

GANG · FORWARD

P O C O · A · P O C O


I · A M · R E A D Y


WILLIAM · STIRLING · MAXWELL



133.3

Seal of St. Maxwell
on binding





And. Vesalius de corporis humani fabrica lib. VII.
Basileae. 1543.


First edition of this fine book. The last prints
and Johan Calcar, a pupil of Titian. (Munich.
[ed. 106th] vol. V. p. 1151.)


Johan Stephan ^{van} Calcar of Calcar was b. circa
1500 in a town that name in the Duchy of Cleves.
& died about 1540. Vasari (Vita Ferraro, 1557, 1566
in p. xiii p. 150) speaking him with high praise
as a Fleming who had so completely caught the Italian
style that his works could mention him as rival to a
Fleming. As a painter he was a successful imitator of
his master Titian.

His portrait of And. Vesalius in this volume is
so well reported that I cannot find it worthy of a
place in my examples of the engraved Portraits
of the 16th Century; 1577, which is a copy of p. 58.

An original, or at least an old portrait in
up type, of Vesalius, agreeing with the portrait, & as-
cribed to Titian in the Vaticanian Museum
in glass case & inventory.

The title page of this volume, representing Ves-
alius in his lecture room, is also a very fine
great interest. It is possible that many of the
heads, as well as that of the Professor, are portraits.
With the exception of these little, the blocks ap-
pear to have been used again in the 2d edition of
the book which was published at Basel, by the same
publisher, Jan. Opvicius in 1555. The title block
in that edition is evidently a copy, by a very inferior hand,
as may be seen by comparing, in the two, the heads of Ves-
alius; the title-tablet, & the tablet at p. 174 page; the last
book & tables on the table near the Professor; the boy & woman
on the left; & the man & dog on the other. This latter group
had in the later edition, been increased but not improved by
addition of a goat.

Bruckert, *Dictionnaire des Moeurs grammes*
Moguer n. Mireuil, 1832. Part 1 p. 263
notices the mark  at the top of the post, & says
it may be that of John Harbst or Oporinus the
Printer, who headlets is not known to have been
a wood engraver, & that therefore the mark, if it be
his, is used probably in his quality of publisher.
This seems to be a very important conjecture.
R. says "We pretend that the woodcut in Volume
are by John Harbst (also it might have been de-
signed, but we cannot continue our list but that it
was likely that an eminent painter of history &
portraits would have wanted his name in
cutting wood-blocks".

The initial  at the beginning of the
book is one of them very fine.

Q. 1612 Boys dissecting a
pig.

Q. 1614 Boys putting a human skull
into a cauldron, which is boiling in a furnace.

I. 1619 Boys equipped as soldiers
examining the wounds of a comrade.

I. 1620 Boys hauling up the body of a
wolf by a rope tied to its hind feet, and
dragging it up a steep hill.

I. 1621 Boys hauling up the body of a
wolf by a rope tied to its hind feet, and
dragging it up a steep hill.

I. 1622 Boys hauling up the body of a
wolf by a rope tied to its hind feet, and
dragging it up a steep hill.

I. 1623 Boys hauling up the body of a
wolf by a rope tied to its hind feet, and
dragging it up a steep hill.

I. 1624 Boys hauling up the body of a
wolf by a rope tied to its hind feet, and
dragging it up a steep hill.

I. 1625 Boys hauling up the body of a
wolf by a rope tied to its hind feet, and
dragging it up a steep hill.



ANDREAE VESALII
BRUXELLENSIS, SCHOLAE
medicorum Patauinae professoris, de
Humani corporis fabrica
Libri septem.

CVM CAESAREAS
Majest. Galliarum Regis, ac Senatus Veneri gra-
tia et priuilegio, ut in diplomatis eorundem continetur.

B A S I L E A E.

AD DIVVM CAROLVM QVINTVM, MAXIMVM, INVICTISSIMVM

QVE IMPERATOREM, ANDREAE VESALII

in suos de Humani corporis fabrica libros, Praefatio.



VANTVMVIS uaria in artibus scientiisq; tractan-
dis grauius obfistat, quo minus accuratè perdiscan-
tur, minusq; foeliciter in usum succedant, CAROLE
clementissime Cæsar, tamen haud mediocrè dispen-
dium quoque adferre arbitror, nimum diductam
disciplinarum, quæ uni cuiuspiam arti absolundæ fa-
mulantur diuisionem, & multo adhuc magis eius ar-
tis exercitiorum adeò morosam ad diuerfos artifices
distributionem, ut qui artis scopum sibi præfixerūt,
unam eius partem ita complexentur, ut cæteris quæ
ipsum maximopere spectant, & ab illo seungi ne-
queunt, relictis, nihil unquam egregium præstent,
ac propositum finem nunquam attingentes, à uera
artis constitutione perpetuo declinent. Nam, ut cæ-

teras quidem silentio præteream, & de eaquæ sanitati hominū præfecta est, aliquantisper ser-
monem instituam, profectò in hac tametsi reliquarum omnium quas hominis ingenium adin-
uenit longè cōmodissima & imprimis necessaria difficilisq; ac operosa sit, nihil pestilentius irre-
pere potuisset, quàm quòd aliquando, & præcipue post Gotthorum illuuiem, Manforem q;
Persiæ regem (sub quo Arabes nobis adhuc cum Græcis meritò familiares uigebant) medi-
cina coulq; lacerari cepit, quòd primarium eius instrumentum manus operam in curando ad-
hibens, sic neglectum est, ut ad plebeios ac disciplinis medicæ arti subseruientibus neuti-
quam instructos, id quasi uideatur esse demandatum. Quamuis enim tres medicorum se-
ctæ olim extiterint, Logica uidelicet, Empirica & Methodica, nihilominus tamen illarum
autores uniuersæ artis scopum ad conseruandam sanitatem, morbosq; profligandos direxe-
runt, deinde huc omnia, quæ singuli in suis sectis arti necessaria existimabant, referentes, tripli-
ci auxiliorum instrumento utebantur, quorum primum uicius fuit ratio, secundum omnis
medicaminum usus, tertium manus opera, quæ uel præ cæteris medicinam esse deficientissimam
additionem, & superfluoꝝ ablationem, eleganter ostendit, ac nunquam non fui usum in affe-
ctuum curatione præbet, quoties in remedia obimus, quorum beneficio hanc generi hu-
mano saluberrimam esse, tempora ususq; docuerūt. Triplex hæc medendi ratio, cuiuscunq; sectæ
medicis æquè erat familiaris, ipsiq; proprias manus pro affectuum natura curationi accommo-
dantes, non minorem industriam in illis exercendis impenderunt, quàm instituendæ uicius
rationi, aut medicamentis dignoscendis, ac componendis. quemadmodum præter cæteros
diuini Hippocratis libros, ij liquidò arguunt, quos de Medici munere, de Ossium fracturis,
Articulorum luxationibus, eiusq; generis malis omnium absolutissimè conscripsit. Quin &
Galenus post Hippocratem medicinæ princeps, præterquam quòd Pergamentum gladi-
atorum curationem sibi soli commissam subinde gloriatur, neque ingrauescente iam ætate,
simias ab ipso secandas famulorum opera excoꝛiari uoluit, crebrò inculcat, quantum manus
artificio oblectatus sit, quamq; studiose id cum cæteris Asiæ medicis exercuerit. Imò ueterum
nullus non æquè attentè curationem quæ manu fit, atque eam quæ uiciu ac medicamen-
tis perficitur, posteris tradidisse uidetur. Verùm maximè post Gotthorum uastationem,
quando omnes scientiæ antea pulcherrimè florentes, atque ut decebat exercitiæ, pestum iure,
lauiore medici primum in Italia ad ueterum Romanorum imitationem manus operam fasti-
dientes, quæ in agris manu facienda ducerent, seruis præscribere, ac illis tantum architec-
torum modo astare, coeperunt. Mox quum sensim cæteri quoque ueram medicinam exercitan-
tium incommoda detrectarent, quæstui honorisq; nihil interim subducentes, à priscis medicis
promptè degenerarunt, coquendi modum, omnemq; adeò uicius præparationem agrorum
custodibus, medicaminū compositionem pharmacopolis, manuum uerò munus tonsoribus
relinquentes. Atque ita temporis successu, curandi ratio tam miserè diuulsa est, ut medici qui-
dem, se physicorum nomine uenditantes, medicamentorum & uicius ad reconditos affectus
præscriptionem sibi duntaxat arrogauerint: reliquam autem medicinam, ijs quos Chirur-

gos nominant, uixq; famulorum loco habent, relegant, turpiter à se quod præcipuum & antiquissimum est medicinae membrum, quodq; naturæ speculationi (si modo quod aliud) in primis innititur, depellentes: id quod tamen hodie apud Indos maxime reges exercent, Persæ hæreditario iure suis liberis perinde ac quondam tota Asclepiadum ars tradunt, Thracæ cum plerisque nationibus summè colunt ac uenerantur, ea artis parte propemodum neglecta, quam olim Romani tanquam eludendis interimendisq; hominibus excogitatum, è re publica proferunt: ut quæ citra Naturæ opem nihil penitus accommodet, imò & illam alioquin in morbo à se explicando fatigentem, iuuare studens, frequenter totam pessundet, & ab officio prorsus abstrahat. Vnde etiam illi potissimum debemus, quod tot conuicijs in medicos iaci solitis hæc sacratissima ars eluditur, quum tamen ipsius pars, quam liberalibus disciplinis instituti à se turpiter diuelli sinunt, præcipua laude illam perpetuò illustret. Quando enim ingeniorum fons Homerus medicum uirum multis præstantiorem esse affirmat, & cum uniuersis Græciæ poetis Podalirium & Machaonem celebrat, hi diui Æsculapij filij non ideo prædicantur, quod febriculam, & quæ sola Natura absque medici auxilio leuius, quàm illo adhibito, sanat, remouerent, hominum uel palato in reconditis deploratisq; affectibus subsisterent: sed quia luxationum, fracturarum, uulnerum, & reliquarum continuitatis solutionum, sanguinisq; fluxus curationi potissimum præsent, ac spiculis, telis, atque alijs eiusmodi malis (quæ bella in primis inferunt, diligentemq; medici operam semper expent) generosissimos Agamemnonis milites liberarent. Verum augustissime Cæsar CAROLE, unum medicinae instrumentum alijs præferre, haudquaquam proposui: quum triplex dicta auxiliorum ratio minime disjungi possit, & tota ad unum artificem attineat: atque ad hanc ut debite exequatur, omnes medicinae partes ex æquo ita constitutæ paratæq; sint, ut singula eo felicius in usum referantur, quo quis cumulatius omnia inuicem iungat. Quamuis etiam rarus omnino morbus occurrit, qui non statim triplex præsidiorum instrumentum requirat: itaq; opportuna uicis ratio instituenda, & medicamentis ac demum manu aliquid molienti sit, adeo ut huius artis tyrones modis omnibus hortandi ueniât, ut illorum (si dijs placet) physiconum susurros uilipendentes, Græcorum more, ac quemadmodum artis natura penitus præcipit, manus quoq; curationi admoueat, ne deinceps laceram mendicationem, in communis hominum uitæ perniciem conuertant. Atque hoc eo instigandi sunt diligentius, quo in medicina hodie integrius eruditos, à manus opera, tanquam à peste, ideo præsertim abstinere cernimus, ne à medicorum Rabinis apud indoctam plebem pro tonsoribus tradantur, ipsiq; postmodum neque par cum istis uix dimidiatio medicis quæstus, neque honor, neque apud imperitum uulgus æstimatio accedat. Hæc etenim detestabilis uulgi opinio præcipue remoratur, quo minus totum curandi artificium, uel hoc etiam seculo assumamus, & interiorum affectuum curationem duntaxat nobis asciscentes, magna mortalium noxa (ut semel uereq; dicam) modica solum ex parte medicis esse studcantus. Quippe quum primum ad pharmacopolas uniuersa medicamentorum compositio relegatur, mox etiam medicis impense ipsis necessariam simplicium medicamentum cognitionem auferunt, atque ut tot barbaris uocibus, falsisq; etiam pharmacis officinae scaterent, tot uero elegantissimæ ueterum compositiones nobis pariter deessent, adhucq; complures etiam lateant, autores fuere: ac inexhaustum laborem pararunt cum ætatis nostræ, tum qui ante annos aliquot hanc præcellere eruditissimis uiris, indefesso studio simplicium medicamentorum cognitioni sic incumbentibus, ut illam pristino nitore restituere conati, plurimum contulisse uideantur: cuius rei inter tot celebres alioquin uiros, argumentum præbet, huius ætatis rarum specimen Gerhardus Vueldbik, Maiestati tuæ à secretis, uariq; disciplinarum ac linguarum eruditione cum primis ornatus, atque in stirpium historia nostrorum hominum exercitatus. Cæterum peruerissima hæc curationis instrumentorum ad uarios artifices diductio, adhuc multo execrabilius naufragium, ac longè atrociorem cladem præcipuæ naturalis philosophiæ parti intulit, cui quum hominis historiam complectatur, firmissimumq; totius medicæ artis fundamentum, ac constitutionis initium iure habenda sit, Hippocrates & Plato tantum tribuerunt, ut illi inter medicinae partes, primas esse adscribendas non dubitarent. Hæc nanque cum prius à medicis unice excoleretur, ipsiq; in hac adipiscenda omnes neruos intenderent, tum demum miserè collabi coepit, quum ipsi manuum munus ad alios reijcientes, Anatomem perdididerunt. Dum enim medicis solam interiorum affectuum curationem ad se pertinere autumabant, etiam uiscerum cognitionem sibi abundè sufficere arbitrabantur, & ossium, musculorum, neruorum, uenarum, artèriarum quæ ossa musculosq; perperant fabricant, ueluti ad ipsos non spectantem, neglexerunt. Ad hæc quum uniuersa administratio tonsoribus committeretur, non solum uera uiscerum cognitio medicis periit, uerum etiam dissecandi industria

intercidit prorsus, eo quod scilicet hi confectionem non aggredierentur, illi uerò quibus manus artificium committeretur, indoctiores essent, quam ut dissectionis professorum scripta intelligerent: tantum abest, ut difficillimam abstrusissimamque artem manu ipsis traditam, id hominum genus nobis asseruaret, utque haec pestilens curatiuae partis dispersio detestabilem ritum in Gymnasijs non inueneret, quo alij humani corporis sectionem administrare, alij partium historianam enarrare consueuerunt. his quidem graculorum modo, quae nunquam aggressi sunt, sed tantum ex aliorum libris memoriae commendant, descriptae uel ob oculos ponunt, alie in cathedra egregio fastu occinentibus: illis autem adeò linguarum imperitis, ut dissecta spectatoribus explicare nequeant, atque ex physici praescripto ostendenda lacerent, qui manu corporis sectioni nunquam adhibita, tantum ex commentario nautam non sine supercilio agit. Atque ut sic omnia perperam docentur in scholis, ac ridiculis quaestionibus dies aliquot abeunt, ita quoque spectatoribus in illo tumultu pauciora proponuntur, quam lanus in macello medicum docere possit. ut aliquot Gymnasia praeteream, ubi de humani corporis compage refecanda uix unquam cogitatur: usque adeò uetus medicina à pristino decore ante plures annos deficiit. Porro quum illa iam pridem in tanta huius seculi (quod tuo numine prudenter moderari uolunt superi) felicitate cum omnibus studijs ita reuiuiscere, atque à profundissimis tenebris caput suum erigere coepisset, ut ueterem candorem citra controuersiam in nonnullis Academicis propemodum recuperasse uideretur, nihilque illa impensius adhuc desideraret, ac prorsus emortuam humani corporis partium scientiam, ipse tot praestantium uirorum exemplo prouocatus, huic pro mea uirili, ac ijs quibus possem rationibus opem ferendam duxi. Ac ne, omnibus aliquid communium studiorum gratia tanto successu attentantibus, solus torpescerem, aut etiam à meis progenitoribus degenerarem, hoc naturalis philosophiae membrum ita ab inferis reuocandum putauit, ut si non absolutius apud nos, quam aliàs unquam apud praefatos dissectionum professores uersaretur, eò tamen pertingeret, ut aliquando haud puderet asserere, hanc dissectionis rationem cum antiqua illa conferri posse: nostraque hac tempestate nihil simul ita collapsum, moxque integritati restitutum, ac Anatomen fuisse. Verum id studium neuiquam successisset, si quum Parisijs medicinae operam darem, huic negotio manus non admouissim ipse, ac obiter mihi & cõsodalibus ab imperitissimis tonsoribus in una atque altera publica sectione uisceribus aliquot superficiei tenus ostensis acquieuissem. adeò enim perfunctorie illic, ubi primum medicinam prosperè renasci uidimus, Anatome tractabatur, ut ipse in brutorum alioque sectionibus sub celebri ac nunquam satis laudato uiro Iacobo Syluio uersatus, tertiam cui unquam mihi adesse obtingit sectionem, solito absolutius, & sodalium & praceptorum hortatu adductus publicè administrarem. Quum autem secundò (tonsoribus ab opere iam relegatis) illam aggredierer, musculos manus cum accuratiori uiscerum dissectione conatus sum ostendere. praeter octo enim abdominis musculos turpiter, peruersoque ordine laceratos, nullum unquam musculum, ut neque etiam os aliquod, multoque minus adhuc neruorum, uenarum, arteriarum exactam seriem, quisquam mihi primum monstrauit. Mox Louanij, quò ob belli tumultus mihi redeundum fuerat, quòd illic decem & octo annis de Anatomie ne somniauerat quidem medici, utque de eius Academiae studiosis bene mereret, ac ipse in re prorsus abdita, & mihi ad medicinam apprimè necessaria exercitatio redderet, accuratius paulo quam Parisijs, humanam fabricam ita inter diuidendum enarraui, ut iuniores eius Academiae professores nunc magnam atque adeò seriam ac diligentem in hominis partibus dignoscendis operam impendere uideantur, probè intelligentes, quam egregiam philosophandi suppellectilem earum notitia ipsis suppeditet. Porro Patauij in clarissimo totius orbis gymnasio, quia ad medicinae chirurgicae professionem (quam, ne à reliqua medicina me ipsum disiungerem, annis quinque illustrissimam, & erga doctrinarum studia longè liberalissimam) SENATVS VENETI stipendijs conductus, praeegeo) Anatomes quoque tractatio pertinet, eam in hominis constructione inquirenda nauauit operam, ut modò saepius hinc & Bononiae hanc ita administrauerim, ridiculorumque scholarum more expulso sic ostenderim atque docuerim, ut in hac nihil quod à ueteribus proditum ad nos peruenit, desiderare possimus, ac nullius quae occurreret partis constructionem adhuc expeteremus. At medicorum segnities nimium cauit, ne Eudemi, Herophilii, Marini, Andreae, Lyci, ac aliorum dissectionis procerum scripta nobis refererentur, quum ne fragmentum quidem alicuius paginae super sit tot illustrium autorum, quos uel Galenus secundo commentario in Hippocratis librum de Natura humana, plures uiginti commemorat, imò & Galeni Anatomicorum librorum uix dimidia pars ab interitu est uindicta. Qui uerò ipsum sunt secuti, in quorum classem Orisabium, Theophilum, Arabes, & nostros quotquot legere haecenus mihi licuit, recenseo (illorum bona dixerim uenia) omnes, si modò

quid lectu dignum tradiderunt, ex Galeno id sunt mutuati, & per louem studiose secanti, nihil unquam minus aggressi uidentur, quàm humani corporis sectionem: adeò mordicus horum primarij nescio cui dicendi generi, aliorumq; in refecando oscitantæ fidentes, Galenum in dispendiosa compendia turpiter redegerunt, nunquam ab illis dum ipsius sensa assequuntur, ne latum quidem unguem recedentes: imò librorum frontibus adijciunt, ipsorum scripta è Galeni placitis penitus confarcinata, suaq; Galeni esse omnia, ideo etiam subiungentes, si quis fortè ea duceret reprehendenda, ob id Galenum quoq; esse cõtemnendum arbitretur. Atque ita huic omnes fidem dedere, ut nullus repertus sit medicus, qui in Galeni anatomicis uoluminibus, ne leuissimum quidem lapsum unquam deprehensum esse, multoq; minus deprehendi posse, censuerit: quum interim (præterquam quòd Galenus se frequenter corrigit, suamq; negligentiam in quibusdam libris commissam, in alijs, postea exercitator reddidit, non semel indicat, contrariaq; frequenter docet) nobis modò ex renata dissectionis arte, diligentiq; Galeni librorum prælectione, & in plerisque locis eorundem non penitenda restitutione constet, nunquam ipsum refecuisse corpus humanum: at uerò suis deceptum simijs (licet duo ipsi arida hominum cadauera occurrerint) crebro ueteres medicos in hominum confectionibus se exercentes immeritò arguere. Quinetiam quamplurima apud Galenum inuenias, quæ in simijs quoque minus rectè affectus est, ut taceam, mirandum esse maxime, in multiplici infinitaq; humani corporis organorum & simiæ differentia, nullam nisi in digitis ac poplitis flexu, Galenum animaduertisse: quam cum cæteris procul dubio omisisset, nisi citra hominis dissectionem ipsi fuisset obuia. Verùm in præsentia, haudquaquam institui falsæ Galeni dissectionis professorum facile principijs dogmata perfringere: multoq; adhuc minus in ipsum bonorum omnium autorem, mox initio impius, suæq; autoritatis parum obseruans haberi uelim. Haud enim ignoro, quàm medici (longè secus quàm Aristotelis sectatores) turbari soleant, quum multo sæpius quàm ducentes à uera partium humanæ harmoniæ, usus functionisq; descriptione, Galenum declinasse, in unius Anatomes administratione nunc obseruât, toruè interim & summo defendendi studio dissectas particulas expendentes. Quamuis & hi ueritatis amore ducti, paulatim inde mitescant, suisq; oculis ac rationibus nò inefficacibus plus fidei, quàm Galeni scriptis adhibeant, hæc uerè paradoxa non ab alijs autoribus emendicata, neque autoritatum congerie tantum firmata, huc illuc ad amicos sedulo perferibentes, & ad illorum inspectionem, ac demum ad ueræ Anatomes cognitionem, tam sollicitè & amicè hortantes: ut spes sit, hanc breui in omnibus Academicis ita excolendam, quemadmodum Herophili, Andreæ, Marini, aliorumq; præstantissimorum dissectionis procerum seculo in Alexandria olim exerceri consuevit. Quod quo felicioribus Musarum auspicijs succedat, quantum in me fuit, præter illa quæ aliàs huius argumèti in lucem edidi, & quæ plagiarij quidam me procul à Germania absentem arbitrati, tanquam sua emisserunt, iam de integro humani corporis partium cognitionem eo ordine in septem libros redegi, quo in hac urbe & Bononiæ in illo eruditorum uirorum cœtu ipsam pertractare soleo. Hac siquidem ratione, qui secanti adfuerit, demonstratorum habebunt commẽtarios, cæterisq; leuiori negotio Anatomen ostendent. Quanquam alioquin & his quibus inspectio denegatur, minime futuri sint inutiles, quum cuiusque humani corporis particulæ numerum, litum, formam, magnitudinem, substantiam, ad alias partes connexum, usum, munus, ac eiusmodi permulta, quæ in partium natura dissecantes rimari consueuimus, unà cum mortuorum uiuorumq; refectionis artificio, satis diffusè persequatur, & partium omnium imagines sermonis contextui insertas ita contineant, ut ueluti dissectum corpus operum Naturæ studiofis ob oculos collocent. Ac primo quidem libro omnium ossium cartilaginumq; naturam enarraui, quæ quòd illis reliquæ partes suffulciantur stabilianturq; & secundum hæc describantur, ab Anatomes studiofis primùm cognoscenda ueniunt. Secundus liber ligamenta, quorū beneficio ossa cartilagineq; inuicem cõnectuntur, & dein musculos, motus è nostro arbitratu pendentis opifices, commemorat. Tertius, uenarum quæ musculis & ossibus cæterisq; particulis familiarem quo enutrantur sanguinem deferunt, ac dein arteriarum insiti caloris spiritusq; uitalis temperiem moderantiũ, frequentissimam seriem complectitur. Quartus non modò neruorum qui musculos adeunt distributionem, sed & reliquarum quoque omnium propagines edocet. Quintus organorum nutritioni, quæ potu & cibo perficitur, famulantium constructionem tradit: ac insuper ob sedis uiciniam, instrumenta etiam continet, ad speciei successiõnem à summo rerum Opifice fabricata. Sextus cordi uitalis facultatis fomiti, ipsiq; subministrantibus particulis dicatur. Septimus uerò cerebri & sensus organorum harmoniam ita persequitur, ut illic neruorum à cerebro originem ducentium series quarto libro expressa, nò repetatur. Quippe in horum librorū ordine digerendo, Galeni sen-

sententiam sum sequutus, qui post musculorum historiã, uenarum, arteriarum, neruorum, & dein uiscerum Anatomen pertractandam duxit. Quantum uis nō inepte, ac potissimum apud huius scientiæ tyronem, aliquis cum uasorū distributione rudem uiscerum cognitionē ita perfectam contendet, quemadmodum in Epitome præstiti: quam ueluti horum librorū semitam, ac in illis demonstratorū indicem præparauit, Serenissimi Principis PHILIPPI Maiestatis tuæ filij, ceu uiui paternarum uirtutum exemplaris (à quo quæcūq; in optimo totius orbis moderatore desiderari possunt, quàm cumulatissimè expectantur) splendore decoratam, auroritateq; munitam. Verum hūc quorundam iudicium mihi succurrit, qui non duntaxat herbarum, sed & humani corporis partiū quantum uis etiā exquisitissimas delineationes, rerum naturalium studiosis proponi, acriter damnat; quod has non picturis, uerum sedula refectione, rerumq; ipsarum intuitu disci oporteat, perinde sanè ac si hoc nomine uerissimas, ac utinam à typographis nunquam deprauandas partium icones sermonis contextui adhibuissim, ut studiosi illis freti, à cadaverum sectione temperarent; & nō hīs potius, quibus possem modis medicinæ candidatos ad cōsectiones proprijs manibus obeundas, cum Galeno hortarer. Profecto si uerum, qui pueros domi in cōsectionibus administrandis, perinde atque in pingendis elementis & lectione exercebant, consuetudo huc usq; deducta fuisset, non picturis modo, uerum & omnibus cōmentarijs perinde atque ueteres illos facile nos carere permitterem: qui tum primum de Administrandis dissectionibus scribere sunt aggressi, quum nō liberis solum, sed alienis etiam uiris quos uirtutis nomine suspiciebant, artem cōmunicare honestū esse censuerunt. Cum primum enim pueri non amplius in sectionibus exerceri cōsueuer, protinus necessariò accidit, ut Anatomen infelicius cōdiscerent, exercitatione, quam in pueritia auspicari solebāt, abolita. Adeo ut quārs Asclepiadum familia excidisset, multisq; seculis in deterius uergeret, opus fuerit libris qui speculationē ipsius integrā cōseruariēt. Quantum uerò picturæ illis intelligendis opitulentur, ipsoq; etiā uel explicatissimo sermone rem exactius ob oculos collocent, nemo est qui nō in geometria, alijsq; mathematū disciplinis experiatur: præterquàm quod nostræ partium imagines illos impense oblectabūt, quibus nō semper humani corporis refecandi datur copia: aut si datur, tam delicata & in medico parum probāda præditi sunt natura, ut etiam iucundissima hominis cognitione, immensi rerū Conditoris sapientiā (si quid aliud) attestāte, insigniter capiantur, eò tamen animum inducere nequeunt, ut uel sectioni aliquādo intersint. Vt cūq; uerò sit, toto opere id unice studiū, ut in negotio longè reconditissimo, neq; minus arduo, quam plurimis prodessem, humaniq; corporis fabricæ non decē, aut duodecim (uti obiter spectanti apparet) sed aliquot mille diuersis partibus extractæ historiā, quàm uerissimè & absolutissimè pertractarē, ac intelligendis Galeni libris posteritati adhuc asseruatis, & inter cætera diuini eius uiri monumēta præceptoris operā requirentibus, nō spernendā frugem medicinæ candidatis adferre. Licet interius non me lateat, quàm conatus iste meæ ætatis, qua uigessimū octauum annum nondum excessi, nomine, parū autoritatis habebit, ac quamminimè ob crebram non uerorum Galeni dogmatum indicationem, ab illorum moribus erit tutus, qui mihi Anatomen docenti nō astitere, aut ipsi hanc sedulò non sunt aggressi, primaq; fronte uarias rationes in Galeni defensionem cōminiscentur, nisi magno alicuius numinis patrocinio ex more commendatus in lucem auspicatò prodeat. Verum quia maiori nullo quàm diui CAROLI, inuictissimi, maximiq; Imperatoris nunquā intermorituro nomine tutius muniri, splendidiusq; ornari potest, tuam Cæsaream Maiestatem omni reuerentia supplex iterum atq; iterū obsecro, ut iuuenile hoc meum studiū multis rationibus causisq; sibi obnoxium, sub ipsius ductu, splendore ac patrocinio in hominū manibus tantisper uersari sinat, donec per rerum usum, ac quod ætate accedit iudiciū, eruditionemq; hunc laborem summo optimoq; Principe digniore reddam, aut aliud non reiiciendum alijs ex arte nostra deprompti argumenti munus offeram. Quamuis augurer, ex uniuerſa Apollinea disciplina, adeoq; tota naturali philosophia, nihil tuæ Maiestati gratius acceptius ue procudi posse, historia, qua corpus & animum, ac præterea diuinum quoddam numen ex utriusq; symphonia, & nosmetipsos denique (quod uerè hominis est) cognoscimus. Atque ut id pluribus colligo argumētis, ita inde in primis conijcio, quod in ea librorum frequentia, quæ sceleris memoriæ MAXIMILIANO Romanorū maximo Imperatori auctore cōsecrati fuere, nullus præsentis negotij libello unquam gravior extiterit. Neq; unquam obliuiscar, qua uoluptate tabulas meas Anatomicas inspexeris, quàmq; curiose de singulis percunctatus sis, quas pater meus Andreas Maiest. T. à pharmacis primarius iuxta ac fidelissimus, aliquando intuentas obtulit. Ut nunc præterea incredibile illum, ut in omnes disciplinas, ita etiā multo maximè in mathematicas, & præsertim eius quæ mundi astrorumq; scientiam pertractat, amorem, & in tanto heroe admirabilem eius peritiā. Adeo, ut haud fieri queat,

AD CAROLVM V. INVICTISS. IMP. PRAEFATIO.

quin ut mundi scientia unice teneris, ita etiam aliquando omnium creaturarum absolutissimae fabricatione expēdenda delecteris, & immortalis animae diuersorio ac instrumēto cōsiderando uoluptatem capias: quod domicilium, quia permultis nominibus mundo egregie correspondet, ueteribus haud ab re microcosmus nuncupabatur. Caterum, uti modo homini dignissimam sui corporis structurae cognitionem, per se longē commendatissimam, & cui tantopere uel Romae summos uiros, tum rebus, tum disciplinis philosophicis per omnia praecipuos, operam impendere iuuit, minimē hic praedicandam statui: ita quoque Magni illius Alexātri, qui non nisi ab Apelle pingi, à Lysippo in aere duci, & à Pyrgotele sculpi uoluit, probē memor multo minūs hic laudum tuarum aliquid recensendum duxi, ne ieiuna & parum exercitata oratione, illis pro luce tenebras offundam, praesertim quum prorsus improbandus sit, nimium receptis in Praefationibus ritus, quo absq; omni delectu, & ferē prae meritis, ueluti ex typo & formula quapiam, uilis alicuius praemioli gratia, omnibus ascribi solent, suspicienda doctrina, singularis prudentia, mira mansuetudo, acce iudicium, indefessa liberalitas, erga literatos & studia mirus amor, in rebus agendis summa celeritas, omnisq; adeo uirtutū chorus, quo tuam Maiestatem non minus quam dignitate, ac felicitate, rerumq; gestarum triumphis uniuersos mortales anteire, nullus nō (quamuis hic à me non dicatur) perspectissimū habet, unde etiam summi numinis loco adhuc uiuus coleris: quod ut Dii studijs & toti orbi non inuideant, sed diutissime mortalibus in colume, perpetuoq; felix seruent actuantur, precor.

Patauij, Calend. Augusti, anno post natum CHRISTVM

M. D. XLII.

TYPOGRAPHVS LECTORI.

Quoniam Epistola, quam unā cum Tabulis, ad hocce de Humani corporis fabrica libros & ipsorum Epitomen paratis, ab ANDREA VESALIO ex Italia missam accepimus, pleraque continere nobis uisa est, quorum alioquin Lectorem initio admonendum putassimus, quaeq; Typographis, praecipue ita parui Principum decreta pendentibus, & ad ea quae in rei literariae usum euulgantur deprauanda natis, significanda uidebantur, operae precium duximus illam ita quoque uti ad nos missa est, candidis

Lectoribus communicare.


S.




CCIPIES breui simul cum his literis per Mediolanenses mercatores Danonos; tabulas ad meos de Humani corporis fabrica libros, & eorundem Epitomen sculptas. Utinam tam integrè ac tutò Basileam perferantur, atque sedulò cum sculptore & NICOLAO STOPIO hic Bombergorum negotiorum fidelissimo curatore, in humanioribusq; studijs apprime uersatò iuvene, eas composui: nè aliqua ex parte atterantur, aliud ue incommodum ipsis ueclura inferat. Inter tabularum seriem exemplar frustatim reposuimus, simul cum impresso singularum figurarum typo, cui quo quaque loco repouenda ueniat ascripti: ne forte illarum ordo ac dispositio tibi tuis ue operis negotium facesseret, figuræq; non ordinatim imprimerentur. In exemplari promptè discernes, ubi genus characterum sit immutandum, quandoquidem scripturæ partem, quæ organorum historiam complectitur, continuoq; orationis contextu singulis capitibus absoluitur, lineis ab ea distincti, quæ ad characterum qui in tabulis sculpti occurrunt explicationem iuuat: ob idq; figurarum & characterum Index appellatur. In continua orationis serie nusquam figuris indicandis interrupta, litterulas expendes, quas in officinis super lineares nuncupatis: quæ illis respondent annotationibus, quas interiori margini non tantà industria, quanto labore & tædio, adhibui, ut lectori uelut scriptorum essent commentarius, exprimens in quâ nam figura pars, cuius mentio incidit, spectari possit: uti annotationes in exteriori margine obuiæ, eorum quæ enarrantur argumentum quodammodo proponunt. In interioribus, ne essem prolixior, eam rationem obseruavi, ut quotiescunque figura indicatur, quæ capiti, ubi annotatio spectatur, præfixa est, nullum capitis numerum indicem: quem alioquin appono, si figura alteri præponatur capiti. Rursus, si figura in libro ubi annotatio occurrit, inueniatur, libri numerum figuræ haud subijcio. Quamobrem uerò figuræ hoc illo ue loco collocandas duxerim, in librorum titulis, & characterum indicibus abunde explicatum reperies. Notarum enim, quibus partes in delineatione quapiam insigniendæ fuerūt, loco, characteres quorum in officinis perpetuò usus est, in tabulis sculptimus: primum ferè à maiusculis, & dein alijs Latinorum orsi: in super Græcorum minoribus: mox ab eorundem grandioribus, qui Latinis non sunt familiares: quum uerò hi omnes non sufficerent, numerorum typos assumpsimus, & si quæ alia notula in communibus typis occurrebat. In horum indicibus descriptione obseruatum est, ut indicans unamq; priuatam explicationem habens character, in margine liber collocetur. Si uerò peculiarem non habeat indicem, ac uelut cum alio characterè exprinatur, ipsi punctum in margine subieci, ut unà cum cæteris lectori in serie obuius fieret. Verum hanc rationem, ac potissimum cur characterum indicem cum partium historia confundendum non putauerim, aliàs ad te prolixius scripsi: nunc uerò ijs quibus possum modis hortor, & rogo pariter, ut omnia quam nitidissimè & oculis excudantur, utq; in meis conatibus expectationi, quam omnes de tua Officina, nunc primum magno studio forum commodo, felicitq; Musarum omine instituta conceperunt, satisfacias. Præcipuum studium in tabularum impressione erit impendendum, quòd non uulgariter ac scholasticè, uelut quæ simplicibus duntaxat lineis sint expressæ: nusquam picturæ ratione (si interdum locum quo res delineatæ suffulcrentur, excipias) neglecta. & quanquàm hic iudicio ualeas, nihilq; nõ de tua industria & sedulitate mihi pollicear, hoc unum percuperem, ut inter excudendum id exemplar quam proximè imitareris, quòd à sculptore speciminis sui loco impressum, unà cum ligneis formis reclusum inuenies, ita enim nullus character, quantumuis etiam in umbra reconditus, oculatum sedulumq; lectorem latitabit. & quod in hac pictura longè est artificiosissimum, mihiq; spectatu perquam iucundum, linearum in quibusdam partibus crassities simul cum eleganti umbrarum obfuscatione apparebit. Verum non est quòd hæc tibi perscribam, quum in papyri lænitæte soliditateq; ac in primis in uestrarum operarum diligentia positum sit, ut singula, quale nunc mittimus exemplar, nosq; hic aliquot impressimus, ex tua Officina omnibus proponantur, multisq; fiant communia. Dabo operam, ut non ita multo post ad uos proficiam, & si non toto impressionis tempore, saltem aliquandiu Basileæ cõmorer, necum formulam decreti Senatus Veneti allaturus, quo cauetur, ne quis tabularum

tabularum aliquam absque meo consensu imprimat. Casaris, quantumvis tu generale in omnes libros quos primus imprimis habeas, mater mea ad te Bruxella mittet. dudum enim mihi impetratum fuit: sed ut recentius esset, ad pluresq; annos utile, haec tamen non curauimus describendū. Regis Galliae se mihi adepturum recepit ipsius apud Venetos Orator, Monfessuli antistes. Licet hac ex parte parum sim anxius: imo diplomatum exemplaribus ne paginam quidem occupandam duxerim. Nam quid principum decreta apud bibliopolas, et in omnibus angulis nunc densissime satos typographos ualeāt, abunde in meis Anatomicis tabulis ante annos tres Venetijs primum impressis, et postmodū misere passim deprauatis, maioribusq; interim titulis exornatis, est animaduertere. Augustæ enim mea ad NARCISSVM VERTVNVVM, Casaris et regni Neapolitani primarium medicum, rarumq; profecto nostræ ætatis medicorum exemplar, subducta epistola, nescio quis rabula Germanicè est præfatus, et præter meritum in Auicennam reliquosq; Arabes blaterans, me inter quosdam succinctos Galenos connumerat, et (ut emptori fucum faceret) me coegisse in sex tabulas falsò asserit, quæ Galenus pluribus quàm triginta libris diffuse complexus est. Dein Latina se Germanico idiomate donasse subiungens, attestatur Græcas et Arabicas uoces ab ipso adhibitæ: quum interim non solum tales omnino subduxerit, sed ea omiserit quæ conuertere nequiuit, quorumq; nomine tabulæ in primis debebant esse commendatioræ. præterquam quod Venetam sculpturam peruersè istic sunt imitati. Hoc Augustano sculptore longe rudior imperitiorq; extitit, qui Colonie ipsædem tabulis manum admouit: quantumvis illic nescio quis in typographi gratiam scribat, non tantum ex meis tabulis hominis constructionem melius quàm ex humane fabricæ refectione intueri posse, uerum etiam ipsos ex elegantissimis figuris fecisse multo elegantiores: quum tamen et picturam ualde corruerint, et neruorum delineationem parum feliciter imitam adiecerint, quam ego characterum adiecto indice, uni atque alteri amico, qui id tantisper dum ipse eadem ederem, à me expetebant, ruditer delineaueram. Parisijs tres priores eleganter expresserunt, alij interim propter sculpturæ (uti conijcio) difficultatem omisiss: quum potius à prioribus, si studiosorum habitæ esset ratio, abstinendū fuisset. Cæterum Argentinenfis ille, quæ FVCHSIVS tantis conuicijs ob quædam denuò transscripta proscindit, quemq; ego longe alio iure quàm ipse plagiarium appellare possem, de studijs pessimè est meritis, quod tabulas quæ nunquam satis magnæ studiosis proponi poterunt, tam fœdè contraxerit, et turpissime pictas, ac præter omnem rationem circumscriptas, cum Augustani uersione, tanquam suas emisserit. Huius gloriæ is inuidere usus est, qui undecunque citra delectum compilatis ex aliorum libris, imaginibus, Marpurgi et Francofordiæ eius generis libros adhuc emittere pergit. Adeo ut diuina illa et felicissima Italarum ingenia leuiter feram, et ualde exosculer, quod aliud in Germaniæ medicis iudiciū ob sordidorū quorundam typographorū mancipia requirunt, quæ nullum nō scripti genus uilis alicuius præmioli à typographis emungēdi gratia cōgerere, emutare, transcribere, suoq; nomine ut nouum quid editum uideatur, decretaq; principum sileant, emittere audent. Hæc eò scribo, ut intelligas, quàm parum illa impressioni tuæ adhibenda putauerim, quin potius significandum duxerim, me multo lubentius tabulas alicui industrio typographo quocunque transmissurum: quantumq; in me esset, operam meam in rei literariæ usum communicaturum: quàm ut ineptus aliquis, cui pro mea uirili rationibus omnibus obesse conabor, tabulas tanto labore in communem studiorum usum confectas imitaretur, illæq; turgido quopiam præfixo titulo, perinde ac si à me ita negligenter exijissent, in hominum manus uenirent. Atque hæc potissima est causa, cur tabulas meo sumptu parauerim, ac nunc iterum atque iterum abs te contentam, ut quàm integerrimæ et mundissimæ à tuis operis seruentur. Vale, Venetijs, nono Calendæ Septembres.

Tuus And. Vesalius.



ANDREÆ VESALII.



ANDREAE VESALII

BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPO-

RIS FABRICA LIBER PRIMVS, IIS QVAE

uniuersum corpus sustinent ac suffulciunt, quibusq; omnia
stabiliantur & adnascuntur dedicatus.

QVID OS, QVISQVE IPSIVS VSVS

& differentia. Caput I.



CAETERARVM hominis partium est durissi-
mum, & aridissimū, maximeq; terrestre & frigidum,
& sensus denique præter solos dentes expers. Huius
enim temperamenti summus rerum opifex Deus
substantiā meritò efformauit, corpori uniuerso fun-
damenti instar subijciendam. Nam quod parietes &
trabes in domibus, & in tentorijs pali, & in nauibus
carinæ simul cum costis præstant, id in hominis fa-
brica ossium præbet substantia. Ossium siquidem
alia roboris nomine tanquam corporis fulcrum pro-
creantur, e quorum numero sunt tibiae & femo-
rum ossa, & dorsi uertebrae, ac omnis fere ossium con-
textus. Alia reliquis partibus ueluti propugnacula,
tutissimiq; ualli & muri à natura obijciuntur, quæ in-

Ossium natura.

Ossium usus.

*Ossium differen-
tia ab usu.*

admodum caluaria, uertebrae spinæ, & transuersæ earundem processus, pectoris os, costæ.
Alia quorundam ossium articulis præficiuntur, ne illi plus satis laxè moueantur, aut in-
nimium acutos inclinentur angulos. Huius namque beneficii occasione, ossicula effinguntur,
femur seminis magnitudinē à dissectionis professoribus comparata, quorum quædam secun-
do pollicis manus internodio, & quatuor reliquorū digitorum primis internodijs, & primis
etiam internodijs quinque digitorum pedis coarticulantur. Dentes porro incidendis & con-
fringendis & atterendis molendisq; cibis priuatim conducunt, perinde ac duo auditus instru-
menti ossicula peculiari usu audiendi officio famulantur. Verum cuiusq; ossis primarium mu-
nus, singulorum ossium Caput silius ostendet, quandoquidem in præsentia abunde est, gene-
ratum ossium usum recensere: quo (ut semel dicam) hæc fulcrorum modo uniuersam corporis
molem sustentant, & ipsa omnia adnascuntur & firmantur, & ab ipsidem suspenduntur, adeo
sanè ut ex ossium usu aut officio, non alia quàm modò fere diximus, desumi possit differentia.
In magnitudine uero ossa uariant, quòd nonnulla quidem sint grandia, ut femur, tibia os, hu-
merus, & ossa sacri ossis lateribus utrinque connexa: nonnulla autem parua existant, ut bra-
chialis ossa, dentes, & ossicula quæ femoro assimilantur. Alia rursus ampla sunt, ut ossa sacri os-
sis lateribus coarctata, scapulae, sacrum os, uerticis ossa, frontis & occipitij. Alia angustia & gra-
cilis & longa, ut fibula, radius, ulna, & cum alijs multis costæ. Porro satius erit omnes differe-
rentias, quas à forma petere integrum esset (cum innumeræ occurrant) ad priuatas ossium
descriptiones referuare. Arduum quippe esset, ossibus nondum enarratis assequi, quæ nam
horum sint aspera: ut ea quæ lapidea in caluariæ basi uocabimus, quòd præruptæ rupi simi-
lia uideantur, item quæ læuia sint, ut uerticis ossa, frontis os, pectoris os. deinde quæ triangu-
lum referant, ut scapulae: & quadrangulum, ut uerticis ossa: & quæ cunei speciem obtineant,
ut capitis os, à cuneo *osplanofolius* dictum: & quæ iugis alsimilentur, ut *osyugum* Græcis, iuga-
lia autem nostris appellata: & quæ nostrum imitentur, ut clauiculæ: & quæ ensis effigiem
ostendant, ut pectoris os: insuper quæ figuram referant, ut *osadles* uocatum os: & quæ ra-
dij quo latiores cordulae textuntur figuram expriment, ut cubiti os radij nomine donatum: &
quæ cubo tesserae comparamus, ut pedis os à cubi imagine *osbubolus* nuncupatum: & quæ
cymbæ imaginē accedant, ut pedis os à cymba Græcis *osacapsolus* appellatum: & quæ mola,
scuto & patellæ similia dicantur, ut os genu articulo præpositum: ad hæc quæ totius Italiae
circumscriptionem leuiter proponant, ut femur: & quæ fibulam repræsentent, ut tenuius in ti-
bia os fibula appellatum: & quæ coccygis seu cuculi auis rostro comparentur, ut sacro ossi sup-
positum os, quod coccyx nuncupatur: dein quæ incudis uel molaris dentis effigiem quodam-
modo repræsentent, ut minus organi auditus ossiculum: & quæ malleum, ut grandius eiusdem
organum

*Differentia à
magnitudine.*

À forma.

A

organum

organi officulum: præterea quæ à uerticuli forma nomen fortiantur, ut dorsi uertebræ: & quæ clauo à Græcis *ὀστέον* appellato respondeant, ut dentes: & quæ mediam maiusculæ pisæ seu cicieris formam præferant, ut duo pedis officula, primo pollicis interno odio supposita: eiusque generis ossium quæ forma inuicem uariant permulta, non ita obiter ab illo cui ossa adhuc incognita sint, intelligerentur. Atque hac etiam ratione processuum, appendicum, capitum, superciliarum, sinuum, & tuberculorum imagines, in præfenti nequiquam recensendæ ueniunt: quemadmodum neque aliqua quæ ex hisce sumi possit ossium differentia, quum quid processum, appendicem, eiusque ordinis reliqua nomen, hæcenus non expresserim, ista secundo ab hoc capite necessarii pertractaturus. Ac proinde etiā differentia ab ossium commissurarum speciebus petita, nisi commissuris accuratè explicatis, obuiæ esse nõ queunt. Quod autè quamplurimæ sint, & cognitu non admodum faciles, quartum Caput attestabitur. Item differentia quæ à cartilagine dependere possunt, nondum natura cartilaginis exposita, haud promptè quibus assequeretur. Incognita enim cartilagine, intellectu difficile est, quæ nam ossa cartilagine prorsus destituantur, ut uerticis ossa: quæ illa undique, ut quædam brachialis ossa, aut alia quæ tantum ex parte, ut femur, in crustentur. quæ item in cartilagine degeneret: ut nasi ossa,

*Differentia
ab appendicibus,
processibus, ca-
pitibus, &c.
Ab ossium com-
missuris.*

*A cartila-
gine.*

*Ab ossium
substantia &
constitutione.*

*Quoniam præfens differentia in figuris, singulis Capitis quibus
primariis os aliquod describitur, præpositis, ita ut reliqua quæ hoc*



*Capite pertractantur, non
est obuia, hic appropinquamus
brachij ossis, seu ut cū Cel-
so dicamus: humeri, secun-
dum longitudinem dissecti al-
teram partem, quæ ipsius
capite quod scapula articu-
latur, cauernas pumicis
modo efformatas, & A in-
signitas cõmonstrat: quæ ad
modum et squamæ illis cau-
ernulis obductæ, et B notatæ.
C autem inscribitur portio
exterioris superficiei istius
ossis, hic cõbina. Insuper
D sinum cõmonstrat am-
plexer cauum, qui solidissima
crassaque ossis parte E ac F
indicata circumdatur, secun-
dum humeri longitudinem
exporrigitur. Ad sinus uerò
summum ubi G reponi-
tur, & inum ubi H uisi-
tur, osseæ occurrunt lineæ,
medullam hoc sinu conten-
tam intercentes. Cæterum
sub humero os cymbam refe-
rens, ac undecima figura
trigesimi tertij Capitis ex-
primendū, hic uerò per me-
dium dissectum, & I & K
insignium delineauimus, ut
ossis apparet substantia
pumicis instar constructa.
Ac utrunque quidem L,
cauernosam fungosamue hu-
ius ossis notat substantiam.
M uerò, squamam, quæ of-
fis constituit superficiem,*

*& undique illi fungosæ substantiæ circumducitur. Præterea huic
ossi unum officulorum subiunximus, quæ primo pollicis pedis interna
dio coarctata, in secunda trigesimiterij Cap. figura a & q. osten-
dentur. Atq. hoc ideo N notatum integrè per medium diuisimus,
ut aliquod os impenitè solidum, & cauernulis penè destitutum, in com-
speciem quouis pacto ueneret.*

*In x de Vsu
periti, et alih.
Cõmentar. in
Hipp., lib. de
Fracturis.*

donata sunt, femur, tibiæ os, humerus, maxilla inferior, quartum superioris maxillæ os, frontis os, temporum ossa, & plerumque ipsum cuneiforme os. Dentes autem, qui omnium ossium facile sunt durissimi, huius generis sinum quoque obtinent: sed interim dictis nuper cauernulis, & pumicis modo efformatis foraminulis prorsus destituuntur. Maiores isti sinus, & illa pumici ac exiccato fungo non absimilis constructio, ossibus contigerunt, cum quò motus no-

mine

mine leuiora redderentur, tum ut medullam propriam ipsorum nutrimentum illis continerent, aut priuatim aërem, aliquam uel peculiarem materiam, ut frontis os, temporum ossa, præter medullam, amplecterentur. Neque solum in maioribus his ossium sinibus, ut quispiam arbitra retur, medulla reponitur, uerum illæ spongiæ modo extructæ cauernulæ non minus quàm in signiores illi sinus medulla infarciuntur. Quod autem singulis ossibus prout unumquodque maiori minoriue indiget leuitate, robore & duritia, aut prout huic aut illi sensus organo præ est, sinus hi & ossium densitas iustissime attribuatur, in singulorum ossium enarratione sedulo prosequar. Præter cauernulas & sinus, quibus ossa intus scatent, quædam etiam amplius foraminibus sunt peruia, ut occipitis os, & uerterebræ, quæ dorsalem transmittunt medullam, pubis quoque ossa, quò leuiora reddantur, cæteris omnibus grandius foramen obtinent. Alia autem paruis perforantur foraminibus, ut pleraque capitis & maxillarum ossa, uenis, neruis, arterijs uiam præbentia: & os quod inter capitis ossa octauum numerabitur, odorum gratia tenuibus foraminulis cribri modo perforatum creditur. Alia exterius ac in superficie nullum quod sensu dignoscitur foramen cõmonstrant, ut brachialis ossa, & dentes, & digitorum ossium permutula. Non paucis autem ossibus foraminula obtingunt, quæ exterius ac in superficie sunt conspicua: non tamen uniuersum os penetrant, sed tantum uenis & arterijs crassiora ossa subeuntibus præparantur. Eiusmodi foramina in calcis osse, & talo, & osse sacro, & in grandium uerterebrarum corporibus passim occurrunt: quòd uidelicet hæc crassiora sint, quàm ut à uasis ipsorum superficiem tantum perrepantibus, alimentum commodè queant assumere. Ab ossium sensu leuis admodum pendet differentia. Dentes enim sensu præditos, reliqua autem ossa illo destituta arbitramur: quamuis non nimium temerè ossibus omnem sentiendi uim adimere conuenit, quum in crebris quas manu obimus curationibus interdum ossa dolore affici, etiam præstantissimi medici affirmant: non ignorantes interim membranam quandam omnibus propemodum ossibus obduci, quam *membrana ossium* ob id Græci uocant, cuius gratia alijs ossa (si quid modò sentiunt) sensu pollere uisum fuit. Præterea & soli dentes tota sede qua extra gingiuas prominent, nudi sunt, reliquis interim ossibus omni ex parte tectis, & ante sectionem latitantibus. Ad hæc dentes ubi prominent, membrana ossa inuoluen te destituuntur, ut & caluarie interior superficies, quæ cerebrum continetur, quam dura cerebrum induens membrana proximè succingit, quum alioquin cæteris ossibus dicta prius membrana undique circumducatur, si eas sedes exceperis, quibus ossa uel articulantur inuicem, uel aliquo in mutuo confluuntur.

Qua ossium arte medullæ reponatur.

Ab ossium foraminibus.

A sensu.

Ab occultatione.

A membrana ossa succingente.

QVID CARTILAGO, ET QVIS CARTILAGINIS USUS ET DIFFERENTIA. Cap. II.



CARTILAGO osse mollior est, terrestris tamen ac durissima partium corporis secundum os particula, prorsus solida, & nullis foraminibus cauernulisque ossium modo intus oppleta, & sensus ac medullæ expers. Huius usus perquam uariis est. Primum namque idem præstat quod ossa, quum uelut fulcrum quoddam sit, cui proximæ partes adnascantur, & ad stabiliantur. Cartilagines enim quibus larynx constat, ossium munere elegantius funguntur. quippe ipsis quidam implantatur musculi, ac nonnulli ab illis enascuntur. Insuper cartilagines hæ laryngem perinde effingunt, atque rusticorum domus extrabibus confectas cernimus, priusquam stramina, tegulae, & lutum illis adhibetur. Neque sanè hominum ossa & cartilagines carne nudatas, ac postmodum unà contextas, propius cuiuspiam imaginis assimilaueris, quàm tuguriorum fabricæ iamprimum erectæ, & nondum ramis aut terra ornatae. Pari quoque ratione cartilagines ossium uicem obeunt, quæ inibi reponuntur, ubi nullo osse locato, musculi suam insertionem tentant: quod palpebris & naso cuenit. In palpebrarum enim extremis oblongæ consistunt cartilagines, in quas musculi palpebras mouentes inseruntur. Ad hæc, nasi alæ cartilaginibus efformantur, quæ musculorum insertionem perinde ac ossa excipiunt. Quinetiam illæ alarum cartilagines, nasi apicem unà cum alijs cartilaginibus à nasi ossibus prognatis eleganter ossium ritu suffulciunt, eriguntque. Præterea costarum ossa in cartilagines finiunt, in omnibus quòd ad usum ferè spectat, illis ossibus respondentes: quamuis ex abundanti his cartilaginibus peculiaris usus accedit, quo thoracis amplitudinem (quam illæ cum costarum ossibus efformant) promptius dilatarì constringique pariantur, quàm si rigida & ossis modo duræ essent. Insuper eiusdem ferè usus gratia asperæ arteriæ cartilagines nostri imaginem exprimentes, in hoc ab ossibus discrepant, quòd præter id quòd bellè sustinent, ossisque munus fulciendo gerunt, eam adipiscuntur temperiem, cuius be-

Cartilaginis natura.

Usus communis ossium usui respondens.

Cartilagines ossis proprii usui stringi ac dilatare.

*Cartilaginis
usus in arti-
culis.*

neficio distendi comprimique secus quam os possunt. Adde & alium cartilaginis usum neutiquam infimum, quo hæc ossibus occasionem præbet, ut in continuis frequentibusque motibus attritu minus uidentur. Ossium namque commissuræ motus gratia extructæ, propter ossium siccitatem ex mutuo contactu, leui opera rumpentur, nisi utraque commissuræ ossa tota sede qua se inuicem contingunt, articulumque formant, cartilagine quadam ueluti crusta seorsim obducerentur, & hæc cartilago suo in duritie mollitiæque temperamento impetui resisteret, & unâ incidentis uim cedendo leuiter exoluere. Neque solum cartilago in ossium attritu quo minus mutuo contactu atterantur cominoda est, at ita læuis planaque uisitur, ut promptissime ossis caput in suo sinu uoluatur, nullaque asperitas motus promptitudinem impediat, accedente huc uiscido lubricoque humore, & ueluti smegmate quopiam, quo rotulas ad reflectendum funes oblinimus. Quinetiâ sagax rerum Opifex adeo præstantem cartilaginis usum in articulis fore cognouit, ut non solum ad eum quem diximus modum ossa in mutuo contactu cartilagine læui & lubrica crustæ cuiusdam modo ornauerit, uerum in nonnullis articulis præter has cartilagine tertiam quandam adhibuerit, quæ neutrius ossis cartilagini, sed tantum membraneis articuli ligamenti orbiculatim connascitur, & ueluti cartilaginum ossibus obducentium quoddam interstitium efficitur. Hæc utrinque, quâ inter alias cartilagine consistit, læuis, & ob uiscidum quo oblinitur humorem lubrica est, & multo illis cartilaginibus quæ ossibus obnascitur mollior. Huiusmodi cartilagine inferioris maxillæ ad superiorem articulos intercedere, suo loco audies: deinde aliam pectoris ossis cum clauicula articulum, & nexum clauiculæ cum summo humero, & ulnæ cum brachiali, & tibi ossis cum femore, in quo articulo huius generis cartilagine, sinus, quibus femoris capita excipiuntur, magna Naturæ providentia peculiariter augent. Verum cuiusmodi cartilagine Galeno non uidentur animaduersæ, si ex omnibus eas duntaxat exceperis, quas genu articulo proprias esse diximus: quarum Galenus ligamenti nomine semel, & obiter tantum meminit. Arabibus autem eas notiores fuisse, quodammodo hinc colligitur, quod illi ossium contextum docentes, ossa quidem omnia scripserint esse contigua: illis tantum seclusis, in quibus Laguahic, aut (ut correctius dicamus) Luhach intercedunt, quæ ossa inuicem nonnihil dirimunt, ea uoce huius generis cartilagine mollicie à ligamenti natura parum absumilem intelligentes. At quibus sedibus hæc contineantur, neminem Arabum hætenus docuisse reperi. Huiusmodi itaque usum cartilago in articulis suppeditat, ad quem rursus accedit, quod in plerisque ossium commissuris non ad motum institutis, cartilago quasi glutinis uice interuenit: quemadmodum in pubis ossium commissura fieri animaduertimus, & in minoribus natu corporibus, in appendicis cum reliquo osse coarctis, neque aliorum pilorum modo concidentes sustinent, instar aridi durique soli, in quo arbores firmius figuntur: eo uidelicet pacto, quo in longis nauibus remos, quoties non nauigatur, sua serie firmatos, & ex aqua subleuatos conspiciamus. Præter hæc rerum Opifex nudas & prominentes corporis particulas, & ossium fines alteri ossi non commissas, cartilagine adauxit, nimirum ut tali constarent substantia, qualis neque frangi propter molliciem, neque rumpi propter siccitatem queat. Quod autem cartilago non minus quam ungues ea formentur substantia, uel pueri nos docent, qui maiusculam cartilaginei piscis, aut uituli cartilagine nacti, eam in globulum scindunt, ac ut ualidissime frequentissimeque resiliat, lapidi cuiuspiam injiciunt. Is enim refulsus liquidò cartilaginis temperiem ita arguit, ac quum cæsim punctumque cartilago superficietenus cultro petitur, & ab illo dein resilit. In cartilaginum, quæ nudis partibus contingunt, numero, obseruabis nati cartilagine, eam quæ in mucronem gladij modo à pectoris ossis fine exauctur, spuriarum costarum cartilagine, & eam quæ ossis coccygis termino adnascitur: & auris cartilagine, quæ tenuis mollisque est, & cute obducta, ossis uice auris corpus pulchre suffulcit. Cæterum isti cartilaginum inter se uariantes usus, earundem quoque differentias explicant, adeo ut nunc neque has, neque cartilaginum formas, prolixius enarrare conueniat, præsertim quum singulæ cartilagine perinde ac ossa à nobis priuatim ueniant describenda. Quamuis forte aliquis hæc adhuc additum uelit, in minoris ætatis corporibus cartilagine molles

*Tertia in arti-
culis quibusdā
cartilago.*

*Li. 2 de Ad-
ministran. se-
duonibus.*

*Cartilago
glutinis uice
subiens.*

*Ligamentorum
substantia in-
grediens carti-
lago.*


*Cartilagine
aliquid conti-
nuo erigentes.*

*Existit par-
ticulis adnatæ
cartilagine.*

*Cartilagine
differentie.*

molles esse: in grandioris uerò ita subinde indurari, ut fragilis ac friagilis ossis naturam referant, quod potissimum laryngis cartilaginibus, & illis accidit quas superiores costæ educunt. Hæ enim temporis succellu, idèq; maxime in brutis, ossæ fiunt, exterius duntaxat cartilagine ueluti membrana quapiam succinctæ, quæ ab ossæ illa cartilaginis substantia per elixationem leui negotio abscedit & diuellitur.

NOMINA QVIBVS OSSIVM PARTES
sedesq; indicantur. Caput III.



PRÆSENTIS TABVLÆ EIVSDEMQUE
characterum index.

Proposita modo tabula aliquot ossa in hoc tantū delineantur, ut ossium partes & sedes, quarum nomina hoc Capite persequar, in nonnullis saltem ossibus appositè exprimant. Vnde si in huius Capitis contextu alicuius ossis hic non delineati mentio incidet, id ex figuris proprii sui Capitis, aut ex integris quæ primi libri calci adhibebuntur, opportune petes. Quanquam non opus est, in cuiusque partis sedisq; descriptione, omnia ossa, quæ exempli loco adferam, contemplari, quum hic abunde erit in uno osse quod traditur perpendere, & quum alibi id nomen occurreret, memorem esse. Quæ uerò ossa hic delineantur, characterum index docebit.

A Dextrum femur, cuius appendices sua sede dimouimus, ac ueluti quodam interstitio à reliquo osse disunximus.

B Dextrum femur, cui appendices suis sedibus adhuc adnatæ hærent.

C Maxilla inferior, unâ cum humiliori dentium serie.

A 3 D Hic

D Hic os dextro sacri ossis lateri coarticulatum, externa sede exprimitur: cui aliud nullum peculiare nomen cum Galeno indimus, sed triplici nomine, uidelicet ilium & coxendicis & pubis, pro ipsius sedium ratione comprehendimus, id uigesimo nono Capite descripturi.

Sub iam cōmemorato osse, & inferiori maxilla, pedis dextri ossa ita uidētur, ut quatuor tarfi 1. 2. & c. ossa his notis, 1. 2. 3. 4. insignita, cum osse cymbæ non ablimik, ac E indicato, & talo F inscribitur. E. F. G. pro, & calcis osse G significato, à quinque pedij ossibus I, II, III, IIII, V, notatis, & H. I, II, digitorum ossibus H & H ostensis, adeo remouentur, ut sedes qua pedij ossa tarfi ossibus III, etc. committuntur, intueri possit. Hac nanque ratione sinus in superficie tantum insinuati, & capita

H H. leuiter admodum protuberantia, opportune commonstrantur.

I Pedis subiacet brachij os, seu humerus, anteriorem ipsius sedem ostendens.

K Scapulæ dorsi portio, in hoc depicta, ut spinam ipsius cum summi humeri appendice lineis inter distincta, & uarijs partibus efformata ostenderet. Atque hæc ossa præfens commōstrat tabula. reliqui uero characteres ossium partibus ostendendis hunc in modum seruiunt.

L & c. Quatuor L in priori femore A notato positis, quatuor femoris appendices indicantur.

M & c. Quatuor M in altero femore locatis, etiam quatuor femoris appendices insinuatur, quarum circumscriptionem lineæ notant, quibus illæ à femoris osse, ut ita dicam, dirimuntur.

NN Superius N in osse sacri ossis lateri commissio, ac D insignito, appendicem notat ossis ilium. inferius autem N, appendicem ossis coxendicis.

O & c. Aliquot O in pedij ossibus, I scilicet, III & V signatis ponuntur, & deinde in primo secundoq; pollicis osse, & primo secundoq; medij digiti etiam O conspicis, appendices in his ossibus insinuantia: non quod tantum ossa O insignita appendicibus donentur, sed quia aliquot characteres eandem in similibus ossibus rationem esse, satis doceant.

P Humeri appendix.

Q Appendix spinæ scapulæ, seu summi humeri.

R Lineæ, quæ plures spinæ scapulæ appendicis portiones intercedunt.

S & c. In utroque femore duo scripsimus S, femoris notantes processus.

T Processus acutus inferioris maxillæ, atq; ita etiam T, lagōm insignitur.

V V Duo sunt processus in osse alteri sacri ossis lateri coartulato.

X Processus appendicis superioris pedij ossis V notati, paruoque digito præpositi.

Y Y Duo processus, seu tubercula inferioris sedis humeri, qua cubiti ossibus articulantur.

a & c. In utroque femore ter a ponitur, tria femoris ostendens capita. Cæterum in priori femore A notato, in elatissima appendice a posuimus. In femore uero B insignito, extra appendicem, ne forte quis solam appendicem hic caput coxendicis ossi inarticulatum esse arbitretur.

b Caput maxillæ inferioris dextrum.

c Caput tali ossis quod cymbam refert sinum subintrans.

d Caput tali, tibiæ sinum subiens, quod & F notatur.

e & c. Aliquoties in pedis figura e occurrit, capita notans pedij & digitorum ossium.

f Caput humeri superius, quod scapulæ articulat.

g g Duo capita inferiora humeri, seu potius sedes quibus ulna & radius articulantur.

h h In utroque femore semel h ponitur, ceruicem capitis indicans quod coxendicis ossi immittitur.

i Ceruix in inferiori maxilla.

k Ceruix in talo.

ll Ceruices pedij ossium. Ponitur autem l in II, & in IIII tantum, ne reliquæ ceruices obscurarentur.

m Ceruix in humero.

n Acetabulum in coxendicis osse, cui femur inarticulatur.

o Acetabulum in humero, latitat autem o inter duo Y.

pp p Superficietenus exculpti sinus, qui in tarfi ossibus uidentur.

qq Pedij ossium minimè extuberantia tubercula. duo autem q tantum his ascripsimus, quod reliqua in umbra latitaissent, & picturæ quoque obfuiscent.

rr Supercilia in coxendicis osse, ad superiorem acetabuli sedem conspicua. Si forte in cartilaginibus has quoq; ossium partes aut sedes contueri lubet, omnes quæ in cartilaginibus spectari possunt, effigies cartilaginum trigesimo octauo Capiti præpositæ commonstrantur.



TCVNQVE uocum multitudo & uarius illarum apud alios & etidem subinde auctorem usus rerum descriptionem arduam reddit, nulla tamen æquæ uaria pugnantisq; dictionum est congeries, atque nominum, quibus ossium partes sedesq; indicantur, & quibus in ossiū descriptione perpetuò est utendū. Vt enim nunc ad sequens Caput uarias appellationes asseruē, quibus commissurarū ossa iungentiū species significatur, huc modo referuntur.

ἰσθμὸς, αὐχλὺς, κοτύλη, κοτυλοειδὲς, ὀστέον, γλῶσσιν, ἰνδόν, ὀφρυδόν, ἄμβονος, χεῖλος, βαθμίδος, eiusq; generis uoces quamplurimæ, quæ Græcorū sunt nomina: Latinis autē, & si priuatim nō nulla tantum habentur, interpretum tamen lasciuia tot nominum myriades passim ita sunt obuiæ, ut iam

seorsum unumquodq; Græcorum nomen assumendum ueniat, & quid ueteres qui pueros domi sedulo dissecandi rationem docebāt, illis intellexerint, addendum, quò tandem cuiusmodi uoce nos quoque simus toto sermonis contextu usuri, statuatur. καλόν itaque, quo etiam nomine Græcorum interpretes subinde utuntur, aliquando autem artum, interdum uerò membrum uertunt, Græcis quatuor duntaxat membris accommodabatur, brachio scilicet, cubito, femori, & tibiæ: neque etiam aliam partem ea uoce Galenus usquam intellexisse uidetur. Verum quum rarò, aut nunquam huius uocis usus mihi incidat, illi prolixius in harendum non arbitror.

ἑπίφυσις, quam Latini appendicem, appplantationem, adnexam, additamentum, adnatum, & alijs innumeris profectò modis reddunt, perpetuò appendicem appellabo. Est autem ἐπίφυσις seu appendix, os alteri ossi adnatum, & peculiarem obtinens circumscriptionē, neque illius ossis cui committitur, uera portio. Huiusmodi appendicis naturam, quoties aut uitiū, aut hecidi, aut agni, aut alicuius iunioris animalis pars aliqua mensæ apponitur, discere licet. Emundato enim femore, humero, tibia, aut radio, aut ulna, aut alio his simili osse à cæteris liberato, & ualidius non nihil attritato, ab illo ueluti aliquid quoddam os decidere cōspicimus, appendicis nomine donatum. Atque id in iunioribus duntaxat animāibus intuemur. In ætate enim prouectis appendices adeò pertinaciter suis ossibus adnascuntur, ut ab osse auelli nequeant, uixq; coniunctionis lineam exprimant, & ueræ suorum ossium portiones esse uideantur: cum interim in nuper natis magnam cartilaginis portionem inter appendicem & os cui ea adnectitur, intercedere appareat, quæ appendicem ossi glutinis modo connectit. Coalitus hic non læui plana q; perficitur superficie: uerum os cui appendix committitur, sinibus quibusdam & asperitatibus abundat, quibus appendicis tubercula sinusq; mutuo ingressu ualidius accommodantur.

Præterea connexus iste hoc quoque priuatim nascitur, quòd os nulla prorsus sui sede mollius, & in duritia ac soliditate infirmius quàm circa ipsum connexum cernatur. Perpetuò enim os inibi pumicis spongiæ uel modo multis cauernulis intus plenum est. & quamuis id subinde reliqua propemodum ipsius longitudine unum sinum ampliter cauum & duntaxat medulla oppletum obtineat, ac durissimum ualidis sinibusq; secundū sinum illius longitudinem existat: nihilominus tamen priusquam appendici os annectitur, sinus ille deficit, & ipsum mollius redditum, cauernulis, quemadmodum & appendix ipsa, scatet. Atque id ita perficitur, ut

Galenus appendices sinuum medullam continentium opercula esse tradiderit. Quasi uerò appendix cum cauernula medulla destituerentur, & non quamplurima ossa sinibus quibus medulla ossuosis fibris non intertexta continetur carentia, appendicem asciscerent. Amplis enim ossibus quæ sacri ossis lateribus coarctantur, eiusmodi sinus neuiquam adest: nihilominus tamen toti illius ossis spinæ appendix coalescit, quemadmodum & toti in finis sedi coxendicis ossis. Quin & scapulæ nulla ferè ex parte medullosoæ, quatuor appendices annectuntur, duæ quidem ad ipsius basim, una ad mucronem interioris processus scapulæ, & quarta ad summū humerum: quæ peculiariter ex pluribus particulis extruitur. Demum dorsi uerbræ eius generis sinu carent: attamen ipsarum corpora superius infriusq; sibi appendices uendicant. Imò non modò uerbrarum corpora appendices habent, sed etiam transuersorum in thorace ac lumbis uerbrarum processuum & spinarum apicibus appendices annectuntur. Insuper & costarum radici uerbræ coarticulatæ appendix committitur, etiam si costarum os nullo am-

plo sinu medullam recipiente donetur. Cæterum uerbræ & puerorum dentes, qui etiam appendicibus decorantur, non solum indicant ossa his sinibus destituta appendices obtinere, uerum etiam argumētò sunt non solis grandibus ossibus Naturā appendices dedisse, quantumuis antehac Anatomicorum præcipui oppositum asseruisse uideatur, appendices magnis tantum ossibus adscribentes. Porro ex ossibus eiusmodi sinus habentibus, femori quidem quatuor annectuntur appendices: unus capiti, quo coxendicis ossi inarticulatur: unus inferiori ipsius parti, quæ tibiæ committitur: & duo alijs duobus ipsius processibus, quos ferè rotatores uoca-

Varias esse uoces quib. ossiū partes sedesq; indicantur.

καλόν. Artum, Membrum.

ἐπίφυσις. Appendix.

In uel usu partium. Appendices sinuum medullæ continentium non esse opercula.

Non solum grandibus ossibus appendices contingere.

Galeni lib. de Ossibus.

Ex pte femoris appendices fi.

fig. capituli inferioris in- ter G. & A.

N, N. f. d. X, Y, E, K f. 1, 1. ca. 21. Q, R, f. K.

1, 2 f. ca. 17 A, B C.

Quatuor I. f. A. de in 4 M. f. B.

mus, Tibiæ ossi & fibulæ ad genu & ad pedem appendices adnascuntur. Radius quoque iuxta brachiale & humero appendicibus donatur. Humero autem tantummodo superius, quæ scapulam spectat, appendix contigit: quemadmodum ulnæ duntaxat iuxta brachiale. Atque hæc ossa grandia sunt, quibus insignes Natura sinus largitur. Parua autem, quæ & nos quoque eius generis sinu contra Galeni placitum donari docuimus, haudquaquam appendice carent: quippe postbrachialis & ^apedij ossa ad unum omnia manifestissimum appendicem exigunt, ubi primorum digitorum ossium sinus ad articulationem subeunt. Superius uerò quæ hæc ossa brachiale & tarsum respiciunt, subinde appendicem quidem adipiscuntur, at firmius semper quàm ima parte, ipsorum ossi coalitam. Item omnia digitorum ossa superius & inferius appendicibus plerumque decorantur, si ultima excipias, quæ superius tantum appendices habent. Hæc omnia in puerulis admodum sunt cōspicua. In ijs uerò qui iam ad summum incrementum uenere, appendicum connexus spectatu est difficilis, in senibus autem prorsus occultatur ac latet. *Antiquioris*, quem interpretes processum, excessum, explantationem, additamentum, & nescio quibus alijs uocibus uertunt, nobis processus appellabitur: estq; ossis pars nihil à suo osse differens, quàm quòd tuberculi seu gibbi instar ex osse procedit, quemadmodum ex arboris trunco radices ramiq; extuberare ac procedere uidentur. Eiusmodi processus in ossibus sunt quamplurimi. Nulla enim dorsi est uertebræ, quæ non multis donetur, quandoquidem aliquot ^bcervicis uertebras etiã plures undecim processus habere, thoracis autem uertebras septem, lumborum uertebras nouem, suis locis docebimus. Deinde & ^cinferior maxilla processibus utrinq; duobus donatur, & ^dhumerus quoque, & omnia corporis ossa processus exigunt, quoties extra simplicem planamq; superficiem aliqua sui sede extuberant. Porro processuum, sicut & appendicum, nonnullæ sunt differentiæ. Quibusdam enim processibus, appendix adnascitur, nam femoris processus rotatores nuncupati, & scapulæ spina (quæ processus scapulæ est) appendicem obtinent: quemadmodum & interior quoque scapulæ processus, qui ancoræ imaginì confertur. Alijs processibus nulli sunt appendices, nam maxillæ inferioris, calcis ossis, tali, & reliquorum fungosorum ossium processibus appendices rarissimè contingunt, modò & eorum quoque ossium processus fungosi sint. Humeri etiam processibus, qui ad cubiti articulum consistunt, nulli appendices adnectuntur: quemadmodum neque ulnæ processibus, qui humero articulantur. Rursus ipsi appendices plerumq; sibi processus uendicant. Ulnæ enim appendici processus accidit, quem columnæ, & quo scribimus stilo, dissectionum periti assimilarunt. Tibiæ quoque ossis inferiori appendici ^eprocessus obtigit, quem interiore malleolū nuncupamus. Deinde & pedij ossis paruum digitum sustentans superior appendix ^fprocessum exigit, cui octauus pedem mouentium musculus inseri ostenditur. Humeri quoque appendix, quemadmodum & appendix infima femoris, in duos processus adeò insignes diuiduntur, ut utrosque capitis nomen seorsim mereri audias. Ad appendicem itaque & processum referuntur, quæ iam explicabimus ossium capita, cervices, sinus, tubercula, & supercilia. Quanquã tamen processus nomen illis tantū processibus adhiberi satis erit, qui alteri ossi non articulatur. Femoris namq; & humeri capita processus non nuncupamus, quemadmodum sanè acutos maxillæ inferioris processus, & tubercula humeri, quæ ad cubiti articuli latera prominent. Deinde & processus appendicibus ornatos, non appendices, sed processus simpliciter appellare opportunius fore putamus. Femoris enim rotatores, & scapulæ & uertebrarum processus, etiam si appendices habeant, processus aliorum Anatomorum more (qui subinde *ἐπιφύσεις* cum *ἀποφύσεις* confundunt) nuncupabimus: Appendicis autem processum simpliciter nunquam, non addito appendicis nomine, proferemus, quippe obiter tantū intellectis nominibus, in ossiū descriptionibus erūt obuia, ut & processuū quoq; usus in singulis ossibus manifestus euadet. Cōferunt autē processus præcipuè ad cōmodam articulationem, & ossium cōmisiuram, deinde ad multarū partium exortum, aut insertionem. Si enim ossa nullibi extuberarent, neq; collū ritu educerētur, ac rursus ualliū modo exculperētur, paucissima ex ipsis nasci, ipsiq; inseri possent. Nunc autē processus montis instar prominent, à quo plura quàm ex plano pronascūtur, aliq; ei dein (ut sic dicam) inseruntur, & super ipsum exadificantur. Quinetiam processus propugnaculi uice esse, scapularum & uertebrarum processus testabuntur. *Κραῖναι*, seu *λαγῶναι*, interpretibus quibusdam cornix dicitur. At ueteres Græci in ossibus hac uoce acutum significabant processum, quem ad arcus cornu & incisionem, ubi neruus sedet, referebant. Huius generis unus utrinque in inferiore maxilla habetur, cui temporalis musculus tendo inseritur. Deinde in temporum osse ^galius cernitur, quem mammæ papillis assimulant. Sic & in eodem osse ^halius consistit, qui gallorum calcaribus, & scroptorio

ἀποφύσεις.
Processus.

Processuum
& appendicū
differentiæ.

Processuū
usus.

Κραῖναι.

oo in fl.
pedis.

8 fi. 15 cap.
numerus no-
tantur.
c T-i fi. C.
d XX fi. i.

SS fig. A.
B.

fi. 12. cap.
24 R.
d fi. 3 ca.
32 i.
X in pede.

c T fi. C.
es 6 muscu.
tab. A, B.
d 4, 5 fi. 6
cap. unus h.
alter i.

fl. 6. ca. 11.

Metre id.

Dad B pri.

fi. ca. 10.

Ab mad f

in fi. I.

g. g. in pede

Cöftr. f. 1. u

13 fl. ca. 13

com n. m. l

fi. 10.

f. 9. fi. ca. 15

d. c. i. figura

16 ca. X. Y

a. b. immit-

te A. fi. ca.

10 in c. f. g

fi. ca. 29.

c. figura

ca. 14, 15,

16, 17.

G. H. fl. 3

ca. 27.

In libro de
Ossibus.

κεφαλή.

κεφαλαίον.

Caput.

Capitum alia

prominentia,

alia depresso.

ἀρθρον.

Articulus.

ὕπερθρον.

Vertebra.

σπονδυλος.

Capiti differ-

rentia.

In u de Vsu

partium.

σπονδυλος.

mo de Musculorum motu *κύνδυλος* appellat, depressum ossis capitulum, quando *κεφάλυ* seu caput *κύνδης* seu acetabulo, profundo ue seu alto sinui cōfert; *κύνδυλος* uerò, seu depressum mi nimeq; extuberans & planum capitulum, *γλήνη*, quam sinum esse dicimus, adeò leuiter in osse cœlatum, ut an sinus, an capitulum sit, dijudicare uix possis. Atque in hunc modum à primis dissectionis professoribus *κύνδης* nomen proculdubio institutum fuit. quamuis interim facile curauero, ne hoc nomen quicquam obscuritatis alibi in nostra oratione pariat, quum non minus promptum fuerit, obscure & leuiter extuberans capitulum, aut internum externum ue femoris caput iuxta genu dicere, quàm ambigua uoce condylum, uel nodum, uel quippiam simile sermoni inferere. Ac proinde etiam in cuiusque ossis descriptione perpetuò illud nomen nobis constituemus, à quo postmodum in musculorum, uenarum, arteriarum, & reliquarum corporis partium enarratione nunquam discedemus. *Τεφνολος* & *αίχνη*, Latini collum & ceruicem nuncupant, his uocibus ossis partem quæ collo nostro respondet significantes. Collum nanque & ceruix tenues ossium sunt processus, quorum extremum crassius redditum in ossis caput finitur. Huiusmodi ceruices nullibi perinde conspiciuntur ac in femore, iuxta elatissimum ipsius caput coxendicis ossi inarticulatum. Dein in maxilla inferiori adeò insignis ceruix se offert, ut & caput inferioris maxillæ ceruicis nomine ab Anatomicis subinde donatum sciamus. Quinetiam in talo quoque ceruix apparet, ante orbiculatum ipsius caput conspiciua, quod nauiformi ossi inarticulatur. Ad hæc, pedij & postbrachialis ossa, quæ digitis coarctantur, ceruices ostendunt. In reliquis autem ossibus illæ non æquè manifestò conspiciuntur. Cæterum aliquando non modò tenuiores ossium partes in capita extuberantes, ceruices dicuntur, quinetiā & tenues processus ita uocamus, qui latiores redditi sinum constituunt cui aliud os coarctatur. Quod si in aliquo osse conspiciatur, sanè in scapula esse manifestissimum, cuius artior pars ante sinum cui humerus inarticulatur posita, ceruicis quoque nomen ab Anatomis professoribus obtinuit. *Κοτύλη*, & *κοτυληδών*, ac dein *ἐφύλασσαν* Latini in ossium descriptione (nulla nanque nobis modò mensurarum est ratio) acetabulum & acceptabulum, & uulgò pyxidem, & interdum buccellam uocant: his nominibus sinus indicantes, qui alius profundius ue descendunt, excauanturq; ac ossium capita excipiunt. Obseruantur autè eiusmodi sinus seu acetabula, in coxendicis osse, ubi femoris caput admittitur: dein & in osse cymbæ referente, in quem tali caput ingreditur. Neq; sanè in corpore alij sinus, quibus ossiū capita inarticulantur, illis duobus profundiores existunt. Verum arbitror à primis dissectionis professoribus, nō solum insigniter profundos sinus eo nomine appellatos esse, sed omnē sinum alterius ossis caput excipientem, modò cuiuis illum primo intuitu sinum esse attestaretur. *γλήνη* autem ab ocularis sinus (quantum coniecto) forma sinus dicitur, qui leuiter & superficialiter tantum cauitus est: ac talis occurrit, ut ignores num aliud os admittat, aut aliud os subeat, nihilo secus quàm si duo plani læuigatiq; asseres inuicem imponderentur. Atque sic *γλήνη* depresso responderet capiti, quod omnium primum *κύνδυλος* nuncupatum esse arbitror. Tales sinus habentur in tarsi ossibus, quæ pedij ossa ipsis coarctantur. Item ossis cymbæ referētis sedes, quibus id tarsi ossa excipit, huiusmodi quoque sunt: ut & brachialis ossium nonnulla, quibus postbrachialis ossa articulantur. Præterea in prima ceruicis uertebra, ubi hæc depressa secundæ uertebæ capitula admittit. Verum hæc non ita dico, quasi inhibere uelim, sinus quosdam (qui & si manifesti sinus formam præferant, tamen non admodum profundè insinuantur) etiam *γλήνης* appellari. Nollē enim contentiose rixari, num tibix ossis sinus quibus inferiora femoris capita insident, *κύνδης* aut *γλήνης* nomen mereatur. Attamen si articulationis species diligēter discusserimus, meritissimo *κύνδης* uocabimus apparentem sinum, *γλήνη* uerò sinum adeò obscurum, ut ambigamus an uerè sinuum numero ueniat adscribendus. Quamobrem autem sinus nunc leuiter, nunc profundè à rerum Opifice insculpantur, sequenti Capite, quod ossium commissurarum differētiās explicabit, ostendemus: quando quidem articulationis gratia tam sinus quàm capita formantur. Hic autem fuisse cerit nomina duntaxat declarasse: & si cui interim uisum fuerit, licebit & sinuum differētiās hinc quoq; sermoni obiter adijcere. Quippe præterquam quòd alij altr, alij uerò in superficie tantum inciduntur, alij rotundi orbicularesq; sunt, ut coxendicis ossis sinus femoris caput excipiēs, & digitorum ossium sinus, quibus postbrachialis ossa inarticulantur. Alij autē oblongi sunt, ut radij sinus brachiali admittens: & primæ uertebæ sinus, qui occipitis ossis capitula excipiunt: & maxillæ superioris sinus, admittendæ inferiori maxillæ parati, in horum quoque sinuum numero reponuntur. Alij gemini sunt, ut tibix ossis sinus, quibus inferiora femoris capita committuntur: dein digitorum ossium sinus plerique gemini quoque censentur. Alij trochleis rotulisq; respondent, ut humeri sinus ulnam admittens. Alij C referunt, ut sinus ulnæ, quem humerus ingreditur. Cæterum ut sinus & capita articulo-

rum

Τεφνολος.
αίχνη.
Collum.
Cervix.

Galen. initio
lib. de Ossib.

Galen. in libro
de Ossibus.
κοτύλη.
ἐφύλασσαν.
Acetabulum
C.

γλήνη.

Sinuum &
capitū usus.

Sinuum diff.
tenuis.

b. h. fi. A. C.
B.

i. fi. C.

h. in pede.

h. in pede.

1. 2. fi. ca. 22.
C. D.

f. n. fi. D.
a. u. fi. 33.
ca. h.

b. p. p. p. m.
pede.
c. fi. 10. ca.
33. n. m. l.
d. 6. fi. 25.
ca. M. L.
K.

7. fi. 31. ca.
E. G.

f. n. fi. D.
a. 8. fi. 14.
ca. x. 2. 3.
b. 2. fi. 27.
ca. I. K.
c. 1. 2. fi. 23.
ca. K. L. M.
d. 1. fi. 24.
ca. E. C. D.

rum gratia cōstituuntur, ita quoque & ἰννεσ, ὀφθαλμοὶ, αὐχένος, χέλι, quæ Latinis supercilia & labra nuncupantur. Sunt autem processus ad sinuum orbem instar laborum prominētes, & sinus profunditatem augentes. Hi tameti in omnibus articulis ferè & ossium commissuris conspicui sint, euidentissimè tamen ipsorum naturam in profundissimis sinibus ostendunt. Quare etiam in coxendicis ossis sinu, cui femur inarticulatur, altissima maximeq̃ prominentia videntur¹ supercilia, ut sinum impensius cauum redderent, femorisq̃ luxationem accuratius prohiberent. Quò minus enim ossa promptè luxentur, supercilia in primis conducunt. *Bathydors* autem, sinus quidam sunt, qui basis firmamenti² ritu, ultrà quàm animanti ex usu sit, os moueri haudquaquam sinunt. In³ anteriori enim humeri sede, & in⁴ posteriori sinus exculpitur, singulos ulnæ processus excipiens. Anterior nanque sinus priorem ulnæ admittit processum, quando cubitus extremè flectitur: posteriorè autem sinum posterior ulnæ processus in cubiti extensionibus ingreditur. Quoniam itaque posterior sinus in anteriorem non est peruius, hi ulnam ultrà quàm expedit haudquaquam moueri sinunt. Si enim essent peruij, neque processibus obuia ierent, cubitum aequè in acutum angulū extenderemus, atque modò flectimus. Merito itaque primi dissectionum professores, hos sinus *Caluiolas* uocarunt: quamuis Hippocrati non huiusmodi tantū sinus ita appellentur, uerumetiam reliqui, in quos tubera ossium ingrediētia insidunt. Vlnæ nanq̃ sinum C modo exculpitur, & quem humeri orbita subit, *Caluiola* nuncupauit, quemadmodum alij totum cubiti cum brachio articulum. Illi quos prius in humero narrabam sinus, id priuatim sibi uendicant, quòd soli ferè omnium sinuū alterius ossis processibus in articularum motibus excipientiū, ἢ cartilagine uix in crustētur: quemadmodū alij plerique ossium sinus, articulandis ossibus non parati, sed solum in hoc incisi ut ligamenta aut musculi in ipsis ualidius apertioribz sede inferantur, & interdū quoque aliqua ex hisdem initium commodius ducāt. Cuiusmodi sinus in interno latere magni externiq̃ processus femoris obseruatur, & in talo & calce, in⁵ medio duorum articularū, quibus hæc ossa inuicem coarctantur. At hæc omnia, (quemadmodū & sinus, quibus tendines uehuntur, atque ne sua aberrent sede cōtinentur, quales in externa radij sede iuxta brachiale occurrunt) in priuatis ossium descriptionibus magis erunt obuia: & si aliud quodpiam nomen, quo in ossium descriptione utendum erit, hic prætermiserim, id sequentibus Capitibus recensēbo. Vereor enim ne ista, utcunque utilis sit, ante ossis cuiusque enarrationem prolixitas, ab Anatomæ studio aliquem properandi cupidum deterreat, isq̃ non mediocri dispendio aliud perquirat compendium. Quamuis non minus Galeni librorum occasione, quàm quæ subsequetur ossium descriptionis gratia, in hunc modum nomina prælibare operæ precium fuit.

DE OSSIVM INTER SE STRV.

Dura & contextu. Caput IIII.



QUASI humani corporis instar unius continuiq̃ ossis, lapideæ cuiusdam statux modo, effingi nequierunt. Nam & si ita quidem hominis fabrica iniurijs minus foret obnoxia, & ipsius ossa firmiorem sedem adipiscerentur, neque luxari, neq̃ excidere ac distorqueri possent: tamen quia homo motu (qui animali maxime, si quid aliud, proprius censetur) neutiquam destitui debuit: & quum motus citra ossium diuisiones commissurasq̃ haud perficiatur, hominem è multis ossibus fabrefieri magnoperè cōdixit. Quinetiam ossa inuicem componuntur non solum motus gratia, sed etiam alicuius corporis transitus occasione, aut securitatis, seu noxijs ferendis pertinaciæ causa, aut partium diuersitatis nomine. Propter motum quidem digitorum ossa inuicem committuntur, deinde ulna & radius cum humero, & humerus cum scapula, & femur cum tibia, præter eiusmodi innumeros ossium connexus. Transpirationis uerò seu transitus alicuius corporis gratia, futuras capitis efformari, tunc dicam, quando has fuliginosa cerebri recrementa transmittere, & duræ cerebri membranæ fibris uiam præbere docebo, ex quibus membrana caluariam succingēs conflat. Pariter quoque & in capitis futurarū sermone (ne longius exempla petantur) caluariam non uno osse, sed pluribus efformari audies, ne fortè hæc quapiam ex parte læsa, late rumpatur, uitiūq̃ ueluti in scissilem ollam longius quàm ad ossis circumscriptionem pertingat, sed ut ipsum unā cum osse ad futuram terminetur. Ad hæc, propter partium differentiam, uerticis ossa utcunque mollia duris temporum ossibus committi, in eorum ossium commissurarū sermone intelliges. Omnia igitur ossa inter se cōtigua sunt, & neque os ullum (nisi fortassis quod ab v imagine *iofides* nuncupatur, & si quod in cordis basi consistit) seorsim per se habetur, sed aut pars continui est, aut aliud os cōtingit, ac alteri adnectitur: adeo ut sagax rerum parens Na-

*ἰννεσ.
ὀφθαλμοὶ.
αὐχένος.
χέλι.
Supercilia
Labra.*

Bathydors.

Libro de Fracturis.

Sinus articulationis nominē non parati.

Homini plurib. ossib. consistere, motus gratia.

Transitus expirationis gratia.

Gratia diffinitionis partem di.

Partium differentie gratia.

tura

Li. 2. de Partib. animal. Capite 9. lib. 3. de Hist. ant. Cap. 7.

tura, ossibus tanquam uno continuoq; & tanquam pluribus ad cōmemoratos usus hominem uti uoluerit. Quod uerò cartilago & interdum ligamenti portio inter ossa quæ inuicem committuntur interuenit, uilius pendendum arbitror, quam ut eius gratia cum Aristorele minus aptè possim dicere, ossa inter se esse contigua; quamuis interim is ossa uenarum modo continua esse attestetur: præterea etiam asserens, hæc ex dorsi spina non secus quam uenas à corde principium ducere. Hanc porro integram ossium mutuò coherentiū seriem Græci σκελετόν, quasi assicatum esset cadauer, nuncuparūt. Cæterum ut uariis compositionis usus est, ita quoque multiplex eiusdem est ratio: quam modò obiter in tabellam primū reijciam, latius singulas commissurarum differentias dein explicaturus.


a 8 fi. 32
ca.
b fi. ca. 14
R. R.

Tres fig. ad huius li. cad. cōpositæ.


TYPVS COMMISSVRARVM

OSSA INNGENTIVM.

Humani corporis ossa inuicem committuntur
structuris, quæ



Atque hæc omnia committuntur



Hu.

Huiusmodi itaque commiffurarum differentijs offa inuicem committuntur. Ac primum quidem uoluntarij motus gratia eorum naturalis fit compositio, quæ à Græcis ἀρθρώροις & ἀρθρώσι, nobis articulatio articulorum nuncupatur. Verum motus huiusce in omnibus articulis non eadem est ratio, quandoquidem alij motus euidenter sunt, neque quenquam latent. nemo enim non caput super collum moueri sentit, femurq; ad coxendicis os, & extremam manum ad cubitum, ac præter innumeros articulos, ipsos quoque digitos. Hæc articulationis species euidentem motum ostendens, Ἀρθρώσις dicitur, quasi laxa esset dearticulatio: quemadmodum & Hipocrates eam ἐπιρροήσι, quasi abarticulationem uocauit. Aliorum uero articularum neque ualidus neq; manifestus, sed obsecutus difficilis latensq; motus sentitur, ut is neuiquam à sin- gulis promptè diiudicari queat. Cuius enim postbrachialis ossiū ad brachialis ossa coarticulationis motus non est obuius: si tamen in planam superficiem primum digitos extenditis, ac indec dein minimumq; digitum medio & annulari instar x aut decussatim subiceris, digi- torumq; radicibus ueluti femicirculū statuere coneris, postbrachialis ossa non prorsus immobi- lia apparebunt. Atque idem quoque in brachialis ossium inter se commissuris, & calcis cum ta- lo, talisq; cum osse cymbam exprimente, ac rursum huius cum tribus tarsis ossibus, & calcis cum tarso ossis cubum referente, tarsiq; ossium cum pedij ossibus usuuenit. Harum namq; commissu- rarum me obsecrissimū quidem motum, nisi mente sedulo adhibita, animaduertes. Vocata est autem hæc articulationis species συνάρθρωσις, quasi coarticulatione dixeris, solius motus quan- titate à dearticulatione discrimen recipiens. Cæterum utranque articulationis speciem Natura non simplici compositionis genere nexuit, quemadmodum etiam neque omnibus articulis par motus attribuitur. Alij enim flectuntur & extenduntur, atque in hoc illudq; latus adducitur, & abducitur, ac demum in gyrum quoque circumuertuntur. Femur enim & brachium hos motus ostendit, quippe brachium pectori adducis, & retrorsum ad dorsum agis, dein sursum ad caput moues, deorsumq; ad ilia fers: ac demum circumagis quoq; quum pollice in mensam fixo, reliquis digitis circulū quam potes maxime moliris. Ita & femur antrosum retrorsumq; & introsum ad aliud femur, & extrosum ab alio ducis, & circumuertis pariter, quum calce in terram firmato digitos huc atque illuc in latera agis. Hoc enim pacto circumuersionis motum subaudire conuenit, non autem quum brachium modò antrosum, modò sursum, modò retror- sum, modò deorsum, succedentibus motibus ueluti in circulū moues. quod in uisibus muscu- lorum explicandis diffusius persequemur. Alij articuli duntaxat flectuntur & extenduntur, atq; in latera mouentur, omnis motus circūuersionis expertes, ut prima digitorum internodia, & ipsum brachiale quā cubito iungitur. Alij uero flectuntur & extenduntur, simulq; circūuer- tuntur, nullum interim in latera motum sibi uendicantes. Vt radius simul cum ulna ad hume- rum flectitur & extenditur, ac etiam ad humerum circumuertitur, seu in prouum supinumq; agitur. Alij solum flectuntur & extenduntur, ut ulna ad humerum, & tibia ad femur, & secun- da & tertia quatuor digitorum internodia, & tertium pollicis. Alij duntaxat circūuertuntur, ut prima ceruicis uertebra supra secundam, uelut ad axem cum uniuerso capite circūuoluitur: & radius supra ulnam non nisi in prouum supinumq; circumuersionis motu ducitur. Quo- uiam igitur omnes articuli non simili pollent motu, nequaquam mirum uideri debet, diuersa quoque compositionis specie eosdem compingi. Ac species hæc seu forma est tripartita, à uetu- tissimis Græcorum qui filios dissectionis rationem docebant, triplici uoce donata, ἑναρθρώσις uidelicet, ἀρθρώσις & γυγλήσις, quanquam fortassis hæc nomina à Diocle, & illis qui primum refecandi rationem commentarijs tradidere, postmodum fuerint consula. ἑναρθρώσις itaque ar- ticulationis speciem notabat, in qua expipientis ossis cauum sinus ue altus, & acetabuli modo exculptus est. Caput autem quod illi inarticulatur extuberans, ad & sinum in hac articula- tionis differentia similiter ac caput esse simplicem, unicum scilicet sinum & unum caput, per- uenit ac in femoris articulatione cum coxendicis osse, & in humeri cum scapula, & postbra- chialis pedijq; ossium cum primis digitorum ossibus fieri conspicimus. Commemorati modò articuli manifestis pluribusq; motibus donantur. Femur namque & brachium, cuius os hume- rum dicimus, flectuntur, extenduntur, ad latera ducuntur & circumuertuntur. Prima autem di- gitorum ossa non circūuertuntur, quod cum musculorum ratione & ossium quæ selemo com- parantur, tum etiam articuli constructionis gratia accidere audies. Huiusmodi etiam articula- tione brachiale radio iungitur, quod flectitur & extenditur, & in latera agitur. Radius quoq; numero ἑναρθρώσει committitur, quare etiā pluribus motibus donatur. flectitur enim & exten- ditur simul cum ulna, & deinde circumuertitur, adeo ut Naturam ἑναρθρώσει in simplicibus ar- ticulis, qui contina & non intercepta cartilaginis in crustatione, ut sic dicam, perficiuntur, con- uincisse cōstet, quorū ipsi pluribus motibus idem os moueri, siue flecti, siue extendi, siue in latera

Εὐφροσύνη.
Εὐφροσύνη.
Εὐφροσύνη.
Εὐφροσύνη.

Analeptus.
 Lib. de Arri-
 cul. ofis inga-
 lis docens lu-
 xat. onem.

Morus obscu
ri.

συνάρθρωσις
Coarticula
tio.
Articulos om
nes nō h̄sdē a
gmotibus.

Tres articu-
lorum formæ.

հնախնայաբան.

Quando in sim-
plici articulo
Natura enar-
throsin mol-
atur.

B simpli

simplicissimo minimeq; gemino utens ossium connexu.^a Tali uero caput ossi cymbam referenti hac articulationis specie iungitur, ut etiam quædam brachialis^b ossa inuicem articulari suo loco doceamus, non minus quam secundæ, tertiæ, quartæ & quintæ costarum cartilagine hac articulationis specie pectoris ossi coarctantur. In præsentia enim abunde est, commissurarum differentias naturasq; enarrare, & in illis scopum Cōditoris recensere, quibusdam tantum additis exemplis, qualia hæc posteriora in obscuris motibus censeri queunt. Omnes enim articulos semper enumerare, & si promptissimum mihi quidem esset, illi tamen Anatomes tyronem nondum explicatis ossibus remorarentur, ac negotij difficultate à pulcherrima Dei operum

ag. 3. quod sit.

inquisitione absterrent. *Ag. 3. quod sit.* itaq; articuli species est, quæ cauum sinumq; leuiter & si perficietenus exculptum, & caput ossis depressum adipiscitur, & ueluti planarum superficierum connexu fit. & quemadmodum in enarthrosi quis sinus caputq; sit indicare leuis est negotij, ita è diuerso in arthrodia utraque adeò obscura sunt, ut ignores cui nam ossi sinus aut capitis nomen opportunè debeas adscribere, perinde ac si duas superficies planas inuicē incumbere fingeres. Hac specie committuntur tria interiora tarsi ossa cymbam referenti ossi, & pedij ossa tarsi ossibus, nonnullaq; brachialis ossa postbrachialis ossibus, dein quartum brachialis os quod rectum uocabitur, tertio brachialis ossi: & clauicula summo humero. Atq; in his commissuris adeò obscuri sunt motus, ut perquam arduè sentiri possint. Quasi Natura hanc articulationis speciem in simplici articulo tentaret, ubi uix tantillum os moueri statuit. Nullibi enim simplicem eandemq; ueram arthrodiam reperiās, ubi manifestus sit motus: quemadmodū fortē duplicem obseruabis manifesto motu præditam, sed illo ferè unico & simplici. Prima namque ceruicis uertebra nullo motu alio, quam liquido circumactu super secundam moueri probabitur, & duobus interim locis prima hominis uertebra secundæ per arthrodiam iungitur, utrinque scilicet ad secundæ uertebrae dentis latera, & dens ipse quodammodo arthrodia primæ uertebrae committitur. Quamquam in his uertebrae nexibus sinus capitaq; adhuc manifestiora sint, quam in simplicibus, quas antea enumerauimus, arthrodij. Ad hæc, eiusmodi quoque arthrodiam obseruabis in reliquis etiā ceruicis uertebis, & thoracis quoq; omnibus, ad eam usq; quam ab incumbēte ipsi uertebra & ab ipsi subiecta suscipi exponā. Nam earū uertebrae connexus, qui ad radicem spinæ seu posterioris uertebrae processus consistunt, ita committuntur, ut subingredientes unius uertebrae partes leuissimè protuberent, & partes aliam uertebrae admittētes, superficietenus tantum sinuentur. Quamuis in his uertebis præter flexionem & extensionem, etiam aliquis in latera motus obseruetur. Atque ita si eiusmodi duplicem uertebrae ad se inuicem articulationem arthrodiam esse dixerimus, hanc non ex acie simplicis motus gratia perpetuò fieri etiam fatebimur.

Quando Natura arthrodiam constituit.

g. 3. quod sit.

g. 3. quod sit. manifestis sinibus capitibusq; perficitur, sed nequaquam simplicibus. Fit enim ginglymos, quoties mutuo ingressu ossa inuicem iunguntur: ita ut unius gibba, alterius ossis caua subintrent: & rursus unius ossis sinus alterius gibba admittant, perinde ac si digitos mutuis ingressibus committas, aut ostiorum cardinibus hanc articuli speciem conferas, in quibus ferrum parieti infixum illud quod ostio cōmittitur excipiat, ipsiq; etiam ostij ferro parietis ferrum subintret. Ab hac enim imagine præsens articulationis species nomen inuenit.^b Hæc in genu occurrit. tibiæ enim os duobus donatur sinibus, in quorum medio tuberculū prominēt: femoris autem inferior pars duo exigit capita, tibiæ ossis sinus ingre-

Hic A ferrū seu cardinem notat, parietem infixum. B autē ferrū quod ostio seu fenestrae necitur.



diētia, dein in capitum medio sinus uisitur, tibiæ ossis tuber suscipiens.^c Eadem ratio in secundis & tertijs quatuor manus ac pedis digitorum articulis seruatur, & in tertio manus pollicis internodio, & in secundo pollicis pedis. Superius enim horum articulorum os duo obtinet capita, in quorum medio sinus cōstitit: inferius uerò, ac (ut sic dicam) unguis uicini os, duobus donatur sinibus, tubere quodam diremptis. Ad hæc, humeri cum ulna articulus ginglymo elegantissimè perficitur. Vlnæ enim sinus humeri tubercula excipit, & rursus ulnæ tubera humeri sinus mirificè subeunt. Atque in dictis iam ossibus ginglymos in uno cōtinuoq; sit articulo, qui solam extensionem & flexionem nanciscitur, nullo interim alio motu præditus, non aliter quam si hac articuli forma rerum Opifex utendum duxisset, quoties articulum duntaxat flecti extendiq; aut alio simplici tantum motu agi oportuit. Huc quoque quantum coniectura assequi ualeo) ueteres Græci reposuerunt ossa inuicem distinctis remotisq; articulationibus commissa, quæ simplici motui præficiuntur. idq; tunc potissimum, dum illæ articulationes inter se in susceptione uariant.^d Radius nanque ulnæ duplici articulo committitur, & eius beneficio tantum simplici motu, qui in supinum prouumq; fit, pollet. Iuxta humerum enim ulna in sinum sibi exculptum radij admittit capitulū, & iuxta brachiale radij sinus ulnæ capitulum excipit.

Quando Natura ginglymosi formam uerit. Quibus modis duplices articuli formantur.

a Iunge O 3. fi. 33. ca. in huius figure. b 2. fi. ca. 25. numerus 7 in.

c Iunge f. 34. fi. 33. ca. 33. cum n. m. 10. fi. d. fi. ca. 3. 99 ad pp.

e Iunge 4. fi. 35. ca. X. cum c. fi. 5. Dein 4. fi. 2. b. cum d. e. 3. quinquē. Poljes L. 4. fi. cū g. 5. fi. f. Iunge 4. 7. fi. cap. 15. cum 9. fi. g. Iunge X. 7. fi. 3. ca. 10. cum a. 2. fi. aut cum c. fi. gura 3.

b Cōfer G. F. 1. 7. fi. 31. ca. cum E. F. 1. 1. fig. 30 capitis.

i In 2. fig. 27 cap. cum G. H. 1. ad 1. K. M.

h h. 1. fi. 24. ca. Aut cum m. 3. fi. gura in 1. 5. fi. 2. p. 5. fi. in o. 7. fig.

excipit. Idem in calcis & tali cōnexu (ut & ginglymos obscurum motū edentes aliquot recen-
seam) obseruatur. In posteriori enim sede talis calcis tuber assumit, in anteriori uerò calcis
sinui caput tali inarticulatur, adeò ut mentis simò & hic quoque mutuis ingressibus ossa articu-
lari dicantur. Pariter huc quoque ueteres retulisse uidentur duplices articulationes, etiam si mu-
tuo eodemq; uario non fierent ingressu, sed simili utrinque modo, ut capitis ad primam uerte-
bram connexus censeretur posset. Duobus enim inuicem distantibus primæ uertebræ sinibus;
duo occipitijs ossis capita ueluti enarthrosi articulantur, neque quicquam dextri lateris articu-
lacio à sinistri, specie formaue discrepat. Sic quoque & aliæ uertebræ inter se coarctantur.
Nam inferior seu subiecta superiori seu superpositæ duplici articulo cōmittitur, illis nimirum
articulis qui ad spinæ seu posterioris uertebrarum processum radicem haberi dicentur. Non
enim de uertebrarum nexu, quem suis corporibus moluntur, in præsentī loquor: quum is,
quantum ad propositum spectat, uarius sit. quemadmodū etiam uertebræ supra duodecimam
thoracis consistentes, quod articuli formam attinet, posterioribus articulis arthrodia mu-
tuo iunguntur: quæ uero duodecimæ subiacent, quodammodo enarthrosi. Verum si huius-
modi uertebrarum nexus, quia duplices (unus utrinque nimirum ad latus) sint, sub ginglymo
complecteremur, etiam aliquot huius generis articulationes non simplici tantum motu dona-
tas faceremur, quum uertebræ præter extensionem & flexionem, in latera quoque non nihil
agantur. At non arbitror ueteres illos Anatomicorum præcipuos, uertebras ideo ginglymo
articulati dixisse, quòd prima ceruicis & duodecima plerumque thoracis uertebrarum dunta-
xat exceptis, semper una uertebræ superiori parte suscipiatur ab alia, & inferiori parte inferio-
rem suscipiat: aut contrà, superiori parte aliam suscipiat, inferiori autem suscipiatur. Quamuis
id Galenus satis innuat, hac ratione ginglymon fieri autumans: & fortè non animaduertens, si
uerum assereret, tunc oportere tria ossa ad articulationem concurrere, primum scilicet os uer-
tebræ, quæ superiori sua sede exciperetur: & secundum uertebræ, quæ superiore hanc se-
dem exciperet: & tertium uertebram, quæ à mediæ seu primæ uertebræ inferiori sede suscipe-
retur. Ut enim una suscipiat, eademq; suscipiatur, præter illam, & susipientem & susceptam
quoque concurrere necessum esset. Atque hac etiam ratione ad plurima ossa ginglymos refe-
rendus esset, ad ea nimirum quæ ima sui parte aliud os subirent, & superiore aliud admitteret:
aut ex aduerso, in superiori sede aliud ingrederentur, inferiori autem aliud exciperent, nullo ar-
ticulationis formæ habito respectu. Et huius generis censerentur prima digitorum ossa, quæ
superiori sede per enarthrosin postbrachialis ossibus iunguntur, & ima parte subsequentijs os-
sis digiti sinus subeunt. Verum de digitorum uertebrarumq; connexibus suo loco cumulatim
pertractaturus, nunc commissuras nullum prorsus motum ostendentes exequar, si prius ad-
monuero, nullum hactenus dictorum ossium contextum fieri, nisi sinibus & capitibus seu su-
perficiebus leuiter lubrica; cartilagine incrustatis, si modo uertebrarum corporum ad inuicem,
& sacri ossis cum duobus ipsi coarctatis ossibus connexum secluseris, in quo cartilagineum li-
gamentum priuatim interuenire posterius audies. Quæ uerò iam narrabuntur commissuræ
omni prorsus motu destitutæ, læui lubricoq; contactu nequaquam fiunt. Atque harum pri-
ma *γόμενος* dicitur, estq; cum instar clauis os ossi infigitur: quæ dentes ad unum omnes maxil-
larum præsepilolis tanquam clauis adeò impinguntur, ut ne tantillum quidem moueantur.
Cæterum ueteres interdum instar clauis connexum, etiam ad articulum, sed alia ratione contu-
lerunt, quum ossa inuicem alterius ossis beneficio tanquam clauis cuiusdā interuentu coarctari
dicerent. quemadmodum Aristoteles innuit, quum duo ossa caua in medio clauum habere scri-
bit, tibiæ & calcis os sinus obtinere, & talum suis tuberibus eos sinus clauis ritu ita subire arbi-
tratus, ac si duo asseres eodem spiculo committerentur. Verum trigesimo tertio Capite tali na-
tura tradetur, cuius connexus ad tibiæ & calcem ginglymo, & in hominibus & in quadrupe-
dibus articulatur. Homines enim talo non destituuntur, quamuis is à solipedū ac bisulcorū ta-
lo forma (non autem situ) discrepet. Nam tibiæ omnibus subijcitur, & calci, aut quod calcis ui-
cem gerit ossi articulatur. Femoris enim os tam in auiibus quàm in equis & porcis, & reliquis
quadrupedibus, Aristotelem, & in tertio de Usu partiū Galenum lussit, quòd in illis æque ac in
hominibus femur uisui obuium non sit: ut modò in suum locum asseruem, quæ in libro de Cō-
muni animalium gressu Aristoteles, ob ignoratum ipsi in quadrupedibus & auiibus femoris
os, & brachij os, parum rectè posteris tradidit. Sutura, quam *φαγω* Græci appellant, compo-
sitio quedam est, ad confuturam rerum similitudinem. Hanc nonnulli quū explicare student,
ferratam compagem structuramq; alij in unguem commissuram esse definiunt. Sed illi nobis
in memoriam reuocant, mutuum ferrarum contrario occursum ingressum, quo dentatæ alterius
ferræ partes in alterius sinus subeunt. Hi uerò quæ in unguem committi dicuntur, quū gibbæ

*Libro de Offi-
bus, c. 3. libro
Cōmentario-
rum in Hippo-
lib. de Ar-
ticulis.*

γόμενος.

*Capit. 9 libri
de Partibus
animalium.*

*φαγω,
Sutura.*

videlicet partes ad unguium figuram structæ, in sinus quibus concinnè excipi possunt, inferuntur, qua connexus serie arcuum seu lenticularum alteres subinde inuicem compingi cernimus. Caterum posteriores, suturæ formam accuratius quam priores explicant. Quemadmodum omnium proximè eam assimilant, qui suturas ad limborum suturæ effigiem conferunt, quando, ut de unguibus diximus, panni unius flosculi in alterius sinus mutuis ingressibus consuntur. Eiusmodi futuris ossa capitis magna ex parte compinguntur: & inter reliquas semper suturæ speciem elegantissimè ea ostendit, quam Δ literæ in occipitio comparamus. Porro æquoria ossium structura est per simplicem lineam, citra omnem tuberis, sinus & asperitatis mutuum ingressum commissa. Ad hunc modum quadam maxillæ superioris ossa, & præsertim nasi inter se iungi putantur. Caterum quia harmoniæ cõnexus uix unquam ad amul-

sim instar simplicis lineæ perficitur, sed nonnullæ asperitates mutuò ingredientes perpetuò ferè cum ossa rumpuntur, in harmonia occurrunt, ueteres suturarum uoce etiam harmonias plurimum complexi uidentur. $\Sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$ est naturalis ossium unio, qua commissuræ forma appendices suis ossibus connascuntur, in ætate quidem minoribus, quum ossa adhuc mollia fungosaq; existunt, cartilaginis interuentu: in grandioribus uerò, ubi iam ossa induruerunt, appendices citra alicuius corporis interuentu ossibus adeò uniuntur, ut coalitis lineam uix conspiciere queas. Hac quoque unione ossa sacri ossis lateribus commissa inuicem in pube coalescunt. Dein admodum pueris utriusque lateris os tribus formari ossibus apparet: quæ tribus lineis in coxendicis ossis acetabulum concurrentibus interstinguuntur: ut etiam in agnis uidere est, in quibus cartilago lineas has sicut in pueris intercedit. in paulo autem proejectioribus tres illæ, partes adeò connascuntur, ut ne linearum quidem species se offerat. At de his ossibus, ipsis dicando Capite pertractabitur: quemadmodum & de uertebris, quæ in pueris quoque pluribus constant partibus. quemadmodum & occipitis os, & alia corporis pleraque: quæ alioquin unius ossis nomine ideo habentur, quòd coalitis imago planè in ætate proejectioribus lateat. Libri Introductorij, seu Medici, qui Galeno ascribitur, author, ossium disciplinam instituens, non eiusmodi unionem, quam nos iam descripsimus, $\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$ uocat, uerum suturas ad harmoniam quodammodo accedentes. Maxillæ enim superioris ossium commissuras, $\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$ (at non rectè interim) appellat. Omnes ossium constructuræ species, aut alicuius aut nullius corporis beneficio committuntur. Vniuersi nanque articuli ligamentis inuicem alligantur, quæ orbiculatim ossa inuestiunt. interdum uerò & hæc in ossium medio consistunt, ut in femoris cum coxendicis ossis articulo, & in uertebrarum corporu nexu. Hic ossium connexus ligamentorum auxilio commissus, Græcis $\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$ nuncupatur: nerui interim uoce ad ligamenta propriè dicta, & ad tendines, neruosq; qui à cerebro dorsaliq; medulla prodeunt, deducta. Hæc nanque omnia ueteres, ut & uulgus hodie, nerui nomine subaudierunt: & præcipuè Aristoteles cum aliis semper, tum maxime quum ossium contextum recenset. Nonnulla uerò carnis etiam ope committuntur, ut generatim omnes articuli musculis obducti. Musculi enim quum ab uno osse aut alio corpore principium ducentes alteri inserantur, uinculorum etiam loco iure habentur, ossaq; inuicem nectunt. Caterum quia musculi ueteribus plerisque, & potissimum Aristoteli carnis nomine appellantur, connexus qui musculis fit, $\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$ merito nuncupatur. Porro & dentes quoque in suis alueolis carne quapiam firmari uidentur, adeò ut ea quasi ratione ossium cõstructio reperiretur, in qua caro non duntaxat musculorum modò connexum exterius ambiret, sed & interueniret quoque. Insuper alia cartilaginis medio connascuntur. quippe appendices in prima ætate cartilaginis medio suis ossibus committuntur, quemadmodum & pubis ossa, & ossis v imitantis osicula. Hæc connexus species à cartilagine $\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$ uocatur. Sutura autem & harmoniæ nullius corporis beneficio quàm ossium structuræ cõeunt. Nam & si duræ cerebrum inuestientes membranæ fibræ aliquot suturas transeant, non tamen ob id eas cõnectunt: quemadmodum neque cartilagine in articulis ossa oblinentes, ad ossium firmitatem & connexum quicquam auxiliantur. Præterea in senioribus appendices non amplius cartilaginis, quæ glutinis uicem subeat, interuentu ossibus connascuntur, sed cartilagine prorsus perperita adeò committuntur, ut, quemadmodum iam antea quoque dixi, coalitis regionem obseruare arduum sit. Institutum modò erat huic Capiti finem imponere, atque ad singulares ossium descriptiones sermonè dirigere, nisi magnopere Galeni autoritas me remoretur: quæ merito prohibet, adeò leuiter ea quæ in præsentii Capite ab ipsis placitis deflectunt, prætergredi. Vt enim ex multis præter prius etiam commemorata, aliquid proponam, primum in libro de Ossibus, ubi is ex professo, & sui non mediocri in



Serrata com
pago.

Instar ungui-
um commissu-
ra.

Asserum ne-
xus.

Limboru ua-
ria insusio.

æquoria.



$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

Quorum bene-
ficio ossa inui-
cem cõmittun-
tur.

Ligamen-
torum.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

Libro 2. de
Partibus ani-
malium, ca. 9.
Carnis.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

Cartilaginis.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

Que nullius
corporis inter-
uentu commit-
tuntur.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

$\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

a. fi. 6. ca.
c. 7. A. B. C.
D. 3. fi. 6. ca.
b. E. inter-
tia integra-
rum.
c. 1. fi. ca. 13.
d. 2. ad f.

fi. ca. 40. li.
secundi. 2.
4. 5.

figure in-
tegrari.

fi. ca. 1. li. 2.

Passim in
musculorum
tabul. ut se-
prima tab.
Q. 2.

b. fi. ca. 40.
lib. 2. cha. 4.
d. 2. 3. 4.
4. 5.
i. fi. inte-
grarum.
h. fi. 1. 2. 3.
ca. 13. G.

Que possi-
mum à Gale-
ni placitis hoc
Cap. declinat.

primo de Administrandis sectionibus libro commendatione, ossium structuras enumerat, ipsius dogmati non accessi, quo futuram, harmoniam & gomphosim synarthrosis species esse docet. Ego enim synarthrosi obscurum, & non manifestum ascripti motum: nō idemq; articulationis differentis ac formis illam atque diarthrosin fieri commemorauit: deinde futura, harmonia & gomphosi non obscurum aut difficilem, sed nullum prorsus motum dedi, & has connexus species nequaquam articuli nomine cum Galeno sum complexus. quod profecto neque ab ipso faciundum fuerat, nisi brachialis, & postbrachialis, & tarsi, & pedis, & costarū cum pe-ctoris osse cartilaginum cōstructionem suis locis narrans, hæc per synarthrosin cōmitti falso asserere uoluisset. Quum enim inibi uerē hæc ossa synarthrosi coarctari diceret, non ne animaduertendū ipsi fuerat, hæc neque futura neq; harmonia neque gomphosi connecti: Quod sanē fieret, si modō synarthrosis species harmoniam, futuram & gomphosim rectē statuisset. Verū per me cuius integrum erit, de synarthrosi ex suo arbitratu constituere: si interim non ignoret, hanc longē secus in omnibus ferē Galeni libris accipi, quā initio libri de Ossibus. Nam uel in XIII, XIX, XXI, XXIII, Capitibus eiusdem libri, aliter quā in initio, Galenus sentit. Deinde Introductorij seu Mediciauthor, Galeni decreto non acquiescens, & sibi priuatim ossium connexus diuidens, inquit: Ea aut ad motum componi, uo cariq; eam compositionis seriem ἀρθρῶν, seu articulū: aut ad nullum motum, ac tunc συνάρθρῳσι appellari: cuius species futuram, gomphosim & symphylin enumerat. Verū hac ratione brachialis, postbrachialis, tarsi & pedis ossium cōpositioni synarthrosis accommodari nequaquam possit, quum neque futura, neq; gomphosi, multoq; minus symphyli inuicem connectantur. Insuper magis à Galeni dogmate recessi, quum omnes ossium cōmissuras aut aliquid corporis beneficio, aut nullius committi propositum finit: quandoquidem Galenus id soli symphyli, in libris de Ossibus tribuerit, atq; synneurosin, synsarcosin, & synchondrosin, symphyleos tantū species enumerauerit. Quod autē illum non sim secutus, priuam occasionem inibi sius præstitit oratio, qua fungosa molliaq; inter se nullis medijs per symphylin cōnasci, licetiora uerō densioraq; nonnullis intermedijs coalescere docuit. Cōperio enim in mollibus adhuc & teneris ossibus, appendices cartilaginis interuentu suis ossibus uniri: in duris uerō & asceratis, & in senibus, nihil prorsus symphylin intercedere. Deinde nulla prorsus mihi se exhibet symphysis, seu unio, quam ligamenti interuentu uerē unitam liceret asserere: adeo ut symneurosis sub symphyli comprehendī nequeat: dummodo nulla unio ligamenti ope perficiatur, uti sanē articuli ad unum omnes ligamenti beneficio cōeunt, nunc (ut & antea dixi) orbiculatim obducti, nunc etiam in mutuo ossium contactu interueniētis. Præterea ad amulsum mihi singula perpendiculari, multo adhuc minus symphysis sese obtulit, quam carnis interuentu committi quis rectē assereret. In nullo enim ossium connexu caro intercedit, nisi fortassis in dentium cum maxillis connexu, qui gomphosis, non autem symphyli censetur: quantumuis etiā dentes nullū ostendant motum, non magis scilicet quā harmonia, aut futura. At carnis interim, hoc est musculorum auxilio, omnes ferē cōmittuntur articuli: quem cōnexum συνάρθρῳσι à ueteribus appellatum fuisse diximus, quam symphysis speciem nemo dicere possit. Ad hæc (ut huic Capiti finis aliquādo tandem imponatur) Aristotelis quoq; locus secundi libri de Partibus animalū, ut promptius à Galeno dissentire admonuit: ubi Aristoteles ossa neruis, carne & cartilagini cōmitti affirmat, eum connexū uniuersim ad omnes ossium cōmissuras doctissimē referens. Quamuis etiā hanc Aristotelis sententiā Galenus haud oscitanter præterijt, quando eorū quæ in libro de Ossibus docuit oblitus, ad finem secūdi de Administrandis sectionibus libri, ossiū cōstructiones perfunctoriē, licet sanē eleganter, percurrit, & quodāmodo Aristotelis uerba recenset.

Capite nono.

CAPITIS STRUCTURÆ RATIO, quotq; eiusdem figuræ. Caput V.


QUINQUE SEQUENTIVM FIGVRARVM INDEX.

PRIMA quinti Capitis effigie naturalis capitis, seu caluarie figura inslar oblongæ spheræ utrinq; leuiter depressæ efformata, & anteriū posterioriq; extuberās, delineatur. Secūda effigies, primā non naturālē capitis figurā demonstrat, in qua anterior eminētia perijt. Tertia effigies secūda capitis figurā nō naturālē ostēdit, in qua anterior eminētia depeditur. Quarta effigie tertia nō naturālē capitis figura indicatur, in qua utrunq; tuber, anteriū nimirum & posteriū, intercidit. Quinta effigie, quartā non naturalem capitis figuram expressimus, in qua ambæ eminētiæ ad latera, non autē antrosum retrorsumq; spectant.

PRIMA FIGV-
RA V. CAPITIS.

SECUNDA.

TERTIA.



QVARTA.

QVINTA.

Caput oculo-
rum gratia for-
matum.
Li. 7 de Vsu
partium.



Qui Natura
oculos muni-
rit.

Cerebri oculo-
rum gratia in
capite locari.
et dem cerebri
nomine reli-
quos sensus.

HVMANVM caput oculorum gratia efformari, cancrorum, scarabeo-
rum, & quorundam quæ capite destituuntur animalium oculos manife-
stò commonstrare, Galenus docuit. His siquidem oculi super processus
prælongos locantur, neque imi, quemadmodum os, nasus, & aures in
pectore ipsis conduntur. Oculos enim alta eguisse sede, attestantur ho-
stium incurfus latronumq; speculatores, qui muros, montes & altas tur-
res eodem usu ascendunt, quo nautæ nauium antennis, terram ocyus,
quàm qui subsunt in naui, conspecturi. Commemoratis igitur animalibus testacea & dura
cute obtectis, integrum fuit oculos in oblongis processibus tutò reponi, quòd illi duriores
erant futuri, & tunica extrorsum obduci poterant, quæ ab illorum animalium cute prognata,
simul durissima & testacea esset. Homini uerò propter corporis subtilitatem, & mollem te-
nuemq; qua oculi inuestiuntur membranam, totos oculos necessariò molles habituro, hi præ-
longis processibus citra periculum apponi nequierunt. Quando itaque in imo hominis ocu-
los locare non erat eorum functioni commodum, nudis uero ceruicibus eos adnectere haud-
quaquam decebat: & quum Natura nec oculorum usum prohiberi, neque eorundem securita-
tem uitari uellet, partem extruxit altam, & eleganter oculos ab iniurijs uindicantem. Superius
enim palpebras, cilia, & frontis os collocauit: inferius uerò præter palpebras, malæ etiam & ge-
næ oculos tutantur. Internis autem partibus nasus muri instar oculis interiectus est, exterius
deinde ualidissimum os externum oculorum sedis angulum occupat, adè ut excelsis & extu-
berantibus undique partibus oculi sepiantur, utiliterq; ueluti in sinuosa ualle latitent. Cæte-
rùm horum quæ oculos muniunt coaceruatio & congeries, caput minime est: quamuis etiam
illa sine capite consistere nequeant. Quæ igitur fuit necessitas, hîc quoque alias componi par-
tes, quarum fabrica capitis nomen meretur: Singula sensus organa, uisus nimirum, odoratus,
gustus, & auditus, neruo indigent molli: neruo quidem, quòd ille sit sensus instrumentum:
molli autem, quoniam affici & disponi quodammodo oportet: quin & aliquid etiam organa
ab

ab incidenti extrorsum sensibili pati, ut sensus fieret, magnoperè conducit, Quando itaque oculi mollibus cerebri neruis indigebant, ac mollia omnia si ulterius procederent promptè diuulsa frangerentur, offendereturq̃, cerebrū iure non procul ab oculis reponi debuit. His ita se habentibus, quod à principio de capitis structuræ ratione inquirebatur, iam inuenimus. Colligitur enim, cerebrum in capite locari oculorum causâ, odoratus autem & auditus gustusq̃ organa propter cerebrum. Quanquam & hæc organa alioquin altissimam sedem opportunè sortiantur. Aures enim quum sonum percipere debeant, qui naturâ in sublime fertur, rectè in altis corporum partibus locatæ sunt. Item nares, eo quod omnis odor ad superiora ducitur, merito sursum sunt: & quod magnum cibi & porionis iudicium ad nares quoque pertinet, non sine causâ uicinatam oris illæ sequuntur. Iam gustatus, qui sentire eorum quibus uescimur genera debet, commodè habitat in ea oris parte, qua esculentis & poculentis Natura iter patefecit. Tactus autem toto corpore æqualiter fusus est, ut omnes ictus, omnesq̃ nimios & frigoris & caloris appulsus sentire possimus. Cæterum caluaria (ut modò temporales præteream mulculos, & capitis super colli uerthebras connexum, & rotundam figuram iniurijs pertinaciter repellendis omnium aptissimam)^a cerebri, cuius debet esse receptaculum & propugnaculum, figuram non iniuria mutuatur, nimirum sphaeræ utrinque leuiter in anteriora depressæ. Quum enim cerebro cerebellum posteriori in parte subijciatur, & dorsalis medulla illac è capite procidat, priori uerò cerebri sede processus ad oculos & ad odoratus organorum sedes pullulent, non ineptè cerebrum prælongam sphaeram refert. Atque ob hanc etiâ causam caluaria^b, quæ secundum naturam se habet, ad oblongæ sphaeræ imaginem potissimum extruitur, priorem posterioremq̃ partem obtinens prominentiorem, ac magis proceram. Omnes autem reliquæ ab hac euariantes figuræ, non naturales censentur: quemadmodum ea in^c qua anterior eminentia à syncope frontis uel elatiori sede producta perit, posteriorem autem quæ occipitis est referuatur. Item quæ huic planè contraria uisitur, ac posteriorem, occipitijs nimirum, eminentiam manente anteriore perdidit. Deinde^d tertia, naturalis adhuc magis opponitur, in qua ambæ capitis eminentiæ, prior scilicet quæ in fronte, & posterior quæ in occipite consistunt, abolentur, & caput ad amussim rotundum ac iustar exactæ sphaeræ obseruatur. Ista figura Theristes ab Homero fuisse traditur. hanc enim ab ipso *ῥησέω* appellari, nonnulli asserunt: quanquam plerisque omnes acuminatas capitis figuras eo nomine, & *ῥησέω* nuncupare libuerit.^e Quarta species non naturalis figuræ ab Hippocrate quoque enumeratur, in qua caput in latera ad utranque aurem insignius, quàm in anteriori posterioriq̃ sede prominet. Ac hæc naturali capitis figuræ omni ex parte dissimilis est, haud secus quàm si ad alteram aurem in naturali figura faciem, ad alteram uerò posteriorem ceruicis sedem fingeres. Verum Galenus alibi hanc excogitari quidem, non autem in rerum natura consistere posse affirmat: quamuis interim Venetijs puer multis partibus deformis, & admodum amens hac figura hodie conspicitur. Imò apud Bononienses mendicus obambulat, cui caput quadratum, sed latius paulò quàm longius contigit. Præterea Genuæ puellus à mendica ostiatim circumfertur, & in nobilissima Belgarum Brabantia ab histrionibus fuit propositus, cuius caput citra omne mendacium duobus uirorum capitibus grandius est, & in utrunque latus extuberat. Cæteras autem non naturales capitis effigies, etiam in egregiè prudentibus interdum conspiciamus, licet tales caluariæ nobis in cimiterijs nimis quàm rarò se offerant: uti profectò subinde occurrerent, si Alpium, quæ Stiriam spectant, accolarum cimiteria scrutaremur: quum illos homines non modò dictis capitis figuris, sed longè etiam magis differentibus, pluribusq̃ deformes esse, non semel mihi retulerit Naturæ operum studiosissimus, ac in primis generosus iuuenis, CHRISTOPHORVS PFLVG SALISBURGENSIS, multiplici linguarum peritiâ, uariâq̃ cum aliarum artium, tum uerò potissimum Iuris Ciuilis cognitione ornatus: qui nuper sui longè præstantissimi animi egregium specimen edidit, quando Louanienſis Gymnaſij studioſorum præfectus, tam alacriter ac repente Louanium grandi obſidione ſecundò liberauit.

Naturalis capitis figura.

Prima non naturalis capitis figura.
Secunda,
Tertia.

Quarta.


Lib. 9, de V. suppartum.
Varie capitis figura.

Prior et 7 li
bri figura.

fig. 1. et
pictæq̃ 6
cap. fig.


2 figura.
3 figura.
4 figura.

5 fig.



PRIMA SEXTI CAPITIS

FIGURA, QVAE DVAS VERTICIS ossium portiones inuicem nonnihil sciunctas commonstrat, ut commodius artificiosissima sutura fabrica oculis subijceretur.



SECUNDA FIGURA.

HÆC OSTENDIT CALVARIÆ portionem à reliquo capite serra diuisam, ut ossis apparet constructio duabus densis solidisq; squamis seu laminis et notatis efformata, in quarum medio fistulosa seu fungosa ossis consistit sub-

stantia et indicata. Cæterum huiusmodi squamæ vulgò capitis tabulae uocantur. ac superior quidem exterior ue squama et notata, prima appellatur tabula. interior uero, quæ duræ cerebri inuestienti membranæ est proxima, et insignitur, secunda tabula loco habetur, et quidam hanc diploë quoque uocant. Neque desunt interim qui fungosam fistulosamq; ossis substantiam et indicatam, unius etiam tabulae uice recensent, hanc mediam seu secundam appellantes, hæcque ratione tres caluariæ tabulas constituentes, quæ crassitie duritiæq; in omnibus hominibus neutiquam pares cernuntur.

TERTIA SEXTI CAPITIS

FIGURA.



TERTIA figura integrâ caluariam capitis naturalis figuræ (quæ oblongam sphaeram utrinque leuiter in anteriora compressam refert) absque inferiori maxilla in sinistro latere depictam exhibet, suturas in externa capitis sede spectandas pulchrè proponens.

QVAR

QVARTA SEX-

TI CAPITIS

FIGVRA.



H A E C figura caluariâ sinistro lateri magis incumbente exprimit, ut & basis caluariæ in conspectu nonnihil ueniret. Aliquot suturarum causa, ab hac figura os iugale serra ademinus. Cuiusmodi uero illa sint, ex subsequenti characterum indice, ac ex huius & succedentium aliquot Capiti contextu, promptè intelliges. Præsens namq; figura maxillæ superioris ossibus cognoscendis, quibusdamq; ossium foraminibus ostendendis, etiam pulchrè subseruit.

CHARACTERVM TERTIAE ET QVARTAE

FIGVRAVVM INDEX.

P R A E S E N S characterum index tertiæ ac quartæ figuræ communis erit, quod scilicet eidem ferè characteres in utraq; collocentur. et si casu quis aut tertiæ, aut quartæ figuræ duntaxat peculiaris occurrerit, illi pro figuræ ratione, aut hanc notam 3, aut istam 4, in indicis contextu subijciam.

A, B Coronalis anteriorue sutura earum quæ transuersum ducuntur. Cæterum *B* & *A* in tertiâ medium notant coronalis suturæ, in sinistro latere consistens, dextrum autem ipsius latus, quartâ figura exprimitur.

C, D Posterior sutura transuersarum, quæ *A* Græcorum maiusculæ literæ assimilatur. In tertiâ huius suturæ sinistra pars conspicitur, in quartâ uero dextra. Porro tertiâ figurarum integrâ ossium compagem experimentium, huius suturæ totam sedem ad *B* demonstrat, quæ ueræ suturæ per similitudinem est. Quippe de ipsius additamenti per capitis basim perreptantibus, atque in quintâ & sextâ iam subsequentibus figuris, delineandis, alia est ratio.

E 3 Sutura à medio suturæ *A* referentis ad medium coronalis, seu à *D* ad *B* deducta.

F Squamosa cōglutinatio, ac in tertiâ quidē figura uidetur sinistra, in quartâ autē dextra. Dein *G*. in ambabus à *C* ad *G* interuallum cōglutinationis notatur, à sutura *A* simili ad ueram cōglutinationem squamæ formem pertingens, quod non mutuo incumbentiū squamarum, sed ueræ suturæ constructionem ostendit. Quod uero à *G* ad *H* per *F* porrigitur, squamæ formis est cōglutinatio, uerticis ossi & temporis ossi communis. Ab *H* autem ad *A* indicatur glutinatio squamæ formis, ossi uerticis & frontis ossi communis.

I 3 Sinistrum uerticis os.

K Dextrum uerticis os.

L Frontis os, quod unicum est.

M Occipitis os, similiter unum.

N Sinistri temporis os in tertiâ, dextri autem in quartâ ostenditur.

O Os cuneo à dissectionis professoribus assimilatum, quod succinctiori nomine sæpius cuneiforme

P. (uoces duntaxat sectantium uenia) appellamus. Hoc unicum est, & cōiugis expers. Verū *P* priuatim notat huius ossis processum, quos uespertilionum alis cōparabimus. Hi utrinq; duo sunt, in 2, 3, 4, quartâ figura conspicui & præter *P*, etiā numeris his 2, 3, 4, & 5 notati, quos quinta huius cæ 5, fig. 4 pitis figura accuratius proponet.


QQQ

- QQQ Hoc os maxillæ superioris ossium primum erit, hic aliquot Q insignitum, ne forte sedem Q quod d' uicinius est notatā, aliud os ā præsenti esse arbiträreris. Linea inter duo Q consistens, ac * insignita, processum eius ossis delineat, qui cavitatē in tempore exculpitā ualde auget.
- R R R Lenis in frōtis osse & uerticis asperitas, ā qua semicirculi ritu tēporalis musculus pronascitur.
- SS Quartū maxillæ superioris os: in tertia sinistrū, in quarta dextrū notatur. T incuria elapsū est.
- V, X 3 Caluariae sedes, quam os iugale appellamus, ac sequenti Capite describemus. V hic notat processum temporis ossis, N indicati, ad iugalis ossis constitutionē eductum. X uerō, processum
- Z 3. primi maxillæ superioris ossis, Q insigniti. Z autem futura indicatur, dictos nuper processūs
- V, X 4. necdens, quibus iugale os efformatur. Porro V & X in quarta figura notant sedes, ā quibus processūs illos ferrā rescuimus.
- a a Suturae cuneiforme os circumscribentis interuallum illi ossi ac temporis ossi commune.
- b Suturae cuneiforme os circumscribentis interuallum ipsi & frontis ossi commune.
- c 4 Pars hæc cuneiformis ossis interdum peculiare uidetur ossiculum, squamæ modo tenue, & linea
- Φ 4. ā cuneiformi osse dirēptum, quam q̄ indicauimus. V erūm hæc non ita crebrō se offert.
- c Suturae os cuneiforme circumscribentis interuallum, ipsi & maximo superioris maxillæ ossi paulo antē S insignito commune.
- ff 4 In quarta figura f conspici, præsenti Capiti nihil seruiens: notatur enim sutura ossi Q indicati, & ossi S notati communis, quam cum reliquis maxillæ superioris futuris persequar. Hic enim obiter eius memini, quod huius uidendi gratia in quarta figura os iugale excuerim.
- g g Sutura, frontis os ā cuneiformi & maxilla superiori dirimens.
- b 4 Sinus, cui capitulum inferioris maxillæ inarticulatur.
- i Temporis ossis processūs, scriptorij stili modo prominens.
- k Mammillaris processūs, ē temporis osse productus. Quarta figura utriusq; processum k notat.
- ll 4 Capita occipitij ossis, quæ primæ ceruicis uerbræ sinibus articulantur. In horum medio foramen occurrit, dorsalis medullæ causa cælatur. V erū ut præsenti Capite ossiū foramina enarrare non instituimus, sic neque eadem hic characteribus insignienda duximus. Quamuis priuatim in quarta figura Φ ponatur, ad quod ā duodecimo Capite foraminibus dicando remittēris.
- Φ 4. tim in quarta figura Φ ponatur, ad quod ā duodecimo Capite foraminibus dicando remittēris.

QVINTA SEXTI CAPITIS FIGVRA.

BASIM CAPITIS ABSQVE INFERIORI MAXILLA


AD ANVSSEM REPRESENTANS.



INDEX

QVINTAE figura multos characteres tertiae & quartae figuris communes, in hunc modum adhibuimus.


- A** Coronalis futurae extremum, in temporis cauo conspicuum.
- C C** Sutura Δ exprimens: atque hi characteres inferiorem partem huius futurae crurum notant, ubi haec non amplius futurae effigiem accurate demonstrat. Sagittalis futura hic se nusquam offert.
- F** Squamiformis conglutinatio non omni ex parte hic uisitur. quare etiam alios characteres tertiae & quartae figurarum, ipsi non accommodauimus. Quamquam hic **K** idem, quod in tertia & quarta indicabat, notare possit.
- K** Verticis sinistrum os, uerum modica ipsius conspicitur portio.
- L** Frontis os, cuius etiam modica pars hic oculis subijcitur.
- M M M** Occipitij maximae ossis partem hic cernere licet, totam nimirum quae in caluarie basi consistit.
- N N** Vtrinque unum temporis os notatur. **O O** Cuneiforme os.
- P P** Processus cuneiformis ossis uersutilionum alarum imagini respondentes. Qui numero quatuor sunt, his characteribus 2, 3, 4, 5 notati.
- Q** Primum maxillae superioris os, quod Γ hic notauit.
- S A** Maximum quartum uel maxillae superioris os, & hoc quoque peculiariter aliquot Δ indicatur.
- V X** Os iugale. **Y** Sutura ossis iugalis.
- a a** Suturae os cuneiforme, circumscriptoris interuallum ipsi & temporum ossi commune.
- b** Suturae os cuneiforme, circumscriptoris interuallum illi ac frontis ossi commune.
- d** Hac sede occultatur futurae os cuneiforme, circumscriptoris interuallum commune ipsi & ossi externum angulum sedis oculorum constituenti, ac **Q** insigniti.
- e** Suturae os cuneiforme, circumscriptoris interuallum ipsi & quarto maxillae superioris ossi commune.
- f** Haec futura superiori maxillae peculiaris censetur, ac proinde hic non uenit explicanda.
- g** Sutura frontis ossi & superiori maxillae communis.
- h** Sinus, cui capitulum inferioris maxillae inarticulatur.
- i** Processus scriptorio stylo non absimilis. **k** Mammillaris processus.
- l l** Capita occipitij ossis, quae primae ceruicis uertebrae coarctantur.
- m m m** His characteribus, qui quinta, ut & subsequentes, proprii sunt, notatur futurae Δ imitantis additamenta, per caluarie basin antrosum deducta, atque ad se inuicem, nempe ad **n**, tendentia.
- n n** Linea dicta nunc additamenta iungens, ac ossi cuneiformi & occipitis ossi communis.
- o p** Sutura a linea n. indicata, in dextrum latus repens, inter os cuneiforme & sinistri temporis os. Verum ab **n** ad **o** non proprie futura est, quae admodum neque ab anteriori **m** ad **n**, sed rimae & ossis ab osse notabilis distantia, secus nimirum quam in alijs futuris harmonijs sive occurrit.
- q q** Suturae os cuneiforme, circumscriptoris interuallum ipsi & sextis superioris maxillae ossibus.
- II II** notatis commune. Verum ut cuneiforme os futuris circumscribas, hanc quintam figuram & tertiam cum quarta intueri, singularium animaduertens characteres. Ab **n** igitur ad **o**, hinc ad **p**, **a**, **H**, **b**, **d**, **e** & **q** procede, atque ita utrinque cuneiforme os futuris terminatum fingito, sed non nisi hominis caluarie inspectioni adhibita, ut quae in omnem partem prompte uertere poterit. quum interim hic tres simul tabulae inspiciedae sint, ut uel in externa caluarie sede id os circumscribas. quod quo leuius praestes, futuram Δ similem cum suis additamentis, & linea occipitis ossi et cuneiformi communi, futura denique cuneiforme os circumscribente hic delineauit, iisdem characteribus in hac atque in tertia, quarta & quinta undique adiectis.
- r** In hac figura, ut et in quarta temporis ossis linea notatur, inibi futurae modo os, cui auditorij meatus initium insculpitur, continens, & ueluti a osse (ut sic dicam) seiungens.
- s** Ossis temporis asperitas & processus, quo id transuersam respicit lineam, cuneiformi ossi & occipitis ossi communem, & n. notatam.
- z** Octauum capitis ossis processus, seu septum amplitudinem narium intercedens. Reliqui characteres ostendendis superioris maxillae ossibus priuatim conferunt.





P R A E S E N S figura interna calvariae basis sedes oculis subijcitur. Hic namque calvariam delineauimus, in qua superior ipsius pars subsequenti figura exprimenda, ad eum modum ablata est, quo cerebri fabricam ostensuri caput serra diuidere consueuimus.

SEPTIMA SEXTI. CAPITIS
FIGVRA.



S E P T I M A figura reliquam internae sedis calvariae partem commonstrat, figura sexta non expressam.

DVAE proximè præcedentes figuræ pluribus ornantur characteribus. uerum huc potissimum seruiunt masculi Græcorum, capitis ossium futuras indicantes: quæ in interna caluarie sede, qua cerebrum continetur, etiam se spectandas offerunt. Reliqui autem characteres in his figuris conspiciui, caluarie foraminibus ostendendis conducent.

II In septima figura coronalis notatur, non adeo exactam futuræ compagem, atque in caluarie externa sede, exprimens.

ΔΔ Sutura Δ literam referens, notatur in septima. Verum & in sexta Δ etiam uisitur, dictam nuper suturam notans.

ΘΘ In septima, sagittalis sutura indicatur. Sequentes modò notæ ad sextam duntaxat referuntur.

ΛΛ Squamosa sinistri temporis conglutinatiō.

ΞΞ Additamentum sinistri lateris suturæ Δ imitantis, quod per caluarie basim contendit.

Π Linea cuneiformi ossi & occipitis ossi communis, quæ duo suturæ Δ imitantis latera additamentā ue iungit.

ΣΣ Sutura cuneiforme os, circumscribens internum commune ipsi & frontis ossi, & octauo capitis ossi, in octaua figura A, B indicando. Si itaque a Π ad Σ, & hinc ad aliud Σ, hinc uero ad primum Ψ, ac inde ad secundū Ψ perrexeris, cuneiforme os in sinistro latere interna caluarie sede circumscripseris. Vnde si eosdem characteres in dextro latere ad suas futuras poni sinxeris, eodem modo ut in sinistro latere, per characteres pergens, uniuersum cuneiforme os hoc loco descriptum fueris complexus.

OCTAVA SEPTIMI CAPITIS FIGURA.

QVAMVIS modò tabularum frequentia lectori minime molestus esse uelim, eoq; potissimum nomine singula capitis ossa adhuc priuatis figuris nō exprimam: tamen quia ossis cuneo comparati, & dein octauo capitis ossis, quod cribri instar foraminibus peruium est, circumscriptio, non ita promptè ac cæterorum capitis ossium intelligitur, præsentī figura cuneiforme os cum octauo capitis osse, à cæteris omnibus liberum, ea facie exprimitur, qua internam caluarie superficiem cerebri sedem respicit. quod ideo maxime præstitimus, ut cauernæ in cuneiformi osse plerumq; occurrentes in conspectu essent. Inditetur itaq; A, B, A octauo capitis os. Verum B priuatim insinuatur septum, sedes interstinguens, quæ cerebri processibus parantur, qui nervorum modo à cerebro ducti, olfactus organorum loco habentur.



A, B A octauo capitis os. Verum B priuatim insinuatur septum, sedes interstinguens, quæ cerebri processibus parantur, qui nervorum modo à cerebro ducti, olfactus organorum loco habentur.

C D Duæ præcipuæ cuneiformis ossis cauernæ.

E Septum indicatas modò cauernas interdiuidens.

F Alterius cauernæ seu antri foramen, in narium amplitudinem pertinens.

G Cavitas in humiliori sede septi posita, quod duo potissima antra intersepit. Reliqua foramina in hac figura passim obuia, cum cæteris caluarie foraminibus duodecimo Capite enarrabuntur.

H Cuneiformis ossis processus uespertilionum alis similes, & hic aliqua ex parte conspiciui. Cæterum iam tempestiuū est Capitis contextum aggredi, hæc q; omnia seriatim persequi, atq; Conditoris nostri industriam in condenda caluarie expendere. Licebit enim opinor, solis uocibus addictorum uenia, uniuersam struem tertia, quarta, quinta, sexta & septima figuris expressam, caluarie nomine complecti, utcumq; alij solam partem crinibus ornatā ita appellari uelint. Atq; ita hæc moles nobis in caput & maxillā superiorē, doctrinæ studio, diuiditur.

C CERE

Quale domici-
lium Naturae
cerebro parat
rit.



Calvaria cur
non solido offe
constet.

Suturarii u-
sus.

Naturalis fi-
gurae capitis
suturae.

Coronaria su-
tura.

Aliteram refe-
rens.

Sagittalis, et
uarius ipsius
ductus.

Virorum capi-
ta a mulierum
non perperam
uariare.

Capit. lib. 3.

Histor. enu-
malium, et 2.

de Partib. ani-
malium.

Lib. 1. cap. 7.

de Hist. enu-
malium.

EREBRVM rationis sedem (quæ instar reginæ in altissimo corporis
sita, duabus cōcupiscibilibus animis dominatur ac præest) tuto quodam
munimento custodiri magnoperè expedit. Quocirca etiam prouidus re-
rum Opifex, non soli curi carnosissq; partibus ut in abdomine, aut per in-
terualla à se inuicem remotis ossibus ut in thorace, cerebri commisit cu-
stodiam, sed undique os ipsi instar galeæ circumposuit. Verum quum ca-
put tectum quoddam domus calidæ referat, fumida uaporosaq; subie-
ctarum partium recrementa, quæcunque sursum conscendunt, excipiens, atque huius gratia
copiosiore euacuatione caput ipsum egeat, galeam cerebro inductam non omni ex parte soli-
dam, sed^a cauernosam, futurisq; intertextam sagax rerum Parens efformauit, non quidem
spongix modo tenuibus inæqualibusq; foraminibus, uelut quibusdam cauernulis, utrinque
os perforans: at utraque parte^b cauernulas, intus^c ac foris scilicet, in læuem & densam ossis
squamam desinere uoluit, quòd illic occurruræ erant duræ cerebri membranæ, hîc autem
membranæ quæ caluariam ambiens, *επιανθωδης* nuncupatur. Si enim tota caluaria substan-
tia seruaretur fistulosa, & cauernulæ nullo obducerentur cortice, ea substantia sua asperitate
uicina raderet uulneretq;. Dein si prorsus spongiosa fistulosaq; foret, nullo donaretur ro-
bore, ac pumicis ritu fragilis atque infirma esset. Verum uidebitur fortasse alicui, caluariæ os
inter duas squamas frustra fistulosum & cauernosum esse: quum ipsius futuræ propter illa-
rum copiam & magnitudinem ab aliquo ad transpirationem iuuari nihil indigeant. Si itaque
huius iudicio uniuersa caluaria simul tenuis & densa solidaq; fuisset, nihil sanè tuior hac
ratione redderetur subiacentium organorum constructio. quandoquidem quæ ossa uulne-
rant, intrò promptè ob uia breuitatem penetrare possent. Si uerò caluaria sine omni cauernu-
larum specie simul crassa densaq; crearetur, homini onus haud secus præberet, quàm si obli-
gata capiti sarcina nunquam remitteretur. Reliquum igitur erat tertium, scilicet neque tenue
neque densum, solidum uè, sed crassum, rarumq;, ac cauernosum caluariæ os fabrefieri. Ita
enim neque grauaturum erat, neq; uia in cerebrum breuis ipsum percutientibus futurum. Cæ-
terum caluaria non ad excrementorum tantum transpirationem futuris indiguit, sed conduce-
bat ex multis ossibus ipsam compingi, ut si quādo percussâ rumpatur, ipsius rupturæ in totam
caluariam ueluti per fictile uas, non procedât, sed detineantur, & in illis sedibus cessent, in qui-
bus ipsum quoque os futuris terminatum desinit. Quinetiam cerebri uentriculos, aliq; non-
nulla in cerebro corpora, ne cōcidant, distendi ac eleuari oportuit: id quod optime futurarum
perficitur beneficio. Duræ siquidem membranæ cerebrum conuestientis^d fibras, unâ cum ua-
porum quorundam sinibus futuras transeuntes, in membranam extrinsecus caluariam succin-
gentem explicari, atque ita cerebrum cur minus in se collabatur sustinere, septimo libro osten-
demus. Atque huius potissimum usus ratione, iustissima caluariæ futurarum cernitur distribu-
tio, nimirum ut sustinendæ in cerebro partes accuratè subleuentur. Quod enim oblongum ce-
rebriq; modo rotundum est, non aptius quàm transuersis, & alijs secundum longitudinem
ductis apprehensionibus attollitur. Naturalis nanque capitis figura primùm tres futuras obti-
net: duas quidem transuersas, quarum^e altera in lyncipite est, in occipitio^f altera: tertia à me-
dio posterioris, seu eius quæ in occipitio consistit, per capitis longitudinem ad medium usque
anterioris extenditur. Anteriorem coronalem uocant, quandoquidem coronæ potissimum in
ea capitis parte collocantur: posteriorem à Græcæ literæ Α imagine, *αμφοδοντι* nominant:
tertia per uerticem capitisq; longitudinem procedens, *δελταία* Græcis nuncupatur, quod ue-
ru sagittæ uel instar rectæ incedit. unde etiam à uirgæ ductu *καθολοφους* fuit appellata. Hæc in-
terdum per^g frontis mediū ad nasi usque summum non ad eò insigni atque in ipso uertice com-
plexu, aut exquisita ad eò futuræ compage prorrepit. Atque id nonnulli uiris omnibus, alijs au-
tem mulieribus peculiare esse falso contendunt: quum rarissimè in uiris, atque adhuc multò ra-
rius, aut uix unquam in mulieribus id accidere, non obiter animaduertimus. Et hoc uel inde
conijcias, quòd ex uiginti quæ in cimiterijs occurrunt caluarijs, uix unam, cui frontis os diui-
datur, reperiās: neque ulla, etsi secus tradiderit Aristoteles, in futurarum enarratione prorsus
aberrans, uiris ac mulieribus hac in parte uidetur differentia. Cæterum quadrupedibus à po-
stiori futura Α referenti, sagittalis futura ad superciliorū usq; mediū protenditur: id quod
canum caluariæ, equorū, boum, & id genus animalū manifestè attestatur. Non enim audien-
dus est Aristoteles, qui canibus continuâ, nullisq; futuris distinctam ascribit caluariā, quū com-
memoratas hæcenus futuras, & quæ hoc toto Capite enumerantur ferè omnes, canum
caluariæ eleganter expriment. Non desunt etiam, qui instantibus hanc futuram per medium oc-
cipitij ossis ad^h foramen usq; dorsali medullæ uiam porrigens descendere, totumq; occipitij os
diuidere

a b c d e f
gura.
c. d. e. 2. fi.
a. c. e. 1. et 6
fig. chara-
cteris.

fi. 7 libri
G. H. I. de m
F.

g. 4. fi. A.
B. in 7 r.
h. 3. 4. fi. C.
D. in 6, 7
o. o.
i. 3. fi. ad
per E ad B.
in 7 o. o.
Tale quid
ostendunt
3. 4. fi. 3. ca.

Canina
caluariæ fi-
gura ca. 9.

6 fig. e.

diuidere afferat: quod sanè & nos quoque obseruauimus. uerùm potius ea diuifio ad *συμμετρίαν* coalitumq; quàm ad futuræ speciem referenda est. quoniam hæc cartilaginis beneficio in pueris perficitur. in ætate autem prouectioribus nullum eius diuifionis rudimentum occurrit. Vnde etiam eiusmodi diuifionis ratio non hîc in futurarum sermone, sed in occipitijs ossis descriptione enarranda uenit. Quòd autem Herodotus, ac præter illum plerique etiam alij in Persia caluarias reperiri scribunt, nullis prorsus futuris interstinctas, ipsèq; Aristoteles suo tempore uiri caluariam absque futuris repertam tradit, neutiquam miror: quum ualde senum caluariæ nobis futurarum situm duntaxat, idq; per quàm obscure etiã referant, nulla interim futuræ imagine conspicua. Neque profectò mirum est senibus futuras concrefcere, siquidem illis uertebrae uniri cōnasci q; cernimus, & ossium quoque supercilia processusq; ita excrefcere ipsis animaduertimus, ut cōsuetis motibus illorum ossa agi nequeant. Nam & si nunquam senum ossa à iuuenum ossibus, & puerorum rursus à iuuenum uariare cognouissem, in postrema Bononiensi Anatome id sanè didicissem, ubi præter quamplurima ossa, iam nati pueruli ossa, & nonagenarij senis, & mediæ ætatis hominum ossa in scholis sedulo à medicinæ candidatis adhibebantur, quum Galeni librum de Ossibus ante musculorū sectionem istic enarrarem. Quando enim permulti effractis monumentis, atque ex xenodochijs conquisitis corporibus ossa ad inspectionem sibi parabant, facîle accidit ut alius in senis, alius in pueri, ac rursus alius in huius illiusq; ætatis hominum ossa inciderent, atque in scholas deportarent. Tunc itaque (ut ad se reuertatur oratio) in puerulorum ossibus omnia esse læuia, disuncta, mollia, pleraque cartilaginea, & processum minimum prominere, & quamplurima quæ in adultis unius ossis loco habentur, in illis ex pluribus cōstrui expendimus: quæ in singulis ossibus fracturarum, luxationum, distorsionum, & plicationum gratia, sermoni addere haud graua bor. Quanti enim momenti sit hæc nouisse, abunde intelligunt, tum qui ueræ medicinæ studiosi Hippocratis libros euoluerunt: tum qui apêdices in pueris ab ossibus sæpius quàm articulos luxari, quotidiana experientia didicere, ac ab ineunte ætate luxatos, autaliter in ossibus affectos, aliquândo sectioni accommodarunt. Cæterum iam tres futuras ut frequentius in naturali capitis figura obuiæ sunt recensimus. quæ caluaria in latus cubante, literâ H, aut potius * exprimunt. In capitulum autem formis à naturali structura euariantibus, futuræ ad hunc modum se habent. Vbi anterior capitis eminentia perit, futura coronalis aboletur, seruata ea quæ A exprimit, unâ cum sagittali, quæ tunc ad mediū usq; superciliorum porrigitur. At posteriori eminentia deficiente, futura A referens deperditur, manente coronali, & sagittali interim per occipitijs mediū ad caluarie usq; basim ducta. Quapropter si hanc capitis figuram occipitio inniti sinxeris, utraq; remanentium futurarum effigies T literæ similis erit: quemadmodum & primæ quoque figuræ non naturalis, futuræ T referunt, quum illa fronti innititur. Anteriori uerò posterioriq; eminentia simul cōcidentibus, binæ quæ tunc uidentur futuræ ad rectos angulos se inuicem intersecantes, X literam repræsentant. Altera nanque transuersa ab unius auris regione ad alterius auris regionem per mediū caput deducitur. Altera autem à foramine in occipitis osse dorsalis medullæ gratia inciso, per capitis longitudinem ad summum usque nasi pertingit, illius ritu quam sagittalem uulgo dicimus. Hæc siquidem semper in tribus prioribus capitis figuris à naturali differentibus seruatur. Reliquæ autem duæ cum totius capitis figura uariè intercidunt. Quinta capitis figura, ut prorsus naturalis est contraria, sic quoque omnino pugnantibus cum ipsa futuras exigit. Transuersæ enim seu coronalis, & illa quæ A refert, secundum capitis procedunt longitudinem, recta interim seu sagittali transuersim lata. Verum nunc & ad reliquas capitis commissuras sermonem dirigamus. Suntq; primum duæ à sagittali futura quodammodo æquæ distantes lineæ, per capitis longitudinem una utrinque supra aures porrectæ. His* principium ab humillima futuræ A imitantis sede pendet, qua hæc propter occipitijs inferiora uix amplius futuræ effigiem egregiè refert. Hinc nonnihil præfentes lineæ rectâ quodammodo feruntur, & h mox sursum ascendentes, instar semicirculi quodammodo ad coronalis futuræ terminum perrepunt. Hæc maxima ex parte constant duobus ossibus mutuo sibi incumben tibus, connexisq; non per futuram quidem, sed paulatim uerticis os descendens, instar squamæ attenuatur, atque in os infra ab auribus ascendens, similiterq; in squamam attenuatum subintrat: utriusq; ossibus quâ inuicem compinguntur, asperitatem quandam mutuam nanciscentibus. Vnde etiam neque Hippocrates, neque aliquis eorum qui accuratè corporis fabricam expendunt, futurarum nomine eas dignatus est, sed à squamæ similitudine dissectionū periti eas *λεπτοσφύνη* hoc est squamolas cōglutinationes appellarunt. Non enim propter falsa quorundam dogmata arbitrandum est, has cōglutinationes minus quàm tres futuras prius enarratas, in caluariæ amplitudine qua cerebrum reponitur apparere, ob idq; futurarum nomine

Capite futuris descripta.

Senum, iuuenum, & puerorum ossium uarietatem.

Non naturalium capitis figurarum summa.

Squamose temporum commissuræ.

Structuræ capitis etiam in interna caluarie sede conspici.

nequitiam donari.¹ Harum enim effigies in caluarie amplitudine perinde ac futurarum com-
spiciuntur, quæ non æquæ futuræ speciem in internâ caluarie superficie exprimunt; sed quia mi-
nus implicantur, idq; potissimum² coronalis, magis ad lineæ harmoniæ³ uel figuram accedunt.
Præsentis squamosæ coglutationis non toto ipsorum ductu instar mutuo incumbentium
squamarum committitur.⁴ Quæ enim primò à futura⁵ à imitante procedunt, notabili
intervallo foris & intus in caluarie amplitudine speciem futuræ adipiscuntur. Præterea ha-
rum coglutationum portio,⁶ quæ coronali futuræ proxima existit, etiam uerticis ossi, &
ossi quod cuneo assimilabimus, communis censenda est. Quod uerò hæc commissura, quem-
admodum dictæ capitis futuræ omni ex parte serrata comigat, aut in unguem connexu non
extruantur, hinc præcipuè fieri credimus, quòd raram & fistulosam cauernosamq; oportebat
fieri totam caluarie partem, quanta à uertice & ex lateribus crassæ cerebri membranæ cir-
cumponitur. reliquam autem solidam ac duram, idq; in primis temporum ossa, ob cavitatem
temporali musculo exculptam tenuia, & sonorum fortè etiam gratia (quum in illis auditus
organum consistat) omnium corporis ossium faciliè durissima. Hac itaque occasione ossium
fines in squamam attenuatur, uerticis quidem offe intus locato, ut propinquet ac occurrat lon-
giori spacio duræ membranæ; alio autem ab auribus ascendente, uelut aliquo propugnaculo
ipsi uerticis ossi facto. Ad hæc, uerticis ossa duris ac densis temporum ossibus non potuisse u-
niri, nobis persuademus, quoniâ non ita promptè laxum cum duro ad unionem peruenit ami-
am, ægreq; solubilem. Hactenus ergo quinque peculiare, & quicq; alteri ossi quam capitis of-
sibus communes futuras explicauimus: coronalem scilicet, & quæ à imaginem refert, & quæ
rectâ per capitis uerticem ducitur: duas item ab hac æquedistantes, quas squamosas coglu-
tinationes uocauimus. Est & alia soli quoq; cõmunis capiti in caluarie interna amplitudine,
qua cerebrum continetur, potissimum apparet, ac frontis ossi⁷ illiq; ossi communis quod
olfactus organum fedes constituit, ac instar cribri peruisum cernitur. Id enim os ueluti fron-
tis ossis basi inferum, hac futura ipsum ambiente in capitis amplitudine obscure describi-
tur, aliam quoque futuram obtinens, ipsi & superioris maxillæ ossibus communem. Præfens
enim os,⁸ osseum septum foramina narium interdiuidens producit, quod futura quadam se-
cundum humiliorem septi sedem, ipsiusq; longitudinem ducta à maximis superioris maxillæ
ossibus quæ dentes cõtinent, dirimitur: perinde ac ab offe cuneum referente⁹ inibi etiam sepa-
ratur, quâ narium foramina in fauces pertinent. Cuiusmodi autè hoc cribri modo perforatum
fit os, postquam alias futuras capiti alijsq; ossibus communes exprefserit, in ceterorum capitis
ossium enarratione persequar. Sunt enim & aliæ futuræ capiti cum alijs ossibus cõmunes, ni-
mirum cum superiori maxilla, & e offe quod à cunei similitudine *aplanofossæ* uocant, quod si-
militer unicū, ac, ut nonnulla corporis ossa, coniugis expers est: ab aliquibus inter capitis ossa,
ab alijs inter maxillæ superioris ossa (quum inter utraque medium fit) cõnumeratum. Quan-
vis capitis ossibus longè rectius, quàm superioris maxillæ ascribetur, quum haud minimam
caluarie amplitudinis, qua cerebrum reponitur, sedem cõstituit, cum cæteris ossibus quæ ab
omnibus Anatomicis capiti attribuuntur. Sed cuius nam id formæ, & quantæ magnitudinis
sit, quibusq; circumscribatur futuris, recensere nunc conabimur. Suuræ à imitantis¹⁰ extrema
quæ propter occipitij humiliora non amplius exactâ futuræ compagem exprimunt, uersus ca-
pitis inferiora basim¹¹ uel protenduntur, ac per mediâ basis sedem (quæ præruptæ rupi & imagi-
ne & duritiâ similis est) & quâ caput primæ ceruicis uertebrae articulatur, in anteriora prore-
punt, mutuo sensim appropinquant. Quum autem extrema hæc iuxta narium foramina oris
amplitudinè¹² præstantia pertingerint,¹³ transuersa lineâ simul iunguntur, quæ nec futura neque
harmonia merito dici potest: sed ad symphyllum coalescent uel prorsus esse referenda. In pueris
enim cartilagine in eum modum oppletur, quo in illis appendicum cum suis ossibus unio com-
mitti uisitur, in natu uerò grandioribus præfens lineâ omnino latet, perinde ac unio appendi-
cum in ætate prouectis occultatur. Vt cunq; sit, hæc lineâ & occipitis ossi, & ossi cuneum
imitanti cõmuni est. Ab hac utrinq; in latera, futura per temporum caua obliquis anfrac-
tibus sursum ducitur, uersus¹⁴ anteriorem squamosarum coglutationum sedem. Vbi uerò
futura hæc¹⁵ anteriorem illam coglutationum sedem attingit (quod notabili intervallo à co-
ronalis in cauis temporum extremo est) in priora modicè deorsum ad coronalis extrema du-
citur. Hinc rursus parumper deorsum repit, quousq; superioris maxillæ contingat os, quod
externum oculi sedis angulū constituitere docebitur. Hinc decliuis per caua quoq; temporum
incedit: inde ad posteriorem intimorum dentium sedem ducta, per totam narium amplitudi-
nem transuersim fertur. Hæc futura à transuersa lineâ, quam futura à referentis extrema com-
mittere diximus, in hunc modum sursum ad caua temporum utrinq; ducta, & deorsum ad

Cut squamo,
sa conglutina
tiones reliqua
rum futurarū
specie non cō
pingantur.

Quæ futura
hactenus com-
memorata.

Sutura oculi
um capitis os
circumscri-
bens.

Sutura capi-
tis ossib. et a-
lijs communes.

Sutura Aini
rangs addita
menta.

Cuneiformis
ossis circūscri
ptio.

6 fl. A, A.
7 fl. Г, Г.

c 3, 4 figura à Cad
G.
d 3, 4 fi. ab
Had A.
e 3, 4 fig.
O.

4. musculo-
rum tabu-
la, r.

g 6 fig. ad
characte.
res u, L, r,
h 8 figura
A, B, A.
i 13 fi. 7 lib.
L, dem D.
k 3 5 fi. de.
in O 1 fi. 9
capitis.
l 1 fi. 9 2a.
pitis g.
m 2 fi. 12 ca.
pitū secun-
dū = k, v, f.
n 3 4, 5, fi.
O, P, et tu-
ta frē 8 fi.

o s fi. C, C.
dem utrin-
que m, m.
Sed potissi-
mum si. indi-
ci character-
rum inserta
huc facit.
p s fi. n. n. &
fi n.
q in s fi. ab-
n per o ex
p in dextro
latere: in si-
nist. per a ei
a ad A. in 3;
4 fi. per a a
uersus H.
r 3, 4 fig. ab-
H ad A.
s 3, 4 fig.
ab A ad b.
t 3, 4, 5 fi. a
b per d
ad c.
u s fi. q. q.

pala

tum usque ab utroque latere, eo quo scriptum est modo, rursus descendens, cuneiforme os exterius circumscribit. ^a Interius uero in capitis amplitudine os quoque cuneiforme eadem futura terminatur, inibi quoque etiam huius ossis circumscriptio leuiori negotio, quam externa sede deprehenditur, si modo quis accurate dictae iam futurae progressum expendere: nam hac celsissimae pluribus locis sedibusque sese offert. Linea enim primum ossi occipitis & cuneiformi communis, pariter & exterius, & interius apparet: quemadmodum & futurae etiam interuallum, à linea oblique sursum ad caua temporum usque ad anteriorem conglutinationum squamæformium sedem pertinens, etiam ^a interius & ^c exterius cernitur, & commune est ossibus temporum & cuneiformi, ac demum uerae futurae speciem ostendit. Quod autem ab hac sede antrosum ad coronalis extrema ducitur, squamulam refert conglutinationem, uerticis ossi & cuneiformi communem. Interuallum uero à futurae coronalis extremis ad ossa externos oculorum sedium angulos constituentia procedens, etiam squamulae conglutinationis formam commōstrat, estque frontis ossi & cuneiformi commune. Praesentis futurae interuallum ductus uel conglutinationi squamulae respondens, exterius tanto elatius, quam in interiori caluariae superficie, apparet, quanto interuallo cuneiforme os instar squamulae attenuatum, frontis & uerticis ossibus committitur. Atque idem etiam in temporum ossium cum uerticis connexu accidit. Squamulae enim eorum ossium conglutinationes, multo elatius in exteriori capitis superficie, quam interiori, ubi cerebrum consistit, ascendere uidetur. Ceterum futurae cuneiforme os circumscribentis interuallum, quod per caua temporum deorsum fertur, in interna caluariae sede non conspicitur, sed tantum in cauis temporum & ^b oculorum sedibus, in externis scilicet earum sedium angulis. Atque hoc futurae interuallum commune est cuneiformi ossi, & ossibus externos oculorum sedium angulos occupantibus. ^b Interuallum autem eius quam modò prosequimur futurae, iuxta posteriorem intimi dentis sedem prorepens, exterius apparet, & in narium etiam amplitudine: estque commune cuneiformi ossi, & superioris maxillae utrorumque laterum maximis ossibus. Interuallum uero eius futurae in superiori narium amplitudinis sede conspicuum, in interna caluariae sede melius quam in ^c externa, spectanti occurrit: & commune est ipsi ossi cuneiformi, & illi ossi quod cribri modo perforatum dicitur. Porro interna caluariae sede, non solum praesentis futurae interuallum illi ossi & cuneiformi commune obuium est, uerum etiam utrinque ad id interuallum aliud eiusdem futurae interuallum sese offert, quod cuneiformi & frontis ossi commune censetur. atque id etiam ^m in oculi sedis radice liquidò cernitur, iuxta enim anteriorem illius regionem. Adeò, ut si ad amulsim oculorum sedes (quae λέγεται Graecis dicuntur) expendere, radicem ipsarum, & magnam externi earum lateris ad interiora portionem, à cuneiformi osse constitui spectabis, si modò in hominis fabrica huiusmodi etiam duxeris intuenda, atque illis caperis, quae & si ad artis usum non magnopere conducunt, immensi tamen Creatoris admirabilem arguunt industriam, & proculdubio à ueteribus Anatomes professoribus sedulo ac studiose examinata fuerunt. Porro hoc futurae interuallum, quod & cuneiformi & frontis ossi commune dicebam, magna pars alterius futurae est duarum, quas capiti cum alijs ossibus Galenus communes esse retulit: tunc scilicet, quum unius loco illam enumerat, quae cuneiforme os inibi circumscribit, quae id occipitis ossi, & temporum ac uerticis ossibus contiguum esse narrauimus: ^a alteram uero, postquam cuneiforme os circumscribentem futuram, sua oratione absoluit, à cauis temporum per mediam oculorum sedem ad nasi summum, seu superciliorum medium pertingere ait. quemadmodum etiam pertingit, illic incipiens ubi cuneiforme os circumscribens futura, per caua temporum deorsum uersus intimum dentem primum descendit. Atque hac futura primo ipsius interuallo, frontis os à superioris maxillae osse externum oculi sedis angulum constituente coniungit: dein magno interuallo cuneiformi ossi & frontis ossi communis efficitur, toto nimirum ductu, quo cuneiforme os frontis ossi in oculorum sedibus & caluariae interna superficie contiguum esse uisitur. Vnde etiam id interuallum in futurae cuneiforme os circumscribentis dimensione, non autem in frontis ossis à cæteris maxillae ossibus separatione, habendum uenit. Vt sane subsequens futura transuersim per oculorum sedem ductae interuallum, frontis os à secundo, tertio, quarto & quinto maxillae superioris in altero latere ossibus dirimens, frontis ossi & illis maxillae ossibus commune existit, tota nimirum sede, qua praesens futura internum sedis oculi angulum, & nasi summum seu superciliorum medium occupat. Verum de superioris maxillae ossibus futurisq; nono agemus Capite, illic necesse rursus futurae huius sermonem instituituri. nunc autem capitis ossa separatum sunt recensenda, quae enumeratis hactenus futuris, octo circumscribuntur, simul capitis amplitudinem qua cerebrum continetur efformantia. Sunt enim duo uerticis ossa, utrinque uidelicet unum: duo item infra, ad utranque nimirum aurem unum, quae temporum ossa huc

Quibus sedibus futura occurrit cuneiforme os circumscribens.

Galenus locum in libro de Ossibus explicat, quod futurae frontis os à maxillae ossibus, &c. dirimens.

usque uocauit, quintum frontis est os, ut saepius, unicum, sextum occipitis, similiter unum, septimum cuneiforme, unum quoque, octauum id os censetur, quod sedes constituit, quibus duo neruis non ab similes cerebri processus incumbunt, quos ferè olfactus organa nuncupamus.

*Verticis ossis
suum circum-
scriptio.*

^a Verticis ossibus in superiori parte ea futura peculiaris est, quae recto tramite secundum capitis longitudinem ducta, haec ossa inuicem dirimit. In anteriori autem sede uerticis ossa coronali futura, & posteriori ^Δ imitanti ab alijs discernuntur. Inferioribus uerò sedibus squamosis conglutinationibus circumscribuntur: quo fit, uerticis ossa quadrilatera uideri, undique sibi similia, praeterquam ubi instar squamæ attenuantur, temporumq; ossa subeunt. Hic enim tenuissima sunt, sed solida, & neuiquam fistulosa: quemadmodum reliqua ipsorum sede, quae temporalibus musculis non obteguntur, fistulosa cauernosaq; inter suas squamas cernuntur, eandem ferè crassitiem undique ea sede obtinentia. Dein quæ frontis ossi committuntur, tenuiora quam iuxta occipitis apparēt. Si uerò aliquibus donantur sinibus, aut foraminibus, illa duodecimo Capite ipsis dedicando percurram.

*Frontis ossis
circumscrip-
tio.*

Frontis os circumscribitur coronali futura, & ea quæ octauum Capitis os olfactus organorum sedes constituens terminat: & illa quæ à temporum cauo incipiens, ac per medium oculorum sedium ducta, ad superciliorum usque congressum fertur, ac frontis os à maxillæ superioris ossibus separat, inq; futurarum numero ultimum locum sibi uendicauit. Frontis itaque os quodammodo orbiculare est, nullibi tenuius quam ubi superiorem oculorum sedis regionem constituit, & octauo capitis ossi committitur. Hic enim ueluti duobus tenuibus efformatur squamis, in medio uacuis, & aëre oppletis, quemadmodum & ipsius ^c concauitas, quam inter suas squamas ad supercilia nasiq; summum haberi audies. Vbi etiam hoc os cauitatis ergo reliqua ipsius sede, crassissimū est, ac ueluti protuberat. Verum altera illarum squamarū, quæ oculi sedem respicit, exteriorq; est, laeuis uisitur, quæ autem internā capitis spectat amplitudinem, ⁱ inaequalibus quasi nubis forma tuberibus extruberat, quæ cerebri reuolutionibus mutuo correspondent. In temporibus, ubi temporales musculi consistunt, id tenue etiam est, ac solidum, minimeq; cauernosum, ^p praeterquam ubi cum uerticis osse inibi iungitur. Natura enim illic utrunque os uersus interiora priuatim crassius effecit, ne forte nimia ossium tenuitas caluariam ibidem plus æquo infirmam redderet. Cæterum frōtis os in fronte paulo supra supercilia, & reliquam dein ipsius sedem, quæ excarnis est, nullam cauitatē ostendit notabilem, & multo crassius ipsiusq; quam uerticis ossa sentitur. Quæ tamen illud his committitur, ^h & sagittalis futura in coronalem incidit, frontis os tenuius infirmiusq; est, quam in ipsa fronte. Hæc sedes qua dictæ iam futuræ inuicem committuntur, totius caluariæ pars mollissima rarissimaq; censetur. est enim illa, quæ in nuper natis infantibus adhuc membranæ, ac recenti caelo similis tangentibus occurrit: & quæ in puerulis nunquam manducant & respirant, moueri uisitur. Porro quoniam hæc sedes Arabibus Zeudech nuncupata, inter excarnes capitis partes tenuissima est, & futuræ nulfquam laxius hærent, medici huic cauteria uulgo dicta, uel candefcente auro, uel ferro, uel urente quopiam medicamine, pro affectus ratione (sed parum tūc interim) adhibēt. Locus autem iste in nobis, apice medij digiti promptè conijcitur, si brachialis principium superciliorum medio nasiue summo,

*Mollissima
rarissimaq;
caluariæ
pars.*

*Occipitis ossis
circumscrip-
tio.*

quis accommodauerit, ac medium digitum ad capitis uerticem rectā depresso. Occipitis os futura ^Δ simili, & eiusdem futuræ additamentis, & linea hæc iungente terminatur. Vnde etiam quinque quodammodo lateribus constat. duobus quidem à ^Δ imitantis futuræ cruribus efformatis: & alijs duobus, quæ ab eiusdem futuræ additamentis sepiuntur, ac demum quinto à linea quæ occipitis ossi & cuneiformi communis habetur, descripto. Hoc os in crassitie admodum inæquale est, neque omni ex parte sibi respondet. Quicquid enim ipsius in occipite excarne ac à musculorum exortibus insertionibusq; liberum est, insigniter crassum cernitur, tanto scilicet osse frontis crassius, quanto illud uerticis ossium crassitiem uincit. Neque etiam occipitis os tota excarni sede, parem adipiscitur crassitiem, uerum ad eius sedis radicem ^k in medio longè crassissimum apparēt, ^l illa nimirum regione, qua duos maximos

*Occipitis ossis
crassissimum.*

duræ cerebri membranæ sinus, sanguinem & spiritum uitalem uenarum arteriarumq; modo continentes, iungi, aliosq; duos sinus educere, in cerebri uasorum enarratione audies. Videtur enim Natura ossis crassitie huic sinuum concursui prospexisse, tum quod ex ipsius læsione extremum homini impenderet periculum, tum quod hanc occipitis sedem oculis destitutam, subinde percutiendam, ac crebro in terram uarijs casibus illidendam, haud ignoraret. Crassissima hæc occipitis ossis sedes, similiter atque tota excarnis ipsius ossis pars, intus cauernulis constant, utrinque ualida obductis squama: quemadmodum uerticis & frontis ossa, ubi excarnia sunt, constare retulimus. Verum reliqua occipitis ossis sedes, cui posteriore colli regionem sibi uendicantes musculi partim inferuntur, & à quo partim principium

3 fi. 1. fi. 4. K
In utraq; e
aut os cir-
cumscribitur
B. D. A. B.
C. D. C. G.
F. H. A.
Supra R. R.
3. 4. fi.

3. 4. fi. L. cū
circumscribitur
uero B. A.
A. B. G. G. In
6 fi. secundū
extra 22
L. 1.
d. Ad latus
2. L. fig. 6.
e. 6. 7. fi. K.

Tale quid
ostendit 13
et 13. figu.
7 lib.
2. 6. fi. cha
racter 7.

3. fi. B.

3. 4. 5. fi. B.
M. Circū-
scribitur au-
tē in 3. C. D.
dein in 5. m.
m. m. m. et
n. n.

k 6 fi. h.
l 7 fig. 7 li-
bri R.

Hæc ex 6 fi
gura petun-
tur. Sed ma-
nifestius ex
9 fig. 7 li-
bri.

In 6 fi. 2 k
ad forame
e notatum.

In 6 fi. ab e
ad n.

4. 5 fi. l. l.

d 5. 4. 5 fi.
alteri os N
notatur, et
in 3. 4. cir-
cūferibitur
ad C per G.
F ad H, de-
in in 5. 4. C p
m. mad n.
et illuc p
4. 4 ad H fi-
gure 4. 3.
E 3. 4. 5
fi. h.
f Inter T et
6 fi. aut 9
fi. li. 7 Z.

3. 4. 5 fi. l.

4. 5 fi. X.

iz fi. Z. et

5 fi. Y.

h 4. 5 fi. h.

! 4. 5 fi. r.

5 fi. f.

f. ca. 1. 4. li.

3 L.

pium ducunt, solida admodumq; densa, sed perquam tenuis, neque cauernulis donata, cerni-
tur. Est autem hac sedes, quam cerebellum implet. Ne uero ob insignem illam tenuitatem of-
fis robori male confuleretur, in huius sedis, qua os tenue est, medio, oblongum & instar
lineæ exporrectum eminet tuberculum, ossis robor inibi plurimum adaugens. Porro quia
id in internam caluariæ amplitudinem uergit, duos quasi sinus utrinque uidelicet unum effor-
mat, quos cerebellum infarcit. Hoc tuberculum, quemadmodum & tenuis ista occipitij ossis
pars, pertinet à radice excarnis partis occipitij ossis ad posteriorem usque regionem foraminis
dorsali medullæ parati. Ab anteriori enim parte foraminis dorsale transmittētis medullam,
& quā occipitis os maximè in angustū cogitur, id sensim ita crassescit, ut insigniter etiā crassum
uideatur, quā cuneiformi ossi cōmittitur. Hoc os in externa sede ad latera foraminis medullæ
dorsalis gratia exculpit, duo exigit capitula, quæ primæ ceruicis uertebræ articulantur, quo-
rumq; beneficio caput proprio motu flectitur & extenditur. Hæc capitula in puerulis, appen-
dicibus constant: in senioribus autem, ut & reliquæ appendices, hæc etiā latent. Præterea pue-
rulis id os tribus extruitur partibus, quæ lineis tribus cartilagine oppletis dirimuntur. Atque
harum una à sagittalis suturæ termino ad foraminis dorsali medullæ parati posteriorem perti-
ngit sedem. alia duæ à foraminis lateribus transuersim, in suturæ A referentis additamēta perti-
nent. Adeo, ut admodū pueris in occipite duo habeantur occipitis ossa, & unum in basi crassum
cuneiformi ossi cōmissum. Occipitis os intus læue minimeq; asperum est, perinde ac exterius
tota ipsius sede excarni, etiā læue cernitur. Sede autē huic subiecta, & ubi occipitis os non mi-
nimam capitis basis portionem constituit, id egregiè asperum inæqualeq; se offert, ut commo-
dius ab ipso ligamenta & musculi quidam pronascerentur, & rursus quidam alij tutius fir-
miusq; illi infererentur. Temporum ossa circumscribuntur squamosis conglutinationibus
& suturæ quæ A refert additamentis, itemq; futuræ cuneiforme os terminantis intervallo,
quod utrinque à transuersa linea, quæ occipitis ossi & cuneiformi communis est, sursum per
caua temporum ad squamosas conglutinationes oblique contendit. Hæc ossa non perperam
dicerentur circularia, nisi extra circuli descriptionem ea ossium pars promineret, quæ
referenti futuræ proxima est, capitūq; mammillarem educit processum, qui in utroque tempo-
rum osse unus habetur, non solum ad opportunam caput mouentium musculorum, qui à pe-
ctoris osse & clauiculis principium ducunt, insertionem protuberans, uerū ut auditus orga-
no apta hic constitueretur sedes, magna cavitare indigens. Ac proinde etiam temporum ossa
non hic modò mammillari processu extuberant, sed etiam in internam capitis amplitudinem,
ut ampla uacuaq; sedes in temporis osse constitueretur, qua auditus organum tum suo ner-
uo dilatando, tum etiam sinibus efficiendis, & peculiaribus ossiculis reponendis, oportu-
num locum adipisceretur. Cuiusmodi uero hæc sint ossicula, secundo ab hoc Capite ex-
quar, nunc temporis ossis historiam absolutorus; cuius iam unum recensui processum, qui à
uaccini uberis papillæ forma Græcis quidem *μαστοειδής*, nobis autem mammillaris nuncupa-
tur. maior enim est, quàm ut aptè teneris muliercularū papillis assimilari possit. Deinde tem-
poris os⁸ alio donatur processu, non procul à mammillaris processus interno latere initium du-
cente. Hic oblongus, tenuisq; & perquam solidus est, unde etiam ab acus imagine illum
Græci *βελονοειδής* uocant, à styli uero scriptorij specie *γγραφοειδής* & *στυλοειδής*, ac dein à galli calca-
ris imagine *κολωνοειδής*. Qui etsi solidus uideatur, quum tamen tenuis existat, & admodum
promineat, seuq; occasione abrumptur, in caluis è terra effossis raro occurrit. Ex hoc pro-
cessu ad os u referens, & ad linguam musculi porrigitur, quemadmodum & ad inferio-
rem maxillam, illi nimirum quorum beneficio ea deorsum trahitur. Deinde u referens os,
aut oblongorum teretiumq; ossiculorum, aut ualidi teretisq; ligamenti interuentu huius pro-
cessui cōmittitur. His⁸ alius adhuc in temporis osse accedit processus neutiquam infimus, qui
mediā ossis iugalis partē efformat: quod proximo Capite nihil aliud esse audies, quàm duorū
ossium processus obliqua futura inuicē nexos. Ad huius processus radicem ante auditorij
meatum⁸ sinus ossi insculpitur, cui inferioris maxillæ capitulū inarticulatur. & hic auditorij
meatus initium, quod impense crassum est, ueluti⁸ futura quapiam exigua obscuraq; à reliquo
temporis osse alicubi, & potissimū anteriori inferioriq; sede discernitur. Cætera ossis amplitu-
do uerticis spectans os, ampla & tenuis admodum, sed solida & cauernulis destituta cernitur,
exterius læuis, intus uero inæqualiter extuberans, secundū cerebri reuolutionū quæ intestinorū
gyris comparatur effigiem. Ad basim uero capitis asperum & insigniter inæquale est, &
potissimū ubi processus riti transuersam respicit lineam, occipitis ossi & cuneiformi com-
munem. Hæc enim parte inæqualiter extuberat, pumicisq; modo asperum occurrit, transuer-
so foramine peruium, quo soporalis arteriæ præcipuam sobolem in caluariam ferri audies.

Occipitis of-
fis capitula.

Temporum
ossium cir-
cumscriptio.

Mammillaris
processus.

Temporis of-
fis cauitas.

Processus
scriptorio
stylo similis.

Temporis of-
fis processus
iugalis ossis
portionē com-
stituens.

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER I. 33
DE OSSE IUGALI, ET OSSIBVS QVÆ
rupi præruptæ assimilantur. Caput VII.

Huic Capiti nulla præfigitur figura, quòd iugale os in præcedētis Capitis tertia et quinta figuris V & X notatum fuerit. quemadmodum & ipsius futura in tertia quidem Z, in quinta autem Y indicabatur. Ossa uerò quæ rupi præruptæ assimilantur, seu quæ lapidea uocamus, etiam quinta præcedentis Capitis figura ostenduntur, tota nimirum sedes, quæ C, C, M, M, M, m, m, m, k & huiusmodi in caluariæ basillicæ repositi characteres occurrūt.



INTER reliqua corporis ossa, quædam proprijs circumscriptionibus terminisq; destituta, non secus quàm si pecularia essent ossa, dissectionū professoribus describuntur, in ossiumq; numerū cum cæteris referuntur. Huius generis est os iugale Latinis, Græcis uerò *συνωμα* ob hoc nuncupatum, quòd utraq; ossa (sunt enim utrinq; singula) bouum equorum uel iugis ab Anatomes peritis assimilentur. Cōstat autē os iugale, aut potius caluariæ sedes hoc nomine dicta, ex duorū ossium processibus inuicem obliqua futura cōiunctis, ac posterior quidem eius pars temporis ossis processus est, anterior autem pars, illius ossis processus censetur, quod uniuersum oculi sedis externum angulū efformans, maxillæ superioris ossium primum numerabitur. Adeò sanè, ut os iugale proprijs destituatur terminis, aliudq; nihil sit, quàm duorū processuū mutuò futuræ beneficio cōmissorum regio. Cæterum os iugale medullæ expers est, solidū, durum, & lapidis modo ad patiendū pertinax.

Quibusdam ossium sedibus perinde ac si undiq; circumscripti herentur nominari imponi.

Os iugale.

Iugalis ossis usus.

Qui Naturæ temporali, uisus, sensus, prospice xeni.

Manforium musculum à iugali osse principis sumere.

Ossa præruptæ rupi similia.


Huiusmodi namq; efformari decuit, quòd temporali musculo operimentū ritu fuerat proponendum. Hoc enim os foris gibbum, intus cauum, illi musculo sagacissimè opponitur. Quamuis interim Natura hoc propugnaculo minimè cōtenta, temporalem in capitis ossibus magna ex parte occultauit, sinum ossibus inculpens musculo recipiēdo apprimē idoneum, & hunc undiq; uicinarum partium tuberibus promontorijsq; circumsepientem. Atque id meritissimò Naturæ molitur, quando quidem temporū musculi malè affecti, conuulsionones, febres, sopores, amentias inferunt, quia neruorum principio proximè accedunt, & solum os eos à cerebro ipsiusq; membranis dirimit. Adde quinos neruorum cerebri furculos (præter tres enim alijs notos Anatomicis, duos adinueni) singulis musculis implantari: ob idq; non iniuria diuū Hippocratem pronunciauisse, plagas præcipuas ac stuporem inducentes, esse temporales. Sed horum musculorum præstantiam in secundo libro cum reliquis ad unum omnibus abundè prosequemur, ubi etiam docebitur, iugale os in hoc præcipuè formatum, ut ab ipso masseter siue manforius musculus opportunè principium ducat. Cæterum ueteribus *συνωμα* ossa uocabantur, quæ petram & effractam rupem non duritiā modò, uerū etiam imagine referūt. Huiusmodi autem est inferior capitis pars, qua dorsalis medulla è caluariā delabitur, ac ubi māmillares & stylium referētes temporū ossiū processus exoriūtur. Eius enim regionis ossa omnium uniuersi corporis durissima & solidissima existunt, atq; re uera cōmodi musculorum exortus ac insertionis gratia, præruptæ asperæq; rupi quàm similima. Vnde etiam hanc partem meritò ita nominandā arbitror, nullumq; in corpore os propria finitū circumscriptione petrosū lapideū uel à ueteribus fuisse appellatū reor. Quanquam rursus non ignorem plurimos, dumtaxat temporum ossa hoc nomine indicauisse, nō quidem adhuc uniuersa, uerū illam ipsorum portionē, quæ dictos antè processus educit. Per me igitur, ita temporū ossa nominare licebit modò neminè lateat, dictā nobis caluariæ basis regionē Anatomicis creberrimè petrosū os nuncupari, & dein inter dū ossa quædā ab ipsis cōmemorari, ac si propria donaretur circumscriptione: quū tamen nihil aliud uerè celsenda ueniāt, quàm duorū ossiū mutuò cōiunctū (ut iam diximus) fines, & aliquando unius alicuius ossis una sedes, uti euenisse audies in ossibus quæ sacri ossis lateribus coarctantur, ac triplici nomine pro sedium ratione donantur.

fig. ante. ca. li. 4. post. te. Q. R. b, c. d.

f. Hec in s. li. 6. cap. 4. si sunt obuia.

Tres fig. re. cap. 29.

DE OSSICVLIS AUDITVS ORGA
ni constructionem ingredientibus. Caput VIII.



HUIVS FIGVRÆ INDI
cem sequens pagina proponet.

OCTA

PRÆCEDENS figura auditus organi ofsicula exprimit. præcipua enim il-
lius figuræ effigies, portionem ex dextri temporis osse exactam abruptamque commonstrat, quæ
dein per mediū dissecta, duas quæ in eius ossis cavitatem reponuntur, membranas, unā cum ofsiculis
ob oculos ponit: uti characterum index hunc in modum explicabit.

- A** Foraminis portio, quod ab aure introrsum ad membranam **B** notandam pertinet.
B Membrana transversim foramini obducta, quod ab aure in cavitatem fertur, in temporis osse au-
ditus organi nomine exculptam.
C Vnum auditus organi ofsiculum, malleolo assimilatum.
D Quinti nervorum cerebri paris nervus.
E Quinti paris nervorum cerebri ramus, per cæcum foramen ad musculum temporalem potissi-
mum digestus.
F Quinti paris nervorum cerebri ramus, per foramen procedens, quo uena auditus organum pe-
tens excipitur.
G Series quinti paris nervi ad planam lævemque concavitatis eius sedem, hic auditus organi occa-
sione cælatam.
H Sedes orbicularem circulum referens, cuius anteriori sedi alterum auditus organi ofsiculum
I. committitur, quod incudi & molari denti comparatur, & **I** hic insignitur.
K, K Cavernulae indicantur, quibus cavitates auditus organo paratae, intus scæte.
L Mallei ab omnibus conterminis partibus liberi anterior facies.
M Mallei ab omnibus partibus similiter liberi posterior facies.
N Incudis, seu molaris dentis ab omnibus partibus liberi anterior facies.
O Incudis seu molaris dentis ab omnibus partibus liberi posterior facies.
P Incudis ac mallei ita ut in aure committuntur, simul nexorum anterior facies.
Q Incudis ac mallei unā iunctorum, posterior facies.



M O D O quidem haud institimus organi auditus constructionem omni-
paratam industria commemorare, quum hæc unā cum reliquorum sen-
suum instrumentis septimo libro enarranda relinquatur. nihilo minus ta-
men duo ofsicula, quæ in ossis temporis cavitatem auditus organi nomine
exculpta reponuntur, hic opportunè describuntur, ne fortè quicquam ofscū
in humani corporis fabrica hoc libro ofscitanter præterisse uideamur.

Cavitas audi-
tus organo pa-
rata, & for-
amina in ipsam
pertinentia.

cognovisse, satis hinc colligatur, quod nusquam horum mentio inciderit. Quando igitur au-
ditus organi constructionē recensebo, amplam anfractuosamque cavitatem temporis ossi incul-
ptam audies, quæ tortuoso foramine in capitis amplitudinē cerebri sedē pertinet: & alio longē
ampliori minusque tortuoso, in externā capitis sedē versus aurem exporrigitur. Dein de ab hac
cavitatem alia duo deducuntur foramina, quorum alterum cæcum nuncupabitur, alterum uerò
hoc quoque nomine appellari possit: verum non similiter ipsi cæco anfractuosum angustumque
est, & uenæ ad auditus organi enutritionem accedenti uiam præbet. Atque hæc quidem fo-
ramina suis characteribus notisque duodecimo Capite indicabuntur, nunc autem tantum ipso-
rum meminimus, quantum ad ofsiculorum historiā duximus sufficere. In foramen itaque capitis
amplitudinem qua cerebrum continetur spectans, quinti paris cerebri nervorum alter^c nervus
sui portione cavitatem temporis ossi incisam membranæ modo oblinat: non quidem uniuer-
sam, at quibusdam tantum sedibus, quasi ea nervi portio in plures diuideretur membranas, ali-
quot eius cavitatis regionibus obductas. Verum inter reliquas cavitatis sedes, quæ variæ sunt,
& alicubi planæ, alicubi rarioris spongiæ pumicisque modo foratæ,^f una est orbicularis & pla-
na, & osseo circulo parumper extuberante septa. Ad huius circuli quinti paris nervo obducti
exteriorem atque auri proximā sedem,^g ofsiculum obseruatur, quod duobus tenuibus acutisque
processibus tanquam cruribus huic osseo circulo astabillitur, superius, ubi crura ipsius coeunt,
spissius crassiusque incudis instar effectum. Hoc alterū auditus organi ofsiculum est, quod sanè
leuiori negotio inter secundum cōmonstrare soleo, quàm in præsentia, ut ab aliquo qui id nun-
quam

Quinti paris
nervorum ad
auditus organum
series.

Ofsiculum in-
cudi comparat-
um.

a n fig. ca.
14 libri 3.
b a, b, c,
figur. 12 ca.

c D.
d E, F.
e G. Aut 1.
2 fi. ca. 2 li.
3 a, b, c, o.

H.
I, N, O.

quam uiderit, intelligat, describere possem. Nihil enim aliud quo dilucidius cognoscatur, sermoni adhuc adjicere possum, siquidē illius & forma & situs uix manifestius explicari queant. Quippe, uti dicebam, ad circuli in temporis ossis cauitate, effracto iam osse, cōspicui externū latius, hoc ossiculū reponitur, & bina quibus firmatur crura exigit, quorum exterius ac aurī uici-
nūs, est breuius & crassius, latiusq̃, ac in acutū definit apicem. Alterū crus quod interiūs cō-
sistit, & membranæ orbicularem illam cauitatis sedem succingenti magis, quā exterius crus, innascitur, longius nōnihil & tenuius uisitur, ipsiusq̃ extremum quasi in unculum cessat, quo
membranæ cauitati tēporis ossis obnatæ implicatur, firmiusq̃ innectitur. Ossiculi huius pars
extra membranā prominens, superius partim plana, partim rotunda cernitur: quemadmodū
minores incudes effingi solent, quorū amplior pars plana est; altera, quæ ueluti in mucronem
desinit, instar coni rotunda. Grandiores enim incudes penitus plani depressi ue & quadranguli
sunt. Cæterū si hoc ossiculū, quia tantū binis donatur cruribus, incudi assimilare minus pla-
uerit, nihil profectō obstititⁱ molari denti duabus tantum radicibus ornato, id conferre.

*Ossiculi mal-
leoli non admo-
dum dissimile.*

*b. ff. ca. 11
Kale pro
ponit den-
tem.
i C. L. M.
h B.*

Alterum ossiculum auditus organi fabricā ingrediens, à iam cōmemorato plurimū uariat,
& alteri membranæ innascitur. Foramen enim concauitatis seu antri in temporis osse incisi,
quod aurem spectat, ea parte qua cauitatis amplitudini uicinū est^k, membranula tenuissima &
membranæ secundū ipsius latitudinem innascitur. Hunc processum liceret^l femoris ossis parti
comparare, quæ ab ipsius processibus, quos rotatores uocamus, ad inferiora usq̃ femoris ca-
pita pertinet. imò si hæc inferiora capita à reliquo femore resecta finxeris, uniuersum ossiculū
tunc femori opportunē assimilabitur. Quemadmodū enim femur iuxta ipsius ceruicem duos
ascendit processus, sic etiā ossiculū hoc eadē sede processulos aliquot sibi uendicat, quorū bene-
ficio membranæ suæ firmius innascitur. Dein, ut femoris ossis ceruix oblique uersus corporis
interiora ad coxendicis ossis sinum uergit, atq̃ in caput ad amussim rotundum cessat: ita etiam
præfens ossiculum, à membrana in trorsum abscedit, in rotundū caput definēs, quod læue mi-
nimeq̃ asperum est, & superiori parti alterius ossiculi, quod molari denti, aut incudi assimila-
uimus, ita tenuissimarum membranarum interuentu^m committitur, ac si malleus incudi laxē alli-
garetur, non secus, quā si ossiculum postremò enarratū malleoli præstaret munus: alterum
uero incudis uicem gereret, sed pro mallei mole nimis quā parui. Num autem ossicula incu-
dis & malleoli ossis ita fungantur, quemadmodum sanē formam referūt, & leuissimo afflatu
secundum ossiculum cum membrana cui innascitur inter diffecandū mouetur, primo ossiculo
interim quodammodo quiescente, à me haudquaquam assertum uelim, quando quidē auditus
rationem non satis ex sententia percipiā. Non quòd mihi animo exciderit, commune illud me-
dicorum ad partium temperiem asylum & aëris gyri, quos ex huius percussu in aurem ferri, &
quandam membranam ferire, uulgò nobis ē lapillorum in aquam iactu persuademus, interim
organi huius cōstructionis prorsus ignari. Longē enim diuiniore rerum Opifex callidissimo
artificio hīc machinatur, quorum fabricam satis dilucidē in scholis quidē cōmonstro, usum
autem & operandi rationem non magis quā oculi ipsius assequor. Verū quia de auditus
organo postea prolixius pertractabitur, hīc sat fuit ossicula recensuisse: quæ si hoc sermone
non assecutus fuero, uituli, aut agni, aut alterius animalis capite in mensam posito, temporum
os nunc hoc nunc illo modo diuides, horum ossium cōstructionem animaduersurus. Quan-
quam multò satius est hæc in crudo capite, quā in cocto examinare, & in homine potius,
quā in alio quouis animali. Non enim illa administratione, tam spectatu iucundissimam ossicu-
lorum cōstructionem adinuenies, quā omnium ferē musicorum instrumentorum fabricæ
rationem ex auditus organi compage desumptam perinde admiraberis: ac uel hoc in primis
nomine auditus organi harmoniam summa uoluptate intueri solitus est, non modò musicorū
absolutissimus, uerum & nostræ ætatis philosophorum eximium decus

*Secundi ossi-
culi ad femoris
os comparato.*

*Figure ca.
30.*

*Auditus or-
gani ossicula-
rum usus.*

MARCUS ANTONIVS GENVA, primarius, uariæ disciplinarū eruditione excultissimus apud
Patauinos philosophiæ professor, cui rerum naturalium studiosi tantum debebunt, quantum
frugis ex hoc meo conatu ipsi accedet, quippe qui ad hunc inchoandum primus autor, ac
sedulus monitor haud minus extitit, quā rarum uirtutis exemplar VVOLPHANGVS
HERVVORT, patricius Augustanus, ob incredibilem erga literas earumq̃ cultores amo-
rem, immortalitate dignissimus, ac mihi dum uiuam unice colendus, quòd ad huius operis
absolutionem, quantum in ipso fuit, nihil fecerit reliqui.

*Marcus An-
ton. Genua cy
Vvolphangus
Heruort, hu-
ius operis et in-
choandi cy abo-
soluendi auto-
res præcipui.*

DE DVODECIM SVPERIORIS MAXIL
lae ossibus, in quorum classē nasi ossa etiam referuntur. Caput IX.

PRIMA NONI CAPITIS FIGVRA.



PRIMAE NONI CAPITIS FIGVRAE, EIVSDEMQUE
characterum Index.

- H A E C* figura anteriorem calvariae sedem exprimit, maxilla superioris ossa, quam datum est accuratissime, ostensura. Humanæ autem calvariae caninam subiecimus, ut Galeni superioris maxillæ ossium descriptio, leuiori negotio à quouis intelligatur. Præterea, ut oculorum sedes, ac in ijs apparentes suturæ ossaq; quoad fieri licet, spectarentur, hominis calvariam occipitio inniti, & anteriori sede super caninam erigi oportuit. Præsentis autem figuræ characterum indicem ita digeram, ut maxillæ Græcorum, maxilla superioris ossibus (quæ sex utrinq; erunt) primum adhibeantur: reliquis autem ossibus & futuris, ut fors fert, omnes accommodentur. Cæterum priores aliquot characteres ostendendis foraminib. capitis iuuabunt, quare etiam illi ad Caput his dicandū opportunè referuabuntur. Sunt autē illi *A, B*, usque ad *I*.
- I I* Frontis os. I etiam ponitur in oculorum sedibus, eam frontis ossis partem notans, quæ superiorem oculorum sedum regionem constituit.
- K* Verticis os sinistrum. *L* Sinistri temporis os.
- M* Mammillaris processus sinister, iuxta quem processus stylum referens etiam occurrit.
- N* Cuneiforme os, in sinistri temporis cauo & in dextri oculi sede *N* insignitur. In sinistri autem oculi sede *G* & *H* reponuntur, idem os indicantia: quanquam illi characteres huius sedis foraminibus ostendendis peculiariter subseruiant. Ad hæc, *N* quoq; reponitur ad intimum sinistri lateris dentem, notans cuneiformis ossis particulam, & dein suturam id os à superiori maxilla hac in sede diuidentem.
- Γ Γ* Hoc os, nobis primum maxillæ superioris numerabitur, ac *Γ* in oculi sede positū, huius ossis partem notat, in oculi sede conspicuā. Circumscribitur uero id os præsentis figuræ *a, b, Q, R* & *P*, quos characteres suis locis sensim explicabo.
- Δ* In sinistri oculi sede *Δ* tantū apparet, superioris maxillæ secundū os indicans, quod terminatur sutura *Δ* & *C* literas proxime ac uelut orbiculatim ambiente, & quodāmodo etiā *X, V, c*.
- Θ* In sinistri quoque oculi sede *Θ* tantum occurrit, tertium maxillæ superioris os indicans, quod *V, T, c* & interceptur.

- AA** Quartum maxilla superioris os. **A** in oculi sede positum huius ossis partem notat, quæ inferiorem oculi sedis regionem magna ex parte cõstituit. Dein eodem etiam **A** indicatur principium foraminis, quod in genis **B** insignitur. Verum id os circumscribitur **b, g, e, Y, X, c, d, b, D, a, N**, in prima hac figura positum, et in super **e, u, t, y** in sequenti figura ponendis.
- II** Quintum maxilla superioris os. **V** num **Ξ** dextris lateris os, alterum **Ξ** sinistri lateris os in sinuat, quod et in alijs characteribus obseruatum uidetur.
- II** In altera secunda huius capitis figura **II** se offert, sextum superioris maxille os indicaturum, quo etiam characterẽ sexti ossis coniux notabitur, ipsum uidelicet alterius lateris sextum os.
- O** Narium septum, quod octauum capitis ossis cribri modo perforati processum putatur. Atque his iam explicatis characteribus, ossa præsentis figura occurrentia insigniimus.
- P** Sutura duos ossium processus committens, quibus iugale os efformatur.
- Q** **Q** ad **S** suturam notatur, cuneiforme os à primo maxilla superioris osse dirimens, ac hic in oculi sede conspicua, in dextrisq; oculi sede ad characterem **Q** clarius ferè, quam in sinistri, apparet. In tertia uero figura, et quarta, quæ sexto Capiti præponuntur, hæc sutura in canis temporum d insignitur.
- R, S, T, V, X, Y, Z** Sutura frontis os à maxilla superiori et cuneiformi diuidens. **Ab** **R** enim ad **S** suturæ pars notatur, frontis ossi et primo maxilla ossi communis, quæ in canis temporum in tertia figura sexti Capitis conspicitur, inibi à **b** ad proximum ipsi **b** pertinens. Hic uero à **S** ad **T** suturæ huius interuallum notatur, frontis ossi et cuneiformi commune.
- A** **T** ad **V** interuallum metitur, tertio maxilla ossi et frontis ossi cõmune. **Ab** **V** ad **X** interuallum præsentis suturæ insignitur, cõmune frontis ossi et secundo maxilla ossi. Inter **X** et **Y** huius suturæ interuallum consistit, quarto maxilla ossi ac frontis ossi commune. **Ab** **Y** uero ad **Z** suturæ illius significatur interuallum, cõmune frontis ossi, et quinto maxilla ossi.
- a** Maxilla sedes aspera inæqualisq; quæ primum maxilla os quarto committitur. Verum **ab** **a** ad **b** sutura indicatur, duobus illis ossibus communis, ubi hæc in anteriori caluarie sede est conspicua. Pars autem ipsius quæ in temporis cauo latitat, ex quarta figura sexto Capiti præposita, sub characterẽ **f** in temporis cauo posito peropportune petes.
- b** **A** à **b** ad **Q** suturæ primū os à quarto diuidens pars indicatur, quæ in oculi sede est cõspicua. Hæc in præsentis figura sinistra oculi sede characterib; pauciorib; occupata, est manifestior.
- c** **Ab** **V** ad **c** suturam notatur, secundo ossi et tertio communis. Quicquid autem sursum iuxta **C** et **d** ad **X** usq; ducitur, secundū os à quarto dirimit.
- d** **d** seruit describendo tertio maxilla ossi. **T** enim ad **V** superiorẽ eius ossis sedem describit, **V** ad **c** anteriorem, **T** ad **d** posteriorem, quæ cuneiformi committitur ossi. **c** uero ad **d** eius ossis inferiorem partem circumscribit, quarto maxilla ossi contiguam.
- e** **e** ad **Y** suturam notat, quarto maxilla ossi et quinto communem.
- f** **f** ad **Z** suturam insinuat, quinto unius lateris ossi et quinto alterius lateris ossi communem.
- g** In narium amplitudine **g** ponitur, suturam indicans, quæ septum narium à quartis maxilla superioris ossibus disiungitur.
- h** Sutura, aut harmonia potius, quartis maxilla superioris ossibus communis, cuius beneficio illa inuicem in mustacis regione dirimuntur.
- i** Ad superiorem foraminis **B** notati sedem, **i** ponitur, indicaturum quarti ossis suturam, quæ elatius quàm id foramen consistit, ipsiq; quarto ossi duntaxat peculiaris est.
- Hominis caluarie, cuius modò indicem prosequor, figura, nullo præterea insignitur characterẽ, neq; aliud in illa enarrandum superest. Subsequentes itaq; notæ canis caluarie hunc in modum propriæ censentur.
- l** Sutura à malis sursum ad medium ambitus oculi, in inferiori regione sedis oculorum ascendens, usq; ad **l**.
- l. m** **l** usq; ad **m** suturam notat, ad supercilia usque iuxta internū oculi sedis angulum cõscendentem.
- n** Sutura ab illa quæ externum nasi ossium latius circumscribit, inter caninum dentem et incisoriū ipsi proximè delata. Licuisset hanc caluariā pluribus characterib; occupare, nisi existimassẽm hominis maxillam Lectori in præsentia satis negotij exhibituram.

SECUNDA NONI CAPITIS FIGVRA.



SECUNDAE FIGVRAE EIVSDEMQUE CHARA-

cterum Index.

P R A E S E N S figura, calvariae basim in hoc exprimit, ut palatum maxillaeque superioris ossa in priori figura commonstraret. Huic autem permulti adsunt characteres, qui capitis ossibus suturisque enarrandis superius adiuvierunt. ac proinde quid illis indicetur, ex secundo Capite petas licet. Quamvis interim hic eos annotare operae pretium sit, quibus ad propositam enarrationem indigemus.

L Hic modica ossis frontis portio in conspectum uenit.

O O P P Cuneiforme os.

Q I Hoc os prior quoque figura **I** notatum habet, estque primum maxillae superioris os.

S A Hoc os prior figura etiam **A** indicat, estque quartum maxillae os.

V X Calvariae sedes, quam os iugale Anatomes peritis uocari, iam antea dictum est.

Y Sutura, quae duos processus os iugale efformantes committit.

d Hic latet sutura, primum maxillae superioris os a cuneiformi discernens: deinde et sutura primum a quarto dirimentis pars, in temporis cauo conspicua.

e Sutura quarto maxillae ossi et cuneiformi communis.

f Sutura primum maxillae os a quarto separantis pars, in anteriori maxillae regione apparet, ac prior figura ab a ad b indicata.

g Sutura frontis ossi et primo maxillae ossi communis, quam superiori figura **R** insigniuimus.

h Sextum maxillae superioris os.

q Ab e uersus q sutura sexto maxillae ossi et cuneiformi communis indicatur.

r Septum narium, et sedes qua id a cuneiformi osse dirimitur.

t. u A t ad u transversa notatur sutura, sextum os maxillae a quarto dirimens.

x Ab x ad t sutura indicatur, duo sexta maxillae superioris ossa ab inuicem sciungens, et duobus illis ossibus communis.

y Sutura notatur recta per palatum ducta, et quartis maxillae ossibus communis.

z Priuatim indicatur foramen in anteriori palati sede posteriorisque dentium incisiorum regione apparet, ad cuius latus interdum obscura occurrit sutura, transuersum aliquosque in

a. quarto superioris maxillae osse praeapens, et a insignita.

SVPE.



UPERIOR maxilla non unico quidem, sed pluribus efformatur ossibus, atque id potissimum, ut ad patiendū fiat pertinacior, ne scilicet statim una eius particula laborante, uniuersa infestetur, sed quò malum unà cum osse (ut in capitis ossium structura dictum est) desinat. Deinde quum nō omnes eius partes æquē solidas, spissas ac duras fieri oportuerit, illā quoque ex pluribus constitui ossibus fuit necesse. Atque hæc præcipuē duris, sed admodum leuibus componitur ossibus. nam narium foramina adeò am-

Cur maxilla pluribus constituitur ossibus, et ipsa cauis ac leuibus.

pla patentiaque sunt, ut tantæ molis maxillæ insignis accedat leuitas. Dein alij in ossibus sinus, ac intus latitantes cauernæ, quas aer opplet, adeò amplæ caueque existūt, ut maxilla superior utrinque ad latera narium cauitatis, simile quid nascatur cum cereis imaginibus, quas in varias formas fundimus, ac intus cauas relinquimus. Non enim Galeno hac parte assentiendum est,

Lib. ii. de V. su partium.

qui superiorem maxillam medullæ expertem, durisque ossibus, nec leuitate indigentibus efformatam docet: quòd hæc nihil, ut inferior, moueatur. Quum interim inferior multo sanè sit ualidior, & osse constet iniurijs ferendis longè pertinacior, multoque minus à Gallica scabie erodi apto. Compinguntur uerò maxillæ superioris ossa inuicem futuris, ita tamen ut ea quæ per harmoniam committuntur, futuras quoque modò appellare liceat. Nam uel Galeni suffragio eas omnes futuras nominare nemini uerendum est, quum exactissimæ (si modo quæ sint) harmoniæ intus quendam mutuū ingressum futurarum quasi ritu ostendāt. Cæterum quæ nam futurarum superioris maxillæ sit series, quisque illius ossium numerus, longè facilius demonstratu quàm scriptu arbitror. Quò minus tamen hîc rei difficultati cedam, primum hominis superiore maxillâ aggrediar, ac deinceps obiter in quibus Galeni descriptio canibus aut simijs, non autè hominibus cōueniat, subiungā. Vocabitur itaque superior maxilla, quicquid ossium in caluaria præter superiorem dentium seriem nobis adhuc enarrandum superest. Capitis igitur ossa octo, suis futuris circumscripta, iam antea enumerauimus: præter quatuor ossicula, aut ditius instrumentorum constructionem ingredientia. Maxillæ autem superioris ossa (præter tenuia quædam fungosa & ueluti membranæa ossicula, quæ in narium amplitudinis summo, in exiccatis, aut nuper coctis caluarijs impenfè cartilaginea obseruantur) duodecim sunt, ab utroque scilicet latere fena. Atque horum^a sex, unum sedis oculi externum angulum constituere dicemus, secundum uerò & tertium ad oculi sedis internum angulum referentur, quartum omnes sui lateris dentes superioris maxillæ suscipere docebimus, quintū ex duobus (quæ ita uocamus) nasi ossibus alterum erit, sextum cum suo coniuge ad palati finem collocabitur, quā narium foramina in oris amplitudinē spectāt. Accepta igitur in manus caluaria, illam cum figuris huic Capiti præpositis confer, sexque horum ossium suis characteribus insignitorum circumscriptionem tuo Marte aliquantisper inquirito: & quemadmodum in scholis facere consueui, rudioris penna omnes quæ tibi occurrent futuras, in altero caluariæ latere atramento oblitera, ut inde futuras quibus ossa distinguuntur, ex sententia promptius adinuenias. Ac primum omnium oculi sedi animū accōmoda, cōsideraturus quorū nam illa efformetur ossibus: quorū nonnulla maxillæ superiori, alia capiti ascribuntur.^b Superior nanque huius sedis pars, frontis osse constat.^c Vertex autem huius sedis, quæ instar conij pyramidisque in arcum cogitur, osse componitur cuneiformi, magnam quoque exterioris lateris oculi sedis portionem (sed profundam) efformante, adeò ut cuneiforme os, secundum os: frontis autem, primum, in oculi sede numerari nihil prohibeat.^d tertium autem, ossium maxillæ primum numeratur, quod totum externū oculi sedis angulum, & inferioris ambitus mediam portionem constituit, reliquam autem inferioris ambitus oculi sedis partem ad superciliorū usque medium, maximum seu quartum maxillæ os occupat, atque hoc etiam ipsius sedis inferiorem partem quodammo do totam efficit, inter ossa oculi sedem efformantia numero quartum.^e Quintum uerò oculi sedis os, in interno consistit angulo uersus anteriora, & iuxta sedis ambitum, estque id ossium maxillæ secundum.^f Sextum autem ossium sedem oculi constituentium, in interno etiam sedis reponitur latere, & posterius nuper dicto locatum, nobis maxillæ ossium tertium censetur. Duo itaque oculi sedis ossa, ad capitis ossa referuntur, duo nimirum priora. & quatuor ad superiorem spectant maxillam, quatuor uidelicet postremò enumerata. Postquam hæc in oculi sede non oscitante animaduuerteris, & futuras inspexeris quibus sex oculi sedis ossa terminantur, licebit exactius unumquodque maxillæ os priuatim suis futuris ad hunc modum circumscribere.^g Primum maxillæ superioris os, alteram ossis iugalis partem constituit, & nonnihil temporis supercilijque ac sedis oculi, totum uidelicet exteriorem angulum, in se comprehendit, non minimam malæ etiam portionem efformans. Committitur autem hoc primum maxillæ os, temporis ossi, interuentu^h futuræ, quæ duos processus os iugale efformantes iungit. Dein com-

Constructuræ ossium maxillæ ratio.

Libro de Ossibus.

Breuis maxillæ ossium enumeratio.

Quorū ossibus oculi sedes efformetur.

Primum maxillæ os.

Primum r.
r. 1. 2. figur.
sec. a. 1. figur.
ter. o. 1. figur.
quart. a. 1. figur.
5. 2. figur.
6. 1. figur.
7. 1. figur.
8. 1. figur.

b. 1. figur. 1. in
sinist. oculi
sede.
c. 1. figur. G. H.

d. 1. figur. r.

e. 1. figur. A.

f. 1. figur. A.

g. 1. figur. o.

h. 1. 2. figur. r.

i. 1. figur. P. 2. figur.
gura Y.

mittitur ossi cuneiformi^c eius futura beneficio, quæ per cava temporū declivis ducta^d etiam in oculi sede conspicitur, huiusq; primo maxillæ ossi & cuneiformi cōmunis est. In superiori parte^e nectitur frōtis ossi, ea sede qua supercilij extremū habetur. Fit uerò hæc cōmissura illius futu-
ræ beneficio, quæ à cauis temporū per oculorū sedes ad superciliorū medium fertur, frontisq; os à maxilla superiori & cuneiformi discernit. Inferiori autē parte insigni amplitudine primum os quarto ea futura cōpingitur, quæ tribus locis in cōspicuo est:^g in cauo scilicet temporū sub osse iugali^h, in anteriori maxillæ regione iuxta malam,ⁱ & in oculi sedis inferiori parte. Futuræ pars in cauis temporum conspicua, ab inferiori parte interualli futuræ os cuneiforme à primo maxillæ osse diuidētis incipit. à fine enim illo hæc futura oblique deorsum nonnihil in priora fertur, quousq; ad^k infimam malæ sedem, ubi hæc aspera inæqualisq; est, pertingat. Pars autem huius futuræ in anteriori maxillæ sede apparens, à mala oblique sursum ad oculi sedem contēdit, ad mediā regionē inferioris ambitus oculi hīc sedem circumscribētis. Pars autem seu interuallum huius futuræ, primum os quarto cōmittentis in oculi sede cōspicuum, à medio inferioris ambitus sedis oculi per humiliora eius sedis retrorsum oblique uersus exteriora tantisper conscendit, dum ad infimam futuræ partem, cuneiforme os à primo maxillæ dirimētis pertingat. Ad hunc igitur modum primum os circūscribitur, quatuor (uti diximus) ossibus cōmissum: temporis scilicet ossis processui alteram ossis iugalis partem efformanti, dein cuneiformi ossi, frontis ossi, & quarto maxillæ ossi. ^a Secundum maxillæ os cæteris omnibus longē minus, & squamæ modo tenue, in interno oculi sedis angulo consistit, ubi^b foramen habetur, cui^c caruncula præest internum oculi angulum occupans: quæ in hoc creata dicitur, ne quid pīuitæ ad oculorum sedes à cerebro expurgatum, in genas defluat, sed tota per id foramen in narium amplitudinem procumbat. Ossiculum hoc superiori parte^d modico interuallo futuræ terminatur, frontis os à superiori maxilla distinguētis. Quare etiam futuræ illius interuentu ossiculum id frontis ossi committitur. Ab hac futura, alia secundum posteriori ossiculi latas descendit, quæ secundum ipsius ossiculi inferiora repens, per anteriori ipsius latus sursum in eandem futurā denuò ascēdit, quam frōtis os à maxilla superiori dirimere diximus. Cæterum futura, quæ à iam dicta frontis os à maxilla discernente ad eum modum in orbem penē fertur, in posteriore ossiculi regione (quæ oculi sedis conum respicit) secūdo ossiculo cōmunis est, & illi quod tertium maxillæ nobis enumeratur. Ad inferiorem uerò ossiculi partem, & secundum anteriori ipsius latus, futura hæc communis est ipsi ossiculo, & quarto maxillæ superioris ossi. Contingit itaque præfens ossiculum superiori parte frontis os, posteriori tertium maxillæ os, inferiori uerò anterioriq; quartum maxillæ os. Ossiculum istud quia laxè hæret, & anteriori parte quarto ossi harmonia uerius quàm futura iungitur, ipsumq; admodum tenue est, in caluarijs è terra effosis raro occurrit: quòd in humida hac sede positum, facile putrescat: & ob laxum nimis cōnexum, promptè decidat. In coctis uerò caluarijs, & arte ad ossium disciplinam paratis, absque negotio seruat. ^a Tertium maxillæ superioris os similiter ac secundum tenuē, & squamæ modo cernitur pellucidum: & quando effringitur, intus sinibus aëre oppletis ampliusq; scatere cernitur. Hoc paulo minus toto quadrangulo est, in interno latere sedis oculi repositum. ^b Superiùs terminatur futura frontis ossi, & superiori maxillæ cōmuni. ^c Anteriori os communem futuram cum secundo maxillæ osse adipiscitur. ^d Posteriori cum cuneiformi osse futuram communem exigit. ^e Inferiori parte, cum quarto maxillæ osse, cōmuni futura donatur. Vnde etiam quatuor ossibus tertium hoc os cōnectitur, superiùs scilicet frontis ossi, anteriori secundo maxillæ ossi, posteriori cuneiformi, inferiori quarto maxillæ ossi. Interiùs uerò quā narium spectat amplitudinem, cum inordinata ossium compage intus in narium summo reposita, coit. ^a Quartum maxillæ os reliquorum ipsius ossium longē maximum, omnes sui lateris dentes excipit, ac uarijs futuris circumscribitur: quemadmodum & ipsum quoque os uarium est, huc atque illuc in plures locos pertingens. Primum itaque futura illa terminatur, quæ primum os à quarto discernit, eam dico quæ simul in^b cauis temporum, & in anteriori maxillæ regione, & in oculi sede conspicitur. Deinde quartum os terminatur futuris, secundum maxillæ os & tertium ab ipso dirimentibus, quæ secundum totam sedis oculi longitudinem in inferiori eius sedis parte, & in anteriori regione secundi maxillæ ossis, ducuntur. Ad hæc, iuxta superciliorum medium, quartum maxillæ os futura finitur, superiorem maxillam ab osse frontis disingente. Hoc futuræ interuallum ducitur ab anteriori sede secundi ossis, ad exteriori latus ossis nasi, eius lateris, cuius maxillæ superioris ossa nunc intueris, quod quintum maxillæ os cōstituatur. à quo quartum dirimitur, futura à nasi summo iuxta ipsius externum latus deorsum ad nasi ossis longitudinem porrecta. Secundum uerò longitudinem ductus foraminum nasi, quartum maxillæ os ab illorum foraminum septo futura intersinguitur, secundum

Secundū maxillæ os.

Tertium maxillæ os.

Quartū maxillæ os.

c 3, 4. f. 6
capitis d.
d 1. fig. Q.
e 1. fig. R.
f 1. fig. R. S.
T, V, X.
Y, Z.
g 4. f. 6 ca.
ff.
h 1. fig. ab a
ad b.
i 1. f. ab per
D ad Q.
h 1. fig. d.

a 1. f. a.
b 1. fig. C.
c 1. f. 9. cap.
14. h. 7 n.

d 1. f. ab V
ad X.
e 1. fig. ab V
secundū a.
c c. decor-
sum, ac il-
line rufus
sursum ad
X.

a 1. f. e.

b 1. f. a T ad
V.
c 1. fig. ab V
ad c.
d 1. f. a T ad
d.

e 1. fig. a c
ad d.

a 1, 2. figura
a, A.

b 4. f. cap.
6 ff.

c 1. f. ab a ad
b.

d 1. f. ab ad
D.

e 1. f. ab X
secundum c
ad c, dein
ad d.

f 1. fig. ab X
ad Y.

g 1. fig. ab Y
ad c.
h 1. fig. a g.

i. f. ad D ad dūm humilissimam septi sedem prorrepente. In posteriori uerò sede quartum os à cuneiformi di-
 H. stinguitur, tum in oculorum sede, tum etiam iuxta intimum dentem, ubi futura cuneiforme
 h. f. N. 2. os à superiori maxilla terminans cōstitit. In palati fine uersus interiora quartum os¹ transuersa
 figura c. futura ab illo osse iungitur, quod sextum maxillæ appellamus, quodq̃ hīc ad narium forami-
 i. 2. f. ab u. na cum suo coniuge reponitur. Atque has omnes futuras quartum os cum alijs sibi contemi-
 n. 2. f. ad t. nis ossibus habet communes, quibus^m alia accedit quarto ossi dextri lateris, & quarto sinistri
 m. 2. f. ad t. lateris ossi propria, secundum palati longitudinem prorrepens: & non solum in palato, uerum
 per x ad z. & in narium amplitudine conspicua.² Deinde & in anteriori maxillæ sede eadem quoque su-
 n. 1. f. b. tura sub naribus ea sede cernitur, ubi superioris labri sulculus consistit. Hīc enim futura appa-
 ret utrorumq̃ laterum, quartis ossibus propria: quamuis linea potius quàm futura censerī de-
 beat. Ex hac futurarum frequentia quartum os terminante, haud difficulter colligitur, ipsum
 sedecim ossibus committi, primo enim, secundo, tertio, quinto & sexto maxillæ superioris con-
 necitur ossibus, deinde frontis ossi, cuneiformi, & octauo capitis ossi, ipsi uidelicet foraminum
 narium septo, ac demum quartum maxillæ os suo coniugi, seu alterius lateris quarto ossi iun-
 gitur: quemadmodum & octo dentibus quarto ossi infixis, quoties superior maxilla sedecim
 dentibus decoratur. Præfens os magna ex parte latera & inferiorem sedem narium constituit,
 & ad hæc latera impenſe cauum est, & nequiquam solidum, sed cereis imaginibus intus uacuis
 admodum eleganter simile. Huic ossi, præter alia ipsius foramina^o unum accedit, quod ab infe-
 riori oculi sedis regione incipiens, deorsum in anteriorem maxillæ partem porrigitur. Istud
 o. 1. f. a in ubi primū in oculi sede inchoatur, notabili interuallo superius ueluti ossea constat squama:
 oculi sede ubi primū in oculi sede inchoatur, notabili interuallo superius ueluti ossea constat squama:
 positi, dem B. ubi autem in anteriorem maxillæ partem pertinet, iam penitus in osse exculptum uisitur, atq̃
 p. 1. f. a. i. Hoc interuallum creberrimè non continuum est, sed^o futura donatur, quæ huic quarti ossis
 particulæ (ubi foramen consistit) propria peculiarisq̃ est. Quis uerò huius foraminis usus cen-
 seatur, in communi omnium caluarie foraminū sermone exequar. in præsentia autem obiter
 in illius mentionem incidi, quò aptius futuram quarto ossi propriam hīc recenserem: ne quis
 fortè, quum ipsam obseruaret, illam plura cōstituere ossa, ac altius quàm ab oculi sedis ambitū
 ad foramen usq̃ ferri arbitraretur. Præterea in anteriori palati sede ad posteriorem in cisoriorū
 q. 2. f. z. dentium regionem, aliud^o foramen se offert, quartis maxillæ superioris ossibus commune, &
 r. 2. f. a. a. ex palato in narium amplitudinem spectans. Ad huius foraminis latera interdum^o futura ap-
 pareret, aut potius linea, in pueris cartilagine oppleta, quæ quasi ad caninorum dentium anteri-
 us latus pergit. Verum nusquam adeò penetrat, ut huius futuræ beneficio quartum maxillæ
 o. 1. f. c. a. i. os in plura diuisum censerī queat: quod (ut paulò post dicam) canibus & simijs porcisq̃ ac-
 cedit, in quibus futura quartum os in duo diuidens, non solum in palato, uerum exterius in an-
 teriori maxillæ sede, etiam conspicuè cernitur, neque ulla appendicum cum suis ossibus coa-
 litus speciem refert. Quintum maxillæ superioris os ex duobus nasi ossibus alterum est, of-
 f. 1. f. z. f. siculum uidelicet durum, solidum, latum, tenue, oblongū, & quadrangulo potius quàm trian-
 gulo simile.^o Superiori enim parte non in acutum definit angulum: uerum adeò obtusum est,
 b. 1. f. a. y. ut inibi duobus donetur angulis. Terminatur autem illic futura, frontis os à superiori maxilla
 ad z. dirimente.^o Externum ossis latus communem futuram nanciscitur cum quarto maxillæ osse,
 c. 1. f. a. y. quæ secundū nasi latus tantū decliuus pertingit, quanta quinti huius maxillæ ossis est longi-
 tudo, quæ in homine longè breuior quàm canibus & simijs uisitur.^o Internum uerò ossis la-
 d. 1. f. a. z. tus quo coniugi suo committitur, futuram obtinet harmoniæ non admodum dissimilem, ac
 ad f. utriusque nasi ossibus communem. Hæc à medio superciliorum ex futura frontis ossi ac maxil-
 læ superiori communi incipiens, decliuus secundum ossium nasi longitudinem porrigitur.
 e. 1. f. a. f. Inferiori autem parte, quintum os futura haud intercipitur, neque alteri ossi iungitur, uerum
 hoc unà cum suo cōiuge asperum inæqualeq̃ est, & in cartilaginem finit deorsum proceden-
 f. 4. m. f. u. tem, coq̃ molliorem, quo longius ad nasi apicem deferitur. hanc cartilaginem cum reliquis nasi
 lorū tabu & totius corporis cartilaginibus priuatim post ossium enarrationē prosequemur. Sextum
 le, x. l. maxillæ superioris os, cum suo pari non minimam palati & narium amplitudinis portionem
 a. 2. f. n. constituit. Reponitur enim ad palati extremum, quā nares in fauces pertinent: estq̃ os tenue,
 b. 2. f. a. x. sed solidum, latumq̃. Id^o posteriori sede partim cuneiformi committitur ossi, partim liberum
 uersus e. est, semiparenthesis (formam referens. Vbi cuneiformi ossi cōmittitur, illa circumscriptum
 c. 1. f. e. est futura, quæ iuxta posteriorem intimi dentis sedem fertur, maxillamq̃ superiorem à cuneifor-
 d. 1. 2. f. p. mi osse dirimit, ea potissimum parte, ubi cuneiforme os ipsius educit^o processus uespertilionū
 c. 2. f. a. d. alis similes. Anteriori parte & externo latere sextum hoc os futura terminatur ipsi & quarto
 u. maxillæ ossi communi, ac transuersim in palato ducta.^o Interiori autem latere, quo se coniugi
 f. 2. f. a. d. ad D 3 suo

Quintum ma-
xillæ os.

Sextum ma-
xillæ os.

suo iungit, futura quadam dirimitur, quæ utriusque lateris sexto ossi duntaxat communis est, portioq^{ue} illius existit, quæ per palati longitudinem prorrepens, quarta maxillæ ossa inuicem separat. Contingit igitur sextum os, cuneiforme os, quartum maxillæ, & suum coniugem, & postremò narium septum: quod etiam à sexto osse, quemadmodum à quarto, ea dirimitur¹ futura, quam ad septi humiliorem sedem duci, antea commemoratum est. Hactenus itaque sex al-
 terius lateris maxillæ descripsi ossa, quæ si lenis oppositi lateris cõnumerentur ossibus, omnia maxillæ ossa confurgent duodecim, quibus nullum octo capitis ossum adieci. Ceterum si ad amussim singula quæ hoc Capite persectus sum excusseris, ac demum non perfunctoriè Galeni superioris maxillæ descriptionem euolueris, permulta iam occurrunt, in quibus ab illius placitis dedinem. quæ etsi omnia in præsentia (tuæ fideus industriæ) non commemo-
 rauero, nonnulla tamen subiiciam, è quibus meæ siue diligentia, seu oisitantia (prout mea ue-
 ritati aut cõsona, aut dissona intueberis) specimen aliquod anima duertere queas. Galenus itaq^{ue} in libro de Ossibus futuras maxillæ peculiâres descripturus, earum seriem à² malæ infima & extrema sede aggreditur, quam ego asperam inæqualemq^{ue} esse recensui, quòd hinc masseter mu-
 sculus sui principij ualidissimam nerueamq^{ue} admodum portionem educat. Hic igitur Galenus futuram describit, primum maxillæ os à quarto dirimentem, primam appellans, eius futuræ partem³ in cauo temporis cõspiciam. Secundam uerò numerat huius futuræ partem in an-
 teriori maxillæ sede occurrentem, quæ ab illa malæ asperitate fursum ad medium inferioris am-
 bitus sedis oculi pertingit. Hanc postmodum tripartitò ait discindi, ac⁴ primam huius secun-
 dæ futuræ partem prope magnum seu internum oculi sedis angulum exteriori in parte ad me-
 dium superciliorum, & communem frontis & maxillæ futuram inquit procedere. Hæc futuræ parte homines destituuntur, uerum in canibus caudatisq^{ue} simijs est manifestissima. quamuis interim non exactè ad superciliorum feratur medium, sed ad eam tantū sedem, in qua quartum maxillæ os à secundo dirimi dictum est. Hanc itaque partem, ut Galenum assequaris, ex canis caluaria petes. Porro secundam partem secundæ futuræ, inquit⁵ per concuum sedis oculi sub magno angulo ad communem capiti & maxillæ futuram pertinere, hancq^{ue} eundem angulum comprehendere. Hæc pars ea esset futura, quam secundum & tertium maxillæ ossa in inferiori ipsorum sede, à quarto dirimere docuimus. Verum hæc in homine nequaquam secundæ Galeni futuræ cõmittitur, multoq^{ue} minus primam partem secundæ futuræ contingit, quum hæc in canibus tantum & simijs, non autem hominibus cernatur. Porro⁶ foramen, quod huic secundæ parti Galenus subiici scribit, id esse opinor, quod in oculi sede oblongū admodumq^{ue} paruum est, inter quartum maxillæ os & cuneiforme cõspiciuum. Tertiam partem secundæ futuræ Galenus appellat portionem futuræ primum os à quarto diuidentis, quæ in oculi sede spectatur, unā cum illa quæ cuneiforme os à primo maxillæ osse disjungit, atque in oculi se-
 de etiam spectatur. Galeni enim est sententia, sub dictis duabus futuris (quæ duæ primæ par-
 tes sunt ipsius secundæ futuræ) tertiam eiusdem partem inferiorem in sede oculi ambitū inlen-
 dentem interius ad imum contendere, ibiq^{ue} communi futura capiti & maxillæ superiori iungi. His futuris Galenus tria maxillæ superioris ossa circumscribi postea subiecit, quibus hæc capiti committitur. Primum esset, quod ego primum maxillæ statui, secundum, ea quæ mihi secun-
 dum & tertium numerabatur: duo enim illa unius ossis loco ex Galeni placito recenserentur. Tertium, pars esset nostri quarti ossis, quicquid scilicet ipsius in oculi sede cõsistit, ea nimirum pars in qua⁷ foramen incipit, quod ab oculi sede in anteriorem maxillæ regionem pertinet. Hic modò consideratè exquirito, num Galenus maxillæ ossa hucusque uerius quàm ego, in homine enarrauerit, & quantum adhuc Galenus in simijs & canibus omiserit. dein, num Gale-
 num ego ex rei potius cognitione, an interpretis uersione intellexerim, & cuiusmodi natatore Delio Galeni de maxillæ ossibus tractatio indigeat: potissimum quando communis utilita-
 tis uel parum studiosi quidam, uel etiam inuidi, Græcum exemplar ita supprimunt, ut nullis id rationibus quò aliquandiu mihi usurpandū traderetur, ab ijs obtinere licuerit: qui tamen præ-
 ter Balamium, & Cardinalem Rodolphum, id se etiam habere fatebatur, sed ea conditione, mi-
 hi ne communicaretur. Verum interea omnem nauabo operam, ne illo libro, quemadmo-
 dum neque alijs etiam quibusdam Galeni libris ad Anatomem eguisse uidear, quos aut totos citra omnem usum recondunt, aut saltem correctiores à tinceis (quum ipsis usui esse nequeant) erodi malunt. Quòd uerò Galenus peculiaria constituat ossa, quibus incisorij dentes insigun-
 tur, hinc accidit, quòd suis nimirum fauens simijs, eas homini plus satis similes effingebat. In ca-
 nibus enim & simijs porcisq^{ue} ac alijs animalibus, quibus canini dentes ualidi exercitiq^{ue} obtige-
 runt, duæ (uti prius dixi) uidentur futuræ, aut harmoniæ potius, admodum conspicuæ, qui-
 bus homo defuitur. A futura enim quantum maxillæ os, quod nasi alterum existit, à quarto
 distin

*Vniuersa su-
 perioris ma-
 xillæ ossa esse
 duodecim.
 Non omnia
 præsentia Ca-
 pine hactenus
 tradita, Ga-
 leni placitis re-
 spondere, quo-
 rum quedam ad
 Capitis usque
 finem recen-
 sentur.*

g. 1. fig. 2. b.
h. 1. fig. 2.

*d. 1. fig. d. in
 homine, m.
 canis h.*

*b. 4. fig. 6. ca-
 pit. f. in tem-
 poris cauo.
 c. 1. fig. ab. 4.
 ad b. in ho-
 mine, in ca-
 ne à h. ad l.
 d. 1. fig. m. ca-
 ne ab l. ad
 m.*

*c. 1. fig. ad. 2.
 non ad. 2.
 f. fig. in a.
 fi. à b. per c.
 e. d. ad. T.
 continuam
 duci futuræ,
 uti in cane
 est cõspici-
 uum.*

*g. 1. fig. D.
 h. 1. fig. ab. se-
 cundum D.
 per Q. ad
 s.*

*is figurar.
 h. 1. fig. e.*

*li. fi. a. in o-
 culi sede po-
 situm. atq^{ue}
 id Galeni os
 quoddammodo
 illic circumscribe-
 retur. b. c.
 c. d. h. d.
 m. 1. fig. a. in
 oculi sede.*

*Canina cal-
 uaria n.*


distinguente, alia educitur futura, oblique deorsum inter caninum & incisorium canino proximum delata, quæ cum illa communis efficitur, quæ in palati extremo iuxta incisórios dentes transuersem in illis animalibus fertur. Hæc futura citra omnem cartilaginis interuentum adeo insignis est, ut quartum à me enumeratum maxillæ os, canes in duo diuisum commonstrent. Verum non arbitrandum est futuram hanc, inter dentium præsiopola in canibus aut simijs ductam, à superciliorum medio deorsum continuo progressu (& si Galenus ita doceat) ferri, sed ut iam admonuimus, ex medio ferè ductu illius futuræ incipit, quæ externum nasi ossium latius terminat. Quod ubi in cane simia ue inspexeris, accuratè expendito, quàm impossibile sit, hanc futuram porrigi inter dentes hominis, maxillam adepti breuissimam, & dentibus caninis prorsus exiguis donati. Insuper animaduertito, quid in libris de Partium usu Galenus sibi uoluerit, quum duodecim superioris maxillæ ossa esse obiter scripsit: uti & Introductorij seu Medici autor, duodecim tantum maxillæ ossa, è Veterū indubiè placito, enumerat: aut quum Galenus hæc ossa prolixius cōmemorans, nouem tantū recenset, nullumq; os priuatim incisorijs dentibus tribuit, in eo etiam numero cuneiforme os haud complectens.

Libro unde
cimo.

DE MAXILLA INFERIORI,

Caput X.

PRIOR
FIGURA.



POSTE
RIOR.

VTRARVMQVE DECIMI CAPITIS FIGVRARVM, ET
earundem characterum Index.

PRIOR seu dextra huius capitis figura, inferiorem maxillam unâ cum dentibus anteriori facie exprimit. Posterior figura, inferiorem maxillam simul cum humiliori dentium serie posteriori sede delineatam exhibet. Tabula autem tertio præsentis libri Capiti præposita, ad characterem C, maxillam à latere delineatam ostendit.

- A_{1,2} Maxillæ inferioris alterum caput, quo hæc superiori maxillæ dearticulatur.
B_{1,2} Ceruix, seu collum capitis A insigniti.
C_{1,2} Alterius lateris acutus processus, in quem temporalis musculus insertionem molitur.
D₂ D in umbra latitat, sinistra figuræ amplum indicans sinum, cui in ore dilitescens musculus inseritur, qui simul cum temporali & mansorio attollendæ seruit maxillæ.
E_{1,2} Asperitas ad posteriorem inferioremq; maxillæ sedē conspicua, ad quam mansorius inseritur.
F₂ In sinistra figuræ umbra F foramen notat, tertij paris nervorum cerebri sobolem admittens.
G₁ Foramen, quo surculus nervi nuper dicti in humiliori labrum procidit.
H₂ In hæc tubercula maxillam detrahentes musculi implantantur, & quidā linguæ ab ipsis oriuntur.



ANIMALIVM omnium homo inferiorem maxillam, pro totius corporis mole, breuissimam adipiscitur: asinus autem & equus inter quadrupeda ferè longissimam. Homini enim facies obtigit rotunda, non longa, ut reliquis animalibus: quæ, quoniam manibus carent, cibum assumptura, inclinantur. Duram autem hominibus maxillam, ut & cæteris animalibus fieri deuit, quod sola mobilis sit, & uarios atq; fortissimos motus in mordendo mandendoq; sustineat. Cæterū ne sic dura solidaq; nimio pondere ipsam mouentibus musculis incōmodo foret, sinus & cauitates notatu dignas, medullaq; infarctas exigit, interim appendicis undiq; experts. Sinus hi non adeo in posteriori maxillæ parte, ac in quadrupedibus exculpuntur, sed antrorsum magis uersus menti regionem, & ad maxillæ latera. Plurimis animalium maxilla duobus constat ossibus in summo mento, ubi ma-

Homini bre-
uissimam obri-
gisse inferiorem
maxillam.

6 musculo-
rum tabula
maxillæ per
me tui se-
proponit.

*Maxilla ho-
mini ferè uni-
co offe extrui.*

xilla illis in acutum definit, mutuo per unionem nexis. Homini autem, unico conformatur offe, ac in summo mento lata, neque ut in cæteris animalibus, acuta cernitur. Nulla enim parte maxilla difficilius quàm hîc discinditur. Præterea coctione, aut carie in terra illam dissolui, nō. dum animaduerti. & quamquam cum alibi, tum præcipuè Parisijs in Innocenti cimiterio maxillam inferiorum maxillarum (uti & cæterorum ossium) frequentiam conspexerim, nullam tamen unquam in duas bipartitam partes adinueni. Canum uerò, boum & asinorum maxillæ, etiam citra coctionis beneficium, inuicem paruo conatu interdum diuelluntur. Quamuis interim Galenus, & alij plerique post Hippocratem dissectionum periti, maxillam non unicum esse os asseruerint, sed coctum in summa menti extremitate laxari, ob idq̃ ipsum coaluisse manifestum indicium esse. Vtunque sit, hætenus nulla hominis maxilla mihi gemino constructa offe (uti & prius dicebam) occurrit. & quamuis fortè inter tot hominum myriades in canino aliquo mucuncione, aut puerulo talem quampiam maxillam aliquando obseruarem, non tamen ideo mox asseram, hominis maxillam duplici offe constare: quin Cello potius, aut illi Græco auctori ex quo Celsus quicquid de ossibus prodidit mutuatus est, accedam, qui cum Galeno canes parum curans, maxillam simplici offe componi docuit. Et quamuis hæc in pueris duobus ossibus per unionem nexis efformaretur, non ideo tamen simpliciter duplici offe maxillam formari rectè diceremus, nisi etiam occipiti os, uertebras, & ossa quæ sacri ossis lateribus committuntur, pluribus effingi ossibus donaremus. si quidem hæc in pueris compluribus ossibus mutuo per unionem commixtis extrui, nemo negauerit. Inferior maxilla utrinque

*Duo utrinque
maxille pro-
cessus.*

in duos definit processus, quorum^a alter in mucronem productus, musculi temporalis tendinis insertionem ualidissimè excipit, totus ab illo tendine complexus.^b Alter, qui posterior est, in capitulum transuersim oblongum finit, quod sibi correspondenti^c sinui inarticulatur, qui ad iugalis ossis radicem & anteriorem auditis organi sedem in temporis offe incisus est. Huic sinui, ut & capitulo maxillæ, cartilago crustæ modo obducitur. Verum præter hanc cartilaginem omnibus articulis pariter communem, inter sinum capitulumq̃ alia reponitur cartilago læuis, tenuis, & mollis, ligamentiq̃ naturæ quod ad substantiam spectat, nō nihil compos. Hæc ossibus nusquam adnascitur, sed tantum ligamenti articulum in orbem continentibus. Istius cartilaginis beneficio, durorum præsentis articuli ossium impetus exoluitur, & quo minus mutuo affricu in ualidis assiduisq̃ maxillæ motibus ossa rumpantur, scite præstat, unā cum cartilagine sinui & capitulo obnata. Ad hæc, inferior maxilla duobus utrinque donatur foraminibus, atque^d alterum quidem in interiori ipsius regione, non procul à nunc commemoratis

*Peculiaris in
maxillari ar-
ticulo cartilagi-
nis offigies.*



*Maxilla fo-
ramina.*

processibus, cernitur:^e alterum uerò, in exteriori sede ad labri inferioris radicem, latusq̃. Interius, quod & amplius, & inæquale seu asperum est, uiam præbet^f portioni nervi tertij paris neruorum cerebri ad dentium radices dispersæ, unā cum uenula & arteria, quæ dentibus & inferiori maxillæ nutriendis, hoc foramen subeunt. Exterius uerò, eius nerui^g sobolem ex maxilla in humilior labrum finit procidere, estq̃ longè minus interiori. Porro si setam exiccate maxillæ interno foramini indideris, eam ab hoc foramine ad externum usque leui opera ferri conspicias. & si maxillam effregeris, continuum iter ab uno foramine in alterum canalis mo-

*Dentium al-
ueoli.*

do cælaturum obseruabis. Præter hæc foramina in maxillæ externa superficie alia prorsus nulla reperiās, nisi fortè & alueolos præsepia^h illis annumerare lubeat, quibus dentes instar clauorum infigi mox trademus. Quod uerò horum sinuum alueorumq̃ gratia, inferior maxilla crassior sit, hinc potissimum constat, quod in uetulis, illisq̃ quibus dentes eruti sunt, ac in quibus ipsi dentium sinus succreuerunt, maxilla ab imo sursum multo tenuior & angustior ef-

*Maxilla in
posteriori se-
de amplius, et
tenuior, sinus,
effigies.*

ficiatur. Maxilla ubi dentes ipsi non infiguntur, eaq̃ sede qua commemoratos nuper educit processus, latissima, & si latera spectes, tenuissima,ⁱ intusq̃ ac^j exterius quasi amplo & in superficie tantum cavato sinu insculpta uisitur, quod aptius musculi maxillam, præter temporalem musculum attollentes, insectionem molirentur, isq̃ qui illorum in ore delitescit, minus sua crassitie ac mole faucium angustiam infarciret: adeo, ut intus magis quàm foris, maxilla merito insinuetur. Quinetiā huic latiori maxillæ sedi id separatim accidit, quod aspera inæqualisq̃ cernitur, idq̃ potissimum iuxta huius sedis^k inferiorem posterioremq̃ regionem, quod etiam musculorum insectionis occasione rerum Opifex machinatur, non ignorans asperis inæqualibusq̃ locis promptius aliquid adherere, adnasciq̃, quàm planis & glabris. Cæterum hac etiā gratia interior maxillæ sedes ad mentum^l aliquot tuberculis asperitatibus ue extruberat, ut musculi (quorū ope ipsa deorsum trahitur) suam insectionem ualidius conficerent, ac deniq̃ nonnulli linguæ peculiare musculi hinc aptius enascerentur. Tale quid etiam ufuuenit in externa inferioris maxillæ sede, ad summi menti regionem,^m ut hac ratione labri humilioris musculi commodius illinc, pronascerentur.

a 1, 2 fig. A.
C. & 6 mus-
culorū ta-
bule, A, B.
b 1, 2 fig. A.
B.
c 5 fig. 6 ca-
pus h.

d 2 fig. F.
e 1 fig. G.
f 2 fig. car-
tilla 2 ca. 4.
lib. præpo-
nuntur T.
g diste fig-
ura V &
h musculo-
rum tab. G.

h 2 fig. D.
i 1, 2 fig. E.

h 6 muscu-
lorum tabula
D.

l 1, 2 fig. E.

m 2 fig. H.
n 5 muscu-
lorum tab. H. 1.
o 1, 2 fig. 19
cap. 1, 2 H.
p 4 mus-
culorū tab. N.



PRAESENTIS VNDECIMI CAPITIS FIGVRAE,
ac ipsius characterum Index.

HAC figura tam superioris maxillae, quam inferioris dentes, in altero latere exprimitur, quum enim utriusque lateris par sit ratio, abunde est alterius lateris dentes ex maxillis erutos delineasse. Si uero dentes maxillis adhuc infixos contemplari uisum sit, superioris Capitis figurae inferiorem commonstrant seriem, quemadmodum tertia et quinta sexti Capitis figurae superiorem, ubi et quarta eius Capitis figura alueolos promptè ostendit, quibus dentes insiguntur. Quandoquidem ex caluaria, quam illa figura expressimus, studio superioris maxillae dentes euulsimus.

AA Dextri lateris octo superiores dentes.

BB Dextri lateris dentes octo inferiores.

1, 2 Duo dextri lateris incisori.

3 Dens caninus dexter.

4, 5, 6 Quinque molares dextri. Hunc numerum et inferiori et superiori dentium classi accommodare integrum est. Nomina autem dentium, cum uarijs reliquorum ofcium nomenclaturis, ex huius libri calce sumenda ueniunt: quod in eum locum nomina, quaecunque mihi haecenus occurrere, duxerim rejicienda.

C Basis notatur molaris dentis.

D Acies dentis incisori.

E Media molaris dentis pars hic delineatur, finem in dentibus conspicuum ostensura.



L X OSSIBVS solos dentes sentiendi uim obtinere, Galenus non perfunctorie attestatur, asserens se quoque dentium dolore uexatum, atque tum diligenter animum adhibuisse num dentes ipsi doleant: sensisseque manifestò dentem non modò dolere, uerum etiam pulsare, carnibus inflammatione obsessis non dissimiliter. Applantur enim dentium radicibus molles quidam neruuli, à tertio neruorum cerebri coniugio propagati, quorum gratia dentes duntaxat euidenti inter ossa sentiendi facultate donatos credimus. Caterum nonnulli Galeno haud acquiescentes, colligunt, dentem, quum os sit, citra dolorem affici: quemadmodum cum lima excessus dentium praefecare, aut ignitis ferris eos aliquando exurere cogimur. At quum in huiusmodi artis operibus ipsos sensu praeditos subinde experiamur, & à frigore potissimum molestari cognoscamus, meritò laudandus est immèssus rerum Opifex, quem ceterorum ofcium solis duntaxat dentibus notatu dignam sentiendi facultatè largitum arbitramur. Nouerat enim hos crebrò occurruròs ijs quae secant, uel frangunt, uel rodunt, uel ualide excalefaciunt, aut refrigerant, uel alia quauis occasione alterant: quibus omnibus dentes multò aliter, quam reliqua ossa, nudi exponuntur. Quamobrem, si nulla sentiendi uim pollerèt, à dolore homo neutiquam admoneretur, neque denti succurreret, quod infestat amoturus, priusquam molestati dentes uitarentur. Porro dentes non solum sensu, & quòd nudi sint, ab alijs ossibus distingui creduntur, uerum etiam quia hos plus ceteris ossibus semper enutrirì, & quouis tempore uitae incrementum accipere, ideo praecipue arbitramur, quod dentes illis quos eximimus oppositi, subinde in eruti dentis locum extra reliquam dentium seriem succrescant: ob hoc uidelicet, quod contrarijs dentibus non amplius alterantur. Reliqui enim dentes tantum augentur, quantum laeuigandis cibis comminuuntur. Sunt autem plurimum dentes numero triginta duo, una serie in utraque maxilla sedecim, instar iustissimae choreae siti. Quatuor priores aduersus quia secant, incisori uocantur: sunt enim lati & acuti, quò oblatum ipsis cibum mordendo cultri modo promptè abscondant, diuidantque.

*Dentes senti-
re.
Libro quinto
de Medica-
mentorij com-
posicione secun-
dum locos.*

*Dentit à ce-
teris ossibus dif-
ferentia.*

*Dentium nu-
merus.*

Incisori.

Deinceps

2 fl. 2 ed. li.
45 et XXX.

1, 2, D.

- Canini.* Deinceps^c canini utrinque singuli constituuntur, ampli quidem sua basi gingivis proxima: ipsorum autem fine à gingivis remoto, acuti, ut si quid propter duritiem ab incisorijs non præscinderetur, hoc illi confringerent. Porro ipsis id nomen inditum est, quòd exertis canum (qui hos habent insignes) dentibus respondent. Post hos, maxillares seu molares quini ab utroque latere habentur, asperi, ampli, duri & magni, quò in cisa ab incisorijs, effracta & à caninis in laeuorem exactum terere possint. Si enim prorsus laeues crearentur, idonei ad proprium munus minimè existerent: quoniam ab inaequalibus asperis & omnia melius teruntur. Propter hoc ipsum & molas, quibus fruges moluntur, temporis processu diutè minuendo laeuigatas, rursus incidi atque exasperari uidemus. Neque si asperi quidem essent, non autem duri, plus commodi ex ijs esset, ut qui prius contererentur, quàm cibos in laeuorem comminuerent, sunt enim dentes omnium ossium durissimi. Quinetiam, si asperi & duri facti, non essent unà & amplii, neque tales plus accommodarent illis concredito muneris, si modo quæ laeuissimè atteri debeant, in amplis firmari basibus oporteat. Incisorijs enim & caninis nihil còminuitur, propter strictam & angustam ipsorū aciem. Quid si hæc omnia molares adipiscerētur, at interim parui essent, non ne & hoc solo illorum usus corrumperetur? quum plurimo atterendis còminuendisq; cibis tempore indigemus. Dentes ad unum omnes in maxillarū sinibus clauorū ritu infiguntur, qui propter imaginem, quam cum præsepibus brutorum habent, Græcis *quadrina*, Latinis præsepia, nuncupantur. Hi nanq; singulis circundantur dentibus, hosq; stringunt atq; adeò exactè retinent, ut non promptè uel tantillum commoueantur. Neque paribus radicibus omnes suis inferuntur præsepibus, quandoquidem paruis una radix, duè uerò maioribus, tres & quatuor maximis obtigerunt. Incisorijs enim singulis immittuntur radicibus. Canini quoque radices singulas exigunt, qui incisiorum radicibus multo altius infiguntur, tantoq; maiores sunt quantum caninorum robur excedit. Quanquam & inter incisorios duo medijs inferioribus hæreāt radicibus, quàm duo laterales, caninis proximi, nimirū quòd medijs latiores grandioresq; sint. Molares radicibus inter se uariant. nam qui maxillæ inferiori sunt infixi, binis radicibus: qui superiori, ternis, subinde infiguntur. Differūt tamen & hi interdū, qui nanq; suprà sunt, quaternis: qui infrà, ternis radicibus immitti aliquādo deprehenduntur, præsertim duo denti intimo proximi. Dein frequentissimè duos molares superiores canino denti succedentes, duobus tantum immitti radicibus spectabis, tres reliquos ternis: sic & duos inferiores canino proximos una radice, tres reliquos duabus. Præterea obseruabis quoque omniū intimos minoribus infigi radicibus, quàm illis attiguos. Incisiorum & caninorum numerus, rarò in hominibus ut molarium, mutatur. Interdum enim in utroque latere quinque molares occurrunt, interdum quatuor: nonnunquam quatuor à sinistris, quinque uerò à dextris: uel contrà in sinistris quinque, ex dextris quatuor: uel infrà quatuor, suprà autem quinque, quam differentiam potissimum pariūt postremi dentes, quos plerique genuinos uocant, etiam si Cicerò ita molares uocauerit. Sunt autem illi, qui primum post pubertatem uenerisq; usum hominibus cum maximis subinde cruciatibus prodeunt: id quod medici parum obseruantes, aut alios dentes euellunt, aut humorū uitio eos infestari sibi persuadentes, ægros catapotijs atq; id genus pharmacis obruunt, quum dolore affectis nullum leui gingiuarum ad postremum dentem scarificatione, ac interdum ossis pertusione, præsentius remedium adferri possit, id quod ipse etiam modò experior, cui hæc scribenti trigessimus secundus dens ætatis uigesimo sexto anno succrescit. Atque id etiam arguunt permultæ caluariæ in cimiterijs occurrentes, in quibus posteriores illi dentes ueluti in cauea quapiā adhuc reponuntur ac latitant, quibusdā suæ basis apicibus os tenuissimum perforantes. Cuiusmodi caluariam nuper mihi exhibuit humanæ fabricæ quàm studiosissimus ac ualde peritus iuuenis, IOANNES PAVLVS GVLDOVICVS VRBINAS, mihi amicissimus. Cæterum Aristoteles, alijq; complures uiris copiosiores dentes quàm mulieribus ascribunt: quòd cuius non minus promptum est experiri, quàm mihi falsum id esse dicere, quum nulli nō dentes numerare liceat: ex quorū frequentia plerique etiam uitæ longitudinem breuitatemq; arguunt. Dentes non solum dictos nunc præstant usus, uerum etiam ad uocis modulationem iuuant, quum dura lapideaq; conformentur substantia, exiguas, sed notatu dignas cavitates intrus obtinent: quæ ut dentes leuiores sint, commodiusq; accipiant nutrimentum, occasionem præbent. Atque huius cavitatis causa, si quādo dentibus foramina ex humorū acrimia erodentiumq; influxu oboriātur, quæ ad eam cavitatem usq; pertingāt ocysissime dentes ad radicis usq; extrema eroduntur. Deinde puerorū dentes imperfectis & mollibus & quasi medullosis cōstare radicibus, non prætereundum est: quemadmodum & pueris dentium partem extra gingiuas conspicuam, dentis radici appendicis modo committi. Atque id quidem uel pueri didicimus, quum nobis focijq; uacillantes dentes,

Charact. 3.

4, 5, 6, 7, 8.

Dens molaris C. infigitur.

In ca. initio eam que sepius occurrat radicem feriem ex-presimus.

Dens E. infigitur.

dentes, & præcipuè incisorios, unguibus aut filo denti circumdato, eximere cõsueuimus. Quin & in mulis quoque, ac multis canibus dentium reſeruatis radicibus, ipſorum appendices proci dere indies obſeruamus. Atque poſtreimum illud proſectò accuratiſſimè expendendū eſt, ne pueris effracti alicuius ex caſu dentis reliquam portionem unquam eruamus, ſed duntaxat appendicem, in cuius locum alia (modò radix ſeruetur) promptè ſuccreſcet. Dein plurimum id quoque in pueris animaduertiſſe cõducit, quibus mox ab ineunte ætate molares dentes erodi uitariq; ſolent. In his nanque operæ præcium eſt, molarium dentium appendices (quæ non ita ut incisoriorum procidere in ipſis ſolent) auferre, quò nouæ earum loco ſuccedant, dentesq; integri ſeruentur. Si enim appendicum unio ætatis progreſſu firmetur, appendix nunquam decideret, quinimò uel pubertatis tempore aliquot dentes cum radicibus, ob eroſionis uitium, plerunq; ueniunt erudi.


DE OSSIVM CAPITIS ET MAXILLÆ
superioris foraminibus. Caput XII.



QVANDOQV IDEM in uenarum, neruorum & arteriarum deſcriptio nibus, foraminum capitis ignorantia non modicum obſcuritatis paritura eſſet, dein quia in illis enarrandis (quū cognitu ſint difficillima) Anatomicorum præcipui multum aberrauerunt, operæ præcium iam duxerim, hoc Caput omnibus capitis foraminibus dedicare, ac ſingula quæ accurata diligentiq; ſeſtione maniſeſtò deprehendi, modò recenſere, ut in ualforum & neruorum quarundamq; membranarū cerebri enarratione, huc ſtudioſus diſcendiq; cupidus lector recurrere poſſit, & foramen cuius mentio incidet, perpetuò in pro cinctu habeat. Vt uerò id fiat compendioſius, quatuor figuras præſenti negotio famulantes, huc reponam, unumquodq; foramen cum ipſi præfixo caractere ſeorſum ita enarraturus, ut ſermo ſimul characterum Indicis & Capitis contextus uices opportune ſuppleat. Inde ſi caſu, aut ex indiſtincta aliquis ſinus uel proceſſus antea fuerit omiſſus, illum etiam nunc deſcribam.

*Quæ foraminū
deſcriptio in ſi
tuatur.*

PRIMA XII CAPITIS FIGVRA.



P R A E S E N S figura anteriorem caluariæ ſedem exprimit, ac proinde omnia etiam foramina in oculi ſede maxillæq; ſuperiori, in hac ſuperficie apparentia, proponit. Caninum autem caput humanæ caluariæ ſubieclum, iam prius maxillæ ſuperioris oſſibus ſuturisq; indicandis uniç, perinde ac tota hæc figura, inuit.

SECUNDA DVODECIMI CAPITIS FIGVRA.



HAC figura calvariae basis exteriorem faciem, quæ palatum respicit, delineauimus. Nos enim hic caluam, seu caluariam, aut capitis ossa non octo illa quæ prius in sexto & nono Capitib. ossa capitis uocata sunt, nominabimus: aut cum Aristotele capitis tantum partem capillis tectam: uerum octo illis ossibus maxillâ superiorem adijciemus, idq; caluariam seu caput modò dicemus, quod in cemiterijs passim reperitur, & caluariæ loco pingitur. Quòd autem suprâ capitis ossa à maxillæ superioris ossib. distinxerimus, Galeni nomine & euidentioris doctrinæ studio factum fuisse, hæcenus abundè licuit colligere.

TERTIA DVODECIMI CAPITIS FIGVRA.
INTERNAM CALVARIÆ BASIM COMMONSTRANS.

QVARTA

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER I.
 QVARTA DVODECIMI CAPITIS FIGVRA



QVARTA internam calvariae sedem superioris ipsius partis ostendit, quam à tertia figura calvaria ferrata rescuimus, ut calvariā cerebri harmoniam ostensuri diu-
 dere solemus. Age igitur characterum indicem aggrediamur, & singulis characteril. u. eius fi-
 guræ cui peculiare sunt, numerum subijciamus, prius adhuc admonentes, nō parum foraminibus
 quibusdam intelligendis eam figuram iuuare, quæ octaua sexti Capitis habebatur, interiorē
 ostendens ossis cuneum referentis, & octauū capitis ossis, quæ cerebrum spectat superficiem.
 Eam enim figuram cum interna tertia huius Capitis figuræ sede, secundum cuneiformis ossis
 & octauū capitis ossis descriptionem, conferre plurimum conduxerit.

A Foramen ad medium supercilij incisum, quo¹ ramus minoris tertij paris nervuorum cerebri
 radices ex oculi sede ad frontis musculosam cutem dispergitur. Hoc in utroque latere non itē
 per perfectū orbiculareq; existit foramen, sed subinde linus duntaxat semicirculū ritu exculptus
 apparet. Aliquando in uno quidem latere foramen, in altero autem semicircularis tantū linus,
 perinde atque hīc in prima figura, cernitur. Foramen hoc frontis ossi propriū est, quod
 aliquot I prima huius Capitis figura insignitū cernitur. Verū non est, quod aut hīc in ora-
 tionis contextu, aut in margine os aliquod adnotem, quum character foramen indicans, etiā
 os cui id insculpitur, promptē doceat.

B Foramen, quo dictæ minoris tertij paris nervuorū cerebri radices soboles, ex oculorū sede in
 genas ad superioris labri & alarū nasi musculos procidit. Præfens foramen in star oblōgi me-
 tus in quarto superioris maxillæ ossē sculpitur, & in anteriori maxillæ sede ubi in prima figura
 B poniū, foraminis huius ductus penitus in ossē cælatur. Per oculi uerò sedem, tantū tenui ac
 squamæ similimo ossē tegitū: quam regionem Δ in oculi sede conspicuo, insigniuimus.

C Foramen nunc cōmemorato amplius, quod ex magno interno ue oculi angulo in narium
 cauitatem rectā deorsum pertinet, secundo superioris maxillæ ossi, & quarto pariter cōmune.
 Istud¹ portiunculæ minoris tertij paris nervuorum cerebri radices uiam præbet, & nonnihil pi-
 tuitæ ex cerebro ad oculi sedem confluentis, ad nares transmittere creditur. Cæterū præter
 id foramen, aliud quoque grandius pituitæ ex oculi sede in narium amplitudinem, hincq; ma-
 gis ad fauces quā nāsum defluxui, præparatur. Quod quū profundius latet, neq; ullo pacto
 præpositis iam figuris indicari possit, quartam adito figuram sexto Capiti præpositam, à qua
 iugale os (quod cauum temporis exactius oculis subijceretur) rescuimus, illi figuræ ϕ ascriben-
 tes, ut saltem foraminis huius in cuneiformi ossē incisi sedes indicaretur. Quo autem id magis
 in caluarijs cōspectum fugit, eo minus quoq; mirandū est, hoc quacūq; etiam dignum sit an-
 madauerione, dissectionis proceres latuisse.

D 1, 2 Præfens foramen omnium quæ in oculi sede conspiciuntur, facile maximum occurrit, & dictæ iam sæpius minoris tertij paris nervorū cerebri radices^a ramulo uiam dat, in temporalem musculum & manforium ex oculorum sede porrecto. Neque huius duntaxat nervuli nomine patens illud oblongumq; foramen exculptum est, at musculi temporalis exortui hinc quoq; robur accedit. Ad hæc pituitæ, ad grandius in narium cavitatem pertinens foramen (quod expressimus) defluenti, uiam præbet. Quinetiā præparatum uidetur^b nervulo cuidam, quem iuxta quinti paris nervorum cerebri radicem educi, nos primum obseruauimus. Quippe nervulus ille per proprium foramen paulo posterius H notandum porrigitur in temporalem musculum & manforium, illumq; qui in ore delitescens, etiam attollendæ maxillæ famulatur. Cæterum rima hæc, seu oblongum foramen D insignitum, ad cuneiforme os, & quartum os maxillæ superioris pertinet.

42 fi. 2. ca.
lib. 4. Q.

62 fi. 2. cap.
libri 4. d.

E 1, 3 E in tertia figura posito, & E in utroq; oculorū sedibus primæ figuræ foramen indicatur, in sedis oculi radice seu uertice elatissimū, & in cuneiformi osse incisum, quod foris quæ oculi sedē spectat, prorsus orbiculare cernitur, nervo uisorio (cuius gratia exculptum est) amplitudine respondens. Verū interius ubi cerebro propius accedit, iuxta externū ipsius latus, exiguum eundemq; acutum obtinet angulū, qui uenulæ cum uisorio nervo hac excidente paratur. Angulum hunc γ notat. Is namq; inter E & γ in tertia huius Capitis figura consistit.

413 fi. li. 7
N. O.

F 3 Huic sinui cuneiformi osse inciso, uisoriorum nervorum^c coitus innititur.

412 fi. lib. 7
M.

G 1, 3 G in primæ figuræ sinistra oculi sede occurrit, in tertia autem figura G dextrum eius figuræ latus ideo occupat, quod in sinistro latere foramen G indicatum, nusquam obuiū sit, eò quod

*Lib. 9. de V.
superartium.*
Quoniam præfens foramen obscure in huius Capitis figuris cernitur, hic foraminis dextri lateris effigiem delineauimus, atq; humiliorē ipsius partem A, superiorem uero seu eiusdem foraminis angulum insigniui. Quoniam ueriusq; lateris foramen etiam pulchre in octaua sextæ Capitis figura in conspectu sit.



huius figuræ caluaria in latus uel istius foraminis aliquo modo uidendi nomine, infleximus. Insculpitur autē cuneiformi osse, ac humiliori sui parte paulo minus toto orbiculare est, elatiori uerò in acutum longumq; & angustum definit angulum. Foramen hoc, etiā Galeno secus uisum sit, nervi uisorij foramen amplitudine uincit. & si similiter atq; illud prorsus orbiculare esset, facile triplo, aut quadruplo amplius efficeretur. Nihilominus tamen humilior ipsius pars, quam paulo minus toto orbicularem esse diximus) uisorij nervi foraminis amplitudinem adhuc

414 fi. 7 li
bri G.
b eadem figuræ H.
c fig. 44. 14.
lib. 3. X.
d eadem fig.
G. 13 fig.
lib. 7 H.

longè superat. Præfens foramen cælatur gratia^a secundi paris nervorum cerebri, in oculi sedem ad mouendos oculi musculos progredientis, dein gratia^b minoris tertij paris nervorum cerebri radices, quæ frontis cuti, superioris maxillæ in facie musculis, in nares & musculos inferiorē maxillam attollentes, digeritur. Hæc quidem per humiliorē foraminis sedem procedunt, unā cum^c insigni ramo soporalis arteriæ, quam reticularem plexum in homine quidam efformare comminiscuntur. Verum per elatiorem foraminis sedem, quæ in angustum longumq; angulum cogitur, uena ex oculorū sede, ab illis quæ temporalem adeunt musculum, duræ membranæ hic distribuitur, & suæ distributioni in caluariæ basi sinus inibi exculptos gerit, uenularum tuberibus congruentes, & in ea caluariæ sede conspicuos, cui in tertia figura C inscribitur. Neque profectò neruis his duntaxat, & uenæ, & nuper dictæ insigni arteriæ, amplum id foramen excauatur: uerum etiam pituitæ ex cerebro in oculi sedem, & hinc in narium amplitudinem promananti, quemadmodum sectio luculentissimè iuxta ac iucundissimè ostendit, adeo ut nulla ratione magna hæc foraminis amplitudo, neruis illis, & uenæ, & arteriæ par conspiciatur.

H 1, 3 Foramen orbiculare, & in osse longius quàm duo proximè commemorata procedens, & arcuatus quoq;. Hoc in cuneiformi osse cum reliquis^a nervuli gratia exculptur, quem nō procul à præcipua quinti paris radice pronasci audies. Præfens foramen in tertiæ figuræ dextro latere sub G positū, paulo grandius uisitur foramine in sinistro latere conspicuo, quod interdū præter nervulū illum etiam tertij paris^b minorem radicem transmittat, quam per foramen G insignitum deduci, paulo superius commemoratum est.

414 fi. lib. 7
72.

614 fi. 7 li.
bri H.

412 fi. lib.
7 E.

I 3 Hac sede in octauo capitis osse^a multa, sed exigua spectantur foramina, odorū & aeris in inspirationibus ad cerebrum ingressus nomine, in cisa. Hæc non ut hactenus dicta, ipso ductu recta sunt, & utrinque peruia, sed obliqua, & anfractuosa, spongiorumq; foraminibus similia. Inter reliqua tamen utrinque unum est rectum & grande satis, quod primum quodāmodo est, & antica frontis ossis sedi proximum, uenam ad duram cerebri membranā ex narium amplitudine exporrectam transmittens. Verum cætera interim foramina, etiam recta & utrinque pertusa uidentur, si modò interiora narium ossicula in ipsum summum nō pari semper numero reposita, & insigniter fungosa, & nonnihil membranæ cartilagineæq; eximerentur.

613 fi. lib. 7
G. 13 fi. ca.
14 lib. 3 H.

Num

Num uerò hæc foraminula pituitæ cerebri expurgandæ etiam efformetur, septimo libro pertractabimus. In præsentia tamen addendum duxi, his nunquam nisi oppleto cerebro pituitam excolari, & leuissima pituitæ copia hac defluente, ea foramina obturari, aliâq; grauedinis symptomata induci. Insuper admonendus es, in omnibus caluarijs non æquæ frequentia hæc appa-
c 12 fig. 7 li. bri E. d eadem figu a D.

K 3, 4 Cautas inter duas frontis os constituentes squamas reposita, quam nonnulli olfactus organum esse asserunt, propter aërem in illa conclusum, quem odoratui mirifice necessarium esse non ambigimus. Quam uerò hæc cautas capax sit, promptè obseruabis, si frontis os in superciliorum regione frigeris. Est enim amplissima, & molliusculū corpus membranula obductum completitur, quod medullæ quodāmodo respondet: uniuersum tamen eiusmodi est, ut nullū simile in toto corpore reperias, præterquā in^a cauernis antris uel in cuneiformi osse cerebro conspicuis. Præterea quibus gallico morbo anterior frontis ossis squamæ eroditur, aut uulnere perfringitur, tanto impetu in expiratione aërem ex cauitate illa propelli cernimus, ut etiam is candelæ lumen promptissimè exufflet. Præfens enim cautas non solum ad superciliorum sedem & quibusdam receditis foraminibus in narium amplitudinem pertinet, sed etiam in eam frontis ossis porrigitur partem, quam superiore sedis oculi regionem cōstituere dictum est.

a 8 fi. 6 ca. G. D. *L 3* Foramen, aut rima potius, talis formæ, qualem unguis apice quis ceræ imprimeret: quæ du-
sub D 13 fi. 7 libri. *ra* cerebri membranæ hæc firmandæ extruitur. Necessum quippe erat, non hic solum ubi membrana multis foraminibus est peruiua, uerum alijs compluribus locis, caluariæ alligari, & duram membranam fibras uinulaq; per caluariam transmittere. Licet etiam istas rimas aëri in cerebrum ducendo aliquid auxiliari intueberis, si illas intrusa seta, in nuperrimè dictam frontis ossis cauitatem nariumq; amplitudinem definire expenderis, ac præterea in ossis cuneum imitantis antra pertinere animaduertaris.

M 3 Sinus in cuneiforme osse incisus, ac glandulam cōtinens, cui ex cerebro defluens pituita in-

*Meatus pur-
gandæ cerebri
pituitæ parati.
Lib. 9 de V su-
partum.*

*Quoniam hæc septimo libro peculiaris si-
gura quantumuis rucis præfenti loco accu-
ratius intelligere
do nō inuicis est,
hic illā addeci, A.
glandulam indi-
cans, cui pituita
influit. B peluim
ex tenui membra-
na cerebri extru-
da C, D, E, F quatuor ueluti ductus à glan-
de pituitam deducentes.*



*da C, D, E, F quatuor ueluti ductus à glan-
de pituitam deducentes.*

stillat, quam deinde per os sinū hunc efformās in palatū manare Galenus prodidit: per ipsū cribrum aut spongiæ modo foraminibus peruium, pituitam colari asserens. Hanc sententiam, nisi mea quædam in Gale-
num pietas remoraretur, non minus à uero alienam ostenderem, quā quod maxime. Quandoquidem hæc ossis sedes, quæ ossis cuneiformis medium existit, neutiquā spongiæ, multoq; adhuc minus cribrum instar perforatur, quum inibi solida continuatq; constet squama, intus amplas illas cauitates plerumque continente, quas octaua sexti Capitis figura expressimus, quæq; non nisi effracto prius osse in conspectum ueniunt. Per huiusmodi itaque ossis cuneiformis foramina (quum nulla sint) pituita haudquaquā descendit. Verum à sinu M notato utrin-

que duo deriuantur ductus, sinuum modo exculpti, quorum prior ad secundum foramen nobis in oculi sedis radice enarratum ac G insignitū tendit, & pituitam in oculi sedem, & hinc per foramina, quæ prius C & ϕ expressimus, defert. Posterior sinus ad asperum inæ qualc; foramen, seu rimam potius deorsum porrigitur, quā pituita ori palato uel potissimū influit, & aër quoque inter spirandum caluariam petit. Rimam hanc temporis ossi & occipitij communem,

N notauimus in sinistro latere secundæ figuræ, & in dextro tertiæ. Ductus uerò & sinus non adeò commodè (quum non admodū caui uideantur) in tertia figura se spectandos offerunt, quanquam interim priorem sinum O, posteriorem uerò P in eadem figura indicauerimus, ut his adiutus characteribus sinuū sedem in ueris caluarijs ocyus adinuenias. Processibus qui orbiculatim circa sinum M insignitum apparent, dura cerebri membrana firmissimè adnata
a 15 fi. 7 li. scitur, ac ueluti ea sede sustinetur, qua hic à caluariæ basi abscedit, insignioresq; soporalium articularum ramos, & commemoratas nuper quæ pituitam deducant uias, sibi subditas habet.

Q 2, 3 Ad latus inæ qualis asperæq; rimæ seu foraminis N notati, uersus anteriora magis, aliud occurrit foramen in cuneiformi osse incisum, quod laeue est, & non ad amussim orbiculare, sed circulo respondet utrinque modice in longum compresso. Hac enim effigie foramen insinuari decuit, quod duo teretia corpora inuicem membranæ connexa, erat transmissurum.
a 14 fi. li. bri 7 li. K. 2 fi. 2 ca. 4 li. M Z. ^a Tertiū nanque paris neruorum cerebri crassiori, & præcipuè radici simul cum^b quarto pariam præbet,

- R 2,3** Rursus ad externum foraminis Q indicati latus, aliud multo minus hoc, & exacte orbiculatum, in cuneiformi osse cernitur, quo internæ iugularis uenæ portio à soporali abscedens arteria, caluariam subintrat. Aliquando exiguum foramen ad internum latus foraminis, duo numero commemorata nervorum paria transmittentis, observatur, eiusdem uenæ ramulo paratum. Verum id in uno caluariæ latere raro uisitur, atque adhuc multo rarius in utroque. Nos tamen id foramen sinistro lateri (quod inter cæteras caluarias una hoc donata foramine obtigitur, quæ cæteris omnibus elegantior uisa est) hic quoque appropinquamus, ac S in secunda & tertia figuris insigniuimus. Ab hoc foramine sinus per interiora caluariæ ascendunt, conuexo dimidiata uenæ congruentes: & in hoc cælati, ne caluariæ os sinus in dura cerebri membrana uenarum modo ductos, premat confringatq. Hos caluariæ sinus in tertia figura & quarta aliquot T, T notauimus.

V 2 Foramen hoc in externa caluariæ basis sede obuium, eodem uideri nequit, hinc enim oblique uersus exteriora protensum, in auditorij organi cavitatem temporis ossi insculptam definit. Quare etiam id paulo post cum aliquot auditorij organi foraminibus delineatum, rursus subiiciam. Efformatur autem id, ut uiam porrigat quintæ coniugationis nervorum cerebri ramulo, ab auditus organi cavitatē hanc ad musculos inferiorem maxillam attolentes excurrenti. Insuper hoc etiam foramine iugularis internæ soboles, auditus organum petit, ac aër etiam in temporis ossis antrum auditus organo proprium, per id foramen fertur. Id quod facile perciperis, si attracto in os aère, illum quasi per aures propellere conaberis, in auribus sonum percipiturus uentorum, aut aquæ turbinum sonis parum absimilem.

X 2,3 Insigne foramen maiori soporalis arteriæ ramo caluariā ingredienti excavatum, quod non rectè caluariā perforat, sed instar oblongi meatus, ex posterioribus oblique introrsum in priora temporis ossi insculpitur. Ossis pars hoc foramine peruia, ubi deorsum ad fauces spectat, ac in secunda figura ce notatur, instar pumiceis aspera inæqualisq. uisitur. Cæterum huius foraminis progressum commonstrat X in secunda & tertia figuris positum, & deinde hæc quam modo adijcimus figura, in qua X & Y, ut & in maioribus figuris, situ inuicem minimè respondent. Hunc uerò obliquum & in osse longo tramite procedentem ductum, Natura effinxit longioris obliquiorisq. arteriæ soporalis progressus gratia, nimirum ut uitalis spiritus hoc errabundo ductus itinere, cerebro exquisitus præpararetur.

Quare etiam Galenū in primis admiror, quem cum plerisque alijs foraminibus grande hoc foramen, non obiter expendendum, latuit: & qui per foramen tertij & quarti paris nervorū cerebri Q indicatum, soporales arterias caluariam ingredi in suo de Sinia uenarum artiarumq. dissectione libro, scriptum reliquit. Et quemadmodum de hoc foramine, neque canes, neque simias hic intuitus, falsa posteris tradidit: ita non mirum est, ipsum mirabilem illum reticularem plexum sua imaginatione in hominibus quoq. confixisse, ac uasorum cerebri seriem non undiquaque ueram memoriæ prodidisse.

Y 3 E regione foraminis nunc dicti, ac X insigniti finis, qui caluariæ amplitudinem respicit, aliud foramen inchoatur, rectè antrorsum in narium usq. amplitudinem, meatus oblongi modo protensum, & arteriæ ramo uiam exhibens, qui à soporalis arteriæ maiori portione caluariam ingrediēte, ad nares usq. exporrigitur, inibi cum alijs eò porrectis arteriæ furculis pullum edens sensibilem. Hoc foramen cuneiformi ossi peculiare censibus.

a 2,3 Quinti nervorum cerebri paris meatus, auditorius uel porus, cuius principium interius in caluariæ amplitudine, a notat in tertia figura positum. Exteriori autē ipsius partem, quæ ab aure excipitur, ac auriculæ quodammodo respondet, aspera q. uisitur, a secundæ figuræ indicat. Meatus iste etsi intus admodum amplius cauiusq. sit, adeo tamen tortuosus & anfractuosus ac impenso uariis inueniū, ut nō nisi rarissimè impulsam transmittat setam. licet quo minus seta transmittatur, non ipsius meatus gyri anfractus ue in causa tantum sint, uerū etiam quod is ad aurem, & dein quæ cerebrum respicit, arcior euaserit, quam in medio, ubi admodum amplius latusq. uisitur. Verum interim haudquaquam audiendus est Aristoteles, quum ab aure ad cere

Præfens figura foraminib. X cy Y notatis, promptius ostendit uia, complectitur enim



urriusq. lateris si ramuli ductus, ea serie postea, quæ illa in caluariam immittit, seris, aut ex plumbo filis ferri cernuntur. Vtriusq. igitur X sinistram foramen notat, maximo sinistram soporalis arteriæ ramo paratum. urrumq. uero Y foramen indicat, soporalis arteriæ ramulo in narium amplitudinem excurrenti incisum.



Præfens figura ad sinistram latus est referenda.

brum

brum nullum asserit pendere meatum. At in oris palatum usque semitam pertingere, & uenam de cerebro eodem descendere, inquit. In caluariæ enim amplitudinem auditorius meatus pertinet, & uenam quoque admittit: non quidem illam à cerebro deducens, uerum eam ab interna iugulari caluariam ingredienti ad auditus organū assumit, & uti antea monuimus, quinti paris neruorum cerebri ramulo uiam præbet. Præterea si setam auditus meatui exterius indideris, hancq; modicè in anteriora introrsumq; obliquè protruseris, in foramen v notatū, illam multo facilius quàm in caluariæ amplitudinem ferri conspicias.

*Libro primo
Historiæ ani-
malium Capitu-
lo undecimo*

b 2 Foramen ex auditus organi amplitudinis medio exortū, ac illinc in posteriora porrectum. Hoc anfractuū & labyrinthorum occasione, & quia in internam caluariæ sedem non pertinet, immixtam non transmittit setam. Preparatur autem ramulo nerui quinti paris, quem quū Natura indurescere uoluerit, admodum callidè hunc per durissimū sicillimiq; ossis anfractuofum foramen deduxit. Vocatur uerò omnibus dissectionum professoribus τυφλόν, cæcum & monoculum, non quòd uerus peruiusq; meatus non sit, sed quòd uix ad auditus organi amplitudinem usque setam aut plumbeum filum admittat. Istud foramen lupis & canibus, quibus id supra māmillarīs processūs radicis sedem habetur multo amplius grandiusq; cōtingit, quàm hominibus. Forsitan nonnulli foramen ex auditorio meatu in priora protensum, ac v insignitum, cæcum appellant. Vt cūq; uerò sit, hoc foramen v, aut illud b notatum ignorarunt, quanquam sanè hæcenus apud neminem, uel unum foramen digna descriptione expressum reperi, quum interim foraminum speculatio sit iucundissima, illaq; maximam Naturæ arguant industriam.

*Foramen cæ-
cum.*

c 2, 3 Foramen occipitis ossi & temporis ossi commune, ac sexto parī neruorum cerebri, & ma-
ior internæ iugularis uenæ ramo, minorisq; soporalis arteriæ soboli exculptū. Istud, quia hæc
transfuentia organa grādiōra sunt, amplum uisitur, transfuentium cor-
porum formæ respondens. Non enim examuissimū circulare est, sed
quodammodo geminum intortumq;, & ipsius una pars (quæ inter-
rior est) neruo ex caluariā antrorsum quodammodo elabenti para-
tur; altera uerò (quæ exterior est) uenæ & arteriæ caluariam ad poste-
riora ingredientibus subseruit.

*Hic foramen quod
modò describitur fo-
ramen expressimus,
interiori quidē ipsi-
us parti d, exteri-
ori autem i ascri-
bentes.*

(d)

d, 2, 3 Foramen in occipitij ossē gratia nerui septimi paris neruorum cerebri in cūsum, quod quī-
dem orbiculare est, sed ductu oblongum obliquumq;. Ex posterioribus enim, internæq; calua-
riæ sede decliue fertur, quò citius septimi paris neruus hoc ductus foramine, sexto parī commit-
teretur, unaq; ambo simul hærentes, deorsum tūtò descenderent.

e 2, 3 Foramen unicum, cæterisq; omnibus facile maximum, quod occipitis ossi insinuatur, gra-
tia dorsalis medullæ ex cerebro originem ducentis.

f 2 Non insigniter amplum foramen, quod ab externa caluariæ sede, ex posteriori nimirum
sede capitis occipitij ossis, quod primæ ceruicis uertebrae articulatur, incipiens, in internā calua-
riæ sedem longo ductu per os fertur, in elatiori sede septimi paris neruorum cerebri forami-
nis d notati cessans. Hoc uenæ & arteriæ gratia cælatur, per transuersos uertebraū ceruicis
processus sursum conscendentiū. Cæterum in quibusdam caluarijs id foramen in altero latere
aliquādo deesse reperiens, interdū etiam in utroq; uerū tunc huius foraminis uices gerit septi-
mi paris neruorum cerebri foramen d insignitum, quod tunc non ad amuissimū orbiculare cer-
nitur, sed oblongum, neruo simul cum uena arteriaq; transmittendo idoneum.

g 2, 3 Foramen id ad posteriorem regionem processū māmillarīs, iuxta futuræ λ referentis la-
tus in temporis ossē cælatur, & transuersim caluariam ingrediens, uiam externæ iugularis ue-
næ ramo hac caluariam petenti, offert. Animaduerti interdum id foramen, modò in altero la-
tere, modò in utroque defuisse.

^a In tertia figura, non oscitanter sinus in interna caluariæ amplitudine, qua cerebrum conti-
netur, animaduertendus uenit, in quem tria foramina c & f & g insignita, & uenis arterijsq;
transmittendis parata subeunt. A sexti enim neruorum cerebri paris foramine c notato, &
interna parte foraminis f insigniti, in dextra sinistraq; caluariæ sede sinus incipit, quem in sini-
stro latere h, h & h indicauimus, in dextro autem tribus i. Sinus isti obliquè instar quartæ cir-
culi partis sursum in posteriora tantisper conscendunt, dum dexter sinistro inibi committatur,
ubi k reposuimus. Huius enim coitus sedes in mediæ regione occipitis ossis uisitur, quæ inter
elatissimam futuræ λ exprimentis^b regionem, & posteriorem foraminis dorsalem medullam
transmittentis, ac e insigniti regionem, media consistit, & k inscribitur, ubi occipitis os craf-
tissimum densissimumq; esse, in eius ossis historia retulimus. Ex hoc duorū sinuum congressu,
alius rectā sursum fertur, sub eminentissima parte futuræ λ similis, & sub tota sagittali futura,

*Caluariæ si-
nus duæ mē-
branae uasis co-
dentes.*

h, h, h.

i, i, i.

k.

ll & frontis osse usque ad olfactus organorum sedium septum, » quodammodo in tertia figura insignitum. Hunc sinum quarta figura aliquot l notatum gerit. tertia autem in frontis osse, li-
m tera m eundem indicat. Ceterum sinus hi exculpuntur duræ cerebri membranæ gratia, cuius uasis ipsos ne illa caluariæ ossibus præmeretur, cedere tunc audies, quando cerebri uasorum non minus elegantem quam arduam, parumq; ab alijs dissectionis professoribus animaduertam seriem, in tertio libro exequar.

n, o 2 Animum accommoda quartæ figuræ palato, in quo his characteribus ampla narium foramina septo quodam insigni x notato interstincta, & in faucium amplitudinem è naribus tendentia, n ac o indicantur. Hæc etsi homini ad plurima conducant, præcipue tamen naturali inspirationi uociq; idonea censentur.

p 2 Foramen hoc iuxta posteriorem dentium incisoriorum sedem expalato in narium amplitudinem definit, quartisq; maxillæ superioris ossibus commune habetur. Deinde hominibus unicum adest, equis uero & canibus geminum. Paratur autē gratia connexus, consensusq; tunica palatum succingentis, cum illa quæ narium amplitudini obducitur. Portiuncula enim illius tunicæ simul cum uenula, & item arteriola, id pertransit.

q 2 Ad palati finem iuxta maxillæ superioris sexta ossa, uirineque duo uisuntur foramina: unum a quidem altero prius, & amplius. prius enim antierius ue ac λ insignitum, notatu digna est amplitudinis, ex palato sursum in posteriora ad oculi sedis uerticem radicem ue properans. Inibi enim definit, ubi foramen occurrit, quod alterum pituitam in nares expurgantium esse retulimus, atque sub litera o iam antea descripsimus. Posterius autem x notatur, estq; exiguum omnino, & sursum ascendens, aliquando in idem foramen cum anteriori λ insignito terminatur. Interdum uero peculiarem terminum, in futura cuneiformi offi & quarto superioris maxillæ communi adipiscitur.

*Foraminula
per caluariæ
amplitudinem
per se obuia.*

Præter foramina hæcenus commemorata, si caluariam in manus sumpseris, alia quamplurima (sed exilia) obseruabis, uenis transmittendis & membranarum nexibus exculpta. Visuntur uero huius generis aliqua è directo maioris interioris ue anguli sedis oculi, iuxta futuram secundo & tertio maxillæ superioris offi & frons offi communem. Hæc in cavitatem pertingunt, inter frontis offis squamas comprehensam, & K prius indicatam. Horum quoque sedes in prima præsentis Capitis figura, T & V indicatur: quibus characteribus nuper dictam futuram suo loco expressimus, quemadmodum & commemorata iam ossa r, Δ & o inibi insigniuntur. Deinde in frontis quoque osse iuxta superciliorum sedem huiusmodi quoque occurrunt foraminula, quemadmodum & in utroque nasi osse, quod quintum superioris maxillæ recessimus. Insper in primo maxillæ osse, quod externum oculi sedis angulum constituit, unum aut alterum huius generis foramen inuenitur. Præterea offis cuneum referentis latera, quæ temporum caua cum alijs ossibus constituunt, tali quoque foramine donantur. Ad hæc, in lateribus sagittalis futuræ in uerticis ossibus, & potissimum iuxta futuram

ff. Δ similem, talia etiam apparent, quorum sedes in quarta figura aliquot f in umbra latitantibus indicatur. Verum præter commemorata unum notatu digna magnitudinis habetur interius in frontis osse, quæ octauo capitis offis anterior pars ipsi committitur, & anterior septi pars olfactus organorum sinuum cernitur, nimirum inter tertiæ figuræ m & n conspicuū. Pertingit autem hoc foramen in frontis offis concavitatem, superius K indicatā. In quarto quoque superioris maxillæ osse, iuxta magnū interiorem ue oculi sedis angulū, dicti iam ordinis foramen etiam se offert. In basi uero offis cuneum imitantis extrinsecus, quæ id septo narium committitur, subinde quina numero uisuntur, ac tria quidē μ, ν, ξ insignita posterius consistūt, utrinque nimirum unum, & in horum medio tertium, quæ antrorsum instar arcuissimorum meatuum producta, in narium amplitudinem definunt, quamuis interim medij foraminis ν indicati finis setam rarius admittit. Alia autē duo quæ ω & o insigniuimus, antierius incipiūt, & recto tramite antrorsum quoque cōcendentia, in oculi sedis uerticē radicemq; terminantur. Ceterum horū foraminū termini hic cōmodè delineari nequeunt, quare etiā eo uehementius hortor, ut ex hominū caluarijs potius, quam ex nudis ossium picturis hæc discas, foraminis cuiusq; sedis coniecturā hinc à characteribus sumens, & cōsideratē, an me aliquod foramen notatu dignū præterierit, expendēs. Super sunt adhuc in tertia figura & quarta Græci maiusculi characteres, quibus in futuris caluariæ indicandis, iam pridē uisum: adeo ut nullus præter α enarrādus sit reliquus, quo sinus quidam in uertice notantur, quibus duræ cerebri membranā innasci audies. Atq; horum sinuum non eadem semper est series, quippe modò nulli, modò pauci, modò plures, atq; hi uarij, cernuntur: proflētō (si quis me audit) illis animaduertēdi, qui nimis promptè hanc uerticis sedē urunt, aut in ossium fracturis nimium intrepidè ac confidenter terebrant. Huc quoque referre sinus duos cuneiformis offis, in ipsius medio antrorum modo repositos, nisi iam antè in eius offis historia

ipso

ad fig. 2. d.
pachion.
preposita
inferius 2.
b. Eius de fi-
gure humi-
lun 2.

at fig. 16. 7.
K.

ipſos deſcriptiſſem, perinde ac amplas cavitates in quartis maxillæ ſuperioris oſſibus ad na-
rium amplitudinis latera reſoſitas.

DE OSSE v GRÆCORVM LITE-
ræ imagini comparato. Caput XIII.

PRIMA
DECIMI
terrij Capitis ſi-
guræ



SECUNDA
FIGURÆ.



PROPOSITARVM HIC FIGVRARVM ET EARVN-
dem characterum Index.

PRIMA præſentis Capitis figura, anteriorem faciem exprimit oſis v imaginem
referentis, unâ cum minoribus elatioribus vè ipſius lateribus, & oſſiculis, quæ his uſque ad tem-
porum oſſium proceſſus in ſtyli modum efformatos connectuntur.

ALTERA figura, poſteriorem oſis v referentis regionem commonſtrat, ſimul
cum elatioribus coſtis: uerùm interim illis oſſiculis nō delineatis, quæ ad proceſſus ſtyli ſpeciem
exprimentes pertingunt, prioriq; figura delineantur.

ABC Grandius mediũq; oſis hyoidis oſſiculum, anteriori ſede conſpicuum. Verùm **A**
& **B** gibbam huius ſedis regionem indicant. In horum characterum medio peculiare huius re-
gionis apparet tuberculum * notatum. **C** autem indicat ſuum tranſuerſim oblongum, & in ſu-
periori medij iſtius oſſiculi ſede obuium.

D Poſterior grandioris oſſiculi ſedes, ſinuata & caua.

EF Humiliora oſis hyoidis latera, quæ cum medio oſſiculo figuram v ſimilem repræſentant.

G Connexus humilioris lateris, cum latiuſculo grandioriq; hyoidis oſis oſſiculo.

H Humilioris lateris apex, qui laryngis cartilaginis ſcutum exprimentis proceſſui alligatur.

IK Superiora hyoidis oſis latera, humilioribus longè tenuiora, magisq; teretia.

LMN Tria oſſicula ſuperioribus lateribus utriq; ut plurimum commiſſa. Cæterum ad hyo-
idis oſis inſpectionem etiam faciunt præter quintam muſculorum tabulam ad characterem **L**,
prioris aliquot figuræ duodecimi Capitis libri ſecundi ad **A**, **B**, **C**, **D**.



LARYNGIS eminentiſſimæ parti os unitatis nomine comprehen-
ſum, ſed uarijs multiplicibusq; oſſiculis extructum, præponitur, quod
nonnulli à literæ v figura vnoſſe, alij ſuccinctius vnoſſe appellant:
qua uoce diſſectionum rudes deluſi, in Galeno os ſuam referens uer-
terunt. Alijs ruruſum id os à **A** imagine λαμβανός nuncupatur: quo
etiam nomine interpretes decepti, futuſam capitis **A** literæ ſimilem
uertere conſueuerunt, cuiuſmodi tamen mendas pro noſtra uirili nuper
ex Galeno, quem & Italia & Germania latinū dedit, ſubduximus. Herophylus quoq; id os
σπέρτω appellauit dicitur, fortè quòd lingue, aut laryngi, aut faucibus apponatur, quæadmodū
ipſi in organoſ generationi famulantibus quædam ἀσπέρτης λεγομένης, & ἀσπέρτης ἀσπέρτης
uocantur. Non deſunt etiā, qui quum in faucibus conſiſtat, id φάρυγγος nuncupauere. Nos
uerò paſſim id os v referēs, aut uoce contractiore hyoides nominare inſtituimus. Homo igitur
hoc os longè aliter, quàm quadrupeda, quæ hæcenus aggreſſi ſumus, extructum obtinet, ac
maximum hyoidis oſis oſſiculuſ eſt latiuſculuſ, & foris gibbum, priuatoq; tubere prominēs:
intus autē, ſeu poſteriori ſede, cauum. in anteriori etiam ſede ſuperius quaſi in oblongū ſinu
deprimitur, pro figuræ nimirum ipſi idoneæ, & muſculorū ligamentorumq; illi cōmiſſorum
ratione. Superiori enī ſinu implantatur tertius & quartus huius oſſis peculiareſ muſculi:

Oſis hyoidis
ſuus & nomi-
na.

Medium hy-
oidis oſis oſſi-
culum.

ad tuberis uerò in hac sede conspicui latera, quæ quodammodo in gibba sede sinuantur, insertionem tentant: duo primi huic ossi peculiare musculi. Ex posterioris autem sedis cauo musculi⁶ duo priores linguam mouentes præcipue enascuntur. Præterquam quòd gibba extrorsum, caua uerò introrsum, atque ab iniurijs extrinsecus occurrentibus remotius opportunè collocentur. Grandius id ossiculum supra laryngem paulò cõstans, tangentibus occurrit, ipsius interim lateribus penitus ferè latitantibus. Huic enim latiori ossiculo utrinq³ alia duo uniuntur. Atq³ horum alterũ humilius est, alterum elatius. Humilius ossiculum nonnihil breuius, latiusq³ superiori est, nulliq³ alteri ossi committitur, quàm lateri medijs ac latiusculi hyoidis ossis ossiculi, ad quod cartilaginis ligamentiq³ cartilaginei interuentu ualide, & notatu digna amplitudine necitur. Verum⁸ finis ipsius¹ superiori processui cartilaginis laryngis, quæ scuti imaginem exprimit, colligatur. Inferius hoc ossiculum seu latus unà cum suo coniuge, qui in altero cõstitit latere, humilior hyoidis ossis latus merito appellamus, aliquot musculis admittendis & producendis aptum. Atque hæc humiliora latera simul cum medio grandiori ossiculo, u⁹ imaginem pulchrè efficiunt. Porro superiori ossiculo seu lateri quod magis teres uisitur, alia rursus oblonga teretiaq³ ossicula tantisper cõtinua serie uniuntur, quousque ipsorum fines propter radicem² processus temporis ossis, quem scriptorij styli formam ostendere iam sæpius commemoratum est, temporis ossi inserantur, uti in quadrupedibus uidere est manifestissimè. Hæc ossicula superioribus hyoidis ossis lateribus commissa, non pari semper obseruantur numero, ut plurimum tamen terna quaternæue utrinque cernuntur, quanquam etiam interdum, idq³ maximè in mulieribus, hæc ossicula uiderimus simul cum superioribus lateribus omnino deesse, & ipsorũ uicem teres quoddam, ualidum & oblongum ligamentum gerere, hyoidiq³ ossi & stylum imitanti processui colligari. Quod etiam non semel animaduertit mihi admodum familiaris RENALDVS COLVMBVS, nunc sophistices apud Patauinos professor, Anatomes studiosissimus. Hyoidis igitur os neque liberum, neque ulli contiguum esse ossi, superiora ossis indicant latera temporum ossibus cõnexa. Deinde & inferiora quoq³ latera, cartilaginis scuto similis processibus ligamenti beneficio cõmissa, idem attestantur. Cartilagine enim laryngis, ut & costarum cartilagine, ossium præbent usum, & quod ad contiguitatem spectat, in ossium quoque classem recensentur. Verum quoniam hyoides os non adeò firma basi, atque reliqua ossa, nititur, proprijs id musculis in omnem positionis differentiam ita trahi in secundo libro narrabimus, ut neque in latera, neque sursum aut deorsum, neque prorsum aut retrorsum promptè ex sua sede dimoueri queat. & quamuis id minimum homini obtigerit, maximos tamen plurimosq³ usus præstat: qui tunc enarrabuntur, quum⁷ aliquot linguæ musculos ab ipso enasci, linguæq³ fundamenti tutissimæq³ basis modo subijci, & musculorum laryngis quædam principia porrigere ostendemus.

DE DORSO, ET GENERATIM DE
ipsius ossibus. Caput XIIII.

SVBSEQUENTIS FIGVRÆ AC IPSIVS
characterum Index.

FIGVRA proximam paginam occupante dorsum, quod Græcis *σάχη* & *ὄστρον* dicitur, à latere expressimus, ut primum totius dorso ossium contextus cerneretur, ac postmodum singule ipsius partes priuatis Capitibus delinearentur. Cæterum quum tres figuræ, & earum præcipue tertia, ad præsentis libri calcem posita dorsum pariter commonstrent, non abs re illas etiam obiter intueberis, unà cum tertij libri figuris, neruorum à dorsali medulla originem ducentium seriem exprimentibus, atque ad undecimi eius libri Capitis initium repositis.

- A, B Collum septem constans uertebreis, quæ numeris internæ ipsarũ sedi appositis sigillatim notantur.
C, D Dorsi pars thoracem constituens, quam nonnulli simpliciter dorsum nuncuparunt. alij uerò, quod ueluti post septum transuersum consistat, metaphrenum. alij, uti iam dicebamus, dorsi partem, qua thorax constituitur. Hæc ut plurimum duodecim formatur uertebreis, quibus thoracis costæ articulantur. unde etiam ille costarum, ut & thoracis uertebre nominantur.
E, F Dorsi pars quinque lumborum uertebreas complectens.
G, H Os sacrum, quod tantisper sex ossibus seu uertebreis in homine effingi dabis, quousque ossis sacri descriptionem priuatim persequutus fuero.
I, K Os coccyx, quod etiã quatuor ossiculis efformari tantisper annues, dum & id descripsero.

L, L & c.

Latera hyoidis ossis.
Humiliora.

Superiora latera & commissa ipsius ossicula.

Quæ hyoides os firmatur.
Ipsius usus.

f. 4. musc. 14
bulæ S. T.
& alij eius
ossis musculi
li Q. V.
g. 1. 2. fi.
ca. 19. lib. 2.
D. D.
b. V. n. 1. 2.
fi. E. F. Alie
iam I. K.
i. 1. 2. fi. G.
h. 1. 2. fi. H.
l. 3. 4. fi. ca.
38 A. B.

m. 1. fi. L. M.
N.
n. 3. 4. fig. 6
ca. i.

o. 1. 2. fig. 19
ca. lib. 2. D.
D & E.
p. 1. 2. fi. ca.
21. lib. 2. F.
dein 2. 3.
figure K.

L. L. Aliquot vertebrae L insigniuimus, nimirū in tota dorsi compage secundam, nonam, decimam, & c. octavam & uigesimā quartam : ita indicaturi vertebrae partem, seu sedem, quam ipsarum corpus nuncupamus.

M, M in ijsdem uertebreis uisitur, in quibus *L* occurrit, processus notans in latera exporrectos, atq; ideo transuersos, aut laterales nobis appellatos. Quod uero nō solæ uertebrae *L* insignitæ corporibus, & *M* indicatæ transuersis processibus donentur, neminem latere arbitror, etiam si singulas uertebbras characteribus non obruamus. Acque id etiam de subsequentibus notis existimandum uenit: quippe si quid proprii cuiuspiā obtigerit uertebrae, hoc Capite id explicare haud instituiamus.


[illegible]

O, O *Quisfuit in uerterbris, quæ nuper cõmemoratis subiiciuntur, indi-*
 C. *catus uerterbrarum processus sursum fpectantes, quibus superpo-*
sita subiacentibus articulantur. Hos, rectè descendentes pro-
cessus nuncupabimus.

P, P *P*illis inscribitur uertebreis, quas prius *L*, *M* & *O* insigniui-
mus. notantur autē uertebraiū processus in corporis posteriora
exerti, & aculeo ac spine non absimiles. Vnde etiam Græcis
ἐκταδες, Latinitis uerō spine nuncupantur, atq; hinc quoq; totam
uertebrearum compagem, ἐκταδεις & spinam uocamus. In oratio-
nis autem contextu, hos processus ferē posteriores uertebrearum
processus aut spinas nominabimus, totum dorsum hoc nomine ra-
rius appellaturi.

Q. Q. prope easde reperis vertebrae, quibus postremo enarratas
 &c. characteres inscripsimus. A. Nulla vertebrae notat partem,
 sed foramen in vertebrae consistens lateribus, & nervos a dor-
 sali medulla pullulatos transmittens. Quam vero hoc foramen
 in dorso obsequi varium sit, in peculiari ipsorum descriptione per-
 tractabitur.

R, R Cartilagineum notatur ligamentum, uertebrae corpora interueniens. quod Galenus cartilaginem puram esse, contra ueterum placita contendit: uerum quam recte, secundi libri uigesimo septimo Capite docebitur, inibis figuram proposituri huic narrationi non inutilem, qua aliquot uertebrae delineabuntur corpora, cartilagineum hoc ligamentum, uertebrae ac corporum appendices, & cartilaginem quae corpus uertebrae ac appendicem intercedit (ut in pueris haec se habent) exprimentia.



in triū subse
quentiū ca.
figuris id so
ramen ob
uium est.

de cenſura uiam præparans, Secundo, non ex incompolito ſimpliciſſime uniuerſum conſtituitur.

Naturæ in
dorsi creatio-
ne industria
Vt id susti-
neat.
Vt dorsalis
medullæ uia ef-
ficiatur, & in-
terim mobile
sit.

tuit dorsum, quamvis id ad stabilitatē & tutā dorsalis medullae sedem satis fuisset: quū neq̃ lu-
xari, neq̃ excidere aut distorqueri posset, nisi ita variē esset articulātū. Verum si rerum Opifex
tantū patiendi pertinaciē animū adhibuisset, neq̃ in organorū fabrica ullum priorem dignio-
rem uel spectasset scopū, non aliter sanē quā prorsus in compositū simplexq̃ dorsum creasset.
Quippe si quis lapideum, aut ligneum animal confingit, non aliter dorsum quā unica conti-
nuāq̃ parie fabricat. Homini uerō dorsum inclinaturū, aut erecturū, non erat melius id uni-
uersum unico ossē fabricari. quinimo cum dorsi beneficio hominem multis ac uarijs motibus
agi oporteat, satius fuit hoc ex pluribus constitui ossibus, utcunq̃ etiam hoc nomine iniurijs
magis reddatur obnoxium. Quamobrem uerō dorsum non ex duobus uel tribus ossibus, tam
longis quā in manu est humerus, & ulna cum radio: in crure autem femur, & tibiae os cum fi-
bula: sed ex quatuor & triginta efformetur ossibus, uariē mutuo articulatis, in praesenti subijci-
endum est, à praecipua totius dorsi particula sumpto orationis exordio. Est autem haec^b dor-
salis medulla, quam instar cerebri partibus sub capite locatis esse tunc nitemur ostendere, quum
quarto libro neruorum seriem pertractabimus. Quoniam itaque hanc similiter ut cerebrum,
duro & promptē iniurias repellente munimēto custodiri oportebat, dorsum instar carinae hu-
mano corpori subiectum, omnino insculpi, iterq̃ simul & tutissimum uallum ac (ut Graeci di-
cunt) *σπυγγή* ipsa, ipsi medullae confici debuit. Huius enim natura cerebro respondet, & noxae
quae hac affecta hominem afficiunt, illis conferuntur, quae cerebro laborante indies oboriri
cernimus. Motus siquidem & sensus omnium partium quae laesa sub sunt uertebrae, uiciantur.
Sed haec quidem neminem latere, Galenus attestatur. Quamobrem uerō diuinus Hippocra-
tes libro de Articulis prodiderit, si plures uertebrae uno ordine inuicem subsequentes transmo-
ueantur, graue esse: si autē una ex ceterarū compage exiliat, perniciosum esse: haudquaquam
perinde notum est omnibus. Hippocrates itaq̃ causam symptomatis nos edocet. nam si simul
plures uertebrae dimoueantur, ita ut quaeque paululum transmutetur, & sua sede declinet, tunc
circularis, ac proinde nō uehemens dorsalis medullae obtinget euersio. Si uerō, inquit, una uer-
tebrarum suo contextu dimoueatur, tunc dorsalis medulla paruo intervallo inflexa, afficietur,
& quae exiliit uertebra ipsam comprimet, nisi sanē & rumpat. Quum itaque dorsalis medulla
angularem, eamq̃ subitam & acutam flexionem nequeat perferre, dorsum nō potuit magnis &
laxis articulis insignem transpositionem habentibus, innoxie moueri. Vnde etiam melius fuit,
ex multis & paruis ossibus quae singula ad motum conferunt, dorsum coaceruari. Ceterum
his ossibus non par adest magnitudo, neque omnibus foramen medullam dorsalem transmit-
tens aequa amplitudine exculpitur. Coordinationis enim occasione melius fuit, minores sem-
per fieri superiores: modò id quod portatur ab aliquo, minus esse conueniat portante. Hinc
igitur^c maximum dorsi ossium sacrum os à Natura creatum est, & ueluti basis quaedam uigin-
ti quatuor uertebri subijcitur, duobus cōmissum^e maximis ossibus, quae unā cum ipso cor-
pus maximē stabiliunt. Secundum uerō dorsi os magnitudine, si à sacro sursum ascendas, uer-
tebra est sacro ossi coarticulata, à prima quidem iacēs quarta & uigesima, ipsarumq̃ in lumbis
uertebRARUM ordine quinta. Porro aliarum singulae quantum posita ab infima discedunt, tan-
tum & mole. Atq̃ haec magnitudinis diminutio usque ad ipsum caput perficitur, praeterquam
si quando uertebra interueniat paulò maior subiecta, quod sanē non absq̃ magno usu fieri,^f pri-
mae ceruicis uertebrae descriptio ostendet, quae illam reliquis ceruicis uertebri latiore esse
docebit, gratia commodae quinti & sexti caput mouentium musculorū insertionis, & secun-
di scapulum attollentis musculi exortus. Atque inibi etiam articulationis nomine, secundam
ceruicis uertebra ualidiorem grandioremq̃ tertia esse audies. Quia uerō Natura nullius oc-
casionē uertebrae in posteriori suorum corporum sede exculpit, quā ut iter^g dorsali me-
dullae pararet, oportuit sanē foramen magnitudine cum dorsali medulla congruere. Haec au-
tem quum in singulis uertebri sit impar, & in primis uertebri maxima (gignendis enim ner-
uis sensum confringitur, attenuaturq̃) optimo iure superiorum uertebRARUM foramen inferio-
rum foramine amplius est. Dein quū superiores uertebrae amplo foramine exculpi debuerint,
& interim alijs innitantur uertebri, promptē colligitur, illas quoque simul tenues necessariò
extructas esse. Neque dorsali medullae duntaxat uia in uertebri exculpitur, uerum etiam^h tri-
ginta neruorum paribus in homine à dorsali principiū ducentibusⁱ tutissimae uiae foraminaq̃
in uertebri caelantur, quae in neruorum serie exequar. quamvis in priuatis uertebRARUM descri-
ptionibus quaedam illorum foraminum mentio subinde incidet: praecipue quòd in omnibus
uertebri non eadem specie, neque pari etiam numero insinuantur. Quum igitur dorsalis me-
dulla ueluti alterum cerebrum omnibus propemodum quae sub capite consistunt organa ha-
beat, & dorsum ipsi uia & uallum quoque tutum fabricetur, rerum Opifex alia permulta mi-
randaq̃

*Dorsi ossium
multitudinis
causa.*

*Libro 12 de
Vsu partium.*

*Dorsi ossium
nō par magni-
tudo, neq̃ dor-
salis uiae aequa
amplitudo.*

*Foramina ner-
uis emissis
parata.*

*VertebRARUM
spina.*

*b Tres figu-
rae in capiti
li. 4. praepo-
sita.*

*c G. H. Aut
in integris
fig. M. cū o.
d. f. aut cha-
racter 24.*

e A. aut 1.

*f. 1. H. musc.
tabula 14.
g. Eadem ta-
bula 1. K.
h. 13 musc. ta-
bula 2.
i. 1 fig. ante
11. ca. li. 4.*

*h Tres fi. ca-
piti u. li. 4.
praeposita.
l. 2.*

P, P, P. randaq; circa uerthebras molius est, quippe ex medio posteriorum partium^m spinam produxit, instar sepiis & ualli totius dorſi; hanc primam proponens, frangendam & conterendam, modisq; omnibus passurā, priusquam noxa inferatur cuiuspiam uerthebræ, & ipsa dorſalis medulla lædatur. Posterioribus his processibus inⁿ plurimis uerthebris appendice donatis cartilago obnaſcitur, idoneū subditorum propugnaculū, ut quæ nec frangi nec rumpi, modo fragilium friabiliumq; ac durorū, neq; incidi & quassari perinde ac mollia carnosaq; queat. Præterea sin gulorum processuū quos spīne modo extuberare diximus, magnitudo in omnibus uerthebris inæqualis quodāmodo cernitur, mirificè & hoc pariter prouidente Natura. Nequaquā enim in ijs locis in quibus eandem sedem cum dorſali medulla pars quæpiā primaria sibi uendicat, æquum erat negligere eius partis dignitatem: neq; in locis sola occupatis medulla, prælongas educi spinas, erat iustum. Quemadmodum neque expediebat ē paruis uerthebris longam enaſci spinam, neq; ē grandibus breuiem. Ratione igitur optima, quoniam in thorace cor lo catur, & magna arteria dorſo incumbit, in his dorſi partibus Natura longissimas produxit spinas, in alijs uerō sedibus breuiiores. Verthebrarum quidem lumborum corpus grande est, illisq; intus magna arteria & cōcaua uena suffulcitur, sed ossis sacri moles est maior & insignior, nullum ta men interim præcipuū ei præiacet organum. Par igitur erat posticos processūs secundum uer thebras thoracis, maximos in lumbis educi, in sacro autem ossē breuissimos. Cervicis uerō uer thebræ quum tenuissimæ omnium sint, non potuere nancisci processūs longos simul, & inno xie iniurijs ferendis aptos: quum hileui occasione propter tenuitatem rumperentur. Quemad modū itaq; dicti nunc processūs spinā efficientes, propugnaculi uicem gerunt: ita & alijs pro cessibus, nimirum^o tranſuerſis uerthebræ donantur, quæ partim ueluti sedes quædam dorſum mouentibus musculis submittuntur, quemadmodum & spinæ ad musculorum productionem inſertionemq; eo usu potissimum iuuant, cuius gratia generatim omnes ferē ossium processūs montium colliculorumq; ritu extuberare ac educi, prius nō semel relatū est. Omnibus enim his uerthebrarum processibus musculi accumbunt cum arterijs, uenis, neruis, ad ipsos & per ipsos delatis.^p Verū alius quoque tertius usus tranſuerſorum thoracis uerthebrarum processuum prædictis accedit, quo aptam costis sedem porrigunt, cui illæ articulantur. Quia autem dor ſum instar unius corporis ex uerthebris efformari debuit, quod simul firmum, & forte, & ad mo tus promptum eſſet, magnopere laudanda uenit Natura, quæ dorſum ambobus uſibus (etſi contrarijs) idoneum conſtruxerit. Omnes enim uerthebræ ad sacrum uſque os (ſi duas prio res exceperis)^q in anterioribus quidem sedibus sibi mutuò amplis corporibus turō colligan tur,^r posteriori autem sede duplicibus articularis coarctantur, ubi etiam robur propter antero rem compagem nanciscuntur. Moueri itaque uerthebræ non prohibentur, quòd corporibus mutuò non connascentur, & poſtica sede non obscuris articularis ſint diſtinctę: atque hac etiam ratione antrorſum ualde inclinari poſſumus, retrorſum uerō nequaquam. Rumpes enim, ſi coëgeris membranea, quæ uerthebrarū corpora colligant, ligamenta, cum alio cartilagineo liga mento inter uerthebrarum corpora reposito, itaq; corpora connectente, ut uerthebræ non ad modum à connatis differant. At horum ligaminum naturam ſubſtantiamq; ut & cæterorum omnium, ſequens liber accumulatè pertractabit. Quoniam uerō nō æquē tutum erat dorſum antrorſum retrorſumq; flexi (ita enim inſirmum ac inſtabile & laxum penitus eſſet) Natura quod ſatius eſt, iure prælegit. Ad uniuerſa etenim uitæ munia cōmodius eſt, dorſum in priora flexi, dein hæc quoq; flexio uas ſi dorſo ibidem incumbētibus, magnæ ſcilicet arteriæ, & con cauæ uenæ, minus moleſtiæ inferat, quum aliās plurimū extenderentur. Quia igitur oportuit dorſum anteriori ſede ad amuſſim ſtringi, meritò uerthebræ in poſtiori ſede laxius articulan tur. Cuius autem formæ ipſarum ſint articuli, unā cum his quæ de ſingulis uerthebris dicenda ſu perſunt, iam addemus. Sunt enim in uerthebris pleræque differentiæ, paſſim incredibilem Na turæ induſtriam oſtendentes, ob idq; quatuor modò ſequentibus Capitibus non perfunctō riē aut obiter enarrandæ, quorum primum colli cervicalis uerthebris, ſecun dum thoracis, tertium ijs quæ in lumbis habentur, quartum autem ſacro oſſi coccygiq; oſſi dedicabitur.


Cartilagoſſi
nari apicibus
obnata.

T^ranſuerſi
processus.


V^rerthebrarum
coarticulatio.

Cōmodius fuiſſet
ſe dorſum fle
re antrorſum.


PRIMA XV CA-
PITIS FIGURA.




SECUNDA.



TERTIA.




QVARTA.



QVINTA.




SEXTA.



SEPTIMA.

OCTAVA.

NONA.



DECIMA.

VNDECIMA.

VNDECIM

DE HUMANI CORPORIS FABRICA LIBER I. 61
VNDECIM CAPITIS DECIMIQUINTI

figurarum & earundem characterum Index.

- P R I M A** præsentis Capitis figura, occipitij ossis partem ab alijs ossibus liberam, & in externa caluaria basis sede hic conspicuam exprimit.
- Secunda**, primam ceruicis uertebrae anteriori superiorq; facie expressam proponit.
- Tertia**, primæ ceruicis uertebrae superiorem posterioremq; imaginem oculis subijcit.
- Quarta**, primam ceruicis uertebrae inferiori posterioriq; facie delineatam exhibet.
- Quinta**, secundæ ceruicis uertebrae anteriorem commonstrat faciem.
- Sexta**, secundæ ceruicis uertebrae posteriorem faciem designat.
- Septima**, secundam ceruicis uertebrae inferiori facie spectandam offert.
- Octaua**, tertiæ ceruicis uertebrae anteriorem superioremq; faciem ostendit.
- Nona**, tertiæ ceruicis uertebrae posterior superiorq; facies delineatur. Quoniam uerò huius ceruicis uertebrae inferior sedes secundæ uertebrae inferiori sedi respōdet, illam hic non apponimus, ne forte præsentī Capiti nimis tabularum acruus præponatur. Atq; hac etiam ratione, cæteras ceruicis uertebrae tertiæ subiectas singulatim non depinximus, præcipue quum illarum descriptio ex triū superiorum uertebrae figuris, promptè desumi queat.
- Decima**, trium primarum ceruicis uertebrae compago, anteriori parte depicta cernitur.
- Vndecima**, trium primarum ceruicis uertebrae contextus posteriori facie exprimitur.
- A in 1** Foramen in occipitis osse, dorsalis medullæ gratia excisum.
- B 1** Dextrum occipitis ossis capitulum, quod primæ coarticulatur ceruicis uertebrae. Sinistrum uero capitulū, **C, D, E** & **F** insignitur. Siquidem **C** & **D** capituli notant longitudinem, seu du
- E, F 1** Eum, quo longitudinem in horum capitulorum descriptione metimur. Dein **E** insinuat internū latius capituli, quod magis deorsum, quam externum **F** insignitum, deprimitur, aut non æquè sursum prominet.
- G 1** Anterior foraminis dorsalem transmittentis sedes, quæ ob teretis cuiusdam ligamenti inscriptionem aspera & inæqualis est.
- H 1** Sinus in posteriori sede utrorumq; capitulorum occipitis ossis incisus, ac utiam primo dorsalis medullæ neruorum pari porrigens.
- I 2, 3, 4** Foramen transmittendæ dorsali medullæ in prima ceruicis uertebra exculptum.
- K 2, 3** Hic primæ uertebrae corpus exculpitur, secundæ uertebrae dentē, qui **Γ** notabitur, suscepturum.
- L 3, 4** Sinus in posteriori sede corporis primæ uertebrae incisus, ac cartilagine incrustatus.
- M 2, 10** Processus & tuberculum, in anteriori corporis primæ ceruicis uertebrae sede prominens.
- N 2, 3, 10, 11** Dexter primæ uertebrae sinus, quo dextrum occipitis ossis capitulum excipitur. Sinistrum sinum in secunda & decima figuris **O, P, Q, R** notauī: **O** quidem & **P** eius sinus longitudinem indicaturus: **Q** uerò, internum latus, longè ipso exteriori **R** insignito declinuius.
- S 2, 3, 4, 10 & 11** Transuersus primæ ceruicis uertebrae processus dexter. Sinistrum uerò characterē non insigniuius, quòd utriusq; eadem sit ratio. Sic etiam ipsius foramen in sinistro tantum latere secundæ & undecimæ figuræ **T** notauimus.
- V 3, 11** In dextro tantum latere sinus indicatur, qui cum occipitij ossis sinu **H** notato commune efficit foramen, quo primum dorsalis medullæ neruorum par elabitur.
- X 3, 4, 11** Hac sede prima ceruicis uertebra posteriori destituitur processu, & inibi duntaxat uisitur acutum exiguumq; instar lineæ prominens tuberculum, ad cuius latus hæc sedes aspera est.
- Y 4** Dexter primæ ceruicis uertebrae sinus, dextrū secundæ uertebrae tuber c signandum excipiens.
- a, b.** Sinistrum sinum a & b notauimus: a quidem internum ipsius latus, b autem externum indicantes.
- c 5, 6** Dextrum secundæ uertebrae tuber, seu insigniter depressum capitulū, cōmemoratum iam prius primæ uertebrae sinum **Y** insignitum subingrediens. **d, e, f** sinistrum ostendunt capitulum. **V** erum d priuatim latus ipsius notat internum elatiusq; e uerò externum, & depressius, f autem eam capituli partem, quæ ad posteriora ueluti extra circuli circumferentiam educitur.
- Γ 7, 10, 11** Secundæ ceruicis uertebrae processus, quē a dentis imagine dentem uocabimus, quīq; in quinta figura & decima & undecima etiam conspicitur. **V** erum bunc in septima, decima & undecima **Γ** insigniuius. In quinta autem & sexta figura pluribus notatur characteribus priuatim

F aliquid

- g. h.* aliquid significantibus. *g* enim in quinta tuberculum ipsius notat cartilagine obductum. *h* in sexta, notat posteriorem dentis sedem, quæ crassior est, magisq; quam dentis radix in posteriori ora extuberat. *i* sinum indicat, ad quem transuersum ligamentum aduoluitur, quod dentem in pri
k, l. ma uerthebra constringit ac continet. *k* & *l* utrinq; sinus insignitur ad dentis principij radices ue
 latera incisus, atque anterioris secundi neruorum dorsalis medullæ paris propagines admo
 dum exiguas transmittens. Cæterum foramen, hoc sinu & primæ uerthebræ sinu, efformatū in un
m. n. decima figura *m* signatur. Postremo *n* in quinta figura dentis notat mucronem.
o 3, 11 Sedes dextri lateris notatur aspera, inter primæ uerthebræ superiorem sinū *N* indicatum, &
 inferiorem *Y* indicatum consistens, ubi foramen non peruium conspicitur.
p 6 Sinus dextri lateris, ad posteriorem dextri secundæ uerthebræ tuberis *c* insigniti sedem excul
 ptus: & commune foramen uiam ue constituens, qua secundum neruorum dorsalis medullæ coniu
q. gium in posteriora profilit. In quartæ figuræ sinistro latere *q* positum cernis, sinum hunc primæ
r. ceruicis uerthebræ notans. In dextro autem latere decimæ & undecimæ *r* reposui, ipsam ner
 uorum uiam in altero latere utcumque significans.
f 5, 6, 7 Posterior processus, seu spina secundæ ceruicis uerthebræ, quæ etiam in decima & undecima fi
 guris parte superiori, in septima uerò inferiori est obuia.
t 9 Tertiæ ceruicis uerthebræ spina, quam & undecima figura ostendit. Spinæ autem huius apices
 in octaua *z* & *ω* notantur, ipsa uerò spina illic numero *u* indicatur.
u 5, 6, 7 Dextri lateris transuersus secundæ ceruicis uerthebræ processus. Sinister etiam citra chara
 cterum operam in illis figuris, quemadmodum & in decima & undecima utriusque lateris pro
 cessus promptè cognoscitur.
x 5, 6, 7 Foramen transuersi secundæ ceruicis uerthebræ processus.
y 5, 6, 9, 10 Transuersus sinistri lateris processus, tertiæ ceruicis uerthebræ. Verum *y* internam partem, &
 autem externam notant. Porro octaua figura transuersus dextri lateris processum his notis *7*
 & *s* indicat, sinistri autem lateris processum istis notis *9, 10*.
a 8, 9 Foramen transuersi tertiæ ceruicis uerthebræ processus.
β 6, 7, 11 Dexter descendens secundæ uerthebræ processus, cuius sinus formam septima figura indicat.
γ 9, 11 Dexter descendens tertiæ ceruicis uerthebræ processus, uerum *γ* in nona & undecima posteri
 orè ipsius indicat sedem. Inferior autè ipsius sedes seu sinus, sinui respōdet in septima *β* insignito.
δ 9, 11 Dexter ascendens tertiæ ceruicis uerthebræ processus, ac nona quidem figura ipsius tuber ostē
 dit, quemadmodum & octaua utriusq; ascendentis processus tubera indicat notis *3* & *4* insignita.
ε 5, 6, 7, 10 Sedes, qua secundæ uerthebræ corpus deorsum porrigitur.
ζ 9 Sedes, qua tertiæ corporis uerthebræ corpus decliuus fertur.
η 9 Superior tertiæ uerthebræ ceruicis sedes sinuata. & *η* quidem sinum indicat, θ uerò & *u* utrinq;
 prominentè processum. atq; hi etiam processus numeris *1, 2* in octaua figura insigniti cernuntur.
λ μ ν 10 Anterior secundæ uerthebræ corporis sedes, in qua *λ* prominens indicat tuber, *μ* uerò &
ν utrinque depressa tuberis latera.
1, 2, 3, 9, c. Numeri characteres in octaua figura conspicui, processuum tertiæ ceruicis uerthebræ nume
 rum indicant. Quandoquidē *1, 2* notantur duæ eminentes partes superioris superficiei corporis
 uerthebræ: *3, 4* duo ascēdentes processus. *5, 6* duo descēdentes processus. *7, 8, 9, 10* transuersi pro
 cessus. *11* spina, cuius apices notātur *z* & *ω*. uti & huius uerthebræ inferior pars *q* indicatur.
s 8, 9 Sinus inferiorem partem foraminis constituens, quo tertium dorsalis medullæ par exilit.
τ τ 7 Sinus superiorem dicti iam foraminis partem efformans.

Homo pulmo
num occasione
collo donatus.



VL MONVM gratia hominē collum dari, hinc potissimū cōstat, quod
 id perpetuū unā cum pulmonibus deperditur. Quippe hac occasione pi
 lices (quibus & pulmones defūcti collo destituuntur. Animalibus uerò,
 quibus Natura pulmones dedit, his quoque & collum elargita est. Aspe
 ram enim arteriam qua inspirantes aërem in pulmones ducimus, & rur
 sus expirantes eundem efflamus, ab ore ad pulmones ferri, atque ob id in
 ter os & pulmones spaciū intercedere debebat, siquidem opportuna ef
 fatione (quæ uocis est materia) hominem donari deuit. Nam citra asperæ arteriæ benefi
 cium uox minime perficitur, unde etiam nō miramur, nullū animal collo carens uocem edere.

Quum

a Hæc ostē
dit fig. 1 ca.
38. Vasa au
tē per collū
repentia et
pulmones
fi. calci 3 li.
apposita,
ut & illæ
quæ 4. li. fi
ni insunt.

Quum itaq; pulmones in thorace contineantur, & aspera arteria (quam in os desinere omnino decuit) ex pulmonibus cōfurgat, intervallum elatiorem thoracis sedem & fauces inter cedens, arteria illius gratia creatur. Quia uerò thorax & os inuicem separantur, quantum inier utrumque intervalli mediata, uia eorum efficitur, tam quæ desuper deorsum proce dūt (ut dorsalis medulla & stomachus) quàm eorū quæ ab inferioribus sursum (ut aspera arteria, & multa leues arteriæ ac uenæ) porriguntur. Homo igitur collum asperæ arteriæ gratia nanciscitur, asperam uerò arteriam uocis respirationisq; causa. Quare etiam colli longitudinem homo tantam sortitus est, quanta asperæ arteriæ ad dictas modò functiones ex usu erat. Quinetiam conueniebat partes scapulis conterminas, & brachium, & cubitum, extremamq; manum, præterea & septum transfuersum, à dorsali medulla collum perreptante nervos adipisci: quocirca & propter illorum propagationem, necessum fuit in spacio inter caput & thoracem medio uertebras reponi, quibus collum texeretur. Sunt autē humanæ ceruicis uertebræ septem, quarum nunc naturam usumq; explicare contendā, à capitis colliq; motibus sumpto sermonis exordio. Non enim hic auium quadrupedumq;, quibus longa obtigerunt crura, colli usum recensere proposuimus, quum nemo nō intelligat Naturā his, quòd manibus destituātur, colli maxillarumq; prolixitate ad cibum assumentū prospexisse, hacq; ratione pluribus uertebris collum illis confinxisse. Galenus itaq;, rarum Naturæ miraculum, ipsiusq; operum exquisitissimum interpres, in nullius partis constructione expendenda adeò eruditum solertemq; ac industrium requirit auditorem, atque in capitis motuū, eiusdemq; cum duabus summis uertebris articularū descriptione. Quid multa: tam paucos quæ in duodecimo de Vsu partium, de capitis motibus tradit, assequuturos cōtendit, ac uelut rei difficultate lectorem ita deterret, ut nemini mirum uideri debeat, me quoque hac in parte præceptoris opera penitus destitutum, ea qua licuit diligentia & Anatomes discendā à puero, prorsus obfirmato animo ea perlegisse, ac ut Galeni sensa intelligerē, res ipsas orationi eius sedulo adhibuisse. An uerò frustra negociū attentauerim, tum demum nosces, ubi didiceris me non solum quæ Galenus docere conatur percepisse, uerū Naturæ in articulis hisce artificium, capitisq; motus ab ipso parum recte tradi, tandem etiam intellexisse. Galenus enim capiti duos motus ascribēs, unum in annuēdo renuēdoq;, alterum in latera fieri docet, ac priore quidē intelligit, quo caput antrosum flectimus, inclinamus, annuimusq;, ac deinde quo caput retrorsum reflectimus & reclinamus, ea prorsus functione, qua Thraces & Cretensium plerique hac etiam ætate uidentur abnuere. Illi enim abnuentes, in posteriora caput rectā remouent, subleuant ue: non autem ut nos renuentes, id circumagunt, seu circumducunt. Cæterū altero motu, quem Galenus in latera ducitur, super primam ceruicis uertebram fieri ait, quo caput in latus inclinamus, ac uelut humeris seu scapulis adinuemus. Quòd autem hæc de laterali motu, atque adeò de renuendo annuendoq; ipsius sit sententia, ex quarto de Administrandis sectionibus libro doceberis, si modò accuratè expendas, quo situ Galenus occipitis ossis capitula, quæ primæ uertebræ dearticulantur, locari, assurgere, innitig; afferit, quum in hoc illud uē latus caput agitur, & quum ex Galeni placito renuimus annuimus ue. Huiusmodi enim profectò ipsius de capitis motibus est dogma: quorum priorem, qui annuendo renuendoq; sit, secundæ ceruicis uertebræ beneficio, aut super secundam perfici affirmat: posteriore uerò motum, quo caput in latera ducitur, super primam ceruicis uertebram fieri ait, quemadmodum cū ex pluribus Galeni locis, tum præcipuē ex quarto de Administrandis sectionibus libro colligere promptissimum est. Vt enim illos libros omnīū postremos scripsit, ita quoque suam sententiam & breuius & apertius in illis, quàm aliās, explicuit. Num uerò hoc eius placitum ueritati sit consonum, ipse nunc mecum inquirito, atq; aliter quàm Galenus capitis motus (affectu interim aliquandū represso) cōstituito. Primū itaq;, caput aut primario motu quiescēte collo mouemus: aut secundo, quum scilicet caput colli motum sequitur, etiam si id in aliam partem, quàm collum mouetur, ducere coneris. Proprii capitis motus duo sunt. prior, id antrosum flectimus, retrorsumq; inclinamus, extendimus ue: quem motum conficis aut rigido immotoq; collo, aut collo etiam simul moto, siue id pari motu cum capite agas, siue contrario. Quamuis enim in anteriora collum ducas, caputq; necessariò collum insequatur, nihilominus tamen caput proprio motu in posteriora possis reflectere, atque leui negotio obseruare, collum caputq; proprios & priuatos in flexu reflexuq; motus obinere. Alter proprius capitis motus, is censendus est, quo caput ita circumducimus, seu in gyrum agimus quodammodo, ut rota ad axem reuoluitur. Atque hunc motum etiam quiescēte collo obibis, si modò dextra, modò sinistra uicissim intueri studueris, caput ue circumuerteris. Præfens motus capiti omnino est proprius, & collum illo destituitur. quapropter etiam quocunq; modo collum moueris, hic capitis circumactus commodè perficitur. Flexo enim collo, capiteq; cum

Ceruicis uertebræ septem.

Galenus de Capitis motib. sententia.

Lib. 12 de Vsu partium. 4. de Administrandis sectionibus, cap. 18.

Alia quàm Galeni de Capitis motib. sententia.

Articuli ca-
pituli motibus
parati.

Descriptio
occipitij ossis,
quæ primæ ver-
tebræ articula-
tur.

Primæ cerui-
cis vertebrae
descriptio.

illo inclinato, id facile in gyrum ducis. sic etiam si collum fuerit extensum, aut in latus humero admotum, caput promptè circūagis. Cæterum ut caput uno circumactus motu, quo collum caret, priuatim donatur: ita collum quoque alterum peculiarem motum, quo in latus ducitur, sibi uendicat. Caput enim nullum obtinet peculiarem motum, quo in latus inclinetur, sed collum tantum beneficio motuq; secundo in latus fertur. Quippe nobis denegatum est, caput huic illi ut scapulæ uel minimum ad mouere, nisi collo illic ducto. Duobus itaque proprijs motibus caput donatur, quorum prior, qui flexione ac reflexione perficitur, capitis cum prima ceruicis uertebra articuli sit beneficio: super primam enim uertebam caput flectitur, & reflectitur. Posterior motus, quo caput in gyrum ducitur, super secundam ceruicis uertebam celebratur. Caput enim simul cum prima ceruicis uertebra, super secundam, ueluti ad axem, circumducitur. Atque hæc mea de capitis motibus & articulis est sententia: quæ quantum à Galeni declinet placitis, promptissimè quidem colligis. num autem magis ueritati accedat, ex ossium constructione ligamentisq; hæc committentibus, & musculis illa mouentibus, discito. Cæterum ligamenta & musculos in secundo libro exequar, in præsentī ossa tantum aggressurus, in quorum sermone forsitan quæpiam quoque ligamentorum mentio incidet. Occipitij os ad latera foraminis dorsalis medullæ uiam porrigentis, utrinque unum exiget^r capitulum, magis ad anteriorem foraminis sedem, quam posteriorem uergens. Hæc capitula, si^r priorem posterioremq; ipsorum sedem spectes, oblonga sunt & arcuata, atq; ita prorsus extructa, quasi rotundum aliquod ossis caput, ut femoris scilicet, quod coxendicis ossi articulatur, in duas partes dissectum esset, ac utrinque ad latera foraminis in occipitis ossis incisulpi, una illius capitis pars, reposita. Si enim utraque occipitis ossis capitula internis lateribus iuncta fingas, ex ambobus rotundum (quanquam interim in homine satis depressum) caput constitui cernes. Quæ quum ita sint, facile constat, utrumque capitulum, uti diximus, oblongum esse, atque^r interno latere magis quam^m externo protuberare, ad eum nimirum modum quo in ossis rotundi alicuius capitis media ac in tota superficie magis prominens pars, procerius, quam partes in orbiculo posita, extuberat. Hæc erunt capitula, quæ primæ ceruicis uertebrae inarticulari, paulo posterius scribam. Nunc autem adhuc in occipitij ossis^r asperitas crassitiesq; expendēda uenit, inter duo nuper commemorata capitula, in hoc parata ut ualidior efficeretur insertio^r teretis ligamenti, dentem secundæ uertebrae occipitis ossi colligantis. Hæc asperitas interdum aded insignis uisitur, ut tuberculum aliquod dici mereatur, prominens gratia dicti ligamenti, & nonnihil etiam insertionis^r musculorum collum flectentium nomine. Posterior autem sedes foraminis dorsalem transmittētis, aspera quoque, sed non aded ut anterior crassa est, ac etiam ad posteriorem utriusque capituli regionem, sinus leuiter impressus conspicitur, in hoc paratus, ut cum alio primæ uertebrae sinu utrinque foramen efformaret, quo^r primū dorsalis medullæ neruorū par procederet. Prima ceruicis uertebra reliquis omnibus dorſi ossibus solidior, densior, sed secundū longitudinē tenuior, & forma à cæteris omnibus plurimū differēs est. Foramen namq; ipsi dorsalis medullæ gratia incisum, habet maximū, quod & hic dorsalis sit crassissima. Deinde ipsius corpus^r interiori sede exculpitur, & sinum in posteriori sui corporis sede leuiter incisum ostendit, qui cartilagine incrustatus secundæ uertebrae^r dentem excipit. Corpus enim primæ uertebrae hac ratione cauā, ut dens ille in primā uertebra inibi reponi queat. Cæterum ne prima uertebra hoc modo in suo corpore exculptra, & corpore propemodū destituta, plus æ quo imbecillis inualidatq; redderetur^r processu quodam & tuberculo in anteriori sede augetur, cuius beneficio illa crassescit, robustiorq; euadit: præterquam quod ipsum etiam tuberculum accommodum est suscipiendæ insertioni, primi dorsum mouentium musculorū paris. Eiusmodi itaque huius tuberculi usus est, non autē in hoc producit, ut nimium capitis flexum prohiberet, caputq; in flexione sustineret: aut in causa esset, ut flexum caput alacrius denuò sursum & in posteriora reflecteretur, quemadmodum Galenus in quarto de Administrandis dissectionibus parum rectè asseruit. Nam (ut nihil hic de capitis motu, super quam uertebam scilicet is fiat, dicam) caput nulla ratione eò usque inclinari potest, ut occipitis os id tuberculum contingat, tantum abest ut illo capitis moles suffulciretur. Cæterum prima uertebra ad latera^r cauitatis, quæ secundæ dentem admittit, est ualidissima, & crassissima, & utrobique^r unum ostendit sinum, quo sui lateris occipitij ossis capitulum excipitur. Sinus hi utrinque singuli, ut illis capitulis exquisitè responderent (si^r priora^r posterioraq; spectes) oblongi sunt, & exterioribus lateribus sursum educti, internis uerò profundius non secus profectò, quam si ambo sinus ex uno rotundo profundoq; sinu essent discissi. Si enim coxendicis ossis, aut alterius ossis rotundo sinu donati, sinum diuideres, atque utrinque ad primam ceruicis uertebam, ubi nunc sinus habentur, unam partem collocares, huius primæ uertebrae sinus tibi cōstituerentur. Vel

f. si. A.
g. dextrū
figure B o-
stenditur.
h. fig. C.
i. fig. D.
h. 1, 2 fig. 3 o
cap. A.

l. fig. E.
m. 1. fi. F.

n. 1. fig. G.
o. fig. margi-
gini paulo
post adhi-
bendæ l.
p. eiusdem
fi. H.
q. 8 muscul.
tab. A. B.
r. 1. fi. H.
s. fi. 3. ca. 11.
lib. 4. F.
t. 2, 3, 4. fi.
gur. 1.
u. 2, 3 fig. K.
x. 3, 4. fi. L.
y. 5 fig. G. H.
dem G. 11 fi.
gur. 1.
z. 2, 10 fig.
M.

43 fig. K.
b. 2, 3, 10. fi.
dextrū no-
tant N.
c. 2, 3 fig. O.
d. 2, 3 fi. P.
e. 2, 3 fi. R.
f. 2, 3 fi. Q.
g. 1, 2 fig. 19
c. 4, 5, 6.

fi

si uertebrae sinus simul iunctos fingeres, unicum sinum rotundum profundumq; ex ambobus efformatum cerneris. Quod tanto manifestius adhuc in prima canum & simiarum ceruicis uertebra contueberis, quanto illis animalibus sinus hi altiores profundioresq; ac capita occipitij ossis extuberantiora acutioraq; obtigerunt. His itaque primae uertebrae sinibus occipitis capitula excipiuntur, atque in illis flectuntur & extenduntur, seu antrorsum retrorsumq; rectissimo ducuntur motu. Nulla autem ratione caput huius duplicis articuli auxilio, in latera agitur: quamuis id Galeno Anatomicorum principi tot locis proditum fuerit. Primum nanque immoto collo, caput ne tantillum quidem in latera mouere possimus. Et, si caput super primam uertebam in latus ageretur, quis ambigit in eo motu primam uertebam debere immotam feruari: si modò in motu alterum articuli os oportere semper quiescere, Aristoteles in libro de communi animalium gressu rectè demonstrauit. Ut interim taceam Galeni impietatem, quae rerum Opifici rudem negligentiam turpiter imponit, quum se abundè Opificem celebrare arbitrat, tam proluxa praestatione attentum lectorem, & in demonstrandi methodo exercitatum, desiderat. Quid enim turpius (si modò uerum dicere licet) Naturae, nobis longè quàm Galenus est chariori, praeter meritum impingi potuit, quàm in dignissimo totius corporis articulo, extrema oscitantia? Nemo enim ignorat hunc articulum esse illum, qui ne minimo quidem temporis momento paruum inclinationem sustinet, multoq; minus exarticulationem ac luxationem, qua homo mox respirationis expers, mutus & absque motu & sensu, tanquam affecta neruorum radice, redditur. Quis obsecro articulus totius corporis est, in quo ossis caput in alterius ossis sinu ita mouetur, ut caput non amplius sinum contingat? nullus profectò, praeterquam, si Galeno credimus, capitis cū prima ceruicis uertebra articulus. Ipse enim caput huius articuli beneficio in latus duci arbitrat, in quarto de Administrandis sectionibus asserere coactus est, quādo caput in dextrum latus ducitur, dextrum tunc occipitij ossis caput in dextrum uertebrae sinum stringi, sinistram uerò caput ex sinistro sinu assurgere: & contra, si quando caput in sinistram latus inclinatur. Non igitur huic gemino capitis cum prima uertebra articulo in latus motum, sed flexum reflexumq; tribuamus. neque adeò in Galeni uerba iuremus, ut tantam oscitantiam immenso rerum Autori in praecipuo corporis articulo imputemus: neque etiam in Galeni excusationem studeamus comminisci, ab illo motum in latera intellectum, quem ego in gyrum & circumactu fieri dico: neque etiam illum motum super primam uertebam fieri cum Iulio Polluce fateamur. Praeter id enim quòd Galenus illum motum minime intellexit, quis adeò stupidus esse poterit, ut duo oblonga occipitis ossis capita mutuo distantia, & duos primae uertebrae sinus altos, seu profundos, & similiter oblongos subeuntia, circumagi posse autumat? Quis enim unquam circinum utriusq; cruribus asseri infixum, circumagi animaduertit? Neque est quòd quis Galeno patrocinaturus, occipitis capita sibi depressa tingat, atque ita caput super primam uertebam circumagi posse contendat, quum Galenus inter reliqua ossium capita *καρπώεις* nomine nulla unquam dignatus sit, his tantū occipitij capitibus demptis, quae *πάλσιμ καρπώεις* (sed non rectè admodum) uocat, eo nomine rarum, quae in canibus potius quàm hominibus occurrit, mucronem insinuans. Huiusmodi itaque capitis cum prima uertebra est articulatio, & aliqua etiā eius uertebrae descriptionis pars. Reliquam autem nunc prosequemur, sensim ad alium capitis motum accessuri. Ad exteriora igitur sinuum occipitis ossis capitula excipientium latera, prima ceruicis uertebra utrinque^b unum exigit transversum processum, procerius multo quàm ceteri uertebrae ceruicis transversi processus, educum & latiusculum, nō tamen aequè in hominibus ac in canibus caudatisq; simijs instar alae cuiusdam latum. Educuntur autem transversi primae uertebrae processus insigniū, ut opportinam praeter reliquos ceruicis transversos processus, duorum musculorum insertionem singuli acciperent. Illis enim processibus priuatim^c quinta & sexta musculorum caput mouentium paria inferuntur. Hi processus magno perforantur^d foramine, per quod^e arteria & uena hac caluariam petentes feruntur. Ad posteriore sinuum quibus caput inarticulatur sedem, sinus utrinque in prima uertebra exculpitur, illi respondens, quem in occipitij osse ad posteriorem capitulum sedem caelatū dixi. Ambo enim sinus, occipitis ossis nimirū & primae uertebrae, simul uiam praebent primo pari neruorum dorsalis medullae. Canibus uerò in prima ceruicis uertebra non sinus, sed proprium foramen hac claberi neruo insciniditur, quòd illis prima uertebra admodum ampla altaq; sit. Caeterum hic hominis uertebrae sinus, etiam ad posteriorem foraminis partem pertinet, quo transversus perforatur processus: ut ita sinus ille non neruo duntaxat, sed uenae arteriaeque etiam cedat. quas hac caluariam adire paulo prius relatum est, per^f foramen scilicet ad radicem capitulum occipitij ossis exculptum. Prima ceruicis uertebra posteriori processu, seu spina ob hoc inter reliquas uertebrae sola destituitur, quòd is aliquot mu-

Caput flecti
& reflecti super
primam uer
tebram.

Lib. 12 de V.
su partium.

Articulus to
tus corporis
dignissimus.

Non semel in
lib. de Ossibus,
& 4 de Actu
nisi scilicet.

Reliquae pri
mae uertebrae
descriptio.

sculorum paria aculei modo uulnerasset, neq̃ illis & præcipue⁴ tertio musculorum caput mouentium pari aptum iter, aut sedem tribuisset. Ea tamen parte, qua aliae uertebrae in spinam definit, hæc aspera est, & ueluti acuta linea extuberat, quo facilius quartū caput mouentū mu-
q. 1. a. m. sc. tab. 1. B. r. 3. 4. 11. f. x. s. 1. a. m. sc. tab. 3. f. t. 4. f. 3. d. ex. ter. Y. fini. ster. a. b. uo. tatur. u. 4. f. inter. a. c. b. x. 4. f. g. b. 2. 4. f. g. a. z. 5. 6. f. g. c. dextrum si. m. str. d. e. f. a. 5. 6. f. f. b. 5. 6. f. g. d. c. 5. 6. f. g. e.

Sinus primæ uertebrae tubera secundæ excipientes.

Tubera secundæ.

In inferiori primæ ceruicis uertebrae regione, sub duobus, quibus caput excipitur, sinibus, alij totidem insculpuntur leuiter ac in superficie caui, ob idq̃ etiam *πλωσφιδες* appellati. Horum circumferentia orbicularis est in medio uix aliter, quod dijudicari possit, caui obtinens, sed exteriora sinuū supercilia longe inferius, quàm interiora descendunt, idq̃ si hanc uertebra in erecto corpore secundæ inniti singas. His sinibus cartilagine obrustatis, duo secundæ ceruicis uertebrae excipiuntur tubercula, quæ ad latus corporis eius uertebrae habentur minimū prominentia, uti & sinus primæ uertebrae leuiter excauantur. Tuberculorum circumferentia etiam sinuum modo orbicularis est, quamuis interim non nihil^a posteriori parte extra circuli circumferentiam deduci uideatur. Ad hæc, internum latus tuberi, elatius^c exteriori latere affurgit. Verū ea laterum altitudo depressoq̃ non adeo insignis est, atque superciliorū primæ ceruicis uertebrae sinuum. Deinde tubera in medio seu centro non æquē prominent, ac primæ uertebrae sinus inter supercilia caui sunt: non secus sanē, quā si tuberi latera procerius quā ipsorum medium exurgeret. Unde etiam fit, in nudis ossibus inuicem adaptatis, sinus non ad amussim tuberbis respondere, & in illorum sinuum medio spacium non prorsus oppletum apparere. atque id priuatim hominibus accidit: canibus autem & equis alijsq̃ animantibus plurimū caput circumductibus, unum continuum utriusque lateris in secunda uertebra est tuberculum, & sinus quoque in prima ceruicis uertebra cōtinuus apparet, tuberculo concinnē respondens. Hanc in hominibus inæqualitatem, Natura subinde peculiari cartilagine corrigit, quæ præter cartilagines ossibus crusta modo obnatas, sinum & tuber intercedit, ac ligamentis in orbem articulum cōtinentibus duntaxat adnascitur, & superius inferiusq̃ admodū uiscoso humore, tanq̃ sinegmate, oblinitur. Huiusmodi igitur primæ uertebrae sinuū cum secundæ uertebrae tuberibus duplex (utrinq̃ scilicet unus) est cōtextus, eius quem statim dicā

Hic peculiariter ueriusq̃ lateris cartilagine nonnihil a nobis obseruatam designamus.



Secundæ uertebrae dens.

Libro de Articulis.


Dentis cū prima uertebra contextus.

motus gratia efformatus. Nunc enim tertius secundæ uertebrae ad primā contextus adhuc fermoni est adijciendus, qui secundæ ceruicis uertebrae^a dente cum prima uertebra effici. In medio enim duorum tuberū secundæ uertebrae, ex superiori mediaq̃ sui corporis regione, processus quidā insignis & altus, admodumq̃ durus & solidus enascit, quem quoddenti ac potissimū hominis canino assimile, *δολωρ* adū & *δολωρ* Græci uocant, quo etiā nomīne Hippocrates secundā uertebra nuncupauit, non autē (ut Iulius Pollux, & Cælius, dissectionū imperiti male recentent) primā. Verū alij hunc processum à turbinis, seu nucis pinei imagine *κωνοειδής* alij, quod cuspis pyramidis ue modo extuberet, *κωνοειδής* & *κωνοειδής* appellarunt. Processus hic primæ uertebrae^c cavitatem subit, quam illic haberi scripsimus, ubi primæ uertebrae corpus deberet consistere, & ubi eiusdem sinum insculpi scripsimus, qui cartilagine oblitus, anteriorem dentis partem laui & lubrico^d tubere prominulam excipit. Posterior dentis pars, e regione eius tuberis^e posita, magis extuberat, crassiorq̃ est quā ubi primū is à secunda uertebra producit. Hic enim utrinque ad latera^b sinus singulos, & tertium in posteriori sede^f exigit. Qui in lateribus conspiciuntur, inter dentis radicem & secundæ uertebrae tubera consistunt, unaq̃ cum primæ ceruicis uertebrae sinibus, qui his respondent, foramen utrinque parant, neruulis transmittendis aptum, quos interdum hāc in musculos collum flectentes proci-

Quamuis præsens figura priuatim secundo libro sit propria, illam tamen huc repositui, quod ijs quæ hic traduntur intelligens.

dis non mediocriter iuuat. Significetur itaq̃ obiter A, B, C, primæ ceruicis uertebra. D, D, secundæ corpus. H, dens. I, res ligamentum a dente occipitis ossi inferum.

K, transuersum ligamentum, dentem in prima uertebra stringens.



quod firmissimum ligamentum explantari inferi ue finit. Nullibi enim in ligamentorū enarratione interesse

q. 1. a. m. sc. tab. 1. B. r. 3. 4. 11. f. x. s. 1. a. m. sc. tab. 3. f. t. 4. f. 3. d. ex. ter. Y. fini. ster. a. b. uo. tatur. u. 4. f. inter. a. c. b. x. 4. f. g. b. 2. 4. f. g. a. z. 5. 6. f. g. c. dextrum si. m. str. d. e. f. a. 5. 6. f. f. b. 5. 6. f. g. d. c. 5. 6. f. g. e. d. s. f. g. n. et. 6. f. h. i. h. b. n. c. 10. 11. f. g. m. a. r. c. s. f. K. de. in L. f. s. f. g. 2. 6. f. g. h. b. 5. 6. f. h. h. i. 6. f. g. i. h. 11. f. g. m. 12. f. cap. 12. libri 4. N.

interesse puto, siue ea inferi, siue enasci dixerō, quum ligamentū pariter ad utrumq; os pertineat.
 "Superior dentis pars, seu ipsius apex in mucronē testudinis capitis modo exacuitur, ut^o aliū
 extra primam uertebra prominens, ex se robustum teresq; ligamentū educeret, quod occipitis
 ossi ad eam sedem alligari possit, quam in anteriori parte foraminis dorsalem medullā transimit
 tentis, asperam, leuiterq; extuberantem cōspici scriptum est. Atq; eiusmodi profectō primā
 uertebra cum secunda cōtextus perficitur, duobus nimirū latis secundā uertebrae tuberibus,
 totidemq; primā sinibus, & uno rursus primā sinu, cui dentis tuberculū committitur. Hunc
 contextum ex ipso potius rerum intuitu, quā ex hac mea nō tam cōcinna quā uera descri-
 ptione, disci malim, quōd pressius diiudicaretur, num Galenus nos caput supra secundā flectere
 & extendere, seu horum articularum ope annuere, ac Thracum modo renuere, uerē prodide-
 rit: an ego perperam hīs contextibus caput unā cum prima uertebra uelut ad axem in gyrum
 duci, nihilq; minus quam flecti ac extendi, contrā Galeni decretū tot locis grauer repetitum,
 asseruerim. Si enim singula in ossium fabrica perquisiueris, secundā ceruicis uertebra tibi tra-
 bem referet, cui terrā infosso axem infigimus, ipse autem dens, axis erit. prima uerō uertebra,
 cui caput in hoc circūactus motu, ac si cum illa idem corpus esset, iungitur, trabi assimilatur ad
 axem reuoluto. Aut prima uertebra cardini confertur, ostio cōmissō: secunda
 autē, illi cardini quem parietī infixum uidemus. Præterea ligamentū transuer-
 sim denti obductum, abunde commonstrat, primam uertebra nequaquā
 supra secundā flecti: si modō quiescente dente, prima uertebra antrosum
 retrorsumq; in flexu mouenda esset. Quis enim ambigit, ligamentū id dentem
 in primā uertebra sinu continere? & illi non tantam laxitatem cum Galeno ascribi posse, ut
 primam uertebra adeō à dentis contactu in anteriora ferri sinat, ut caput iustum experia-
 tur flexum? Porro iam duo apud Iulium Pollucem nomina mihi succurrunt, quorum alter-
 rum primā accommodat uertebrae, alterum secundae. ac prima quidem *ἡ πρῶτη*, secun-
 da uerō *ἡ δευτέρα* ipsi nuncupatur. Hæc nomina proculdubio à ueteribus, qui pucros in Anatome
 exercebant, manarunt: hoc nomine uolentes innuere uertebra, axis modo quiescentem, ac su-
 per quam alia circumuertitur: illo autem, uertebra, quæ tanquam ad axem circumuoluitur.
 Atque id sanē meæ subscriberet sententiæ, quæ caput super secundā in gyrum duci, iam sæpius
 asserui. Quod uerō à ueteribus ante Galenum hæc nomina manarint, præter poetas Celsus mi-
 hi autor est, qui tametsi ipsius codex ubi ceruicis explicat uertebrae uiciatus sit, atq; ipse à se neu-
 tiquam intellecta multorum Galeni interpretum more uerterit, attamen à ueterum quopiam,
 ex quo suum de ossibus Caput in latinam orationem conuertit, eam sententiā primū assump-
 sisse uidetur, quæ meæ, atque ipsi denique ueritati, proximè accedit. Neque profectō est quod
 prolixius hæc referam, quum uel leporis, uel cuniculi, uel agni, uel hœdi ceruicem inter eden-
 dum contemplari integrum sit, & simul luce clarius intueri motum qui in gyrum fit, super se-
 cundam celebrari uertebra: ac deinceps non amplius mirari, quam obrem Galenus auditorem
 adeō solertem, in Mathematicisq; peregre regie institutum, in duodecimo de Usu partium expe-
 tat: quum nemo ambigat, elegantem aliā atque difficilem alicuius negocij descriptionem eo
 difficiliorem reddi, quo ipsa minus ab enarratē intelligitur, isq; magis à Naturæ artificio, quod
 recensere proposuit, aberrat. Quod uerō Natura præter flexum in anteriora, & in posterio-
 ra reflexum, etiam alios duos motus, quorū alter in latera, alter in gyrum circūactusq; fit, super
 primam uertebra non perfecit, quemadmodum brachium femurq; triplici motuum differe-
 rentia moueri uoluit, hinc potissimum factū ducito, quod primā uertebra magis ampliusq;
 quā reliquas omnes dorsalis medullæ causā, ^p perforari operæ precium fuit, quodq; ob id
 unus duntaxat rotundus ampliusq; sinus in illa efformari nequieuit, neque etiam occipitis os
 "foraminis sui occasione in unum tantū grande caput extuberare potuerit, quod in illo pri-
 mæ uertebrae sinu perinde ac femur in coxendicis ossis sinu, omni motus specie ageret. Quum
 itaque duplici articulo, dextro nimirum & sinistro, caput iungendū fuerit, omnisq; propemo-
 dum duplex articulus simpliciter solum motui famuletur, meritō Natura caput supra primam
 uertebra flecti ac reflecti uoluit. Nam supra hanc in latus moueri nequieuit, nisi Natura hīc sui
 oblita, unum occipitis ossis caput in uno uertebrae sinu stringi, aliud uerō caput attolli, atque à
 prima uertebra prorsus disiungi cupiuisset: quod in nullo tentauit articulo: id semper studens,
 ut articuli ossa mutuo essent cōtigua, neque ab inuicem abscederent, & nescio quam uacua à
 Galeno confictam sedem statuerent. Deinde caput in gyrum supra primā uertebra moueri
 minus potuit, nisi Natura acutum processum in capitis amplitudinem, quæ cerebrum contine-
 tur, à prima uertebra produxisset, ad quem caput ueluti ad axem uolueretur, ac deinceps alia
 quamplurima nunc rectissimè formata, uitare proposuisset. Super secundā itaque uertebra

Caput est pri-
ma uertebra sa-
per secundam.



A unus cō-
do, B alter.

Lib. 12 de V-
su partium

Curr. Natu-
ra caput super
primam uerte-
bra simul quo-
que circumdu-
cis in latera
inclinati mo-
luerit.

Libro 4. de
Administ.
sectionibus.

*Non potuiss
se caput super
secundam ste
di & reflecti,
neq; etiam in la
tus inclinari.*

*Quibus uerte
bris motus late
ralis committit
tur.*

*Foramē secun
dū par dorse
lis medullæ ner
uorū in posteri
ora transmuta
rens.
Spina sex hu
miliorum cer
uicis uertebra
rum.*

*Secundā uer
tebrarū aliquot
sibi subdistingui
iorem esse.*

*Transuer
sū ceruicis uer
tebrarū pro
cessū naturā.*

caput artificiose in gyrum mouetur. si enim flecteretur, dens dorsalem frangeret medullam. Quum enim quicquid dente prima uertebra antrosum duceretur, posteriori sede sursum cleuata, tunc dorsalis medulla in primæ uertebrae foramine prorsus coarctata compressaq; abrumperetur. Deinde prima uertebra, supra secundā retrorsum nullo modo reflecti posset, nisi ipsa in anteriori sede, qua dentem continet, prorsus exculperetur, primaq; tunc uertebra à dente non præpedita, retrorsum liberè duceretur. Adde, caput nequiquam in latus supra secundam moueri potuisse, eadem ratione qua probauimus lateralem motum supra primam nequiuisset fieri. Alias enim necesse esset, primā uertebra in altero latere à secunda semper leuari, quod periculum nunc in circumactu non impendit. Porro lateralem motum Natura insigni profectō industria omnibus ceruicis commisit uertebri, quæ singula seorsum in latus moueri nequeunt, uerū simul omnes succedentibus motibus illuc adeo continnè inclinantur, ut caput commodè secundario motu in latus citra omnem noxam feratur. At nunc rursus ad secundam ceruicis uertebra, ac sic deinceps ad quinque reliquas sermonem reflectamus, ueram duntaxat earundem constructionem enarrantes, ne casu quapiam noua disceptatione præsens Caput in immensum excrescat, atque ego nimium anxie Galeni (cuius diligentiae alioquin cum omnibus medicinae studiosis plurimum debeo) sensa eruerem, omnesq; ipsius Anatomicos lapsus studio commemorare, uidear. Secunda itaque ceruicis uertebra in posteriori tubero, quibus illa primæ uertebrae committitur, sedeleuiter exculpitur, ut comune cū prima uertebra foramē utrinq; cōstituatur, quod secundū dorsalis medullæ neruorū par, in posteriora elabatur. Verum huius foraminis maiorem portionem prima efformat uertebra, insigniter satis ad posteriorem sedem sinuum, quibus secundā articulatur uertebrae, insinuata. Reliqua in secunda ceruicis uertebra commemoranda, cæteris etiam quinque inferioribus magna ex parte sunt communia. Hæc enim similiter atq; illæ, posteriori donatur processu: qui hoc priuatim in ceruicis uertebri sibi uendicat, quod suo mucrone bipartitur, ac præcipuè secundæ uertebrae, triumq; ipsi subiacentium. Sexta enim uertebra admodum obscure sui processus diuisionem ostendit, atque adhuc multo minus septima, quæ priuatim hoc cum sexta sortitur, quod ipsius processus plerumque donetur appendice, ac procerius educatur, quodammodoq; ad superiorum thoracis uertebRARUM processuum imaginem in suo mucrone accedat, nisi quod ille his obfusior ampliorq; relinquitur. Cæterarum uerò ceruicis uertebRARUM processus appendicibus carent, & lati, inæquales, asperi, & (ut ita dicam) ramosi, inferioriq; sede caui, ac superius gibbi cernuntur, ac utrinq; modicè depressi, quod extuberans linea facit, quæ secundum processus longitudinem porrigitur: quemadmodum etiam inferiori processus parte (quæ caua est) quidam lineæ instar ductus, secundum processus longitudinem ferri uidetur. Prominet autem in gibba sede, lineæ, ut ligamentum ab hac in caua sedis medium producat: quod secundū processus seu spinæ longitudinem porrectum, unam spinam alteri colligare, dextrosq; musculos à sinistris dirimere, in secundo libro scribemus. Verum hæc posteriorum processus lineæ, in thoracis & lumborum uertebri conspectiores erunt, quod & illarum uertebRARUM processus insigniores sint, & ualidiori duriori q; ligamento (quum minus moueri debeant) inuicem deligentur. Diuisionis autem in processulos potissima occasio musculi censentur, in posteriori ceruicis sede repositi, ut enim hi promptius principium dicerent, & ualidius quoque in uertebRARUM spinas in sectionem molirentur, hæc spinæ etiam in processulos dirimuntur. Atque id Natura in his colli uertebri peculiariter machinata est, quia non adeo longas spinas à paruis illis uertebri, atque à thoracis lumborumq; uertebri producere tutum fuerat. Deinde maior musculorum copia in ceruicis posteriori sede, quàm in alijs dorsi partibus collocatur, quemadmodum ubi musculi scapulas, thoracem, caput & dorsum mouentes persequar, audiretur es suffissimè. Porro musculorum etiam gratia secundæ uertebrae spina procerius, quàm aliquot ipsi succedentes spinæ, exierit, cæterisq; latior uisitur, quod scilicet hæc priuatim tertio musculorum caput mouentium pari, & sexto quoque principium præbeat. Ne tamen iniuste Natura ex gracili uertebra prolixiorē latiorēq; educeret spinam, ipsa secundam aliquot sibi subditis grandiorē effecit: uerū non tam spinæ producendæ gratia, quàm ut secunda articulationi abundè sufficere posset, quam cum prima uertebra molitur. Atque hoc illud est quod antea asseruimus, Naturam semel atque iterum superiorem uertebra in inferiori maiorem creauisse. Secunda enim crassior, & maior ualidiorq; est tertia: dein primam transuerforam processuum occasione, omnibus ceruicis uertebri latissimam esse, supra docuimus. Cæterum transuersi processus in reliquis colli uertebri non admodum exporriguntur, & imprimis secundæ uertebrae, cui breuis & simplex utrinque transuersus obtrigit processus. Videtur autem is in secunda uertebra minus quàm in alijs prominere, breuiorq; esse, propter huius uertebrae tube-

73. 4 fig.
re K.

56 fig. p.
t. 1. 1. r.
43 fig. ca.
lib. 2. 1.
24 fig. q.
75. 6. 7 fig.
g. 1. 1. r.
8 fig. 1. h. r.
diere u.
48 fig. 1. r.

b. 1. ca. 16
N. O. P.
Hæc erunt
obtus. 1. 7
fig. 1. 1. r.
cum 1. 1. r.
ceteris 1. 1. r.
contulens.
ant. N. O. P.
obferens 1.
1. 1. r.
figure ca.
p. 16.

c. 14. musc.
tabula A. B.
d. eadem ca.
bulæ, K. L.

c. 5. 6. 7 fig.
g. 1. 1. r.

tuberum, quæ primæ sinus subeunt, amplitudinem, crassitiemq̃. Insuper hæc tubercula amplitu-
do in causâ etiam est, foramen quo transuersus secundæ processus perforatur, non rectâ, sed
obliquè exculptum uideri, secus atque in prima ceruicis uertebra, & quinque secundæ subie-
ctis, quarum transuersus processus recto amploq̃ foramine peruius est. Neque profectò hæc
nus in homine ulla ceruicis mihi occurrit uertebra, quæ transuersum processum non gesserit
perforatum. Verùm processus septimæ canum simiarumq̃ uertebra transuersum processum,
absque foramine frequenter adinueni. Huiusmodi foraminibus solæ ceruicis uertebra ornan-
tur, in hoc perforata, ut uenâ arteriamq̃ sursum ducant, quæ dorsali medullæ, ac tandem ipsi
cerebro sanguinem spiritumq̃ deriuant. Præterea quatuor uertebra, quæ statim secundam se-
quuntur, hoc etiam peculiariter sibi uendicant, quòd illorum transuersi processus ampli & bi-
fidi sunt; non tamen interim, ut earundem spinæ, asperi & inæquales. Transuersi enim pro-
cessus forma inuicem respondent, & interior ipsorum pars semper latior est, clariusq̃ ipsa poste-
riori effertur. Spinæ autem partium impar in omnibus quasi uertebis est forma, & illæ perpe-
tuò uarijs modis protuberat atque exasperantur. Hæc transuersorum processuum amplitudo
& bipartitio, eadem ratione accidit, qua spinas bifidas esse prius relatum est, nimirum muscu-
lorum ortus insertionisq̃ gratia. Vt enim alios huius sedis præteream musculos, utrinque
transuersis uertebrae processibus priuatim duos committi in secundo libro scribemus,
quorum beneficio collum, & postea consecutionis motu caput in latera ducuntur. Hi musculi
in utroque latere ita collocantur, ut unus anteriori transuersorum processuum sedi, alter uerò
posteriori ascribatur. Septima autem ceruicis uertebra transuersos processus latos quidem exi-
git, at admodum obscure bipartitos. Quum enim ampli processi q̃ sint, nulla incumbit necessitas,
eosdem quoque bifidos fieri, præcipue quando musculi collum in latera ducentes, non adeo ua-
lidè septimæ ac cæteris committantur, quòd hæc illis ueluti basis in dicto colli motu subiaceat,
ac obscure non secus quàm thoracis uertebra in latera moueatur. Ascendentes descendentesq̃
processus, quibus uertebrae mutuò articulantur, in omnibus ceruicis uertebis secundæ
subiectis similes sunt, & secundæ quoque descendentes processus obtinet, aliarum processibus
non dissimiles. Qui itaque deorsum spectant, & subditæ committuntur uertebra, orbiculari sinu
nilhil minus quàm altè inciso, & ab anteriori sede insigniter obliquè deorsum in posteriora
ducto, ornantur. Ascendentes uerò processus, qui incumbenti articulantur uertebra, tubercu-
lum orbiculare habent, quòd adeo leuiter superficietenusq̃ extuberat, ut ignores sinuum ne id
an capitum numero ascribere debeas. Hoc tuberculum ascendentium processuum sinui con-
gruit; & cartilagine perinde ac sinus incrustatum, ab anteriori sede deorsum in posteriora ad-
modum etiam obliquè fertur, id quod non obiter considerandum est. Nam obliquus ille du-
ctus in ceruicis uertebis, quæ thoraci propiores sunt, minor semper, ac secundum corporis
longitudinem rectior euadit, quòd illæ uertebrae nō adeo laxè ac superiores moueri, atque ob
id etiam non tam laxè articulari, debeant. Ascendentes itaque processus suo tuberculo, sinum
descendentium processuum subingrediuntur, atque ita secunda ceruicis uertebra tertiæ dupli-
ci articulo alligatur, ut tertiæ quartæ, & sic reliquæ omnes ad thoracem usque consequentes.
Septima enim ceruicis, primæ thoracis ascendentes processus excipit. Verum Natura non so-
lum ceruicis uertebis laxiores communicauit articulos, sed ut commodius aptiusq̃ quàm reli-
quæ dorsii partes, collum insigni & quo maxime indigemus usu, moueri possit, ipsa aliud quo-
que proprium colli uertebis adhuc elargitur. Quum enim uertebrae thoracis & lumborū
corpora inuicem planis minimeq̃ extuberantibus committantur superficiebus, ad eum modum
quo duo læuigati ampli q̃ asseres mutuò incumbere, Natura inferiori ceruicis uertebrae
corporis partem oblongam, capitisq̃ alicuius articuli ad motum euidentem facti ritu, extube-
rare uoluit, ac superiorem corporis uertebrae partem amplo sinu ita excauauit, ut oblon-
gum superioris uertebrae corpus in hunc subditæ uertebrae sinum ingreditur, uertebrae q̃
compago ad mouendum promptior confurgat. Atque hæc compactionis species in secundæ
uertebrae cum tertiæ, & deinde in aliquot subiacentium uertebrae nexu magis est cōspicua.
Colli autem septima, primæ thoracis quasi omnino plana innititur superficie, ac etiam ipsius
corpus elatori sede non adeo atque superiorum uertebrae excauatur; quòd præcipue acci-
dit, quia superiores laxius inferioribus moueri, ex usu fuit. Cæterum quàm tutò uertebrae inui-
cem ligamentorum ope colliguntur, quamq̃ studiose Natura laxis his ossium connexibus pro-
spexerit, musculi & uertebrae ligamenta in secundo libro affatim ostendent. Nunc interim
DEI opificium summopere admiremur, quòd is simul & securitati, & multiplici motui tam
incredibili industria prouiderit; & quāuis fortè crebriores ceruicis noxas luxationesq̃, quàm
reli quarum dorsii partium fieri conspiciamus, nihilominus tamen adhuc magis obuerfetur ani-

Foramen trās-
uersorum pro-
cessuum.

Ascendentes
et descendentes
processuum
natura.

Meiore obli-
quum ductum
ad auid b.

Corporū cer-
uicis uertebra-
rū contextus.

g 2 fig. M.
3, 4. fi. L.
r 3, 4. fi. X.
s prima li-
nea, in 7. fi.
à foramine
illo per s. du-
cereur. se-
cunda autē
ex tertia à
foramine
per 7. r.

commune est. Quemadmodū & uerthebras non uno ossē in puerulis efformari, nulli negatum est uerthebræ. Prima enim ceruicis duobus constat ossibus, inuicem appendicū more cōmissis. Apparet autem hæc unio, ubi primæ^a anterior pars consistit, & quā aliæ in spinam exacuuntur. Reliquæ autem ceruicis & thoracis & lumborum uerthebræ præter appendices, tribus extruuntur partibus. Vna enim linea cartilagine oppleta, secundum spinæ ducitur longitudinem, à foramine dorsali medullæ parato ad spinæ usque apicem pertinens. Aliæ autem duæ ab eodem foramine productæ, corpus uerthebræ à duobus transversis processibus reliquisq; uerthebræ posterioribus partibus dirimunt, quemadmodum in agno ac hædo est cernere. Quamuis id in puerulis obseruari malim, quòd ipsi ossium noxæ crebrius quàm ætate confirmatis oboriantur. Cæterum in ætate paulò prouectioribus, hæc ossium frequentia aboletur appendices tamen etiam uigoris tempore aliquando non ita difficulter distinguuntur. In senibus autem non solum appendicū connexus obliteratur, uerum uerthebrarum corpora aliàs magno intervallo ob cartilaginei ligamenti interuentum dissita, adèò coalescunt, ut modò tres modò quatuor uerthebras in illis ita concreuisse, ac simul in cemiterijs effodi uideas, ut inuicem diuelli nulla ratione queant. Coalitus iste quorundā processuum fit interuentu, quos corpus unius uerthebræ ab externa ipsius superficie in aliud producit. Cæterum coalitum hunc in causa esse, cur minus dorsum moueant senes, & quòd nequaquam dorsum extendant, ipsiq; magis incuruentur, neminem ambigere reor, præcipuè si quis aliquando gibbosi uerthebras inspexerit, hasq; incuruatas, & suis corporibus pertinacissimè unitas. Quanquam ad hæc, difficilem in senibus motum augent ossium superciliorū mira asperitas, & ossium tubercula, quæ capita in suis sinibus moueri prohibent. Postremò & insignis ligamentorum duricies, promptè uerthebras moueri uetat.

Verthebrarum
pueris plurib.
constare ossi-
bus.

Verthebrarum
in senibus ne-
cuss.

DE THORACIS VERTEBRIS.

Caput XVI.

PRIMA XVI CA' SECVN-
DITIS FIGVRA.

TERTIA.

QVARTA.



QVATVOR PRÆSENTIVM FIGVRARVM ET EARVN-
dem characterum Index.

DVODECIM thoracis uerthebrarum eas hic delineauimus, quas ostendendæ illarum descriptioni sufficere duximus. Integra enim dorsi uerthebrarum series, figura decimo quarto Capiti præposita, ac dein tribus integram ossium compagem ad huius libri calcem exprimentibus proponitur. Thoracis autem uerthebræ simul cum costis, quæ illis articulantur, etiam seorsum duabus prioribus figuris exprimuntur, quæ decimo nono Capiti præfiguntur. Prima uero huius Capitis figura unam ex medijs thoracis uerthebris anteriori parte delineatam ostendit, cui ferè decem superiores thoracis uerthebræ correspondent. Secunda, eandem uerthebram, quæ prima explicatur figura, posteriori facie spectandam offert. Tertia, thoracis undecima uerthebra posteriori facie ostenditur. Quarta duodecimam thoracis uerthebram posteriori etiam facie expressimus.

A 1, 2, 3, 4

- A**_{1,2,3,4} *In omnibus obseruatur figuris, superiorē corporis partem notans, quæ superpositæ cōmittitur uertebæ. Caterum quia superiori parti inferior prorsus respondet, abs re fuisset uer*
Φ₁ *tebram thoracis ab inferiori facie delineare. Quæ uero in tertia figura positum, appendicem notat superiorē corporis uertebæ, quæ adhuc post osiū coctionē & emundationem ferè relinquitur.*
B₁ *Medium eius sinus, quem duabus uertebRARUM corporib. communem esse dicemus, cuius costæ ra dix inarticulatur.*
C₁ *Eiusmodi sinus pars in inferiori uertebæ corporis sede sculpitur, quæ tanto minor est supe riori parte B insignita, quanto communis sinus costæ articulandæ paratus, ad subiacentem uer tebram magis, quàm ad superpositam pertinet.*
D₃ *Sinus undecimæ uertebæ, cui undecima dextri lateris costæ inarticulatur.*
E₄ *Sinus duodecimæ uertebæ, cui duodecima dextri lateris costæ coarctatur.*
F₄ *Sinus asper & profundus, ex quo ligamentū prodit, duodecimā costā suæ cōnectens uertebæ.*
G_{2,3,4} *Foramen grandius posteriori uertebæ corporis sedi, quæ dorsale medullam respicit, incisum.*
H₁ *Transuersi processus uertebRARUM thoracis.*
K₁ *Sinus in apice transuersi processus, cui costæ articulatur, conspicuus.*
L₁ *Sedes transuersi processus, quàm gibbam esse dicemus.*
M₁ *Sedes transuersi processus caua. Quod autem in reliquis tribus figuris posteriorem uertebra rum faciem exprimentibus, transuersi processus nonnihil decliues ferri apparent, ob hoc euenit, quod in his delineationibus superioris uertebRARUM partis magna conspicitur portio. Oculi enim acies ad posterioris sedis medium, studio non fuit directæ.*
N, O_{1,2} *Spina, seu posterior processus, ac in secunda quidem figura superior spinæ exprimitur sedes, in qua N & O & P tres lineas notant, triangularem figuram simul constituentes. & interuallū inter N ac O una est superficies superior, & aliud interuallū inter N & P altera est superficies superior. Verum prima figura tertiam ipsius processus superficiem notat, quæ inferior est, ac inter O & P consistit. Quod autem iuxta N in prima figura inumbratum cer nitur, alterius superiorum superficierum est portio.*
Q₁ *Linea in tertia superficie extuberans, quæ aspera & inæqualis est.*
R₃ *Spina undecimæ thoracis uertebæ.*
S₄ *Spina duodecimæ thoracis uertebæ.*
T, V₁ *VertebRARUM thoracis, quæ supra duodecimā consistunt ascendentiū processuū anterior sedes.*
X, Y_{2,3} *Ascendentium thoracis uertebRARUM processuum posterior sedes, qua illi processus extube rant, & cartilagine incrustantur.*
a b_{2,3} *Descendentium thoracis uertebRARUM processuum exterior sedes.*
c₁ *Hic uidetur dextri descendentis processus anterior sedes, quæ sinuatur, cartilagineq; obducitur, & ascendens subiectæ uertebæ processus tuberculum excipit.*
c f₄ *Ascendentes duodecimæ thoracis uertebæ processus, undecimam subeuntes uertebRAM.*
g, b₄ *Descendentes duodecimæ thoracis uertebæ processus, qui ascendentiū primæ lumborum uer tebræ processuum sinibus inarticulantur.*

Plurimi duo
decim thoracis
esse uertebRAS.



Quandam uer
tebram supra
infraq; ab alijs
suscipi.

THORACIS uertebæ numerantur² duodecim, præterquam quod ali quando, tamen si raro, aliquibus uel deest una, uel superest. Sed deesse ra rius, quàm superesse, inuenitur. Patauij nanque duo corpora, tredecim sin gula thoracis donata uertebis mihi occurrerunt, quum interim hæcenus undecim tantum uertebRAS nunquam uiderim. Neque etiam lumborum ceruicisq; uertebRARUM numerus tam crebro, atque thoracis, uariatur. Præ terea, etsi thoracis uertebæ pari consent numero, non tamen in omnibus eandem articulationis commonstrat speciem. Quum enim una thoracis uertebRARUM sit, quæ uertebRAM ipsi superpositam ascendentibus processibus & subiectam descendentibus pariter subeat, duabus uel excipiat uertebis, hæc tamen nō eadem (licet duodecim tantum thoracis sint uertebæ) se offert. quandoquidem nunc undecima, nunc uerò duodecima, aut alia quæpiam interdum hoc articuli genere proximis committitur uertebis. Quò igitur accuratius, quænam hæc sit, quæ ratione alijs coarctetur, quiuis promptè intelligat, præfens negocium descriptu utcunque arduum, sed demonstratu mihi per facile, quàm potero diligentissimè mo do

fi. cap. 14
C, D. inte.
græ K ad
L. Dein to
tus uerte
brarū con
textus 1, 2
fig. cap. 19.

dò aggrediar, omnes thoracis uerthebrarū partes ordine enarraturus, ut in quibus illæ inuicem pugnent, ocyus quis adinueniat. Quippe in thoracis uerthebris nō mediocri occurrit differentia. Primum itaque thoracis uerthebrarum corpora tantum magnitudine inter se discrepant, quantum una, alia collo uicinior consistit. Primæ nanque thoracis uerthebræ corpus magnitudine admodum duodecimæ corpori cedit. Deinde corpus primæ, superiori sua sede, quæ primæ ceruicis cōnectitur, non omnino planū est, sed modicè utrinque ad latus extuberat, ceruicisq; uerthebrarum corpora obscurè imitatur. Inferior autem huius corporis pars, plana consistat superficie, quemadmodū & inferior superiorq; omnium thoracis uerthebrarū corporum superficies. Nullum enim thoracis uerthebrarū corpus inferiori parte, uel leuissimè in longum decliue protenditur, & in subsequenti uerthebræ corporis sinum (ceruicis uerthebrarum ritu) definit. Vtunque etiam aliter Galenus attestetur, parem quodammodo articulationem thoracis uerthebris tribuens, quam in præcedenti Capite ceruicis uerthebrarum corpora moliri docuimus. Ad hæc, primæ secundæq; thoracis uerthebræ corpus, nō ad eò anteriori parte rotundū seu orbiculare prominet, atque reliquarum thoracis uerthebrarū corpora, quæ multo magis quàm supremarū corpora ad circuli seu literæ C conuexi imaginem accedunt, proceriusq; in thoracis amplitudinē protuberant. Videntur enim duæ superiores thoracis uerthebræ, ceruicis uerthebrarum modo, in anteriori corporis sui sede depressæ, multoq; (ut sic dicam) ampliores, quàm profundiores, ac ad cōuexum semiparenthesis (potius quàm C formate. Quod ipsis priuatim cum articulationis laxo motui aptæ gratia, tum musculorum collum flectentium occasione oboritur. Musculi enim illi, ita utrinque primarum thoracis omniumq; ceruicis uerthebrarum corporibus insertuntur, ut liquidò constet, ea corpora ab illis comprimi. Reliquarum autem uerthebrarum corporibus huiusmodi musculi neque adnascuntur, neque incumbunt quoque. Præterea omnibus thoracis uerthebrarum corporibus hoc commune accidit, quòd utrinque sinus habeant, quibus costarum capitula inarticulantur. Verum ut costarum capitula in illo articulo uariant, ita etiam ipsi omnino sinibus non omnes uerthebræ decorantur. Vbi enim prima thoracis secundæ committitur, & secunda tertiæ, atq; ita deinceps ad nonæ usque cum decima conuexum, sinus quidam in ambobus lateribus iuxta foramina neruorum communis existit, ac partim in superioris uerthebræ corpus, partim in inferioris excinditur, quam interim huius sinus grādiōr portio ad inferiorem uerthebram potissimum pertineat. Sinus iste in cruristatur cartilagine, & obtusi anguli penè forma cælatus est, quemadmodū & costarum capitulū sinum subiens anguli obtusioris modo extuberat, in costarū tractatione com monstrabimus. Cæterum prima thoracis uerthebra hoc proprium cum undecima & duodecima adipiscitur, quod utrinque peculiarem habeat sinum alijs uerthebris non communem, in ipsiusq; corpore duntaxat in cistum. Ad superiorem enim sedem corporis primæ thoracis uerthebræ, sinus ubiq; exculpitur rotundus, & satis insigniter cauus, ac denique cartilagine oblitus, cui primæ thoracis costæ radix rotundo capitulo inarticulatur. Deinde ad inferiorem huius sinus sedem alius insigniter profundus cōspicitur, asper & inæqualis, & foraminibus quibusdam oppletus, neque cartilagine inunctus, à quo ualidissimum prodit ligamentum costam in suo sinu robustissimè stringens. Pari ratione sinus in duodecima uerthebra duodecimæ costæ gratia in sculptus, ad inferiorem ipsius sedem alium quoq; asperum, sed minus quàm postremò dictus primæ uerthebræ sinus, profundum adipiscitur, qui ligamenti duodecimam costam firmius uerthebræ adnecienti nomine cælatur. Postremò thoracis uerthebrarum corporibus etiam substitit ratione quædam accedit differentia. quanto enim cuiusq; uerthebræ corpus grandius maiusq; est, tanto etiam minus apparet solidum, sed fungosum, & multis inæqualibus uarijsq; foraminibus incerta serie interscintum, in quæ uenæ arteriæq; corpus uerthebrarū enutrituræ subintrant. Nisi enim uasorum furculi crassorum ossium substantiæ insinuarentur, impossibile esset mediam intimamq; à superficie remotissimam ossis substantiam, sibi nutrimentū (quandoquidem ita distat) allicere. Inter cætera huius generis foramina, nullibi insigniora se offerunt, quàm in posteriori corporis uerthebrarū sede dorsale medullā respiciēte. Vbi in plurimis uerthebris unū peculiare cernitur foramen, pro uerthebræ mole magnum, & asperum, & in multa desinens foraminula. Et quamuis Galenus huiusmodi foramina, priuatim lumborū uerthebris uideatur adscribere, si tamen quis singula studiose rimabitur, conspiciet primam lumborū & thoracis duodecimam, & undecimam, aliquotq; uerthebras ipsis superpositas, hæc foramina pro illarum magnitudine insigniora, plura & altiora exigere, harumq; uerthebrarū corpus fungosius, quàm cæterarum omnium esse. Quòd scilicet magnæ sint uerthebræ, & caua uenæ caudicem sibi innitentem non forantur, ac duntaxat uenæ pari carentis propagibus implicentur. In transuersis

Thoracis uerthebrarū in corporibus differentia.

Libro de Ossibus Cap. 9.

Ex sinibus quibus costæ articulantur differentia.

Differentia corporum substantia.

Libro de Ossibus Cap. 10.

*Differentia
transuersus
processibus.*

uerfis processibus, uerterbrae thoracis etiam inuicem variant, uerum non adeo ut Galenus in decimotertio de Partium usu prodidit, decima & duas ipsi succumbentes transuersis priuans processibus. Omnibus enim thoracis uerterbris utrinque unus transuersus obtigit processus, qui magnitudine in nouem superioribus uerterbris uix quicquam differt, decimae autem uerterbrae transuersi processus minus, quam superiorum uerterbrarum, extuberant, ut etiam decima, quae ipsi committitur costa, admodum parua spuriaque est. Vndecimae uero uerterbrae transuersi processus minores adhuc decimae sunt, & duodecime processus adhuc minores ipsius undecimae: nimirum quod non tantus horum processuum usus, atque superiorum uerterbrarum processuum, sit. Caeteris enim omnibus costae articulantur, quarum gratia thoracis uerterbrae ualidissimi crassissimosque processus transuersos sibi uendicant. Duodecimae uero & undecimae transuersis processibus costae non articulantur. duae enim infimae utriusque lateris costae, unica tantum ad uerterbrarum corpus articulatione committuntur, reliquis interim ad uerterbrarum corpora & processuum transuersorum apices dearticulatis. Ad apices namque transuersorum processuum nouem superiorum thoracis uerterbrarum sinus cartilaginei incrustati uidentur, quibus costarum capitulum articulat. In transuersis autem decimae uerterbrae processibus eiusmodi sinus aut nulli, aut interdum obsecuri conspiciuntur: in duarum uero infimarum processibus prorsus nulli occurrunt. Praeterea sinus in transuersorum processuum apicibus sculpti, omnes quidem anteriori processuum sede habentur: uerum alij superiores, alij mediam magis occupant. Primae enim uerterbrae transuersorum processuum sinus deorsum spectant, nonae uero sursum, mediae autem medio se habent modo. Quod Galenus quidem parum animaduertisse uidetur, quum costarum nexus explicans, huiusmodi sinus omnes deorsum spectare, atque inferiori apicis transuersorum processuum sede insculpi arbitrat. Qui decimam thoracis uerterbram, & duas huic subiectas nequaquam transuersis processibus ob id debebat priuare, quod illi totius dorsi in latus motum essent praepedituri. Si enim motus illius ratione Natura transuersi processus illis uerterbris abesse uoluisset, non magis uerterbras decimae (quam Galenus supra in libro de ossibus tradidit) subditas, quam superpositas, debuisset illis processibus priuare. Nam si inferiorum uerterbrarum transuersi processus motui laterali obstaculo erant futuri, profecto superiores non minus motui, quam inferiores obstuissent. Quemadmodum enim dorsi pars, quae uerterbrae supra infraque exceptae subiicitur, sursum in illo motu ducitur: ita etiam superficialentem partem deorsum ferri necessum est, si modo ueluti in semicirculo dorsum in latus duci debeat, cuius semicirculi circumferentiae medium punctum uerterbra illa merito censetur, quae supra infraque suscipitur, quaecumque etiam haec sit. At quid opus est huic sermoni, adhuc propter uerterbram utrinque susceptam intellectu difficili, immorari: quum decima & duae ipsi succumbentes thoracis uerterbrae tam insignes transuersos processus habeant, quam illorum usui in musculorum exortu infertioneque expedit. Quinetiam Galenus sui nescio quam memor, passim omnes costas duobus internodijs articulari prodidit, uno scilicet uerterbrae corpori, altero autem transuerso processui, quod si esset (uti sane non est) nunquid & decima thoracis uerterbra, & duae ipsi subditae necessario transuersis donarentur processibus: Quo autem ductu illi aut sursum aut deorsum porrigantur, tunc dicemus, quum thoracis uerterbrarum spinas sermoni subnexuerimus. Natura enim omnibus thoracis uerterbris spinam toto ductu simplicem, minimeque bifidam largitur. Atque huius spinae in omnibus uerterbris non eadem forma uisitur. Nouem enim superiores longissimas exigunt spinas, non admodum amplas, at tamen ex amplabasi in mucronem sensim desinentes, triangulicam imaginem ita referentes, ac si triangulari constarent pyramide. Superiori namque sede rectam acutamque ostendunt lineam, secundum ipsarum longitudinem exporrectam, & deinde utrinque ad latera iuxta inferiorem ipsarum sedem, simile etiam obtinent lineam, adeo ut spinae unius, tres longae acutaeque lineae, ternas superficies efforment: quarum duae superiores spinam sedem constituent, quae superior uerterbra respicit, atque harum una utrinque habetur. Tertia superficies inferiorem constituit sedem, subiacetis uerterbrae spinae incumbente. Tres istae superficies in eadem spina in nouem superioribus uerterbris, ut plurimum pares & aequae amplae cernuntur, et duae superficies exacte laeues sunt, tertia autem & inferior aspera est, & ueluti linea secundum ipsius longitudinem ducta interdiuiditur. Ab hac tertiae superficiei linea ligamentum prodit, quod lineae duabus superficibus communi inferitur, ac inuicem spinas colligas, interuallumque earundem opplens, dextros spinas a sinistris dirimit, illi respondens ligamento, quod inter ulnam & radium, ac inter tibiam os & fibulam consistere dicam. Interdum superiores superficies inferiori ampliores apparent, ipsaeque spinae a lateribus magis (quemadmodum in quadrupedibus cernitur) sunt depressae. Decima thoracis uerterbra non ita prominentem, atque superiores uerterbrae, spinam exigit: nec haec triangularem

Libro de Ossibus, et de uerterbris, no. 8. Adm. diffec.

Libro de Ossibus, no. 8. Adm. diffec.

Tum alibi, scilicet, cum maxime 8 de Adm. diffec.

Spina diffec. tenet.

p. fi. K. cap. 19 c. b. 19 c. ca. 19 m.

78 fig. 15 cap. 1. w. 51, 2/3. N. O. P. 12 fig. N. 11, 2/3. O. P.

x 2 fig. una ab O ad N. altera ab N ad P. 71 fig. inter O et P. 22 fig. 2.

4 fig. cap. 1 lib. 2. 4 m. ter E et I. b 7 mus. id. S, T, V.

rem

rem illam imaginem adeo scite commonstrat. Duæ enim superiores superficies, amplæ admodum sunt. tertia autem inferior uel angusta cernitur, nec ualde depressa, sed insigniter aspera & inæqualis. Præterea spinæ huius mucro obtusus ampliusq; est, non ut superiorum uertebrarum spinæ acutus & strictus. Vnde decimæ uertebræ¹ spina, adhuc minus quam decimæ exporrigi, & utrinq; magis adhuc deprimitur, ampliorq; (si superiora inferioraq; inspexeris) efficitur. Deinde inferior ipsius superficies in lineam insigniter extuberat, neque amplius depressa, sed arcta & aspera uisitur, huiusq; spinæ mucro admodum obtusus est ac spissus. Duodecimæ² spina, adhuc magis à superiorum uertebrarum spinis uariatur, ad lumborum uertebrarum³ spinæ imaginem magna ex parte accedens, quæ utrinque admodum depressa est: & si summum in unumq; spectes, admodum lata & ampla. Cæterum ut omnibus uertebis non eadem spinarum forma accidit, sic etiam spinæ ductu inuicem discrepant. Nouem nanque superiorum thoracis uertebrarum spinæ, ut & ceruicis, insigniter decliues feruntur, seu à summo ad imum tendunt. Decimæ autem thoracis uertebræ spina minus quam superiorum spinæ deorsum conuiert, magisq; recta retrorsum fertur. Vnde decimæ spina adhuc rectius erigitur, & huius rectitudinem duodecimæ spina uincit. Verum interim harum nulla adeo recta fertur, quin ipsius mucro semper magis deorsum, quam sursum, uergat. quod etiam omnium in lumbis uertebrarum spinis accidit, deorsum magis quam sursum spectantibus. Atque hæc in hominis dorso subaudienda sunt. Canibus enim, simijs, leporibus, & alijs ferè quadrupedibus prorsus contraria est ratio, Galeni dogmatibus pulchrè quadrans. His enim decimæ thoracis uertebræ spina neque deorsum neque sursum uergit, & duæ deinceps, quæ statim decimæ subiaciunt, spinam habent obscure superiora suo mucrone spectantem. Reliquæ uerò has adhuc subsequentes spinas exigunt ab imo sursum porrectas, longè perfectò secus, quam homo, cui ne unius quidem uertebræ spinam sursum magis, quam deorsum, inclinare, nemo uerè asserturus sit. Transuersi colli uertebrarum processus, quemadmodum & nouem superiorum thoracis, ex Galeni sententia, decliues, seu à summo ad imum deberent porrigi: uerum id adeo obscure leuiterq; fit, ut uix mentione dignum uideatur. Quandoquidem si transuersos colli uertebrarum processus non perfunctorie consideraueris, dices illos⁴ externo seu posteriori eorum latere, deorsum respicere: interno autè seu anteriori latere, quod posteriori latius est, sursum tendere. Transuersi autem nouem superiorum thoracis uertebrarum processus, toto ipsorum corpore retrorsum & sursum magis, quam deorsum, feruntur. Verum⁵ superior eorundem pars gibba uisitur, inferior caua, & nonnihil sinuata, quasi hac ratione descensus ad inferiora speciem processus illi referrent. Transuersi autem processus duodecimæ thoracis, non solum sursum conuiert, uerum etiam egregie retrorsum ducuntur, quemadmodum & undecimæ & decimæ processus nonnihil sursum spectant. Transuersi lumborum uertebrarum processus admodum obscure sursum ducuntur: quamq; uertebræ sacro osi commissæ, paulò manifestius suos processus sursum efferre cernitur. In canibus transuersi processus colli uertebrarum perquam conspicuè & manifestò deorsum tendunt. Thoracis autem uertebrarum processus, aut non deorsum feruntur, aut admodum leuiter. Verum lumborum uertebrarum processus insigniter in altum oblique porriguntur, & Galeni descriptionibus ad amussim conueniunt: si modò uertebrarum numerum exceperis, plures enim lumborum uertebræ canibus & caudatis simijs obtigerunt, quam hominibus, qui etiam plerumque à canibus una thoracis uertebræ superantur. Ad hunc igitur modum transuersi posterioresq; thoracis uertebrarum processus constituuntur. illi uerò⁶ quos ascendentes & descendentes uocamus, ea quæ nunc subsequitur serie disponuntur. Vertebrarum omnium quæ supra sacrum os habentur, articulationis, quæ nuper dictis efficitur processibus, duplex est ratio. aut enim succumbens uertebræ superiacentem subintrat, ac ab illa suscipitur: aut succumbens superiorem in suis sinibus excipit. adeo ut omnis uertebræ, duabus tantum demptis, una parte suscipiatur, altera suscipiatur. Prima enim ceruicis uertebræ & superiori & inferiori sede suscipitur, superior quidem occipitis ossis capitula, inferiori autem secundam ceruicis uertebram. Duodecima uerò thoracis (nisi alia quæpiam interdum sit) utrinque suscipitur, nullam interim suscipiens. Omnes itaque hæc uertebræ superiores, ad primam usque ceruicis, priori articulationis genere committuntur, superior enim semper inferiorem excipit, ut decima thoracis undecimam. Quæ autem sub utrinque suscepta locantur, superiori quidem sui parte superiacentem excipiunt, inferiori autem parte subiacentem ingrediuntur. atque ita prima lumborum uertebræ à secunda suscipitur. Thoracis uertebræ supra utrinque susceptam repositæ, eandem in ascendentibus descendentibusq; processibus speciem cum⁷ colli uertebis obtinent. Sunt autem hæc thoracis uertebræ, secundum Galeni sententiam in libro de Ossibus, nouem superiores: aut alicubi in libris de Vsu partium decem. Is enim hic undecimam, illic ue-

Spinarum ductus.

Libro de Ossibus, & libro 13. de Vsu partium.

Transuersi, & processus ductus.

Tum alibi, tunc in lib. de Ossibus.

Differentia ab ascendentibus & descendentibus processibus, eorumque articulationis ratio.

rò decimam thoracis suscipi tradidit, uti in simijs & canibus cernebat. mihi autē nunquam decima utrinque suscipi in homine uisa est, sed plurimum duodecima. Aliquando enim cum sacrum os quinque tantum ossibus efformatum repperi, undecima mihi utrinque suscepta occurrit. Verum Bononiæ Galli cuiusdam sacerdotis ossa contexuimus, in quibus prima lumborum utrinque suscipitur, & illa suos processus perinde sibi articulatos gerit, ut duo decima thoracis uertebra duodecimas costas. Quum itaque duo decima thoracis frequentissimè utrinque suscipi appareat, ab hac orationem instituamus. Vndecim thoracis uertebra⁹ processus ascendentes protuberant, acin⁷ exteriori posteriori ue sede, notatu digna orbiculari⁹ circumferentia cartilagine incrustantur, atque horum processuum tuber adeò leuiter ac in plana superficie extuberat, ut num sinus, num tuber censendū sit, uix internoscas. Descendentes autem processus interna anteriori ue ipsorum sede, qua foramen dorsalis medullæ gratia calatū respiciunt, sinum quoque adipiscuntur amplum, & quodammodo orbicularem, & cartilagine incrustatum, & nuper dicto tuberi ad amussim respondentem. Hi sinus & tubera, à colli uertebra⁹ sinibus tubibusq⁹ in ductū duntaxat uariant. Colli enim uertebra⁹ sinis, ac tubera oblique ab anterioribus sursum porriguntur, aut contrā oblique deorsum tendunt. Nihil enim refert, siue sursum, siue deorsum porrigi dixeris, modò obliquitatem illorum intelligas, & cum thoracis uertebra⁹ sinuum tuberumq⁹ ductū conferas. qui quandantenus recto perficitur tramite, quò firmior minusq⁹ ad motum sequax thoracis uertebra⁹ cōtextus foret. Quum igitur thoracis uertebra⁹ ut & colli, ascendētes processus posteriori sua sede protuberent, descendentes uerò interna sede cælentur, meritò ascendentes inferioris uertebra⁹ processus subintrant descendentes superioris uertebra⁹ processus, inferiorq⁹ uertebra à superiori excipitur.

*Ab a ad b
colli uertebra
rū processu
ductus meti
tur. à c uerò
ad thoracis.*

*Quo modo li
borum uerte
brae mutuò de
articulatur.*

Cæterum lumborum uertebra⁹, alia ratione coordinantur. Ascendentes enim illarum processus interno latere, quo se inuicem illi respiciunt, sinum habent oblongum, & amplius fatiscatum. Descendentes autem processus latere suo externo (modicè interim uersus anteriora) oblongo protuberant capitulo, quod in inferioris uertebra⁹ ascendētis processus sinu aptè excipitur. Adeò, ut in lumborum uertebra⁹ inferior uertebra suis sinibus superioris admittat capitula: secus quàm in ceruice & thorace, ubi superior suis sinibus inferioris uertebra⁹ tubercula excipit. Duodecima autē thoracis uertebra⁹, ascendentes processus similes gerit cum ascendētib⁹ ceruicis ac thoracis uertebra⁹ processibus, quos posteriori sua sede extuberare diximus. Atq⁹ ideo duodecima ascendētib⁹ suis processibus undecima thoracis uertebra⁹ descendentes subit, ipsaq⁹ ab undecima excipitur. Descendentes uerò duodecimæ processus extuberant quoq⁹, descendētib⁹ in lumbis uertebra⁹ processuum ritu, deinde hi subeunt sinis ascendētib⁹ processuum primæ lumborum uertebra⁹, quæ quum duodecimā excipiat, quid promptius colligipossit, quàm duodecimam suprà infraq⁹ suscipi? Verum interim non ita multum refert, an duodecima, an undecima, an alia quæpiam utrinque suscipiatur: modò nos indicibilis Naturæ industria hîc non lateat, quæ in dorsi medio uertebra⁹ effinxit, stabilem, & utrinque ita susceptam, ut in cameratis & arcualibus ædificijs architectos inter utriusque lateris lapides unum locare cernimus, qui utrinque suscipitur, ipso interim nullum suscipiente: quemadmodum cæteri omnes unum lapidem suscipiunt, & ab alio excipiuntur, sustinenturq⁹. Vt enim dorsum sibi dicatis ageretur motibus, hanc uertebra⁹ utrinque susceptam quiescere, firmariq⁹ necessum est, reliquis interim omnibus ab hac & à se inuicem leuiter secedentibus: Illa enim quiescente quum dorsum flectimus, superiores deorsum ducimus, inferiores autem quodammodo sursum incuruamus. In tensione uerò rursus opposito motu uertebra⁹ agimus: si quidem dorsi motus circularij, non autē prorsus angulari figura celebrantur. Quàm parum uerò hæc cum Galeni in decimo tertio de Partium usu, placitis conueniant, si mutuò loca contuleris, promptè animaduertes. Cæterum dorsi motus unà cum ipsius musculis parum rectè hæcenus cognitis, in secundo libro exequemur. Iam autem ad thoracis uertebra⁹ reuerfis, inter utriusque lateris ascendētem & descendētem processum, insignes nobis⁹ obseruandæ sunt asperitates, inæqualiterq⁹ protuberantes processuli, in hoc parati ut ualida hinc pronascerentur ligamenta, tanto robustius firmiusq⁹ thoracis uertebra⁹ colligantia, quanto obcuriori motu thoracis uertebra⁹, quàm ceruicis moueri, ex usu fuerit. Quæ quum ita sint, omnes thoracis uertebra⁹ septem donantur processibus: duobus nimirum transuersis, duobus ascendētib⁹ & totidem descendētib⁹, unoq⁹ posteriori, seu spina. Si uerò undecima, aut aliqua hac superior, utrinque susciperetur, tunc duo decima, aut omnes utrinque susceptæ humiliores, duobus abundarent processibus, quandoquidem ascendentes singuli duorum loco, propter sinum illis incisum enumerarentur. Veteribus enim nonnullis, hic sinus tam insignis habebatur, ut singulos ascendentes lumborum uertebra⁹ processus, geminos enumerasse uidean-

*Thoracis uer
tebra⁹um pro
cessuum nume
rus.*

*q. fi. T. v.
r. 2, 3, fig. 22,
Y.*

si. fi. c.

*t. 2. fi. cap.
17. K. L. M.*

*u. 2. fi. ca.
17. O.*

x. 4. fi. c. f.

y. 4. fi. b.

*Figura O-
peris fronti
adhibita uas
rios arcus
ostendit.*

*2. 23. fi. cir
ca G.*

*d. 1. 2. 3. 4. fi.
H. I.*

*b. 1. fi. T. V.
2. 3. fi. X. Y.*

*c. 2. 3. fi. a. b.
d. 1. 2. fi. N. O. P.*



*e. 1. fi. ca. 17
K. quide si-
nus nota-
tur, tubera
autē M. L.*

uideantur. At nunc satius erit, & illis quoque uertebis peculiare Caput consecrare, hæc q̃
inibi accumulatus persequi.

DE LUMBORVM VERTEBRIS.
Caput XVII.

PRIMA XVII CA-
PITIS FIGVRA.

SECVNDVDA.



TERTIA. CVIVS VT
ET DVARVM PRIMARVM,
ac earundem characterum Indi-
cem iam subiungemus.



QVONIA M omnes lumborum uertebrae eadem forma constant, unam duntaxat ipsarum
triplici facie hic expressimus: Prima quidem figura anteriorem uertebrae faciem, Secunda la-
tus, Tertia posteriorem faciem proponentes.

1, 2, 3 Appendix superior corporis uertebrae.

3 1, 2 Appendix inferior corporis uertebrae.

2, D, E, F, G His characteribus non in eadem figura obuijs, spina simul notatur, ac singuli priuatim
in spina aliquid hunc in modum indicant.

1, 2, 3 Indicatur spinae lumborum uertebrae superior pars, seu lata aspera q̃ ipsius linea.

D 2 D latitat in umbra sub spina secunda figura, notans lineam inferiorem spinae.

E 2 E non procul à D distat, notans alterius lateris sinum, ad latus lineae D insignitae consistentem.

F & G 2, 3 Appendix spinae, triangulum referens, ac in basi G, in acuto aut è angulo F insignitus.

1, 2, 3 Alterius lateris transversus processus.

1, 2, 3 Ascendens alterius lateris processus. Verum K, L & M in secunda figura et tertia expref-

L, suis alterius lateris ascendens notatur processus. K enim sinus insignitur. L uero antierius eius

M. dem sinu labrum seu supercilium. M. autem posterius supercilium.

0, 2, 3 Descendens alterius lateris processus. O in tertia figura positum, eius processus tuberculum
notat, seu caput.

QV O leuiori opera processum hoc Capite priuatim de-
scribendorum sedem formamq̃ assequaris, praesenti figura cau-
datae sinia lumborum uertebrae dextra facie, expressimus. in
qua A & A uertebrae illius notant corpus. B transversum
processum hic manifestò sursum spectantem. C spinam, quae etià



G 3 sursum

sursum uergit. D & E, duos indicant ascendentes processus. F uero & G, duos descendentes processus insinuant. Postremo H indicatur processus, quo humanae lumborum uertebrae (uti paulum infra audies) priuantur.

*Quis modi
sint lumborū
uertebrae
corpora.*



Foramina.

*Transuersi
processus.*

Spina.

*Ascenden-
tes processus.*

*Descendentes
processus.*

*Processus
quem Galenus
ex abundanti
lumborum uer-
tebris scribit
lib. 13 de Vsu
paruum, & li-
bro de Ostitibus
cap. 10.*

*IO. ANDRE-
AE ALBII
bolsidalis.*

ERRE omnia quæ ad lumborum uertebras spectant, antea recensuimus, ac proinde illarum descriptioni modo prolixius non immorantes, obiter prius commemorata resumemus: dein si hoc Capitulum priuatim aliquid sibi uendicat, subiecturi. Sunt itaque lumborū^a uertebræ numero quinque, omnium quas hactenus descripsimus maximæ & crassissimæ, ob quod etiam ipsarum corpora multis foraminibus opplentur, quæ non peruia sunt, ac duntaxat ualorum nutrimentum afferentium occasione parata.

Foramen uero dorsali medullæ in his exculprium, tanto minus est incumbentium uertebrarum foraminibus, quantum iam toto progressu dorsalis medulla gignēdis neruis^b tenuior graciliorque euasit. Foramen emittendo neruo & admittendæ uenæ arteriaque in ambobus uertebrarum lateribus caelatum, ferè uniuersum ad superiorem referitur uertebram, quæ eius foraminis superiorem sedem ac latera constituit, quum interim subiecta inferior uel uertebra duntaxat humiliorē foraminis sedem efformet. Transuersi harū processus utrinque singuli, longè tenuiores sunt thoracis uertebrarum^c transuersis processibus. At interim admodum procerè educuntur, quasi costarum usum in lumbis essent præstaturi. Prima & quinta lumborum uertebræ, breuioribus transuersis donantur processibus quàm mediæ. Præterea nullius uertebræ transuersi processus sursum manifestò assurgunt, præter quintæ uertebræ processus, quibus quò minus transuersim aliorum modo porrigitur, ilium ossa obstant, quæ illius uertebræ corpori uiciniuss accedunt, quàm mediarum in lumbis uertebrarum transuersorum processuum est longitudo. Spina his est ualida & crassa, at pro ipsarum mole non admodum procera, aut longa. Si dextrum sinistramque in spina spectes, ipsa tenuis est: si autem superiora inferioraque consideres, latissima. Superius quidem acuta, & in asperam definens lineam: inferius uero crassior, & quasi duobus donata sinibus, in quorum medio linea seu oblongum educitur tuberculum, à quò ligamentum superiorem in spinæ inferioris uertebræ lineam pronascitur, quod spinarum interuallum oplens, dextros musculos à sinistris ita dirimit, ac ligamentum inter uenam & radium sedem sibi uendicans, internos cubitum occupantes musculos quodammodo ab externis interdiuidit. Spine^d mucro appendice, ut et thoracis uertebrarum spine, constat: & ualde obtusus, ac quodammodo triangularis uisitur, si modò utrinque ad latera unam trianguli costam, & tertiā (quæ alijs breuior est) in spinæ appendicis basi constituas. Ascendentes processus interno latere, quo se inuicem regione spectant, sinum adipiscuntur profundum, & si animum anteriori & posteriori sinus partibus accommodaueris, oblongum. Descendentes processus insigniter decliues feruntur, & externo ipsorum latere in oblongum tuberculum definunt, quod magis uertebræ anteriora quàm posteriora respicit. Tubercula hæc in subiectæ uertebræ ascendētes subeunt processus, quemadmodum etiam antea fusius exequutus sum: adeò ut huic Capiti hactenus, quod prius non recensui, nihil adiectum sit. Neque etiam aliud subnecterem, nisi Galenus lumborū uertebris, ex abundanti unum utrinque tribueret^e processum, quem ad inferiora uergentem iuxta foramen situm scribit, quo neruus à dorsali medulla principium ducens prolabitur. Ego hunc processum in humanis uertebris nunquam obseruauī, unde etiam in hoc inquirendo eadem ratione & uia mihi utendum duxi, quæ ea indagare soleo, quæ à Galeno descripta in hominis corpore mihi haudquaquā occurreret, quæ uel secus quàm ipse tradidit habere cernerem. Consueui enim hæc omnia mox in brutis animantibus, & potissimum (quorum copia nunquā defuit) canibus examinare, qui per sæpe Galeni descriptionē mihi ostenderunt, aut ueluti manu ducentes, quid sibi uoluerit, edocuerūt. Hic itaque processus me tantisper latuit, donec omnium partium anatomen Bononiæ in simia illa aggrederer, cuius ossa præter humanum sceleron, IOANNI ANDREAE ALBIO, Hippocraticæ medicinæ apud Bononienſes professori clarissimo, compegi: quum is, ut uir est splendidissimus, suæque Academiæ studiosis summè addictus, omni humanitate admodumque liberaliter in ipsius ædibus me Bononiā hominis fabricæ docendæ gratia uocatū secundò, exceperisset. In simiarum igitur lumborū uertebris ad radicem^f transuersi processus in inferiori ipsius sede, acutus conspicitur processus rectè deorsum protensus, & sinus qui nerui nomine incisus est, externum latus constituens, ac ueluti interuallum quoddam cum descendente processu efformans, in quod ascendens inferioris uertebræ processus subintrat. Cæterum est huius processus naturam in simia ob eius penuriam intueri non dabitur, canis tamen tres humiliores thoracis uertebras

*a f. cap. 14.
E, f. ter. m.
tegre 2. ad
M.*

*b f. fig. ca. 11.
l. br. 4. E, F.
c f. fig. capit.
14. Q.*

*d 1. 23 fig.
H.
e 1. 23 fig. ca.
16 H. 1.*

*f ostendit
id. 1. fig. in
tegram.
g 1. f. in te-
gram. 1. 23
b 23. C. D.
E, F. G.
i 23. 2. C.
ad D.
h 1. 23 fig.
C.*

*l. 2 fig. D. l. 2
neam. E. ad
tem alteri
sinu notat
m 7. musc.
tab. V.*

*n 23. 3 fig.
F. G.
o 1. 23. 3 fig.
1. K.*

*p 23. 3 fig.
q 23. 3 fig.
N. O.
r 23. O.*

s 4. f. H.

*t 4 fig. G.
u 4. f. H.*

bras contemplator, etiã eiusmodi processu donatas: uti & in senioribus canibus perpetuò lumborum uertebrae eiusmodi processum obtinere uidimus. In homine autem ne signum quidem eius processus ulla in uertebra reperitur. Lumborum igitur uertebrae in homine septem donantur processibus, uno scilicet posteriori, seu spina, duobus transuersis, totidemq; ascendentibus & descendentes. Simia uerò adhuc duos habet, quos ad transuersorum radices consistere diximus, ad eò ut his nouem adsint processus: quot etiam in homine quidam recensuere, quum singulos ascendentes processus, * in duos processus subdiuidunt, idq; sinuum ipsorum gratia. Verum hac ratione simijs undecim processus in lumborum uertebrae confurgerent. Porro Galenus interim (ne id prætereamus) parum sibi consentiens, in decimo tertio de Partium usu, foramina neruorum occasione cælata exprimens, non uidetur peculiarem in lumborum uertebrae processum fingere, quum descendentes harum uertebrae processibus illum usum ascribat quem aliàs dicto nobis simiarum processui tribuit.

Lumborum uertebrae processuum nomenclaturæ.

DE OSSE SACRO, ET OSSE COCCYGE. Caput XVIII.

PRIMA DECIMIOCTAUI CAP. FIGURA.

SECUNDA.



TERTIA.

TRIUM QUAE HIC PROPONUNTUR FIGURARVM ET earundem characterum Index.

PRÆSENS tabula, uniuersum dorsum osium, quæ lumborum uertebrae subiiciuntur, contextum exprimit. ac prima quidem ipsius figura, quæ dextrum latus occupat, anteriorem horum osium faciem spectandam proponit. Secunda uerò in sinistro consistens latere, posteriorem ostendit faciem, modicè in latus delineatam, sinus demonstrandi gratia, cui dextrum illud os coarctatur. Tertia autem figura in dictarum medio consistens, integrum coccyx os ea forma magnitudinèq; oculis subiicit, quæ id in uetere ætatis hominibus plurimùm obseruatur.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K Hi characteres in prima figura nouem denotant ossa, quintam lumborum uertebrae subsequenti, quorum sex superiora sacri ossis loco in homine habiturus sum: quatuor uerò inferiora (quæ etiam G, H, I, K in tertia figura insinuantur) mihi coccyx, seu (uti interdum loquimur) coccygis os, appellabuntur.

L, L, R In prima figura notatur transuersi ossis sacrum os constituentium processus. uerum hic L & G 4 L, pri

L, priuatim indicat. amplitudinem processus secundi ossis. *R* autem, & in hac, & in secunda figura ostendit processus transversus quinti ossis tuberculum, cui nonnulla ligamenta implantari *M*. audies. In secunda itaque figura *L*, *M*, *L* & *R* transversos processus ossis sacri ossium insinuant.

N N deinde *O O*, postremo *P Q* & in secunda figura ossis sacri dextrum sinum notant, cui dextrum ilium, aut (ut alijs forte placebit) ilis os connectitur, & qui postmodum in plures sinus & tubera subdividitur. *N* enim & *N* notatur ipsius oblongus sinus, & anterior. Quero & *O* tuberculum indicant instar amplæ cuiusdam lineæ prominens, ac anteriorem sinum *N* & *N* notatum à posteriori *P*, *Q* & *Q* insignito dividens. *P* enim superiorem sinus posterioris sinum notat. *Q* autem inferiorem. Quero tuberculum designat, superiorem sinum *P* notatum ab inferiori sinu *Q* insignito interdiuidens.

S In prima & secunda figura, primi ossis dexter ascendens processus notatur.

T, *V*, *X* Hi characteres in secunda figura tantum apparent, ac *T* quidem notat sinum ascendētis processus, *S* indicati, cui tuberculum descendētis dextri processus quintæ lumborum vertebrae articulat. *V* uero & *X* sinus huius anterioris posteriorisq; notant supercilium. quamquam in terius etiam superciliū in secunda figuræ ascendente sinistri lateris processu, *X* insigniuimus.

Y In secunda figura connexus frequenter apparens significatur, quo primi sacri ossis descendentes processus ascendētib; secundi ossis ad eum modum committuntur, quo hac sede lumborum vertebrae articulari, iam multo antea didicisti.

Z In prima secundaq; figuris connexus notatur transversus processus primi ossis, cum transversus secundi ossis processu.

a In prima figura & secunda, indicatur inferior extuberansq; sexti ossis pars, quæ primo coccygis ossis ossi coarticulat.

bb In tribus figuris insinuat cartilaginosa ligamentum, coccygis ossis commissuras intercedēs.

c In secunda & tertia insignitur cartilago, mucroni coccygis ossis adnata.

dd In secunda sacri ossis ossium spinæ posteriores ut processus ostenduntur.

e, f, g, h, i, k Hi characteres in secunda figura admodum latitant, notantes dorsalis medulla in osse sacro iter, foraminaq; hic inter spinarum intervalla subinde conspicua.

1, 2, 3, 4, 5, 6 His numeris in prima & secunda inscribuntur foramina nervorum à dorsali medulla in sacro osse complexa originem ducentium, quæ sex constituunt paria, in anteriori ac posteriori sacri ossis sede excurrentia. Horum primum par inter primum os sacri ossis & quintam lumborum vertebrae exilit, ipsiusq; sedes 1 insignitur. Secundi autem par foramen inter primum & secundum os consistens 2 indicatur: & ita seriatim reliqua suis numeris ostenduntur.

QVARTA
FIGURA.



QVINTA.



QVONIAM in præsentis Capitis contextu, Galeni gratia sinuarum & canum sacri ossis & coccygis mentio incidet, non ab re duximus, & hic quoq; ea ossa, uti in sinijs obseruantur, exprimere: quarta quidem anteriorem sedem sacri ossis, & dein coccygis explicantes; quinta uero eorundem ossium posteriorem sedem. Numerus igitur ille 1, 2, 3, & c. sex indicat ossa, quorum tertio cartilago priuatim subnascitur. Neq; est quod hæc ossa prolixius characterib; depingam, quum illa ex humanis ossibus promptè intelligantur.



VENIAM AD MODVM permulta haecenus commemorata, aliaq; postmo-
dum & in hoc & subsequenter libris frequentissime recensenda omnium
qui Galeno successerunt medicorum in dissectionibus osecitantiam ac insi-
gnem prorsus inscitiam attestantur: ita profectio non minus & ossis sacri,
& coccygis quae apud omnes obuia est descriptio. Quid enim prohibet
obsecro, illos Anatomes imperitos rudesq; dici, qui Galeni descriptiones
in aliquibus falsas, in plerisque simijs & canibus, non autem hominibus con-
uenientes, ac si eas in homine spectassent, posteris prodiderunt: ac nunquam ab ipsis ne per
somnia quidem uisa, & saepe perperam in Galeni libris intellecta, scribarum modo recensere
haudquaquam sunt ueriti: Apud quem quaeso, Galeni tempora secutum, alia ossis sacri & coc-
cygis fit mentio, quam à Galeno uarijs locis sibi non constanter proditur: quum interim nulla
prorsus imagini ossis humani accedat. At in praesenti reliquos Galenum secutos, qui hominis
partibus cognoscendis obfuerit potius, quam profuere, missos faciamus, Galeni omnium disse-
ctionis professorum facile coryphaei placitum altius resumentes, quò minus turpiter ipsius quo-
que autoritatem negligisse uideamur. In libris itaque de Partium usu, sacri ossis non semel inci-
dit mentio: idq; inibi quatuor ossibus extrui docetur, nullo interim uerbulò de coccyge osse
ascripto. Et praeterquam quod coccygis ossis Galenus inibi non meminerit, abundè constat,
hoc ipsi quum illos libros scriberet, fuisse incognitum. Quandoquidè quatuor ossis sacri ossa esse
docens, illorum extremò talem² cartilaginem adnasci subiungit, qualem nos coccygis ossis
mucroni in sermonis progressu obnasci dicemus, & in quam ossium fines alteri ossi non com-
missi, perpetuo ferè degenerant. Praeterea in duodecimo de Partium usu,^h transuersos sacri
ossis procellus tenues & subtiles esse asserit: quum in libro de Ossibus eos (uti mehercule sunt)
crassos & amplos esse doceat. Verum Galenus in hoc de Ossibus libro, quem post libros de
Partium usu, iam in simiarum sectione peritior, aggressus est, sacrum os³ tribus efformari ossi-
bus perceret. Illiusq; libri ossis descriptio utcunque breuis sit, simiarum tamen & canum ossi
sacro eleganter & scite congruit. Dein sub tribus ossis sacri ossibus⁴ alia tria enumerat ossicula,
simul coccygis nomine ab ipso donata, & succinctè ut in simijs sese habent enarrata. In libris de
Administrandis dissectionibus, quos omnium Anatomes librorum postremos secundo exa-
rauit, ut semper simiae magis quam hominis constructionem inibi pertractat, sic quoque sacri
ossis & coccygis ad eum modum meminit, ut nihil omnino ipsius oratio inibi à libro de Ossibus
discrepet. Quando enim inter femoris motuum autores⁵ musculus recenset, quem à coccyge
osse principium ducere inquit, promptissime colligitur, illum tria ossicula in simijs tertium os
sacri ossis subsequenter inuuisse, quum interim in libris de Partium usu (dum magna ex parte
aliorum Anatomiconum niteretur placitis) eum musculum à sacro osse (uti etià in homine fieri
audies) enasci scripserit. Ceterum quo minori negotio Galeni dogmata assequaris, & eorum
oseitantiam pariter expendas, qui ex aliorum libris ea quae nunquam uiderunt ridiculè transcri-
bunt, iam me non pigebit & sacrum & coccyx os, ut in simijs canibusq; se habent, describere, ac
postmodum hominis ossium historiam instituere. In canibus itaque & simijs sub infima lum-
borum uertebra,⁶ os quoddam reponitur tribus efformatum ossibus, ita inuicem commissis,
ut in anteriori sede earundem medium talem connexus speciem ostendant, qualem uerte-
brarum corpora mutuo compacta exhiberent, si quando ita coaluissent, ut ne tantillum quidem
moueri possent, & ex ipsorum medio omnis cartilago temporis successu iam euauisset, quan-
quam & in catulis sacri ossis ossium unio cartilagine etiam aliqua (ut in appendicum connexu)
repleri conspiciatur. In lateribus anterioris iam dictae sedis, haec ossa in aetate prouectis uix ali-
quam coalitus imaginem ostendunt, sed continuè ab initio fuisse uidentur, quemadmodum
& posterior ipsorum ossium sedes prorsus (nisi fortè in admodum catulis) continua apparet.
Tria haec ossa inuicem ad hunc modum coalita, Galeno in libro de Ossibus, & libris de Ad-
ministrandis sectionibus sacrum seu amplum & latum os dicuntur. Sunt enim haec à lateribus
ampla, continuaq; & quum uertebrae imaginem quodam modo expriment, hic amplos la-
tosq; transuersos processus efformant, qui inuicem continui in se insignem & inaequalem aspe-
rumq; sinum in externo latere excisum gerunt, quo illium ossibus ualidissime coarctantur. In po-
steriori parte hoc os tres exiguas efficit spinas, minus quam Galenus arbitratur sursum specta-
tes, & subinde instar continuè lineae constitutos. Hoc sacrum os superius inferiusq; magna ex
parte lumborum respondet uertebrae. Superior namque pars, superiori earum uertebrae sedi:
inferior autem, inferiori assimilatur. Superior enim ossis sacri pars tanta amplitudine protube-
rat, & appendice donatur, quanta est inferior corporis infimae lumborum uertebrae pars, quae
sacro ossi eadem prorsus ratione committitur, qua lumborum uertebrae inter se coarctantur. Prae-

*Med corum
in Anatomie
oseitantia &
ignorantia.*

*Galeni de sa-
cro osse et co-
cyge sententia.
Lib. 12, 13, 14,
& alibi.*

*Libro decimo
quinto.*

*Simiae ca-
nisi, sacri os-
is descriptio.*

*Coccygis
canini de-
scriptio.*

terea sacri ossis superior pars duos exigit ascendentes processus, eodem modo insinuatos, quo ascendentes in lumbis uertebrae processus caelari diximus. His excipiuntur in finem lumborum uertebrae descendentiū processuum tubercula. Porro inferior sacri ossis pars (quae tertij & angustissimi trium ossium sacri ossis humilior sedes est) orbiculari quoque protuberat corpore, lumborum uertebrae corporibus forma admodum simili. Nulla enim ratione illud ab his uariat, quam quod sacri ossis corpus lumborum uertebrae corporibus tanto minus sit, quanto hoc corpus ab illis mole uincitur. Praefens sacri ossis corpus uni committitur^b ossiculo, quod ex tribus ossibus coccygis ossibus iam primum enarrabitur. Sub sacro itaque osse tribus ad hunc quem diximus modum ossibus concinnato,ⁱ alia tria collocantur ossicula ordine inuicem succedentia, & lumborum uertebrae in cōformatione non absimilia. In nullo namq; ab illis imagine differunt, nisi quod transuersos processus latiores, quam lumborum uertebrae, obtinent, & eosdem magis deorsum quam sursum coniucentes; dein spinam aut nullam, aut perquam exiguam à se porrigunt. Corporum enim forma penitus illis respondet uertebrae, nisi forte pro ossiculorum mole haec aliquis, minima quaeq; expendens, ampliora esse astrueret. In ascendentibus autem & descendentibus processibus ne minimum quidem differunt. Horum itaque trium ossiculorum supremum, suo corpore tertio sacri ossis ita coarctatur ossi, ut lumborum uertebrae inter se. Suis enim ascendentibus processibus descendentes ossis sacri processus excipit. Tria haec inferiora ossicula Galeno coccyx proculdubio appellantur. Inter tria enim haec ossicula, & inter horum supremum & sacri ossis inferiorem partem, non minus interuenit cartilaginis, aut potius cartilaginei ligamenti, quam inter lumborum uertebrae, quum inter tria sacri ossis ossa nihil, uti iam diximus, cernatur cartilaginis, & praecipue in aetate prouectioribus. Deinde in canibus simijsq; musculus femur mouentiū quartus, à tribus illis ossibus principium sumit. eum dico, quem in tertio de Administrandis sectionibus à coccyge osse enasci Galenus testatur. Quin etiam foramina neruis transmittendis incisa, Galeni in libro de Ossibus descriptioni accuratè conueniunt. Tria enim neruorum paria sacro ossi, & totidem coccygi à Galeno tribuuntur, quae in hunc se habent modum. Veteribus Anatomes professoribus is in neruorum paribus recensendis mos fuit, ut neruorum par semper ad neruis subiectam referrent uertebrae. ac proinde primum dorsalis medullae neruorum par enumeraret, quod inter occipitis os & primam colli uertebrae profilit: secundum, cui inter primam & secundam colli uertebrae uia exculpitur. Sic itaque primum neruorum ossis sacri par id censetur, quod inter primum ipsius os & infimam lumborum uertebrae elabatur, cui foramina ad eum modum inciduntur, quo in lumborum uertebrae ea haberi iam pridem proditum est. At secundum & tertium par, non à lateribus primi paris ritu exiliunt. Quum enim ossis sacri latera articulatione cum ilium ossibus praepedirentur, impossibile fuit & hic quoque per latera neruos excidere. Quocirca in anteriori & posteriori ossis sacri sede foramina in ossium compage caelantur, ut hac Naturae industria ab illis neruorum paribus, quemadmodum & à ceteris fere omnibus antrosum retrorsumq; soboles opportunè dirigerentur. Ac secundo quidem pari foramina in primi ossis cum secundo compage excinduntur, tertio autem pari uia paratur, quae secundum ossis sacri os tertio coalescit. Ceterum tribus à coccyge osse pullulantibus neruorum paribus foramina perinde ac in lumborum uertebrae exculpitur, quum enim horum ossium latera (ut ossis sacri ossium) articulatione non occupentur, satius fuit eandem hinc foraminum seriem obseruare, quam in alijs uertebrae laterali articulatione non praepeditis fieri docuimus. potissimum quum horum ossiculorum articulatio illi par sit, qua lumborum uertebrae inuicem coarctantur. Primum itaque par in utroque latere uno inciso foramine inter tertium sacri ossis os & primum coccygis prodit: Secundum uero inter primum coccygis os, & secundum: Tertium autem par, inter secundum os & tertium egreditur. Ab humiliori uero sede tertij ossis, quod dorsalis medullae reliquum est, coniugis expers, nulliq; associatum excidit. Singulis enim ossibus sacri ossis & coccygis ossis dorsali medullae uia exculpitur, medullae hinc crassitie respondens. Extremo tertij ossis coccygis ossis in canibus & caudatis simijs solida & non perforata ossa, oblonga & superius inferiusq; crassiuscula, in medio autem tenuia quadam continua serie annectuntur, caudamq; constituunt. Interdum uero, neque id infrequenter, in multis canum & simiarum speciebus etiam plura tribus uidentur coccygis ossis ossa, eiusdem prorsus cum tribus superioribus formae. atque ita etiam illis tunc plura neruorum paria ab illorum ossium lateribus profiliunt. Non caudatis simijs infimo coccygis ossis ossi cartilago tantum adnascitur: quanquam tamen ex illis non adeo concinne, atque ex canibus, Galeni sententia intelligatur. Quum igitur haec ita in illis animalibus se habeant, ex hisq; Galeni descriptionem optime percipiam, & pariter in scholis adeo amice ostendam, ac postmodum

b 4 fi. cha. rati. 4.

i 4 fi. cha. rati. 4, 5, 6. quae conseres cum integram si gur. lumborum uertebrae.

Hac fere feriatim petiuntur ex 2, 3 fi. Cap. 11. lib. 4. praepositis.

in homine secus omnino inueniam, cur quæso scioli quidam, & in Galeni uerba iurati, ad aliudq; nihil quàm ad detrahendum & inuidè de aliorum laboribus (quum ipsi nihil possint) iudicandum nati, nunc mihi obstrepent, quòd toties Galeni placitis inter dissecandum minime acquiescam: Quasi uerò & ipsi oculis priuarentur, ac mihi quæ meo Marte adinuenio, non liceret, ob nescio quam in Galenum religionem, apud cruditissimos sapenostre ætatis uiros proferre. quum interim hisce rabulis, nullus nec bonus nec malus genius silentium possit imponere, si quid dignum de medicinæ subiecto, & arsne an scientia sit, & num prædicatorum tractatio ad logicum an ad metaphysicum spectet, & de intellectu possibilib, & num scientia de anima omnium sit præstantissima, alijsq; ineptijs reperissent. Verum illos ridiculos (quamuis interm superciliosos) homines, modò (uti longè minus adhuc præfens consueui) neutiquam moror: quin potius gratiam à ueritatis studiosis expecto, quod Galeni sententijs subinde commemoratis, ueram hominis cõstructionem ipse pertractem, etiam si fortè longius alicubi expatiatur oratio. Neq; arbitror Galeni (qui toties inter scribendũ ingenuisse uidetur, quòd simul cum ipso Anatomes studium prorsus, uti sanè accidit, collabretur) manes mihi ob id infestos fore, quod ipsum potius simiæ quàm hominis fabricã edocere, ac propter aliorum Anatomicorum qui illum præcesserunt libros, à simiæ cõstructione ad hominis demigrare, simulq; ambas confundere, ostendam. Quod non eò dico, quasi in sacri ossis & coccygis descriptione Galenus hominis ossa cum simiæ miscuerit (nisi uolens pauciora coccygis ossa, quàm subinde in caudatis simijs occurrunt, enumeraret) sed quod quinque tantum uertebras lumborum recenseat, quum canes & caudatæ simiæ plures habeant, nihilominus tamen Galenus & uertebras & sacrum os & coccyx os simiæ describat. Quod uerò ueteres illi pueros in Anatome exercentes, hominis ossa sedulo uersauerint, nomina attestantur partibus ab ipsis indita. Vix enim ambigo, quin *lōuoyzæ* appellauerint os quoddam à similitudine quam, quam cum aue à Plinio quoque coccyge (nobis uerò cucculo) nuncupata, obtinet: præcipue quum carne ligamentisq; adamussim nō est purgatum. Quæ autem hæc esse possit similitudo, tunc promptius exponam, quum horum quoque ossium in homine descriptionem succinctè addidero. Sub lumborum itaque uertebris in homine plurimũ decem reperiuntur ossa, quorum sex sacrum hominis os, quatuor uerò coccygem constituunt.¹ Sex enim superiora inuicem ita committuntur, quemadmodum tria ossa canis sacrum os efformantia, uniri relatum est. In medio enim anterioris sedis connexum ostendunt, qualem uertebrarum constituerent corpora, si adeò coaluissent, ut nihil cartilaginis in sex horum ossium unione uideretur, nisi forsitan in admodum pueris, quibus ossa adhuc prorsus non coaluere. In lateribus quoque anterioris partis, ubi (ut ita dicam) transuersi sex horum ossium processus inuicem uniuntur, admodum obscura cõnexus apparet species. In posteriori autem sede, unio prorsus aboletur, unumq; os ex illis sex efformatum conspicitur. Nulla enim hîc unionis se offert linea, nisi interdum in primi ossis cum secundo coalitu.² Quippe non rarò primum os secundo posteriori sede ea articulationis forma cõmitti speiatur, qua ascendentes descendentesq; in lumbis uertebrarum processus articulari solent. Verum etsi illi processus ita iungantur, transuersi tamen cius ossis processus, omni ex parte secundi ossis processibus coalescunt: & omnes isti connexus adeò sunt ualidi, ut primum os ne tantillum quidem super secundum moueri queat. Aliquando tamen sacra ossa in cimiterijs obuia primum os abruptum ostendunt, idq; ac si lumborum esset uertebra seorsum inuenitur. Nisi enim id primum os crassius & amplius donaretur transuersis processibus, à lumborũ uertebris forma uix discerni posset. Porro in pueris sex horum ossium coalitus etiam in posteriori sede cõspicius est, quemadmodum in anteriori parte est spectatissima. Deinde ut in nullis hominibus in anteriori sede coalitus omnino obliteratur, ita etiam perpetuo in posteriori sacri ossis sede ea coalitus species se offert, quæ ossium corporibus perficitur.³ Si enim foramini dorsali medullæ in sacro osse inciso, animũ accommodaueris, per foraminis progressum, ossium corpora ita liquidò coaluisse cerne, atque in anteriori sede. Præterea sex horum ossium series tribus ossibus quæ canis sacrum os efformant, responderet, quemadmodũ enim his supremum maius est medio, & medium maius infimo: ita quoq; hominis ossa tanto minora uidentur, quanto humiliorem in sacro osse sedem occupant. Quanquam secundũ os, hoc sibi priuatim uendicat, quòd inter reliqua ossis sacri ossa amplioribus crassioribusq; & antrosum retrosumq; magis prominentibus transuersis constet processibus.⁴ Primi seu supremi ossis superior pars, omnino superiori sedi cuius lumborũ uertebræ respõdet. Et corpus etiã quintæ lumborum uertebræ ita primo ossi adaptatur, ut lumborũ uertebræ superioris uertebræ processuum tubercula suscipiunt. Sexti uerò ossis humilior pars insigniter ab inferiori sede tertij canum ossis differt. Hominis enim os nullos descendentes adipiscitur processus,

Lib. 10. Naturalis hystoria Cap. 9.

Hominis sacri ossis descriptio.

si. cap. 14.
G. H. C. 1.
K. d. in m.
tegarum.
fig. M. N.
et huius ca.
toti. C. 2.
fig.
b. i. f. A. B.
C. D. E. F.
c. 4. fig. ch. 4.
tract. 1. 3. 3.
d. fig. cap. 14. R.
c. 1. 2. fig. L.
L. R.
f. 1. 2. fig. Z.
h. 2. fig. Y.

i. fig. f. 3.
h. 1. h.
i. fig. i. Z.
paulo sub
inferiori L.
Confer su-
perioiem
partem c. 1.
2. fig. cum
figuris ca.
17. aut con-
necti asper-
dant inter-
grit. fig. C.
fig. cap. 14.
m. 1. figur. a

processus, quibus sibi subdito ossē coarticularetur. Verūm duntaxat in orbiculare, sed paulō latius definit tuberculum: quod primo ossi, coccygis in homine ossis, eo modo committitur, quo uerterarum corpora inter se, aut potius quo caudarum ossa mutuo coarctantur. Quintam transuersis humani ossis sacri ossium processibus in externo latere, parumper uersus posteriora, sinus exculpitur, cui alterius lateris ilium os ualidissimē coarctatur. Est autem hic sinus admodum asper & inæqualis, ac primū quidem secundū ipsius longitudinem in medio extuberantem habet lineam, aut amplioris lineæ modo prominens tuberculum, quod sinum rursus, in anteriorem & posteriorem sinus, dirimit. Anterior utcūq; simplex est, asper tamen, & inæqualiter admodum incisus, posterior alius cauat, uerūm in medio processum ostendit transuersim extuberantē, qui sinum posteriorem denuō in superiorem & inferiorem interdiuidit. His sinibus aptissimē respondēt ilium ossa, muris tuberculis, sinibusq; donata. Sinus hi & tubera cartilagine aliorū sinuum modo non obducuntur. Quum enim alia tubera & sinus lacui continuatq; & plana cartilagine incrustentur, isti sacri ossis sinus nihil præter cartilaginea educta ligamenta, sacrum os robustissimē ilium ossi cōnectentia. Hi sinus præterea ad tripotissimum superiora ossa sacri ossis referunt, inferiora enim processus transuersos habēt tenues, at amplos interim, & inter se continuos, ex quibus musculus ille pronascitur, qui femoris motorum quartus habebitur. Verūm transuersus quinti ossis processus ea parte, qua transuerso sexti ossis unitur processui, tuberculū exigit, utcūq; prominens & crassum, in hoc formatum ut opportune duo ligamenta hīc sacro ossi implantarentur, quorum alterū ab acuto coxendicis ossis processu enalci docebitur, alterū ab elatiori sede appendicis, qua coxendicis os donari audies. Foramina neruis transmittendis in sex istis ossibus exculpta, imagine, quamuis non numero, illis omnino cōueniunt, quæ tribus canis ossibus inciduntur. In anteriori enim sede homini quina utrinq; iuxta corporum compagem foramina cælantur, & totidem in posteriori sede: adeo ut hæc ossa sex neruorū paribus uiam præbeant. Primum namq; inter primū os & quintam lumborū uerteram perinde egreditur, ac reliqui nerui ex lumborum & thoracis uerterarum lateribus profluentes. Secundū par inter primū ossis sacri os, & secundum: & alia hac serie deinceps ita elabūtur, ut excidens par ad subditum os perpetuō referatur. Præter hæc foramina neruis exculpta, in posteriori sacri ossis sede alia apparent, inter spinas ossium, in uiam spectantia quæ dorsali medullæ est parata. Hæc foramina ligamenti opplentur, perinde ac in canibus ferē peruia. Verūm interim ossis sacri ossibus spinæ obtigerunt, tanto in singulis ossibus proceriores, quanto os ipsum unde prodeunt grandius superiusq; est. Nulla tamen spina (si modo quid iudico) ne minimum quidem sursum conuiuet, sed deorsum potius omnes spectant, & ut in alijs uertribus cum transuersis processibus interuallum quoddam & sedem constituunt: in quam nonnulli dorsum mouentes musculi apte reponuntur, & à qua illi iustissimē cum alijs hinc prodeuntibus musculis originem ducunt. Tota autem ossis sacri sedes posterior gibba est, & curua, quò ita tutius propugnaculi modo cas quibus præest partes tueretur, ac ab occurrentibus muniret. Anteriori autem sede, læue est, neque asperum, sed sinum cauumq; quo aptiorem illis organis quæ cum alijs ossibus instar peluis cuiusdam completitur, sedem efformet. Ad hunc modum hominis sacrum os se habet, quod interdu quinque tantum constat ossibus, & tunc in anteriori sede duo desunt foramina, in posteriori tamen perpetuō sex neruorum coniugijs iter paratum cernitur. Coccyx os quatuor extruitur officulis: quorum supremum, sinum exigit, quo sexti ossis sacri ossis tuberculum excipitur: quod ipsi corporum uerterarum modo ligamenti admodum cartilaginei interuentu committitur, nulla interim alia accedente articulationis specie, nisi fortē quinque tantum ossibus sacrum os extruatur. Tunc enim ad foraminis cuiusdam in posteriori sede constitutionem, neruumq; sexti in sacro ossē coniugij deducendum ac defendendum. primum hoc os in posteriori sede duos acutos educit processulos, qui sursum spectantes, quinti ossis sacri ossis processibus ualidē coalescunt, ipsumq; primum coccygis os uix cartilaginei ligamenti interuentu quinto committitur, sed propemodum ossis sacri ossium ritu coalescit. Porro primum coccygis os, quando sex sunt ossis sacri ossa (quod frequentissimē euenit) eiusmodi nullos educit processus. Verūm ad sinus eius, quo sexto ossi sacri ossis coarctatur, latera, superiori ipsius sede latius ad transuersa extuberat: inferiori autem parte sensim angustatur, ac rursus secundo ossi ita omnino committitur, ut id sexto ossis sacri ossi diximus committi. Huic dein tertium & quartum succedunt, eodem penitus modo inuicem commissa, tantoq; minora, quanto unumquodq; in ipsa serie humiliorē locum obtinet. Quatuor his officulis nullum foramen unquam

Foramina
neruis in sa-
cro ossē trans-
mittentia.

Sacri ossis
spinæ.

Anterior
et posterior sa-
cri ossis sedes
cuiusmodi.

Coccygis os-
sis distinctio.

n fig. cap.
14. R. aut in
17. 3 fig.
huius ca b
o 2 fig. N
N, C, C
p 3 fig. cap.
29 A, B, C,
C, C.
q 2 fig. O
O.
r 2 fig. N, N,
2 2 fig. P,
Q, C. Verū
P, C, Q, C
os sinus, o
autem tu
ber notant.
t u musc.
tab. o.
u 1, 3 fig. R.
x 10 musc.
tabula, d
unum 7, d
terium 8.
7 2 fig. cap.
29 d.
2 Eadem
fig. l.
4 1, 2 fig.
charact. 1,
2 ad 6. spe-
dia tamen
magis 2 C
3 fig. cap.
u libro 4.
pre posi-
tas.
b 2 fig. e, f,
g, h, i, h.
c 2 fig. d, d
d.
d 10 musc.
tab. C, de-
m subsequē-
tes ad 16. u
que in hac
dorsi par-
te.
e 1, 3 fig.
G, H, I, K.
fig. cap.
14. 1, K.
in integris
N.
f. 1 fig. 6.
g 2 fig. inferi
us b.

unquam inscinditur, quo dorsalis medulla prorepat, aut ex quo ulli exiliāt nerui. In sexto enim ossis sacri osse dorsalis terminatur, neque ipsius¹ extremum in coccyx os descendit. Hæc officula fungosa sunt, & pectoris modo rubicantia, ac in pueris admodum cartilaginea, uniuerso contextu ex ampliori basi in mucronem desinūt, cuculli²q; rostri modo introrsum curuantur. Infimum officulum suo mucrone, quo³ recti intestini posticam infimamq; sedem contingit, in⁴ cartilagineum degenerat, eiusdem usus occasione qua uertebrarum spinis cartilagineas obna scirelatum est. Hinc sanè liquet, quàm in Galenum essemus impij, si hominis fabricam illum contenderemus enarrasse, ac non potius semel simiarum constructionē illum persecutum fa teremur. & dein si non ipsi statim initio tertij libri Commentariorum in Hippocratis librum de Articulis crederemus, quum ait se de Ossibus librum conscripisse, cum sigillatim quale unumquodq; os esset, præcipuè quidem in ipsis hominum aridis cadaueribus, sin minus, in simijs certè diligenter inspexisset; ita indicans se omni studio saltem simias descripsisse, hasq; homini in ossium constructione esse simillimas. Deinde si quis ipsius enarrationem ad hominum, non autem simiarum fabricam cogere uolet, is Galenum⁵ quatuor ossa latuisse annuet, quæ nos coccygis loco recensimus: & deinde Galeno falsò imponet, ipsi⁶ sex foramina fuisse incognita. Quandoquidem in homine utrinque in anteriori sede sacri ossis sex sunt foramina, quum in canibus tria tantum occurrant, nam foramina in coccyge canum conspicua, tantum in posteriori sede, seu potius lateribus consistunt, uti & Galenus uerissimè recenset, anteriorum foraminum nullam faciens mentionem. Ad hæc, cogemur Galenum oscitantæ turpiter insimulare, quòd non eundem contextum in tribus inferioribus ossis sacri hominis ossibus esse dixerit, qui est in tribus superioribus. Non enim plus cartilaginis in inferiorum ossium unione, quàm in superiorum interuenit. Et interim nulla cartilaginei ligamenti portio hominis coccygis officula cōmittit, quam cartilaginem, ut & in uertebrarum corporibus, Galenus esse existimauit. Adeo ut si prescius singula inquirenda duceremus, tandem Galenum ex ueris aliorum Anatomicorum descriptionibus falsas fecisse uelimus nolimus concederemus. Nulli enim dubium esse debet, à formæ obliquitate & in mucronem ductu ac rubore, quatuor illa hominis ossicula *λίκορυα* ueteribus fuisse appellata, quod illi hæc omnia ad cuculli rostrum pueris suis referrent. quum interim nulla sit in canibus cum hominis ossibus similitudo. Ea enim quæ Galeni conueniunt descriptioni, uertebris lumborum, uti diximus, omni similitudine accedunt. Porro sacri os *σπᾶν*, seu latum & amplum uocant, quod eius amplitudo facile reliquarum uertebrarum, quibus instar basis tutissimiq; fundamenti subijcitur, amplitudinem uinceret. Non enim arbitror eos id in amplitudine omnibus contulisse ossibus, quum ilium ossa sacro osse ampliora esse cognoscantur. Vnde uerò id *ισπᾶν* seu sacrum uocant, non satis constat; nisi id ita dixerint à rara quadam effigie formæq; aut quod adeo diuini propugnaculi imaginem referat: aut quòd diuina ope, citra musculorum auxiliū, in partu huius cum ilium osse connexu referari, ac denuò naturali instinctu committi plerique (sed falso) arbitrentur, aut fortè quòd grande magnumq; sit: quemadmodum apud poetas Ilium, mare, famem, atque id genus, sacra uocari putamus. Verum tunc, uti de amplitudine dictum est, sacrum os uertebris duntaxat esset conferendum, quum ossa ipsi utrinque commissa, & femur ac tibiæ os sacro osse grandiora sint, & interim unico tantū (ut sic dicam) hæc cōstent osse, quum sacrum senis compingatur. Alij huius nominis rationem indagantes, nescio quid de ueterum sacrificijs in medium adferunt. Porro quandoquidem nominum rationem perlubens ad alios remittere passim soleo, etiam huius nominis inuestigationi non grauatim concessero,

Impios in Galenum esse, qui hominis historicum docuisse et contendit.

Coccygis et sacri ossis nominum ratio.

DE THORACIS OSSIBVS.

Caput XIX.

CHARACTERVM SEPTEM DECIMINONI CAPITIS figurarum Index.

QVONIAM subsequens characterum Index septem præpositis figuris habebitur¹ communis, ut leuiori opera ad quam figurarum characteres referantur cognoscas, singulis, uti consueuimus, numeri notam subiungemus.


1, 2, 3, 4, 5, &c. In prima & secunda figura hoc numero indicantur duodecim thoracis costæ: quarum septem superiores pectoris ossi articulantur, quinque autem humiliores nō item. Thoracis uerò uertebrarum numerus, etiam citra notarum subsidium, modò è notatis costis obuius euadit: si singulis uertebris utrinque unam costam articulari spectes.

H AA

A, A_{1,3} Quicquid costarum hucusque à uertebribus fertur, osseum omnino est: hicq; primum costæ in cartilagine degenerant. Reliquarum notarum index figuris subiicitur.


PRIMA DECIMINONI CAPITIS FIGVRA, QVA THORACIS OSSIVM INTEGRA COMPAGO


anteriori facie exprimitur, duodecim nimirum thoracis uertebrae, & duodecim utrinque costæ, una cum pectoris osse pluribus efformato ossibus.



SECUNDA PRAESENTIS CAPITIS FIGVRA, POSTERIOREM INTEGRÆ THORACIS OSSIVM COMPAGIS FACIEM PROPONENS.

Inuenit modò obiter tres figuras contueri, quibus in huius libri calce totus ossium contextus triplici facie delineatur.





**TERTIA FIGVRA EX
MEDIIS VERTEBRÆ,**
rum thoracis, tres continet uerthebras, dextro
latere expressas, unā cum eiusdem lateris me-
dia costā. Atque huius figuræ beneficio,
costarum ad uerthebras articulatio, dein
costarum quoque ductus ostenditur.



**QVARTA, EXPRIMITVR COSTÆ
POSTERIOR ET VERTEBRIS PRO-**
xima portio, ut tubera exacte in conspectum uenirent, quibus nouem
superiores costæ uerthebris articulantur. Præterea huius costæ par-
tem effregimus, ut ossa costarum ostenderetur substantia, & indicata.



**QVINTA FIGVRA PORTIONEM
EXHIBET DVODECIMÆ COSTÆ PO-**
steriori facie, & qua duodecima thoracis uerthebræ coarctatur de-
pictam. Hanc quoque, ubi & positum cernis effregimus, ossæam costæ substantiam ostensuri.

**SEXTA FIGV-
RÆ, PECTORIS**
ossis & cartilaginibus costarum
liberi anteriorem partem
proponens.



**SEPTIMA, PE-
CTORIS OSSIS**
cartilaginibus costarum liberi
posteriorem commonstrans
faciem.



- BB**_{1, 3} Nobis modo ad characterū indicem reuersis, **B**, **B** indicetur cartilagineæ costarum substantia principium. Linea enim **B** & **A** intercedens, eius substantiæ cum ossæa coalitum notat.
- C**₁ Primæ costæ cartilaginis cum pectoris ossæ coalitus.
- D**₁ Secundæ costæ cartilaginis cum pectoris ossæ articulatio, à qua etiam promptè subsequenti-
um quinque costarum articuli species colligitur.
- E**₃ Cartilaginis tuberculū, quo secunda costæ ac quinque subsequentes, pectoris ossæ articulantur.
- F**_F₁ Terminus cartilaginis illegittimarum costarum, qui acutus spectatur.
- G**₁ Sedes, qua undecimæ costæ cartilago à decimæ cartilagine frequenter dehiscit.
- H**₁ Sedes, qua duodecimæ costæ cartilago ab undecimæ perpetuò dirimitur.
- I**_I₁ His sedib. costarū cartilagine inæqualiter protuberāt, ipsarū interualla plerumq; opplentes.
- K**_K_{1, 4} Hac regione internæ mediarum costarum sedi sinus oblongus exculpitur, cui uena, arteria, & nervus insident.
- L**₄ Tuberculum, seu capitulum, quo costæ uerthebrarum corporibus articulantur.
- M**₄ Tuberculum, quo costæ transuersorum processuum apicibus articulantur. Atque hæc quodammodo nouem superioribus costis sunt communia.
- N**₅ Species tuberculi, quo undecima & duodecima costæ uerthebris articulantur.
- O**_{4, 5} Tuberculum, in costarum posteriori sede iuxta apicem transuersi processus consistens, cui undecimus dorsum mouentium musculus insertur.

- Q4** Intervallum, inter *L* & *M* apprens, quod asperum ligamenti producendi gratia efficitur.
- R4** Hæc quoq; sedes, musculorum quos in Capitis contextu numerabimus occasione exasperatur.
- S, T, V** 3 Tres simul contextæ uerteræ, aut harum uerterarum corpora. Alias autem uerterarum partes, processus uel suis locis indicauimus.
- X** 3 Sinus duobus uerterarum corporibus communis, cui costæ capitulum inarticulatur.
- a3** Costæ ad uerteræ corpus articulus.
- b3** Sinus in transuerso uerteræ exculptus processu, cui costæ etiam articulatur.
- c3** Costæ ad transuersum processum, articulus.
- d, e3** In suprema uerteræ insignita, etiam d sinus indicatur, talis qualem inter median & infimam uerteram *X* expressimus. ac *e* is notatur, cui in infima uerteræ b inscriptum cernis.
- f3** Costæ regio in posteriora maxime exporrecta, adeo ut in hunc modum opportune costarum ductum hinc metiaris. Ab *a* enim & *c* ad *f* costæ a uerteris deorsum oblique in posteriora fertur. ab *A* uero & *B* ad *E*, sursum in anteriora circulatim costæ reflectitur.
- g, h, i, k** 1 His characteribus in prima figura pectoris os notatur. ac *g* quidem ad *h*, primum pectoris indicatur os. *b* uero ad *i* usq; secundum. *i* ad *k* usq; tertium. *k* autem, mucronatam pectoris osis notat cartilaginem. Verum iam exactius pectoris os in sexta & septima aggrediemur.
- l** 6 In anteriori primi osis sede protuberans instar triaguli pars, quæ *t, q,* & *r* posset circumscribi.
- m, n** 6 Sedes utrinque ad partem eam protuberantem depressa.
- o7** Posterior primi osis sedes, quæ utunque cana cernitur.
- p6,7** Sedes primi osis, cui primæ costæ cartilago innascitur.
- q, r** 6 Sinus primi osis, quibus clauicularum capitula articulantur, ac *r* etiam in septima figura dextrum indicat sinum.
- s6,7** Sedes inter duos clauicularum nomine insculptos sinus consistens, ac lunæ modò excauata.
- t6,7** Hæc sede primum os secundo committitur.
- u6,7** Communis primi & secundi osis sinus, cui secundæ costæ cartilago coarctatur.
- x, y, z, æ** 6, 7 Sinus secundi osis, quibus cartilagine tertie, quartæ, quintæ, sextæ & septimæ costarum inarticulantur.
- y, æ** 6, 7 His sedibus interdum in pueris secundi osis distinctiones apparent, perinde ac si id ex pluribus efformaretur osibus, per unionem mutuò coalescentibus.
- z6,7** Hoc tertium pectoris osis os censetur, quod in cartilaginem ensis mucroni non absimilem, ac *z* notatam finitur. Foramina, quibus interna pectoris osis sedes abundat, etsi notis non indicentur, se se facile demonstrant.

Quid thorax.
Libro i. Hist.
storie animalium
Cap. 7.
Pectus.
Pectoris os.



Opificis rerū
in thorace cre
ando indu
stria.

HORACEM uocabimus, quicquid costis interceptū circumscriptumq; est: non autem cum Aristotele^a uniuersum corporis truncum, quem à iugulo ad pubem usq; metimur. Anteriorem uero thoracis partem, pectus opportune nominabimus. ob idq; etiam^b latum in hac sede os, cui costæ coarticulantur, pectoris seu pectorale os ritè uocabitur. quò minus tres Græcorum & præcipue Galeni uoces, *θώρακα, στήθος* & *σπῆναι* oscitanter uideamur confundere. Pectoris itaque os, & costæ, itemq; duodecim dorsi uerteræ, quas thoraci hætenus ascripti, thoracis sunt ossa. Est autè admirabilis summi rerum Opificis industria, quæ totus thorax neque osseus, neque carnosus efficitur, uerum os cum musculis uicissim alternatimq; commutatur. quanquam interim caluaria quidem uniuersa ossæ, abdomen uero musculosum magna ex parte extruitur. Carterum decet hæc non per transennam aut obiter considerare, uerum accuratè præcipuoq; studio expendere. Quum enim tria sūt principia hominem dispensantia, os quidem immobile ac nullis interstinctum musculis primo principio circumdatur, musculi uero tertio: at secundo ex ossibus musculisq; medium quid circumtextitur. Cerebrum nanq; in nullo usus musculis eguit, quum nulla caluariæ pars aut dilatatione, aut compressione indigeat. Quare etiā meritò caluariæ ueluti galea & murus immobilis ipsi circumponitur. Porro si organis iecori famulantibus, uentriculo scilicet, & intestinis, & uescig, ac demum ipsi utero aliquod tale septum in circuitu oppositum fuisset, ubi cibum & potum uentriculus fusciperet: quorsum utero gestantium tumor emineret: quæ excernerentur excrementa, aut quomodo partus felici conatu propelleretur: nullo hîc opem ferente

Omnium
thoracis of
suum stru
em i & 2
fig. ostend
dunt.
a integre
figur. d. o
d.
b i f. g. h. i.

Hæc ostendunt
7 &
8 muscul. id.

Hæc com
monstrant
prioris sili
figuræ.

rente musculo: Thoracis autem motus, quem maxime ad aëris inspirationem requirimus, omnino aboleretur, si solis duntaxat ossibus thorax constaret. Si uero is rursus ex solis musculis motuum opificibus conformaretur, ij pulmonibus & cordi, nulla etiam se externa eos urgente, inciderent. Vt igitur aliqua thoracis capacitas intus fiat, ac thorax etiam motu agatur uoluntario, musculi alternatim sunt interpositi. Mox autem & hoc ad securitatem non parum cordi pulmonibusque conducit. magis enim huic muniuntur, quam si solis musculis thorax fabricatus esset. Quinetiā ossa thoracis moles firmandis sustinendisque scapulis, ac demum brachijs quoque, mirifice confert. Scapulas enim solis inniti costis, & clauiculas nullo osse quam scapulis & pectoris osse firmari, docebimus: ad quas rursus brachia, & postea cubiti & extremæ manus quadam serie coarctantur. Præterea si nullis ossibus thorax constaret, nullus esset locus unde scapulis & brachijs & abdomini ac alijs quibusdam membris musculi pronascerentur: neque ullis fundamētis musculi haerent, aut consisteret. Atque hanc sanè ossi thoracis necessitatem, si quid aliud, profecto testudines non absque summa Creatoris nostri admiratione, pulcherrimè edocent, quæ etsi tam tuto sepiatur domicilio, tamen in pectoris & thoracis laterum sedibus elegantissimum & iucundissimum spectatu ossium demonstrant textum, in hoc duntaxat incredibili artificio creatum, ut illi priora crura innituntur: utque musculi testudinis brachia mouentes, commodè originem sumant. Sed fortassis in medium aliquis adferet, Cur esset peius, thoracis modo abdomen quoque osseum extrui: quum si talis ossa strues uicissim ex muscularibus formata uentri circumponeretur, contractionem ac dilatationem non præpediret, ad hæc maior securitas ita abdomini conciliaretur: Qui sic quaerit, docendus est, ea quæ uentri continentur, non potuisse adeo, atque interdum ex usu est, dilatari comprimique, si extrinsecus ossibus sepiantur. Si autem hoc uerum est, neque mulieres concipere possent: deinde neque ad saturitatem semel comedere homini liceret, uerum assidua egeret comestione, quemadmodum & respiratione. Sed hac quidem perpetuò hominem indigere, nihil est absurdum: quippe qui in aëre uersatur, ac uiuit. Si uero esculentis poculentisque similiter egeremus, uitam duceremus admodum à philosophia & musis alienam: cibisque perpetuò dediti, operam optimis pulcherrimisque rebus nunquam nauaremus. Rursus, si ossa moles tanta esset, quantā mulieres ultimis mensibus uterò gerentes requirunt, quid hac mole esset ineptius: si excluso fœtu, illa tam molestè extuberaret: & interim nulla re alia quæ ex usu humanæ fabricæ esset impleta non consideret, ut intestina & uentriculum debite amplexaretur, & penicillimodo, uel calefaciendi causa, proxime illis applicaretur: Verum hæc in quinto libro exequemur fusius, & ostendemus pariter, in uentris fabrica tantam Naturæ fuisse solertiam, ut uentris organa neque dilatatione neque compressione uicissim egentia, aut alijs subiecerit partibus, aut etiam non minus quam pulmonem munierit. Iecur namque & lien costis sepiuntur, & renes quoque tot alijs organis ob hoc potissimum ad dorsum succumbunt, quod horum nullum dilatari debeat. reliqua autem uentris organa insigni quæ diximus proidentia, osseo contextu suis functionibus haudquam præpediri Natura uoluit. Quum itaque neque respiratio, neque uox absque thorace fieri possit, ac dein thorace primum quidem cor, insuperque cum ipso pulmo, muniri debeant, ad quatuor uelut scopos rerum Opificem in thoracis fabrica attendere oportuit, uocem nimirum, respirationem, cordis & pulmonis magnitudinem. Thorax enim, qui quodammodo ovali constat figura, tam amplus est, quantam pulmonis molem esse oportuit. At pulmo interim thoracis sequitur formam, non autem thorax pulmonis. In pulmonis enim historia, mediocri negotio ostendam, ipsum nulla peculiari eguisse forma, ut neque iecur, neque lienem, neque quodāmodo cerebrum. Porro iam tempestiuū erit, thoracis ossa seriatim describere, & cum uertebra eiusdem prius enarrauerimus, à costis sermonē auspicari. Costæ igitur uiris & mulieribus ab utroque latere duodeno constāt numero: rarius enim undenæ tantum uidentur, quamuis interdum etiam tredecim obseruauimus: quemadmodum tredecim quoque thoracis uertebrae sæpius quam undecim tantum occurrere, supra retulimus. Singulis enim thoracis uertebrae, singulae in ambobus lateribus costæ articulantur. Quod autem uiros costæ quapiam in altero latere destitutos, ac uiros unius costæ numero à muliere superari, uulgus opinatur, ridiculum planè est: etiam si Euam ex Adæ costā à Deo procreatā, Moyses in secundum Geneseos Capite prodiderit. Quamuis enim forsitan Adæ ossa, si quis ea in seculo compegisset, ex altero latere una caruissent costæ: non ob id tamen omnibus quoque uiris unam deficere necesse est. Aristoteles homini octo costas tantum tribuit, concessurus etiam quosdā gentis Turdulorum septenis costis creari, si modò id alicuius idonei auctoris testimonio ipsi consitisset. Verum ut hic Aristoteles aliorum duntaxat suffragijs suum dogma firmaret, ita quoque non dissimile uero est, illic octo costas homini ex aliorum relatu eundem ascripsisse, hæc

Cur abdomen
non etiam sit
osseum.

Quò porro
mū Natura
thoracem con
ditura assen
derit.

Costarum nu
merus.

Uiris ac mu
lieribus idem
costarum nu
merus.

Lib. 1. Hist.
animalium
Cap. 15.

ratione rem non uisam parum rectè nobis tradidisse. Quod si toties in hominis fabrica ipsum fecisse nobis occurrit, quid de reliqua animalium historia censendum putabimus? Quamquam interim dum memoratum iam Aristotelis locum aliquando Patavi in scholis enarrarem,

Corporum in
Ligumib. sym-
metria.

à summæ (propter singularem literarum ac juris civilis cognitionem) spei adolescentibus IACOBO NIGRO & FRANCISCO PINELLO patricijs Genuensibus accepi, generosissimos Ligures in ueterū monumentis *ἱσθησόμενοι* fuisse appellatos, quum tamen is populus ut est nauali terrestriq; pugna strenuus, optima quoq; membrorū symmetria ac numero sit spectatissimus. Sunt itaq; plurimū utrinq; duodecim costæ: ac septem superiores pe-

Costarū sub-
stantia & ap-
pendix.

toris ossi & uertebri, ut postea dicemus, articulatur; quinque autē humiliores solis alligantur uertebri, neq; ad pectoris os pertingunt, sed in thoracis lateribus desinentes, suarum cartilagini-

Ossa substan-
tia.

um sinibus⁸ inuicem cōmituntur, duodecima duntaxat excepta, quæ ab undecima penitus⁹ dehiscit, neq; aliqua ex parte ipsam cōtingit. id quod & undecimæ non rarò usu uenit, decimæ cartilaginem tunc non attingenti. Quinq; istæ humiliores, quod pectoris ossi non articulatur,

Cartilaginea
substantia.

quod¹⁰ ossæ¹¹ cartilaginosæq; cōstent substantia, quodq;¹² appendice ea sede qua uertebRARUM corporibus cōnectuntur, & qua in capitula eas protuberare audies, donetur. Ossa costarum substantia nō omni ex parte sibi similis est. Vbi enim costæ uertebri coarticulatur, ac ubi dor-

Lib. 8 de Ad-
ministr. sect. 7.
partim in lib.
de Ossib. Ca.
13.

sum efformant, solidiores multò durioresq; sunt, quàm in thoracis lateribus & iuxta pectoris regionē, ubi magis fungosa extruunt substantia, quæ tenui squama, seu lamina obducitur, atq;

Costis omni-
bus non paritè
grauido.

hæc illic demum tenuissima est, ubi in cartilaginem degenerat. Cartilago etiam non parem un-

Non param
pluendo.

dique ostendit speciem. inferiorum enim costarum cartilago mollior est: unde etiam fortassis nonnulli illegitimas costas *χονδρῶν*, quasi cartilaginé dicas, uocari tradunt. Superiorū uerò co-

Costarum le-
ues & asperi-
tas.

starum cartilago durior est, solidiorq; ac in senibus intus ossæ efficitur, quemadmodū in ouib;¹³ & bobus, alijsq; fere omnibus eius generis animantibus experimur, quorū cartilago intus friabili alboq; ac fragili constat ossæ, exterius cartilagine ueluti mēbrana quapiā obuoluto. Atq;

Costarum si-
mus.

id etiā in simijs canibusq; adeò est manifestū, ut Galenus earum costarū cartilagine ossæ, spuriarum uerò exquisitas cartilagine esse dixerit. In hominibus autem nisi ætate admodum prouectis, cartilago in ossæ naturam delisse uidetur, quum interim in iunioribus adhuc can-

Costarum le-
ues & asperi-
tas.

nibus, & quæ iam proximè recensuimus animantibus ossæ admodū efficiatur. Huius cartilagi-

Costarum si-
mus.

nis moles in omnibus costis nō eadem est, ut etiā omnium costarum non par est longitudo. pri-

Costarum si-
mus.

ma namq; & duodecima breuissimæ sunt, mox secunda & undecima, quæ omnes breuib; do-

Costarum si-
mus.

nantur cartilaginibus. Sexta uerò, septima & octaua, longissimæ sunt, ac longissimas etiā obti-

Costarum si-
mus.

nent cartilagine. Primæ costæ cartilago amplissima est, quemadmodū & prima costa cæteras quoq; amplitudine superat, mox hanc secunda, & deinde tertia subsequuntur. duodecima uerò

Costarum si-
mus.

& undecima omnium sunt tenuissimæ, & in tenuissimas quoq; terminantur cartilagine. Mediæ autem medio se habent modo, quarum cartilagine subinde in progressu ab ossæ costæ substan-

Costarum si-
mus.

tia latiores efficiuntur. Quum enim cartilagine sex superiorū costarum interualla efformant, to-

Costarum si-
mus.

toq; ductu ab inuicem æquæ distent, sextæ, septimæ, octauæ & nonæ interdum costarum car-

Costarum si-
mus.

tilagine uariè in progressu latescunt, inuicemq; continuatæ interualla ipsarum suamet substan-

Costarum si-
mus.

tia¹⁴ implent. Ad hæc quinq; spuriarum costarum cartilagine in acutum mucronem desinunt, Verarum autem costarū cartilagine non item. Primæ enim costæ cartilago,¹⁵ suo sine qui pe-

Costarum si-
mus.

toris ossi ualidè cōnascitur, amplior sit, quàm qua primum ab ossæ costæ substantia educitur. Secundæ ac tertiæ triumq; subsequentiū costarum cartilagine modicè in progressu arcantur,

Costarum si-
mus.

& singulæ in¹⁶ tuberculū finiunt, quo postea has pectoris ossi coarticulārī docebimus. Costis non omni ex parte eadem adest læuitas. interna enim sede, qua membranā ipsas succingentem

2. fig. F.
h. 1. fig. H.
i. 1. fig. G.
h. 2. fig. ab. a.
per f. ad A.
l. eadem si.
d. B. ad E.
aut. 1. figur.
A. B.
m. 4. figur.
L. 2. M.
A. 5. figur.
fractam o-
stendunt co-
stam ad 9.

n. 1. fig. I. L.
o. 1. fig. F.
p. 1. fig. C.

q. 1. fig. D.
d. 1. fig. E.

r. 1. 4. fig. K.

1. fig. 6. cap.
lib. 3. G. G.
1. fig. cap. 11
lib. 3. H. H.
11. 2. fig. cap.
11. libri 4.
precipui
rami costæ
rum ductū
seruantes.

est,

est, non omni ex parte laeuis occurrit. ea enim^s parte quae costae uertebrae alligantur, praeterquam quod tubercula & capitula efformant, quibus uertebrae inarticulantur sinibus, etiam asperae inaequalesque sese offerunt, quo aptius hinc ligamenta educantur costas uertebrae corporibus & transuersis earundem processibus colligantia. Praeterea in hac externa costarum sede, ubi primum a transuersis uertebrae abscedunt processibus,^v tuberculum quoddam asperum inaequaleque uisitur, tendinibus^u undecimi dorsum mouentis musculi excipiedis paratum. Tendines enim huius partem in apices transuersorum processuum, & partim in haec costarum tubercula inferuntur. Deinde, quae costae adhuc magis a transuersis uertebrae abscedunt processibus, in hac posteriori externaque ipsarum sede,^a asperae inaequalesque sunt, ac etiam ueluti tubere quodam modice prominendi donatae, ut in illas apta insertionis sedes eius musculi efficeretur, quem in homine thoracem mouentium quartum, in simijs uero & canibus sextum numerabimus. Dein haec asperitas non duntaxat illius musculi insertioni idonea est, imò etiam^b externi intercostales musculi hinc nasci docebuntur, qui hac iuxta uertebrae regione non solum ab inferiori sede superioris costae in humilioris costae elatiori nascuntur partem, uerum etiam ab externa unius costae sede ad alteram alterius hinc exporriguntur. Reliqua autem regione costae laeues aequalesque sunt, nisi forte quispiam eas modice asperas in superiori & inferiori sede esse contenderet, a qua intercostalium musculorum pendet origo, in quamque eorum etiam insertio perficitur. Prima costa superiori sede, qua latissima est, priuatim aspera inaequalisque cernitur, ut musculus dorsum mouentium quartus hinc principium opportune sumat. Costis omnibus non par ad uertebrae obigit articulatio. nouem enim superiores^a duplici coarctantur articulo, undecima autem & duodecima simplici, quemadmodum & decima quoque rarissime duobus articulis suae committitur uertebrae: utcumque etiam secus Galeno uisum fuerit, qui singulas costas duplici articulo uertebrae coarctari docuit. Caeterum costae duobus nodis articulae^e duo exigunt tubercula: unum quidem, quoⁱ sinui uertebrae corporibus inciso inarticulantur: alterum autem, quo^b internae sedi apicis transuersi processus firmantur. Atque haec tubercula sinibus illis respondent, quos uertebrae, quum earum recenseretur constructio, insculptos retulimus. Prima igitur costa rotundo tuberculo primae thoracis uertebrae corpori inarticulatur, ac deinde transuersum eiusdem uertebrae processum tantisper ascendit, quousque ipsius apici alio capitulo tuberculo ue articuletur. Secunda uero costa & septem sublequentes communi semper duarum uertebrae corporum sinui non rotundo, sed instar obtusi anguli protuberante capitulo inarticulantur: transuersi autem processibus pari modo cum prima coarctantur costa. quamquam & hinc quaedam in articulis, propter sinus non eadem sede in transuersis processibus exculptos differentia cõsurgat. Superiorum enim uertebrae transuersi processus, suos sinus in humiliori parte internae illarum sedis incisos gerunt, inferiorum autem (uti supra etiam cõtra Galeni suffragium admonuimus) in superiori parte, mediarum uero uertebrae sinus medio fe habent modo. Caeterum quod costarum articulatio, quae ad uertebrae corpus efficitur, tantò elatior sit illa, quam costae ad transuersos processus moliantur, quantò apex transuersi processus demissior est, sinu uertebrae corpori exculpto, uel me tacente notum esse arbitror. Porro trium inferiorum costarum articulatio, quae ad uertebrae duntaxat corpus perficitur, sinibus quoque non admodum altè cauatis, neque ualde protuberantibus^b capitulis perficitur. Atque hac ratione costae uertebrae committuntur. quam autem articuli speciem cum pectoris osse moliantur, & quo ductu a uertebrae antrosum contendant, tunc primum opportune explicabimus, quum pectoris ossis constructione sermone addiderimus: quae perfectio enarrari esset facilis, si humanum os, simiarum & canum & uulorum, eiusque generis animantium ossi responderet. In his namque animalibus (ut etiam inter edendum uidere est) pectoris os septem costat ossibus, non admodum inter se forma differētib. In canibus enim, porcis, & ouibus, inuicem cõueniunt: in simijs uero, & sciuris, propter clauicularum articulationem, primum supremumque os aliquantulo caeteris amplius uidetur. Septem haec ossa latiora, quam profundiora crassiora ue sunt, & qua inuicem committuntur latiora nonnihil, quam in ipsorum medio existunt. Horum connexus cartilaginis interuentu interdum tam laxè perficitur, ut a uertebraeⁱ compage modice differat: est tamen is cõnexus ad symphy sim seu unionem ita referendus, ut appendicem cum suis ossibus connexus, nisi quod hunc connexum etiam in admodum decrepitis bobus est cernere. Vnde etiam Galenum in libro de Ossibus miror, qui pectoris ossa synarthrosi scripserit committi, quum tamen neque harmonia neque sutura, multoque adhuc minus gomphosi componantur, quas compositionis species Galenus in eius libri initio sub synarthrosi cõplectitur. In harum commissurarum lateribus sinus utrinque exculpitur, cui cartilaginis in quam costae degenerant, tuberculum aliquod inarticulatur. Ad primi enim ossis cum secundo contextum,

Costarum a
lterum tuber-
culum.

Costarum ad
uertebrae ar-
ticulatio.

Tum alias se-
pius, cum maxi-
me de Admi-
nistr. sect.

Quadrupedi
pectoris ossis
descriptio.

Humani pec-
toris ossis de-
scriptio.

secundæ utriusque lateris costæ cartilago articulatur. Ad secundæ ossis cum tertio commissuram tertie utriusque lateris costæ cartilago ipsius serie suorum ossium commissuris coarctatur. Verum primi ossis lateribus primæ costæ cartilago adarticulatur, aut potius adnascitur. Hæc enim commissura ad coalitum potius, quam ad articulationem spectat. Septimum autem os, quod reliquis gracilius, magisque teres est, in cartilaginem exacuitur, ipso ossis latiore, ensisque mucroni quam similitudine, ac huiusmodi sanè pectoris ossis in canibus & similibus est ratio. quam Galenum spectasse annues, quum ipsius de pectoris ossis historiam, his quæ modo prælibauimus, contuleris. ^{h tota 6, 7 figur.} Verum si humanum pectoris os (quod ut generatim dicam amplum, licet si cum aliorum animalium ossibus cõferatur longè breuissimum est) intuitus fueris, multò aliter id habere animaduertes. Nunquam enim quod certò affirmare possim, in humano pectoris ossis mihi septena occurrunt ossa, neque etiam hæc in homine eodem semper numero cernuntur. In adultis tria ferè conspiciuntur, prorsus inter se uaria. ac ^{l. fi. 2 g. ad h. 6 autem 7 abf. addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} primum quidem insigniter amplum est, & nonnihil etiam crassum: ita tamen, ut ipsius crassities ab amplitudine plurimum uiuatur. Os id ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} interna seu posteriori sede, qua thoracis respicit amplitudinè, modicè cauum est: in anteriori autem gibbum, & in medio secundum ipsius longitudinem longè crassius, quam in lateribus. uidetur enim in anteriori sedis ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} lateribus depressum, atque ut aptè primæ costæ cartilaginis crassities ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} responderet, extenuatum. In medio autem, roboris gratia ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} trianguli modo protuberans. ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} Superior etiam ossis pars multo crassior ampliorque est ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} inferiore, & utrinque uno ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} sinu longo ac uersus posteriora inciso, & cartilagine incrustato donatur, cui clauiculæ ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} caput inarticulatur. In horum sinuum medio propter extuberantia illorum interiora latera, primum hoc os in superiori hac sede ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} lunatum cernitur, & ueluti foueam ostendit, quam ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} σφαγῶν & iugulum proprie uocamus, uulgò autem furculam superiorem. ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} Inferior ossis pars utuncque aspera est, & secundo, quod iam describam, ossi cartilaginei ligamenti interuentu ad eò laxè committitur, ut nunquam horum ossium lateat connexus, imò & ipsius quoque motus in magnis respirationibus interdum animaduertitur. ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} Secundum os multo amplius est, quam crassum, ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} superiori sede qua primo connectitur ossi, strictius est ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} quam prope inferiorem. At nullibi interim æquè amplum cernitur, atque primi ossis elatior sedes. Quà secundum hoc os primo committitur, in utroque connexus latere ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} sinus instar obtusi anguli insculpitur, ambo-
bus ossibus communis, & cartilagine incrustatus, cui secundæ costæ cartilago instar obtusio-
ris trianguli uerticis protuberans inarticulatur. Præter hunc sinum, præfens os utrinque ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} alios multos exigit pari modo, instar obtusioris anguli insinuat: uerum hi paribus interuallis ab inuicem nequaquam distant. Primus enim in altero latere huic ossi proprius sinus, qui tertie costæ cartilagini paratur, à sinu secundæ costæ gratia inciso longius distat, quam secundus huius ossis peculiaris sinus, quartæ costæ gratia cælatus. Rursus, plus interualli consistit inter secundum sinum & tertium, quam inter tertium & quartum, adeò ut sinus sextæ & septimæ co-
starum nomine in hoc ossis sculpi, se inuicem contingant, uixque mutuo remoueantur, & non tam altè, atque superiores, excauentur. Suscipit enim hoc secundum os priuatim tertie, quar-
tæ, quintæ, sextæ & septimæ costarum cartilagine, secundæ costæ cartilaginis ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} modo protuberantes. Secundum hoc os in pueris ex ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} plurimis efformatū uidetur ossibus inuicem symphy-
si seu unione cartilaginis interuentu contextis. Verum is cõtextus neutiquam canis aut simiæ ossiū compagi uenit conferendus, quū longè magis lateat, inferioraque ossa multò breuiora supe-
rioribus cernantur. Et in cemiterys secundū os integrum, & à primo dissociatum ferè semper effoditur, quemadmodum uertebræ mutuo diremptæ eximuntur, etsi fortuitò in secundo ossis aliquam compaginis speciem, ac si ex pluribus id constaret, obseruabis, ea potissimum appare-
bit, ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} ubi tertie costæ cartilago ossi articulatur, & deinceps ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} ubi quaratarum costarum cartilagi-
nes pectoris ossi iniunguntur. ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} Tertium uerò os exiguum est, & inferioris secundæ ossis sedi in-
terna parte eadem ratione committitur, qua primum secundo iungi relatum est, illicque secundo ossi necitur, qua septimarum costarum cartilagine in sinu secundæ ossis sedi articulatur. Hoc ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} os modicè amplum est, ac tenue, humiliorique sede in mucronatam cartilaginem degenerat. Ve-
rum id non infrequenter deesse reperies, & ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} mucronatam cartilaginem inde enasci conspicias, ^{addt. m. fi. 7 o. n. 6 si. m. m. o. 6, 7 si. p. p. 6 si. q. 7. 4. q. 6, 7 figur. q. 9, 12. r. 6. 7 figur. t. 4. s. 6, 7 figur. q. r. i. figur. cap. 22 A. u. 6, 7 figur. x. 6, 7 figur. 1. 1. figur. ab h. ad i. r. 6, 7 si. t. a. 6 figur. iuxta 1. b. 6, 7 figur. c. 1 figur. d. 6, 7 si. x. 2, 3, 4, 5.} ubi septimarum costarum cartilagine mutuo cõeunt, secundoque pectoris ossis ossi articulan-
tur. Iam si tria pectoris ossa simul iunxeris, manubrij alicuius gladij imaginem conspicias, pri-
mi nanque ossis superior pars, quæ lata admodum est, illi manubrij parti respondebit, quæ sub
paruo digito in apprehensione consistit. Secundū autem os, illi parti congruet, quam manus
tota intus complectitur, in qua sinus costarum cartilaginibus parati instar fouearum erunt,
quibus digiti firmari possent. atque huiusmodi foueæ eum præstarent usum, quem in gladijs
ex manubrij asperitate quærimus: quoties intortis nodosisque funiculis, aut scabra piscis cure,
ma-

Pectoris os-
sis ad ensium
comparatio.

manubrium obduci curamus. Tertium os unâ cum cartilagine, reliquæ gladij parti posset assimilari. adeo, ut nonnulli uniuersam hanc ossium struem *supradictâ* ab ensis imagine uocarent. alij, qui canes potius ac simias quàm homines spectarunt, mucronatam cartilagine[m] duntaxat illo nomine dignantur: quod hæc scilicet gladij mucronis formæ accedat, ipsumq[ue] canum pectoris os ensis imagini non ita aptè ac humanum os conferri queat. Hæc imaginum collatio attestatur, ueteribus illis hominum cadauera, Galeno autem fumiæ dissectioni fuisse adhibita. cui sententiæ Celsi quoque oratio, qua ille os pectoris utrinque lunatum esse scripsit, suffragatur. id enim de simijs & canibus falso protulisset, quum tale quid in illis nihil appareret. quippe in hominæ primum pectoris os superius, & secundum inferius, multo latiora sunt, quàm ubi hæc inuicem committuntur. Pectoris ossis substantia admodum fungosa mollior est, & anteriori sede magis continua squama quàm posteriori obducitur. Posterior enim sedis squama multis inæqualibusq[ue] donatur foraminibus, quæ haud peruia sunt, sed uasis solum uiam præbent, quibus id os enutritur. Atque hæc foramina in primo osse tanto magis sunt conspicua, quanto huius ossis crassities secundi ossis crassitiem superat. Quod itaque pectoris os, illis costis quæ orbiculatim thoracis amplitudinem efformant, stabiliendis procreatum sit, neminem latere arbitror: quemadmodum neque, quod propugnaculi etiam uicem secundariò gerit, eosq[ue] usus homini præstet, quos generatim thoracis ossa præbere in huius Capituli initio retulimus. Cartilago, in quam pectoris os exacuitur, subditorum quoq[ue] est propugnaculum, & malum granatum uulgo appellatur, quòd (ut arbitror) unius balustij apicis imagini illa accedat. A qua etiam forma, uulgo ipsam epiglottalem appellat cartilagine[m], ab imagine uidelicet laryngis operculi, pectoris ossis cartilagini specie non admodum ab simili. Verum huiusmodi nominum copiam ad præsentis libri calcem unâ cum cæterorum ossium nominibus subiiciemus. Modò autem nihil addendum superest, nisi fortè costarum ductus in costarum ossibus longè quàm in cartilaginibus diuersus. Costarum enim ossa quum primum à uertebis abscedunt, in posteriora deorsum obliquantur, & hinc ad thoracis latera deorsum semper oblique uersus anteriora declinant, quousque in cartilagine[m] desinunt oblique ac circulatim sursum in anteriora porrectam. adeo ut costæ ubi cartilagine[m] primum educunt, arcuatim, & in angulum quodammodo sursum flectantur. Iste costarum ductus non in illis solum quæ pectoris ossi committuntur, euident est: uerum & in reliquis omnibus, si fortè duodecimam exceperis, cuius cartilago admodum obscure sursum spectat. quanquàm interim hic inflexus potissimum in medijs, quinta nimirum, sexta, septima, octaua & nona uisitur, in superioribus uerò ac inferioribus magis latet.

Pectoris os
utrinq[ue] luna-
tum.

Pectoris os-
sis substantia.

Pectoris ossis
usus.

Mucronata
cartilagine
us.

Costarum du-
ctus.

DE CARTILAGINE QUÆ COR-

dis basi ascribitur substantia, seu cordis osse. Caput XX.

HÆC figura magnæ arteriæ & arterialis uenæ radices perfunctoriè exprimit, ab omnib[us] connatis corporibus partibus ue diuisas, & duobus circulis similimas. Ac A quidem arteriæ magnæ radicem notat, B uerò arterialis uenæ radicem. C autè connexum indicat, quo uasa inuicem in ipso exortu conuascuntur. Iste connexus, qui potissimum cartilagineus est, non ex hac rudi figura pe-

tendus est, uerum cum ex alijs sexti libri figuris, tum maxime ex octaua & decima, quas non obfuerit obiter cum suorum characterum indicibus modò perlustrare. Parum autem opportune facerem, si easdem tabulas uarijs in locis frequenter proponerem.



E FÔRSITAN præsentis libro, os aliquod præter misisse uideamur, hoc loco etiam osseæ cordis substantiæ mentionem faciendam duximus. Galenus nanque ab elephâtis corde, à quopiam suorum familiarium os eximæ magnitudinis exectum prodidit: & grandium quidem animalium cordibus os, minorum uerò cartilagine[m] ascribit. Ego autem hæcenus, uti in nullo corde, ita neque in humano exquisitum os repperi, capere sedem, qua Galenus cordis os cõstituit, substantiã obseruo cartilagineam, quæ meca quidem sententia nihil est aliud, quàm magnæ arteriæ & uenæ arterialis radices à corde principium ducentes. Quippe radices hæc, in quibus membranarum bafes consistunt, quæ materierum

Li. de Ad-
minis. sect. 8.

Humani cor-
dis osseæ de-
scriptio.

Cartilagineæ
cordis substan-
tia.

terierum ē duobus illis uasis in cor refluxui præficiuntur, multò duriore sunt, quàm reliqua illorum uasorum substantia, adeò ut radices cartilaginis natura participare non nihil uideantur, quæ in bobus ita interdū indurescit, ut quadrupedū costarum cartilagines in album & friabile os extrinsecus cartilagine tanquam membrana obductum degenerare, prius scriptum est. Hæc itaque uasorum radices perinde ad se mutuo sunt conterminæ, ac si duos circulos in puncto inuicem committeres continuaresq; ita ut dexter circulus uenæ arterialis effe radix, sinister uero (qui amplior esset) magnæ arteriæ. Vbi autem circuli mutuo committerentur, is locus esset, quo hæc uasa suis orbibus simul connascuntur uniunturq; ac ubi optima cartilaginis consistet portio, quæ oblonga & ueluti teres esset: tota nimirū sede qua illæ radices inuicem comittuntur, & reliquæ interim circulorū portiones essent resectæ. Ac proinde per melicebit radices hæc, aut cordis cartilaginem, aut os uocare, modò accuratè ipsarū naturā quis intueatur, neq; unā cum Galeni sectatoribus ipsius sensa admodum oscitanter eruentibus tam stolidus sit, ut cordis os instar Δ aut ν efformatum sibi persuadeat. Qui enim post Galenum humani corporis historiam scribere aggressi sunt, in cordis basi os quoddam extructum recensent, quod laryngis superiori sedi præposito, & ab ν imagine *uocales* nuncupato, assimilant. Neq; sat fuit illis hominibus ad hunc modum, os in humani cordis basi constringeret: quin imò sermoni adiecere, cordis basim, atq; ideo etiam uniuersum cor, ab ipso nō secus firmari quàm linguæ radix illo osse quod laryngi præponitur. Arbitrantur namq; cor eiusmodi osse firmatū, moueri: non expendentes cor etiam si eiusmodi donaretur osse, ipso nō minus suffulciri posse, quàm ferreus palus lectum in aëre sustineret: quādo is lecto alligatus, simul cum ipso deorsum ex alto projiceretur. Quamuis interim quatuor cordis uasorum ad conterminas sedes connexum nonnihil cor sustinere, haud inficiari possumus. Cæterum huiusmodi hominum figmenta missa faciamus, & illorum quoq; oscitantiam negligamus, quæ in cordis (ut ipsi existimant) affectibus magno supercilio os cordis cerui, nescio quibus geminis & auro mixtum, propinant: quum interim ceruo non aliud os, quàm uitulo, aut cani, aut sui insit, cartilagineæ nimirum magnæ arteriæ & uenæ arterialis radices. Et ossiculum illud quod ē ceruorum cordibus exemptum pharmacopolarum officinæ mihi hætenus ementitæ sunt, aliud nihil esse cenfeo, quàm grandius agni hyoidis ossis ossiculum, quod continuum est, & Δ simillimum: nisi quòd dextrum crus etiam transuersum in hunc modum \times sinistrum decussatim fecet, & alterum crus altero breuius sit: quod etiam ouina lingua, quoties mensæ apponetur, luce clarius edocebit. Porro qua administrandi ratione cartilagineæ uasorum radices inquirendæ sint, in sexto libro, ubi cordis sectio pertractabitur, describemus.

Anatomicorum lapsus.

Medicorum
& pharmacopolarum impostura.


c. d. A. B.

c. 12. fig. cap.

DE SCAPVLIS. CAPVT XXI.

PRIMA FIGVRA VI. SECVNDV. TERTIA.

GESIMIPRIMI CAP.



TRIVM QVÆ HIC PROPONVNTVR FIGVRARVM ET earundem characterum indicem, proximè sequens pagina exhibet.

PRI

PRIMA uicesimi primi Capitis figura internam, seu anteriorem scapulæ dextræ sedem exprimit, quæ costis innititur.

Secunda, dextræ scapulæ externam posteriorem uel sedem ostendit.

Tertia, scapulam dextri lateris in latius depictam continet, ut sinum gibbæ exteriorisq; scapulæ sedis proponeret, qui inter elatiorem scapulæ costam, et scapulæ spinam cõssistit. Verum id iam ex characterum indicibus reddetur explicatius.

In prima figura **Z**, **X** & **Y** scapulæ ostendunt basim. Est enim scapula quodammodo triangularis. **Z** uero, & **a**, & **A**, superiorem scapulæ notant costam. **Y** autem, & **B**, costam scapulæ inferiorem: adeo ut **Z** superior sit basis angulus, **Y** inferior angulus: **A** & **B** tertius scapulæ angulus, quem scapulæ superior et inferior costæ cõstituunt. Atq; hæc obiter isti notant characteres: singulis autem seorsum aliud cum cæteris in hunc modum insignitur.

B 1, 2 Scapulæ sinus, cui humeri caput articulatur. In secunda figura **B** notatur inferior sinus sedes, quæ quodammodo orbicularis est. **A**, superior sedes magis stricta, contractaq; in prima figura **A** indicat protuberantem sinus seu cervicis scapulæ partem, à qua duo huius articuli peculiariora ligamenta, una cum externo capite musculi cubitû flectentium anterioris pronascitur.

D 1, 2 Cervix seu collum scapulæ. Verum **C** etiam insignitur radix interioris scapulæ processus, qui **E**, **f** & **F** insignitur. Deinde **C** in prima figura sinum quendam indicat, sub interiori scapulæ processu conspicuum.

E, **f** & **F** in prima figura, & **E** & **F** in secunda, interiorem insinuant processum scapulæ, in quo **F** protuberantem notat partem, cui clauicula alligatur, & penè innititur. **E** uero, processus huius appendicem. **f** autem, asperam commonstrat partem, à qua ligamentum pronascitur, hinc in summum humerum (qui **K** indicabitur) pertinens.

H 2 Radix spinæ scapulæ, seu ipsa scapulæ spina, quæ in homine summû producit humerû, quem

K. **K** in prima & secunda & tertia notat, et **L** etiã in prima ac tertia. Est itaq; **G** & **H** spinæ exortus longitudo. Quod uero ab **H** ad **K** fertur, summus est humerus. Vbi enim **H** cernitur, illic spinâ à scapulæ dorso abscedere dicemus. Verum **K** priuatim notatur summi humeri appendix.

I, 3 Sinus summi humeri admodum leuiter cælatus, & admittendæ clauicula paratus.

I, 2, 3 Scapulæ spinæ pars crassior, interdum appendice decorata. Ad **G** enim, & **I**, & **H** spinæ scapulæ est crassior, quàm alibi. **A** **G** uero per **I** ad **K** aspera pars notatur spinæ, & summi humeri. Quod autem in secunda inter **I** & **H** cõssistit, & in prima inter **L** & **a**, laue est, & minime asperum.

L, **M** & **c**. 1 Instar obliquarum linearum tubercula sinus perinde constituentia, ac si illi à costarum conuexis scapulæ cauo essent impressi.

O, 1 Sedes in interna scapulæ regione magis cauæ, quæ secunda figuræ literis **G** & **H** respondet.

P 1 Protuberans crassiorq; inferioris costæ pars, quæ in internam scapulæ sedem prominet.

p 1 Hac sede inferior scapulæ costa latus uel efficitur acutius, ideoq; magis prominet, ut tertius brachium mouentium musculus hinc promptius exortiretur.

Q 1 Scapulæ inferioris costæ asper sinus, unde interior cubitum extendentium pronascitur musculus. **R** incuria elapsus est.

S 2 Ad scapulæ externam sedem protuberans inferioris costæ pars.

T 2 Impressio & amplitudo inferioris costæ, unde tertius brachium mouentium musculus nascitur.

V 2 Hic externa scapulæ sedes propter crassitiem inferioris costæ insigniter caua, cernitur. Quod enim inter **V** & **V**, & **G** & **H** cõssistit, tenuissimum maximeq; subtile & solidum est.

Z 1, 2, 3 Appendix basis scapulæ, ad principium ipsius spinæ coalita.

z 1, 2, 3 Appendix inferioris anguli basis scapulæ.

Φ 1 Superioris anguli sedes, in internam scapulæ regionem modicè protuberans.


Z, 1, 2, 3 **Z** superiorem basis angulum antea notauit.

a 1, 3 Semicirculare foramen, seu sinus, in superiore costa scapulæ conspicuus.

b, **c**, 3 Sedes in externa scapulæ regione inter spinam & elatiorem scapulæ costam consistens. Verum **b** priuatim scapulæ sedē hic notat tenuissimâ, maximeq; subtilem: et quodammodo pellucidâ. **c** aut foraminulū indicat hic frequenter apparēs, et uenulæ inibi scapulâ nutrituræ uia præbens.

QVARTA VIGESIMI PRIMĪ

CAPITIS FIGVRA.



P R A E S E N T I figura externam seu posteriorem canis scapulae sedem in hoc delineauimus, ut promptè expendetur hominis scapulae ad canis, aut ouis differentia, quam in summo humero, aut superiori scapulae processu notabimus. Significet igitur *A* & *B* scapulae gibbum, seu dorsum. ac *A* quidem ipsius inferiorem sedem, *B* autem superiorem, & animalis collo capitiue propiore. *C* & *D* spinam scapulae notent, super scapulae ceruicem non excedentem. *E* scapulae ceruicem.

Scapularum situs et nexu.



Scapulae uisus.

Scapulae forma triangulatis.

Basis scapulae.

C A P V L A E ² utrinque singulae posteriori thoracis regioni uersus superiora innituntur, ac occipitis ossi, ceruicis, thoracisque uertebri, costis, & ossi *v* litteram referenti, musculorum duntaxat interuentu copulantur. Occipitis quidem ossi beneficio ^h secundi scapulam mouentium musculi, qui etiam hanc multarum uertebrearum spinis committit; uti & ^c tertius scapulae motuum dux, qui ceruicis uertebri illam nectit. ^d Quartus uero scapulam mouentium, illam aliquot thoracis & ceruicis uertebrearum spinis firmat. Costis scapulam committunt ^e primus illam mouentium musculus, & thoracem mouentium ^f secundus. Ossi uero ^g referenti ^h septimi eius ossis peculiarium musculorum ope scapula copulatur. In hominibus, simijs, ac sciuris, & si quae alia clauiculis donantur, ex abundanti ligamentorum auxilio, ⁱ scapula ^j clauiculis coarticularur, clauiculaeque contermina est. In omnibus uero animalibus ^k brachij os seu humerus ipsi articulat, ac proinde si hominem scapulis destitutum finxeris, nulla ratione humeri articulum sermone constitues. Ad eius namque articuli constructionem necessum est, humeri caput alicuius ossis sinum subire, atque ut moueatur, in aliquo osse ueluti in basi quapiam firmari. Porro huiusmodi sinus occasione, ^l collum quoddam seu ceruix scapulae protuberat, in cuius extremo ^m sinus tam alte lateque exculpitur, quantum humeri articulo uarijs admodumque differentibus motibus mouendo ex usu est. Atque hic sane primus praecipuusque scapularum usus censetur, cui alius mox subsequitur, neque ipse quidem poenitendus, thoracis uidelicet partium costis interclarum communitio atque custodia. Anteriores enim thoracis partes tuemur, multo ante prouidentes quae occurrunt laesuraeque sunt, & anticipantes uel transilire, ut id quod ingruit declinemus, aut obijcere pectori munimentum aliquod, aut manibus quippiam quo defendamur assumere. Quinimo plerumque & solis manibus ante periclitamur, satius esse rati has uulnerari, rumpi, coteri, abscindi, quam quod laesum sit, ad pectus pertingere concedamus. Thorax enim respirationis est organum, quemadmodum & ab illo complexus pulmo: cor autem insiti caloris fomes, irascibilisque animae sedes censetur, propugnaculis ob id etiam egens ualidioribus. Porro quum posteriori thoracis sedi, & anteriori aequale ab occurrentibus periculum impendat, eorum uero quae obesse possunt praecognitio, in anteriori & posteriori regione nequaquam par sit, non praesentibus nimirum in posteriori regione oculis, oportuit sane & hic quoque Naturam artificium quoddam machinari, posterioremque thoracis sedem nequiquam negligere. Quocirca instar ualli & mirabilis propugnaculi uertebas thoracis inibi compegit, & scapulas tanquam duos clypeos & scuta, firmissimosque muros obiecit. hinc rursus alium usum homini accessurum minime ignorans, quo complures muscoli motuum brachij autores, sedem qua fulciantur, & a qua originem aptissime ducant, commodè adipiscuntur. Atque id profecto summæ opus est iustitiae, eodem osse ad tam uarios prorsusque necessarios usus abuti, & undequaque ita scapulas efformare, ut priuatim ad singulos usus conficte censi queant. Scapula enim inaequalis est admodum, omni ex parte sibi dissimilis, praeter uarios enim ipsius processus, sinus, tubera, appendices, eiusque generis reliqua, e quibus ossium differentias desumpsimus, scapula trianguli differentibus lateribus efformati imaginem quodammodo exprimit. ⁿ Primum namque ipsius lateris, quod basin scapulae perpetuo uocabimus, ea scapulae sedes est, quae secundum dorsi longitudinem thoracis uertebrearum spinis proximè exporrigitur. basis haec obliqua constat linea, quae superius & inferius, uersus corporis latus oblique ueluti in circuli conuexum inclinata, in medio autem crebro paululum lunata cauaque uisitur. Interdum enim continuo ductu tota scapulae

atrium in-

tab. 7. d. e 12 musc. tab. G. d 10 tab. r.

e 5 tab. r. f 7 tab. L. g 5 tab. R. s. h integra-

rum Q. ad

integre si-

S ad R. h 12 figur.

C. D. l 12 figur.

A. B.

m 1, 2, 3 fi.

d 2 per 2 ad X.

pulæ basis, hunc in modum (gibba est. deinde basis hæc tenuis admodum uisitur, quamuis inferiori tamen parte & superiori modicè quàm alibi crassior appareat, & inferioris partis crassities partis superioris crassitiem adhuc uincat. Huic basi plerumque " duæ adnascuntur appendices: una quidem, quæ grandior crassiorq; & longior est, ac perpetuò apparet, ad basiq; inferiori consistit angulum insigniter obtusum, ac ueluti orbicularem: altera autem appendix aliquantulum sub superiori habetur angulo, illiq; basis sedi coalescit, à qua scapulæ^o spinam principium ducere audies. Præter has appendices etiam basi mollis quædam cartilago adnascitur, eius cartilaginū generis quo ossium extrema nulli commissa ossi, augeri solent. Verum in hominibus hæc cartilago longe breuior minorq; est, quàm in ouibus & bobus, alijsq; animalibus, quorum scapulæ thoracis potius incumbunt lateribus, quàm, ut in homine, posteriori thoracis sedi uertebri proxima. Atq; ita primum scapulæ latus basis ue se habet, duo autē reliqua inter se uariant. " Inferius enim, ab humiliori basis sede admodum oblique sursum in anteriora ducitur: " superius uerò (quod tantò breuius est inferiori, quanto inferius est ipsa basi breuius) nonnihil deorsum in exteriora fertur, quodammodo transuersim procedens. Duo hæc latera in " angulum coeunt, & latiusculam scapulæ partem suis extremis finibus continent, in qua ceruix scapulæ sinusq; conspicitur, humeri caput excipiens: adeò ut hæc sedes (si modò anguli loco censi possit) tertius scapulæ angulus futura sit, quando quidem " primum angulum superiorem basis angulum numeramus, " secundum uerò humiliorem. Cæterum duo hæc latera suis finibus tertium angulum constituentia, non solum ductu & breuitate inter se differant, uerum etiam crassitie. Inferius enim latus, quo altius à basi sursum conscendit, eo crassius & insigniter " spissum efficitur, non aliter quàm si Natura huius lateris beneficio, scapulæ alioquin tenui & infirmæ magnū robur addidit uoluisset, ac deinde secundariò quibusdam musculis commodi exortus locum præparauisset. Præter id enim quòd musculorū quorundam gratia (ut mox subiiciam) huius lateris crassities internam scapulæ sedem " cauiorem reddit, & in externa sede seu gibbo, ueluti " sinum efformat, ipsum quoq; in sua externa sede prope inferiorem basis scapulæ angulum " compressionem obtrinet, ac deorsum quadantenus educitur, ut " musculus illinc principium sumeret, cuius ope brachium ueluti à pectore reflexum, retrorsum ducitur. Quinetiā interna huius lateris sede, iuxta ipsius clatiorem partem, qua id scapulæ ceruicem terminat, etiam " oblongus sinus aliquantulum asper inæqualisq; conspicitur, " musculo principium porrigens, quem à scapula enatum cubiti extensionis autorem in secundo libro afferemus: inibi perpetuò inferius hoc scapulæ latus, inferiorem costam ueterum more appellatur, qui superius inferiusq; scapulæ latera " mōdō uo cauerūt. Porro superius scapulæ latus tenue, minimeq; crassum est, ad eam usq; sedem qua scapulæ ceruicis " superior regio consistit, " interiorq; scapulæ processus exoritur. hac namq; sede superius scapulæ latus impenso crassescit. Deinde priuatim huic lateri iuxta interioris scapulæ processus radicem, " sinus quidam seu medium foramen instar semicirculi insculpitur, uiam porrigens nerui quinti paris neruorum dorsalis medullæ " furculo, hac una cum uenula arteriaq; posteriorem scapulæ sedem adeunt. Cæterum scapulæ " ceruix, quæ inter superioris & inferioris scapulæ costarum fines habetur, crassa est, ipsaq; scapula ex ampla tenuiq; sede inibi coarctata, & secundum latitudinē incrassata cernitur. Ceruicis tamen " longitudo seu interuallum, quod à superiori corporis parte ad inferiorem metior, admodum ceruicis crassitiem superat, quæ ab anteriori parte in posteriore pertinet. Ceruix insignius adhuc extrorsum ducta, dilatatur, & ut ipsa oblonga est, ita etiam oblongum efformat " sinum, inferiori parte circulari circumferentia terminatam, superiori autem parte in acutum magis exprorectum. Atque id propter " impressionem accedit, hic internæ ceruicis sedi factam, tendinis eius " musculi ducendi gratia, qui intro antrosumq; brachium circumuertit. Præterea sinus ceruicisq; scapulæ " superior pars, in hoc procerius extuberrat, quò aptius hinc " duo ualidissima huius articuli pronascerentur ligamenta, & " externum quoque caput eius musculi commodè hinc principium duceret, qui cubitum flectentium anterior censebitur. Hic scapulæ sinus cartilagine reliquorū articuli sinuum modo in crustatus, non admodum altè cælatur, neque etiam huius longitududo & amplitudo respondent, humeri " capitis quod ipsi inarticulatur, lōgitudini & amplitudini. Quod sanè in hoc articulo Natura peculiariter machinatur. aliorum enim articulorum capita sinibus exquisitè congruunt, nisi forte " femoris cum " tibia articulum excipere uelis, in quò tibie sinus femoris capitibus non respōdere, ac priuatim in illo quoq; articulo Naturā aliquid moliri intelliges. Quia igitur parte genu ab aliorū articulorū ratione differt, suo dicemus loco: nunc uerò humeri articulus uenit explicandus. Quum ergo Natura hunc scapulæ sinum satis leuiter, laxorum motuum gratia, exculpisset, illumq; non ualde amplum longumq; creauisset (præter peculiaria huius articuli

Basis appendices.

Basis cartilago.

Superioris inferiorisq; laterum differentia.

Tres scapulæ anguli ac laterum plenior descriptio.

Ceruix scapulæ.

Sinus humero excipiendo partatus.

Cartilago sca-
pulae sinum fe-
quenter augēt.

ligamenta, quae in secundo libro unā cum musculis prosequemur, & quosdā scapulae processū, quos articulum à luxationibus prohibere tum audies, ubi illos quoque iam in sermonis contextu pertractabimus) cartilaginem quandam ligamenti substantiae compotem in hoc sinu crebro effingit, quā sinum auget, profundiorēq; efficit, nimiamq; luxandi promptitudinem multum corrigit, parum interim laxissimos differētesq; brachij motus, quibus maxime indigemus, praepediens. In ambitu enim huius sinus ea cartilago ponitur, scapulae interim, neque etiam humero connata, sed tantum ligamenti articulum in orbem amplexantibus adnexa: Huius cartilaginis externa sedes crassa est, sensimq; ad sinus centrum ducta gracilescit, ac multo ante centrum definit: quasi quis sinum in ambitu anulo auget, cuius orbis instar trianguli esset confusus: & istius trianguli externum latus, exteriorē articuli ambitum respiceret: inferiorius uero latus sinui incumberet: superius autem humeri caput spectaret, adeo ut duo anguli ambitum articuli contingerent, tertius interim sinus centrum spectaret. Ceterum hanc Naturae industriam spectatu iucundissimā, etiam si hominis corpus ad manū non sit, in quadrupedum & auium genibus promptē intueberis, quum pari quoque artificio hīc tibiae ossis sinus perpetuo augeantur. Huius itaq; cartilaginis quotiescunque reperitur, beneficio, sinus scapulae profundior euadit, & interim cartilago impetui compressionisq; ossium facile cedit, laxum huius articuli motum minimē cohibēs. Processus uero quibus praesenti articulo Natura prospexit, duo censentur: quorum alter^a superior est, summusq; humerus nobis uocabitur, atque mox

Scapulae pro-
cessus.

Interior pro-
cessus.

ad scapulae^b spina pronasci docebitur. alter uero est interior ac minor, qui^c ampla radice ex superiori sede ceruicis scapulae principium ducit, & hinc utrunque latus antrorsum fertur, anteriori articuli parti uersus superiora magis oppositus. Inferior huius processus pars exacte laevis est, ac instar antiquae Graecorū literae C cauius, ob idq; etiam *στυμφοδής* appellatus. Alij uero à quadam imagine, quam obtinet cum altera anchorae parte, quae terrae insigitur, *ἀγκυροδής* hunc processum uocant. Nonnulli rursus, quod corniculæ rostri modo inclinatur, *κωκευροδής* appellauere. Atque haec nomina Galeni interpretes subinde luserunt, ad hoc etiam opitulante Galeno, sibi in nominibus hīc parum constanti, quum is enim alibi penē semper hunc processum *ἀγκυροδής* uocat, in decimo tertio tamen de Partium usu, eo nomine illum scapulae processum donauit, quem summum humerum uocauit. Verum huius processus nominum mentio, postmodum necessario incidet. nunc autem quod de interiori processu adhuc enarrandum superest, percurrēmus. Inferna itaque sede is laevis est, in superiori autē parte asper & inaequalis. in elatissima enim sui principij sede crassior uisitur, & inaequali tubere prominet, cui clauicula ferē incumbit ac innititur, ualideq; alligatur. In apice uero, ubi appendicem exigit, etiam asper est, ut aptius^d internum anterioris cubitum flectentium musculi caput ab ipso exoriretur, & ligamentum humeri articulo peculiare hinc principium obtineret. Inter apicem uero & tuberculum, quo clauicula penē sustulcitur, haec superior processus sedes etiam aspera existit, quō fecilius^e ligamentum educeretur, hinc ad superiorem scapulae processum pertinens. Quemadmodum uero haec superior processus sedes in hoc aspera est, ut opportune ligamēta illa & hoc musculi caput produceret: ita quoq; scapulae ceruix orbiculatim foraminula quaedam non peruia commonstrat, ex quibus commoda ualidorum huius articuli ligamentorum pendet origo.

Anterior seu
cauius pro-
cessus scapulae se-
des.

Nunc tempestiuum quoque erit, alterum scapulae processum sermone persequi: cuius naturam optime inueniemus, anteriorem posterioremq; scapulae sedes non oscitanter spectantes. Scapula itaque^h anteriori sede sima cauaq; est, ut commodē costarū conuexis respondeat, ac super ipsas stabilita debite moueatur, deinde etiam, ut opportuna hīc sedes aptareturⁱ musculo, qui totam anteriorem scapulae sedem implens, intrō antrorsumq; brachium circumuertit. Caua haec scapulae sedes laevis quidem est, sed non omni ex parte aequalis. nam iuxta inferiorem ipsius sedem^k tubercula quaedā exigit, modicē instar obliquioris lineae extuberantia, quae quodammodo sinus constituunt, ac si thoracis costae, quibus scapula hac sede incumbit, temporis successu in scapula comprimerentur, ipsaq; scapula illarū effigiem cedendo assumeret. Hī enim sinus tuberaq; in senibus apparent magis, quam aut in pueris, aut iuuenibus, quibus omnia minus conspicuē protuberant, excrescuntq;. Ad haec, scapulae anterior sedes^l ad radicem elatioris angulibalis scapulae non nihil protuberat, aptamq; regionem efficit, cui^m alter scapula attollentium musculorum ualide insertatur. Præterea scapulae anterior sedes quā summi humeri radicē scapulae uel spinā respōdet, insignius quā alibi excauatur, non secus quā si Natura quum scapulae spinam fingeret, cauam scapulae partē in posteriora extraxisset, ac ita ipsius cauitatem auxisset: quemadmodū in fictilibus uasis, & ijs quoq; que ex massa uel cera parantur, indies fieri cernimus. Quando enim ollae ansam externa ipsius sede locatam conspiciamus, plerumque caua ollae pars ansae respondēs, sinuata magis, ac ueluti ab ansa extrorsum tracta cernitur. idq; in illis

q. 1. 2. fig. K.
r. 2. fig. G. H.
s. 1. 2. fig. E. F.
t. 1. 2. fig. E.

u. 1. 2. fig. K.
x. 1. 2. fig. E.

y. 6. muscu.
tab. n.
z. 1. fig. f.

a. 5. muscu.
tab. c.

b. 1. figura.

c. 7. muscu.
tab. r. 8. id.
H.
d. 1. fig. m.
m. 1.

e. 1. fig. o.
f. 9. muscu.
tab. r. o.
g. hic cauer
h. o. si. pri
me cum H
G. fig. 1.

secundus

sedibus potissimum obseruatur, ubi crassiores anse partes consistunt. Vnde etiam illae scapulae
 cavitatis sedes insigniū impressae cauataeque conspiciuntur, quae extremis spinæ respondent.
 mox enim spinam in tota ipsius exortus sede ad extrema impensius crassam, quam in medio
 ductu, uideri audies. Inter reliquis interim scapulae cavitatis sedes, ea maxime caua se exhibet,
 quae iuxta scapulae ceruicem existit, praeter id enim quod in posteriora à scapulae spina, extra-
 cta colligitur, hic etiam scapulae^b collum impense crassum & introrsum protuberans, hanc ca-
 uitatem insigniter auget: quemadmodum & inferior scapulae costa, quae quum crassa sit, huius
 quoque sedis cavitatem profundiorē reddit.^c Posterior scapulae sedes insigni^d processu, ue-
 luti spina, adornata, si obiter uideatur, gibba est, quod hanc figuram iniurijs citra noxam feren-
 dis accommodatiorem esse Natura haud ignorauerit. Verum si pressius hoc scapulae gibbum
 contempleremur, duae in ipso sedes cavitatesque nobis occurrent, musculis suscipiendis aptissi-
 mae.^e Vna enim sub scapulae spina inter spinæ inferiorē sedem, & extuberantiore crassioremque
 inferioris scapulae costae partem consistit.^f Altera uero inter superiorem scapulae spinæ sedem,
 & superiorem scapulae costam habetur. Atque hanc quidem^g musculus occupat, quem brachium
 circumducentiū tertium statuimus. Inferior cavitatis^h musculo oppletur, qui brachium circum-
 uertentiū secundus numerabitur. Porro etsi haec externa posterior uel scapulae sedes, cum scapu-
 lae spinæ, tum ipsius costarum gratia, duas has cavitates ostendat, nihilominus uniuersa (quo-
 niam extuberant cernitur) scapulae dorsum à ueteribus nuncupata est, similitudinem à uero
 hominis dorso fumentibus. Processum autem qui ab hoc scapulae dorso enascitur, spinam uo-
 carunt, ad uertebrae posteriorum processuum siue spinarum imaginem, quae quum uete-
 ribus reculsimè sint instituta, ab his nominibus nunquam ne latum quidem unguem declina-
 turus, externam scapulae sedem Dorsum nuncupabo: summum uero humeri radicē, Spinam sca-
 pulae. Dicitur autem mihi summus humerus, quod ueteribus ἀνώγειον nuncupabatur: quan-
 quam non adeo promptum sit diuinare, quid quisque hac uoce intellexerit, neque etiam uel diui
 Hippocratis causa nomen id negligendum uenit, aut etiam de ipso obiter statuentū est, si mo-
 do à Syropis & Iulepis interdū animū auocantes, diuina Hippocratis de ossium fracturis &
 luxationibus, idque genus malis oracula, etiam ad nos pertinere duxerimus. Quare etiam non
 ab re fuerit, scapulae spinam summumque humerum, uti nobis uisum erit describere, atque tunc
 demum Hippocratis & Galeni sententiam sermoni adicere. Ex tota igitur propemodū ampli-
 tudine dorsi scapulaeⁱ ualidis crassisque enascitur processus, non quidem è dorsi^j longitudinis
 medio, uerū non procul à superiori ipsius sede. Processus iste (qui scapulae spina est) sensim ma-
 gis magisque augetur, ac tandem à scapulae dorso iuxta scapulae ceruicem abscedēs, teresque quo-
 dammodo apparatus, modicè antrorsum fertur, insigniter supra scapulae cum humero articulū^k la-
 tesces, & ampla donatus appendice, quae in pueris pluribus ossiculis cōformatur, cartilaginis
 interuentu coalescentibus. Huius processus pars omnis anterior, & posterior, & humilior, leuis
 minimeque aspera cernitur: superior autē ipsius sedes neutiquā leuis est, sed rudis, & foraminu-
 lis quibusdā non peruijs decorata, idque potissimū in superiori sui appendicis sede, & ubi non
 procul à scapulae basi, processus iste crassior apparet, ac subinde appendicē quoque nanciscitur.
 Neque haec sanè frustra machinatur Natura. musculorum enim gratia has molitur asperitates,
 quibus^l maximus scapulae sursum ducens musculus implantatur. Dein processus iste ijs quibus
 dixi locis asperior ideo euasit, quod musculus ille latiore ualidioremque in sectionem inibi ten-
 tat. Quinetiam haec asperitas, principium praebet^m dignissimo brachium mouenti musculo:
 quem, quod brachij cum scapula articulum eleganter integit, ἐνωπίδια dissectionum periti uo-
 carunt. In anteriori processus sedeⁿ sinus adeo leuiter & superficietenus insculpitur, ut num
 capitulum, num sinus sit, aegre diiudices. Huic sinui modicè prominēs clauiculae^o tuberculū ar-
 ticularum, ualidissimisque ligamentis cōstringitur. Interueniēte hic plerumque peculiari cartilagine,
 illi prorsus simili quam in maxillae inferioris cum superiori articulis obseruari retulimus, quae
 scilicet utrinque quā ossa spectat, leuis & lubrica sit, & tantū ligamentis articulum continentibus
 affirmata & continua. Dicti modò processus pars, quae à scapulae dorso enascitur, ac (ut sic di-
 cam) dorso proxima est, Spina opportunè nominatur, quae etiā in^p canibus, ouibus & equis
 cernitur.^q Pars autē quae à scapula antrorsum uersus exteriora abscedit, ac sensim dilatescit, inque
 solis hominibus, simijs, sciuris, etsi quod aliud animal clauicula donatur, obseruari potest,
 summum humerum appellabimus: id nomen à Graecis mutantes, qui procul dubio brachij
 ossis cum scapulis articulum ὤμων nuncuparunt, ac proinde ἀνώγειον hanc processus partem
 uocarunt, quod articuli superiorem cōstituat sedem, ac ueluti illius tutissimū habeatur propu-
 gnaculum. Atque ita sanè ab Hippocrate perpetuò accipitur, cum alias sapius, tum praecipue
 quando humerum (quem ipse βραχίονα uocat) nequaquam ad superiora (impediēte nimirum

Posterior sca-
pulae sedes, seu
dorsum.

Summus hu-
merus seu ἀνώ-
γειον, cuius iam
diligens inspi-
cienda est de-
scriptio.

Peculiaris
cartilago cle-
mentis cui su-
periori sca-
pulae processu
articuli.



*Tertium os à
Galeno in sum-
mi humeri cum
clauicula ne-
xū recenseri.*

summo humero luxari docet, & quom de effracto summo humero pertractat. Quoniam & hic Galenus etiā in libro de Ossibus audiendus est, qui cōpaginem præsentis processūs cum clauicula ἀγκύλιον nonnullis dissectionis professoribus uocari asserit. Vbi etiam subiungit, hic quosdam tertium os præter processum hunc, & clauiculam in solis hominibus ponere, idēq; acromion & λατράκιδες uocare. Tertium hoc os Galenus decimo tertio de Partium usu in hominibus recenset, & simias illo priuat quemadmodum & in libris de Administrandis sectionibus, & in suis in Hippocratis de Articulis librum commentarijs. Scribit enim, præter hunc scapulæ superiorem processum, & clauiculam, tertium quoddam os esse cartilagineum, quod clauiculæ ad illum scapulæ processum cōtextui infertur, & à quo membranæ ligamētāq; pronascuntur, quorum beneficio contextus iste ualidiùs cōmittitur. Galenus in quinto de Administrandis cōsectionibus libro huiusmodi os Hippocrati ἀγκύλιον uocari ait, ipseq; eo nomine ibidem id appellat, quemadmodū in libro de Ossibus testatur, quosdā hic tertium quoddam os collocare, idēq; ab illis ἀγκύλιον nuncupari, quom interim Galenus subinde in libris de Partium usu, & in libris de Administrandis sectionibus, ac ferē in omnibus in Hippocratem commentarijs, hunc scapulæ processum ἀγκύλιον uocitauerit, aut saltem huius scapulæ processum cum clauicula compagem. adeo ut non parum Galeni inconstantiam hic admirer, multoq; magis tantisper admiraturus sim, dum in homine tertium id cartilaginofum os mihi occurrat. Neutiquam enim arbitror Galenū, peculiarem superius cōmemoratam huius articuli cartilaginem ossis loco habere, quū eius generis cartilagine ad ligamēti naturam à uera cartilagine plurimū recedat, neq; ossē ullo pacto sint: quin etiam quom hæc in simia perinde ac in homine reperitur. Et si fortē ossis loco habenda esset, præterquā quod Galenus aliter huius meminisset, & articulū interuenire, non autē ipsi in sterni scripsisset, etiā reprehensione nō careret, quod peculiare os in clauiculæ cum pectoris ossē articulo, & rursus in inferioris maxillæ ad superiorem articulis & in genu nō statuisset, quū interim illic huius generis cartilagine manifestius quā hinc in summo humero appareant, etiā illæ Galeno incognitæ & prætermittæ uideantur. Adeo ut adhuc multo satius sit, peculiare hanc cartilaginem (et si ossē esset) ossis nomine nō haberi, quā simul tot ossa Galenū latuisse, clam innuere. Hactenus itaq; mihi hic nunquā, quantū uis diligenter Hippocratis nomine secanti, tertium os animaduertente licuit. Satisq; perspectū habeo, Galenū id nunquam etiam uidisse: & si ausim eod usq; in ipsum impietatis progredi, affirmarem illum huiusmodi os cōfinxisse à quadā cum ossiū, quæ lesami semen referūt, similitudine, quæ aliorū ossium articulis contextibusq; ita apponi audies, quemadmodū cartilaginem os Galenus hic consistere prodidit. Lubens igitur cōcessero, tertium id os me in homine non magis quā in simia reperisse, ut neq; qui mihi secanti adfuerit ullus, ut cunq; etiā ut à singulis id obseruaretur, sedulō semper monuerim. Ac proinde si quis id os, aut simile quodpiam præter processum scapulæ & clauiculæ mihi ostēderit, fidem do in humeri cum scapula articulo, me aliud eiusmodi quid longē dignius atq; in artis operibus egregiē perpendendū, ocyus cōmonstraturum. quod uel sola hac occasione sciens nunc prætereo. Quamuis interim neminē ignorare uelim, nullum unquam animal, præter hominē, simiā, & sciurum, & si rectē memini, gliem mihi occurrisse, hoc superiori scapulæ donatū processu: adeo ut uix ambigē, eum qui primus hominē duntaxat ἀγκύλιον donari scripsit, intellexisse solū hominē hunc processum obtinere: quando illum in canibus, ouibus, capris, leporibus (qui etiā interiorē scapulæ processum separatim nanciscuntur) & alijs quæ mensæ apponi solēt quadrupedibus, nullū superiorē scapulæ processum (at duntaxat spinā) spectaret, parū de simijs cum Galeno sollicitus. Liceat igitur superiorē hunc scapulæ processum nobis tantisper Summū Humerū, aut Superiorē processum, dum uerior occurrat sententiā, appellare. Porro cuius usus gratia is homini & alijs animalibus clauiculas obtinetibus detur, tum demū melius explicabimus, ubi clauicularū historiā aggrediemur. Præter hoc enim quod ad superiora humeri luxationē is processus prohibeat, & tutissimū humeri articulo propugnaculū sit, & quod musculorū insertioni & exortui elegātē famuletur, in hoc potissimum iuuat, ut accedēte clauicula humeri articulum à thoracis lateribus & costis quā lōgissimē remoueat, illumq; in eo situ referuet, quo maximē ad suos motus, quos uarios differentesq; admodum molitur, indiget. At hæc in clauicularū descriptionibus resumētur diffusius, iam enim ali quando opportunū erit, scapularū sermoni modum imponere: præcipuē quom aliud enarrandum nihil super sit, nisi fortē perquam exiguū, cuiusmodi esse possit, basim scapulæ quā appendicibus decoratur, ut cunq; fungosam fistulosamq; uideri, & nonnulla foramina in scapulæ spinā porrigi, quæ ipsi (quom crassa sit) uenas deducāt, nutrimentum illi suppeditaturas. Cernitur autem unum subinde in illa amplitudine, quam superior scapulæ costa cum ipsius spina efformat: ac etiam in interna scapulæ sede, qua hæc impensius cauatur,

*Quibus tantū
animalibus su-
perior scapulae
processus
obtingit.*

*Summi humeri
usus,*

*f integrā
rū qd a.*

*g Grandior
pars 4 fig.
re cap. 22.
h fig. mar-
gins ca. 10.
i 8 fig. ca. 34.*

*h 1 fig. ca.
25 V. V.
2 fig. ca.
33 4. a.*

*l, m integ.
rū qd a.*

n 3 fig. ca.

PRIMA VIGESIMI SECVNDI

Capitis figura.



SECUNDA.



TERTIA.



TRIVM QVÆ HIC PROPONVNTVR FIGVRARVM ET
ipsarum characterum Index.

PRIMA presentis Capitis figura dextri lateris claviculam anteriori externaue & superiori sede expressam habet.

Secunda, posteriorem interiorem ue dextri lateris clavicula faciem, una cum superiori quoque ipsius sede ostendit.

Tertia inferiorem eiusdem lateris clavicula sedem commonstrat.

1, 2, 3 Clavicule capitulum, quo ipsa pectoris ossi articulatur.

B 1 Capituli huius primus angulus.

1, 2, 3 Secundus capituli angulus.

1, 2, 3 Capituli nuper commemorati tertius angulus. In prima tamen figura, uniuersa triangularis capituli circumscriptio est conspicua literis B, C & D. perinde ac in figura manifestio ris doctrinae gratia, indici characteris D hic superposita.

E 1, 3 In anteriori clavicula sede protuberans linea e directo primi anguli B insigniti, notatur.

F & G in tertia figura, protuberans linea inferioris sedis claviculae indicatur, quam F & G in secunda figura utcumque etiam ostendunt.

G 2, 3 G priuatim indicatur asperitas, ad lineam F insignita posteriora apprens.

I 1, 2 Clavicule longitudinis medium, quod teres esset, nisi linea F inferiori ex parte protuberaret.

I 1, 2 Hac sede clavicula ad superiorem scapulae tendens processum dilatescit, superiori quoque sede (quae etiam I ad K usque notatur) gibba est.

K 1 Asperitas in ea clavicula sede conspicua, ubi haec anteriori sui parte maxime caua cernitur.

M 3 Latiuscule sedis claviculae inferior pars leuiter sinuata, & aspera, non autem superioris partis modo gibba.

N 3 Hac sede clavicula etiam aspera est, perinde ac iuxta M, ex qua ligamentum ad internum scapulae processum fertur.

O 2, 3 Claviculae sedes maxime retrorsum introsum ue protuberans, & huius sedis peculiare tuber.

P 3 Locus insigniter asper, in inferiori clavicula sede conspicuus, qua superiori scapulae processui coarticulatur.

Q 2, 3 In tertia figura Q tuberculum insignitur, quo clavicula superiori scapulae processui committitur. In prima uero figura & secunda Q sedes indicatur, qua id tuberculum consistit.

HANC figuram integram erit praesentis Capitis quartam constituere, in qua dextri lateris pars R insignita cartilaginem exprimit, claviculae cum summo humero articuli peculiarem. Altera autem pars S indicata, cartilago est peculiaris claviculae cum pectoris ossi articuli.



I 3 IN

Clauicularum
monuerunt.

Eandem ad
pectoris os ar-
ticulatio.



Peculiaris
cartilago ar-
ticulationis
clauiculæ cū
pectoris offe.

Mira clau-
iculæ curuatur.

Curuatur
us.

Humeri arti-
culus cur a
costis remoue-
atur, & clau-
iculæ ac humeri
humeri ius.

N VTRISQVE lateribus clauiculæ (quæ Græcis κλαυικη, Latiniſis ue-
rò etiam furculæ & iugula nominantur) ſingulæ cōſiſtunt, pectoris offi &
ſummo humero ſeu ſuperiori ſcapulæ proceſſui coarctatæ. Pectoris offi in
illis articulantur ſinibus, quos in primi offis ſummæ ſedis lateribus excul-
ptos diximus. ac quemadmodum ſinus illi oblongi ſunt, ab anteriori-
busq; partibus deorſum in poſteriora ducti, & antica ſede quàm poſtica
latiores, internoq; latere altiores quàm externo cernuntur, ita quoque ſe
habent clauicularum capita pectoris offi cōnexa. Hæc enim ſinum modo oblonga ſunt, ac
depreſſa: et ſi quis accuratius eorum circumscriptionem animaduertetet, illam quodammo-
do triangulam iudicaret. Vnus enim angulus in anteriori capitis parte ad humiliora conſi-
ſtit, utcunq; obtruſus. Secundus etiam obtruſus eſt, in ſuperiori capitis parte nonnihil uer-
ſus poſteriora conſpicuus. Tertius acutior longiorq; eſt, in poſteriori ſede repoſitus, deor-
ſumq; declinans. Porro ut præſentes anguli obtuſi ſunt, ita etiam trianguli lineæ inæquales,
extrorſumq; obliquatæ occurrunt. Illa enim quæ à primo angulo ad ſecundum ducitur, bre-
uiſſima eſt: à ſecundo autem angulo ad tertium procedens, multò longior uiſitur. quæ ue-
rò à primo ad tertium fertur, omnium longiſſima curuaq; eſt. Atque ita ſe habet clauiculæ ca-
pitis circūferentia, quod multa cartilagine incruſtatur, læueq; eſt: cartilagine tamen unà
cum tenuiſſima appendice effracta, caput alperum ac inæquale cernitur. Verum et ſi caput car-
tilagine non minus quàm & pectoris offis ſinus abundet, nihilominus tamen Natura hic
cartilaginem effinxit, qualem priuatim in inferioris maxillæ ad ſuperiorem articulis reponi
commemorauimus. Inter pectoris enim offis ſinum, clauiculæq; caput, cartilago quædam
adeò ampla interuenit, atque capitis & ſinus eſt amplitudo. Hæc tenuis undecunq; eſt, ac
æqua omni ex parte conſtat craſſitie, & quæ ſinum reſpicit, admodum læuis eſt, & unctuoſo
humore perſuſa, ſinuiq; ſeu pectoris offi nuſquam connata. Item quæ cartilago clauiculæ con-
tingit caput, pariter quoque læuis & lubrica eſt, capiti interim non connata, ſed tantum liga-
mentis articulum in orbem amplexantibus, adeò, ut & hæc cartilago non minus triangula ſit,
quàm clauiculæ caput pectoris offi articulatam. Clauicula ab hoc cum pectoris offe articulo,
non recto tramite ad alterum ipſius porrigitur articulum, quo ſcapulæ ſuperiori proceſſui
connectitur. A pectoris enim offe procedens, extrorſum ſenſim curuatur, & anteriori parte
gibba, poſteriori uerò concaua efficitur. Verum ilico poſt medium ipſius longitudinis con-
trario ductu procedit, introrſum nanque curuatur, & gibba ſit, anteriori autem ſede concaua
uiſitur: in anteriora inſigniter illic prominens, ubi ſuperiori ſcapulæ proceſſui proxima eſt:
adeò ut his gibba, biſq; caua reddatur. Pars enim ipſius pectoris offi contermina, & præter
dicta, retrorſum, ſeu ad thoracis interiora magis pertinet, quæ autem ſuperiori ſcapulæ arti-
culatur proceſſui, ac præter dicta, nuncupatur, antroſum uergit, & ab interna thoracis ſede extror-
ſum remouetur, clauicula interim in medio ductu etiam obliquata. eſt itaque gibba anteriori
ſui parte, in anteriori pectoris ſede non procul ab ipſius cum pectoris offe articulo, cauq; eſt
parte ſua interna, non procul uerò à ſummo humero anteriori parte inſigniter breuiq; flexu
caua cernitur: poſteriori autem parte, gibba & conuexa. Atque ut res ſedulò propter crebras
clauicularum luxationes fracturasq; expendenda breuiter dicatur, clauiculæ ductus huic no-
ſtro reſpōdet, præcipue ſi id in medio ductu paulo magis maiuſculi ſi ritu in hunc modum
obliquari fingeremus. Neque horum ullum temere & fruſtra à rerum Opifice factum eſt, ubi
enim clauicula iugulum ſpectat, merito poſteriori ſeu interiori parte caua eſt, quum hæc aſpe-
ram arteriam, ſtomachum cum ſexti paris neruorum cerebri neruis, & imprimis inſignes ner-
uorum ſeries à dorſali medulla axillam petens, ferri deberent. quibus potiſſimum neruis clau-
icula uiam exporrigit, & propugnaculi etiam loco præſignitur. Quia uerò à iugulo, aut po-
tius à ſuæ longitudinis medio clauicula in poſteriora porrigitur, neque alicuius uſus gratia
hæc in anteriori ſede gibba eſſe debuit, neceſſariò rurfus iuxta ſuperiorem ſcapulæ proceſſum
antroſum uergit, quouſque proceſſus illius partem contingat, cui aptè coarticulati poſſet.
Tantum autem hic antroſum porrigitur, quantum retrorſum abſceſſerat ipſius gibba par-
te in illius poſteriori ſede, quæ non procul à ſummo humero diſtat. Si enim clauicula à ſuæ
longitudinis medio duntaxat in poſteriora tenderet, ad colli latera prorepens, neque elatori
ſcapulæ proceſſus apici articuletur, nihil profectò obſtaret, totam ſcapulam clauiculæ be-
neſicio non firmatam, ſuper thoracem cadere, thoraciſq; lateri proximè applicari, articu-
lumq; humeri coſtus uiciniſſimum fieri, hæcq; occasione quamplurimos brachij motus præ-
pediri. Brachium nanque ob id potiſſimum in homine & ſimia atque alijs quæ clauiculis do-
nantur animalibus, tam uarijs differentibusq; motibus duci poteſt, quòd ipſius cum ſcapula
arti-

a integr 4-
rum Q. ad
O. n.

b 7 fig. ca.
19 r.

c 1, 2, 3 fi. A.

d 1 fig. B.

e 1, 2, 3 fi. C.

f 1, 2, 3 fig.

D.

g 1 fig. a B

h 1, 2, 3 fig.

i 4. ad D.

j 1 fig. a B

ad D.

k 4 fig. S.

l ad Q. 1, 2, 3

fig. B.

m 1, 2 fig.

ab A. uerſus

H.

n 1, 2 fig. ab

H. uerſus

Q.

Hec orga-

na ſerè ſi-

mil oſten-

dit ultima

ſil. b. 3. de

in ultima

quarti.

o fig. cap.

21 L.

p 2, 3 fi. O.

q hæc pe-

tes ab in-

gris ubi ar-

ticulus ex-

R. cum ſcō

factus à co-

ſtis remoue-

tur, pro a-

pter nexū

Q. ad S.

articulus à thoracis latere plurimum distet. Si enim articulus ille thoracis costas contingeret, uel quauis ratione ipsius proximè (quemadmodum in quadrupedibus) locaretur, ipsas manuum circulationes & iactationes ad pectus, dorsum, collum, & illa nequaquam moliremur: quemadmodum accidere nouimus, quò luxatus humerus in costas procidit, uel scapula in star alæ ob effractam clauiculam dependet. Ne igitur adeò necessarijs destitueremur munijs, Natura hu meri articulum à thorace plurimum distare uoluit, quod sanè præstitit superiori scapulæ pro cessu, qui ita producit, ut clauiculæ beneficio à pectore detrusus, sustentetur ac stabiliatur, ipseque articulus hac occasione procul à thorace disiungatur. Articulatur uerò clauicula huic processui minimùm extuberanti¹ tuberculo latiori, quàm longiori, & nonnihil obliquo: ta lisque hinc confurgit articulatio, ut quodnam os suscipiat suscipiatur ue, diiudicare uix queas. fit enim hinc ea articuli species, quam Græcorum ueteribus ἀρθρὸς uocari diximus. Clau iculæ² pars quæ superiori scapulæ processui connectitur, latiuscula est, quemadmodum & processus quoque latus ampliusque cernitur. præterea hæc clauiculæ pars, ut & illa, quæ pecto ris ossi committitur, intus fistulosa magisque rara est, quàm reliqua clauiculæ portio, quòd ui delicet hæc partes etiam crassiores spissioresque sint: & ossa intus tanto semper fungosiora, quanto crassiora & ampliora cernantur. Ipsa enim clauicula in suæ longitudinis³ medio soli dissima est, quòd etiam hinc sit tenuissima, quodammodoque teres, non enim prorsus teres est. In humiliori nanque ipsius parte ueluti in⁴ lineam protuberat, quæ incipit non procul à cla uiculæ capite, quòd pectori articulatur, iuxta medium scilicet posterioris & anterioris eius capitis angulorum. Pertingit autem hæc linea paululum ultra clauiculæ longitudinis medi um, in hoc parata, ut⁵ musculus thoracem mouentium primus ab ipsa principium duceret, iuxta huius lineæ principium propter caput clauiculæ⁶ asperitas sinuosa conspicitur, unde ualidum pronascitur ligamentum, clauiculam pectoris ossi illic colligans,⁷ qua ipsi primæ tho racis costæ cartilago connascitur. Quinetiam ad aliud huius lineæ extremum, altera occur rit⁸ asperitas, & ueluti asper quidam sinus, quo clauicula⁹ tuberculo radicisque interioris sca pulæ processus penè incumbit, ac à quo ligamentum promitur, clauiculam illi tuberculo pertinaciter colligans. Porro inferior hæc clauiculæ sedes, ubi linea illa desinit, clauiculæque¹⁰ am pla uisitur, sinuosa fit, & aspera, idque potissimum iuxta conuexum clauiculæ ad superiorem sca pulæ processum, ubi ligamenta articulū hunc continentia ualidiora quàm superiori sede ena scuntur. Superior uerò totius clauiculæ regio læuis omnino est, præterquàm iuxta ipsius articu los, ubi ligamentorum producendorum occasione, quemadmodum & musculorum gratia nonnihil aspera est. A clauiculæ enim parte superiori iuxta pectoris os¹¹ musculus ille enascitur, qui etiam à pectoris ossè pronatus, in¹² mamillarè capitis processum implantatur, capitisque mo torum decimus tertius, seu septimi paris alter numerabitur. Superiori uerò clauiculæ parti scapulæ superiori commissæ processui¹³ musculus ille inseritur, qui scapulam fursum ducenti um primus recensebitur. In anteriori clauiculæ parte ad radicem primi ipsius capitis anguli, linea quoque protuberat, ante medium longitudinis clauiculæ desinens, à qua non minima pars¹⁴ musculi brachium pectori adducentis principium ducit. Ad hæc, in anteriori clauicu læ sede, ubi retrorsum inflectitur, & ubi non procul ab ipsius cum superiori scapulæ processu articulatione caua uisitur, etiam¹⁵ asperitas notatu digna consistit¹⁶ musculo brachium attol lenti parata, cuius principij magna pars hinc pronascitur. In posteriori clauiculæ sede nihil, quòd non dictum sit, inæquale occurrit, præter quoddam¹⁷ tuberculum hinc protuberans ubi quicquam notandum est, nisi fortassis adhuc sermoni foraminula quædam nò prorsus peruia adijci uelis, quæ interdū duo, interdū tria in maximè solida clauiculæ parte, & potissimum in po steriori ipsius sede uidentur, in hoc parata, ut uenulas transmittant clauiculæ nutriendas.

Clauiculæ ad
sternum lūne
rum nexu.

Clauiculæ sub
scapula tubera,
asperitates, le
uities, & fo
ramina.

DE HUMERO SEU BRACHII

osse. Caput XXIII.

CHARACTERVM DVARVM PRÆSENTIS CAPITIS
figurarum (quas sequens pagina proponet) Index.

A, B, C, D, E, F, G, H Horum characterum alij in prima figura, alij uerò in secūda obuij
sunt, indicantes humeri appendicem, uti modò subijciam, ualde uariam.

A, B, C In ambabus figuris humeri caput circumscribitur, quòd scapulæ inarticulatur.

D, E Vtrique characteres in prima uisuntur figura, externum caput appendicis humeri notantes,

I 4 cui

cui ligamenta articuli inferuntur. Verum D externi huius capitis antèrius caput indicat. E uerò posterius, quod in secunda figura magis quàm in prima est conspicuum.

F, G Duo isti characteres in prima, & G in secunda, sinum indicant patulum, qui interius caput ab exteriori dirimit. Reliquum characterum Indicem ponendis modo figuris subiiciemus.


**PRIMA VI
GESIMI TER**

tij Capitis figura, dex
tri humeri anteriorem
faciem referens.



SECUNDA

**HUIUS CAPI
tis figura, dextri hume
ri posteriorem faciem
proponens.**



- H, I 1 Sinus externum caput in duo diuidens, ac externo capiti anterioris musculi cubitū flectentium paratus. Ac H quidē ipsius sedē in appendice notat, I uerò eā quæ in humeri ceruice cōsistit.
- K, L, M 1, 2 Humeri rotula, ad quam ulna flectitur & extenditur. ac K quidem sinum rotule notat, L uerò & M sinus latera. & L rursus internum latus, M autem externum.
- N 1 Sinus ad rotulæ superiorem partem in humeri anteriori sede incisus.
- O 2 Sinus ad superiorem rotulæ partem in humeri posteriori sede admodum altè excavatus.
- P 1, 2 Humeri caput seu tuberculum, cui radius articulatur. In prima figura huius Capitis pars ap-
paret, quæ cartilagine in crustatur. In secunda uerò ea pars, cui radius non committitur, uerum
musculorum exortui eleganter subseruit.
- Q 1, 2 Hac sede humerus ad magnum ipsius longitudinis interuallum instar acutæ linæ protuberat.
- R 2 Sinus in hoc externo humeri capite quartis manum petentium nerui gratia exculptus.
- S 1, 2 Internum humeri tuberculum.
- T 1 Sinus anterioris tuberculi, tertio neruo manum aduentum paratus.
- V 2 Sinus interioris tuberculi, in quo quintus brachium petens neruus uehitur.
- X, Y, Z 2 Posterior humeri sedes. ac X quidem notat partem superiorem, quæ sinuata est: Z ue-
rò inferiorem, quæ gibba cernitur. Y impressionem indicat, ad quam quartus neruus brachi-
um accedens reuoluitur.
- a, b, c, d 1 Anterior sedes humeri, in qua b insinuat prominentem extuberantem uel eius partem: a uerò &
c locum, qui utrinque ad hanc protuberantem partem deprimitur. Deinde tres isti characteres si-
mul notant anterioris humeri sedis inferiorem partem sinuatam: a uerò superiorem, quæ gib-
ba uisitur.
- e 1, 2 Asperitas iuxta externum latus anterioris sedis humeri consistens.
- f 1 Asperitas in anteriori humeri sede conspicua, ad radicem sinum externum caput musculi dedu-
centis, qui cubitum flectentium anterior recensetur.



VMERVS Celfo, atque alijs compluribus¹ id os uocatur, quod scapulæ & cubito articulatam, Græcis (uti & Latinorum quamplurimis) *Brachion* nuncupatur. Vt uero totam ossis & musculorum molem cum neruis, uenis, arterijs, cute, & alijs si quæ brachij constructionem ingrediuntur, ab ipso osse in sermonis contextu distinguamus, quum solius ossis mentio incidet, id Humerum, aut interdum Brachij os appellabimus: quum autem reliquas membri partes unâ cum osse indicabimus, Brachij

Humerus.
Brachium.

uoce non inopportune clarioris doctrinæ studio, utemur. Humerus itaque, Galeni sententia, omnium totius corporis ossium, femore tantum excepto, maximum est: licet tamen tibia & tibiæ os, humerum longitudine insigniter uincant. dein tibiæ os crassitudine & gravitate perinde atque ossa sacri ossis lateribus coarticulata, pondere humerum longè superant, adeo ut plerumque nobis præter femur occurrant ossa, quibus humerus magnitudine cedit. Verum id cum alijs permixtus Galeni concedemus autoritati, quum aliorum uenia nobis non liceat ipsius placitis contraire. Summa igitur humeri pars, qua is scapulæ articulatam, admodum magna² appendice constat, quæ in duo dirimitur capita, quippe hæc interna ipsius sede

Humeri post
femur non esse
omnium ossium
grandiorem,
uti Gal. in li.
de Ossibus cen
ser.

amplum, & in ambitu orbiculare, & paulo minus quam medijs globi modo protuberans efformat caput, quod læue æqualeq; est, & cartilagine incrustatum scapulæ³ sinui articulatam. Hoc caput, appendicis internum latus constituit, superioris etiam appendicis sedis aliquantu

Superioris
humeri partis
descriptio.

lo plus quam medium occupans. Cæterum appendicis externum latus, quodammodo in aliud asperum & inæquale protuberat caput, non quidem articulationi cuiuspiam erectum, sed duntaxat collis modo prominens, in quem ualida multaq; ligamenta humerum scapulæ necessitudine implantantur. Ad externum enim interioris capitis latus, quod in eminentiori & summa appendicis sede habetur, & deinde in anteriori posterioriq; eiusdem capitis sede, amplius quidam patulusq; sinus orbiculatim ducitur, internum caput (quod articulationi subseruit)

ab exteriori (quod ligamentis excipiendis adaptatur) dirimens, & idoneam ligamentorum insertioni sedem parans. In hunc enim sinum orbiculatim ductum, & in anteriori humeri sede magis quam in posteriori patulum, seu amplum profundumq; tanquam in uallem ligamenta inferuntur. In caput uero externum, quod hoc sinu ab interno distinguitur, ligamenta ueluti in collem & promontorium aliquod insertionem moluntur, & quemadmodum omni-

um ossium sedes, in quibus aliquid inferitur, aut à quibus aliquid principium ducit, asperæ inæqualesq; sunt, sic quoque & præfens sinus unâ cum externo capite asper inæqualisq; cernitur. Porro præterquam quod hoc externum caput inæqualiter prominet, uariumq; est,

alio quodam⁴ sinu ueluti in duo rursus capita diuiditur, in⁵ anterius nimirum, & posterius quod anteriori multo grandius est. Sinus enim iste paululum uersus exteriora in anteriori ap-

pendicis sede cælatus, insigniter profundus, longus, & secundum cavitatem ad amussim teres perinde uisitur, ac corpus, cuius gratia insculpitur, quod⁶ externum caput est musculi cubi-

tum flectentium anterioris. Quod autem sinum illum secundum concauum, caput autem musculi secundum conuexum, teres esse intelligo, neminem latere arbitror, dummodo sinus qui-

dem omnes cauos, ea autem quæ illis uehuntur insidentue, gibba esse, non ignoret. Cæterum oblongus hic sinus non tantum ad appendicem pertinet, uerum etiam ad eam humeri os-

sis⁷ sedem cui appendix coalescit, & quæ humeri ceruicem perquam breuem & impenſe cras-

sam constituit. atque ita superior humeri pars scapulæ contermina se habet. Inferior autem, quæ⁸ duobus in cubito existentibus ossibus, ulnæ nimirum & radio articulatam, longè magis adhuc uaria est, tum sinuum, tum capitum actuberum copia & imagine. Primum igitur, in medio inferioris humeri sedis, sinus cum suis tuberibus talis prorsus cõspicitur, qualem in troch-

leæ rotula est cernere, ad quam funes uoluuntur. Quemadmodum enim rotula trochleæ, rotunda orbicularisq; in ambitu est, in lateribus autem plana & lata: sic etiam in hac humeri se-

de orbicularis rotundaq; conspicitur pars, quam nullæ imagini propius quam rotulæ assimi-

laueris. Deinde, ut rotula in ambitu, cui chorda aduoluitur, sinu quodam (ut sic dicam) tereti, & læui, ac lubrico exculpitur, & sinus huius latera utrobique protuberant, funemq;

in se quo minus aberret amplexantur: ita etiam hæc humeri pars in medio sinuata est, & utrinque protuberat. In hoc tamen ab exquisitæ rotulæ tuberibus differt, quod perpetuò ferè

sinus rotulæ latera æqualiter exporriguntur. Hæc autem humeri pars⁹ interno latere admo-

dum insigniter prominet, & ad amussim rotulæ respondet, externo interim latere multo minus educto. Non sanè, quod hic Natura magis quam rotularum artifices dormitauerit, aut minus fuerit solers, sed quod neuiquam necessum erat, humeri sinus, seu orbitæ latera, utrin-

que pariter exporrigi. Vt enim rotula murum altero latere spectans, ideo minus in latere mu-

Inferioris hu-
meri partis de-
scriptio.

ro proxima, quam in alio, protuberare citranoxati potest (quod scilicet nullus metus sit, su-
nem à latere quod murum proxime tangit, è rotula clapsurum) ita quoque externum hume-
ri orbitæ latus, non ita atque internum periclitatur. Ad externum enim latus, aliud ¹ caput
constitui mox subiungemus, cui radius articuletur, quodq; muri uice censerì potest, prohi-
bentis ulnam extrorsum à sua orbita luxari. Verum est & aliud humeri rotulæ cum ueris ro-
tulis discrimen, quod non ad omnem ipsius partem ulna similiter ac funis ad rotulam circum-
moueri potest. Quamuis enim in ¹ superiori mediâq; orbitæ sede, humeri os insigniter sinua-
tum sit, longeq; tenuissimum, & squamæ modo pellucidum, tamen nequaquam est peruium,
& hoc magni cuiusdam usus gratia. Summus enim rerum Opifex quum ulnam ad hanc hu-
meri orbitam flecti & reflecti uoluit, ita sanè rotulam parauit, & ipsi etiam ulnæ ¹ sinus, tu-
beraq; & processus elargitus est, ut cubitum flectere & extendere possimus, & tamen in his
motibus robore non defuturum: quod sanè perirer, si in superiori rotulæ sede humerus esset
peruius, nihilq; esset in quo ulna in extrema extensione firmaretur, sed funiculi modo, citra
renixum basimq; & obstaculum obuolueretur. Exculpit itaque Natura in superiori rotulæ
huius sede duos insignes sinus, ¹ unum quidem anteriori in parte, ² alterum uerò in posteriori.
ri, qui multo amplior, profundior, & quouis modo insignior est anteriori. Sinus hi quasi squa-
ma duntaxat dirempti, ulnæ processus (quos *logónas* priuatim uocant) excipiunt. Atque ho-
rum anteriorem, quum cubitus flectitur, anterior sinus admittit: quum uerò cubitus exten-
ditur, posterior sinus posteriorem ulnæ processum excipit. Sunt enim hi sinus extremæ flex-
ionis ac extensionis termini, tanta prouidentia facti, ut cubitum in acutissimū angulum flecti
finant, & uis ultra rectam lineam eundem extendi permittant, quod scilicet nulla prorsus in an-
gulum extensione, sicuti sanè flexione, indigeamus. Quia uerò præsentis sinus in cubiti moti-
bus ueluti bases & obstacula sunt, quæ ulnam non ultro ferri sinunt, Hippocrates eos *Βαδύ-
δας* nuncupauit, cui etiam humeri orbita à quadā cardinum imagine *γυμνασθῆς* appellatur.
Cæterum istorum sinuum usum tunc demum accuratè intelligemus, quum & ulnæ descri-
ptionem sequenti Capite absoluerimus. in præsentia autem inferior humeri pars adhuc est de-
scribenda. Ad externum itaq; humeri orbitæ latus, ² rotundum & oblongum quodammodo
habetur caput, quod similiter atq; orbita, cartilagine incrustatum & læue, radij cum humero
articulationi subseruit, & in radij superiorem ³ sinum subintrat, radiusq; (ut aliàs fufius ex-
quar) ad id caput in pronom supinumq; mouetur. Deinde capitis longitudo, quam à superio-
ri ipsius parte ad inferiorem secundum humeri longitudinem metior, in causa etiam est, quod
in cubiti flexione ac extensione, caput id à radij sinu (qui rotundus, non autem oblongus est)
haud elabatur aberret uē. atque hac etiam occasione tota capitis pars cartilagine obducta,
anteriorem humeri sedem spectat, nihil prorsus in posteriora erectum, quod in nulla cubiti
extensione radius posteriorem humeri sedem adeat. Veruntamen ad externum huius capitis
latus, humerus insigniter protuberat, montis rupis uē imaginem ostendens, in hoc paratam,
ut quamplurimi musculi hinc opportunè principium ducant. ⁴ Ab hac enim humeri sede, &
acuta linea quæ ab hoc tubere sursum aliquouſque secundum externum humeri latus conscen-
dit, sex enascuntur musculi, quorum ¹ primus is censerì posset, qui cæteris est latior, quiq; inter
radius mouentes facillè est longissimus, radiūq; in supinum ducit. ² Secundus sub illo exo-
ritur, qui bicorni tendine brachiale extendit. ³ Tertius is est, cuius ope index, medius & anula-
ris extenduntur. ⁴ Quartus, quem præcipuum parui digiti extensionis autorem ponemus.
⁵ Quintus, qui ulnæ exporrectus, extensionis quoque brachialis opifex est. ⁶ Sextus, alter ra-
dium in supinum agentium numerabitur, cuius etiam portiuacula ab illo humeri tuberculo
feriatim ac in fima ex parte educitur. Porro tuber istud quoties musculorum, neruorum, ue-
narum, arteriarumq; hanc sedem perreptantium mentio incidet, perpetuò externum humeri
tuber seu tuberculum uocabimus. est enim, uti diximus, musculorum producendorum gra-
tia paratum, ac in posteriori ipsius sede iuxta ⁷ externum latus orbitæ humeri ⁸ sinum exigit,
quo ¹ quartus brachium aduentum neruius uehitur. Sed ut externum hoc humeri latus
protuberat, ita quoque & internum latus musculorum quoq; & neruorum ratione ² insignem
acutumq; processum seu tuberculum adipiscitur, nullius articulationis gratia, quemadmodum
externum, cui radius articuletur, promittens. Ad ³ internum itaq; latus orbitæ humeri proces-
sus educitur, ex cuius apice, qui utcunque amplius est, ⁴ musculus enascitur, qui lato tendine cu-
tem internam summæ manus adit. deinde ⁵ duo brachialis flexus autores, insuper ex infima
processus huius (quem semper internum humeri tuberculum nuncupabimus) sede portio
eius ⁶ musculi oriuntur, qui inter radius in pronom mouentes, superior habetur. postremò &
quorundam digitos flectentium ⁷ musculorum obscura hinc pendet principij portio. Neque
etiam

q. 1. 2. fig. P.

r. 1. fig. N.
2. fig. O.s. 1. figur.
24. cap. C.
D. E.t. 1. figur. N.
2. fig. O.

x. 1. figur. P.

7. 9. fig. ca.
24. O.x. 2. figur. P.
uerfus x. 2.
2. figur. O.
quo linea
notatur.
a. 12. musc.
tab. o.
b. ut tab. A.
c. 9. tab. z.
d. 9. tab. o.
e. 9. tab. A.
f. ut tab. m.g. 2. figur. M.
h. 2. fig. R.
i. 2. 3. 1. cap.
u. lib. 4. o.
k. 1. 2. fig. S.
l. 1. 2. fig. L.
m. 3. m. j. u.
tab. n.
n. 3. tab. A.
o. 7. tab. Q.
p. 5. tabul.
q. de in 6. 14.
z.

etiam tuberculum id musculis producendis duntaxat famulatur, uerum etiam duobus cubi-
tum adeuntibus nervis idoneam efformat sedem, ipsisq; propugnaculi loco censendum esse. In

figur. T
fig. cap.
ib. 4. 7.
fig. V.
fig. cap.
ib. 4. 8.
fig. 4. 8.
hic inter-
rum si-
nti arti-
culum.

anteriori enim ipsius sede iuxta humeri orbitam, ^a sinum leuiter exculptum ostendit, quo ^b ter-
tius brachium petentium nervus dirigitur. In posteriori autem ipsius sede, ^c alio sinu, ^d quin-
tum brachij neruum deducit. Porro utrunque internum humeri tuberculum grande sit, & in
nobis tactu promptè deprehendatur, obserueturq; non tamen ob id Galeno credendū est, qui
id externo grandius esse prodidit, quum externum multo grandius interiori sit, nam quòd ta-
ctui non ita atque internum sese offert, non ipsius quantitas in causa est, uerum radius, cui id
articulatur, quiq; quò minus tactu id dijudicari possit, prohibet. In canibus autem, equis, ouib-
us, & id genus animantibus parum admodum ab hac constructione hæc humeri tubera dif-
ferunt. quanquam externum humeri caput radio articulatū, tanto minus ab externo humeri
orbitæ latere distinguitur, quanto illis radius cum ulna magis connatus, connexusq; est, quā
hominibus quibus admodum manifestò radius in prouum supinumq; agitur, & cum ulnā la-
xè articulat. Cæterum non ambigo, hīc Aristotelis sectatores, eosq; qui de animalium mo-
tu quicquam ipsius suffragio, tum aliās sapius, tum maxime in libro de Communi animalium
gressu repetito, freti prodiderunt, ē quorum numero Galenus in tertio de Partium usu est,
& Plinius, & cum plerisq; alijs noster Erasmus Roterodamus in suo de talorum lusu parum
anatomico Dialogo, non mediocriter admiraturos, quod adeò exiguum inter homines &
quadrupeda in hac humeri sede, seu humeri cum cubito articulo differentiam statuam: quum
interim, ut reliqua mittam, Aristoteles, & quotquot illum sequuntur, diuersum flexum in no-
bis & quadrupedibus enarrent, quum nos antroisum, illa autem retrorsum hanc flexionem
moliri docent, quod nō solum fallum est, uerumetia Aristoteles uno osse quadrupeda priuare,
ipso nimirum humero, arbitratus illic cubiti cum humero articulum in illis esse, ubi cubitus
brachiali iungitur, quem articulum illa animalia nobiscum habent communem, ac ipsa parem
nobiscum flexionem moliantur, ut etiam in cubiti ad humerum articulo. At illorum anima-
lium humerus, quemadmodum & femur eorundem, & auium, pariter Aristotelem latuit, for-
tè quòd in corporis trunco in illis aliter atque in nobis occultetur. Porro hæc aliās fortassis
diffusius prosequuturi, nunc ad reliquas humeri partes redimus, quæ secundum longitudi-
nem teretes quodammodo sunt, uerum posteriori sede magis quā anteriori ampliores &
depressæ. Anterioris enim sedis ^e medium, quodammodo secundum longitudinem protuber-
rat, & ^f utrinque hæc anterior sedes compressa uidetur, latera autem humeri magis, ut & an-
terioris sedis medium, protuberare quā deprimi conspiciuntur. Atque hæc omnia accum-
bentium musculorum ratione, qui, ubi eorum naturam habueris perspectam, os suo uoto ele-
ganter compressisse tibi uidebuntur. Ex abundanti autem, in posteriori humeri sede iuxta
ipsius longitudinis medium, ^g quædam apparet compressio, ad quam ^h neruus manum adeun-
tium quartus ab interno brachij latere per posteriora, in externum latus oblique deorsum re-
pit. Quomodo autem sedes humeri anteriores quidem & exteriores gibbæ, posteriores uerò
atque interiores simæ Galeno in libro de Ossibus uisæ fuerint, & cur in secundo libro de Par-
tium usu humerum exterius gibbum esse, interius autem sinum prodiderit, nō satis assequor.
Nam nisi humerum statuerimus rectum esse, gibbus censebitur ⁱ anteriori superiori q; parte,
sinus uerò ^j posteriori ac superiori: rursum ^k anteriori inferiori q; sinus, ^l posteriori & inferiori
gibbus. Deinde, nisi fallor, interius, & potissimum ad inferiora, gibbus, exterius uero sinus. At
que hanc formam musculi potissimum inducunt, ^m cubiti flexionis & extensionis opifices, quam-
uis interim minor humeri sit obliquitas, quā quæ in diffusionem uocari debeat. Asperitas
autem quæ in anteriori humeri sede uersus exteriora & supra medium ipsius longitudinis con-
sistit, in hoc parata est, ut ualidior musculorum brachium mouentium hīc succederet insertio,
& ⁿ posterior cubitum flectentium musculus hinc idoneum educeret principium. Atque hæc
asperitas tanta est, ut in admodum senibus hinc insignis processus enasci conspiciatur, im-
mis ad ^o musculi brachium attollentis insertionem paratus. Præter hanc asperitatem, ^p alia oc-
currit iuxta sinum, quo externum musculi caput uehitur, qui cubitum flectentiū anterior est
cuius interioris capitis ^q carnosa pars, huic asperitati adnasci docebitur. Foramina notatu di-
gna in humero nulla occurrunt, præter pauca iuxta sinuum & capitum supercilia, in hoc fora-
ta, ut hinc ligamenta ualidius educerentur, aut eadem hīc implantarentur. Sunt etiam nonnul-
la, sed rara foramina, in humeri longitudine conspicua, & uenis admittendis potissimum in
interno ipsius latere (quā maxima uasorum fertur series) cæcata, atque in amplum
sinum medullæ afferuandæ gratia, & ossis læuitatis
occasione paratum, pertinentia,

Tum alibi, ut
etiam libro de
Ossib. Ca. 16.

Aristoteles
& quampluri-
um aliorum
lapis.

Medetum
humeri parti-
um description

figur. 4.

figur. 4. c.

figur. Y.
ib. 4. 9.

figur. d.

figur. X.

figur. b.

figur. 2.

figur. 4. e.

figur. 4. f.

figur. 4. g.

figur. 4. h.

figur. 4. i.

figur. 4. j.

figur. 4. k.

figur. 4. l.

figur. 4. m.

figur. 4. n.

figur. 4. o.

figur. 4. p.

figur. 4. q.

PRIMA VI-
 GESIMIQVARTI
 CAPITIS FIGVRA.



PRÆSENS figura
 sinistri cubiti duo exprimit ossa, an-
 teriori facie delineata. Quod uerò in
 hac, uti & in subsequētibz fere bu-
 ius Capitis omnibus figuris, sinistri
 lateris ossa sint obuia, quum tamen ali-
 oquin quodammodo semper dextra po-
 tius, quàm sinistra explanentur, fortui-
 to & casu accidit, quòd in lignis seu
 formis hic pro sinistris dextra depin-
 xerimus. Quamuis interim in ossibus,
 dextrumne an sinistrum propona-
 tur, nihil intersit.

SECVN- TER- QVAR- QVIN- SEX-
 DA. TIA. TA. TA. TA.



SEPTIMA. OCTAVA. NONA. DECIMA. VNDE-
CIMA.

QVID DECEM FIGVRÆ QVAS SERIATIM PRIMÆ
huius Capitis figuræ subieciimus, denotent, ac omnium characterum
quæ undecim figuris inscribuntur, Index.

SECVND *A* uigefimi quarti Capitis figura, utrumque cubiti os, radius nimirum & ulna, exteriori facie proponitur. Tertia, solus radius interna sede. quarta autem radius externa sede delineatur. Quinta internam ulnæ sedem, sexta uerò externam exprimit. Septima dextri radij inferiorem ostendit portionem, cui brachiale inarticulatur: atque hanc partem ueluti ex inferiori, seu aliâ ulnam spectante facie, ita delineauimus, ut sinus in conspicuo sit, quo ulnæ tuberculum caput ue hic iuxta brachiale excipitur. Octaua figura, ut et tres ipsam subsequentes, & sex priores, ad sinistrum cubitum pertinens, inferiorem radij portionem exteriori facie sic delineatam continet, ut sinus oculis pateat, cui brachiale inarticulatur. Nona superior portionem radij portunculam indicat, in qua sinus obseruatur, quem externum humeri caput subintrat. Decima inferiorem ulnæ portunculam exhibet, partem quæ brachiale spectat ostendens. Undecima superiorem ulnæ partem expressam offert, in qua sinus tuberaq; et processus occurrunt, quibus humeri orbita seu rotula adaptatur.

A, B 1,2 Interuallum his characteribus inclusum, Cubitus uocatur, ac *A* superiorem ipsius notat partem, quæ humero coarctatur: B uerò inferiorem, quæ brachiale spectat. Si quæ interim huius sedis horumq; osium nomina desideras, ea ex præsentis libri calce non inopportune petes.

C 1,5, 11 Anterior processus ulnæ, humeri sinum subiens, in elatioris humeri rotulæ sedis anteriori parte celatum. Et *C* quidem in prima figura internam processus notat sedem cartilagine incrustatam, in quinta uerò & undecima externam sedem indicat, asperam & inæqualem.

D 1,2, 5,11 Posterior ulnæ processus sinum intrans, in humeri posteriori sede ad elatiorem ipsius rotulæ regionem exculptum. Ac *D* in prima quidem, & secunda, & quinta internam processus sedem indicat, in undecima autem externam seu posteriorem.

E, F, G, H, I, K 1,2,5 Ulnæ sinus humeri rotulam excipiens. Hunc sinum undecima figura exactius ita notat. *F* & *F* tuber quod secundū sinus huius longitudinem fertur. *G* et *G* latus tuberis internum. *H* & *H* latus tuberis, seu, si mauis, sinus ulnæ, externum. *I* & *K* sinus huius sedes, quæ in suis lateribus infima ipsius parte à læui circumferentia nonnihil intermittitur, ligamentorumq; producendorum gratia aliquantulum asper & modicè foratus cernitur.

L 1,5,11 Processuli magnaq; asperitas in radice anterioris ulnæ processus *C* insigniti conspicua, & quorundam musculorum exortui & insertioni aptam sedem parans.

M 1,2, 3,4,9 Ceruix seu collum radij.

N 1,2, 3,4,9 Radij capitulum, cui sinus insculpitur, quem externum humeri caput ingreditur. Sinum *O*. hunc *O* in nona figura indicat.

P 1,2, 5,6,10 Ulnæ ceruix.

Q in iisdem figuris, ulnæ appendix notatur.

R 1,2, 5,6,10 Ulnæ appendicis processus, quem stylo scriptorio comparamus.

S 10 Sinus appendicis ulnæ, cui cartilago quædam adnectitur, seu potius innascitur, *T* notāda, atq; à radij sinu, quo is brachiale continet, pronata.

T 1,2, 3,4,7,8 Cartilago cuius iam meminimus, quæ ulnæ appendicis maximā portionem à brachiali dirimit, ac *T* quidem in prima & octaua cartilaginis sedem indicat, quæ primum à radij appen-
K dicis

dicis sinu x, y & z indicandum pronascitur. In secunda uero partem notat, qua cartilago radij appendici adnascitur. In tertia, cartilaginis sedes indicatur, brachiale respiciens. In quarta cartilaginis sedes ulnae incumbens.

V 2, 6, 10 Sinus in ulnae appendice & ossis ulnae cui appendix adnascitur, sede in hoc paratus, ut alterius brachiale extendentium musculi tendinem deducat.

X, Y, Z. Hi tres characteres in sexta, & X ac Z in secunda triangulum circumscribunt, qui in ulnae excarnis gibbus est. Verum Z priuatim trianguli uerticem notat.

a, a 1, 2, 6 Prima protuberans ulnae linea.

b, b 1, 2, 5 Secunda protuberans ulnae linea. Verum β priuatim in prima & quinta figuris huius lineae secundum β dem insinuat, oblique secundum ceruicem ulnae ductam.

c, c 1, 2, 5 Tertia protuberans ulnae linea.

d 1, 6 Vlnae latus prima linea & secunda circumscriptum.

e 2, 6 Vlnae latus prima & tertia linea circumscriptum.

f 1, 5 Latus ulnae inter secundam lineam & tertiam consistens.

g, g 2, 6 Linea lateri illi peculiaris, quod prima linea tertiaque continetur.

h, i 1 Duo hi characteres sedem utranque notant, qua radius ulnae coarctatur. ac b quidem sedes indicatur superior, & humero proxima. i uero inferior, & brachiali contermina.

k, k 1 Tota hac sede (eo quod radius arcuatim obliquatur) duo cubiti ossa inuicem debiscunt.

l 5, 11 Sinus ulnae incisus, in quo radij capitulum uoluitur.

m 3, 4, 9 Radij capituli sedes, quae ulnae sinui, insignito insidet.

n 1, 3 Inferioris radij appendicis interior sedes notatur: in reliquis autem figuris, secunda nimirum, quarta, septima & octaua exterior sedes ostenditur, alij characteribus ornata.

o 7 Sinus in radij exculptus appendice, in quo ulnae appendix excipitur.

p 5, 10 Protuberans ulnae appendicis pars, radij sinum o indicatum ingrediens.

q 1, 2, 3, 4 9 Amplius abruptusque radij processus, cui etiam musculi cubiti flexorii anterioris inscitur.

r 1, 2, 3, 4 4 Acuta radij linea ipsius inferna sede, qua secundum cubiti longitudinem ulnae respicit, extuberans.

s 1, 3 Internum lineae r prius insignitae latus. t, t 2, 4 Externum lineae r indicatae latus.

u 2, 4 Hac sede radius asper est, ut duo, ex quatuor ipsi peculiaribus musculis, hic ualidius infereretur.

x, y, z 1, 8 Sinus in radij appendice, articulando brachiali incisus. Et z quidem notat tuberculum sinus nonnihil prominens, & sinum ipsum ueluti geminum constituens, cuius partes x & y indicari possunt.

α 1, 3, 4 6, 7, 8 Radij appendicis maxime prominens portio, quae sinum cui brachiale articulatur superiori aut interiori sede adauget, & procerius quam appendicis ulnae processus stylum referens, ac R insignitus, protuberans.

γ d, e, f, g His characteribus in secunda & quarta figuris gibba externaque inferioris radij appendicis regio cum ipsa ossis sede cui appendix coalescit, notatur. & singuli characteres, huius sedis priuatim sinum indicant. γ quidem primum sinum, δ secundum, ε & ζ tertium, η quartum. In secunda θ autem figura θ sinum indicat radio ulnaeque communem.

Cubitus.



Vlna.
Radius.

Vlna ad humeri articulationem
& ipsius
hic processui
& sinui descriptio.

NIVERSA ^a pars inter brachium & brachiale consistens, Graecis ^b μήχους, Latinis uero Cubitus appellatur. haec duobus constat ossibus inuicem incumben-^ctibus & coarticulatis, quorum ^d inferius, quod & longius est, μήχους quoque & Cubitus nuncupatur. Ne autem homonymia sermoni aliquid obscuritatis conciliet, quoties integræ duobus illis ossibus extructae partis cum ligamentis, uenis, arterijs, neruis, membranis, & cute, mentio incidet, Cubiti uoce utendum duximus, inferius quidem os ulnam, superius uero Radium (uti hactenus fecimus) toto sermonis contextu nuncupaturi. Duo haec ossa longa sunt, & omni propemodum ex parte inter se uaria. Primum itaque inferiori humeri sedi diuersa prorsus articuli specie coarctatur. Vlna enim ad humeri orbitam rotulam uel aptis in hoc exculpta sinibus, & idoneis donata processibus articulatur. In superiori nanque ipsius sede, qua admodum crassa solidaque, & appendice non minus quam humeri inferior sedes, destituta est, ^e duos insignes adipiscitur processus, quorum alter altero prior anterior uel habetur. ac anterior quidem is est, qui ^f sinum in anteriori humeri sede ad elatiorē rotulae regionem exculptum spectat, suisque tuberculis illi sinui ad amussim congruit. est enim processus hic amplius

d 1, 2 fl. A.
B. integra-
iū fl. T. V.
b tota fig. 5
& 6. aut
2 si integra-
rum Y.
c tota 3, 4.
fig. aut 2 si
integra-
rum X.
d 1, 2 fl. C.
23 K, L, M.
e 1, 2, 5, 11.
fig. C ante-
rior, D po-
sterior.
f 1 fig. C ap.
23 N.
plus

plus, & obtuso angulo similis, & perquam durus, ac solidus. Posterior autem processus anterioris formæ quodammodo respondet, ^{fig. 44p.} sinum subintrans, qui in posteriori illius sede ad elatorem rotulæ regionem cælatuſ cernitur, cum tamen sinus iste anteriori sinu profundior ampliorq; multo sit, processus etiam posterior anteriori crassior ampliorq; meritò euasit, adhuc magis obfusi anguli speciem referens. Processum hunc Athenienses quidem *ἀλὲν γέναν*, ²³⁰ Dōres autem *ῥύβινον*, Hippocrates uerò *ἄλωνα*, Galenus porro iam *ἀλὲν γέναν*, iam *ἄγκωνά* uocauerunt. Quæ uoces magno eorum qui latine legunt incommodo ab interpretibus cōfunduntur, non hæc solum unica cubiti uoce crebrò uertentibus, sed & ulnam, & totam partem inter brachium ac brachiale repositam, & humeri cum ulna ac radio articulū, & internam eiusdem articuli sedem, ipsiusq; flexum: quum interim plurimum intersit, quid singulis uocibus ab illo quem uertunt autore, intellectum fuerit. Quamobrem ne rem alioquin plus satis arduam, obſcuriorem reddam, id lubens à lectore cōtenderim, ut perpetuò eadem uoce toto contextu me uti patenter ferat, neque haud scio cuius copię gratiā, aut obſcuri nominis proprii occasione, omnia turbari uelit. uocentur igitur nobis hi ulnæ processus, ille quidem anterior, hic uerò posterior, quem gibberum plerique & gibbum appellarunt: non expendentes inde ipsos humeri ^{2 fig. 23} tubercula quæ ad rotulæ ipsius latera habentur, & deinde ^{4p. P. S.} inferiora femoris capita, aliosq; nonnullos ossium processus, simpliciter se gibberos nuncupasse. ^{2 fi. 44.} In horum ulnæ processuum medio, quā se inuicem è regione spectant, grandis exculpitur sinus humeri rotulam excipiens, illiq; omnino respondens. Primum enim instar semicirculi, aut paulo etiam profundius quā semicirculus, cælatuſ: nostriq; C, ac Græcorum C imaginī accedit, unde etiam ab eius characteris forma Græcorum ueteres hunc sinum *συνουδόν* appellarūt. Sinus iste non obiter tantū C modo exculpiē, uerū ut ad amussim humeri rotulæ respoderet, in ipsius medio ^{30 E. F.} tubere obtuso amploq; protuberat, quod secundū sinus illius longitudinem fertur, & utrinq; ^{325 fig.} ad ^{3 D. dem} latera ita comprimitur sinuaturq;, ut funi chordæ uel quæ ad trochleæ rotulam uoluitur, possit cōferri. Quemadmodū enim teres chorda, rotulæ sinui (ut sic dicam) pariter secundū ^{fig. F. F.} concauum tereti inuoluitur, ita quoq; hoc ulnæ sinus tuber sinui rotulæ conuenit. & depressa ^{eadem fi.} sinuataq; rursus tuberis latera, rotulæ sinus extuberantibus æquatur lateribus. Quod ut fiat exactius, ulnæ sinus internum latus, aliū ipso externo cauatur: quò uidelicet internū rotulæ latus, multo procerius externo promineat, extuberetq;. Vniuersus hic ulnæ sinus laevis est, & cartilagine incrustatus, & unā cum suis processibus rotulæ ita coaptatus, ut si uel minimū quid, aut magis extuberare, aut profundius insculpi, aut ampliari, aut stringi illum finxeris, ilico uniuersam læseris articulationem, in hoc duntaxat affabrè constructam, ut eius beneficio cubitus flectatur, & extendatur, circa luxationis periculum. ad quod nō solum spectatu iucundissimus ille qui mutuo ingressu perficitur ossium contextus opitulatur, uerum etiam ligamentorum articulum stringentiū robur. Vt enim ualida articulum ambirent ligamenta, processuum ^{fig. C.} sedes ^{D.} sinum non respiciens, aspera inæqualisq; est. Quamquam denuò non ligamentorum tantum, sed & musculorum nomine processus asperi cernantur. Posterior enim posterioris processus sedes admodum inæqualiter protuberat, quodammodoq; sinuata conspicitur, ut cubitus extendentium musculorū insertionem fortius exciperet. Ita & anterior prioris cubiti processus pars, in hoc aspera est, ut ualidior ^{13 musc.} musculi cubitum flectentium posterioris insertio efficere-^{1. b. c. d.} tur, & musculi ^{8 musc. cu.} secundos ac ^{tab. 1.} tertios digitorū articulos flectentes, hinc promptius originem ducerent. Neque solum hæc anterior prioris processus regio exasperatur, uerum & iuxta eius processus radicem eorum musculorū nomine asperis ^{tab. 9.} quibusdam tuberculis Natura ulnam decorauit. Ad hæc, ut ualidioribus ligamentis hic articulus amplexaretur, in infima ulnæ sinus C literam referentis sede, utrinque ad latera sinulus instar anguli cuiusdam imprimi cernitur, & ipse sinus C similis à sua circumferentia inibi desinit, asperq; redditur. non alia sanè occasione, quā ut ex hac ulnæ parte foraminulis non peruijs obſita, ligamentorum fortium penderet exortus. Atque in hunc modum ulna humero articulatur, radius autem quā humero iungitur, ut cunque tenuis est, & ex ^{14. 9 fi.} oblonga tenuiq; ceruice in amplum orbiculatūq; porrigitur ^{gur. M.} capitulum, quod ea parte, qua humerum spectat, ^{15 dem fi.} sinum exigit rotundum, & non amplius ^{gur. N.} cauum, quem humeri ^{9 fig. O.} caput subintrat. Ad hoc caput radius in prouum supinumq; agitur, & interim quo minus cubitus flectatur, extendaturq; radij cum humero articulus, nequaquam obſtat, quinimò radij sinus ad id humeri caput quoq; inflectitur & extenditur, ad quod præcipue iuat humeri capitis lōgitudo, amplaq; ipsius sedes cartilagine incrustata, quæ nunquam à radij sinu in cubiti motibus abscedit. adeo ut non oscitanter Naturæ prætereundum sit artificium, quæ ita humeri cum radio articulum adaptauit, ut & radius unā cum ulna flecti & reflecti possit, & is interim eleganter in prouum supinumq; quiescente ad humerum ulna, ducatur.

Ulna ad brachiale ductus, et inferioris ipsius sedes historia.

Qui ulna fecit dum ipsius longitudo hanc.

Cæterum ulna à suo cum humero articulo deorsum^a rectà quodammodo uersus brachiale fertur, sensim gracilescens, tenuiorq; tantisper facta dum ad brachiale usq; pertingat, illic enim ex^b tenui longaq; ceruice rursus nonnihil aucta, appendice donatur instar capituli cuiusdam rotunda, sed uaria interim. Hæc nanque inferiori ipsius parte^c processum obtinet, quem, quia in acutum procedit, Græci dissectores à scriptorij styli imagine *ὑποστυλίου* & *υποστυλίου* appellat: in hoc formatum, ut sinum adaugeat, quo brachiale ad cubitum articulari docebimus: usq; ab ipso^d ligamen articulum cōtinens pronascatur. Verum huius processus usum paulo pōst, uel Galeni huic processui nimum tribuentis nomine, explicatius aggrediar. Inferior igitur ulnæ appendicis sedes brachiale respiciens, ad internū latas acuti illius processus inæqualem quandam nanciscitur^e sinum, in quem^f cartilago firmatur, quam à radio pronatam magna ex parte ita inter brachiale & ulnam audies repositam, ut neq; brachiali neq; ulnæ adnascatur, eiusq; generis cartilago sit, quam priuatim in maxillæ inferioris ad superiorem articulis, & in clauicularum cum conterminis ossibus nexu, contineri dudum regulimus. Porro si sinum illum appendicis ulnæ exceperis, tota sedes brachiale spectans, ad eum modum cartilagine incrustatur, quo sinus capitæ articulorum obduci læuigariq; solent. Præter hunc sinum appendix ulnæ, in externa ipsius sede^g sinum sibi insculptum gerit, qui oblongus, & (ut sic dicam) teres est, tendini paratus, eius musculi qui postbrachiali ante paruum digitum insertus, brachialis extensionis autor habetur. Verum præter hanc appendicem, ulnæ secundum ipsius longitudinem forma & impressiones quædam, & ipsius instar linearum tubera, adhuc expendenda ueniunt: Primum itaque humilior ulnæ sedes ad posterioris ipsius iuxta humerum processus radicem, quæ cubito innititur, aliquoulsq; gibba est, sua amplitudine triangulum referens, qui excarnis & musculis intectus, mox adempta cute conspicitur, duntaxat neruofam tenuitatem^h musculorum excipiens, quorum beneficio cubitus extenditur. Huius trianguliⁱ uertex deorsum per ulnæ longitudinem exporrigitur, & lineæ modo ob hoc maxime protuberat, quod huius lineæ latera à musculis duobus comprimentur, ipsa uel ulna musculis illis cedat, quorum^j alter exteriori lineæ lateri exporrigitur, postbrachiali ante paruum digitum insertus, ac brachiale extendens. Alter, qui interno lateri exporrigitur, & cui ulnæ os impenitus cedit, brachiali ante paruum digitum insertus, idq; flectit. Hæc ita protuberans lineæ, secundum inferiorem ulnæ sedem ultra medium ipsius longitudinis fertur: & præter hanc alia adhuc duæ cernuntur, quæ cum nuper dicta sic ulnam efformat, ut ipsa ab humero uersus brachiale procedens non teres, sed triangularis uideatur. Secunda igitur protuberans lineæ ab interiori latere radicis anterioris processus ulnæ rectà deducitur, quæ commune^k latas cum prima lineæ constituit, quod ab illo musculo impressum est, quem modò brachiale flectere diximus. Aliud autem latas cum tertia lineæ efformat, quæ trium linearum acutissima asperissimaq; est, & ab externo latere radicis ulnæ processus anterioris longissimè procedit, atq; in hoc producitur prominet uel, ut ab ipsa ualidum pronasceretur^l ligamentū, quod radium ulnæ secundum cubiti longitudinem robustioris membranæ ritu connectit. Porro^m latas inter secundam lineam & tertiam repositum, musculorum gratia comprimitur, qui internam cubiti sedem occupat, quibusq; hic ab ulna & radio apta sedes paratur. Horum præcipuus est, quem tertium quatuor digitorum articulum flectere audies. Verum quia illi musculi in ipsorum quoq; per ulnam progressu etiam sui ortus portionem assument, hoc tertium latas inter secundam & tertiam consistens lineas magis asperum occurrit, quàm latas inter secundam lineam & primam conspicuum, à quo nullus pronasceitur musculus, nisi iuxta ulnæ cum humero articulum, ubiⁿ is principium ducit, qui radium in prouum ducentium superior est. Latas tertia & prima lineis circumscriptum, reliquis duobus minus est cōpressum, & priuatim^o lineam obtusam, sed longam & modicè prominentem, ac uiciniū tertiæ lineæ quàm primæ deductam adipsitur. Hanc Natura^p trium musculorum gratia produxit, qui ab ipsa triplici principio originem ducunt. Ac primum quidem eius musculi est, qui inter radium in supinum ducentium breuior habebitur, secundū autem & tertium pollicis ac indicis famulari motibus, in secundo libro docebimus: quem eo leuiori negotio intelliges, quo consideratus ea quæ modò narramus, in ossibus spectaueris. Sunt enim hæc non minus uisus ac cognitu iucunda, quàm cerebri & aliarum, quas hodie solum miramur, partium sectio, ut interim de summo in artis nostræ operibus usu nihil dicā, dum ad has lineas scopum figentes, fractum ac luxatum os rite nos reposuisse certissimò cognoscimus. Ad hunc itaq; modum ulna multum etiam ultra mediū ipsius longitudinis se habet. Vbi uero brachiali propinquius accedit, teres omnino esset, nisi secūda lineæ insigniū inibi^q protuberaret, ac oblique deorsum protensa sedem adaptaret^r quadrangularem musculo, qui radij in prouum motus opifex hinc principium sumere docebitur. Porro si quid de ulna adhuc dicendū super sit, id iam unā

in

d 1, 2 fig. ab
Auerius B.
b 1, 2, 3, 4, 5, 6
10 fig. P.
c eisdem fig.
d eisdem fig.
gur. R.
e 12 musculi
tab.
f 9 fig. Si.
B 1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8 fig. T.
h in margi-
ne cap. 10.
i 4 fig. ca.
22 R. S.
k 2, 10 fig.
V.
l 9 musculi
tab. 2.
m 6 fig. 2.
X, Z. 9
musculi. 12. V.
neadem 12.
S. T.
o 2, 6 fig. d.
Z per 4.
ut 1, 2, 3, 4
fig. 4, 4.
p 9 musculi
tab. 1.
q eadem 12
bul. 2.
r 1, 2, 3 fig.
b, b.
s 1, 6 fig. d.
t 2, 6 fig. e.
u 1, 2, 3 fig.
c, c.
x 7 musculi
tab. V.
y 1, 3 fig. f.
z 6 musculi
tab. 2.
a 7 musculi
tab. Q.
b 2, 6 fig. 4.
g. g.
c 10 musculi
tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

in radij enarratione persequar, qui obliquus est, quatenus ulna recta. Radius nanque¹ suprà
 infraque² ulnæ committitur, in³ medio autem ac per reliquam longitudinem ita arcuatim obli-
 quatur, ut admodum ab ulna dehiscat, quod partim motus ratione perficitur, ut obliquo scilicet
 ductu radius ulna suffultus, in prouum supinumque⁴ promptè ageretur: partim, quò apta se-
 des & fundamentum musculis cōstitueretur, quos necessariò internam externamque⁵ cubiti sedem
 occupare oportuit. Quanquam magis obliqui sui motus occasione, quàm musculorum gra-
 tia radium obliquari, plurimumque⁶ in medio ductu duo cubiti ossa inuicem abscedere, illa nos
 doceant animalia, quibus neque radius, neque radij beneficio manus extrema, in prouum supi-
 numque⁷ ducitur. Equus nanque⁸, ouis, eiusque⁹ generis animalia solidis, aut bifulcis donata ungui-
 bus, tota cubiti longitudine radium ulnæ adeò connatum a stabilitumque¹⁰ obtinent, ut ne tantil-
 lum quidē citra ulnam radius moueatur. In canibus uerò & felibus, & ijs animalibus quibus
 pedes in digitos dirimuntur, radius mouetur quidem, sed tanto obscurius ac difficilius, quanto
 nos manuum motus perfectione obimus. Distat igitur in his quoque¹¹ animalibus radius ab ulna,
 uerum longè minus quàm in homine, neque etiam adeò laxam articulationis speciem in illis, atque
 in homine, est cernere. Articulatur autem radius ulnæ suprà infraque¹², differenti omnino articu-
 lo, suprà enim ulna radium excipit, infra uerò à radio ulna excipitur. Ad externum itaque latus
 anterioris ulnæ iuxta humerum processus, sinus quidam instar quartæ circuli partis cubiti
 sim exculpitur, læuis, & cartilagine incrustatus. Huic sinui¹³ internū latus capitis radij, cui sinus
 insculpitur humeri externum caput excipiens, appositè congruit, ac læue & orbiculatum hic fa-
 ctum, in illo sinu uoluitur. Infra autē iuxta brachiale, ubi radius crassescit, dilaturque¹⁴, & insigni
 appendice donatur, huius appendicis humillimæ sedē¹⁵ sinus insculpitur, illi non ab similibus,
 quem paulo antè in ulnam incisum retulimus. In hunc sinum cartilagine incrustatum superior
 appendicis ulnæ¹⁶ sedes capituli modo protuberans, cartilagineque¹⁷ obducta, reuoluitur: hacque¹⁸ ra-
 tione radius utriusque¹⁹ articuli beneficio tantummodo in prouum supinumque²⁰ agitur. Non pro-
 cul à superiori articulo, ubi radij²¹ ceruix consistit, radius²² asperum abruptumque²³ educit proces-
 sum, qui internam cubiti sedem respicit, & insertioni anterioris cubiti flexcentium musculi
 aptam sedē parat. Rursus reliquo ab humero uersus brachiale ductu, radius non omnino teres
 & læuis est. Verum secundum ipsius longitudinem humiliori sua sede²⁴ acutam & insigniter
 extuberantem producit lineam, quæ tertiam ulnæ lineam respiciens, ligamentū admittit mem-
 branæ ualidissimæ ritu ambo cubiti ossa, quæ inuicem dehiscunt, colligans. Externum huius
 lineæ latus perinde ac²⁵ internum quoque, compressum sinuatumque²⁶ est, ut hoc internam cubiti
 sedem occupantibus musculis, illud uerò ijs qui in externa consistunt, cedat. Porro internum la-
 tus externo asperius est, quòd priuatim²⁷ musculus tertium pollicis os flexens, nō in sinum sui
 exortus portionem ab illo latere sibi asciscat. Deinde superior radij sedes ē directò dictæ nu-
 per lineæ consistens, penè teres est, & iuxta medium suæ longitudinis aliquouisp²⁸ aspera occur-
 rit, ut in hanc duo musculi ualidiorē molirentur insertionem: quorum²⁹ alter radium in supi-
 num agentium breuior est, alter uerò radium in prouum ducentium superior, cuius potissi-
 mum occasione asperitas illa cælatur, quòd ipse nerueam potius quàm carneam insertionē effi-
 ciat, longiusque³⁰ in osse producat. In radij sede brachiali contermina, quam crassescere dila-
 tarique³¹ dictum est, pleraque³² examussum inquirenda ueniunt. Primū enim hanc partem ita auge-
 ri oportuit, ut tandē apta constitueretur sedes, cui³³ brachiale articulari queat, necessum etenim
 erat, brachialis cum cubito articulū, in hominibus paulò minus toto ad radicem referri: si mo-
 dō quiescente ad humerum ulna, summa manus radij beneficio, & secundariò in prouum supi-
 numque³⁴ agi debuit. Si nanque³⁵ in radio & ulna sinus, cui brachiale articularetur, æqualis portio
 exculperetur, & ipse interim sinus superiori brachialis sedem imitatus necessariò tranuersum
 oblongus esse deberet, impossibile profectò fuisset & radium & summam manum in prouum
 supinum uel ferri, ulna interim ad humerū quiescente, ac ueluti huius motus basi ac fulcimento.
 Pars enim brachialis quæ ulnæ sinui inferretur, inarticularetur uel, clauī modo obstaret, quo
 minus uel tantillum radius immota ulna moueri posset. Operæ precium igitur fuit, inferiorē
 radij partem adeò crassescere, ut efficiendo sinui, cui brachiale articularetur, apta esset. Verum
 quia tenuis os nimium crassescere nequaquam expediebat, Natura etiam brachialis portio-
 nem ab ulna sustineri uoluit: at ita, ut uix puncto ulna brachiale contingeret, contingit autem
 acuto ipsius processu, quem stylo dissectionum periti assimilant. Ne enim ulna, reliqua sui ap-
 pendicis sede, brachiale citra alterius corporis interuentum contingeret, Natura ab inferiori
 sede³⁶ sinus in radij appendice brachialis gratia exculpti³⁷ cartilaginem deduxit: quæ ulnæ ap-
 pendicem ascendens, illam à brachiali dirimit, itaque articulum hunc aptat, ut ulna brachiale
 quidem sustineat, uerum proximè non contingat, totusque³⁸ sinus (uti sanè oportuit) ad radium

Radij obli-
quitas.Radij ad ul-
nam articula-
tio.Radij secun-
dum: ipsius lon-
gitudinem le-
uitas & aspe-
ritas.Inferioris ra-
dij partis bifo-
ria.Cartilago
brachialis ab
ulna dirimens.

*Libro de Of-
sibus.
Primo de Ad-
minis. diffec-
Secundo de
Vsu part.*

speciet. Atq; hæc sanè tanto uelim inquiri diligentius, quò magis cum Galeni dogmatibus pugnant. non enim lubet in hoc negotio alloqui satis prolixo, palam Galeni loca, à quibus prudens dissentio, subnectere, rationemq; cur aliter sentiam subijcere, quum diligens lector etiam non admonitus, hæc abundè animaduerturus sit. Verum ne nimium Galeni Anatomicorum coryphaei placita, eaq; potissimum quæ à studiosis in publicis sectionibus, ut expendantur requirere soleo, iam præterijisse uidear, in radij ulnæq; Galeni historia portionem & particulam modò assumam, quæ prolixius sæpiusq; ab ipso inculcatur. est autem hæc, acutus ulnæ processus, quem stylo comparamus. Vti itaq; præteream, quòd magnam, & (quantū ex ipsius scriptis assequor) dimidiam sinus cui brachiale inarticulatur portionem, ulnæ ascribit, acuto huic processui priuatum ad brachiale connexum inibi tribuit, ubi ulnæ radijq; historia in libro de Ossibus pertractat. Vbi autem paulo post brachialis ossa recenset, cōnexus speciem exprimit, quando tertium superioris brachialis ossium ordinis os quod paruū digitum spectat, sinuatū esse, atque in illud acutum ulnæ processum ingredi recenser, ac ueluti duos brachialis cum ulna & radio articulos proponit: quorum unum quidem ad radium & ulnam simul refert, alterum uerò ad acutum ulnæ processum. atq; ad hunc quidem nexum pertinere asserit, brachiale in obliquum ducere: ad illum uerò, in rectum, cuius opera summam manum extendimus inflectimusq;. Arbitror autem Galenum per obliquum motum, illum intelligere, quo manus in utrumque latus ducitur, pari nimirum motu, quo digitos inuicem adducimus & reducimus: ita enim obliquum lateralem uel motum aliàs ferè semper Galenus intelligit. Quod si est, quid dici posset absurdius, quàm hunc motum acuti illius processus munere celebrari: quum tantum absit ut quicquam ad illum motum auxiliari queat, ut illum nō secus impediret, quàm si palum bacillum uel aliquem brachialis & cubito simul ad latus sic obligares, ut sedulas matres puellorū sinistrae manus pollicis & cubito pariter baculum alligare uidemus, quando pueros nimium sinistra manu uti cernunt, metuuntq; ne progressu temporis sinistra pro dextra utantur. Porro si Galeni locum in secundo de Partium usu excutere uolueris, inibi illum quoque duplicem articulationis speciem recensere, atque eam quæ acuto fit processui in hoc factam dicere, animaduerturus es, ut manus eius articuli ope in prouum supinumq; & deinde etiam in latus ducatur. Hanc sententiam re ad amulsim perpensa, non minus quàm priorem ueritati repugnare fateberis, idq; tunc potissimum, quando omnem ferè brachialis articulationem, ad radium ob hoc præcipuè referri discas, ut radij motum, qui in supinum & prouum fit, extrema manus secundariò sequeretur: & insuper colliges, illos motus debere impediri, si acutus ille processus ex Galeni sententia brachiali articuletur. Quod (ne longius in re clarissima immorer, ues, bo uesq; liquido ostendunt. nam ipsorum brachialis ad cubitum articulus Galeni descriptionibus quodammodo respōdens, neque in latera, neque in prouum, neque supinum aptè moueri potest. Illis namque animalibus acutus ulnæ appendicis processus oblongus est, & sinum priuatim in brachialis ossibus sibi uendicat, nullaq; cartilago peculiaris ulnam ac brachiale interuenit, præter eam quæ ossibus crustæ modo obducitur, cuiusmodi tamen cartilago in homine spectatur, in quo etiam processus ille non tantū cartilaginis illius altitudinē excedit, quantum superior illius qui in radij appendice sculpsit sinus pars porrigi educiq; cernitur. Eminent autem illa radij pars eadem cum acuto illo processu ratione, ut scilicet sinum efformaret brachiali aptum, hincq; ualidiora articulum continentia producerentur ligamenta. Quum uerò huic radij sinui non unicuique tantum brachialis articuletur os, uerum inter tria brachialis ossa, quæ radio ulnæq; coarctari docebimus, duo ad solum radij sinum referuntur, & tertium, cartilaginem illam à radio peculiariter pronatam & acutum ulnæ appendicis processum, respicit, radij sinus geminus esse apparet, eo quòd sinus modicè inibi protuberat, ubi secundum brachialis os primo committit, illo quod subsequitur Capite dicturi sumus. Ad hunc igitur modum brachiale radio committitur, in quo præterea considerandum uenit, radij partem, cui appendix ipsius coalescit, ipsamq; appendicem interna parte sinuatam & leuiter cauam uideri, cum ut musculo cederent radium in prouum ducentium inferiori, tum ut exactum iter tendinum seriei aptaretur, qui cubito exporrecti digitorum flexui famulantur. Externa autē huius radij sedis pars gibba est, quòd ita (quum extrā ponatur) iniurijs ferendis pertinacior reddatur, ne tamen musculorum cubito exporrectorum tendines summam manum hæc petentes, & gibba illa sede deducti, hinc inde aberrarent implicarenturq;, sinus multi huic sedi insculpuntur, quibus tendines transuersis obducti ligamenti, tanquam per anulos trajecti, in secundo libro describemus. Sunt autē huiusmodi sinus numero quatuor. ac primus quidem amplius est, tendinibus paratus, qui indicem, medium & anularem extendunt. Secundus tendinem transmittit, indicem & medium à pollice in latus abducentem. Tercius quodammodo geminus

*Sinus radij,
deducens locum
cubiti, musculi
ex ipsorum
tendinibus apti.*

*ft. 2. 4. 5. fi.
charac. 3.*

*g. 1. 3. 4. 5. fi.
g. 1. 2. 3. 4. 5. fi.
h. 12. musc.
tab. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.*

nus est, ⁷ bicornem transmittens tendinem alterius musculi brachiale extendentium, unâ cum tendine ⁸ musculi pollicem uersus indicem euertentis, extendentis ue. ⁴ Quartus sinus leuiter admodum exculptus est, uixq; sinus nomen meretur: asper tamen locus est, qui ligamentum transuersim ¹⁰ tribus tendinibus obuolutum educit. quorum unus brachialis ossi pollicem sustinenti inferitur: secundus primo ossi pollicis, tertius autem tertio pollicis ossi. Verum quarti sinus sedes, ligamenti illius gratia non duntaxat aspera est, protuberatq; uerum etiam ut ¹¹ tendo illi ualidius implantetur musculi longissimi radium in supinum ducentis. Et præter hos sinus, etiam in externa articuli, quo radij appendix iuxta brachiale appendici ulnæ articulatursede, ¹² sinus etiam consistit, quo ¹³ musculi tendo uehitur. cuius potissimum beneficio paruus digitus extenditur. atque is sinus & ulnæ & radio communis censetur. Iam de ulna & radio nihil dicendum superest, præterquam quod solida undiq; consistens substantia, illic tantum fungosa, ubi appendices ipsi adnascuntur. intus ¹⁴ sinum exigunt, medulla oppletum, atque in hoc ulnara diuisq; humerum, femur & tibiæ ossa imitantur.


DE BRACHIALI. CAPVT XXV.

PRIMA FIGVRA EARVM

SECVNDÆ.

QVÆ VIGESIMO QVINTO



CAPITI PRÆPONVNTVR.



TERTIA.

QVARTA.

QVINTA.



SEXTA FIGVRA, CUIVS

(VT ET QVINQVE PRÆCEDENTIVM

figurarum) Indicem sequenti pagina subijciemus, unâ earundem characteres explicaturi.

DVÆ

D V AE priores figurae non praesenti tantum subseruiunt Capiti, uerum etiam tribus ordine subsequentibus, quibus summae manus partes etiam explicantur. Vocamus autem summam extremam uel manum, quae Hippocrati ἀρσάκη dicitur: ea nimirum pars quae à cubito ad extremam usque digitorum aciem habetur, quamque in brachiale et postbrachiale ac digitos partimur. Hippocrati enim manus nuncupabatur, quicquid à scapulis ad extremum usque digitorum pertinet: quodque in brachium cubitum et extremam manum subdiuiditur. Prima igitur huius capitis figura, internam ossium summae manus sedem proponit. Secunda uero, eorundem ossium externam faciem appositissime delineatam continet. Quatuor autem figurae has seriatim subsequentes, huic Capiti sunt propriae, ac duntaxat octo brachialis ossa uaria facie exprimunt. Illa namque quae tertio inscribitur, octo brachialis ossium simul in sua sede commissorum internam faciem communistrat. Quarta eadem ossa externa facie delineata continet. Quinta superiorem brachialis ossium partem notat, qua cubito articulantur. Sexta brachialis ossium infernam ostendit sedem, cui primum pollicis os, quatuorque postbrachialis ossa coarctantur. Characterum uero index erit huiusmodi.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Octo his numeri characteribus octo brachialis ossa in omnibus sex praesentibus figuris insignantur, si modo in illa superficie, in qua brachiale se offert, omnia in conspectum ueniant. Atque unumquodque os suo semper characterē indicatur, suumque nomen ita exhibet. Id enim primum uocabimus, quod inscribitur. Secundum uero, quod 2. Sic itaque 1, 2, 3, 4 notant superiorem octo brachialis ossium ordinem, ipsa nimirum quatuor superiora, seu cubito proxima. Verum 5, 6, 7, 8 inferiora indicant ossa, quae postbrachiali sunt contermina.

I, II, III, IIII In prima et secunda figura notantur quatuor postbrachialis ossa, quibus ab inscripto etiam numero nomen imponere nihil prohibet: nisi forte magis libeat illa à digito quem sustinent, aut cui praeposuntur, nuncupare.

A, B, C 1, 2 Tria pollicis ossa, quae ferè et internodia appellamus.

D, E, F 1, 2 Tria indicis ossa, atque eadem ratio in ceteris est digitis.

G 3, 6 Quinti brachialis ossis sinus, sedesque, cui primum pollicis os articulat. atque sinus huius longitudinem transuersum in sexta figura ab a ad b metimur. Internam uero sedem c, externam autem c, d. tem d notat, ac d quidem in quarta figura etiam est conspicuum.

H 3, 4, 6 Sedes sexti brachialis ossis, cui postbrachialis os indicem suffulciens coarctatur. b uero in quinto osse sedem indicat, quam idem quoque postbrachialis os contingit.

K 3, 4, 6 Sedes in septimo brachialis ossis, cui postbrachialis os medium digitum sustinens coarctatur. k. uero in eisdem figuris sedes indicatur, quae idem postbrachialis os, sextum brachialis os contingit.

L 3, 4, 6 Sedes octauae brachialis ossis, cui postbrachialis os anulari praepositum coarctatur.

M 3, 4, 6 Sedes octauae brachialis ossis, cui postbrachialis os paruum digitum sustinens coarticulat.

N 1, 2 Ossiculum accumbens externo lateri articulationis octauae brachialis ossis, ad postbrachiale os, quo paruus digitus sustinetur.

O 2, 3, 6 Processus octauae brachialis ossis, in internam brachialis sedem protuberans.

P 2, 3, 6 Processus quinti brachialis ossis, ex quo transuersum pronascitur ligamentum, quod in octauae ossis processum Onotatum insertionem tentans, tendinibus obducitur, ex cubito internam summae manus sedem ademitibus.

Q 2 Appendix postbrachialis ossis indicem sustententis superior, quae brachiali coarctatur.

R 2 Appendix postbrachialis ossis indicis praepositi inferior, quae capitulum constituit primi indicis ossis sinum subiens.

S 1, 2 Interuallum occurrens inter postbrachialis os indicis praepositum, et id quod medium sustinet. In ceteris autem postbrachialis ossibus eadem appendicum interuallorumque est ratio.

T 1, 2 In prima figura ex duobus sesaminis ossibus internae secundi pollicis articuli sedi praepositis, internum os notatur: in secunda uero figura, externum.

V, V 1 Duo sesamina ossicula, indicis articulo praeposita.

X 1 Vnicum ossiculum sesaminum, aut potius sinapis semini simile, secundo indicis articulo appositum.

Y 1 Vnicum sesaminum ossiculum, tertio pollicis articulo allocatum. In reliquis digitis cum indice eadem est ratio, etiam si secundi et tertij articuli sesaminum ossiculum non appinximus.



L X T R E M A E manus, partem cubito articulatam Græci *καρπός*, nos Celsum imitati Brachiale appellamus. ea octo ossibus duplici ordine distinctis constructa. Quæ in natu gradioribus dura sunt & paruiula, intus parum fungosa, modicaq; medulla appendicum modo oppleta, non autem prorsus medulla expertia, & potissimum quæ horum maiora continentur. Haud parem enim omnia fortuantur magnitudinem, ut nec formam etiam, neq; situm: quum ex omnibus nullū sit, quod alteri omnino respondeat: & singula priuatim aliquid adipiscuntur, quo promptè ab inuicè discerni queant. Porro ut quicq; sint uaria, nihilo minus mutuo tam concinnè adaptantur, ad tantamq; compositionis harmoniam accedunt, ut eorum numerus non admodum inuentu facilis sit. Nisi enim ualidissima cartilaginea ligamenta, quibus obducuntur, simul cum membranis resecueris, & accuratè abraueris, unum esse tibi omnia uidebuntur, aut cum Celso ipsa incerto constare numero opinaberis. Cæterum cuncta neruis his cartilaginosisq; nexibus simul confricta (non autem ut nonnulli existimant connata) duas integras superficies unā efformant, exteriori quidem regione quantum manui ex usu est, gibbā, interiori autem sinuatā, quantumq; & hoc manui expedit, concuam. Atque hæc tantū superficies ligamenti obuincuntur. Superius enim, quā ossa cubito committuntur, læuia sunt, & cartilagine incrustata, quemadmodum & inferius, quā postbrachialis ossibus, & primo pollicis ossi coarctantur. Quin etiam ubi ossa se inuicem contingunt, non undique aspera & inæqualia, ac ligamenti oppleta uisuntur, uerum omnibus apud læuesq; sinus incisi sunt, qui cartilagine læui & lubrica illiti, aliorum ossium tubercula capitā uel similiter læuia, cartilagineq; obducta, excipiunt. In medio enim contactu nullorum brachialis ossium ligamenta membranæ uel interueniunt, nisi in inferioris ordinis ossium connexu, ubi non nihil, sed uix animaduersione dignum, ligamentū cartilaginei ueluti in puncto intercedit, & ubi ossa inferiora non adeo conterminè inuicem atq; superiora sunt compacta. Quod etiam merito Natura molitur, in hoc potissimum duos brachialis ossium ordines fingens, quod superior cubito, inferior autem alia prorsus ratione postbrachiali & primo pollicis ossi debuerit cōmitti. His namq; ut distinctis diremptisq; coarticulatur ossibus, cubito autem unius ossis modo: sic ut iure superioris ordinis ossa, uiciniorū propinquiorūq; ac nullius corporis interuentu inuicem coarticulentur, quā inferioris ordinis ossa. Atque hanc brachialis ossium copiam ratione dissectionum periti potissimam esse referunt: huic secundario patienti difficultatem addentes, quum arbitrentur brachiale iniurijs ferendis pertinacius fieri, quia multis componitur ossibus occurrentium uim articularum nomine cedendo exoluentibus, eo modo quo hastam sagittam uel difficilius laxa quā tenfa penetrare conspiciamus. Quanquam rursus & ad innumeras manus motuū differentias, hanc ossium uim & copiam à Natura non postremo loco extructā esse animaduertimus. Cæterum quibus nam sinibus tuberculisq; brachialis ossa donentur, iam enītar persequi. In superiori brachialis sede, aut ordine qui cubitum spectat, quatuor reponuntur ossa, quibus ex ipsorum qua ordinantur serie, nomina non ab re imponemus: primum perpetuò uocantes, quod superioris ordinis internum constituit latus: secundum uerò, quod huic sublequitur, atq; magis ab interno abscedit latere: tertium, quod secundo ad externum latus proximum est: quartum uerò, quod externum latus iam omnino occupat. Pariter quatuor inferioris ordinis ossa, quintum, sextum, septimū & octauum nuncupabimus, atque in hunc modum singulorum historiam aggrediemur. Primum, secundum & tertium inuicè ualidissimè proximèq; cōmittuntur, & uno ordine iuncta, ac si unum essent os, superiorē brachialis sedem ita efformant, ut instar unius alicuius ossis lati oblongiq; capitis, in radij ulnæq; sinum, ea concinnè articulentur. Ac primū quidem, & secundū, in sinu radij appendici in sculpto reponuntur: tertium uerò cartilagini innititur, quā à radio pronatā, magna ex parte ulnā à brachiali dirimere scripsimus. Quāquā externū tertij ossis latus etiam acutum appendicis ulnæ processum tunc cōtingit, quum in externū latus summam manū inclinamus. Verum interim tertium id os sinum cartilagine oblitū, qui uisu dignosci queat, in homine nequaquam adipiscitur, quem processus ille sibi propriū haberet, quum etiā processus ipse nisi secundum sinum, quo brachiale arctatur, latus perinde extuberet, ac reliquorū sinuū supercilia, ipseq; radij appendicis in hac regione apex. Atq; id uel tactu leuiter diiudicatur, si manu in latus internū ducta inter brachiale & ulnā, alterius manus pollicis apicē inferere quis fuerit adnatus. Tria igitur prima brachialis ossa, superiori sede ita simul iunguntur, protuberantq; ut ueluti unum brachialis caput læue & cartilagine incrustatū constituat, quo id cubito articuiatur, multisq; & uehemētibus motibus, ac si uno grandi efformatū esset osse, agitur. Quartū brachialis os ulnā haudquaquam contingit: at superiori sua sede eam huius articuli ligamenti portio-

Brachiale octo ossibus constructū, inter se forma differentibus.

Brachialis ossa quibus sedibus ligamētis, & quibus cartilagine obducuntur.

Cui duo brachialis ossium ordines.

Brachialis ossium nomina.

Brachialis ad cubitum arctatus.

Quæ quartum os sibi peculiariter uendicat.

nem

nem admittit, quæ ab acuto ulnæ appendicis processu enascitur. Dein superiori quarti ossis sedi^b tendo musculi inferitur, qui brachiale flectentium inferior censetur. Ex inferiori autem ipsius sede^c musculus pronascitur, cuius beneficio parvus digitus à reliquis abducitur. Præterea & " musculus suæ^d originis portionem hinc assumit, qui duorum primum parui digitos flectentium exterior est. adeo ut quartum hoc os neque inferiori, neque superiori ipsius sede, neque etiam externo ipsius latere alteri ossi committatur, sed tantum interno ipsius latere, depresso admodum capitulo, tertij ossis externo lateri (magis tamen ad manus uolam) in eum modum coarticulatur, quo ossa per *ἀρθρωδία* cōstrui diximus. Hoc itaq; quartum brachialis os id peculiare sibi uendicat, quod uni tantum brachialis ossi iungatur, quodq; omnium brachialis ossium minimum sit, reliquisq; minus protuberet, sinueturq;. Est enim quodammodo sphericum, sed paulo longius quàm crassius; quia scilicet inferiùs musculos educit, superiùs autem ualidissimi tendinis insertionem, uti diximus, excipit, eaq; ratione sursum deorsumq; magis quàm in latera protuberare debuit. Vnde etiam ueteres dissectionum professores, id (uti coniicio) Rectum appellauerunt, ambigentes quem in ordinem ipsum referrent. nos autem superiori ordini ascripsimus, quod tertio huius ordinis ossi coarticulatur, ac reuera in eo ordine consistat. Nuncuparunt etiam Anatomici præsens os, cartilaginofum; non secus quàm Marinus^e os genu articulo præpositum eo nomine donauit, quod molam patellamq; uocamus. Non sanè (quantum reor) quod id os molle cartilagineumq; esse arbitrati sint, quum omnium brachialis ossium facilè durissimum & solidissimum sit, at quod cōtūm exterius cartilagine obductum uisatur, propter musculorū principia tendinumq; fines, qui post elixationem cartilaginis molliuscule speciem referunt. Galenus hoc os octauum brachialis os uidetur recensuisse, id propriū ipsi tribuens, quod propugnaculum^f nervi cuiusdam sit, qui ab interna manus sede ad externam secundum id brachialis os reflectitur. Hic nervus me non latet, uerum ad hoc ossiculum in hominibus nō reuoluitur, est enim ille nervus, quem à quinto brachium petentium, paulo post medium cubiti longitudinis ab interna cubiti sede in posteriorem porrigi, atq; duos furculos paruo digito, totidemq; anulari, unum autem medio deriuare, in quarto libro audies. Præsens itaque nervus quartum brachialis os non contingit, ideoq; minus secundum illud ab interna manus sede in externam reflectitur. Porro præter quartum brachialis os, nullum penitus occurrit, non pluribus adnexum contiguumq; ossibus. Primum enim, præterquam quod radio articulatur, etiā secundo brachialis coarticulatur ossi, amplo utcumq; tuberculo in secundi ossis sinum subiens. Deinde alio tubere multo ampliori, atque ab inferiori sua sede protuberante, communem sinum ingreditur, quem quintū brachialis os cum sexto efformat. Verum Natura præcauens, ne id os undique aliorum ossium sinus ingrederetur, & ipsum interim tyrannimore nullum susceperet, insignem in ipso cælauit sinum, quo unā cum secundo brachialis osse (cui is sinus quoq; communis est) septimi ossis omnium facile maximi grande rotundumq; admitteret caput, atque ita primum os radio, & secundo brachialis ossi, & quinto, sexto, ac septimo committitur. Secundum os (quod tanto minus est primo, quanto ipsum maius est tertio) connectitur primo ossi, & septimo, uti iam diximus, tertio autem, amplo connexu per *ἀρθρωδία* constringitur: adeo ut tertium os radio, & tribus brachialis committatur ossibus, primo uidelicet, septimo & tertio, neq; etiam multum ab octauo remouetur. Tertium os modicè protuberante, sed amplo tuberculo in sinum subit octauis ossis: hincq; facile constat, id os & ulnæ, magisq; adhuc^g peculiari huius articuli cartilagini, dein & secundo ossi brachialis, & quarto & octauo conterminum esse. Quintum brachialis os, quod inferioris ordinis primum recensuimus, superiori sua sede in sinum sibi exculptū primi brachialis ossis capitulum excipit, & externo latere sinuatum quoq; sexti ossis capitulum admittit, adeo ut quintum os duobus brachialis ossibus, primo nimirū ac sexto coarctetur. & præterea id priuatim quoque^h primum pollicis os sustinet. In inferiori nanque ipsius sedeⁱ sinum adipiscitur patulum & oblongum, ac in^k interna^l externaq; sede magis quàm in lateribus ac medio exculptum, cui primi pollicis internodij capitulum ea articulationis specie cōmittitur, quæ motum edit omnibus manifestum, aliter multo quàm brachialis ossium inter se cōnexus, cuius motus ita latet, ut uix dijudicari queat. Atque hac etiam articuli specie quatuor^m postbrachialis ossa quatuor inferioris ordinis ossibus adnectuntur. Primum enim postbrachialis os indici præpositum, magna ex parteⁿ sexto brachialis ossi coarticulatur, portionem quoque quinti ossis attingens. Vbi enim quintum os sexto coarctatur, communis sinus utrique ossi exculpitur, cui capitis primi postbrachialis ossis pars articulatur, adeo ut quintum brachialis os, præter primum sextumq; brachialis ossa, etiam primum pollicis os unā cum primo postbrachialis osse contingat. Porro secundum postbrachialis os medium suffulciens digitum, depresso, sed obliquo,

s 4. muscu.
tab. A.
t 3. muscu.
tab. r.
u 4. tab. s.

x 1. 2. fi. ca.
32. et inter
gratum z.

y 2. fig. cap.
u lib. 4. chd
rati. 46.

Si uisum fue
rit, hic figu
ras cōspici
es quot ossi
bus quod
que os com
mittatur ex
aminaturus.

z 1. 2. fi. ca.
24. T.

a 1. 2. fig. A.
b 3. 6. fi. G.
c 6. fig. a, b.
d 6. fig. c.
e 6. fig. d.
f 1. 2. fig. 1.
11, 111, 1111
cū charact.
5, 6, 7, 8.
g 3. 4. 6. fi.
H.
h 3. 4. 6. fig.
gur. h.

4. 6 fi. quo, capite¹ septimi ossis brachialis sinui leuissimè ac obliquè exculpto articulatur acutiori sui
 K. parte latereq² interno³ sextum brachialis os modicè contingens. Duo autem reliqua postbra-
 h. earum chialis ossa, ea scilicet quæ anularem & paruum sustinent, duntaxat octauo brachialis ossi⁴ la-
 4. 6 fig. uibus, ac in superficie tantum excauatis sinibus coarctantur. Sextum itaque brachialis os duo-
 4. 6 fig. bus committitur postbrachialis ossibus, illi nimirum quod indici præponitur, & obscure illi
 4. 6 fig. quod medio subijcitur digito. Brachialis autem tribus committitur ossibus: primum enim os
 suo sinu excipit, & suo tubere in quinti ossis sinum subintrat. dein septimo ossi leuissimè protu-
 berante capitulo, aut potius plana superficie articulatur, estq⁵ inferioris ordinis minimū, quem-
 admodum septimum maximum. quintum autem & octauum medio se habent modo, quan-
 quam octauum quinto paulo grandius cernatur. Septimū os suo capite rotundo, ac impen-
 sius protuberante, in communem primi secundiq⁶ ossis sinum subit, hacq⁷ ratione duobus illis
 ossibus cōmittitur. ab interno autem latere sexto ossi articulatur, ab externo uerò latere articu-
 latur octauo ossi ampla admodum articulatione, quæ depresso sit capite, sinuq⁸ in superficie
 tantum cælato. Hanc articulationem aliqua ex parte cartilaginei ligamenti interuenit portio,
 quæ etsi septimum os uehementius octauo ossi cōmittat, attamen id omnium brachialis ossium
 creberrimè uersus interiora luxatur: tum quòd grandius sit, neq⁹ ita facile, ac cōtermina, occur-
 rentium impetum sustineat: tum etiam, quòd ligamentū interna sede hoc os uicinis colligans,
 nō æquè crassum sit, atq¹⁰ in reliqua brachialis regione. Atq¹¹ id hinc potissimū accidit, quòd Na-
 tura ligamenti mole crassitieq¹²,¹³ tendinibus iter occupare uoluerit, qui frequenti multitudine,
 hac ad digitos flectendos ab interna cubiti sede prorepunt. Vt cunque uerò sit, septimum os
 quatuor brachialis connectitur ossibus, primo nimirum, secundo, sexto, octauo, & postbra-
 chialis ossi medium digitum sustinenti. Octauum os cunei quodammodo ritu septimum &
 tertium subintrat, illisq¹⁴ duobus cōmittitur: septimo quidem, ut paulo antè retulimus. tertium
 autem, in sinum sibi exculptum admittit: dein præter hæc duo brachialis ossa, duobus etiam
 postbrachialis coarctatur ossibus, quæ anulari & paruo subijciuntur. adeò ut & id quoq¹⁵ qua-
 tuor ossibus conterminum sit. quibus subinde paruulum accedit¹⁶ ossiculum, ex illorum nume-
 ro¹⁷ quæ semini inimagini assimilata, *ονομασθῆναι* Græcis nuncupantur. Ad externū enim la-
 tus coarticulationis postbrachialis ossis paruū sustinentis cum octauo brachialis ossis, eius ge-
 neris reponitur ossiculum, sedem quasi oppleturum. quæ ideo hīc quodammodo uacua relin-
 quitur, quòd hoc postbrachialis os sua superiori parte totum octauo brachialis ossi inniti ne-
 queat, atq¹⁸ in externum latus paululum abscedat. Videtur itaque id ossiculum, quando adest,
 priuatim hanc articulationē firmare, ac postbrachialis os paruū sustinens digitum non nihil
 suffulcire, atque hac etiam occasione octauum brachialis os ex abundanti huic quoque ossiculo,
 præter illa quæ nuper dixi, contiguum uisitur. Quinetiam & hoc adhuc octauum os sibi pro-
 prium uendicat, quòd ipsius interna sede, qua manus uolam quodammodo spectat, notatu di-
 gnum educit¹⁹ processum, ab externo latere uersus internum latus inclinantem, & in interno suo
 latere C modo exculptum: ut aptam constitueret sedem, qua tendines musculorum digitos
 flectentium (qui ex cubito procedūt) opportunè uehi contineriq²⁰ possent. Vt uerò tanti tendi-
 num moli sedes hæc aptior redderetur, etiam quintū brachialis os interna sua sede²¹ processum
 educit, uersus externum latus uergentem, & in externo latere pariter exculptum, eiusdem
 omnino usus quo octauī ossis processus gratia, nimirum ut tendinibus illis uia exhiberetur, ac
 postmodum ex processuum illorum apicibus ualidissimū²² ligamentum enasceretur, quod
 transuersim tendinibus circumdatum, ipsos, ne à sua sede²³ aberrent exurgant ue, contineret, am-
 plectereturq²⁴. Hæc sedes tendinum nomine excauata, ut cunque leuis est: quemadmodum &
 reliquos sinus esse dicimus, qui tanquam anuli tendines transmittūt. Cætera brachialis ossium
 pars extra hunc sinum, easq²⁵ sedes quibus ossa articulatur, inæqualis, & propemodum aspera
 est, ut fortiora educeret ligamenta, eademq²⁶ ualidius exciperet, quibus ossa inuicem obuinciri
 ac colligari iam antea proditum est.

Quos ossibus
 sextum os con-
 terminum sit.

Quos septi-
 mum.

Quos octauū.

Ossiculum ad
 nec. un. quarti
 postbrachialis
 ossis cum bra-
 chialis repositū.

Oblasti ossis
 processus.

Quinti ossis
 processus.

DE POSTBRACHIALI.

Caput XXVI.

HVIUS Capitis figura ex prima secundaq¹ præcedentis Capitis figuris extre-
 mam manum, ac proinde etiam postbrachiale (notis I, II, III, IIII) exprimentibus pe-
 tendæ sunt. Quamquam & subsequēntis Capitis prima figura, ad characterem A postbra-
 chialis os indicem sustinens exprimet, omni osse liberum.

PARTEM

Postbrachialis
uocatur
dum.



Quisdam
postbrachialis
ossa quatuor
quibusda quin-
que enumerat.
n.

Quatuor post-
brachialis os-
sa cuiusmodi
sunt.

In longi-
tudine.

In appen-
dicibus.

In nouo ne-
xu.

Postbrachialis
ossium in-
terualla.

Qui postbra-
chialis ossium
seculis cedant.

ARTEM summæ manus à brachiali ad radicem usque digitorum deducam, Græci quidem *μετακαρπιου* nominant: Celsus autem, & Græcorum interpretes permulti, palmam, alij rursus pectinem, ac pectus aliquando uocant. uerum quia palmæ uocabulum latius patet, & brachiale quoque in palma plerisque complectitur, ac reliquis rursus palma idem quod uola denotat. & quum pedis pedio, pectinis & pectoris seu *subos* nomen etiam pariter accommodetur, ego hæcenus *μετακαρπιου* postbrachiale appellaui. Postbrachiale itaque Galeno quatuor conformatur ossibus. Eudemo autem & Celso, atque (ut ex primo de Historia animalium est colligere) Aristoteli etiam, quinque: prout nimirum pollicis^b primum os, quod quinto brachialis ossi articulatur, hi quidem postbrachiali, Galenus uero digitorum ossibus adnumerant. Porro nonnulli id postbrachiali ascribunt, quod in eodem ferè cum cæteris postbrachialis ossibus ordine locatū sit: & non, ut^c prima reliquorum digitorum internodia, nudum exeratur, sed quodammodo postbrachialis ossium ritu lateat, uulgoque pollicis tantū duo ossa tribuatur, quamuis interim id pollicis os postbrachialis ossibus & breuius sit, & ipsis non æque atque illa, inter se conterminū. Præterea & hinc fortassis primum pollicis os postbrachiali adijciunt, quod secundum pollicis os, primo eodem ferè modo articuletur, quo prima digitorum ossa postbrachialis ossibus, quæ simplici sinu illorum ossium rotunda simplicitate excipiunt capita. Postremò huc fortassis ductū fuisse, quod nullum tendinem, qui primo pollicis ossi mouendo famulatur, ipsi inferi putauerint: quemadmodum etiam nulli postbrachialis ossi tendo inferitur, qui illius priuato motui præsit. Complures enim musculi latuerunt alios dissectionū professores, qui primo pollicis ossi peculiariter implantantur. Galenus uero (quem etiā ut minimum^d tres quatuorue eius internodi musculos præterisse, in secundo libro auditurus es) primum pollicis internodiū digitis, quibus singulis tria tribuit ossa, connumerat, quod id supra infraque per *δυσκαρπιου*, hoc est laxam, & quæ manifestum motum edit articuli speciem articuletur: supra quidem brachiali, infra uero secundo pollicis ossi: & interim quatuor postbrachialis ossa, infra tantum quæ digitis committuntur, ea articuli specie coniunguntur. Supra enim, uel Galeni suffragio, postbrachiali per *συνκαρπιου* coarticulantur: hoc est differentia articuli, qui perquam obscurum, & quem sentire uix queas, motum ostendit. Ita enim arbitror Galenum synarthroseos nomine in Capite libri de Ossibus decimo nono usum. Quandoquidem haudquaquam existimandum est, Galenum adeò perfunctorie postbrachialis ossa uel in simia, uel cane intuitum esse, ut aut futura, aut clauu ritu, aut harmonia, hæc ossa brachiali coartari uoluerit, quamuis illa ipsius esset sententia, si illum sui dogmatis non oblitum hinc dixerimus, quod initio libri de Ossibus synarthroseos species enumerans diffusè exequitur. Vt ut uero sit, quod rectius nos Galeni sententiæ accommodemus, quatuor quidem postbrachialis, quindecim autem digitorum ossa, semper enumerabimus. Sunt itaque postbrachialis ossa reliquis digitorum ossibus longiora, & magna ex parte teretia. Longissimum in dici præponitur, atque ita sensim sunt breuiora, ut omnium facile breuissimum tenuissimumque paruo præponatur digito. Omnia^e supra^f infraque appendice donantur, & superior quidem (cuius cōnexus etiam in pueris aliquando later) brachialis ossibus, uti antea diximus, coartatur, ipsaque ossa hinc externa sede nonnihil latiora quam interna sunt, ut postbrachiale unā cum brachiali superficiem exterius gibbam, intus uero cauam aptius hinc efformaret. Quin etiam appendices hæc lateribus se inuicem cōtingunt, & cartilaginei ligamenti internētū inuicem alligantur. Inferiores uero appendices grandes quoque sunt, & in rotundū ac ab externa manus sede in internum oblongū caput desinunt: quod cartilagine obductū, primi digitorū ossis sinum subintrat. Hæc appendices lateribus se etiā contingunt, sed non adeò pertinaciter atque superiores, quæ brachiali coartantur, nihilominus tamen quæ inuicem respiciunt, sinuatae sunt, ligamenta quoque cartilaginea educunt, quorum opera ualide connectuntur. In medio autem ductū, & secundum postbrachialis longitudinem, quoniam ossa suis appendicibus multo tenuiora sunt, inuicem dirimuntur, & digno notatu^g interuallo inuicem dehiscunt. atque id magni cuiusdam usus gratia. in quolibet enim trium interuallorum, quæ quatuor postbrachialis ossa constituunt, duo reponuntur musculi ex octo illis, qui primū quatuor digitorū os flectunt. Quemadmodum itaque singulos digitos, duo illorum musculorum accedunt: ita etiam cuique postbrachialis ossi duo attenduntur, atque in tribus interuallis sex collocantur. ad internum uero latus postbrachialis ossis indicem sustinentis, septimus protenditur. externo autem lateri ossis paruo digito præpositi, octauus exporrigitur. Verum quum hi musculi suo ductu, horum ossium longitudinem uix superent, interualla quoque hæc non tantum distent, ut sufficiens musculorū moles in ipsis collocari queat, postbrachialis ossa merito intus, ubi uolam constituunt, caua uidentur,

ut & hic quoque musculorum portio tutam apramq; sedem nancisceretur. In externam autem ossium sedem muscoli nihil prominent, neque inibi ossium gibbum uel minimum excedunt, parem cum ossibus superficiem constituentes. Quinetiam ut ulnam radiumq; attensis ipsis musculis cedere ostendimus, ita etiam postbrachialis ossa secundum longitudinem angulosa, & lineis quibusdam pulchre extuberantia cernimus, pro musculorum uidelicet, qui ipsis exporriguntur, ratione: uti etiam non minus superiori sede eleganter exasperantur, ut opportuna trium brachiale flectentium musculorum insertionem excipiant. Neq; id solum postbrachialis ossa cum radio ulnaq; exigunt comune, uerum etiam intus oblongum sinum medullae reponenda aptum sibi uendicant. Porro postbrachiale iustissime quatuor ossibus efformatum esse, quatuor qui ipsis stabiliuntur digitis liquido monstrat, quibus quintus ueluti opponi debuit, si modo manus commodum futura erat apprehendendi organum. At satius iam quoque fuerit, digitis peculiare Caput consecrare.

DE MANVS DIGITIS. CAP. XXVII.

DIGITORVM ossium seriem duae priores figurae ad initium uigesimali quinti Capitis repositae monstrant: quemadmodum & tres integrum ossium contextum exprimentes tabulae, ad huius libri calcem locandae. Tabula autem hic inserta, ac in tres ueluti figuras (ut singula duo proponant ossa) digesta, digitorum articulos oculis subiicit. Harum enim prima, duo exprimit ossa: quorum alterum *A* insignitum, estq; postbrachialis os indicem sustinens, alterum *B* indicatur, estq; primum indicis os ab externa sede, quemadmodum & illud postbrachialis os, delineatum. Praesentit itaq; figura primi digitorum articuli effigies proponitur. *C* enim caput rotundum notat postbrachialis ossis. *D* uero sinum primi indicis ossis caput *C* insiguitum excipiens.

PRIMA FL. SECUNDA. TERTIA.
GVRA.

Secunda figura primum indicis quoque os indicat, *E* notatum: & secundum pariter *F* insiguitum: ut horum ossium delineatio secundi quatuor digitorum articuli speciem oculis subiceret. Gitaque & *H* duo indicant capitula primi indicis ossis. *I* uero & *K* sinus secundi ossis, quos duo capita primi ossis subintrant. *L* autem sinum significat, in medio capitum primi ossis consistentem, ac in quem tuberculum secundi ossis inter duos sinus *I* & *K* notatos prominens, & *M* insiguitum subingreditur.

Tertia figura secundum indicis os *N*, & tertium *O*, proponit, tertij cuiusq; digiti articuli speciem ostensura, quam quia penitus secundo quatuor digitorum articulo responderet, alijs characterebus non oblitterauimus. Verum istas articulorum imagines etiam ex duabus primis uigesimali quinti Capitis figuris petere integrum est.

fig. ca.
pollicis
a. A, B,
indictis
o. D, E,
indicant,
qualis
etiam
quorum
est.



MNES manus digitos ternis constare ossibus, (quae & internodia, & articuli, & acies, seu etiam φαλαγγες & σκευαλίδες & λόνδους uocantur) superiori Capite comprehensum est. Atq; haec ossa dura sunt ac densa, non tamen (ut aliquando contra Galeni placitum monuimus) medullae penitus expertia. Praeter id enim quod supra infraq; appendicum modo non nihil fungosa existunt, etiam singulis sinus contigit grandior, medullae afferuanda gratia, ut & in postbrachialis ossibus, paratus. Quod uero digitorum ossibus ad actionis robur in apprehendendo, & eisdem pluribus propter uarios qui manibus sunt motus, ac eorum quae illis apprehenduntur differentiam indigemus, neminem latere arbitror. Deinde quod neque plura ossa, neque pauciora tribus fieri, digitis omnino ex usu fuerit, uel hinc promptissime colligitur, quonia si illum excederet numerum, praeterquam

Singulos digi
tos tribus ossi
bus merito for
mari.

quod nulli auxiliarentur functioni (abundē enim omnes trium ossium ope obimus) perfectam ualidamq; digitorum extensionem uitarent, hanc minus firmam, quam nunc sit, efficientia. Ex pluribus nanque constructa partibus leuiori negotio fatigantur, lassantur, & à suo robore exoluuntur, quam quæ paucioribus efformantur: tunc præcipue, quum omnes particule simul coniunctæ commistæq; (ut brachialis ossa) in uniuersis ipsarū munis, referuari nequeunt. Verum si paucioribus ossibus digiti constituerentur, in tot tam uarias pugnantescq; figuras digitos agere nequiremus, ut igitur uariē mouerentur, patiendiq; promptitudinem declinarent, trium ossium numerus sufficit.

*Iusta ossium
magnitudo.*

Quandoquidem autem prælocatum os postposito, aut uehens uecto, maius esse operæ precium est, meritò Natura quoque, primum cuiusque digiti os grandius secundo, & secundum rursus os tertio minus fabrefecit, non solum inferiora ossa longitudine, sed & crassitie, & latitudine minuens, hacq; ratione potissimum digitos ex ampliori basi sensim in mucronem coarctans: & digitorū formam, quam in mulieribus pulcherrimam ducimus, extruens. Quamquam rursus mirabili industria non eandem figuram digitorum ossibus, & digitis adhuc unguibus cureq; obiectis largiatur. Totos enim digitos paulo minus

*Decens ossiū
et integrorū
digitorum for-
ma.*

sciret: ut quæ nulla extuberet eminentia, à foris occurrentibus frangenda collidenda ue. Quod enim digiti extrinsecus quidem accuratè gibbi sint, intus uerò ac in lateribus magis compressi, alicuius etiam usus occasione factum putato. Interna nanque ipsarum regione digiti molliunt, subigunt, terunt ac apprehendunt: quæ omnia deterius fierent, digitis inibi gibbis existētib. ut interim præteream duriusculam neruisq; oppletam adipem, internæ digitorum sedi, eorum quæ iam dicebamus officiorum causa, & tendinum defendendorū occasione, subtenfam, atq; in secundo libro prolixius priuato Capite enarrandam. Porro quum externa digitorum regione neque horum aliquid tentemus, neque alio quouis munere fungamur, rationi consonum fuit, digitos ad solam patiendi pertinaciam examussim gibbos construī. Quum autem digiti in lateribus minus essent iniurijs obnoxii, quumq; inuicem adducti, constringi, ac in ipsorum medio nullam sedem uacuum relinquere debebant, ipsos in lateribus gibbos fieri haudquaquā ex usu erat. Atque his quæ modò diximus pollex paruusq; digitus cum indice satis suffragantur, siquidem ille utrunq; latus, sed magis internum gibbum adipiscitur, paruus autem externum duntaxat, index uerò contrā internum: quod his sedibus ab aliquo non tutantur. adeo, ut non minimam Naturæ solertiam in totius digiti figura uideamus: à qua quantum ossa discrepent, iam enitar exequi. Nullum digitorū os se offert, quod non suprā infraq; crassius & spissius sit, quam secundum ipsius longitudinem: id quod etiam omnibus ferè longis ossibus commune cernitur, quæ ad articulationem perpetuò crassescunt, augenturq;. Si enim undique pari constarent crassitie, animanti pondere moleq; admodum incommodarent, ipsiq; articuli, nisi amplioribus basibus concinnè adaptarentur, penitus infirmi essent. In hoc igitur primum forma ossium à totius digiti figura differt. Si enim digitus in lateribus ossium imitaretur imaginem, quemadmodum in macilentis ac parum obesis uidere est, inter digitorum latera uacua constitueret sedes, quæ liquorem digitis complecti non medioctri incommodo prohiberet. Impletur uerò hæc ossium sedes duriuscula illa adipe, cuius paulo prius obiter meminimus. Deinde unumquodq; digiti os externa sede teres & gibbum est, nullibi insigniter, neq; etiam in articulorum regione, extra rectam lineam protuberans, uti etiam in lateribus ossa non admodum circa articulos prominent. si modò primum pollicis os hinc exceperis, quod externa sede amplum magis planumq; & depressum, non autem aliorum modo gibbum uisitur. Ad hæc, tertia digitorū ossa sede externa quidem gibba sunt, sed ab ipsa articulatione qua secundis articulantur ossibus deorsum ducta, non ita atque reliqua ossa extrorsum protuberant, sed ungui quodammodo cedunt. tanto enim minus prominent, quantam sedem ungues occupant, quo minus scilicet integer digitus in tertio osse procerius, quam in reliquis, extrorsum exurgat. Interna cuiusq; ossis sedes nihil minus quam gibba est, sed depressa prorsus, & sinuata potius, multò aliter quam externa digitorū sedes: dum modo & hinc quoq; primum pollicis os seduleris, quod brachialis ossibus interna ipsius sede respondet. Nam et si suprā infraq; ad articulorum sedes in internam manus regionem magis protuberet, & in medio ductu inibi sinuatum, exterius autem curuatum conspicitur, non tamen reliquorum digitorum ossium modo, amplum depressumq; & planum est, at potius gibbum, magisq; intus quam foris acutum. Quod sanè Natura haudquaquam fortuito casuq; machinatur. secundi enim & tertij pollicis ossis interna sedi, quemadmodum & tribus quatuor digitorum ossibus teretes tendines exporrigi debuerunt, qui profecto nisi ossium interna sedes ampla depressaq; & ueluti sinuata esset, in ossibus nequirent subsistere: non magis quam teretia corpora inuicem nunquā inniti cernimus.

*Hic con-
tinetur figu-
ras inuere
quibus di-
gitum of-
sa exprimi-
tur.*

*h Manus ex-
tremas & mi-
sculorum
tab. ex de-
6 et septi-
me hic sunt
confundenda.*

Neque etiam teretes illi tendines, ipsis duntaxat applicari debuerent, imò operæ precium fuit, & ex hac ossium fede^e ligamentum nasci, secundum longitudinem ossium tendines illis ossibus committens, ipsosq; ne ab osse exurgant declinent ue complectens. Cuiusmodi uerò tendines ossibus exporrigan-^gtur, quæq; ligamenta ipsis obducantur, in secundo libro astatim recensere-^hmus. in præsentia autem, tantum illorum meminisse sat sit, quantum ad ossium constructionis rationem enarrandam unexpedit. Per secundi itaq; pollicis ossis longitudinem interna sede eius generis ligamentum nasci, eo libro audies, tendinemⁱ musculi deducēs, qui tertio pollicis ossi ualidissimè inseritur, ac eius articuli flexus autor est. Verum quia eiusmodi ligamentū Natura nullum in primo pollicis osse condidit, neque periculum est, tendinem hac ad tertium pollicis os prorepentem aliquò aberraturū (ut qui undique^k musculis primo pollicis ossi proprijs con-^ltineatur) haudquaquam necessum fuit, primum pollicis os aliorum ossium modo planum depressumq; interna sede extrui, præcipue quum & id musculis ipsi attensis insertisq; in do-^mneum extitisset. Primis uerò quatuor digitorum ossibusⁿ duo inuicem incumbentes porrigun-^otur tendines, quorum unum secundo inseritur ossi: alter uerò, qui succumbit, tertio implanta-^ptur: adeò ut tribus horum digitorū ossibus eiusmodi uehātur tendines, eiusq; generis ligamen-^qtis qui tendines anulorum ritu transmittunt, digitorum ossa donentur: præcipue autem pri-^rma & secunda quatuor digitorum ossa, & pollicis secundum. Tertijs enim non secundum^s totam longitudinem tendines exporriguntur, unde etiam neque ita ut inferiora uidentur de-^tpressa & plana. Æquum igitur fuit, hæc ossa non secus formari, quàm si una pars teretis cor-^uporis diuisi essent, tendines uerò ipsis exporrecū altera eius corporis pars, ut scilicet ossa simul^v cum tendinibus teretem digiti imaginem constituent. Externæ enim digitorum sedi eiusmodi^x di nulli deducuntur tendines, at membrana: modo toti ossium longitudini tendines ibidem^y duntaxat adnascūtur. Latera etiam ossium nequaquam digitorum ritu compressa lataq; sunt, neque ulla pollicis paruiq; digiti ac indicis ossium, hac ex parte cum reliquorum digitorum os-^zsibus, est differentia. Respondent enim ossium latera, teretis corporis dimidiæ partis lateri, quamuis interim ab hac figura primum pollicis os tantum discrepet, quanto minus reliquis di-^agitorum ossibus interna sede compressum amplumq; cernitur. Atque huiusmodi digitorum^b ossium est forma, longè profectò alia quàm Galenus ipsis tribuit, eam ad digitorū imaginem^c describens. Verum iam tempestiuum erit, Naturæ providentiā in digitorum articulis con-^dtemplari: neque obiter Galeni orationi acquiescere, qua superioris ossis caput in subsequenti^e sinum subire, ac exteriora sinuum supercilia insignius quàm interiora exporrigi seu extuberare^f simpliciter pronūciat, eandemq; articulationis speciem omnibus digitorum articulis ascribit.^g Vt modò nihil dicam de tendinibus^h musculorum, qui digitos in latera ducunt, & à Galenoⁱ non minus secundis ac tertijs digitorum articulis, quàm primis, communes censentur. quum^k interim nunc facile sinus ostensuri, neq; tertium pollicis articulum, neque aliorum digitorum^l secundum aut tertium articulos, primario motu in latus agi. Primum itaque pollicis os, quin-^mto brachialis ossiⁿ rara peculiariq; committitur articulationis specie, quæ & flecti, & extendi,^o ac dein moueri in latera potest: in eumq; modum parata est, ut priuatim magis motui qui in la-^ptera perficitur, quàm flexioni extensioniq; subseruiat. Quintum enim brachialis os amplum^q exigit sinum, qui transuersim ampliori tubere prominens, interiori exterioriq; sede insignius,^r quàm in lateribus, cælatur. Primum autem pollicis os superius transuersim, seu secundum in-^sternum ac externum latus insculptum, & interius exteriusq; protuberās quinti brachialis ossis^t sinui eleganter cōgruit, & quasi mutuo ingressu ipsi articulatur, non tamen adeò insigni, ut id^u uno tantum agatur motu, reliquorum articulorum mutuo ingressu, nexorum ritu. Verum^v quum interna primi pollicis ossis sedes magis quàm externa promineat, & quinti brachialis^x ossis sinum altius inibi insculptum, profundius subeat, id primū pollicis os magis flecti quàm^y extendi potest. Secundum pollicis os primo ea articuli specie articulatur, quam *σφελγωσις*^z Græci uocant. Inferior enim primi pollicis ossis pars in rotundum quasi capitulum desinit, ro-^atundum secundi ossis sinum subiens. Sed quia caput id transuersim, hoc est ab interno pollicis^b latere ad externum magis protuberat, ac ueluti transuersim oblongū est, in lateribusq; uix ma-^cgis quàm in centro deprimitur, ac demum secundi ossis sinus huic capiti ad amussim aptatur,^d secundum pollicis os flectitur potius & extenditur, quàm in latera inclinatur. quum interim^e æquè in latus duceretur, si capitulum primi ossis ad amussim rotundum esset, & in lateribus^f æquè ac in anteriori sede compressum. Dein articuli etiam ratione (quum capitulū in interna^g sede ualde deprimitur) secundū os maximè ac in acutissimum angulum flecti deberet. uerum^h quo minus id fiat, duo hic obstituntⁱ ossicula seleni seminis imagini à Græcis assimilata.^j Quod uerò secundū pollicis os uix extra rectam lineam extendi queat, caput primi ossis in cau-^k

Primod. V.
su part.
Ossium d. q.
torum articu-
lationis rat.o.

Primod. Ad
minst. dissect.

Primi polli-
cis os ad bra-
chiale nexus.

Secundi polli-
cis ossis cum
primo articu-
li species, ip-
siusq; motus.

sa est, inibi adeo leuiter depressum, hicq; (ut & in lateribus) æqualiter propemodum atque in ipsius centro protuberans. Quam uero affabre, quibusq; rationibus Natura hæc molitur, nihil sanè promptius nos edocet, quam pollicis officia, quæ post cognitam ossiū constructionem longe plura primo intuitu spectantium animis suggerunt, quam prolixè aliquis multas in hoc chartas obliterans, persequi possit. Secundū pollicis os tertio ossi, secus quam primū ipsius os brachiali, & aliter quam secundum primo, committitur. Inferior namque secundi ossis pars, in duo capitula bipartitur, quadamtenus orbiculata, & in medio sinu oblongo dirempta, qui non minus quam ipsa capitula cartilagine in crustatur. Superior uero tertij ossis sedes duos obtinet sinus, tubere quodam oblongo disinctos. Sinus hi, duo secundi ossis excipiunt capitula. ipsum autem tertij ossis tuber sinum subingreditur in secundi ossis capitulorum medio cauatam. atque hac ratione secundum os in tertium subit, uicissimq; tertium os excipit. ac mutuo ingressu ambo ossa tam scitè coarctantur, ut duntaxat tertium os extendi flectiq; queat, nequaquam uero, uel minimum etiam, in latus ducatur. Quod autem tertium os in angulum flectitur, & interim nō ultra rectam lineam extenditur, sed potius a flexione duntaxat erigitur, capitula sinusq; articuli in causā sunt. Capitula enim, quibus sinus ad amussim respondent, in interiora magis quam exteriora feruntur, deprimunturq; ac in externam sedem adeo obscure porriguntur atque consistunt, ut inibi uix capitis speciem ostendant, itaq; tertium os in posteriora inclinari prohibeant. quemadmodum etiam ipsi articulo cōducere tunc discimus, quum ipsius in flexu usum perpendimus: & unā colligimus, quibus modis articulus ipse infirmaretur, si æquè extendi, duciq; in latera posset, atque iam magna Naturæ providentia flectitur.

Tertij pollicis ossis cum secundo articulationis ratio.

Primus, secundus tertij articulationis quatuor digitorum iuxta.

Huiusmodi sanè articulationis specie reliquorum digitorum secundi tertijq; coarctantur articuli. Primus autem ipsorum magna ex parte, uti antea quoque monuimus, secundo pollicis articulo conuenit. Verum longè magis illo in latus ducitur, non tamen adeo insigniter atque flectitur. Postbrachialis enim ossium capita, in interiora multum porriguntur, deprimunturq; in lateribus autem non admodum lateſcunt, sed modicè tamen etiam inibi deprimuntur: adeo ut promptior sit flexio, quam aut extensio, aut in latus ductio. Quanquā rursus index & paruus in primo articulo priuatim id sibi uendicent, ut magis medio & anulari in latus ducantur, id quod potissimū ex capitis postbrachialis ossis, in lateribus compressione euenit. Quod autem quatuor digitorum primi articuli, uix in æquè acutum angulum ac secundi & tertij articuli flectantur, nō ipsa postbrachialis ossium capita in causa sunt, ac si minus interna sede deprimerentur: sed exigua quædam ossicula, quæ selsami seminis imagini comparantur, hoc præstāt, quia & articulum firmant, ac ne plus æquo laxè flectatur, prohibent. Dein primi digitorū articuli reflectuntur extendunturue magis, quam cæteri, quod brachialis capita etiam externa sede compressiora cernantur, quam digitorum ossium capita: quæ in nonnullis hominibus eo magis articulos extendi sinunt, quo externa sede impensius comprimuntur. Videmus enim quosdam non prima tantum digitorum internodia insigniter extorsum inflectere, uerum & reliqua omnia, ac potissimum tertia. Cuius rei specimen pulchrè reddit, summæ spei accuratissimiq; iudicij adolescens, generis præterea nobilitate ac ingenuis moribus singulariq; bonarū literarum ac uariarū disciplinarū eruditione cum primis clarus, IOANNES CENTVRIO

IOAN. CENTVRIONIS mobiles ac elegantes digiti.

GENVENSIS, qui digitos (quos habet egregiè teretes, longos, & ad omne artificium quam maxime idoneos, ac perelegantes) in posteriora adeo mirificè intorquet, ut illis aquam, periade atque nos uola, continere queat. Quanquam is non digitorum modo articulis, uerum & alijs totius corporis, ac potissimum costarum ad thoracis uertebras, miram laxitatem nō medio cri robore iunctam, ostendat. Atque huiusmodi ferè digitorū est articulatio: quæ etiam haud difficulter attestatur, digitorum ossa iuxta articulos merito crassiora euasisse, quam in reliqua ossium longitudine. Quod autem tertium os inferiori sua sede, qua nulli alteri coarctatur ossi, etiam protuberet, asperumq; capitulum duobus quasi unculis donatum obtineat, ideo imprimis accidit, ut toti internæ huius ossis sedi tendo qui ipsum flectit adnascatur, ac demum suo sine in ossis apicem ualidissime inferatur. est enim is tendo omnium digitorum reliqua ossa mouentium facile maximus, robustissimamq; infertionem tentans. Porro quinq; digitos oportuisse fingi, inuentu nequaquam arduum est, si expendamus, ad quæ officia digiti nobis ex usu sint. Si enim pauciores essent, permultæ actiones imperfectius obirentur, pluribus uero in nulum usum indigemus. Quod autem si pauciores formarentur, pleræq; actiones interciderent, promptè assequemur, si singulos priuatim sermone pertractemus. Pollice namque (quem reliquis quatuor opponi expedit, quiq; ob id Græcis *ἀντίχειρ*, quasi promanū dicas, nuncupatur) deperdito, omnes cæteri potestare interciderent, quum absque huius ope illos nihil agere, uel iudices ipsi doceāt, qui furibus pollicem quo potissimum crumenæ aut oculi præscinduntur,

non

I Immitte hic 2 figuræ G, & H m 1, K, ac M in L.

Hæc seriatim figuræ propensius, nunc Capituli præfixæ.

m 1 si. cap 25 V.

Hæc referat & 2 figuræ ca. 25 apices. n 6 musculi. tab. tendines musculi 2 & 3. de 7 tab. c. b.


non minus quàm aurem amputare solent. Ac eadem ferè ratione etiam Athenienses Æginctis qui classe ualebant, pollicem præcindi decreuerūt. Reliquorum uerò digitorum, index ac medius, quemadmodum post pollicem situ, ita etiam usu secundi sunt. Parua enim corpora his apprehendimus, omniumq; artium opera ipsis præcipuè confici cernimus: & si quid uiolentius operamur, illos potissimum in opus aspicimus. Anularis & paruus, minorem quidem alijs usum præbent, at is nihilominus in his cernitur, in quibus amplectendum corpus circulo comprehendimus. Si enim id humidum & exiguum fuerit, digitos ad amussim constrictos ipsi circumflecti expedit. quo in opere paruus quoque est accommodus, operculi modo alijs adiectus. porro si aliquod durum corpus tanta mole constet, ut digitum inuicem impense dirempti disunctiq; id complecti debeat, præterquam quòd id pluribus digitis aptè comprehendendi, pluribusq; suis partibus digitos accedere committiq; cernimus, promptè etiam expendimus, quantum homini ex usu fuerit digitos ad latera inuicè adduci abduciq; plurimum potuisse. Pollex enim intus eiusmodi corpus amplectitur, reliquis interim digitis externæ sedis circumductis, totoq; corpore in eum modum orbiculatim comprehenso. Quod si fit, quis ignorat plures quinque digitos prorsus fore superfluos, quum quinque ad id munus sufficere nouerit? Quamobrem uerò digitum inæquales extruantur, mediusq; longitudine ceteros uincat, hinc colligitur, quòd digitorum extrema ad æqualitatē pertingere satius sit, quoties molem aliquam grandiorē in ambitu cōprehendimus: quumq; in ipsis liquorem, aut exiguum aliquod corpus continere studemus. Grandioribus enim corporibus ualide apprehendendis, retinendisq; uel fortiter emit tendis abijcendisq; æqualis undiq; apprehensio plurimū confert. Cōspiciuntur enim in unam circuli circumferentiā quinque digiti cōcurrere, si quando illis corpus exquisitè sphaericū amplectimur. Præterea ad manus accuratè ocludendas, quādo uel exiguum corpus uel humidum ad amussim cōtinere animus est, digitorū inæqualitas usum præstat manifestū: atq; huic functioni non medio crīter pollicis situs conducit. Pollicē namq; quū ceteris digitis in officio opponitur, ipsis quoq; situ opponi necessum fuit. At si ex opposito prorsus locaretur, mediam brachialis regionem sibi uendicans, à pluribus sanè functionibus manum impediret: ac imprimis eas interciperet, quas seorsum alterius manus uola, aut simul utrisque uolis obimus. ac proinde ex transuerso ipsum oportuit reponi, & plurimum ab alijs disungi adiungiq;. Quum uerò transuersa manus regio ad inuicem æquē, atque ad paruū digitum, consistit, propter indicem locari pollicem potius fuit, ac (uti superius commemoratum est) inferiori brachialis ossium ordinis laxè articulari. Oportebat enim manus indicibus ad inuicem conuerti, auerti autem paruus digitus, qui etiam in extremis digitorum flexionibus paruus digitus nullā sedem finit uacuam, index uerò non paruam, quæ pollicis beneficio ocludi obturariq; modo operculi potest.

*Digitus
inæquales.*

*Pollicem
obtinet.*

DE OSSICVLIS, QUÆ SESAMI semini comparantur. Caput XXVIII.

HVIC Capiti præcipuè famulatur prima figura nigesimo quinto Capiti præposita, & internam summæ manus sedem unā cum ossiculis hoc Capite describēdis cōmonstrans: ad characteres nimirum N, T, V, V, X & Y. quorum etiam N & T, in secunda eius Capitis figura cernuntur. Item hic impense facit secunda figura trigesimo tertio Capiti prælocanda, ad characteres μ (quod etiam inibi in prima uisitur figura) ψ , ω & π . Quin etiam figuræ integram ossium compagem referentes, hæc ossicula k notata proponunt.



Ceterū priuatim hæc tabella duo delineantur ossicula, primo pollicis in pede internodio subiecta, ac in nuper dicta figura ω & ψ insignita, ac A quidem hic notat interioris ossis inferiorem sedem, terræ immitentem: B eiusdem ossis superiorē sedem, quæ caput spectat pedis ossis pollicem sustentantis. C exterioris minorisq; ossis humiliorē sedem indicat: D uerò superiorem.



DISSECTIONVM professores quorundam^a ossiculorū meminerunt, quæ quidem articulos implere, stringere, ac quò minus luxationi redderentur obnoxij, firmare docent, at interim in quibusnam reponantur articulis, quibusq; sedibus adinueniantur, neminem scripsisse scio. Quapropter etiam non inopportunè faciam, si modò quibusnam in locis eius generis ossicula repererim, hinc subiecero: unumquemq; interim admouens, ut etiam in pluribus articulis, quàm ego iam enarraturus sum, eadem inquirat. Sensim namque & temporis successu illa in pluribus obseruari articulis, quàm prima

*Quibus
bus
ossicula
nanct.*

In manu.

fronte mihi occurrere. Primum itaque in interna sede secundi pollicis articuli, quo primum ipſius os ſecundo articulatur,^b duo reponuntur offacula utrunque rotunda, & ſolida, & non multum ab orizæ ſeminis forma diſcedentia. ſunt enim paulo quàm ſemen ipſum breuiora. uerum, ut oryæ ſemen una parte depreſſum uiſitur, ſic & horum offaculorum pars depreſſa, modo diceſq; cauata, & cartilagine ea parte inruſtata eſt, qua primo pollicis offi ambo cōmittuntur. Incumbunt enim primi offis capitis internæ ſedi ad ipſius capitis radicem, & ubi id primum cartilagine obduci laeuigariq; incipit, ac unum officulum latuſ externuſ interioris ſedis capitis, alterum uerò internuſ latuſ eiufdem ſedis occupat: & utraque per illorum, quo inuicem dirimuntur interualluſ^c tendinem ferri ſinunt, tertiuſ pollicis os ſeſcientem. Quum uerò hæc offacula illi pollicis offi ualide colligentur, externa parte gibba ſunt, & offium ſedem referunt quæ ligamenta educit, tendinuſq; inſertionem excipit. Ad hunc ſanè modum, in primis reliquorum digitorum internodijs^d duo quoque offacula reperiuntur, eodem ſitu poſita, tantoq; pollicis officulis minora, quanto ad paruſ digituſ propiuſ acceſſeris. Illiſ enim primo articulo, aut potiuſ capiti poſtbrachialis offis paruſ ſuſtinentis minima & quodammodo cartilaginea adneſcuntur offacula. Reliqui autem digiti medio ſe habent modo. Præterea in ſenibus & offeis (ut ſic dicam) hominibuſ^e unicuſ officulum aliquando in interna ſede tertij pollicis articuli poſituſ animaduerti, quod^f ſinuſ capita ſecundi offis dirimenti, in interna ſede præponebatur. Huiuſmodi etiam^g officulum nonnunquam in ſinguliſ digitoruſ ſecundis & tertijſ internodijs mihi occurrit, ſed adeò exiguum ut uix miſij ſeminis magnitudinè æquet, adeò ut niſi in repurgãdiſ offibuſ accuratiſſimè caueris, id (quemadmodum etiam à primis articuliſ) unã cum ligamentiſ abijciatur, neque unquam ſe ſpectandum offerat. Huiuſ etiam generiſ^h officulum notari dignæ magnitudiniſ illic plerunq; obſeruatur, ubi poſtbrachialis os paruſ digituſ ſuſtulciens, octauo brachialis offi articulatur. atque ita manuſ extremaſ offacula ſe habent. In pede autemⁱ unum ſimiliter inuenimus, ubi pedij os paruſ digituſ ſuſtinenteſ teſſeram imitantij offi coarctatur, illi proruſ reſpondens, quod poſtremo loco in manuſ recentſui. In primis uerò pediſ digitoruſ articuliſ huiuſmodi^k offacula diſſiculter, præterquam in pollice obſeruantur. in ſenibuſ tamen, quòd maiuſcula ſint, promptiuſ ſe offerunt. In ſecundiſ autem & tertijſ articuliſ, illa nunquam inueni, præterquam in ſecundo pollicis internodio, cui grande ſatiſ^l officulum ſubiicitur. Quanquam quæ primo pollicis internodio ſubiſciuntur, multo inſigniora offacula ſint, & horum ruruſ internuſ externo longe grandiuſ. Hæc quæ capiti pedij offiſ (quod pollicis primi offiſ ſinuſ ſubire dicemus) cōmittuntur, leuiter ſinuata ſunt, & cartilagine inruſtata, illiſ capitiſ gibbo pulchrè conueniunt. Inferiori autem ſede, qua terram ſpectant, orbiculata ſunt, & dimidiaſ parti emundatæ piſcæ non abſimilia. Hæc profecto longe ſunt ſolidiſſima, & præterquam quòd primo pollicis præſciuntur articulo,^m tendinem muniunt, quo ſecundum pollicis os ſeſcitur. Ipſa enim utrinque ad tendiniſ latuſ protuberantia, quo minus à pediſ in terram innixuſ tendo comprimitur, eleganter præcauent. Atq; alterum horum offaculorum illud eſt, cuiuſ magi & occultæ philoſophiæ ſeſtatores adeò prolixè meminerunt, quando in homine os quoddam eſſe tradunt ciceriſ imagini reſpondens, nulliq; corruptioni obnoxium, quod in terra poſt mortem recondituſ inſtar ſeminis hominem in extremi iudicij die produſcturum affirmant. Eſt ſanè utrunque os, ſed potiſſimuſ exteriſ, mundato ciceriſ perquam ſimile, ſi modò id ad mediaſ ciceriſ partem referaſ: aut ſi utrunque os iunxeris, integruſ cicer effeceris, quantum ſcilicet ad imaginem ſpectat. Dein in grandioribuſ hominibuſ internuſ id officulum etiam tantuſ eſt, ut teſſera ex ipſo promptè pareatur. In hoc tamen ab Arabuſ illoruſ commentiſ offacula hæc diſſerūt, quòd alioruſ offium modo frangantur, exuranturq;: quanquam ſanè corruptioni admodum reluſtantia, ac ut priuſ dictuſ eſt, ſolida ſint. Dogma autem, quo ex eiufmodi officulo hominem, cuiuſ nunc immenſam narramuſ fabricam, propaganduſ contendunt, Theologiſ diſceptanduſ relinquemus, qui ſibi ſoliſ liberaſ de reſurrectione animaruſq; immortalitate altercationem & ſententiam uendicant. Atque illoruſ etiam cauſa nunc de mirabilibuſ occultisq; dextri pollicis interni officuli uiribuſ nihil ſubiſciemuſ, quantum uiſ etiam ſuſpeſiſ furis, ac interdum ſimul amatoriſ, uel ex publiciſ ſeſtionibuſ eiuf offiſ melior nobiſ ſuppetaſ copia, quàm illiſ tribuſ apud Venetoſ truculentisſimiſ ſcortis, quæ nuper huiuſ officuli, cordiſq; pueruli uirginis maſculi, comparandi gratia, infantem trucidarunt, uiuofq; corexemerūt, ac (uti erant digniſſimæ) flagitiij ſui grauifſimaſ pœnaſ dederunt. Porro officulum id Arabibuſ ac uerè occultis tenebricoſiſq; illiſ philoſophiſ, Albadaran nuncupatuſ eſſe, ſuperſtitioſiſ qui- buſdam uiriſ notiuſ, quàm Anatomeſ ſtudioſiſ, eſt: qui & quartum brachialiſ os ciceriſ aſſimilare poſſent,

*In pede quæ offacula habentur.**Officuliſ magiſ ac occultæ philoſophiæ ſeſtatoribuſ ſimulare.**Albadaran.**b 1, 2 figur. cap. 25 T.**c 6 muſcu. tab. 2, de in f.**d 1 figur. cap. 25 V.**e reſpondeſ illi quod * notatur ſi. 2 cap. 33. f 2 figur. cap. 27 L. g 1 figur. cap. 25 X, X. h 1, 2 ſi. c. d. 25 N.**i 1, 2 ſi. cap. 33 4. k 2 figur. cap. 33 4. n.**l eiufdem ſi. figur. ***m 15 muſcu. tab. ſub M offacula uidentur. tendiſ autem 1 14 muſcu. tab.*

PRIMA VIGESIMI. SECVND. TERTIA.
NONI CAP. FIGVRA.



TRIVM PRAESENTIVM FIGVRARVM ET EARVNDEN CHA-
racterum (qui pro Capitis contextus serie mutuò se consequuntur) Index.

HI I S tribus figuris os delineatur, dextro sacri ossis lateri cõmissum. ac prima quidem hu-
ius ossis anteriorem sedem eo situ exprimit, quo id in sceletò ab anteriori regione inspecto se of-
ferret, quemadmodum in prima figura trium illarũ est cernere, quas huius libri calci subijciam.
Secunda figura huius ossis sedem undecunq; exprimit, quæ externa est, corporisq; interiora non
spectat, eo nimirum situ quo id os integram ossium compagem ex dextro latere intuenti occurre-
ret. Tertia autem figura opposito situ internam huius ossis sedem appositissimè ostendit. Cæte-
rùm et si omnes harum figurarum notæ priuatim aliquid, ut mox persequar, indicent, ipsis ta-
men obiter integrum quod hic delineatur os, in ilium os, & coxendicis, pubisq; subdividere lice-
bit. Ut scilicet in secunda figura à c, per b, ad S: ac rursus in tertia, ab S, per N, ad c lineam
duci fingeres, ilium os à coxendicis osse quodammodo terminantem. Quicquid enim supra hos
betur characteres, ilium os nuncupabitur. Quod autem inter hos characteres, & in secunda
ura inter V, per s, & h, ad Φ: & in tertia inter V, per O, & s, ad Φ intercluditur, coxen-
dicis ossis loco nobis erit. Reliqua uerò totius ossis sedes, pubis os appellabitur: quæ scilicet in
secunda figura ad sinistram latus characterum V, s, h, & Φ consistit. In tertia autem ad dex-
trum V, O, s, & Φ.

A, B, C, D, E, F, G in 3 Sedes ilium ossis notatur, quæ sacri ossis transversis neclitur processibus.
ac A quidem, & B priuatim indicant sinus, quos anterior trium superiorum ossis sacri ossium
transversorum processuum protuberans pars subit. Et B rursus ossis ilium partem indicat, in
star cultri acutam tenuemq;. C & C oblongum tuber ilium ossis, sacri ossis processui oblongo
sinui congruens. D & D longum ilium ossis sinus, qui sacri ossis tuber dorfi spinæ modo protu-
berans admittit. E & F & G sedes ilium ossis, non ad amussim sacri ossis sinibus tuberibusq;
respondens, quanq; E & F duo ueluti tubera indicentur, sinus sacri ossis obscure ingreditia.
G autem sinus notatur, qui ossis sacri tuber admitteret, transversum duos illos sacri ossis sinus

intercedens. At huiusmodi non admodum accurate exprimuntur, quum hæc ossis sedes aspera, inæqualis & effracta rupis modo uariam se spectandam offert.

H, I, 2, 3 Quicquid ad dextrum **H** & **I** in secunda figura habetur, & in tertia ad sinistrum, portio nem ilium ossis indicat, posterius quam transversum sacri ossis processum amplitudoeducta.

L, R, 2 **R, P** in prima: Querò, **H, R, R, P** in secunda: & **P, L, H, Q** in tertia, Appendix ilium ossis indicatur. Cæterum **L** internum appendicis latus priuatim notatur. R uerò & **R** externum appendicis latus, interno minus compressum. **P** antèius appendicis extremum, **Q** posterius appendicis extremum.

K, K, 3 Sedes ad horum characterum sinistrum consistens latus, nono dorsum mouentium musculo principium præbet.

M, N, O, 3 Tuber, à quo principium decimi femur mouentis musculi pendet. Amplitudo autem, quam **P, L, K, K, M, N, S** in tertia figura notauimus, aut quæ illis characteribus circūscribitur, principium offert septimo femur mouenti musculo.

T, 1, 2, 3 Sinus in elatiori coxendicis ossis sede cælatus, & sexto ac septimo femur mouentibus musculis una cum primo crus petente neruo uiam præbens.

S, 1, 2, 3 Tuber externum latus dicti nunc sinus constituens.

X, 1, 2, 3 Tuber internum dicti nuper sinus latus efformans.

Z, Y, 2 Prima in ilium ossis dorso admodum obscure apparens linea.

a, b, 2 Secunda dorsum ilium ossis linea.

c, f, g, 1, 2 Sinus & acetabulum coxendicis ossis, cui femur inarticulatur. Porro **g** separatim huius sinus sedem notat leui lubrica & cartilagine non incrustatam, altiusque quam reliqua sinus superficiei, insculptam.

i, i, 1, 2 Supercilia acetabuli in coxendicis osse cælati.

b, 1, 2 Sedes ubi supercilia intercidunt, ac ueluti sinu quodam insigni donantur.

c, 2, 3 Sedes, qua neruus cæterorum corporis maximus, atque ex pluribus nervis conflatus porrigitur.

d, 2, 3 Processus coxendicis ossis, à quo ligamentum ad sacrum os enascitur.

k, 1, 2, 3 Sinus coxendicis ossis, ad quem decimus femur mouentium musculus, ueluti ad rotulam mirabilè Naturæ industriæ reflectitur.

l, m, n, o, p, q In secunda figura, **l** autem duntaxat in prima coxendicis ossis appendix notatur. ac **l** quidem posterior appendicis terminus insignitur: **q** uerò anterior, **m** autem prima appendicis impressio, o secunda, **n** tertia, **p** ad **q** usque quarta.

u, u, 1, 2 Sedes notatur, qua dextrum pubis os, cartilaginis interuentu sinistro coalescit. Sed **u** in prima figura priuatim notat ossis asperitatem, à qua cartilago abscissit. in secunda uerò, externa eius ossis sedes uisitur, quæ musculorum educendorum occasione aspera est.

r, 1, 2, 3 Pubis ossis foramen, omnium ossium foraminibus patentissimum.

V, 1, 2, 3 Sinus superiori pubis ossis sedi incisus, quo maxima crus petens uena & arteria, ac in uiris semina uia uisa deducuntur.

f, 1, 2, 3 Sinus in elatiori foraminis pubis ossis sede insculptus, ac uenæ & arteriæ, tertioque crus petenti neruo, uiam porrigenis.

t, 1, 2, 3 Hac sede pubis os nonnihil crassescit, ne nimium extenuetur, & in uiris secundum penis musculum, & alterum ipsius corpus, educit.

L de Ossibus cap. 10.

Ilium os.

Pubis.

Coxendicis.



TRANSVERSIS trium superiorum ossis sacri ossium processibus, utrinque unum connectitur os, cui integro nullum nomen Galenus inditum affirmat. Lata enim ipsius, & superior, ac posterior, sacroque ossi commissa pars, ilium os uocatur: anterior uerò eiusdem ossis pars, qua in pubis regione cum alterius lateris osse committitur, ampliter perforatum est, Pubis os: media autem sedes ad femoris ingressum posita, Coxendicis os appellatur. adeo ut unius lateris os non secus denominetur, quam si tribus propria circumscriptione terminatis ossibus extrueretur: posteriori scilicet, anteriori, & medio: seu ilium osse, pubis osse, & osse coxendicis. Cæterum Celfo uniuersum os, coxæ os: auctori uerò Introductorij seu Medici, quemadmodum & Hippocrati nonnunquam *ιχθυος* (quod est coxëdix) dicitur. quamuis interim & latiore posteriorioremque huius ossis partem ilium, anteriorem uerò pubis

42. fi. ca.
à superio
L per M.
L. Sinus
tem tube
raiz: proc
sui, N.
P. Q. d
dicantur.
b tota
3 fi. integ
rum uer
figurat.
Quo mo
autem ho
rum ossi
sedes circ
scribenda
sint, ex ch
radicem in
dice pete
dum est.
c integ
fig. 1.

pubis os uterq; aliorum dissectionis professorum modo nuncupet. Arbitror autem sola nomi-
 na sectantium uenia etiam quum alterius tantum ossis latæ partis mentio mihi incidet, Ilium os
 posse dicere, quum illis aut ile usurpatu minus frequens sit. His itaque ossibus maxima in usu
 cum scapulis est affinitas. ut enim scapulæ potissimum articulantur humeris formantur, ita sa-
 nè hæc ossa in hoc præcipue sunt accommoda, ut femora ipsis articulentur, horumq; ope ho-
 mo erigatur, & sedeat. Dein, ut scapula cernitur ampla, uarijsq; processibus donata (quo mu-
 sculis pluribus admittendis, educendisq; aptior esset) sic hæc ossa omnem ferè constructionis
 rationem in eum modum fabricatam ostendunt, ut ab ipsis omnes propemodum femur mo-
 uentes muscoli pronascantur, præter alios qui ab his ossibus principium ducentes tibiæ, &
 thoracis, & dorsi motibus famulantur. Cæterum quoniam muscoli ab his ossibus enascantur,
 quicq; in ipsa implantentur, orationis series ossium partes enarrans, sensim edocebit. Nunc
 autem minime prætereundus est horum ossium usus nequaquam infimus, quo communi os-
 sium modo, reliquis corporis partibus instar fulcrorum subiiciuntur, reliquisq; partes conti-
 nent & amplexantur. Duo enim hæc ossa simul cum sacro osse ueluti peluim quandam effor-
 mant, quæ intestina concinnè sustinet, & uesicam, & in foeminis uterum elegantissimè conti-
 net, ac demum eas, quas amplectitur partes, tutò munit. Primum itaq; ilium ossis, ^o sedes sacro
 ossi commissæ, egregie uaria est: quemadmodum sacri ossis transuersus processus ea sede, qua
 ilium ossibus connectuntur, admodum uarios multiplicesq; effertulimus. Singulis nanque il-
 lorum processuum sinibus, ilium ossis tubera, & eorumdem processuum tuberibus, ilium ossis
 sinus ita correspondent, ut uarijs partibus mutuo ingressu ilium os sacro committatur: non
 quidem connexu ad motum constructo arbitrarium, aut sinibus tuberibusq; læuibus & carti-
 lagine lubrica incrustatis, uerum cõnexu ualidissimo, & in symphyis seu unionis classẽ quasi
 referendo, quæ cartilaginosis ligamenti, aut potius puræ cartilaginis interuentu perficitur. Cæ-
 terum ossis ilium sinuū, & tuborum quibus id sacro ossi cõmittitur forma, ex sacri ossis descri-
 ptione læui negotio petitur. Vt enim transuersos sacri ossis processus primum oblongo sinu
 donari dictum est, ita etiam ilium os, oblongum tuber sinui congruens obtinet. & quia pro-
 cessuum sinus anterior pars, sinus uel supercilia, satis insigniter protuberat, porrigunturq; ilium
 etiam ossi ad anteriorem oblongi sui tuberis sedem sinus inculpuntur, quos protuberantes
 illæ processuum partes subeunt. Vbi autem humilima eorum sinuum sedes conspicitur, ilium
 os quasi in cultri modum exacuiuit, ut eandem cum quarti ossis sacri ossis transuerso processu
 superficiem constituat. Rursus oblongo sacri ossis tuberi, quod instar spinæ in processuum si-
 nibus eminere relatum est, oblongus etiam ilium ossis sinus conuenit, tuber id ad amulsim su-
 scipiens. Porro duobus processuum sinibus ad posteriorem dicti nunc tuberis sedem consisten-
 tibus, & tuberi transuersim in illorum sinuum medio prominenti, ilium os nõ æquè concinnè
 respondet, quum scilicet nõ ad eò procerè extuberet, atq; illi processuum sinus alitè cælantur.
 Neque etiam ilium os, illorum sinuum tuberi, sedem, qua id susciperetur, parat, atque (ut semel
 dicam) sacrum os ilium ossi non admodum hac sede, ubi duo illi ossis sacri processuum sinus
 conspiciuntur, conterminum est, sed plurima cartilago ligamenti natura participans, hæc ossa
 intercedit, totam amplitudinem, qua inuicem ossa dehiscunt, infarciens. Vniuersa igitur ilium
 ossis sedes sacro commissæ, aspera est, ac inæqualis, & insigniter crassa: quemadmodum & reli-
 qua ossa illis sedibus quibus inuicem compinguntur, ampla crassaq; ideo esse nouimus, ut ua-
 lidiorem amplioremq; connexum efficerent. Atque hæc crassa ilium ossis pars in posteriora
 longè magis quàm transuersorum sacri ossis processuum amplitudo, porrigitur prominẽtq;
 tum quod ilium os amplissimum latissimumq; scapulæ modo esse oportuit, ut femur mouen-
 tes & alios plerosque musculos paulo post enarrandos, à se pronasci sinat: tum, ut ad postero-
 rem sacri ossis sedem aptum cõstitueret locum, à quo quartus hominis thoracem mouentium
 musculus principium duceret: unà cum dorsum mouentium undecimo, qui simul cum illo
 thoracis musculo ab interno latere ossis ilium (quà id in posteriora ferri diximus) & ab ossis sa-
 cri posteriori sede, originem nanciscitur: similiter ac musculus dorsum mouentium decimus
 tertius, ab hac etiam ossis sacri, & ilium ossis sede, initium sumẽs. Porro reliqua ilium ossis am-
 plitudo planæ semicirculari figuræ non absimilis, superiori sua sede secundum totā semicirculi
 circumferentiam, appendicem obtinet, quæ ueteribus Spina ilium ossis dicebatur. Ipsi nanq;
 dorsum ilium ossis uocant, externam suæ amplitudinis sedem, quia hæc ampla est, & si cum
 interna conferatur, quodammodo gibba. Appendicis autem sedes extrorsum prominet, ac ue-
 luti illius dorsi spina iure censetur. Verum & si ueteres hæc nomina rectè instituerint, & Gale-
 nus quoque eorum nominum, ut & ossis sedium differentia, apud illos fuisse animaduertit,
 nihilominus is subinde Dorsum cum Spina in tibiæ & femur mouentiū musculorum descri-
 ptione

Ossium sacri
 ossis lateribus
 commissarum
 usus.

Ilium ossis se-
 des sacro ossi
 commissæ qua-
 lis.

Ilium ossis pars
 retrorsum ma-
 gis quàm sacri
 ossis transuer-
 si processus
 exporrecula.

Ilium ossis ap-
 pendix.

Spina.
 Dorsum.

Lib. 2 de Ad-
 ministr. dist. 2.

d integra-
 rum figur.
 in 10.

e 1, 3 integ.
 fi. 10 cu 11
 f Petuntur
 hæc ex 5 li.
 figuris, præ-
 cipue autē
 22, 24, 25.
 g 3 fi. A, B,
 C, D, E, F,
 G.

h 3 fi. C, C.
 C de in se-
 riatur con-
 fer cum 2
 fig. cap. 18.
 i 3 fig. A, B.
 h 3 fig. B.
 i 3 fig. cap. 18
 humiliss.
 L.
 m 3 fig. D.
 D.
 n 3 fig. E.
 F de in G.

o 23 figu.
 11, 1.

p 12 muscu.
 tab. 10.
 q 13 musc.
 tab. 1.
 r 14 musc.
 tab. 10, V.

s 1 fi. L, R.
 R. 2 fig. H.
 R, R, P. 3 fi.
 P, L, H, Q.

ptione confudit: quod nos, quoad licebit euitates, Dorsum ossis ilium suae amplitudinis exter-
nam regionem appellabimus: Spinam uero, semicircularem ipsius appendicem, quae aspera
inaequalisq; & interno exteriorq; latere compressa uisitur. Comprimitur quidem interna
fede, ut haec inibi amplior euadat, & carnosam transuersi abdominis musculi partem, illinc
aptius educat. Externo autem latere appendix cōprimitur, ampliorq; fit, ut potissima oblique
ascendentis abdominis musculi carnea pars hinc principium sumat, & oblique descendens
abdominis musculus ipsi inferatur. His enim tribus musculis uniuersa superior appendicis se-
des occupatur. atque ut illi ampliores carnosioresq; in ilium lateribus quam iuxta dorsum, aut in
abdominis anteriori sede sunt, ita quoque appendicis pars, quae abdominis latera respicit, an-
teriorq; est, unā cum ilium ossis sede, cui appendix committitur, crassior est, quam pars uerte-
bris & dorso proxima. Anterior uero appendicis extremū, anterior uel spinæ ilium ossis pars
ideo est crassissima, quod præter abdominis musculos ipsi commissos, duobus musculis princi-
pium porrigat, quorum alter tibiæ motorū primus, alter autē sextus censebitur. Ab interna
ilium ossis amplitudinis sede, primum musculus enascitur, qui dorsi motorum nonus erit, qui
ex laui, sed utrunque ampla ilium ossis impressione (quae ad regionem transuersi quintae
lumborum uertebrae processus conspicua est) ortus sui portionem adipiscitur. Verum præter
hanc ilium ossis compressionem, alia magna ipsius est amplitudo caua, & minimum aspera,
quam musculus occupat femur mouentium septimus, quem carneo amplexu principio instar
femiculi ex interna hac ilium ossis amplitudine pronasci, ac deinde sensim arctari, simulq; cum
sexti femur mouentium musculi tendine, primoq; citius petiti neruo, per sinū ferri docebimus,
sibi priuatim in coxendicis osse exculptum. In elatori enim coxendicis ossis sede, iuxta superio-
rem acetabuli, cui femoris caput inarticulari audies, regionem, sinus inciditur amplius, & mu-
sculus hac descendens respondens, qui in mundato osse foraminulis quibusdam in hoc op-
pletus cernitur, ut is ligamentum educat, cuius beneficio os inibi laeue lubricumq; ac ueluti
in tegmate inunctum cernitur, ut recte ad hunc sinum septimus ille femoris musculus, unā cum
sexti musculi tendine, reflecti atque conuolui queat. Vtrinque ad huius sinus latera, unum
insigne satis prominet tuberculum hunc sinum augens, ac quo minus hac descendentes muscu-
li ex sinu declinent, autor. Verum præter hunc usum, tuberculum ad externum sinus latum con-
sistens, nonum tibiæ mouentium producit musculum, cuius etiam usus gratia utrunque am-
plum inaequalisq; uisitur, paruum sinulum instar scissurae sibi uendicans, à quo fortis ille mu-
sculus enascitur. Alter uero tuber, internū sinus nuper dicti latum constituens, plurimum ad
coxendicis ossis robur confert, quod necessariò crassum ualidumq; esse oportuit, tum articula-
tionis roborisq; nomine, tum etiam quod id totius corporis altissimo sinu, cui femur articu-
latur, caelandum fuerat. Atque huius etiam usus occasione, ilium os interna ipsius sede ad ela-
torem sui cum sacro osse connexus regionem, crassum ualidumq; redditur, & ueluti ad secun-
di tuberculi internam sedem continuo tubere porrigitur, quod non solum coxendicis ossis ro-
bur adauget, uerum etiā principium offert musculo femur mouentium decimo, qui internam
pubis ossis sedem occupans, femur extorsum circumuertit. Porro ab ilium ossis dorso, seu
externa ipsius amplitudine, quae interiori ipsius ossis sede asperior est, tres potissimum ena-
scuntur musculi, suis principijs totū ilium ossis dorsum occupantes. Ac primus quidem muscu-
lus femur mouentium primus numerabitur, magna ex parte posteriore ilium ossis dorsi sedem
suo principio opplens. Quantam uero huius sedis portionem occupet, duae admodum obscu-
rè in ilium ossis dorso prominentes lineae indicāt, quae semicirculi instar ductae, ilium ossis dor-
sum ueluti in tres sedes determinant. prima harum extra primam consistens lineam, à primo
femur mouentium musculo occupatur. Secunda uero inter primam lineam & secundam con-
spicua, musculum educit, qui femur mouentium secundus censebitur. Tertia sedes, quae à secun-
da breuiorq; linea ad coxendicis usq; articulum pertinet, tertio femur mouenti musculo prin-
cipium porrigit. Atque in hunc sanè modum ossis sacro ossi commissi ampla, & quae ilium os
dicitur, pars sese habet: media uero pars, quae coxendicis os nuncupatur, etiam magna ex par-
te explicata est. Diximus enim ea parte os crassius ualidiusq; fieri, ut uniuersum corpus uni in-
nitens cruri, fortius sustineret, aptaq; sedes fieret, cui sinus articulando femori idoneus incide-
retur. Huic enim coxendicis ossis sedi amplius rotundusq; & omnium corporis sinuum cui
ossa articulantur profundissimus sinus insculpitur, nō omni ex parte laeuis, lubricaq; cartilagi-
ne crustatus. In anteriori enim ipsius sede, non modica portio altius quam reliqua illius cir-
cumferentia inciditur, ac aspera carnisq; foraminulis quibusdam oppleta cernitur, ligamenti
producendi gratia, quod teres in medium, seu uerticem femoris capitis inferitur. Deinde præ-
sentis sinus supercilia in anteriori ipsius sede leuius, quam in posteriori protuberant, quod sci-
licet

Quibus mu-
sculis appen-
dix occupa-
tur.

Quibus inter-
na ilium ossis
amplitudo.

Sinus coxen-
dicis ossis supe-
riori sedi in-
sculptus.

Sinus tubera.

Quomodo co-
xendicis ossis
robori sit pro-
spectum.

Ilum ossis dor-
si linea, quae ip-
sum occupant,
tres musculi.

Acetabulum
femori articu-
lando parati.

t. 13 fig. L.
u. 1, 2 h. R.
R.
x. 6 muscu-
tab. a.
74 muscu-
tab. n.
21 muscu-
tab. o.
a. 2 fig. ab.
R per R. ad
P.
b. 2 fig. B.
per Had.
Q.
c. 1, 2, 3 fig. P.
d. 3 muscu-
tab. f.
e. dem f.
e. eiusdem t. a.
o. dem x.
f. 8 muscu-
tab. z.
g. ad fini-
strum latum
K, K. figu-
ra. j.
h. inter P.
L, K, K, M.
N. S. fig. 3.
i. 8 muscu-
tab. a.
h. eiusdem
tab. o.
i. 2 fig. cap.
ii. libr. 4.
charac. 57.
c. 10 mus-
tab. f.
m. 1, 2, 3 fig.
gur. T.
n. 2 fig. c.
f. g.
o. 1, 2 fig. c.
30 A.
p. 1, 2, 3 fig.
externu
tuber 3 in-
signitur, in-
ternum uel
rò x.
q. 4 muscu-
tab. o.
r. S. in pri-
ma figure
sinulo po-
nitur.
s. 3 fig. M.
N, O.
t. 16 muscu-
tab. F. G. et
13 tab. r.
u. primus
muscu. tab.
n. secundus
10 tabu. s.
tertium uel
tab. z.
x. 2 fig. Z.
X. una li-
nea, altera
a, b. eius-
dem figu-
ra. 1, 2 figu-
ra. 3.
x. 1, 2 fig. 3.

licet femur sedentibus magis in angulum flecti oportebat, quàm stantibus aut aliud quid agere
 extendi, aut in posteriora duci. Præterea in humiliori coxendicis acetabuli sinus seu
 perigliorum sede, id quoque animaduertendū est, supercilia nō cōtinuo ductu orbiculatim ferri,
 sed incidi ac intermiti, ac ueluti iter parare uenulæ hac in asperam & cartilagine nō obductam
 acetabuli sedem exporrectæ, articuloq; alimentum suppeditanti, à quo uiscidus humor (quem
 in hoc articulo plurimum coaceruari decet) adaptetur, cuius demum auxilio articulus prom-
 ptè mobilis euadat. Ne tamen sinus huius in supercilio incisi ratione, articulus luxationi obno-
 xius reddatur, Natura ualidum cartilagineumq; ligamentum orbiculatim supercilijs adnexuit,
 quod nullibi intermissum apparet, sinumq; adhuc magis quàm supercilia adauget, & uenulæ
 illi uiam præbet, inter os & posteriorem ipsius ligamenti sedem prorepentis, ut uena simul tu-
 rō feratur, & sinus ille luxandi promptitudinē non adiuet, ut eunque etiam hæc femur crebrius
 luxari cernamus. At de ligamenti uenisq; suis agemus locis. Nunc autem perpendenda ue-
 niunt cæca foraminula, pascim in coxendicis ossis acetabuli superciliorum externa sede in hoc
 parata, ut ualidissimum educant ligamentum, orbiculatim femur coxendicis ossi colligans.
 Quinetiam in hoc osse sedes animaduertenda est, quæ inter ilium ossis anteriorem partem,
 quæ sacro cōmittitur ossi, & posteriorem coxendicis regionem conspicitur, & ut neruosi-
 am exculpta, qui crus adeuntium quartus, omniumq; corporis neruorum ex pluribus
 compositus maximusq; existit. Est quoq; hic obseruandus coxendicis ossis acutus processus,
 qui ligamentum educit, in transuersum processum quinti sacri ossis pertinens, & qui mus-
 culo principium porrigit, quem aut decimo femur mouēti musculo alcribimus, aut priuatim
 undecimum femur mouentium numerabimus. Neq; etiam prætereundus uenit sinus cox-
 endicis ossis posteriori internæq; regioni sub dicto nuper processu exculptus, ad quem mira Na-
 turæ solertia ueluti ad trochleæ rotulam decimus femur mouentium musculus reflectitur. Insu-
 per nō perfunctoriē coxendicis ossis appendix indagabitur, toti infimæ ipsius sedi, cui seden-
 tes innituntur, adnata. Appendix hæc ossis, cui coalescit, amplitudinem seruat: quod cum ro-
 boris gratia, tum musculorum exortus causâ insigniter crassum, & ut eunque amplum uisitur.
 Ab hac enim appendice, ut minimum, quatuor grandes exoriuntur musculi, quorum singula
 capita priuatim in appendice impressionem sedemq; sibi uendicāt, in emundato osse satis con-
 spiciam. Ac primus quidem musculus tibiæ mouentium tertius erit, qui ab elatiore eius ap-
 pendicis sede principium ducit. Secundus tibiæ mouentium quartus habebitur, atq; huius
 principium minus quàm primi musculi latum est, ac magis uersus anteriora, iuxta extimum
 primi musculi latus pronascitur. Tertius autem musculus, mihi tibiæ motorum quintus ha-
 bebatur. Quartus uerò, maxima portio est eius musculi, quem Galenus quintum tibiæ mo-
 uentium recenset, mihi autem femur mouentium quintus constituetur: qui maximam præsen-
 tis appendicis sedem suo principio occupans, totius corporis musculorum facile maximus est.
 Sic itaque media eius, quod describimus, ossis pars se habet, quam coxendicis os nuncupa-
 mus. Anterior uerò, quæ Pubis os dicitur, tenuis ut eunque cernitur, & dextrum os sinistro
 cartilaginis interuentu quasi unionis modo cōmittitur. quo enim homo ætate fit prouectior,
 eo semper connexus iste minus cartilagine oppletur, minus uel cartilaginis ostendit. Atque id
 uiris pariter ac mulieribus commune est. Neutiquam enim ob uulgi sententiam arbitrandum
 est, pubis ossa uiris esse cōtinua, mulieribus autem in hoc cartilaginis interuentu compacta, ut
 partus tempore remitti atque inuicem disungi queant. Parturientibus namq; mulieribus (uti
 neque quadrupedibus) hæc ossa inuicem haud disunguntur: uerum id mulieres in hoc ossium
 coalitu peculiare sibi uendicant, quod ipsis non tam longa linea, atque in uiris, committuntur.
 Deinde coxendicis ossium infimæ partes, dextram dico & sinistram, in mulieribus mutuo lon-
 ge magis distant, quàm uiris. Præterea infimæ pubis ossium partes inuicem sub ipsorum con-
 nexu diremptæ, multo etiam magis mulieribus quàm uiris seiunguntur ac distant. Adcō ut in
 mulierum ossibus uacua sedes inter coccyx os & internas regiones infimarum partium coxen-
 dicis ossium, multo amplior quàm in uiris occurrat. hæcq; differentia tam est insignis, ut uel
 ipsa abundè doceat, pubis ossa in partu non recludi, etiam si tactus inter pariendum, idem
 non leui opera attestaretur. Quantum uerò ad hanc amplam sedem magis adhuc partus tem-
 pore dilatandam coccyx os iuuat, licet animalia, quæ caudā habent, id liquidò parientia osten-
 dant: tamen id quoque in mulieribus obseruare integrum est, quibus id os extrorsum caudæ
 modo adcō porrigitur, ut etiam huius ossis gratia ipsis sedes in circulum incisæ apud omnes
 quas unquam uidi nationes adaptentur. Atque ideo etiam pleræq; mulieres genibus innixæ,
 & aliquantisper antrorsum inflexæ felicius pariunt: quemadmodum contrā erectæ, aut re-
 trorsum inclinæ, difficilius. Atque ita excludendo fecui Natura foemini prospexit. Quod au-

⑤ Sinus quod
 crassissimus
 corporis ner-
 uus feritur.
 Coxendicis os-
 sis acutus pro-
 cessus.

Sinus ad quē
 decimus femur
 mouentium mu-
 sculus uolui-
 tur.
 Appendix cox-
 endicis ossis.

Libra de Ad-
 min. st. dissect.

Pubis ossis
 infimæ

Ossium sacro
 ossi nexorum
 in uiris & mu-
 lieribus disse-
 rentia.

tena

Cur pubis os
maximo fora-
mine peruium,
& dein ipsius
sinus & tube,
74.

tum minori negotio leuiusq; uterum gererent, ilium ossa mulieribus multo ampliora sunt, ipforumq; spina in latera longè magis quàm in uiris, educitur, & etiam illa ossa exorsum infignius cauantur: & ut femel dicam, hæc commodam gestando fetui sedem efformant. Quòd autem nuper natis puellis partus facilioris gratia, apud nullas gentes pubis ossa aut comprimentur, aut distinguntur, neminem dilectionis studiosum latere arbitror: quantumuis id pertinaciter uulgus nunc de his, nunc illis nationibus affirmet. Quamobrem uero pubis os maximo totius corporis ossium⁹ foramine (quod etiam propter magnitudinem ab ostij imagine *bucodæ* nunc cupatur) peruium sit, illi demum cognoscunt, qui ad amulsim inter fecundum di-
dicere, qui nam musculi à coxendicis & pubis oisibus pronascantur. Illi enim arguunt⁹ pubis os amplam & aptam educendis musculis sedem necessariò oportuisse fieri. Ne uerò interim frustra animal graueretur, fed ut leue esset, eo quo diximus foramine donatur. Neque est quod hæc aliquis⁹ uasa feminaria, aut maximas crurum⁹ uenas &⁹ arterias, aut etiam⁹ neruos deduci ar-bitretur: quemadmodum nemo non credit, qui etiam Anatomes rudis, nudam ossium compagem intuetur. Illa enim organa aliam nascuntur uiam, quippe maxima crus petens uena, arteriaq;, simul cum⁹ secundo crus adeunte neruo, proprium⁹ sinum exigunt, in superiori pubis ossis fedem inuatū, è regione elatioris sedis nuper dicti⁹ foraminis. Porro feminarijs uasis etiam elatus quam pubis os prominenter abdomine iter paratum esse audies. Deinde ingens illud pubis ossis foramen ualida⁹ membrana oppletur, quæ⁹ musculus internæ foraminis sedi proximum ab illo dirimit,⁹ qui externam foraminis fedem occupat. Neque profectò aliiquid, foramen hoc transit, præter⁹ uenam, &⁹ arteriam, neruumq; non ad genus usq; ramorum serie digestum. Præterea hæc uasa non per foraminis medium feruntur: sed in elatiori forami-nis fede^a sinus cælatur, illis uasis deducēdis paratus. Quòd uerò superior pubis ossium⁹ pars, qua inuicem committuntur, aspera est, ideo contigit, quòd⁹ rectos abdominis musculos hinc enasci Naturæ uisum fuerit. Deinde anterior quoq; ossium fedes inibi aspera est, ut neruorum caput⁹ secundi tibiae mouementum musculi hinc rite pronaceretur. Ad hæc, in anteriori pubis fede^a à coxendicis ossis acetabuli interno latere, ad pubis ossium commissuram usque, tuber & quedam ueluti prominentia conspiciunt, à qua⁹ octauus femur mouementum musculos prin-cipium ducit. Quemadmodum hæc anterior pubis ossis fedes protuberat, ita quoque poste-rior⁹ acutum ostendit lineam, à qua⁹ musculus femur mouentiū decimus sui exortus⁹ portio-nem assumit. His omnibus accedit pubis ossis⁹ crassities, iuxta infimam pubis ossium con-ne-xus sedem, & magni illius foraminis internum latus, ubi pubis os quodammodo teres crassumq; ob hoc uiuitur, ut ipsius ossis robur adaugeatur: utq; hinc præter quoddam penis⁹ musculos alterum corpus⁹ eorum que penem constituunt, originem duceret. Atque in hunc modum ossa se habent, sacri ossis lateribus connexa. quæ in ætate prouectis duo tantum apparent, sin-gula (uti relatum est) duobus tribus ad appendicibus. In nuper natis uerò pueris utrunque os tribus constat ossibus, quæ donata appendicibus. In nuper natis uerò pueris utrunque os tribus constat ossibus, quæ donata appendicibus. In nuper natis uerò pueris utrunque os tribus constat ossibus, quæ donata appendicibus. In nuper natis uerò pueris utrunque os tribus constat ossibus, quæ donata appendicibus.

Verùm quum hæc non minus in agnis hecdidq; quàm hominibus sint conspicua, cuius uel inter edendum ea obseruari est integrum.

Ossa sacri of
fis laterib. cō-
missa in pueru
lis tribus effor
mari ossibus.

DE FEMORE. CAPVT XXX.

CHARACTERVM QVI DVABVS PRAESENTIS

Capitis figuris sequenti pagina proponendis adhibentur, Index.

- A*_{1,2} Caput femoris acetabulum ossis coxendicis subiens.
*B*₁ Sinus femoris capiti insculptus, & teretis ligamenti insertionem à coxendicis osse excipiens.
*C*_{1,2} Appendicis, rotundum femoris caput efformantis, cum reliqua femoris portione coalitus.
*D*_{1,2} Cervix femoris.
*E*_{1,2} Inferiora femoris capita, ac *E* quidem internum, *F* uerò externum notat.
*G*_{1,2} Hæc linea coalitum indicat appendicis, duo inferiora femoris capita constituentis.
*H*₂ Sinus, qui utriusque capitibus *E*. & *F* insignitis est communis, ac quem patella subit.
*I*₁ Sinus ac interuallum, duo inferiora femoris capita inuicem dirimens.
*K*₁ Ab hac sede interioris capitis primus pedem mouentium musculus initium ducit.


1,3 figu.
 .C 1,2 fig
 L_{HR}. R₂R₃

 $x_{1,2,3} \text{ f.r.}$

y 20 fi. lib.
 5 c. et iucr
 sus u. aut 20
 fig. 7 ad f.
 x fig. cap.
 6 lib. 3 f.
 a fig. ca. 12
 lib. 3 q.
 b 2 fig. ca.
 11 li 4 cho
 raft. 71.
 c eiusdem
 fi. charact.
 60.
 d 1, 2, 3 fig.
 V.

Li

L 1. Hinc secundus & tertius pariter pedem mouentes musculi exoriuntur.
M 1. Huic interni capitis sedi, quinti femur mouentium musculi tendo inseritur. Reliquorum autem characterum indicem figuris subiiciemus.



PRIMA TRI

GESIMI CAPL
tis figura, dextri femo-
ris os posteriori facie
delineatum re-
ferens.

SECUNDA

FIGVRA, FEMO-
ris dextri anteriorem
faciem osten-
dens.

- N* 1, 2 Sinus in externo inferiorum femoris capitum exculptus latere, ac quartum tibiam mouentium musculum uehens.
O 1 Hac sede internum latus interioris femoris capitis compressum est, ut hac tendines primi, secundi, tertij & quinti tibiam mouentium musculorum porrigerentur.
P 1 Hac regione idem interioris capitis latus insigniter protuberat.
Q, R, S, V, X, Y Exterior femoris processus. uerum singuli characteres nō in utraq; figura simul obuij aliquid priuatim, ut modo subiiciā, indicant. Quidem in prima et secūda coalitum huius processus appendicis ad reliquum os, *R* in prima sinū internæ præsentis processus sedi cælatū.
T, T. S in prima figura exterioris processus prima indicatur impressio. Cæterū *T, T* in prima, insignitur aspera linea deorsum a prima impressione ducta: *V* in secūda, exterioris processus secūda impressio: *X* uerō, tertia impressio. At *Y* in ambabus figuris quarta indicatur impressio.
a, b, 1, 2 Interior femoris processus. *V* erum b priuatim in secunda, hic appendicis coalitum indicat.
c, c 1 Linea aspera, a radice interioris processus deorsum oblique gratia octauū femur mouentium musculi procedens.
d, d 1 Linea secundū femoris longitudinem protuberans, & quinti femur mouentis musculi insertio-
nem admittens.
e 2 Hac sede femur amplum est, quum interim reliqua fere longitudine teres sit.
f, f 2 Aspera sedes, a qua octauus tibiam mouentium musculus sui exortus initium ducit.

M FEMO-



Femoris su-
perius caput.

Duo inferior
ra femoris ca-
pita, et eorum
den sinus.

Lib. 3 de V su
part. 2 de
Administ. dis-
sect.

FEMORIS os magnitudine cunctis humanæ fabricæ ossibus præstat, in
auibus autē & omnibus ferē quadrupedibus tibiæ ossi & fibulæ (quum
hæc adest) longitudine cedit. Hoc suprà quidem coxendicis ossi, intra au-
tem diuersa articuli ratione, ossi tibiæ coarctatur. Superiori enim parte,
qua similiter atque inferiori appendice donatur, robustissimum caput
obtinēt, proluxæ quidem^a ceruici ad interiora inclinatæ adnatum, coxen-
dicisq; ossis^b acetabulo exquisitè congruens. Vniuersum hoc caput læue
& cartilagine incrustatum uisitur: at in sui medio nonnihil inferius, quàm ipsius uerticis (ut sic
dicam) centrum consistit, angustum profundumq; & inæqualem cōmonstrat^c sinum, cui teres
ligamentum à coxendicis ossis acetabulo enatum, ualidissimè implantatur. Inferiori autē sede
femur insigniter crassum est, & in duo^d capita omnium totius corporis ossium capitum maxi-
ma dirimitur, quæ in posteriorem femoris sedem longè magis quàm in anteriorem porrigun-
tur, quemadmodum etiam ipsorum cum tibiæ osse articulo ex usu fuerat. Hæc nanque ossi ti-
biæ mutuo ingressu ad eum modum articulantur, ut tibia duntaxat flecti extendiq; possit, ne-
quaquam uerò in latum, uel tantillum quidem, duci, utcunq; etiam id Galeno uisum fuerit, qui
in tibiæ motuum examine, femoris ad coxendicis os motu deludebatur. Cæterum femoris ca-
pita retrorsum ideo producuntur, quod tibiā in angulum flecti, nec extra rectam lineam ex-
tendi, aut antrosum erigi satius erat: adeo ut motus illius ratione femoris capita in anteriori se-
de moris sede nequaquam promineāt. & quamuis hæc, in anteriori eorumdem sede, sinum osten-
dant utrisq; capitibus communem, & impenitē patulum, læuicq; cartilagine incrustatum, is ta-
men aliquo tibiæ ossis tubere excipiendo non paratus est. at os orbiculare & breui scuto non
abfimile apto^e tubere sinum illum tubere audies, quum secundo ab hoc Capite eius ossis sermo
instituetur. In posteriori femoris sede capita hæc magno^f intervallo inuicem dirimuntur, atq;
in ipsorum medio amplum profundumq; sinum utcunq; asperum, & cartilagine nequaquam
obductum exigunt. Is nanque asperum inæqualeq; tibiæ ossis^g tuber excipit, quod in tibiæ
ossis sinuum medio protuberare, ac^h ligamentū educere scribemus, quod ualidissimè illi sinui
instituitur, unā cum alio admodum robusto à posteriori tibiæ ossis sede pronato. lnuat etiam si-
nus iste, deducendo totius corporis maximoⁱ neruo hac simul cum^j uena & arteria in tibiā
contententi. Humiliora enim femoris capita, quum tibiæ motuum gratia adeo in posteriora
ducantur, etiam id præstant, ut in illorum medio neruum illum cum uasis tuitissimò deor-
sum repere sinant. atque etiam processuum modo aliquot musculorum pedem mouentium
principia porrigant. Ab elatiori nanque interni capitis^k sede primus pedem mouentium^l mu-
sculus enascitur. Ab externi autem capitis elatiori^m sede, secundus, & tertius quoque, pedis
motibus præfecti exoriuntur. Dein siⁿ musculus in poplite latitans ab osse aliquam sui exortus
portionem sumit, hanc sanè ab externo hoc femoris capite mutuatur. quanquam præcipua
ipsum origo ex^o ligamento pendere docebitur, dictum nunc femoris caput tibiæ potissimum
colligans. Deinde in elatiorem capitis interni^p regionem modicè uersus eius capitis internum
latus tendo inseritur, quinti femur mouentis musculi, cuius etiam insertionis occasione hoc
femoris caput inibi compressam ostendit sedem, tendini excipiendo aptam. Canes in hac ossicu-
lum paruum, & illis^q quæ selemo comparamus simile ostendunt. Atque ita anterior & inferior
posteriorq; horum capitum sedes se habent. latera uerò eorumdem multis cecis foraminulis op-
plentur, ut ualidissima genu articulum continentia ligamenta hinc apte pronascentur. Porro
externum exterioris capitis latus, priuatim^r sinum exigat obliquè ipsi iuxta posteriorem eius la-
teris regionem insculptum, ac^s quarti tibiā mouentium musculi tendini paratum. quo mi-
nus enim tendo ille hac obliquè reflexus, à suo ductu aberrat. Natura ipsi hunc sinum præpa-
rauit. At internum latus interioris capitis, etiam si ad id plures reflectatur^t tendines, tamen nul-
lum eiusmodi sinum adipiscitur. Verum emundato iam osse iuxta posteriorem lateris sedem^u
compressio apparet, qua turò tendines deferri queant, à sua sede tuberis beneficio non redi-
nantes, quod in medio dicti nunc lateris latè^v protuberat, atque secundum ipsius posteriorem
sedem tendines opportunè deferri sinit. Tendines autē hæc deducti, trium primorū & quinti
tibiā mouentium musculorum censentur. Ad femoris ossis ceruicem, cui superius femo-
ris caput adnascitur, duo conspiciuntur processus, quorum^w alter externum femoris latus oc-
cupat, ac omnium corporis processuum nulli alteri ossi commissuram facile maximus est, in-
gni etiam donatus appendice. Alter minor est, & quod ad magnitudinem spectat priori neu-
tquam comparandus, multoq; inferius in interno femoris latere nonnihil uersus posteriora
conspiciuus, & appendice similiter adactus. Græci ambos προχωρητας, quasi rotatores dicas,
nuncupant: hunc anteriorem, illum uerò posteriorem appellantes. quum tamen simpliciter

Duo femoris
processus, seu
rotatores.

a told 1, s
fi. et inter-
grarum A,
superius cit
w, inferius
cum o ari
culatum.
b 1, 2 fig. su-
pra C, in
fra G.
c 1, 2 fig. A.
d 1, 2 fig. D.
e 1, 2 fig. ca.
29 c. fig.
f 1 fig. B.
g 1 fig. cap.
49 lib. 2 P.
h 1, 2 figur.
E, F.
i lunge E.
F, 1, 2 fig.
ad G, F, I
7 figuræ
cap. 31.
h 2 figur. H.
l 2 fig. cap.
32 A, B, C,
D.
m 1 figur. I.
n 7 fig. cap.
31 L.
o fig. ca. 1 li.
2 X.
p 10 musc.
tab. f. de in
o. f.
q ultime fi.
lib. 3 r. u.
r 1 figur. K.
s 12 muscu.
tab. o.
t 2 fig. L.
u 12 muscu.
tab. r.
x 13 tab. o.
y 14 tab. r.
z fig. cap. a
lib. 2 T.
a 1 figur. M.
b 12 muscu.
tab. z. de in
o. f.
c 2 fig. cap.
33 v. u.
d 1, 2 fig. N.
e 10 musc.
tab. r.
f 16 muscu.
tab. tendi-
nes muscu-
lorum L. a.
R, V, V. aub
2 tabu. q. r.
b, d, f, o.
g 1 figur. O.
h 1 figur. P.
i 1, 2 figur.
Q, X.
k femora fi-
guræ cap.
3 hic autem
Q.
l 1, 2 fig. a.
m 2 fig. b.

n s muscu.
 tab. v. nus
 o, alter A.
 In 14 autē
 tab. c. d.
 o i fig. c. c.
 p 7 muscu.
 tab. n.
 q i fig. R.
 r Specta 13
 muscu. tabu-
 le 2, 3, 7,
 2, n.
 i primus 9
 muscu. tabu.
 n. secund.
 10 tabu. 2.
 tert. 11 tab.
 2, quart. 11
 tab. 2.
 t i fig. S.
 u i f. T. T.
 2 i fig. V.
 7 i fig. X.
 2 i fig. Y.
 a 5 muscu.
 tabul. A. 10
 tab. u.
 b ab f ad
 G figur. 2.
 e d c ad G
 figur. 3.
 c 7 muscu.
 tab. 3, 13
 tab. A. 2.
 d 2 fig. f.
 e i fig. d. d.
 f 12 muscu.
 tab. 2, 2.
 g 13 muscu.
 tab. 13, 1.
 h i fig. e.
 i Progres-
 sus est ab
 A per D, c.
 e, d. d. ad i f.
 gure 1. aut
 per D. f.
 ad H f. 2.
 Aut expen-
 de integra-
 tum fig. A.

ἡγοῦνται dicunt, perpetuū externum subaudiunt, quem etiam propter amplitudinē & quan-
 dam cum nate imaginē γλαττόν vocarunt. Horum processuum idem usus cum reliquis fe-
 re ossium processibus est, in hoc enim parantur, ut collis ritu musculorum insertionem probē
 admittant, alijsq; musculis eleganter principij sui sedem præbeant. Interior namque femoris
 processus, qui modicē oblongus, neque admodum inæqualis est, in hoc prominet, ut illi^o sexti
 & septimi femur mouentium musculorum tendines inferantur. Ad huius processus radicem
 in posteriori femoris sede aspera quædā ducitur^o lineā, obliquē deorsum in posteriora aliquō
 usque ducta, & octauī femur mouentis^o musculi insertioni aptata. Exterior femoris processus,
 externa sui sede gibbus est: interna autem, qua femoris caput respicit, sinuatus. Hic enim aspe-
 rum inæqualemq; commonstrat^o sinum, cui^o nonus & decimus femur mouentes musculi in-
 feruntur. Externa autem sedes, quæ gibba est, in ossis hominibus & ætate præuectis, quatuor
 impressiones sedesq; commonstrat, quatuor musculorum insertionibus excipiendis para-
 tas. Ac prima quidem ampla est, & gibba in posteriori processu sede apparens, cui primus fe-
 mur mouentium musculus ampla insertionē implantatur. Ab huius compressionis radice aspe-
 ra quædam^o lineā deorsum per femoris posteriora nonnihil obliquē deducitur, cui primus ille
 femur mouens musculus ualidissimē etiam inseritur. Secunda compressio exterioris proces-
 sus in anteriori ipsius consistit latere, magis quā prima inæqualis & aspera, & utcunque si-
 nuata, ac demum secundi femoris motuum autoris musculi feruens insertioni. Tertia ad su-
 periorē processus sedem uisitur, inter primā & secundā elatiorē consistens sedes. Hæc gib-
 ba est, & insertionē tertij femur mouentis musculi excipit. Quarta in apice processus se offert,
 reliquis tribus longē arctior, & quarti femur mouentis musculi tendinē admittens. Atque
 horum sanē musculorum insertionem exterior processus excipit, ab ipsius uero radice in ante-
 riori externaq; ipsius sede^o musculo principium præbet, qui tibie motorum septimus recen-
 sebatur. Quod uerō ad reliquam femoris formam spectat, uniuersum femur anteriori ipsius se-
 de, & in lateribus teres & utcunque læue est, undique ab^o octauo tibiam mouentium musculo
 circumdatum, cuius gratia anterior femoris sedes iuxta ipsius ceruicis radicem nonnihil ampla
 est, & aspera, quo ualidiū & ampliori principio musculus ille enascetur. In posteriori au-
 tem sede femur in acutum quodammodo fertur, & lineam insigniter protuberantem & aspe-
 ram inæqualemq; ostendit, quæ a femoris processuum radice aliquō usque ultra medium lon-
 gitudinis femoris proripit. Huic lineæ^o quintus femur mouens musculus pertinaciter inferi-
 tur, ipsaq; duntaxat ex reliqua femoris amplitudine, ab octauo tibiam mouenti musculo, non
 circumdatur. Porro ad inferiorem huius lineæ^o sedem, ac iuxta inferiorum femoris capitum
 radicem, femur amplum depressumq; nō autem teres cernitur, quo tutius hæc maxima tibiam
 petens uena cum arteria & nervo feratur, neque si femur hīc gibbum esset, a femore errabun-
 da declinet. Quamuis & femur hīc ad suorum inferiorum capitum productionem latescere
 crassescereq; etiam debeat. Caterum femoris ductus non recto tramite a coxendicis ossis ace-
 tabulo deorsum tenditur. Verum femoris ceruix a capite ipsius ualde extrorsum obliquē, &
 quasi transuersim fertur, & hinc femur rursus reliquo ipsius corpore obliquē uersus interiora
 ad genu descendens procedit. Quam sanē figuram non obiter Natura excogitauit. est enim
 laudatissima, quamq; Hippocrates in libro de Fracturis in effracto femore sedulo seruandam
 præcipit. Quando quidem omnes quibus a prima conformatione femur rectius, quā ho-
 mini ex usu est, contigit, uari & claudi in genu redduntur. Hoc autem quā non modò ad
 cursum, sed ad ambulationē, firmamq; stationem noxiū sit, quotidiē uidentes discimus. Atqui
 si utriusque femoris ceruix non statim a coxendicis articulo, uti diximus, foras porrigeretur,
 quænam sedes internis femur amplexantibus musculis reliqua esset? quæ rursus nervis, ue-
 nis, ac arterijs in uniuersum crurū distributis: quæ item glandulis horum uasorum propaga-
 tionī præfctis? Non enim per externas cruris regiones hæc descendere decebat, quum ita
 omnibus foris occurrentibus leui quaque occasione lædenda, exponerentur. Si igitur uenis,
 arterijs, glandulis, musculis pluris ipsdemq; maximis hanc regionem inibi parare oportuit,
 necessum quoque fuit, ex acetabulo femur foras extrorsum uē abscedere. Porro si quibusdam
 capitis femoris ceruix minus foras educitur, his statim inguinum sedes angustæ & inuicem
 compressæ redduntur, præterea his femur simul cum genu turpiter extrorsum abducitur. Me-
 ritò itaque uniuersa femoris forma curua gibbaq; exteriori regione existit, interiori uerò sub ca-
 ua. Pariter quoq; & magis adhuc femoris posterior pars sima cauaq; uisitur, anterior autē gib-
 ba, quò ad sessiones is femoris ductus admodum sit idoneus: uti etiam ad multa quæ sedentes
 obimus munia, quando scilicet unum femur alteri inijcimus. Ut modò taceam, quā elegtæ
 femur musculis cedit, posteriori ipsius sedem occupantibus,


Femoris secun-
 dum ipsius len-
 gitudinem for-
 ma.

ANDREAE VESALII BRUXELLENSIS
DE TIBIAE OSSE ET FIBULA CA. XXXI.

PRIMA. CAP. SECUNDA. TERTIA. QVARTA.
XXXI FIGVRA.



QVINTA. SEXTA. SEPTIMA. OCTAVA.



NONA. DECIMA. VNDECIMA.



TRV.

VNDECIM præpositæ modo figuræ ad dextram spectant tibiam, ac primæ utrumque in tibia locatum os anteriori facie exprimit, crassius nimirum interiusq; quod tibiæ os uocabimus: & gracilius, quod exterius positum fibula nobis potius quàm sura nuncupabitur. Secunda figura tibiæ os simul cum fibula posteriori facie appositissime delineatur. Tertia solius tibiæ ossis anteriorem sedem commonstrat. Quarta tibiæ ossis posterior facies oculis subiicitur. Quinta fibulam anteriori facie exprimit. Sexta fibulam posteriori sede delineatam exhibet. Septima tibiæ ossis superiorem ostendit sedem, cui femur articulat. Octaua duas continet cartilagine, quæ sinus adaugent, quibus femoris capita excipiuntur. Nona in am tibiæ ossis & fibule sedem anteriori parte proponit, ut cavitās in conspectum ueniret, tali cum tibiæ articulationi parata. Decima solam tibiæ ossis infimam sedem posteriori ex parte delineatam offert, quæ talus excipitur. Undecima internum latus inferioris fibulæ appendicis, commonstrat, quod talo articulat. Characterum autem index erit huiusmodi.

A, B His duobus characteribus in prima figura, superior tibiæ ossis appendix notatur. In tertia uerò & secunda, indicatur linea coalitum commonstrans appendicis cum reliqua ossis portione.
 C Appendix superior fibulæ in prima figura indicatur, in quinta autem coalitus appendicis cum reliquo osse insignitur.

D In prima appendix tibiæ inferior, in tertia appendicis coalitus indicatur.

E In prima appendix fibule inferior, in quinta coalitus appendicis ad os notatur. & quamuis eius modi appendices coalitusq; non in omnibus figuris notauerim, nulli tamen non obuias esse appendices arbitror.

F, G, 2, 4, 7 Sinus tibiæ ossis, quibus inferiora femoris capita articulantur.

H, I, K 7 Tibiæ ossis tuber, sinus, quibus femoris capita excipiuntur, dirimens, ac H quidem ipsius anterior sedes indicatur. I uerò media & impensius prominens. K autem posterior. Atq; hi characteres in eius tuberis sedibus, quæ sinuantur, obuij sunt. & horum K & I in secunda figura, tertia & quarta idem quod in septima, indicant.

L 8 Cartilago dextrum tibiæ ossis sinum adaugens, quo externum femoris caput excipitur.

M 8 Cartilago sinistrum, seu dextræ tibiæ ossis internum sinum augens, cui internum femoris caput articulat.

N 8 Hac sede cartilagine, tibiæ ossis sinus augentes, uidentur crassissimæ.

O 8 Hac sede nuper dictæ cartilagine sunt tenuissimæ, ac ante sinuum centrum deficiunt.

P, P 8 His sedibus illæ cartilagine in apices terminantur.

Q 5 Fibulæ sinus leuiter ac in superficie cælatus, cui tibiæ ossis tuberculum iam R. indicandum, coarticulat.

R 4 Tuberculum, seu caput tibiæ ossis, quod fibulæ coartulat.

S 4, 10 Sinus tibiæ ossis, quo inferiorem fibulæ sedem excipit.

T 5, 6, 11 Internum fibulæ latus, quod tibiæ ossi committitur. Cæterum V in secunda figura superioris rem connexum fibulæ ad tibiam indicat: X uerò inferiorem. Y autem interuallum notat, quo Y. hæc ossa inuicem dehiscunt.

Z 1, 2 Hac sede fibula nō recta ducitur, sed introrsum nōnihil obliquatur, exterioriq; latere sinuata.

a, b 1, 3, 7 Anterior tibiæ ossis sedes, in quam musculi tibiam extendentes inseruntur.

c 5, 6 Superioris fibulæ appendicis processus, cui tendo quarti tibiam mouentis musculi inseritur.

d, e, f, g, h 9 Sedes, cui superior tali pars, lateraq; articulantur. ac d quidem e, & f superiorem huius sedis regionem in nona & decima figuris commonstrant. Deinde rursus d notat eius regionis tuber. e uerò & f partem huius regionis utriusq; ad tuberis d notati latus altius quàm ipsum tuber insinuatam. Porro g sedis huius internum latus indicat, quod ab externo latere constituitur processus inferioris appendicis tibiæ ossis, quem φ in prima figura indicat. Cæterum h in nona & undecima externum huius sedis, quæ talo aptatur, latus ostendit, ab interno constitutum latere appendicis inferioris fibulæ in prima figura E notatæ.

φ, i φ in prima figura processus indicatur inferioris appendicis tibiæ ossis, qui exterior est malleolo.

M 3 lus,

lus. Cæterum i in secunda, tertia, nona, & decima eundem appendicis processum notat.

k 4, 10 Sinus interioris malleoli, ex quo cartilagineum ligamentum talo inseritur.

l 1, 3, 9 Sinus asper & inæqualis in anteriori sede inferioris appendicis tibiæ ossis conspicuus, à quo ligamentum cartilagineum ad tali ceruicem pronascitur.

m 2, 4, 10 Hæc sede sinus spectantur, qui tres tendines ad pedis inferiora protensos deducunt.

n 2, 5, 6, 9 E quidem in prima figura externum notat malleolum. is namq; aliud nihil est, quam inferior fibulæ appendix. Verum n in plerisque figuris hunc malleolum exprimit.

o, p 1, 5 Vmbrata hæc fibulæ sedes ab o ad p usq; pertinens, ea fibulæ pars est, quæ nuda nullisq; musculis tecta ante sectionem se offert.

q, r 2, 6 Hæc septimi & octavi musculorum pedem mouentium tendines reflectuntur, quorum occasione fibula hic sinuata est.

r 2, 6, 11 Sinus inferioris fibulæ appendicis, à quo ligamentum in talum fertur.

s, t 1, 5 Prima fibulæ linea, seu primus eiusdem angulus.

t, t 1, 2, 5, 6 Secunda fibulæ linea.

u, u 1, 2, 5, 6 Tertia fibulæ linea.

x, x 1, 5 Primum fibulæ latus. Verum x & x priuatim huius lateris lineam indicant, inibi gratia musculi pollicem extendentis modice prominentem.

α, α 1, 5 Secundum fibulæ latus.

β, β 2, 6 Tertium fibulæ latus.

γ, γ 1, 3 Prima tibiæ ossis linea.

δ, δ 1, 2, 3, 4 Secunda tibiæ ossis linea.

ε, ε 1, 2, 3, 4 Tertia tibiæ ossis linea.

ζ, ζ 1, 3 Primum tibiæ ossis latus.

η 1, 3 Secundum tibiæ ossis latus.

θ 2, 4 Tertium tibiæ ossis latus.

κ 2, 4 Aspera tertij tibiæ ossis lateris linea, cui musculus in poplite latitans inseritur.

Tibia.

Fibula.

Tibiæ os.



Tibiæ ossis
fibulæ ap-
pendices.

Sedes cui fi-
mur ad tibiæ
articulatur.

Cartilagine
quibus tibiæ of-
fis sinus augē-
tur.
Lib. 3 de V su
parte. & in cō-
mentarijs in
Hippo. libru
de Fracturis.

N TIBIA similiter atque in cubito, bina reponuntur² ossa, quæ Hippo-
crates perpetuò tibiæ ossa appellat. achorū³ alterū interius est & crassius,
quod totius membri nomine *levius*, & tibia nuncupatur:⁴ alterum verò
exteriùs locatur, & interiori crassitie admodum cedit, Græcis quidem *ὑπο-
γῶν*, Latinis autem fura & fibula uocatum. Ego euidentiore doctrinæ stu-
dio crassius os, tibiæ os appellabo, id à tibia, hoc est toto membro distin-
guens, quod his ossibus, musculis, uenis, arterijs, nervis, & cute hæc om-
nia ambienti formatur, Gracilius autem os fibula opportunè dicetur, ut id à fura, quam Græ-
ci, quia ueluti tibiæ uenter est, *ὑποσπονδυλίαν* nuncupant, distinguatur. Tibiæ itaq; ossi & fibulæ
suprà infraq; appendix coalescit, ac superior quidē tibiæ ossis⁵ appendix admodū crassa lataq;
est, anteriori tamen sede crassior, ac in anteriori tibiæ regione magis quàm in posteriori⁶ deor-
sum duci cernitur. Huic⁷ duo oblongi insculpuntur sinus, inuicem⁸ aspero inæqualiq; tubere
distincti, & lubrica cartilagine incrustati. His sinibus inferiora femoris⁹ capita excipiuntur. tu-
ber autem sinus distinguens, grandem¹⁰ sinum subit, femoris capita posteriori in sede dirimen-
tem. Dein tuber ex superiori¹¹ mediūq; ipsius sede, quæ aspera & sinuata, neque ulla cartilagine
inuncta uisitur, ualidissimum emittit¹² ligamentum, nuper dicto femoris capitum interuallo
sinui¹³ ue insertum. Adeò sanè, ut media huius tuberis sedes in hoc aspera sinuataq; sit, quò sceli-
cius ligamenta in femur porrigat, hæc ē maxime protuberante sua sede, ac deinde ex¹⁴ poste-
riori ipsius regione educens. Ab¹⁵ anteriori namq; tuberis regione, quæ minimum prominet,
etiam si illa similiter aspera sit, ac latè sinuata, nullum tamen ligamentum femori inseritur, sed li-
gamenta inibi producantur, quæ¹⁶ cartilagine anteriori huius tuberis sedi colligant, quas ti-
biæ ossis sinus iam augere dicam. Quum enim duo tibiæ ossis sinus femoris capita admitten-
tes, quodammodo superficietenus duntaxat insculpantur, neque ad amussim femoris capitum
gibbis (etiam si Galeno secus uisum fuerit) suis cauis respondeant, Natura mirabili artificio si-
num profunditatem adauxit, quippe præter lubricas cartilagine tibiæ ossis sinibus & femo-
ris capitibus crustæ modo obductas, utrique sinui unam adhibuit cartilaginem, neque femo-
ri, neque tibiæ ossi aliter quàm ligamentorum beneficio connexam. Hæc nanque orbiculatim
ligamenti genu articulum amplexantibus solum connascitur, & præterea ligamenti interuen-
tū anteriori posterioriq; sedi tuberis connectitur, quod tibiæ ossis sinus femoris capita excipi-
entes dirimere dictum est. Istæ cartilagine exactè simplici cartilagine molliores sunt, & quasi li-
gamenti naturæ participes. Dein quæ ossibus applicatur, impenitæ aequales, lubricæ, læues, ac
deniq; unctuosus humore oblitæ spectantur. Ad hæc, in articuli ambitu¹⁷ crassæ sunt, multo ante
sinuum

a tota, &
2 figur.
integrarum
q. et ad a
& a.
b tota 3, 4
figuræ.
c tota 5, 6
figuræ.
d tibiæ of-
fis appen-
dices pri-
mum A, B
1, 3 fig. de
D, 1, 3 si fi-
bulæ autem
C, 1, 5 figur.
in super E a
& 5 figu-
re.
† 1, 3 fig. B.
* 2, 4, 7 si
E, G.
c 7 figur. H.
I, K.
f 1, 2 fig. 30
cap. E, F.
g 1 figur. 30
cap. I.
h 1, 3, 4, 7
fig. 1.
i fig. cap. 1.
lib. 2. X.
h 2, 4, 7 si-
gur. K.
l 7 fig. H.
m tota 8
figura, u.
l, 3 dextra
L, 3 sinistra
aut u. in fi-
gnitur.
n 8 figu. N.

os figur. O. sinuum centrum^o extenuate, desinentesq. Harum siquidem figura lunaris est, quemadmodum interioris sinus internum latus, & exterioris sinus externum. Præterea nullibi crassiores quàm ad lateris sui medium cernuntur. ^p quæ enim anteriori posterioriq. tuberis tibiæ ossis distinguunt sedibus appropinquant, tenuissimæ sunt, & in acutos apices finiunt, quorum qui anteriori eius tuberis sedi committuntur, inuicem proximi sunt, dextraq. cartilago sinistra ibidem alligatur. Apices uerò posteriorem tuberis sedem accedentes, magis mutuo distant, neque inuicem, ut anteriores cartilaginum apices, committuntur. Ligamentum enim crassissimum ex tubere in femur insertum, posteriores cartilaginum apices distinguit. Quæ quum ita sint, leui negotio colligitur, quàm concinnè harum cartilaginum auxilio ossis tibiæ sinuum cauitas adaugeatur, non solum quidem in hominibus, uerum in omnibus quæ hæc nus uidi quadrupedibus & auibus. His nanque in genu articulo eiusmodi cartilagine reponuntur, unde etiam in mensa cuius harum naturam contueri promptissimum est, si modò exactè genu articulum quis inspexerit: neque passim cum Aristotele, & Galeno in tertio de Partium usu, quadrupedum genu illic esse existimauerit, ubi tibiæ inferior pars talo coarctatur.

Atque hoc sanè modo tibiæ os femori articulat. fibula autem non adeò altè conscendit, ut femur contingat, uerum superior ipsius appendix in interno illius latere³ sinum gerit leuiter admodum insinuat & amplum, cui minime protuberans tibiæ ossis appendicis tuber coarticalatur, quod ad externum tibiæ ossis latus uersus posteriora cõsistens cartilagine, similiter atque sinus fibulæ, in crustatur. Porro³ ima sede fibula tibiæ ossi diuersa articuli ratione quàm supra coarctatur. Externum enim tibiæ ossis latus, oblongum exigit³ sinum, cui protuberans internum fibulæ³ latus immittitur, quod asperum nõnihil est, quemadmodum & tibiæ ossis sinus asper quoque, & cartilagine neutiquam in crustatus cernitur. Sinus enim ille fibulam læui contactu non excipit, uerum quæ hæc ossa inuicem cõmittuntur, ualidum intercedit ligamentum, non quidem duntaxat in circuitu ipsa cõnectens, ac etiam ubi mutuo se contingunt. Cæterum per reliquam tibiæ longitudinem fibula à tibiæ osse³ plurimùm dehiscit. non quidem quòd hæc radix³ modo oblique ducatur, ac uelut à tibiæ osse foras obliquetur, sed quòd tibiæ os supra infraq. adeò crassum sit, & in reliqua ipsius longitudine gracile, ut fibula illis tibiæ ossis sedibus, quibus crassum cernitur, commissa, facile à tota tibiæ graciliori sede multum distet. Quamuis tanto adhuc minus fibula à tibia dehiscat, quanto minus recta conspicitur. Fibula enim paulo sub medio lōgitudinis tibiæ, introrsum ac uersus tibiæ os nõnihil curuatur, exter noq. ipsius latere summa, seu cõcaua redditur. Cæterum tibiæ ossis fibulæq. ductus, & secundum ipsarum longitudinem extuberantes lineas impressionesq., tum demum opportuniùs describam, ubi supernas infernasq. eorundem ossium partes, quibus alijs coarctantur expresse. Superior itaque tibiæ ossis appendix, ad eum quem dixi modum femori ac fibulæ coarctatur. anterior autem eiusdem appendicis sedes utcumque depressa aspera³ cernitur, unà cum tibiæ ossis anteriori sede appendicis proxima, & à plerisque Græcorum ἀντικνήμιον uocata, quæ in hoc aspera est, ut ualidissimos³ musculorum tibiam mouentium tendines exciperet, quorum etiam tendinum gratia, superior fibulæ appendix insigniter externo ipsius latere & superiori parte³ protuberat, robustissimum³ quartum tibiam mouentis musculi tendinem excepturus. Dein hæc fibulæ sedes caput educit³ septimi pedem mouentis musculi. Inferiores tibiæ ossis & fibulæ appendices, simul³ sinum sedemq. efformant, cui³ talus mutuo quasi ingressu articulatur. Si enim tibiæ ossis ac fibulæ sinus tuberaq. sedulo perpenderis, tali cum tibia connexum ad ginglymon opportunè referes. Verum tali historiam suo loco explicabimus. nunc enim sinus tibiæ ossis examinandus uenit, qui in infimæ tibiæ ossis appendicis sede amplus admodum est, & quodammodo³ geminus. In medio enim amplo, sed modicè prominente³ tubere interstingitur, liquidoq. altius ad tuberis latera excauatur. Ad internū huius sinus latus inferior tibiæ ossis appendix, ualido magnoq. processu deorsum fertur, qui externo ipsius³ latere, quo sinum respicit, cauius, & similiter ac sinus ipse læuis & cartilagine in crustatus est: interno autem³ latere alterum crus respiciente gibbus est. ac quum³ excarnis sit, nullisq. musculorum partibus obiectus, in nobis tactu facile percipitur, estq. interior malleolus. Processus hic in infima ipsius sede uersus posteriora³ sinum obtinet, ex quo³ ligamentum prodit, cartilagineum tibiæ os talo colligans. Atque eiusmodi etiam ligamenti producendi gratia, anterior appendicis inferioris tibiæ ossis³ sedes, in humillima ipsius parte, etiam sinum exigit transuersim oblongum, & asperum, & inæquale: à quo ligamentum prodit, tibiæ ossi³ ceruicem tali nec tens. Posterior etiam huius appendicis sedes, ubi primū internū educit malleolum, depressa est, sinusq. ostendit, qui transuersis obducti ligamenti musculorum tendines hæc pedem aduntes, tutò, ne suis sinibus aberrant, ferri sinunt. Sunt autem illi numero tres, quintus scilicet pe-

Lib. de Com. muni animalit gressu. Fibule ad tibiæ os nexus.

Vbi fibula à tibiæ osse dehisca.

Tib. & ossis si nus et tubere, quibus talo articulatur.

Interior malleolus.

*Fibula cū ta-
lo articulatio.*

*Talū ante
sectionem ta-
liū non oc-
currere.*

*Exterior mal-
leolus.
Lib. de Offi-
bus Cap. 11.*

*Excarnis fi-
bulæ pars.*

*Fibula secun-
dum ipsius lon-
gitudinem tri-
anguli.*

*Tibiæ ossis se-
cundū ipsius
longitudinem
figura.*

dem mouentium, & duo digitorum flexui famulantes. Cæterum externum inferioris appen-
dix tibiæ ossis latus, nullum educit processum interno malleolo respondentem. Verum^o ap-
pendix fibulæ externo tibiæ ossis lateri adnexa, impenſe hîc crassescit, deorsumq; magis quàm
interior malleolus fertur. ac in causa est, ut rarius in externum pedis latus, quàm in internum,
talus luxetur. Tanto enim fibula hîc declinât ipsô tibiæ ossi descendit, quanto altius tibiæ os
ad femur suprâ porrigitur: adeo ut fibula ne minimum quidem longitudine à tibiæ ossi uin-
catur. Inferior hæc fibulæ appendix, externum^o latus sinus cōstituit talum excipiētis. Verum
appendix interno ipsius latere adeo protuberat, & cartilagine incrustatur, ut eam à^o talo ue-
rius suscipi, quàm eundem excipere, merito quis dixerit. etiam si externum tali latus appositè
teget, atque in eum modum unâ cum interno malleolo talum comprehendat, ut nusquam in
integris hominibus talus contingi queat.^a Tibiæ enim ossis appendix superiorem ipsius inte-
git sedem, & internum quoque ipsius latus, fibula autem inferiori sua appendice externum ta-
li latus occupat: anterior tali sedes, quæ in nuda ossium compage oculis subiicitur tendinibus
occulatur, per pedis superiora ad digitos deductis, ita etiam posterior ipsius sedes non minus
in nudis sceletis conspicua, tendinibus obtegitur in calcem insertis, & quibusdam hæc pedis
inferiora subeuntibus. Ima hæc fibulæ pars talo commissa, exteriori suo latere gibba, & nulla
prioris musculi parte^o obtecta, exteriorem constituit malleolum, quem simul cum interiori
malleolo à quibusdam talum perperam appellari Galenus testatur. Atqui is error ad nos usq;
manauit. Nam, ut cæteros taceam, Erasmus noster Roterodamus in suo de talorum lusu Dia-
logo, malleolos in hominibus talos simul cum Plinio uocari innuit: quod nonnulli Galeni
interpretibus adeo arrisit, ut *osque*, hoc est malleolos, subinde talos reddiderint. Externum
itaq; exterioris malleoli latus gibbum excarneq; est, similiter atq; interioris malleoli internum
latus. Posterior autem exterioris malleoli sedes amplum ostendit^o sinum, qui transuerso obdu-
ctus^o ligamento, sexti & septimi pedem mouentium musculorum tendines deducit, illos quo
minus à sua sede reclinent continens. Internum eiusdem malleoli latus in infima ipsius sede uer-
sus posteriora, profundum asperumq; ostendit^o sinum, ex quo^o ligamentum prodit cartilagine
um, hîc fibulam talo ualidissimè connectens. Cæterum ex uniuersa fibulæ amplitudine, nulla
ipsius pars nuda excarnis ue est, præter infimæ ipsius partis externū^o latus, quod etiam aliquo-
usq; supra appendicem fibulæ inferiorem ex carne cernitur. quum interim reliqua ipsius ampli-
tudo musculis obtegatur, ita fibulam amplexantibus, ut hæc passim ipsis cedere, ab illisq; com-
primi uideatur. Si enim fibulam examinaueris, eam secundum ipsius in lōgitudine ductum tri-
angulam esse conspicias, atque id potissimum iuxta ipsius longitudinis medium. In anterioris
enim fibulæ sedis medio, acuta & insigniter protuberans apparet^o linea, primum fibulæ angu-
lum constituens. In posteriori autem ipsius sede, depressa est, & plana, ac utrinque ad postero-
ris sui sedis latera unam commonstrat^o lineam, quæ insigniter satis protuberans, alium fibulæ
angulum efformat. Adeo ut ea quæ internum latus posterioris fibulæ sedis occupat, secun-
dum fibulæ angulum appellari possit: quæ uerò externum eius sedis latus habet, tertius. Atque
his tribus lineis angulis ue, tria fibulæ continentur^o latera, ac unum quidem inter primum &
secundum angulos consistit, quod unâ cum tibiæ ossis externo^o latere aptam sedem præbet il-
lis musculis, qui à tibiæ anteriori sede in pedis superiora feruntur. Sunt autem illi, pedem mo-
uentium^o sextus, deinde quatuor pedis digitos^o extendens, simul cum^o nono pedem mouen-
tium, & illo qui pollicem^o extendit, ac priuatim in primo hoc fibulæ latere^o lineam quandam
exigit modicè protuberantem, à qua illi musculo principium offertur. Secundum latus, prima
linea & tertia terminatur, & amplum est, egregieq; sinuatum^o septimo ac^o octauo pedem mo-
uentibus musculis locum præbet. Quinetiam octauo musculi gratia, latus hoc utcumque aspe-
rum cernitur, ut is hinc uniuersum ipsius principium pulchrè educat. Ab illis itaq; musculis qui
primum fibulæ latus occupât, & illis qui secundo exporriguntur lateri, à musculis com-
primitur posteriorem tibiæ sedem occupantibus, & potissimum ab eo^o qui pollicis secundum
os flectit, ac ab hoc fibulæ latere carneus enascitur. Quæ quum ita sint, tertia linea à musculis
secundum & tertium latus occupantibus foras protruditur. Secunda autem linea ab illis pro-
ducitur musculis, qui tertium & primum fibulæ latus comprimunt. Verum secunda hæc li-
nea priuatim^o ligamentum educit, fibulam tibiæ ossi tota illa sede qua hæc ossa inuicem dehi-
scent, colligâs, & in^o secundam tibiæ ossis lineam inferunt. Tibiæ enim os similiter ac fibula,
in suæ longitudinis medio quadantenus triangulare est. ac prima ipsius^o linea in anteriori of-
fis sede consistit, insigniterq; prominere. unde etiam Spina Anatomes professoribus appellatur.
atque hæc adeo acutè porrigitur, ut nullibi potius concertantes pueros pedibus inuicem pe-
tere

x 1 fig. E.
dein 2, 5, 6.
9 fig. n.

7 9, 11 fig. f.
2 6 fig. ca.
33 H.

a Confer fi-
guras inte-
gram ossi-
um compa-
gem expri-
mentes, mu-
scu. tabulis
in pede.
b 1 muscul.
ta. 2. 2 tab.
2. 7 inte-
grarum fi-
gur. 9.

c 2, 6 fig. q.
d 2 muscul.
tab. 20 liga-
mentum.
musculi au-
tem 2. et 4.
e 2, 6, 11 fi-
gur. 7.

f 11 cap. 11.
2 8.

g 1, 5 fig. o, p.
h 1, 5 fig. f.

i 1, 2, 5, 6 fig.
secunda li-
neat, 11 no-
ta.

tur. tertia
autem u. 11.

h primum
latus 1, 5 fig.

2, secundum
1, 5 fig. 11, ter.

2, 6 fig. 8.

1 1 figur. f.

m 3 muscul.
tab. 7.

n 4 muscul.
tab. 7.

o 4 tab. 11.

p 3 tab. 8.

q 1, 5 fig. 11.

r 6 muscul.
tab. 8.

s 6 tab. 11.

t 14 tab. 11.

u fig. ca.

lib. 2 a.

x 1, 2 fig. a.

y 13 fig. 11.

tere uideamus, quàm ad anteriore tibiæ sedem, ubi linea proximè cuti subiecta, hanc cultri modo scindit, quoties ipsa impetu ad tibiæ os colliditur. Secunda & tertia tibiæ ossis lineæ, posterioris sui sedis latera constituunt: ac tertia quidem intetnum eius sedis latus efformat, parum acutèeducta, sed obtusa admodum, & quasi teres. Secunda autè linea paulo est acutior, ac externum posterioris tibiæ ossis sedis latus efformat: estq; illa, cui ligamentum fibulam tibiæ ossi cōnectens inferi non ita multo antè relatum est. His tribus lineis, tria tibiæ ossis conficiuntur latera. ac primum quidem prima secundaq; linea terminatur, sinuatūq; est ac planum, eorundemq; musculorum occasione cauatur, quibus primum fibulæ latus cedere dictum est: secundū uerò tibiæ ossis latus prima tertiaq; linea terminatur, & insigniter gibbum est, nulloq; prorsus obiectum musculo. Græcis *λεία*, & frequentius adhuc *αὐτὸνύμιον* nuncupatur. Tertium tibiæ ossis latus, secunda & tertia circumscriptum lineis, non ualde depressum est, ac musculis occupatur posteriorem tibiæ sedem sibi uendicantibus: præcipue uerò illo qui quatuor digitorum tertij ossis flexus autor habebitur, & illo quem pedis motorū quintum statuemus. Ad hæc, tertium hoc latus in superiori ipsius sede asperam ostendit lineam, oblique exporrectam, cui musculus inferitur, quem in poplite latitantem uocamus. Atque huiusmodi sanè fibulæ tibiæq; ossis lineæ & latera læui negotio arguūt, quàm suffulciendis educendisq; musculis hæc ossa conueniant. Articuli uerò ostendunt, quàm affabrè moribus quos cruribus molimur obeundis Natura hæc extruxerit, illa ad eum quem diximus modum iuxta articularum sedem adaugens: adeo ut circa summam Creatoris nostri admirationem, hæc nemo contemplari queat, & non promptè colligat, quàm uniuersam is uitaret cōstructionem, si quicquam eorum quæ modò scripsimus, immutatum fingeret.

DE PATELLA. CAPVT XXXII.

PRIMA TRI-
GESIMISECVN-
di Capitis figura, anteri-
orem patellæ faciem
ostendens.



SECUNDA,
POSTERIOREM
patellæ sedem specian-
dam proponens.

CHARACTERVM SECUNDÆ FIGVRÆ, INDEX:

- A, B Dextri cruris patellæ tuber sinum inferiorum femoris capitum subiens.
C Sinus qui interno femoris capiti adaptatur.
D Sinus patellæ, gibbo externi femoris capitis congruens.
E Hac parte patella inferiori sua sede tibiæ os spectat, & uelut i in processum excedit, qui similiter atque tota anterior ipsius sedes tendinibus tibiæ extendentibus innascitur, quemadmodum pulchre ostendit octaua musculorum tabula, caractere k. qui innascitur caracteribus g, b, i. Foraminula uerò hac parte, ut & in patellæ anteriori sede conspicua, etiam citra characterum operam promptè obseruantur.

tota i, 2
fi. integræ
rum uerò fi-
gur. z.
b. 2 figur.
cap. 30 H.
e 2 fi. A, B.
d 2 fi. C, D.



tota i. fi-
gura.

figur. E.

g 8 muscul.

tab. k.

ANTERIORI genu articuli sedi os quoddam præponitur orbiculare, & breui scuto non absimile, quod posteriori sua sede, qua femur spectat, læui, lubrica cartilagine, magna ex parte obductum uisitur, apto tubere sinibusq; anteriori inferiorum femoris capitum sedi eleganter congruens. Secundum ipsius enim longitudinem tubere amplo & medio-criter prominenti extuberat, quod patulum femoris capitum sinum in anteriori illorum sede exculprum subit. Vtrinque ad tuberis huius latera unus habetur sinus, prominentes & cartilagine incrustatas femoris capitum sedes excipiens. Verum ut exterius femoris caput antrotrorsum magis, quàm interius caput porrigitur, & ampliori sede læui cartilagine obducitur, ita sanè exterior patellæ sinus ad tuberis sui externum latus consistens, longè amplior latiorq; interiori sinu occurrit. Patella igitur illa parte qua femoris os contingit, læuis & lubrica cernitur. Anteriori autem ipsius sede, & in lateribus aspera, & cæcis quibusdam foraminulis obrita spectatur: quemadmodum & in posteriori ipsius sede, ubi infima sui parte tanquam acuto quodam processu deorsum ducitur, tibiæq; ossis elatiorem sedem respicit, aspera etiam & foraminulis illis ornata est, quò aptius firmiusq; tendinibus tibiæ extendentibus innascatur. Vniuersa enim patella, tota ipsius amplitudine sedeq; ubi lubrica cartilagine nō obducitur, tendinibus illis innascitur, nec femori, neq; tibiæ aliter quàm tendinum

Patella sius
& forma.

Qui patella
femoris ossi
connectatur.

Patella sub-
stantia.

dinum beneficio commissa. Hoc enim priuatim patella sibi uendicat, quod alteri ossi ligamen-
torum ope non alligetur, sed tendinibus illis genu articulum transcendentes innata, ad femo-
ris os ualidissime cōstringatur. Patellæ substantia in natu grandioribus impenſe dura & solida
est, utcunque etiam Galenus eam extrinsecus cartilaginosa esse asserat: ac Marinus quoque
cū alijs Anatomicorū præcipuis, eam separatim cartilaginosa os uocauerit, & suum quod
patellæ dedicauit Caput, de Cartilaginosis ossibus inscripserit. Atq̃ isti fortassis animum adhi-
buere tendinū cui patella innascitur substantiæ, quæ elixa molliusculæ cartilaginosis speciem obti-
net, earum partium modo, ex quibus neruosa musculorum capita, aut ligamenta principium
ducunt, aut in quæ eadem inferuntur, Verū quando patella debite à tendinibus emundatur,
nequaquam cartilaginea, sed perquā solida fortisq̃ cernitur, nō quidem in solis hominibus,
uerum etiam in bobus, ouibus, & cæteris quadrupedibus, quorum etiam genu articulo rerum
Opifex patellam præposuit, multo quā in hominibus longiorem & angustiores, quemad-
modum in plerisque auibus latiore & breuiorem. Datur autē patella hominibus, & illis quæ
modò dixi animantibus, ut genu articulus, antrorsum in angulum minus fallax extēdatur, &
duntaxat ad rectā lineā ab angulari flexu erigatur. Deinde patella præcipue præstat, quo mi-
nus in tibie flexu femur ex tibie ossis sinibus in anteriora luxetur. Atque hunc sanè usum illi
demū nos edocēt, quibus patella sede sua dimouetur: aut quibus ex casu in duas partes fracta,
sursum multo elatius ascendit, quā in inferiora femoris capita cōsistunt. Hi nanq̃ infirmissime
tibiam flectunt, & periculosissime per decliua loca gradusq̃ descendunt, femore semper pror-
sum citra omne articuli genu robur elabente.


Patella u-
sus.

b z fig. 30
cap. E, F.

DE PEDIS OSSIBVS. CAP. XXXIII.

PRIMA

TRIGESIMI
TERTII CA-
PITIS FIGURA.




SECVN-

DA.



TERTIA. QVARTA. QVINTA. SEXTA.

ATQVE HIS SERIATIM SVBIACENT SEPTIMA, OCTAVA, ET NONA.




DECI

DECIMA.



VNDECIMA.

DVO-
DECI-
MA.DECI
MATER-
TIA.TREDECIM PRÆSENTIS CAPITIS FIGVRARVM
earundemq; characterum Index.

P R I M A figura integram dextri pedis ossium struem superiori facie exprimit. Secunda dextri quoque pedis ossium compagem ea sede delineatam proponit, qua stantes innitmur. Tertia dextri pedis talus anteriori facie ita oculis subijcitur, ut ipsius superior pars in conspectum ueniat. Quarta, eiusdem tali inferior sedes ab anteriori facie exprimitur. Quinta, talus ab interno latere spectatur. Sexta talum conspiciendum offert externo latere designatū. Septima, dextri pedis calcis os interiori sede ita exprimitur, ut externum ipsius latus magis quam internum appareat. Octaua, calcis os ab interno latere ostenditur. Nona calcis ossis externum latus commonstrat, & perinde ac duæ præcedentes, superiorem calcis sedem depictam exhibet. Decima, pedis os cymbam referens anteriori facie, qua tarsi ossibus committitur, delineatum cernitur. Vndecima eiusdem ossis posteriorem refert sedem. Duodecima, quatuor tarsiossium simul nexorum anterior facies conspicitur, cui pedij ossa coarctantur. Decimatertia, quatuor tarsiossium posterior facies spectatur, quæ calci & ossi nauiformi est contermina.

T, 1, 2 Talus.

Δ, 1, 2 Calx.

Θ, 1, 2 Cymbam referens os.

1, 2, 3, 4 His numeri characteribus in prima figura, secunda, duodecima & decimatertia quatuor tarsiossa indicantur, quibus ab inscripto numero nomina imponimus. hoc primum, illud secundum, atq; ita deinceps appellantes.

I, II, III, IV, V Quinq; pedij ossa in prima figura notantur, quæ in secunda etiam citra characterum appositionem sunt conspicua.

Λ, Ξ, 1, 2 Digitorum pedis ossa.

A, B, C, D 3, 5, 6 His quatuor characteribus tali tuber notatur, tibiæ ossis inferiori appendici articulatam. ac A quidem ad B primam huius tuberis costam seu latus indicat. C uero ad D secundum, & A ad C tertium, B autem ad D quartum.

E, E 3 Sinus tuberis tali, secundum ipsius longitudinem insculptus.

F, F 3 Duæ tali tuberis partes, clatius quam sinus E indicatus prominentes.

G 5 Internum tali tuberis latus, quod compressum & cartilagine incrustatum, interno malleolo committitur.

H 6 Tali tuberis sinus externo ipsius lateri insinuatus, qui cartilagine similiter obductus, externum malleolum excipit.

I 5 Sinus tali asper, cui ligamentum cartilagineum ab interno procedens malleolo inseritur.

K 6 Tali sinus, cui ligamentum cartilagineum ab externo malleolo pronatum inseritur.

L, M 5, 6 Duo sinus, quos posterior tali regio uersus internū latus spectandos exhibet, qui deducendis reflectendisq; musculorum tendinibus parantur, hæc pedis inferiora subcuntibus.

N 3, 4 5, 6 Tali ceruix.

O 3, 4 5, 6 Tali caput, ossis cymbam referentis sinum subiens, qui undecima figura k indicabitur.

P 7, 8, 9 Calcis ossis tuber, caput ue cartilagine obuolutū, & in tali sinum Q notandum ingrediens.

Q 4 Tali amplius sinus, calcis caput P iam indicatum admittens.

R 7, 8, 9 Calcis ossis sinus, cui inferior tali capitis sedes S iam indicanda articulat.

S 4 Inferior tali capitis, quod ossi cymbam referenti articulat, sedes, calcis sinum subiens.

T, T 4

ticulatur. quemadmodū in canibus fit, quibus tali quatrio insignius secundū ipsius longitu-
dinem cauatur, magisq; ad rotulā, cui funis aduoluitur speciem accedit, ob quod etiam firmiori
mutuo ingressu canis talis tibiæ iungitur. Ad hæc, præsens tali quatrio non in his solum quæ
modò diximus quartæ rotulæ parti respondet, uerū uti rotulæ latera, quibus ipsa ueluti in fur-
cula, aut ut alijs placet in trochlea, suffulciunt, detrita & læuia unctaq; uisuntur: ita quoque tali
tuber ad latera, quibus malleolos contingit, comprimitur, læuicq; cartilagine incrustatum cer-
nitur, quamuis non pari modo utrinque. In interno siquidem latere, ^k parua amplitudine & su-
perficietenus tantum comprimitur, quod scilicet inferioris tibiæ ossis appendicis processus inte-
riorem malleolum constituens, & hoc tali latas compræhendens, non admodum amplo ^l spa-
cio læui cartilagine incrustatur. Externum uerò tuberis tali latas ^m ampliter sinuatum, & maio-
ri intervallo cartilagine incrustatū apparet, ut aptam sedem constituat, cui ⁿ internum exte-
ris malleoli latas concinnè congruat, ^o qui magis deorsum, quàm interior malleolus, expor-
rigitur. Quemadmodum uerò internum interioris malleoli latas asperum ^p sinum exigere
seripsumus, ex quo ^q ligamentum cartilagineum talum tibiæ ossi colligans pronascitur: ita quo-
que eius ligamenti recipiendi gratia internum tali latas aspero ^r sinu insculpitur, perinde ac
externum ipsius tali latas similiter ^s cælatur, ut ipsi ^t ligamentum inseratur ab interno exte-
ris malleoli latere eductum. Huiusmodi quoque ligamentorum ratione posterior tali sedes ad
tuberis ipsius, seu quattrionis ^u radicem cõsistens aspera est, ut inibi ligamenta admitterentur à tibia
principium ductia, & rursus alia in calcem porrigat. At præter eiusmodi asperitatem poste-
rior quoq; tali sedes, ^v sinus ostendit, musculorum tendinibus, qui hæc pedis inferiora subeunt,
uehendis parati. Descendunt autem hæc tendo quinti pedem mouentium musculi, & musculi
secūdum pollicis os flectentis, & illius tendo qui tertia quatuor digitorū ossa inflectit. Atq; ad
hunc modum talus tibiæ articulatur, & tali quoque superior ac posterior sedes, lateraq; ita se ha-
bent. Ab anteriori uerò ipsius sede, idq; magis ab huius sedis interno latere oblonga produci-
tur ^w ceruix, quæ aliquouſque progressa, in ^x caput rotundum, lubricaq; cartilagine incrusta-
tum desinit, quod nauicularis ossis alto ^y sinui inarticulatur, contextū efformans, cuius beneficio
modicè obscuroq; motu pedem in latera agi circumduciq; arbitramur. Inferior tali pars, duplici
articulo calcis ossi articulatur, illiq; totus infertur. ac unus quidē articulus in posteriori con-
sistit regione, ubi calcis os amplo latoq; prominet ^z tubere, amplum profundumq; tali ^a sinum
ingrediente. Alter uerò articulus anterior est, ac uersus internum pedis latas uergens, secus at-
que posterior articulus se habet. Calcis enim os oblongo ^b sinu exculpitur, qui cartilagine in-
crustatus, humiliorem tali capitis ^c sedem excipit. Talinamque ^d caput nauiculari ossi articula-
tur, inferiori sua sede qua calci innititur depresso tubere, dicto iam calcis sinui examussim ad-
aptatur. In horum articulorum medio ^e talus, & ^f calx pariter exasperantur, profundosq; obti-
nent sinus, ex quibus cartilaginea pronascuntur ligamenta, talum calci ualidissimè connecten-
tia. Atque isti asperi horum ossium sinus adeò altè cælantur, ut in mundatis ossibus, & post-
modum inuicem commissis, magnum inter talum calcemq; inibi pateat interuallum, in uiuen-
tibus cartilaginosis huiusmodi ligamenti oppletum, quæ adeò pertinaciter talum calci col-
ligant, ut uix tantillum is supra calcem moueatur, ac sua inferiori sede tam sit immobilis, ut su-
periori, qua tibiæ articulatur, uersatilis uolubilisq; obseruatur.

^g Calcis os, quod omnium pedis ossium facile maximum est, pariq; cum talo constat substan-
tia ^h ea parte qua ingredimur leuiter teres, sed tute formationis gratia quoque latiusculum exi-
stit, uerum interim asperum & inæquale inibi cernitur, idq; quorundam musculorum occa-
sione. Primū enim in inferiori ipsius sede transuersim iuxta posteriora deorsum prominet, ac
asperum educit ⁱ processum, à cuius anteriori sede ^j musculus principium ducit, qui quatuor
pedis digitorum secundum os flectit. Dein illic ^k musculosa substantia nascitur, quatuor par-
ticulas deducens, quibus quatuor digitos pollicis adducimus. Horum enim musculorum pro-
ducendi gratia, hæc inferior calcis sedes, latior & inæqualis est, & processus ille ob hoc promi-
net, terræq; propinquius quàm reliquum calcis corpus accedit, quo minus illorum musculo-
rum capita inter calcandum comprimantur. Superior calcis sedes, ^l quæ à posteriori tali parte
ad posticam usque ipsius calcis sedem ducitur, teretis corporis speciem refert, priuatim nihil
præter exiguam asperitatem communstrans, in quam tibiæ ossis & tali ligamenta inferuntur,
quæq; à musculorum exortu & insertione, & articulatione libera est. Posterior hæc calcis se-
des, tibiæ ossis rectitudinem admodum excedens, in hoc in posteriora educitur, ut tibia oppor-
tunè instar perpendicularis lineæ in pedem tanquam in aliam lineam transuersim ductam ful-
ciri possit, utq; totius corporis robustissimus ^m tendo ⁿ posteriori calcis parti inferatur, huic
etenim depresso & utrunque asperæ calcis parti tendo implantatur ex primo, secundo & quar-
to pe

*Sinus tali qui-
bus à tibiæ os-
se & fibula li-
gamenta assu-
mit.*

*Sinus quibus
tendentes de-
ducit.*

*Tali cum of-
se cymbam re-
ferente articu-
lus.*

*Tali ad cal-
cem cõnectus.*

*Sinus inter
tali cum calce
commissuras
apparet.*

*Calcis of-
fis sedes ter-
ram spectans.*

*Superior cal-
cis sedes extra
tibiæ rectitu-
dinem rectori-
sum ducta.*

h s figur.
l 9 fig. ca
31 g.
m 6 fig.
n 9, 11 fig.
cap. 31. b.
o confor
figura cap
31. eum a
p 4, 10 fig.
cap. 31. i.
q fig. cap.
lib. 2. f.
r s fig. l.
s 6 fig. k.
t fig. cap.
lib. 2. g.
u post. B. E.
figure s.
x 5, 6. f. l.
M. aut 15
muscul. tab.
charact. 1.
23.
v eiusdem
tabu. D. E.
O. P. muscu-
los notant.
z 3, 4, 5, 6
figura N.
a cartilagine
figura O.
b 11 fig. li-
c 7, 8, 9 fig-
gur p.
d 4 fi. Q.
e 7, 8, 9 fig-
gur. R.
f 4 figu. S.
g 4 fig. O.
h 4 fi. T. T.
i 7, 8, 9 fig-
V. V.
h 12 figura
A. C. tota
7, 8, 9 fig-
integrarum
auiem 23
figura 4.
12 figur. X.
X. Z.
m 2 figu. Y.
Z. C. 8 fig-
X. 9 auiem
figura Z.
n 14 musc-
tabul. e.
o 14 musc-
tab. n. m. C.
15 tab. N.
p 7, 8, 9 fi-
ab a ad b.
q 13 muscu-
tabul. a. aut
14 tab. ten-
do ex n. o.
q cõslatus.
r 2, 8, 9 fi. c.

to pedem mouentibus musculis conflatus. In quadrupedibus autem, ut canibus, ouibus, & equis, posterior hæc calcis ossis sedes ex abundanti sinum quendam oblongum sibi uendicat, quo tendo is tunc uehitur, qui in illis animalibus secus ac in homine latum tendinem plantæ cui subnatum procreat. Cæterum calcis lateri quæ ampliter sunt depressa lataq; internum latus læue & insigniter sinuatum conspicitur, ut aptam constituat sedem musculorum tendinibus hæc pedis inferiora petentibus, atque ad internum hoc calcis latus tutissimò reflexis. Deducuntur autem hæc, præter præcipuam pedis inferiora petentem uenam, & arteriam, & neruum tendo quinti pedem mouentis musculi: & tendines duorum musculorum, qui ultimos pedis digitorum articulos flectunt. Hi tendines potissimum ad posteriorem processum calcis sedem conuoluuntur, cui Natura sinum insculpsit tali caput excipientem, & anteriorem tali cum calce constituentem articulum. Adeo ut is processus in internum pedis latus protuberans, internum calcis latus impenso sinuatum efficiat, quemadmodum & protuberans posterioris calcis sedis internū latus hunc quoque sinum ampliter auget. Id enim in hoc insignius prominet, ut musculus ab illo enascatur, cuius beneficio pollex introrsum à cæteris digitis abducitur. Externum autem calcis latus non sinuatur, sed asperum & inæquale ac excarne est, si modo humiliorem ipsius sedem exceperis, quæ musculus educit paruum digitum à cæteris digitis in externum latus abducentem. Deinde anterior huius lateris sedes aliqua ex parte læuis, modicèq; admodum in superficie sinuata cernitur, & tendinibus cedit septimi & octauimus musculorum pedem mouentium, qui ad posteriorem externi malleoli sedem reflexi, secundum hanc calcis regionem porrigitur. Cæterum calcis anteriorum partium, ea quæ est regio, ne magni digiti habetur, & processus modo in internum calcis latus excedit, talo quemadmodum antea diximus articulat, nulli interim alteri ossi contigua. At calcis anterior pars minimo digito situ respondens, in anteriori sua facie læuis est, & lubrica cartilagine incrustatur, depresso amploq; prominens capite, quod ossis tesseram imitantis sinui coarticulatur, qui similiter lubrica obductus cartilagine, duntaxat superficietenus insculpitur, eaq; commissuræ specie hic articulus perficitur, quam *ὀσσηὸν* Græcis uocari diximus.

Internum calcis latus quæle.

Externum latus.

Anterior calcis pars.

OSSIS CYMBÆ referentis sinus.

Anterior ossis sedes, & tres ipsius planæ superfices.

Superior sedes.

Inferior.

Quibus pedis ossibus in manu nullum respondet.

TARSUS.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Tria tarsifossia interiora. dioribus uero paucioribusque, ambulandi instrumentum, Tria tarsi ossium interiora plants quodammodo ² superficiebus nauiculari ossi coarctata, proprio carent nomine: at nonnullis

Quartum & extremum os.

simul omnia *κατανοήσας* appellantur, Quartum autem extrinsecus situm, à cubi seu testis forma (quum quasi octo habeat latera) *πυβόδε* uocatum est. Atque unum ipsius lateris posteriorius est, quo ³ calci committitur: secundum anterius, quo continua superficie duobus pedij ⁴ ossibus coarctari docebitur: tertium interius est, quo ipsi proximo tarsi ossi coarticulatur: quartum pedis exterius respicit lateris, uixque lateris nomen meretur, quum admodum obscure planum sit. Quintum superius est, nulli etiam nexum ossi, sed pedis superiora spectans. Sextum terram respicit, nulli similiter ossi commissum, ceterisque lateribus longe inaequalius, & priuatim oblongo quodam ⁵ sinu donatum, ad quem maxima Naturae solertia septimi pedem mouentis ⁶ musculi tendo reuoluitur. Quia uero aliquot huius ossis latera ad eum modum obscura & inaequalia sunt, & non ad amulsi miterae imagini accedit, Arabes ab inaequali effigie, & quadam grandinis imagine, id grandinosum appellauerunt. Alij rursus à multiplici forma illi idem nomen cum cuneum referenti capitis ⁷ ossi indiderunt, id *πυβόδε* uocantes. Hoc tarsi os (uti & antea monuimus) calci coarticulatur, terraeque innititur: reliqua autem tria simul cum nauiculari sursum à

Tarsi ossium forma et quantitas uariata esse.

terra subleuantur, ut pedem hac sede cauum altumque constituent. ⁸ Tarsi ossa, ut & brachialis, figura & quantitate inter se discrepant, nec superiori nec inferiori parte aequaliter porriguntur. Os enim cubum referens, & primum os interius pedis lateris occupans, duobus quae in medio habentur multo maiora sunt. atque illorum duorum rursus grandius est quod cubum referentia necitur, quemadmodum & cubum referens intimo ossi grandius quoque uisitur. Quintum etiam os cubum referens posterius, ad calcem scilicet, uergit: intimum uero os antrosum uersus pollicem multo magis, quam cetera, eminet. Ex medijs, quod intimo ossi proximum est, breue cernitur non adeo antrosum, atque id quod cubum referenti committitur, productum. Omnia simul iuncta superiorem eorum superficiem gibbiam orbicularemque efformant, inferiorem uero cauum simam uel, quemadmodum & pedis ex usu esse nemo non nouit. Duo media cunei accedunt imagini. quae enim pedis superiora spectant, lata orbiculataque nonnihil sunt: quae uero plantam constituent, non secus acuta uisuntur, quam si cuneorum ritu inter intimum & extremum tarsi ossa haec iniicerentur. Deinde tarsi os ossi cubo simili coarctatum, priuatim acutius & demissius in pedis inferiora porrigitur, quam secundum tarsi os intimo commissum, quod à ipsius huc deducto ⁹ processui tendo quinti pedem mouentis ¹⁰ musculi ualidisime inseratur. Tarsi ossa, ubi lateribus inuicem committuntur, tota connexus amplitudine leui lubricaque cartilagine non obducuntur, sed duntaxat in posteriori laterum sede ossi cymbam referenti proxima. quippe in reliqua parte nonnihil mutuo distant, cartilaginorum ligamentorum interuentu inuicem copulata.

Pedij historia.

Tarsum subsequitur pedis ¹¹ pars, quam Hippocrates à costarum fortassis serie *σύνδω*; alij uero Graeci *πυβόδε*, Latini plantam, & nonnulli pecten, uestigiumque appellant. Ceterum quum illae Latinorum uoces in musculorum narratione, & in uasorum neruorumque descriptionibus plurimum obscuritatis (si modo illis uteremur) adferrent, conduxerit profecto, & hic quoque à Graecis nomen mutuare. est enim & planum (quo nomine alij *πυβόδε* uertunt) in hac significatione, qua pedis partem significat, penè inauditus. Pedion igitur manus ¹² postbrachialis responderet: uerum quinque ossibus, non autem quatuor, ut postbrachialis, conformatur. In manu nanque pollicem reliquis digitis opponi decebat, atque hac ratione primum ipsius os brachiali articulo laxiori, quam quatuor postbrachialis ossa, alligatur. quare etiam primum pollicis os digitis, non autem postbrachialis Galenum secuti ascripsimus, pollicis perinde ac ceteris digitis tria ossa tribuentes. Quinque uero pedij ossa pari articuli connexu tarsi ossibus una serie committuntur. Pes enim quum ambulandi sit organum, stabilitatis securitas illi maxime conuenit, quae in uno ordine locatis indiget, non solum quidem pedij, uerum etiam & digitorum ossibus. Ac pedij ossa ¹³ tarsi ossibus leuibus & in superficie tantum protuberantibus capitibus coarctatur, tam obscure prominentibus, ut merito planis superficiebus pedij ossa tarso coarticulati dixeris. & pedij quidem os pollicis praepositum intimo tarsi committitur ossi, quod indicem suffulcit secundo, quod medium sustinet tertio ossi coarticulatur. duo autem reliqua ossa cubum referenti coarctantur: quemadmodum octauo brachialis ossi ea postbrachialis ossa committi proditum est, quibus anularis & medius innituntur. Et quemadmodum articuli, quo postbrachialis os minimi digitum sustinens brachiali necitur, externo lateri ¹⁴ ossiculum quoddam apponi diximus: ita etiam in pede ¹⁵ ossiculum uisitur, ad externum lateris articuli positum, quo quintum pedij os cubiformi ossi articulatur. Porro quemadmodum tarsi ossa non eadem linea anteriori parte finiunt, sic etiam pedij ossium aliud alio magis in posteriora porrigitur.

Pedij ad tarsum coarticulatio.

Pes. ¹⁶ Tarsi ossa, ut & brachialis, figura & quantitate inter se discrepant, nec superiori nec inferiori parte aequaliter porriguntur. Os enim cubum referens, & primum os interius pedis lateris occupans, duobus quae in medio habentur multo maiora sunt. atque illorum duorum rursus grandius est quod cubum referentia necitur, quemadmodum & cubum referens intimo ossi grandius quoque uisitur. Quintum etiam os cubum referens posterius, ad calcem scilicet, uergit: intimum uero os antrosum uersus pollicem multo magis, quam cetera, eminet. Ex medijs, quod intimo ossi proximum est, breue cernitur non adeo antrosum, atque id quod cubum referenti committitur, productum. Omnia simul iuncta superiorem eorum superficiem gibbiam orbicularemque efformant, inferiorem uero cauum simam uel, quemadmodum & pedis ex usu esse nemo non nouit. Duo media cunei accedunt imagini. quae enim pedis superiora spectant, lata orbiculataque nonnihil sunt: quae uero plantam constituent, non secus acuta uisuntur, quam si cuneorum ritu inter intimum & extremum tarsi ossa haec iniicerentur. Deinde tarsi os ossi cubo simili coarctatum, priuatim acutius & demissius in pedis inferiora porrigitur, quam secundum tarsi os intimo commissum, quod à ipsius huc deducto ¹⁷ processui tendo quinti pedem mouentis ¹⁸ musculi ualidisime inseratur. Tarsi ossa, ubi lateribus inuicem committuntur, tota connexus amplitudine leui lubricaque cartilagine non obducuntur, sed duntaxat in posteriori laterum sede ossi cymbam referenti proxima. quippe in reliqua parte nonnihil mutuo distant, cartilaginorum ligamentorum interuentu inuicem copulata.

213 fig. 12
a 13 fig. x.
b 7 fig. i.
c 12 fig. a. b.
d 13 fig. III.
V.
e 12, 13 fig. 7.
f 12, 13 fig. 1.
g 12, 13 fig. 1.
h 2 fig. 1, 9.
13 fig. f.
i 2 fig. 2.
h 15 fig. u.
125, V, 2.
18 fig. ca. 6.

m Confer
munic car-
si ossa pri-
me fig. cu
2. Et rursus
cur duode-
c me cum
13 figure.

n 13 fig. 1.
o 15 musc.
tabu. D. E.
dent. c. d.
p 1 figur. 1.
II, III, IIII,
V. integra-
rum uero
fig. b, b. d.
d. e, f, g, ac
id.
q 12 fig. ca.
25 1, II, III,
IIII.

r sedes in
tarso fer. a-
tum notan-
tur 12, 13, 14
a, b.
s 2 fig. cap.
25. charac.
III, IIII, ad
8.
t 1, 2 fig. ca.
25 N.
u 1, 2 fig. u.

Pedij ossa illic ubi tarso committuntur, lateribus sibi proxima crassaq; sunt, & aliqua ex parte planis laevisq; superficiebus per arthrodia inuicem coarctantur. Quà autem à tarso ad digitos abscedunt, tenuiora fiunt, atque in illorum medio^a interualla efformant, quibus^b musculosa reponitur substantia, cuius auxilio primi digitorum articuli flectuntur. Atq; ut pedij ossa illi substantiae aptiorem sedem porrigant, non ad eam acuta tenuiaq; superiori parte, atque ea qua terram spectant, uisuntur. Vbi autem digitis articulatur, omni ex parte postbrachialis^c ossibus respondent, & appendice donata in rotundum^d caput desinunt, sinum primi digitorum ossis subiens. Pedij os pollicis praepositum, ea parte qua tarso articulatur, in ipsius inferiori sede terrae contermina, processum exigit, cui septimus pedem mouentium^e musculus inferitur. Atque simili quidem occasione pedij os minimum suffulciens digitum, quà tarso articulatur insignem commonstrat^f processum in externum pedis latus excedentem, in quem octauus pedem mouentis^g musculus tendo insertionem molitur.

Pedij ossa^h digiti subsequuntur, qui ex ternisⁱ ossibus omnes ad eorum quae in manu sunt, similitudinem extructi constant: pollice tantum excepto, qui inter alios duplici tantum^j osse extruitur, ut anterior pedis concauitatis sedes firmius terrae innitatur, ad quod etià plurimum iuuant magna^k ossicula, quae quum ossa sesamifemen referentia persequerentur, ad primum pollicis internodium reponi dictum est. eo enim Capite non minus de manus quam pedum ossiculis (quum utrorumque eadem sit ratio) egimus. Quòd uero pes à summa manu uno osse uincatur, manifestum est. extrema enim manus uiginti septem constat ossibus, illis seclusis quae sesamo comparantur. Sunt enim octo brachialis, quatuor postbrachialis, & quindecim digitorum. Pes autem uiginti sex tantum donatur ossibus, calce nimirum, talo, naviculari ossi, quatuor tarsi ossibus, quinque pedij & quatuordecim digitorum. Atq; id Galeni nomine hic addendum duxi, qui in secundo libro Commentariorum in Hippocratis librum de Fracturis (ubi is inquit, pedem hominis multis ac paruis ossibus non secus ac summam manum efformari) scribit, pedi non aliter quam extremæ manus uiginti septem adesse ossa: parum mehercule perpendens, se bis cubum imitans os enumerare, aut præter id os, alia quatuor tarsi recensere. quemadmodum sanè facit eodem in libro, quum quatuor tarsi ossa cubum referenti ossi, & illi quod cymbæ assimilatur articulari tradit. Sed hæc de omnibus humanæ fabricæ ossibus sint satis: & nunc unguis ac cartilagine, quæ adhuc reliquæ sunt, recenseamus. si modò omnia, quæ corpus firmant, & suffulciunt, sustinentq; hoc libro, uti institutum fuit, absoluenta ueniunt.

DE VNGVIBVS. CAPVT XXXIIII.



HIS duabus figuris unguem ita expressimus, quemadmodum conspici solet, quum à manu ad seleti præparationem cocta, aut pede, diuelli consuevit. Ac dextra quidem figura characteribus insignita, internam unguis regionem, seu cauum ipsius denotat, altera interim unguis gibbum ostendente. Quin & A hic unguis sedes indicatur, ante confectionem apprensus. B uero sedes insignitur, quæ mollis est, nullibiq; detegitur, ac uelut radix unguis censenda uenit.



AN VVM pedumq; digiti unguibus ideo à summo rerum Opifice decorantur, ut ipsis firmamenti uice apponerentur. Digiti enim suis partibus carneis, quibus in extremo donantur, mollia duntaxat corpora apprehendunt. Dura autem, & propter hoc carnis naturam pellentia, uolenterq; à se cogentia, digiti sine unguum adminiculo nequeunt amplecti. Ipsorum enim caro, quam postea duriusculam quandam adipem cuti substratam esse docebimus, tunc reflectitur subuertiturq; & ob id firmamento indiget. Quinetiam pleraque deinde commoda ex unguibus, si neque summitatibus digitorum superiores, neque ipsæ inferiores sint, homini accedunt: quemadmodum si radere quid, aut scalpere, aut uellere, aut excoriare, aut euellere oporteat. Cæterum summus rerum Opifex iustissime unguum (qui & munimenta uulnerantium conuassantiumq; censetur) durtiem effinxit. Si enim duriores quàm nunc sunt, instar ossis cuiusdam procrearentur, ita quidem ad apprehendendum magis essent idonei, ut qui ne minimū reflecti reclinariq; possent, at rumpebantur promptissime, non secus quàm alia quæ dura fragilibq; constant temperie. Itaq; securitati simul & robori rerum Opifex prouidens, illos medio critere diros extruxit, ut neq; usui cuius gratia creati sunt, quicquam incommo daret, neque ipsi quum sua mollitie extrinsecus incident

Cur digitus unguibus donetur.

Unguim natura, etiam esse iustum.

*Vnguit ne-
xus.*

*Li. 2. de Admi-
nist. affect.*

tium uim cartilaginum ritu facile exoluunt, leui quaq̃ occasione afficiantur. Ob eandem hanc causam gibba cōstant superficie, quod hac figura iniurijs resistendis melius cōparentur. Quò minus uerò suspensi uacillent, ligamento quodam extremi digitorum ossis radici, eorum superiori termino colligantur. Quoniam autem carni cutiq̃ illos connasci operæ precium fuit, hæc extrinsecus uniuersæ radici circū datur, illa interius usque quaq̃ subnascitur. In radicem ipsam, non modò arteriam uenamq̃, sed etiam neruum porrigi Galenus attestatur, atque unguis ex his sensum, uitam & alimentum aliarum partium modo assumere scribit. Scio quidem non solum duos^a neruulos ad unguium usque radicem ferri, sed eosdem cum^b uenis sub unguibus quoq̃ ad digiti extremum repere. unguis autem interim sensus omnis expertes esse arbitror. Ac proinde non leuiter illorum, qui unguis ex ossis, nervi, cutis (quidam & carnis addunt) concretionem gigni censent, sententiæ accedo. Quòd uerò uenæ, arteriæ & nerui, quemadmodum in hortis alueoli, in unguibus non dispensentur, uel hinc constat, quod pilorum modo ab radice procedentes augeantur. Satiùs enim erat, & hos pilorum ritu semper renouari, atque quum indies atterantur, nunquam non incrementū admittere, quod potius in longum quàm latum & profundum assumunt.

DE PALPEBRARVM CARTILAGI- nibus. Caput XXXV.



HAC figura superioris inferiorisq̃ palpebræ cartilaginem à reliquis partibus liberam delineauimus, ac ipsam, quum alioquin sit nota, nullis chara-cteribus insigniuius.



VTRIQUE palpebræ, tam inferiori quàm superiori, una contigit cartilago, utrunq̃ mollis & longa, in palpebrarumq̃ extremo quâ illæ inuicem conuiuent, locata & inter cutem & membranulâ palpebras intus succingentem reposita. Huic cartilagini palpebrarum pili (quos cilia uocant) infiguntur, in illaq̃ tanquam in durius quoddâ solum inserti eriguntur. Ideo enim cartilagine hæ (quas ab illa pilorum serie, remorumq̃ in longis nauibus, seu, ut uocant, galeries, similitudine *negoris* uocamus) potissimum creantur, ut pilos illos erectos, neq̃ cæterorum pilorū modo flaccidos dependentesq̃ contineant. dein etiam creantur, ut^a musculorum palpebras mouentium implantationi subseruiant, quemadmodum opportunè in secundo libro eorum musculorum naturam explicantes docebimus.

DE AVRIS CARTILAGINE. Caput XXXVI.

QVONIAM auris cartilago cuti illi obducta exquisitè libera, auris ipsius formam, ablata eius pinnula, exprimit, abs re esset hic aurem nulli non obuiam delineare.



QUIS potissimum auris in excipiendis aëris conuolutionibus gyrisq̃ usus censetur, quibusq̃ nominibus auris sedes donetur, in auditus organi constructionis sermone libro septimo exequendum est. hic autem obiter auris recensenda uenit cartilago, quæ auris formam referens in hoc formatur, ut cute uestita auris corpus instar uanni cōstituatur, idemq̃ commodè sustineat, & erectum seruet. Est autem hæc cartilago mollis & tenuis, tanto semper à capitis ossæ uersus auris extrema mollior euadēs, quāto auris orbiculo propius accedit, & quo minus sustinere aliquid debet. Ac proinde etiam in auris pinnula huius cartilaginis nulla exporrigitur portio, quòd scilicet hanc propendentem, neque erigi neque suffulciri oporteat. Porro ad temporis os hæc cartilago durior sentitur, & ut firmiori radice hereat, crassior. Enascitur enim ex orbiculo^a foraminis auditus meatui in temporis ossæ celati, cuius circumferentia ideo exasperatur, ut promptius auris cartilaginem educat. Quamobrem uerò Natura ex huiusmodi cartilagine aurem constituerit, & non duriores aliquam ossæm^b cartilaginem, aut uerum os ipsi indidit, in secundo præsentis libri Capite executus sum, quum Naturam tanta providentia cartilaginis temperiem finxisse dicerem, ut hæc ossis modo sustineat quidem commodè: & interim adeò mollis sit, ut occurrantium impetu non rumpatur, sed cedendo leuiter eum exoluat, atque ita extremas partes iniurijs ferendis pertinaciores, quàm si ossæ essent, reddat.

QUANQVAM nasi cartilagine tactu ante sectionem debite dignoscantur,
nihilominus tamen, quartæ musculorum tabulæ nasus has literis K & L utcumq; proponit.



a. fig. cap.
g. ab f. ad c.
b. eadem f.
à Z ad Y.

c. eiusdem f.
gur. O.
d. 8 f. ca. 6.
A. B. A.

e. 2 fig. cap.
12 o. o.


f. 3 musc. t. a.
F. 4 tab. K.

ERV M opificem terminum extremumq; nasi cartilaginibus eadem ra-
tione extruxisse, qua auris cartilagine paulo antè procreatà diximus,
quadrupedum nasi extremum fere comprobatur, quod minori amplitudi-
ne, quàm hominis nasi terminus cartilagineū existit: qui etiam extra reli-
quam faciei superficiem magis, quàm quadrupedum nasus prominet.
Ab inferiori itaq; nasi ossium sede, qua hæc aspera & latiora, quàm supe-
riori^o sede sunt, duæ enascuntur cartilagine, quæ deorsum in anteriora
exporrectæ, inuicemq; cōiunctæ sensim molliores euadunt, ac in nasi extremo ueluti in cartila-
gineum ligamentum degenerantes, totam anteriorem nasi regionem constituunt, quæ à nasi
ossium inferiori sede ad nasi terminū apicemq; pertinet. Ab ossio autem septo narium forami-
na dirimente, quod octauū Capitū^o ossis partem esse suprà cōmemorauimus, alia enascitur car-
tilago, mollis quoq; ac ligamenti naturæ compos, quæ à tota anteriori septi illius sede antror-
sum procedens, internæ duarum primarū cartilaginum regioni secundum ipsarum longitudi-
nem adnascitur. Hæc pari ratione in ea nasi parte, quæ ueluti ex faciei planicie porrigitur, nasi
foramina interdiuidit, quemadmodū ossium illud septum ipsa^o foramina inibi disiungit, quæ
super palati regionem, à naso ad fauces usq; ducuntur. His tribus nasi cartilaginibus aliæ duæ,
utrinq; nimirum singule accedunt, quæ magis adhuc alijs cartilaginibus ligamentorū naturæ
participant, & orbiculatim singulæ unum nasi foramen constituunt. Cartilagine hæc internis
suis lateribus inuicem colligantur, & aliarum nasi cartilaginum extrema integunt, solaq; motu
donantur uoluntario, cuius ope sursum deorsumq; & introrsum extrorsumq; uellunt, proprijs
in hoc donatæ musculis. Harum cartilaginum latiores mollioresq; partes in nasi lateribus con-
sistunt, ac nasi alæ nuncupantur, quod quasi alarū modo nares occludant, referentq; ita homini
inter respirandū insignem usum præbentes. At quū hæc nasi cartilagine uel solo tactu cognosci
possint, nō est quod prolixius earū naturā exequar: utcumq; etiā uel solius Gallici morbi nomi-
ne (qui has crebro infestat) ipsarū structuram medicis nō oscitanter expendendā duxerim.

DE ASPERÆ ARTERIÆ CARTI-
laginibus, ac quid Græcis in hac γλωσσίς & ὑπογλωσσίς nuncupetur.

Caput XXXVIII.

PRIMA TRI-
GESIMI OC-
taui Capitū figurā toti-
us asperæ arteriæ ab o-
mnibus partibus libe-
ræ anteriorem faci-
em exprī-
mens,



SECUNDA
FIGURÆ, A-
speræ arteriæ caudicis
posterior facies delinea-
tur. ab re enim fuisset,
& huius figuræ, quemad-
modum primæ, ramo-
rum in pulmonem sub-
stantiam pertinentium
seriem appingere, quū
illam prima figura
abundè oculis
subijciat.

N 4 TER.



TREDECIM QVAE SERIATIM HIC PROPONUNTUR
figurarum, & earundem characterum Index.

H A R V M figurarum prima, quæ tertia inscribitur, primam laryngis cartilaginem, quæ quia scutum refert, scutiforme quoque uocabimus, ex dextro latere expressam ostendit. Figura autem quæ Quarta ordine est, eiusdem cartilaginis internam seu posteriorem faciem proponit. Quinta, eandem cartilago externa seu anteriori facie delineatur. Sexta, secundæ laryngis cartilaginis anteriorem commonstrat faciem. Septima secundam laryngis cartilaginē ex dextro latere expressam continet. Octaua secundam laryngis cartilaginē posteriori ex facie depictam offert. Nona laryngis tertia cartilago ex dextro latere delineatur. Decima, tertiæ cartilaginis anterior sedes occurrit. Undecima, eandem cartilaginē posteriori facie oculis subiicit. Duodecima, laryngis operculi inferiorem sedem ostendit, quæ id laryngis amplitudinem spectat. Decimater tia superiorem laryngis operculi sedem continet, quæ palatum respicit. Decimaquarta, unam asperæ arteriæ trunci cartilaginē C modo extructam anteriori externaue facie uidendam obijcit. Decimaquinta, eandem cartilaginē posteriori facie proponit, quæ internam asperæ arteriæ amplitudinem spectat.

A, B 3, 4, 5 Duo elatiore scutiformis cartilaginis processus.

C, D 3, 4, 5 Duo humiliores eiusdem cartilaginis processus.

E, F in 8, in 7 uerò duntaxat *E*. Secundæ cartilaginis sedes, quibus inferioris scutiformis cartilaginis processus coalescunt.

G, H 3, 4, 5 Hac sede scutiformis cartilago artissima breuissimaque uisitur, subinde lineam ostendens quæ dextram cartilaginis partem à sinistra instar duarum cartilaginum dirimit.

I 6, 7 His sedibus secundæ cartilaginis regio spectatur, laryngis internam amplitudinem respiciens. Reliquis autem sedibus, quæ his tribus figuris conspiciuntur, exteriorem laryngis regionem seu amplitudinem constituit.

K, L 6, 7 Inferior secundæ cartilaginis sedes, perfectum efformans circulum. ac *K* quiddem huius partis anteriorem notat regionem, quæ tactu sub scutiformi cartilagine percipi potest. *L* uerò posteriorem inferioris huius sedis regionem indicat, deorsum processus instar eductam, ac in octaua etiam figura *L* insignitam.

M 7, 8 Linea spinæ modo in posteriori secundæ cartilaginis sede protuberans.

N, O 8 Sinus in posteriori secundæ cartilaginis sede, ad lineam illius *M* notatæ latera incisi.

P, Q 6, 7, 8 Duo secundæ cartilaginis tubercula, seu capita, sinus tertiæ cartilaginis subeuntia.

R, S 9, 10, 11 Duæ tertiæ cartilaginis partes.

T 9, 10, 11 Hæc tertiæ cartilaginis regio uacua est, ac duntaxat membraneis ligamentis tunicisque laryngis occupatur.

V, X 9, 10, 11 Tertiæ cartilaginis sedes, quibus secundæ cartilagini articulatur.

Y, Z 9, 10 Tertiæ cartilaginis processus, qui lingulam laryngis efformant.

Z 9, 10, 11 Tertiæ cartilaginis regio, illi ollarum uasorum ue parti assimilata, qua manus lauaturis aquam affundimus.

a 12, 13 Laryngis operculi basis, quæ scutum imitanti laryngis cartilagini continuatur.

12, 13 Apex, seu in posteriora introrsumq; uersus dorsum maxime procedēs laryngis operculi regio. Præter quindecim figuræ modo explicatas, huc comprimis faciunt figuræ Capiti uigesimo primo libri secundi præponende, quibus laryngis musculi explicabuntur. inter ceteras autē illas opportune non minus quàm si hic locarentur inspicies, quæ illarū figurarum tres postremæ habebuntur, quibus laryngis lingule seu rimæ imago, quàm fieri potuit accuratissime, delineatur.



ICET sextus liber cordi respirationisq; organis dedicandus, asperæ arteriæ naturâ diffuse pertractabit, in præsentia tamen ipsius cartilagine explicandæ ueniunt, ut omnes, quibus corpus sustinetur, partes, hoc libro absoluiamus, ac ne quicquam ossium cartilagineumq; hîc non expressum, à musculorum enarratione in sequenti libro nos remoretur. In sexto igitur libro docebimus, asperam arteriam à faucibus in thoracis amplitudinem deduci, & multiplici ramorum sobole in pulmones diffundi, ut

aërem illis reddat, & eundem rursus educat. Neq; solum hanc respirationis instrumentum ponemus, uerum etiam principalissimum uocis esse organum attestabimur, exacte ipsius substantiæ naturam sermone tunc pertractaturi. Constat enim partim cartilaginibus, partim membranis uinculis, simplicibusq; membranis seu tunicis, ac demum musculis ipsius capiti peculiaribus. Ac caput quidem hoc asperæ arteriæ (quod laryngem potius quàm guttur mihi appellandum putauerim) primum tribus constituitur cartilaginibus. quarum prima maxima amplissimaq; & anterior est, foris quidem gibba, intus autē lima, scuto quodammodo similis, non rotundo, sed prælongo, quali ueteres in prælijs ufos, & Turcarum aliquot adhuc, in nauibus præsertim, uti cernimus. Atq; hanc ob causam dissectionū periti eam *bugroedii*, uulgus autem *scutale* & *petale* appellauerunt, ac proinde nos quoque illam scutiformem, aut cartilagineam scuto similem in sermonis contextu perpetuò uocabimus: nisi etiam hanc primam cartilaginem appellare uisum fuerit. Ista in homine superiori sede amplior quàm inferiori conspicietur, secus multo quàm in bobus & porcis, quibus inferiori sede latior, superiori autem multo strictior est, minusq; in acutum quàm hominis larynx, antrorsum exporrigitur. Quòd tamen ad imaginis speciem spectat, hominis cartilago superiori & inferiori sede sibi respondet.

Suprà enim infraq; ex suis lateribus binos educit processus, utrinq; singulos, ac horum quidem duo superiores procerius inferioribus educti, membraneis uinculis ossis u referentis humilioribus lateribus alligantur. Inferiores autē scutiformis cartilaginis processus, lateribus secundæ cartilaginis uersus posteriorem ipsius sedem uniuntur, coalescuntq;. Scutiformis hæc cartilago uiris quàm mulieribus antrorsum magis prominet, tactuiq; magis exponitur: & subinde gemina, idq; potissimū in uiris obseruat. In ipsius enim medio, ubi cartilago hominis breuissima est, maximeq; antrorsum extuberat, secundum suam longitudinē crebro linea ducitur, quæ ad amussim à membranulis emundata, duas cartilaginis partes mutuò commissas etiam ante sectionem fuisse arguit. Atque id sanè hominibus peculiare obtrigat. Boum enim cartilago simplex est, & plurimum ab hominis cartilagine forma uariat: quam sedulo ab architectis spectari uelim. mirū nanque est, quàm boum scutiformis cartilago propugnaculi formæ accedat, quæ ad affabre id speculatoribus in ipsius elatiori sede (ob priuatos ipsi incisos sinus) accommodum sit, & quàm aptè bombardarum ictibus retorquendis comparatum. haud secus profecto, quàm si machina quæpiam esset portatilis, quæ duobus processibus suis humilioribus tanquā duobus palis terre intigi, ac exercitui præponi possit.

Secunda cartilago minor prima, maiorq; tertia est, ac maxima sui portione in posterioribus laryngis sedibus reponit, quæ cibi uia (quam stomachum cum Græcis uocabimus) deorsum à faucibus fertur. Quantum enim scutiformis cartilago à perfecta circuli figura deficit, hoc ipsa superiori posterioriq; eius parte supplet. Ima enim ipsius sede perfectum conficit circulum, cuius anteriorem partem sub scutiformis cartilaginis radice, tactu in antica laryngis sede percipimus. Interna huius cartilaginis amplitudo exacte leuis est, posterior autem ipsius sedes stomachum spectans, longa extuberat linea, secundum cartilaginis longitudinem, quasi spinæ modo exporrecta. Hæc duos huius cartilaginis sinus dirimit, in quibus duo figuntur musculi, recto ductu à secunda cartilagine in tertiā inserti. Superior huius cartilaginis sedes, quæ posteriorem laryngis regionem efformat, in duo definit tubercula oblonga, & utrinque singula, quæ tertiæ cartilaginis sinus inarticulati mox audies. Secunda autem hæc cartilago primæ ad eum modum committitur, quem suprà exposui, quando humiliores primæ cartilaginis processus ipsi connasci dicebam. Vt uero firmiter eorum processuum fieret connexus, secunda cartilago inibi, quæ processus ipsi coalescunt, modicè extuberat, crassiorq; est, & in hac protuberante parte sinus uisitur,

Vbi asperæ arteriæ natura pertractabitur.

PRIMA LARYNGIS CARTILAGO.

SECUNDA LARYNGIS CARTILAGO.

qui



TERCIA lar-
yngis carti-
lagi-
lago.

qui primæ cartilaginis processum ualidissimè excipit. Inferior cartilaginis secundæ pars, ubi laryngis posteriora constituit, non nihil tenuis uisitur, deorsum magis, quàm reliqua ipsius inferioris partis sedes, porrecta. idq̃, ut musculi ex remotiori sede iniuè ducerent, qui rectà per cartilaginis secundæ longitudinem expansi, tertiæ cartilagini inferuntur. Huic cartilagini nullum nomen inditū est, ac iccirco peculiari nomine nobis innominata nuncupabitur. Si tamen quis sedulo eius effigiem inspexerit, atque alicuius rei formæ illam conferre, tandemq̃ hinc ipsi nomen indere uoluerit, haud aliud illi conformitūs adinueniet, illo Turcarū anulo, quem sagittantes dextro pollicis imponunt, ut eius anuli beneficio arcus neruum robustius trahant. Is enim anulus illa parte, qua pollicis interiora respicit, anteriori secundæ cartilaginis sedi similis uisitur: qua uero externam pollicis sedem tegit, posteriori secundæ cartilaginis regioni utcumque conuenit: quemadmodum ex hac anuli effigie, quem margini adhibeo, est cernere. * Tertiam laryngis cartilaginem Græci ἀγούριον & ἀγούριον uocant, quòd quum integra adhuc est, & membrana tunica uel asperam arteriam intus succingente adhuc obducitur, illi ollarum parti similissima sit, qua aquam manus lauaturis affundimus. Illi namq̃ ollarū oris sedi aptius congruit, quàm ligneis illis conchis, quibus nautas sentinam exhaurire, ac olitores irrigare hortos conspiciamus, siquidem & eiusmodi fistulis seu uasculis Græci hanc cartilaginem contulisse uidentur, non quidem toti uasi, sed ipsius mucroni. Vtunque sit, tertiam laryngis cartilaginem unicam simplicemq̃ omnes dissectionum profectores describere, quum interim membranis suis liberata, sit gemina: & duabus constituatur cartilaginibus, ligamentorum duntaxat beneficio & laryngem succingentis membranæ, inuicem admodum laxè commissis. Ac harum una quidem dextro secundæ cartilaginis lateri, altera uerò sinistro innititur, sinum laeuum & altera satis cælaturum obtinens, quo secundæ cartilaginis tuberculum excipit. itaq̃ articulatur, ut ad internam laryngis amplitudinem, ac rursus extra illam moueri possit, hæcq̃ ceteris laryngis cartilaginibus maximè mobilis existat. Vtriusque cartilaginis basis ampla est, & anteriori sede in longum processum finit, in interiora laryngis exporrectum. Superiores uerò harum cartilaginum partes sensim à basi inuicem dehiscētes, ac dein tenuiores mollioresq̃, & adiposæ reditæ, mutuo uniuntur, & dextræ cartilaginis superior pars sinistræ cartilaginis parti coniuncta, eam laryngis sedem extruit, quæ illi uasorum parti congruit, qua aquam manibus affundi supra commemorauimus. Atque hæc quidem laryngis sedes adeo mollis flexilisq̃ est, ut uomentibus in internam laryngis amplitudinem antrorsum reclinetur, asperamq̃ arteriam adeo exquisitè integat, ut ne minimum quidem ex uomitu arteriæ ipsi illabatur. Cæterum & si tertia hæc cartilago gemina sit, duabusq̃ cartilaginibus extruatur, ob id tamen eam duarum cartilaginum loco non enumerabimus: sed unius tantum aliorum Anatomicorum more nobis habebitur, tertiæq̃ nuncupabitur, quò minus illorum placita qui cartilagine numerarūt potius, quàm descriperunt, plus æquo turbare uidear. His tribus igitur laryngis cartilaginibus, alia quedam mollis, & substantia tertiæ cartilaginis superiori parti prorsus similis, accedit, quæ laryngis perelegans efficitur operculum, accuratè prohibens, ne quid cibi aut potus in laryngem defluat. Enascitur autem hoc laryngis operculum ampla & antrorsum curuata basi, ab interiori scutiformis regione iuxta partem ipsius elatiorem, hinc introrsum procedens, trianguli imaginem exprimit, cuius basim operculi à scutiformi cartilagine exortus, aut ipsius cum ea cartilagine cōnexus efformat. Trianguli uerò uertex, ea pars est, quæ introrsum ueluti ad stomachi regionem producit. Corpus hoc quæ palatum respicit, gibbum est ac mollius: quæ autè laryngi innititur, cauum sinumq̃, ac multo quàm superiori parte durius. In extremo autem ipsius, quo stomachum spectat, insigniter molle est, pinguiq̃ obductum membrana ligamenti quodammodo naturam refert. quæ uerò scutiformi cōmittitur cartilagini, etiam multa abundat adipe, neq̃ inibi adeo durum atq̃ in sui medio cernitur. Pleriq̃ corpus hoc præcipuè uocis organum esse putarunt, id temerè γλωττιδα & περιγλωττιδα uocantes: quum tamen hæc nomina penitus pugnātes, diuersasq̃ prorsus partes, ueteribus illis Anatomes professoribus significauerint. γλωττις enim laryngis rimam indicat, quam duo tertiæ cartilaginis processus in media laryngis amplitudine pingui membrana obducti constituunt, & quam præcipuum uocis organum esse in quinto libro demonstrabimus. Illi namque eiusmodi rimam γλωττιδα seu lingulam uocant, ab ea lingularum similitudine, quam ex duabus arundinū laminis inuicem compactis tibijs accommodari uidemus. Cæterum περιγλωττις nuncupatur laryngis operculum, dictæ nuper laryngis lingulæ impositū, & ne quid inter edendum in eam decidat cauens. Quòd uerò id nostri seculi medicos lateat, non ipsi tantum in causa sunt, nihil præter autorum sentia, citra omnem sectionis usum, sectantes: uerum & Celsus etiam hæc perperam (uti sanè quæ ad Anatomen spectant permulta) intelligens, illud laryngis operculum lingulam appellauit,

Laryngis lin-
gula, seu rima
et præcipuum
uocis organū.

possint. Mox acutiori cultro orbiculatim per frontem & tempora & occipitium, sectionem tentabis, ad caluariam usque penetrantem. Ad huius deinceps sectionis orbiculum, serra caluariam diuides, parum solicius, etiam si cerebrum uities, aut paulo humiliter elatus ue caluariam diuidas, quandoquidem nunc duntaxat ossa ac cartilagine intueri seruareque propositum est.

^a Diffecta igitur caluaria, cerebrum solis manibus ex ipsa euulsum, uasi iniiciendum est, ac caluariæ pars à reliquo capite adempta, cacabo indetur, liberata tamen prius ab illa uerticis cute. Iam utranque aurem proximè à temporum osse abscctam, seorsum in afferem, cui cartilagine adhibentur, collocato, unà cum palpebris & nasi extremo, quod cartilaginibus constat, quæ uicinissimè ab illis quibus cōmittuntur ossibus simul cum cute sunt refecandæ. Deinceps maxillam inferiorem à suis cum capitis ossibus connexu liberabis, ac cartilagine, quas priuatim in ipsius cum capite articulis haberi diximus, cultellulo à ligamento articulum continentibus diffecabis, eas chartæ illi cui promptè hærebunt feriatim applicans. Quando inferiorem maxillam adimis, & eam obiter cute & lingua (relictis si uoles musculorū implantationibus) liberas, ac tandem in cacabum reijcis, cauendū est, ne os *v* referens aut laryngem corrumpas, sed integram laryngem cum eo osse, & lingua, & stomachi asperæque arteriæ portione simul è faucibus auferas, ac afferi illi non aliter emundatā cum auribus imponas. Iam à pectoris ossis mucrone ad pubem usque sectionē molieris, ad omentum usque penetrantē, cui deinceps aliam sectionem, quæ transuersim à dextro ilio ad sinistrum pertingat, adiunges, & absque delectu omnia quæ peritonæo cōtinentur, laniorū more euelles, ea uasi iniiciens. Abdominis cutem unā cum musculis obiter ab ossibus diffecabis, & sanguinē spongijs excipiens, cum in uas exprimes, modò à iugulo ad pectoris ossis usque mucronem, adeò profundam duces sectionem, ut illa ad pectoris usque os penetrante, simul cum cute musculos thoraci instratos, à costarum ossibus, earundemque cartilaginibus, adimere possis, & simul clauiculæ nudæ, carnibusque liberæ appareant. Quippe hæ acutiori cultello à pectoris osse ueniūt liberandæ, & cartilagine his articulis propriæ (quemadmodum inferioris maxillæ cartilagine aggressus) accuratè sunt adimendæ, & dein chartæ feriatim adhibendæ. Pectoris os unā cum costarum cartilaginibus studiosè à costarum ossibus liberabitur, sectionibus acutiori & nō admodum crasso cultro per cartilagine inibi ductis, ubi costarum ossa in has degenerant. Atque id promptè obitur, si modo memoria non exciderit, primæ costæ cartilaginem à pectoris ossis medio magis in latus quàm secundæ costæ cartilaginem ferri. Neque tantum cartilagine pectoris ossi coarctatæ à costis sunt dirimendæ, uerum etiam omnes spuriarum cartilagine, quæ uel intercostalium musculorum interuentu superioribus cartilaginibus hærebunt. Disiunctis hunc in modum cartilaginibus, pectoris os à iugulo attolles, & id uenis & arterijs à iugulo ad illud porrectis & membranis quoque liberabis, quæ thoracis amplitudinem intersepiunt. Postremò cartilagine à septo transuerso refecabis, & ipsas simul cum pectoris osse non aliter mundatas, in chartam repones, dein scapulas unā cum clauiculis à thorace diffecaturus. Iam longa sectione in altera manu à summo humero per brachium & cubitum ad pollicem usque ducta, scapulam, humerum, cubitum, & extremam manum cute & carnibus enudabis, non admodum anxius, etiam si aliqua tendinum carnisque portio ossibus adhuc appensa relinquitur. Adeò ut etiam suffecerit, relictā summæ manus cute, illam aliquot sectionibus hinc atque illic scindere, quo postea leuiori negotio manus elixetur. Modò clauicula à summo humero secabitur, mente adhibita, num præter scapulæ processum, quem summū humerum appellamus, & clauiculā, inibi aliud tertium os occurrat. Hoc ubi præstiteris, ac peculiarem eius articuli cartilaginem chartæ adhibueris, clauiculam in cacabum cōijcies, scapulamque ab humero, & deinde humerum à cubiti ossibus separabis: & cubitum cum extrema manu cōnexum seruans, simul omnia in cacabum quoque locabis. Priusquam tamen scapula cacabo indetur, opportunè feceris, si cartilaginem scapulæ sinum, quo humeri caput excipitur, aliquando augmentem, à scapula diremeris, chartæque cum cæteris cartilaginibus applicueris. Atque id similiter in alterius lateris manu est præstandum, ac ilico ad thoracem denud accedendum, ex quo primum pulmones cum corde & septo transuerso execabis: & priusquam cor in uas cōijcias, cordis basim per transuersum à reliquo cordis corpore diuides: & deinde basim rursus à uasis, quæ ab ipsa prodeunt, sic auferes, ut ita uenæ arterialis & magnæ arteriæ orificia illæsa habeas, ac postmodum (si uisum fuerit) in cartilaginum numero illa seruaturus, chartæ applices. Vbi igitur reliqua quæ in thorace inueniuntur, in uas reieceris, cadauer in prouum uertes, & utcumque libet, ceruicem reliquumque dorsum, unā cum tota thoracis amplitudine carnibus emundabis, studiosè cauens ne costam aliquam (utpote fragilem) rumpas: aut nimium uicinè carnem diffecās, processum aliquem uities. Atque id adhuc magis cauendum est, quum iam singulas costas seorsum à uertebis thoracis liberaturus es. Etenim resupi-

Ita diuides, ut septima fig. cap. 6 à sexta si liberata cernitur. Verum non est ut tibi modò in ossibus cartilaginibusque probè instructo, hoc Capite aliquid addiderim.

refupinato cadauere, cultello acutiore costæ capitulū, à uertebrae corporis sinu uenit separandum, & deinde ligamentis sensim diuisis, à transuersis quoque uertebrae processibus costæ sunt adimendæ, obiterque emundatæ in cacabum mittendæ. Crura ad eum modum, quo manus aggressus es, attrectabis, femur uniuersum carnibus emundans, mox & tibiam, & pedem uniuersum. Quū tamen genu nudas, ex tendinibus anteriore genu sedem occupantibus, patellam excabis, & in cacabum nō secus ac femur cōiicies ilico, atque id à coxæ dicis ossē tibiamque liberaueris, & cartilagineas resecueris, quæ tibie ossis sinu femoris capita excipientes augent. quippe & illas non inopportune chartæ agglutinabis, ac deinceps tibie os, unā cum fibula & pede, cacabo indes. Id ubi in utroque crure præstitum erit, & ossa sacri ossis lateribus coarctata aliquantulum repurgata fuerint, cartilaginea ligamenta uertebrae corpora intercedentia adammulsum ueniunt excanda, & chartæ seriatim accommodanda. Ligamentis igitur, quæ uertebrae corporibus in superficie obducuntur, acutiori cultro adeptis, inter ossis sacri summum & cartilagineum ligamentum, os sacrum ac infimam lumborum uertebrae interueniens, sectionem tentabis, quæ ligamentum id, seu cartilagineum, ut Galeno uisum fuit, ab ossē sacro diuidat. Rursus inter infimæ lumborum uertebrae corpus, & clatiorem dictæ nuper cartilaginis regionem, eandem duces sectionem, hacque ratione integram auferes cartilagineum. quam ubi chartæ imposueris, sequentes tantisper excindes, dum ad secundam usque ceruicis uertebrae deuentum erit. Quū itaque uiginti tres cartilaginea ligamenta uel cartilaginea ad hunc modum chartæ applicaueris, dorsum in tres quatuor uel partes cautē & leniter disungendum uenit, ne impetu id tentans, casu aliquem uertebrae processum confringas. Quare etiam cauendum est, ne primam uertebrae à capite negligentius liberare studeas. Licebit enim cum capite ceruicis uertebrae cacabo imponere, ut & thoracis uertebrae cum lumborum uertebrae, modò illas à sacro ossē prius disiunxeris. Os sacrum autem, unā cum ossibus ipsi commissis (quæ ilium, coxendicis & pubis ossa constituunt) nihil prohibet cacabo indere, quum scilicet ilium ossa adhuc cruda à sacro difficulter & arduè separētur, & pubis ossium cartilago etiam tunc uitietur: quam aliàs integrā asseruabis, si pubis ossa non dirempta cacabo inieceris. Ossibus adhuc modum cacabo immisissis, aqua is uniuersus implebitur, ut ossibus altē in aquam subsidentibus, nulla ossis pars emineat. Hoc enim imprimis toto coctionis tempore obseruandum est, ne os aliquod aqua non tegatur, multoque magis, ne id ex cacabo prominens sumum excipiat, cuius etiam occasione grandem cacabum esse conuenit. Vniuersæ coctioni nullum peculiare adhibetur artificium, sed, ut in cæteris elixationibus, spuma sedulo auferenda est, quo ius clarius reddas, ipsaque ossa minus sordida extrahas. Pari etiam ratione pinguedo omnis (quæ plurima supernatare solet) est haurienda, ac in uas aliquod uel uulgi homine reponēda, quod illi in obliterandis cicatricibus, & neruis tendinibusque producendis multum tribuit. Coctioni nullum tempus præfinitur, quum id ex ætatum ratione plurimum uariet. Duabus enim aut tribus horis plusquam satis sit, puerulorum ossa coquuntur præcipue, quum in illis studendum sit, ne inter mundandum ossa, appendices decidant: quarum coalitus in profectionis ætatis hominibus uix unquam, quantumuis coxeris, dissoluitur. Is itaque coctionis scopus est, ut ossa cultro, rum beneficio, uti inter edendum sit, aptè mundari queant. ut autem id facias opportunius, pe detentum nonnulla ossa inter elixandum forpice eximes, eaque solus purgabis: nisi fortasse studiosus adsit sodalis, qui unā manus operi adhibeat. Summopere enim cauendum est, ne imperitior aliquis ossium supercilia, processus, capita & sinus radendo uitiet, aut alicunde cartilaginem læuem, & crustæ modo ossibus obductā imprudens auferat. hæc namque, quum carnem, ligamenta, tendines & membranas ossa ambientes adimis, præcipue seruanda uenit. Neque uero officium id hac duntaxat ratione inepto alicui, & Anatomes parum studioso minus comitteri uelim, uerum ut, quum unumquodque os priuatim purgas, sinus ipsius & capita, & potissimum ligamentorum naturam, & tendinum insertionem, musculorumque exortum accuratè contempleris. Non enim facile dixerim, quantum cognitionis partium eo opere tibi paraturus sis. Quando igitur hunc in modum seriatim ossa ex bulliente iure extrahis, ac mundata terræ, aut sportulæ alicui imponis, non admodum anxie expendito, quodnam os prius tibi occurrat. Summam tamen manum cum cubiti ossibus extrahens sedulo obseruabis, ne uiolentius brachiale à cubiti ossibus seingas, sed cultro articuli ligamenta sensim diuidens, brachiale à cubiti ossibus accuratè liberēs. idem facito in postbrachialis ossium à brachiali separatione. Id enim cauere uelim, ne brachialis ossa inuicem dirimas, unde etiā ilico atque id integrum à cubito, & pollicis primo ossē, & postbrachiali disiunxeris, obiter duntaxat tendines ligamentaque ipsi obnata diuelles, id studens, ne ossa in interna externaque ipsorum superficie penitus ligamentis emundentur, ut ligamentorum beneficio brachialis ossa inuicem hæreāt. Brachiali enim ita igni

adhibito ligamenta sensim reficcata, ipsius ossa firmiter continent, leuiorūq; negotio in ossium connexu brachiale, cubiti & postbrachialis ossibus cōmittitur: nisi forte in iungēdis ossibus peritior, brachialis ossa mutuō dirimere, ac ligamētis emūdere, postmodumq; aenis filis inuicem committere audeas, aut etiā disiuncta asseruare uelis. Mox ubi brachiale in eum modum igni apposueris, chartam assumes, cui postbrachialis & digitorum ossa, non prætermisissis selaminis ossibus, exactē emundata imponas: quo minus hæc illi chartæ inuoluta, neque alterius manus ossibus confusa, in committendis ossibus negotium augeant. Condukerit igitur, manuum pedumq; ossa separatim in quatuor chartas recludere. Priusquam tamen huius illiusue manus, aut pedis ossa chartæ implicas, antea semper indagandum est, num aliquod os nō mundatum super sit, ne quum putamina & ius abijciendum curas, unā aliquot ossa oscitāter simul auferenda porrigas. et si forte unguem asseruare uisum sit, illum dum pedis manuumq; digitorū ossa expurgas, auelles. Nō minus enim humanos ungues, quā auium & quadrupedum ungues, à pedibus calenti aquæ impositis, elixatione recedere conspiciamus. Porro quum ulnam & radius emundas, cartilago non negligetur, quæ à radio profecta, magna ex parte ulnam à brachiali dirimit. Hæc namq; ab ulna liberabitur, ut radio adhuc connata, in ossium connexu, rursum ulnam & brachiale intercedat. Quinetiam quando caput purgas, accuratissimè caueto, ne membranam, quæ auditus organi foramen succingit euellens, ossicula illa negligenter eximas, quæ eius organi constructionem subintrant. quippe illa stylo quopiam in foramen missa, sunt studiose euellenda, & pariter excutiēda. Hæc ossicula ad reliquā ossium colligationem, aliquod recondes, & uertebras omnium postremo ē iure eximes, quemadmodū & sacrum os: nisi forte post aliquam elixationem, coccyx os à sacro liberare lubeat, quod scilicet huius ossicula, ob cartilaginea ligamenta, quæ ipsa connectunt, si diutius coquantur, ab inuicē seiungi soleant. Si tamen coccygis ossis præcindi gratia, os sacrū eximeris, id denuō cacabo est immittendum, coccyxq; os priuatim in chartam reponendum, aut in sportulam coniiciendum, in quam minuta locabis ossicula: cuiusmodi dentes sunt, si forte ipsorum aliquis exciderit, aut aliqua ossis portio oscitanter effracta fuerit. Verū ut pubis ossium cartilaginem serues, priusquam illium ossa à sacro liberas, pubis ossa anteriori posterioriq; sede leuiter funta emundanda, ac dein inuicem solis manibus seiungenda, ut ipsa intercedens cartilago ab altero osse abscedat, unūq; duntaxat commissa maneat, leui negotio postmodū in ossium connexu, cum altero pubis osse iungenda. Ossa hac ratione purgata denuō numerabis, non quidem manuum & pedū ossa, quæ iam seorsum chartis prius inuoluisti, uerum recensabis caluariæ partem, quam serra à reliquo capite ademisti: in qua considerabis, num portiunculæ temporum ossium, quæ instar squamæ uerticis ossibus applicantur, atque serra à cætera temporum portione auferri solent, ex elixatione deciderint, ne forte illas cum ossium spolijs aut iure reiicienda cures. Solent enim facile à uerticis ossibus decidere, si casu serræ sectio multum supra aurem ducta fuerit. Deinde num dens aliquis ex superiori inferioriue maxilla exciderit, perpendes, & uiginti quatuor uertebras totidemq; costas enumerabis, duas clauiculas, duas scapulas, duos humeros, duas ulnas, & radios duos, sacrum os, à quo iam antea coccyx os ademptū est: duo grandia ossa sacri ossis lateribus nexa, femora duo, tibię ossa duo, & fibulas duas, item patellas similiter duas. Atque ubi omnia enumeraueris, magnopere cōdukeris, ossa denuō mundæ & bullienti aquæ indere, ac mox exempta seorsum aspero rudiq; linteo abstergere, & si quæ ligamentorū, aut membranarum, aut musculorum insertionis exortus ue sint reliquæ, eas defricare abstergereq; cōuenit, studio interim adhibito, ne lubrica, & crustæ modo ossibus adhibita cartilago simul auferatur. Interea uerō dum hæc in orbem igni apposita leuiter desiccantur, aurium cartilagine cute deteguntur, chartæ cum reliquis cartilaginibus applicandæ. Idem quoq; in palpebrarum & narium cartilaginibus molendum est, ac deinceps acutis cultellis os referens, à musculis ipsi cōmissis, quā licebit exactissimè crudum emūdabis. Purgato illo osse, laryngis cartilagine similiter crudas accuratè carnibus membranisque liberabis, simul cum una atq; altera asperæ arteriæ trūci cartilagine, C imaginē cōparatē. Iam pectoris os, ipsiq; cōnexas cartilagine sedulo emundabis, quod eo minus promptè perfeceris, quo id pluribus obducitur membranarum, pingueq; est, & interim coquendum ne utiquam uenit, uixq; calente aqua aspergendū. Quum uerō cartilagine carne spoliata, cauendum est, ne membranam cartilaginibus proximè obductam, illiq; correspondentem auferas, quæ quod os ambit, *μεμβράνη* Græcis uocatur. Quippe hac membrana à cartilaginibus discreta, illæ infirmius pectoris ossi cōmittuntur, & cōtractæ breues intortæq; euadūt. Et quo minus cartilagine hæc contrahantur, pectoris os ad ignem non est excicandum, sed aliquid tantisper, dum ossa necere proposueris, in loco non nimis humido reponendum, ne rursus cartilagine plus æquo flaccescat, ac postea deformem thoracis ossium fabricam cōstituant.

Quan-

Quandoquidem nihil prorsus est, quod æquè elegantem sceleti struem uitiat, atque pectoris os cum cartilaginibus, si modo illæ negligentius obseruentur, & non iam compactis ossibus potius, quàm manta, excicari permittatur. Reliquas autè cartilagines chartæ adhibitas, licebit igni non nihil admouere, at ita, ne nimium conuellantur: quum latius sit, & has quoque post compactionem sicari. Iam integrè tibi est ossa & cartilagines ad eum quem mox dicam modum con texere, aut dissoluta asseruare: quod longè etiam præstiterit, si modò aut cõnexis, aut dissolutis carendum esset. Ossà namque distincta, & in oblongam arcam seriatim posita, quouis tempore seorsum conspici, ac omnia quæ ad ossium cognitionem spectant, edocere possunt, quæ autem erecta cõmissa sunt, sinus, capitaque ossium non admodum accuratè cõmonstrant, sed ut uerè dicam, ad ostentationem potius quàm ad disciplinam conducunt. Quanquam rursus ad disciplinam illa ossa accommodatissima sunt, quæ subducuntur ex Italicis monumentis, penus mo do (ut hic ferè omnia) extructis, & sub impluuiò aliquo, aut alioquin aëri ita expositis, ut hæc pluuialem aquam quandoque excipiant. Præter id namque quòd monumèta eiusmodi humida sunt, etiam aqua subinde accedit, cuius beneficio omnia quæ ossibus adnascuntur promptissimè marcescunt, adeò ut illa ossa post aliquot annos exempta, & obiter abluta, sint integerrima, nihilque modo in ossibus spectandum commonstrent, si in arcam seriatim citra connexum reponantur. ad coniungendum enim prorsus sunt inutilia, cum propter egregiam duritiem, tum propter deperditas costarum totiusque corporis cartilagines, quæ si fortè reperiuntur, ob putredinem sunt friabiles, & undique ab ossibus liberæ. Rursus ad hunc usum sunt inutilia, quæ è terra apud alias nationes effodiuntur, & cumulati in cœmiterijs asseruantur. Præter hoc enim, quòd illa carie ob terræ siccitatem afficiuntur, omnia eiusdem hominis ossa nunquam uelut in dictis nuper monumètis reperiens, uel Parisijs etiam in Innocenti cœmiterio. Vbi, si modò alibi, quamplurimos ossium quæ è terra fodiuntur, habes acervos: qui mihi quando primum ossa cum MAT THÆO TERMINO, in omnibus medicinæ partibus insigni medico, & dum uiuam mihi colendo studiorum sodali doctissimo discerem, adeò nobis uberem suppeditarunt copiam, ut longo indefessoque spectandi usu edocti, etiam obuinctis oculis cum sodalibus interdum deponere ausi fuerimus, unius mediæ horæ spacio nullum os ex tot acervis porrigi posse, quod, cuiusmodi diu esset, tactu non diiudicemus, atque id eo nobis faciendum erat studiosius, quo discendi cupididi, magis præceptorum opera, in hac medicinæ parte destituebamur. Porro quod ad coctum ossium connexum erectionemque attinet, ea mox post emundationem (ne nimium indure scant) committenda sunt, nam statim à coctione, ossa solis subulis, quibus suppinguntur calcei, citra negotium perforantur, aeneisque filis mutuò alligantur: quod quisque prout manum nactus est industriam, & ea quæ hætenus toto libro descripsimus, minus obaudiuerit, suo Marte perficiet. Ac primò quidè aliquot paratis subulis, aeneo filo partim crassiore, partim tenuiore, filum igni inderit, quo postmodum magis sequax, & quantumuis uariè intortum, minus rumpatur. His addentur duæ tenaculæ, seu forcipes: unus quidem quo filum intorquebitur, alter autem quo intortum iam absecabitur. Auspicaberis autè ossium colligationem à pedibus, ac primum calcis talum iunges, & deinde cubiforme os calcis, & cymbam referens talo, & tria interiora tarfi ossa cymbam referenti, deinde his cõmittes pedis ossa, hisque seriatim digitorum ossa, cum ossiculis se lamino cõparatis. quæ ideo cautius & tenuiori subula perforabis, quo duriora solidioraque sunt, & ex subulæ impetu propius diuisa dissiliunt. Vbi utrunque pedem iunxeris, tibie ossis tuber, quod sinus femoris capita excipientes dirimit, cultro aliquo oblongo, sed arcto perforandum est, quod excipiendo duriori baculo sufficiat, qui femori etiam intrusus clauu ritu ita tibiam femori committat, uti asseres absque glutine necesse cernimus. Est enim in femoris inferiori sede aliud foramen moliendum, illi è directo consistens, quod in tibia fieri uolebam, ut idem baculus & femori & tibie indatur, huiusque ope articulus genu inflexus maneat. Præter hunc baculum tamen, femur tibie ossi utrinque crassiori filo committendum est, non prætermisiss cartilaginibus tibie ossis sinus augentibus. quæ quum hæc ossa iunguntur simul cum illis constricta, in articulo genu seruiabuntur. Mox fibula tibie ossi supra infraque alligabitur, & patella simul femori ac tibie firmabitur. Hoc ubi in utroque crure præstitum erit, sacri ossis lateribus ilium ossa crassiori filo sunt necessaria, ac deinde pubis ossa interueniente etiam illorum cartilagine iungenda. Iam ad manum erit orbicularis asser, in quem ossa erigenda ducis, aptè firmari queant. Huius asseris medio foramen in hoc paratur, ut quum ossa in erectam arcam recondes, inferior arcæ fundus axem habeat: quæ foramini illi indita, orbem conuolui sinat. Præter hoc foramen, aliud iuxta orbis circumferentiam aprabitur, in quo lignum firmari queat, quod instar teli, aut hastæ, aut falcis (utcunque uisum erit) paratum, sceleti manus suffulciat. Extructo

Quæ ossa ad disciplinam nobilissima.

Emendata ossa quomodo iungenda.

Huiusmodi instrumenta ferè se niam pro pōit cūbu lacap. 7 lib. 2 ad chara. S, T, V, X, Y.

in hunc modum orbi pedes imponēs, & astantis alicuius ope super pedes reliqua crurum ossa inniti curabis, ac deinde femorum capita in coxendicum ossium acetabulis indes, ut recte filo aut uirgula interuallū metiaris, quod ab orbe ad humiliorē sedem foraminis pertinet, in sacro ossē dorsalis medullæ gratia incisi. Hoc etenim interuallum edocebit, quam mensura ferrū fabricandum sit, quod orbi affixum, & ossis sacri reliquarumq; uerterarū foramini dorsalem medullam transmittenti inditum, uniuersa ossa pulchrē sustinebit. Ferrū namq; ita aptandum est, ut ualidē orbis medio clauis affigatur, & ab orbe ad infimam usq; nuper dicti foraminis sedem, teres aut quadratum sit. ab illa autem sede sursum latius quā crassius esse conuenit, ut postmodum ad dorsi inflexum obliquari queat, uerteræq; ipsi ita adaptentur, ut immotæ ad id neutiquam circunuertantur. Atq; ideo ferrum inibi primum tenuius fiet, ubi sacrum os ne deorsum subsideat, suffulciendum uenit. Nisi enim hoc os firmetur, sustineaturq; unā cum ipso reliquæ uerteræ sensim descendēt, temporisq; successu sceleri crura turpiter obliquabūtur. Accuratē igitur ab orbe ad sacri ossis foraminis infimā sedem, longitudo metienda uenit. De reliqua autem ferri longitudine non adeo curandum est, quum hæc si fortē longior sit, post ossium cōpactionem faciliē præscindatur. Et etiā si ossa arcē imponenda duxeris, magnopere iuuerit ferrum plus minus duabus palmis lōgius quā uniuersum sit scleton, fieri, ut ipsius portio extra uerticem eminens, superioris arcæ fundi foramini possit indiri, in ipsoq; conuolui. Ferro itaq; orbi perpendicularim affixo, acutiori cultello ossis sacri foramen dorsalis medullæ nomine incisum, sensim ita exculpes, ut ferrum ipsi commodē intrudi possit. Nam quum hoc foramen natura artius sit, & insigniter obliquū, nequaquam ferrum admittit, nisi quemadmodū iam diximus, sic augeatur, ut à ferri mucrone os sacrum ad eam usq; ferri sedem protrudere ualeas, quam nō amplius teretem, quadratam uē faciendam inuimus. & si casu hæc sedes os sacrum minus aptē suffulcitur uidebitur, opere precium erit eam ferri sedem lima exasperare, ac dein nodum illi ex æneo filo obuoluere, qui os sacrum cōmodē sustineat. Osse sacro in hunc modum suffulto, crassiori filo femoris capita coxendicum acetabulis innectes, diligenter perpendens quantum hæc aut extrorsum aut introrsum intorqueas, ne fortē crura turpiter intorta committas, aut patellæ, interiora potius crurum, quā anteriora respiciāt, quod sanē futurū est, nisi ad amussim capita suis sinibus iunxeris. Vt cūq; tamen feceris, in hoc connexu filum prorsus intorquendū non est, priusquam pedes orbi & tibijs eo situ commiseris, qui tibi apparebit elegantior. Hunc à baculi, quo manus stabilientur forma, potissimum petes: alium quippe situm messoria falsæ, alium telum, & alium rursus hasta, aut Neptuni tridens, aut aliud quoduis instrumentū expectit. Modò uerteræ omnes seriatim accommodandæ sunt, quo cuiusq; situm ordinemq; inuentu non arduum obserues. hunc namq; uerterarū forma, & articulationis ratio promptē ostendunt. Quum primum itaq; ordinatim omnes in mēsam reposeris, quinq; lumborū uerterbras inuicem duobus nexibus cōmittes, qui in corporum lateribus facti, unā cartilagineū ligamentum contineant, quod uerterarum corpora interuenire dictum est. atq; huiusmodi ligamenta seriatim à charta cui illa applicasti, sunt assumenda, eo semper relicto, quod eas intercedit uerterbras, quas inuicē non alligas. quemadmodum in præsentia est ligamentū seu cartilago, sacrum os & infimam lumborum intercedens uerterbrā, idq; quod supremam lumborum & infimam thoracis uerterbras interuenit. lūcis enim lumborū uerterbris, sex inferiores thoracis inuicē, & postmodum sex superiores unā cum ceruicis humiliorē cōnectentur. Reliquæ enim ceruicis mutuo nō sunt colligandæ, sed eas interueniēs cartilago corpori inferioris uerteræ duntaxat est glutināda. quandoquidem ceruicis uerterbre etiam non nexæ, sed ferro tantū inditæ, suā seruant sedem: neq; thoracis uerterarū modo immotæ, postmodum costas sustinere debēt. Illico igitur atq; uerterbras ad eam, quam præcepi rationem, priusq; ferrum illis traiciatur cōmiseris, lumborum uerterbras ita cōnexas ferro impones, idq; sedulo ad eorum situm inflexum uē obliquabis, ac infimā uerterbrā unā cum sacro ossē ita cōmittes, ut iam prius lumborū uerterbæ mutuo uinxisti. Mox his inferiores thoracis adiunges, perpetuò quam licebit accuratissimē ferrū, uti necessum erit, complicans, & infimam thoracis uerterbram supremæ lumborū adnectens. His pari modo superiores thoracis uerterbræ addentur, & harum infima supremæ earum quæ iam ferro appositæ fuerāt, alligata, latiusculum & longum nigroq; colore intinctum adaptabis baculum, qui posteriori ferri parti appositus, quā licebit demissē inter ferrum & uerterbras intrudetur, ut huius baculi beneficio uerterbræ ad ferrū firmius contineantur, neq; ulla ratione uersatiles sint, ne postmodum uniuersus thorax in hoc illud uelatus turpiter conuolui queat. Vt autē caluaria ferro applicetur, necessum est uerticē foramine quodam perforari, ad amussim ferri amplitudini & crassici correspondente, ne quando ipsi ferrum traieceris, caluaria quauis occasione quoquoersum circunuertatur. prout enim faciem anteriore exacte aut latera spe-

ctare uolueris, foramen id aut transuerſim, aut oblique inſculpere cultro quopiam oportet, quemadmodū & illic ubi caluaria denuo perforanda eſt, ut ligulis ea ſecūo quam ſerra in caluaria molitus es, cōmittatur, & quū uisum fuerit, caluaria à ferro adempta, rui ſus diſſolui queat, ſummopere nanq̃ cōducit, internā caluariæ amplitudinē qua cerebrū cōnectur intueri, quod ut fiat, utraq̃ caluariæ pars tribus foraminibus ſibi mutuò correfpondentibus candenti ferro, aut cultri mucrone eſt perforanda, ac unum quidē foramen opportunē in occipitio perficitur, & utrinq̃ in temporibus unum. At inferiorem maxillā aneo filo cum ſuperiori cōmittes, nexu ſuis capitibus in ſinus ſuperioris maxillæ factō. Verum quū hic cōnexus nō adeo firmus ſit, ut accuratē dentes mutuò applicet, ſed inferior maxilla dependeat, elegās q̃ ſit, hanc ſuperiori modo iungi, modo diſiungi, præter dictū nexum, maxillæ inferioris acuti proceſſus etiā perforandi ſunt, & funiculus iſtis illigandus, qui ſubiugalibus traiectus oſſibus & uertici incumbens, nunc uerſus frontem, nunc uerſus occipitium tendi poſſit, dentes q̃ ita collidi queant. Vt cunq̃ uerò ſit, poſſiſſima ferri cura eſſe debet, ne illud ineptē nunc in poſteriora nunc in priora obliquatum, corpus indecorē erigat. quò minus autē id fiat, magnopere conduxerit dorſi ductum cognouiſſe. Porro nunc tempeſtiuū erit coſtas uertebreis & ſuis cartilaginibus alligare, quod ſanē ut ad amuſſim & ſedulo faciās, primū omnes dexteras coſtas à ſiniſtris diſcernes, coniectura uel à ſinu ſumpta, quo uena, neruus & arteria coſtis exporrigitur, dein à ſuperiori coſtarum ſede, que latior ſpiſſiorq̃ inferiori occurrit. Deinceps in hunc ſerē modū ((())) coſtas menſe ſeriatim impones, ut dextræ ſiniſtris reſpondeant curans. Promptū enim erit ſingulas ſuis ſedibus ponere, ſi ea modo memoriæ non exciderint, que ad internofcendas coſtas ſuprà cōmemorauimus. Ex hac coſtarū ſerie primā utriuſq̃ lateris coſtam ſue cartilagini ad pectoris os adnectes, & deinde ſodali pectoris os cum ſuis cartilaginibus in ſua ſede tenendū porriges, ac deinceps primas coſtas primæ thoracis uertebre trāſuerſis proceſſibus alligabis. Inſuper ſecondas coſtas ſuæ cōmittes uertebre, & poſtmodū ipſarū cartilaginibus, atq̃ ita ſeriatim omnes obſeruās interim, ut illas coſtas toto interuallo prorfus dehileſcere ſinas, que ante ſectiōnem cartilaginibus inuicem diremptæ fuerāt. Nunc humeros ſpiſſiori filo ſcapulis neſtes, & deinde tenuiori filo clauiculas ſummis humeris, mox ſcapulas coſtis, & clauiculas pectoris oſſi. Quum tamen humeros ſcapulis aduincies, expendendū eſt, quò nam ſitu manus collocādas duxeris. Hic enim multū refert, quomodo ſcapulæ ſinui caput humeri cōmittatur, in quo etiā connexu cartilago neutiquam prætereunda eſt, cuius auxilio ſcapulæ ſinus interdū adaugetur, atq̃ ita etiā cartilagine maxillarū & clauicularū articulis peculiare nō negleſtæ ſuis articulis neſtentur. Cæterū cubiti oſſa humero uinciēda nō ſunt, priuſquam extrema manus tota fuerit nexa. radii itaq̃ ſuprà inſtrūq̃ ulnæ eſt colligādas. deinde ſi brachialis oſſa diſuncta, ſuisq̃ ligamentis libera ſunt, ea inuicem ſunt cōmittenda, aliās autē ſuorum ligamentorū interuentu abundē continētur. Inferiori ipſorū ſedi primum pollicis os, & quatuor poſtbrachialis oſſa, ac deinde his digitorū oſſa, unā cum ſeſaminis oſſiculis adnectes. Poſtremo autē brachiale radio iunges, & deinde ulnam humero. Atq̃ ubi id in utraq̃ manu præſtitū erit, ſummas manus baculo illi alligabis, quem ualidē orbi inſixū inſtar falcis, aut aliter extruendū dixi. Ereſtis nunc oſſibus, & ex oſſe u referenti, & auditus organi oſſiculis, ac aſperæ arteriæ, auriumq̃ & palpebrarū cartilaginibus, & ungue cordisq̃ cartilaginibus, monile licebit conſingere, his omnibus catenulæ, aut exciccatō cruris aut manus neruo adnexis. Hinc liquet, quā leui negotio humani corporis oſſa, oppido quā medico exoptāda, parari queant: quo in opere nihil ipſo cōnexu, non aggredienti, difficilius uidebitur. qui tamen mihi primum experienti ſatis pulchrē ſuccceſſit, exemplo ab illis ſumpto, quos effractas ſcutellas & lapideos cacabos cōpingere interdū uideram. Coſtioneis autem rationē, emolliēdi in medicina uis docuerat: Lutetia nanq̃ ob belli tumultus Louaniū reuerſus, atq̃ unā cum GEMMA PHRYſIO, æquē celebri Medico ac pauciſſimis conferendo Mathematico, oſſium uidendorū nomine ad eum locū quo magna ſtudioſorum cōmoditate omnes ultimo affectū ſupplicio in publica uia ruſticis proponi ſolent, obambulās, in eiufmodi incidi aſſiccatū cadauer, quale latronis erat, quod Galenus ſe ſpectaſſe commemorat. Vt enim hoc aues carne liberarāt, ita ſanē illud quoq̃ ipſas emundatſe conſicio, quia homo ille ante annū ſtramine duntaxat obuſtus, & quaſi toſtus, paloq̃ alligatus, ita ſua uēſcam auihus exhibuerat, ut nuda undiq̃ eſſent oſſa, eaq̃ ſolis ligamentis haererēt, muſculorum exortibus & inſertionibus duntaxat aſſeruatis. quod in ſuſpenſis nunquam uſu uenit, quum præter oculos (& ſi uulguſ aliter arbitretur) uolucres nihil ob cutis craſſitiem dilaniēt, ac proinde integra in his cute, oſſa intus carie afficiuntur, prorfusq̃ ad diſciplinam ſunt inutilia. Aſſiccatum itaq̃ & nulla ex parte humidum ſordidum ue corpus intuens, haud quāq̃ inſperatam ac ſubinde expetitā mihi occaſionē prætermiſi, quiniſſimò Gemmæ beneficio palum cōſcendens,

femur à coxendicis osse diuulsi, trahentiq; mihi, unà cum brachijs ac manibus, scapulae quoq; subsecutę sunt, deerāt tamen alterius manus digiti, & patella utraq; unà cum pede altero. Quia itaq; crura & brachia (relictō cū totius corporis trunco, capite) clam repetitis uicibus domum detulisse, ut thoracē qui catena alte firmabatur nancisceretur, extra ciuitatē me uesperī excludi passus sum: tantoq; obtinendū ossium desiderio & studio ardebam, ut media nocte in illa corporum multitudine quod expetebā diucllere nō horruerim, haud mediocri labore ac industria, sine arbitris, palum cōscendens. Verū detracta ossa procul illinc deferēs, in secretiori loco condidi, frustatimq; altera die per aliā ciuitatis portā domū detuli. Porro quū ligamenta rescindere coepissem, nihil ob egregiā eorum duriciē promouī, ac illa seruētē aqua emollire coactus sum: utq; uoti compos redderet, omnia ossa tandē tacite ita coxi, illisq; emūdatīs illud sceleton extruxi, quod Louanij apud longe amicissimum mihi GISEBERTVM CARBONEM, insignē ac uario disciplinarū genere instructū medicū, meumq; à puero studiorū commilitonē asseruatur. Atq; id sceleton adeo praeproperē parauī, & manū ac pedem, duasq; patellas nō minori labore & industria aliunde conquisiui, ut omnibus persuaferim id me Lutetia aduexisse, quo omnē subreptorū ossium suspiciōē dederem. quamuis eius urbis Prætor postmodū adeo medicinæ candidatorū studijs fauit, ut quoduis corpus à se impetrari gauderet: ac ipse nō uulgariter Anatomes cognitione afficeretur, n. hīq; illic Anatomem administranti sedulo altaret. Quum igitur primum tentantibus nobis adeo promptē negociū successerit, quid nunc futurū existimandum, postquam cōponendi quoq; rationem alijs descripsimus: & præter subiungendas nunc tabulas, in plurimis Academijs, uel nostra opera, sceleta uiuentur: Verū non hominis solum ossa, sed, uel Galeni nomine, simiæ & canum, ac Aristotelis etiam gratia auium pisciumq; & reptilium inuicem connexa, aut saltem disiuncta apud medicinæ & naturalis philosophiæ studiosum esse oporteret. Nisi fortē hanc philosophiæ partē ad nos nihil pertinere arbitremur, satisq; esse nobis persuadeamus, si nostris syrupis, citra Anatomem imponere mortilibus, & loculos opplere possimus.


DE OSSIVM NVMERO. CAP. LX.



PARVO dubito plerosq; alicubi à me ossium quoq; numerū desideraturos: quibus nullum aliud consiliū dari uelim, quā, ut ex singulis huius libri Capitibus illū petant. prolixius enim esset, hīc omnia recensere. Quāuis ne tantillum laboris subterfugisse uidear, non enumeratis appendicibus, & ossibus ita ut in prouectioris ætatis hominibus se habent, cōstitutus, ad hunc modum ea recensere nihil impedit. Caluarie ossa uiginti sunt, octo quidem capitis, & maxillæ superioris duodecim: ita tamen, ut iugalia priuatim nō enumerentur, quum quorundam illorum uiginti ossium partes seu sedes tantū sint, propriaq; circūscriptioe destituantur. auditus organi ossa quatuor sunt, duo scilicet ad singulas aures. dentes sunt triginta duo, maxillæ inferioris os unicum. ossis u referentis ossicula sunt ferē undecim. Vertebrae uiginti quatuor. sacri ossis ossa sex, coccygis autem quatuor, costæ uiginti quatuor. Pectoris ossis tria numerauimus ossa, alijs autē septena recensentur, sed age hac enumeratione tria tantum sint: & aliās ex tuo arbitratu, quot uisum tibi fuerit. scapulae duæ: totidem clauiculæ, & humeri duo, ulnæ duæ, radij duo, brachialis ossa sedecim, utriusq; scilicet manus octo, octo item postbrachialis ossa, in utraque manu quatuor, digitorum ossa triginta: utriusq; manus nimirū quindecim, sesamina ossicula in singulis manibus ut minimū sunt duodecim, ac proinde iam uiginti quatuor illa in manibus recenseamus. Ossa sacri ossis lateribus commissa, duo, femora duo, duo tibiārū ossa, fibulae duæ, duæ patellæ, duæ calces, tali duo, n. uicularia ossa duo, tarfi ossa octo, in utroq; pede quatuor, decem pedij ossa, in utroq; pede quinque, uiginti octo digitorum pedis ossa, cuiusq; nimirum pedis quatuordecim, pedis sesamina ossicula similiter atq; in manibus uiginti quatuor, quāuis nonnulla sint prorsus cartilaginea. Ac proinde si hæc ossa in unum numerū reijcias, uniuersa erunt (si rectē addo) trecenta & quatuor, quibus si pectoris ossa quatuor adhuc adijci uelles, & maxillæ inferioris duo ossa statueres, essent trecenta & septem. Verum si priuatim omnes appendices (quū ossa sint propria circūscriptioe in pueris terminata) enumerare lubeat, facile dictum nuper numerū semel, ac rursus dimidio duplicares. quod uel hinc colliges, si uertebras, femora, tibiæ ossa, atque alia quæ multis appendicibus donantur, in memoriā reuocaueris. Rursus si ossa ut in pueris uiuentur subduxeris, Dij boni quantū ossium acruum cumularis: quum omnes uertebræ, aut tribus aut duobus content ossibus: & ossa quæ sacro coarctantur, tribus, idq; generis reliqua: adeo ut cuiq; suo arbitratu ossium numerum confingere sit integrum.


HVMANI COR-
SIMVL COMPACTO-
EX FACIE EXPRES-

PORIS OSSIVM
RVM ANTERIORI
SIO.




HUMANI COR-
TERIS QVAS SV-
LIBERORVM, SVAQVE
latere delineatio.

PORIS OSSIVM CAE-
STINENT PARTIBVS
SEDE POSITORVM EX



DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER I. 187
CORPORIS HVMANI OSSA
POSTERIORI FACIE PROPOSITA.



- § 1, 2, 3** Temporis ofstis processus, uberis papillā referēs, *μαστόδους*, mamillaris, *עצם בטיי* bezē potmij.
E 2, 3 Os cuncto comparatum, *σφνωφδούς*, Galeno *ἡσπιδὸς* (etiam sipalatum uix contingit) circūscribitur, *πρόνυμοσφυ*. Cuneiforme palati os, *basillare*, quauis sic etiam appellent occipitis os, *בית המוח* moscau hamaach. Baxillare, paxillum, os colatorij, os cribratum, cauilla: quam *ἡ* ita talum quoque uocent. **2** Sedes caluarie, quam lapidosam dicimus.
θ 2 Cuneiformis ofstis processus, uestertilionū alis assimilati, *ἡσπιδόδους*, *עצם בנפיי* bezē chenaphij.
F 1, 2, 3 Hæc sedes simul cum sua coniuge in altero latere, uocatur ossa iugalia. *ζυγωματις, ζυγοδόν, ζυγώδης*. *עצמות חוג* hazamoth hazogh. Ossa paris, paria, quæ nomina illi etiam temporū ascribūt ossibus, an sæ ossium temporum, arcualia ossa.
Superioris maxilla duodecim ossibus nullum inscripsimus characterem, quod priuatis destituantur nominibus, quanquam interim septum narium, nonnullis cristæ os nuncupetur. Cæterum superior maxilla dicitur *γινυς*, mandibula, *הלהי העליון* halechi habelioi. quæ nomina *ἡ* inferiori maxillæ *G* in trib. figuris notatæ accommodātur, quā Halyabatis interpres priuatim Faucē uocat. **G**.
Dentes, *δοντεις, שיניים* scinajim, plurimum in utraque maxilla sedecim figuntur, quorum quatuor medij, anterioresq̃, incisorijs uocātur. *πυῖς, διχεςίνες, λεῖπες, γλασίνος, ρισορί*, quaterij. *המחברים* ha mechatechim quadrupli. Verū duo medij, priuatim duales illis appellātur. Qui utriusq̃ incisorijs proximus est, caninus uocatur, sūtq̃ ita utriusq̃ maxillæ duo canini. *κυνόδοντες*. *בלבים או בהלעות* balbim au behaleot. *χελαιμ* aut metalebth. mordentes, hos quidā quoq̃ risorios uocauerunt. Quinq̃ autem utriusque insequētes, molares appellantur. *μυλῶντες, γόμφος*. molares, maxillares, paxillares, Cicero Geniuinos, quo nomine alij eos appellant, qui post pubertatem ferē crescunt, ac Græcis *σωφρονισίνες, λεζανίνες, ὀδόντοι* uocantur: nostris dentes sensus ac sapientiæ, dein cayseles, *נאגחיד* naghuid, negegidi, nanged, alhalm. Molares uerō, Hebræis dicuntur *טוחנות* tochanob.
H 2 Os u referens. *ὀστέος, ὑπὸστέος, λαμβανόντες, παρὰστέον, φρεγγύσπον*. os u aut *Λ* imaginem exprimens. *עצם לאמי או למדי* bezem lhami aut lamdij. Linguae os, gutturis os, os laude, os morsus Adam. Auicenna: Interpres Capite de Gutturē habet: *Alfaic* os habēs quatuor latera, duo inferiūs, duo superiūs, quod non obiter Anatomes studioso obseruandum uenit.
I, K, L, M, N His characteribus, in tribus figuris ferē conspicuis dorsum notatur, quod *σπῆνις, ἄσπινος, σπῖνα, τεργῖ*, hominis carina. *שררה* scidra nuncupatū, multis extruitur uertebri, *σπονδυλοισ, חוליות* chulioth. Verticulis, ossibus fusi, quæ in posteriori sede acutiū educūt processum, qui *ἀσπινος*, Siminea, adscensum senasem uocatur. Cæterum ab *I* ad *K* indicatur ceruix. *τραχηλῶς, ὤκω*, collum. *צאור או צאור* zaur uel gharron. Tenon athlas, quod nomen alij septimæ ceruicis uertebrae dumtaxat tribuunt. Porro a *K* ad *L* uertebrae insigniuntur thoracis, *θώρακος*, aliquando *ἡ στήθος, μεσασθενος*. pectoris, inter dum dorsi simpliciter. *חזה* chaze. inter scapilij. Ab *L* ad *M* uertebrae lumborum. *ὀσφύς, ῥύς, ῥαχίς*. renum. *מיתנים* mothnaim. alchatin. Ab *M* ad *N* os sacriū proponitur. *ἰσθμῶς, ἡλκῶς*. latum. *עצם בתע* bezem pi batabath. lumbare, ossa clauui, clauui, alagas, agit, abbans, abbaui, uetula, ofamiū, ofaniū, quæ nomina coccygi ofsi ab alijs ascribūtur. *N* inscribitur coccyx os. *κόκκυξ, σπονδυλοισ, ῥέφροπύγος*. *עצה* haaze. caudæ os, albosos, dein reliqua, quæ ofsi sacro ex quorundam interpretum sententia tribuimus nomina.
O 1, 2, 3 Pectoris os. *στένον*. quo nomine nonnulli superiorem ofsis partem appellant, inferiorem tunc *σπῆνις* nuncupantes. *עצם חתות* bezem behace. thorax, asser, cossos, scutum cordis.
P 1, 2, 3 Mucronata pectoris cartilago, ensi cōparata. *ἐπισπῆνις*, ensiformis. *עצם ברליי רחב* bezē bedelij rachauth. *גברוני, אלחנגרי* alchangri, quibus nominibus uniuersum pectoris os donatur. Malū granatū ensifoidis, cultralis, epiglottalis cartilago, scuti, clypeus oris stomachi, medium furculæ inferioris. **1, 2, 3** cæt. usque ad **12**. In tribus figuris duodecim thoracis costæ tam ueræ ac legitimæ, quàm nothæ spurie ue indicantur. *ἀλυσγῶν*. *צלעות* zelaboth.
Q 1, 2, 3 Clauicula. *κλαυδῶν*. clauēs, iugula, sunt qui *ἡ* has humeros appellarunt. *כבש* scechē. Furculæ, aut priuatim furculæ inferiores, quas ab humiliori pectoris ofsis sede, ita distinguunt.
R 1, 2, 3 Scapula. *ἀσπῶς, ὠμοσπῆνις, ῥαχίς, ῥαχίς*. Scapula, Latinis plerunq̃ etiam humerus nuncupatur, scoptulum opertum, scoptula. *חזה* chatheph. Spatula, clypeus *ἡ* scutum pectoris. Cæterum *λ* in tribus figuris, superior scapulæ insignitur processus, quem summum humerum ferē uocamus, *ἡ ἀσπῶς*, aliquando aut Hippocrati *ῥαχίς* dictus. Galeno etiā *σκαρῶσος* dictus. *אגרוס חרסום* agrasso chartom, *בי העיבור* pi haboreub. Rostrum porcinum, caput a scapulæ. *alacharam*, manu. *char*, algarab, destructū. Processus autem scapulæ interior inferior ue, in prima figura *μ* indica

- tus, dicitur ἀγκυράδης, Galeno interdum ἀγκυράδης, ἀγκυράδης. Anchoræ formis, C literā refe-
 res, processus. עין חכמה hayn hacateph. Oculus scapulae, quo etiā nomine scapulae spina nūcupatur.
 S^{1,2,3} Humerus, seu brachij os, ὤμων. Brachij, sunt quibus ulna uocetur. קנה הררע. chane hazeroha,
 hazad. Paruum brachium, adiutorium brachij, canna brachij, aeth.
 T, V^{1,2,3} Totā hanc sedes, cubitus nūcupatur. πῦχος, ὠλεῖν, ὠλεῖν. Cubitus, ulna, quæ nomina etiā infe-
 riori huius sedis osi tribuuntur. זאנדין andin, זרוע zeroba, שתי עמודים scete hamudim. Afsaid,
 afeid, alfabad. X^{1,2,3} Superius in cubito os, radius nobis appellatū. ὠλεῖν. עמוד העליון
 hamud haelion. Focile minus brachij, canna, arundo minor brachij.
 Y^{1,2,3} Cubiti inferioris os, ulna nobis dictum, eisdemq; cum toto cubito uocibus donatum. πῦχος ὠλεῖν
 hamud hatachthon. Focile maius brachij, cāna, ac arūdo maior et inferior brachij.
 v. Huius processū v in secūda insignitum Græci nuncupant ὠλεῖν ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, Latinorū qui
 ξ. dam Gibberū. Additamentū necatū. Processus autē ξ insignitus, ac stylū referens, ὠλεῖν.
 Z, Z^{1,2,3} Brachiale. ὠλεῖν. Palma quibusdam. רכס rasegh. Rascha, raseta, ascam, ofsa rasete.
 Γ^{1,2} Postbrachiale. ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν. permultis palma, pectus manus, pectē. חר
 masrech chaph haiad, alsclanuat. Δ^{1,2,3} Dignit. ὠλεῖν. bez baboth.
 Θ^{1,2,3} Ossa sacri ossis lateribus commissā, quorū utriusq; unū est, in tres ueluti sedes (etsi continuū sit)
 o. a dissectionis professoribus distinctū, ac prima quidē o insignitur, ilium os nūcupata. ὠλεῖν.
 ω. bezem hachefel. Albarta, anchæ, interdū lūbare. Secūda sedes mediāq; ac ω insi-
 gnita, coxendicis os nūcupatur. ὠλεῖν. bezem haiarech, coxæ os, quibus nominibus
 plerisq; totū os etiā uocatur. Albaurat, pixis os, femoris os, sed ualde perperam. Tertia se-
 p. des, anteriorq; ac p insignita, pubis os uocata est. ὠλεῖν, pectinis. גבי הערעה gabe haberua,
 ὠλεῖν. belhaua. Penis pudibundū, fenestratum os, quod etiā illi femoris os subinde appellatū.
 Verū uniuersum os Hebræis dicitur עמוד הגבהה bazamoth ghau haberna.
 s^{1,2,3} Coalitus pubis ossiū, uerū priuatim cartilago hic insignitur, corū ossiū unionē interueniens.
 Δ^{1,2,3} Femur, seu femoris os, femen. ὠλεῖν. פחד פחד pachad, haiarech. Os coxæ, coxæ, agis, anchæ os.
 τ^{1,2,3} Exterior femoris processus, qui rotator, natis ferē nūcupatur, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν. Malū
 v. granatū testiculorū, tharuca, trachametra maior. Minor uerō interiorq; processus, v insignitur.
 Ξ^{1,2,3} Patella. ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν. Mola, scutiforme os, genu rotula. חרוב
 hayn aut maghen habarcuba. Oculus genu, polus, adaicon, rasga, alrasase, are, fatu.
 Π, Σ^{1,2,3} Hæc pars uniuersa Celfo Crus nūcupatur, quanq; Galeno οἰκός dicitur, quicquid a coxendicis
 ossē, ipsius ue inguinibus, ad extremū usq; digitorū pedis pertinet: femur nimirū, tibia, et pes ipse.
 Nominatur i: aq; secus pars hæc Π et Σ intersepta, quibus nomib. hu-
 Φ^{1,2,3} ius quod; sedis grandius exteriorq; os obuiū est, quod tibiæ os ferē nūcupamus. ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν.
 interdum ὠλεῖν appellatū, קנה הררע chane hagadol. Focile maius, arundo, canna ma-
 י^{1,2,3} ior, seu domestica cruris. Ceterū exterior graciliusq; os insignitū, ac fibula nobis dictū, appel-
 latur ὠλεῖν, ὠλεῖν. Sura. קנה הררע chane bachatō. Focile minus, cāna, et arūdo minor cruris.
 φ, χ^{1,2,3} Malleoli, σφυγὰ, ὠλεῖν, latinorū autē nōnullis malle tali appellatū, שתי קצוות הברסטים מושני הקנים
 sete chezrauoth haboletim miscene bachanim. Clauicula, cauilla, cababin. Ac φ quidē interio-
 rem indicat malleolū, χ autē exteriorē. Ω^{1,2,3} Talus, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν. Latinis Interpre-
 tibis quibusdā parū rectē malleolus appellatur, fortassis huc quorundā nō Anatomicorū sen-
 tentia ductis, qui ὠλεῖν malleū, neutro autē genere ὠλεῖν talos potius significare cōtendūt.
 Balistæ os, cauilla, chabab, alschi. ὠλεῖν. bacharful. ὠλεῖν. haarchom.
 α^{2,3} Calc. ὠλεῖν, ὠλεῖν. Calcis os. עקב haacheu. Atrip, calcar pedis.
 β^{1,2} Os cymbæ scaphamie referēs, ὠλεῖν. Nauculare, nauiforme. עץ השוחא ספינת כסות bezē
 hascaue, aut sephinchotena. e, c^{1,2,3} Hæc pedis pars quatuor efformata ossibus, nobis tar-
 sus, ut Græcis, ferē nūcupatur. רכס rasegh. Raseta pedis, ofsa rasetae pedis. Tria autē
 d, e, f. interiora d, e, f insignita, priuatim ὠλεῖν quibusdā appellatū, extimū uerō e g notatū, uoca-
 g. mus os cubi tesseraniue referēs. ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν. Cubiforme, quadratū. חרדי char di,
 עץ נפיר bezem nipirat. Grandinosum, nerdi. b, h^{1,2,3} ὠλεῖν, planta, planum, uestigium et solum.
 ὠλεῖν, ὠλεῖν. Pectus, pecten. מוסק הרקל masrech hareghel. Afselameet.
 i, i^{1,2,3} Pedis digiti. k^{1,2,3} Characterē k ossicula notatū sesamina, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν, ὠλεῖν.
 thesaminiath. Afsesminia.

ANDREAE VESALII

BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPORIS

FABRICA LIBER SECVNDVS, LIGAMENTIS OMNIBVS,

& Musculis, voluntarij atque e nostro arbitratu pendens motus instrumentis dedicatus, ac propemodum figuras omnes ipsi proprias, ante Caputum contextum, uti nunc subijciuntur, spectandas offerens.



N P R A E S E N T I S Libri initio proponenda sedecim tabularum series, omnibus ferè Secundi libri Capitibus communis erit, neq; minus in Libri calce, quam hic modo in fronte collocari potest.

Primæ enim quatuordecim, integros exprimunt homines, ac harum ordine prima, anteriorem uiri faciem delineatam continet, secunda latus ostendit. tertia, quarta, quinta, sexta, septima, octaua, anteriorem faciem quoq; proponunt, in hoc illud ue latus, pro musculorum, qui indicantur, natura & situ magis repositam. Sex uerò octauam consequentes, posteriorem corporis faciem referunt, omnes propemodum ita effigiatæ,

ut quod in priori conspicuum est, in subsequenti resectum, ab insertione pendeat. Deinde omnes tabulae ita inuicem congruunt, ut uni quæ anteriorem faciem exprimit, alia succedere possit, posteriorem exhibens. Integrum namq; erat tertia subiungi nonam, mox quartam, dein decimam, insuper quintam, illi uerò undecimam, postmodum sextam, ab hac duodecimam, deinceps septimam, quæ sequeretur decimamtertiam, cui rursus succederet octaua, & huic decimaquarta. Vnde etiam non inopportune feceris, si utraq; serie has musculorum tabulas intuearis, atq; quid singulae potissimum exprimant, ex ipsarum earundemq; characterum indicibus illis, quam per typorum rationem licuit, proximè appositis requiras, quo à Caputum contextu non ad quatuordecim primas solum, uerum & ad decimaquintam & decima sextam, si quando uisum erit, recurras, musculorumq; quorum tum mentio incidit, delineationem ex sententia spectes. Per paucis enim Secundi libri Capitibus peculiare figuras sum præposui, ijs nimirum duntaxat, quorum musculi priuatis figuris cõgruè exprimi nequiverunt. Dein primi Capitis fronti tabella adhibetur, ligamenteriorum differentijs ostendendis præcipuè apta, & secundi Capitis initio ea præponuntur figuræ, quas musculorum cõpositioni intelligendæ idoneas duxi. Porro non suffecerit in una tabula musculi aliquem intueri, etiam si illum caractere insigniuerim, sed ut uideas, ubinam quisq; emineat, alteri ue succumbat, passim tibi is uenit inquirendus, & potissimum spectandus, ubi totum se uidendū offert, quod ferè fit, ubi peculiariter uni musculo plures characteres adhibentur, præcipuè quum extra aliorum ordinem maiusculo caractere, Græcis peculiari inscribitur. Quare etiã quum illi in ea tabula inspexeris, non prætereas, quin unã præcedentem tabulam et sequentem intuearis, ut discernas, cui is quæ spectas, musculus incumbat, cuiq; subternatur. At non est, quod prolixius in tabulis exercendi rationem præscribam, quum quicuius pro suo ingenio et Anatomies peritiã, scopos, utendiq; modum sibi præfigere queat. Quod uerò in integras tabulas musculorum effigies ita digesserim, neq; singulis Capitibus singuli articuli cū suis musculis appelli sunt, ea potissimum occasione factū puta, quod illi si priuati articuli pingerentur, à nemine nisi Anatomies peritissimo possent distingui. Nunc autem quum omnia cohererent, cuius obuiū est, quæ sede quisq; musculus reperiatur, adeo sanè, ut prorsus operæ precium fuisset integras ad hunc modum tabulas delineari, quantumuis etiam seorsim articuli fuissent expressi. Insuper si singulis Capitibus suos musculi adhibere, uel aliqua ratione utile fore sperassem, non hoc usu studiosi caruissent, quando præter sumptum nullus labor mihi impendendus erat. Ex his namq; integris tabulis necessario sculptis, particulas singulas articulos ue seorsim transcendendos dare, non maioris mihi esset operæ, quam ex iam proponendis tabulis, nunc caput, nunc brachium, nunc crus aut thoracē, ut ut uisum esset, abscindere, et sculptori offerre. Ad hæc, idem semper labor lectori in uertendis folijs impendisset, quum eadem pagina & musculorum effigiem, & characterum declarationem seu indicem, ac deinde musculorum descriptionem continere nequeat.

PRIMA
MUSCULO-
RUM TA-
BULA.



PRIMAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

PRÆSENS tabula anteriorem corporis faciem magna ex parte notans, corpus exprimit, à quo cutis cum adipe carneaq; membrana, & omnibus in superficie extantibus nervis, uenis & arterijs, si quæ sunt, refecui. Hanc tabulam una cum sequenti, characteribus liberam relinquere propositum erat, quo minus illis commaculata spectaretur. Quandoquidē ter-tia ferè prima est, quam ad disciplinam parauimus, præsens namq; (uti nec consequens) aliquid oculis subiicit, quod non in musculosis & quadratis, ut sic dicam, hominibus, eruditos pictores, sculptoresq; indies etiam præcipue exprimere obseruamus. Quæ enim membranea in tertiæ tabulæ facie & ceruice uisuntur, & fibræ etiam in musculis ductæ, potius pictorem, ac sculptorē & plastem (quorum studijs quoq; opitulari uisum est) perturbant. Quamquam his sanè non sat sit, musculos in superficie repositos ad amussim tenere, imò præter osium accuratissimam cognitiōnem, summa diligentia cuiusq; musculi munus perspectum ipsis esse debet, quo sciāt, quando musculi aliquē aut breuiorē, aut longiorem, aut protuberantē magis, aut cōpressum depingere debeāt, hoc axioma perpetuò ob oculos habentes, musculū, dum os mouet, idq; (ut sic dicā) ad suū uentrem retrahit, breuiorem, multoq; prominentiorem fieri, & ad ipsius uentris mediū colligi, quum uentri cōuerso musculus os dimittit, ipsumq; os aliò agitur, quā ab eo musculo ducere-tur, musculi uentrem (cui duntaxat illi artifices animum accommodant) produci ac subsidere, minimūq; protuberare. Cæterum quandoquidem hæc affatim in musculorum descriptionibus perstringam, characterum præsentis figuræ indicem aggrediar, in quo uix ullum musculum pri- uatim expressurus sum, sed unicum duntaxat characterē singulis in altero latere adhibens, quos hic obiter spectare licet, ascribam. In facie itaque nullus hic in conspectu est musculus, quod illi tenues exacte & membranei sunt, neque etiam obiter adempta cute secus, quā in præsentia modò occurrant.

A Glandulæ quā plurimæ notantur, quæ sub aurium radice, ad posteriorem inferioris maxillæ se-dem repositæ, cavitatem hic opplent, tutæq; uasorum distributioni præficiuntur. Sunt autem hæc quas in pueris humorū influxus crebrò molestant, ac quæ strumis (quas *χουές* Græci appellant) subinde infestantur. Hæc sede, quæ glandulæ reponuntur, etiam citra characteris adminiculum, præscissæ hic auris foramen obseruatu est facillimum.

B Sinistri lateris musculus, ab inferiori maxilla, in os *υ* imaginem referens insertus.

C Musculus à pectoris osse pronatus, ac in os *υ* literæ simile cum suo coniuge insertionem tentans.

D Musculus gracillimus, à superiori scapulæ costa, in os *υ* referens insertus, ac in quarta musculo-rum figura, *V* & *V*, in quinta autem, *R* & *S* notatus. Sedes quæ utrinq; ad literæ *D* late-ra uisitur, cauæq; est, neruus continet sexti paris neruorum cerebri, interioribus uenis iugulari-bus, & arterijs soporalibus concomitatos.

F Musculus à pectoris osse & clauicula, in mamillarem occipitij ossis processum, carnea inser-tione implantatus. *masloidiens*.

G Portio est musculi, scapulam mouentium secundi, cuius effigiem monachi in suis cucullis imi-tati sunt. Præsentis musculi aliud nihil hic est conspicuum, quā quod clauiculam, & summi hu-meri sedem clauiculæ connexam inseritur, uerum in nona figura totus apparet musculus, *Γ* & *Δ* insignitus.

H Sedes hæc iugulares uenas exteriores transmittit, quare etiam citra omnem musculi distinctio-nem, in uiuis duntaxat caua apparet. *V* ena autem resecta, & mucosis quibusdam membranulis ademptis, ille occurrit musculus, quem *D* insigniui, & etiam unus qui à prima thoracis costa, in anteriorem transuersorum processum ceruicis uertebra-rum sedem insertus, *C* in octaua mu-sculorum tabula notatur.

I Clauiculæ anterior sedes, quæ excarnis occurrit.

K Musculus brachium attollens, cuius principium à clauicula, summo humero, et scapulæ spina e-na-scitur, atq; hic ip-sus pars spectatur, à clauicula & summo humero pronata.

L Musculus brachium pectori adducens.

M Pectoris os excarne apparens, nam musculus pectori brachium adducens ad ossis latus, primum

P 1 carneus

carneus esse incipit, & quamvis dexter sinistrum nervoso, & membranæ modo tenui exortu contingat, ob hoc tamen in uiuis adhuc hominibus pectoris os non prorsus occultatur.

N **N** sub axilla latitat, partem notans musculi brachium deorsum uersus dorsum detrahentis, ac sequenti tabula **Γ** indicandi.

O, **O** Hæc digitorum imago, musculi aliquot insertiones indicat, qui in octo superiores thoracis costas insertus inspirationi famulatur, atq; in octaua musculorum tabula **F** & **F** insignitur.

P, **P** Præfens uero digitorum effigies, exortus est musculi abdominis oblique descendens, quem pluribus characteribus hic notare non libuit: quemadmodum neq; recto etiam abdominis musculo notam adhibui, quod prorsus adhuc sub obliquorum nervosis tenuitatibus, & musculo brachium pectori adducente reconditus sit, utcunq; etiam tubera quæ secundum abdominis longitudinem porrecta conspiciuntur, recti abdominis musculi sint: quæ quo minus extuberent, obliquorum tendinum tenuitatibus non inhihentur: quemadmodum neq; cutis crassities in non admodum obesis obstat, quo minus eadem spectentur.

Q Anterior cubiti flexentium musculus.

R **R** sub axilla reconditur, notans dicti iam musculi, interioris capitis carnosam partem, peculiaris musculi ritu extuberantem.

S, **S** Musculus posterior cubiti flexentium, quem duobus insigniui characteribus, ne sedes illis characteribus notatas, diuersos esse musculos quis arbitraretur.

T Musculus ab inferiori scapulæ costa enatus, cubitiq; extensioni subseruiens.

V Superior musculus eorum qui radium in prouum agunt. Ceterum quum præfentis figuræ cubitorum & manuum extremarum non eadem sit facies, haud inopportune dextro et sinistro lateri **V** ac subsequentes aliquot characteres pariter adhibui.

X Musculus ante indicem postbrachiali insertus, idq; flexens.

Y Musculus latum tendinem in summam manum producens. Sedes autem quæ utrinq; ad huius tendinis latus in cubiti longitudine protenditur, nulloq; characterè insignitur, flexionis secundi quatuor digitorum articuli autor est, quem quintæ figuræ **Θ** indicat.

Z In dextro cubito indicatur musculus ab interno humeri tuberculo principium ducens, qui recto brachialis ossi insertus, brachiale flectit.

a In utroq; cubito musculus notatur, radium in supinum ducens: qui ab humeri ossis natus, inferiori radij appendici implantatur.

b In utroq; cubito musculus insinuat, bicorni tendine brachiale extendens.

c In utroq; cubito indicantur duo musculi, ex ulna originem ducentes, quorum unus tendinem brachialis ossi offert pollicem sustinenti: alter in binos dissectus tendines, unum primo pollicis ossi, alterum secundo & tertio inserit.

d In sinistra manu hic occurrit tendo musculi, pollicem uersus indicem euerterentis.

e In sinistra manu spectantur tendines, in exteriorem indicis sedem exporrecti.

3, 4, 5, 6 In sinistra manu notatur transuersum ligamentum, in cubiti externa sede conspicuum, uerum numeri characteres seorsum indicant, quot in hac manus superficie sinus anuliq; dissecantibus apparere possunt. Sunt autem omnes quatuor radio proprii, illisq; tendinibus adaptati, in quorum regione numerum conspicias. In dextro cubito etiam **6** spectatur, idem quod in sinistro indicans.

h In sinistra manu, sedes musculi indicatur pollicem indici proximè adducentis. Modò post sculpturam **f** & **g** incuria elapsa, nihilq; illis insignitum obseruo, quod & in alijs tabulis interdum (citra incommodum tamen) usuuenit.

i In dextera manu musculus pollicem ab indice plurimum abducens: atq; ad huius latus portio eius musculi uisitur, qui primum pollicis os flexentium est prior.

g Musculus paruum digitum à cæteris abducens, ad cuius dextrum latus is se offert, qui sub illo magna ex parte occultatus primū parui digiti flectit internodium, id in externum latus ducens.

k Tunica testem ac ipsius uasa seminaria inuoluens, quæ hæc in uiris prorepunt. Mulieribus enim hæc uasa cum reliquis generationi famulantibus organis in corporis alto reconduntur.

l Ad sinistri testis latus **l** occultatur, notans glandulas cavitatem hic in inguinibus replentes, quæ insignis uena cum arteria crus adit. Glandulis enim repletis hic magnus exurgeret sinus, cuiusmodi in inguinum abscessibus fieri cernimus.

- m* Musculus à pubis osse in femur procedens, in octaua figura Σ notatus.
- n* Hæc prorepunt duo musculi, quorum alter femoris motorum sextus habebitur, atq; in octaua tabula Θ notabitur: alter uero septimus, in eadem tabula Δ indicandus.
- o* Ab ilium osse pronatus musculus, qui tibiæ insertus, illius motorum primus est.
- p* A pubis ossium commissura enatus musculus, ac tibiæ mouentium secundus.
- q* Sextus inter tibiæ mouentes musculus, cuius carnosus substantia hic conspicitur: tendo autem ipsius adeo tenuis est, ut subiectorum illi musculorum circumscriptionem non obliteret. Quapropter etiam priuatim hic se non ostendit, quemadmodum neq; in secunda musculorum figura. in tertia tamen Θ quarta, quadatenus oculis subijcitur, in hac quidē caractere 3, in illa uero Φ notatus.
- r* Præsens musculus etsi cum alijs inibi ad superficiem repositis nuper dicto membraneo tendine sexti tibiæ mouentium musculi obducatur, attamen se ostendit, quemadmodum neq; in musculo sis integra adhuc cute conspectum fugit. Notat autem *r* priuatim septimum tibiæ mouentium musculum.
- s* Musculus supra coxendicis ossis articulum principii ducens, Θ inter tibiæ motores nonus. Verum Θ hic membraneo obtegatur tendine musculi tibiæ mouentium sexti.
- t* Musculus, femoris os uniuersum quodammodo amplectens, tibiæq; ducum octauus.
- u* Sedes hæc *u* notata, ad sinistram spectatur genu, estq; quarti tibiæ mouentis musculi pars.
- x, y* Tota hæc tibiæ ossis regio excarnis est, nulloq; obtegatur musculo.
- z* Musculus pedis motorum ordine sextus, ac per transuersum ligamentum in anteriori tibiæ sede positum, Θ Δ indicandum, descendens, pedisq; ossi pollicem sustinenti insertus.
- a* Musculus quatuor pedis digitos extendens, qui sub musculo *z* insignito, maxima sui portione occultatur.
- b* Quatuor digitos extendentis musculi portio, quæ pedi in anteriora attollendo suppetias ferens, pedem mouentium nonus censetur.
- y* Pollicem extendens tendo. Carnosa enim musculi pars in alto alijs subijcitur musculis.
- d* Transuersum ligamen in anteriori tibiæ sede locatum, Θ quatuor ultimò notatis musculis uiam porrigens.
- e* Exterior malleolus, seu fibulæ excarnis pars.
- f* Musculus fibulæ exporrectus, qui sub pedis inferiora reflexus in pedis os pollicem sustinens insertionem molitur, ac pedem mouentium septimus numerabitur.
- u* Musculus, ab externo femoris capite pronatus, Θ pedem mouentium secundus.
- h* Hunc characterem Θ aliquot subsequentes in dextro crure repositi, quod illis indicandi musculi in eo sint conspectiores. Verum Θ notatur musculus ab interno femoris capite pronatus, pedemq; mouentium primus.
- i* Tendo totius corporis gracillimus, ab illo enatus musculo, qui ab externo femoris capite principium ducens, pedem mouentium tertius habetur.
- n* Maximus suræ musculus, à commissura fibulæ ad tibiæ enatus, pedisq; motorum facile robustissimus, Θ quartus.
- n* Musculus quatuor pedis digitorum tertium os flectens.
- u* Portiuncula quoq; hic uisitur, pedem mouentium quinti. uerum hæc, ut Θ musculi paulò antea in dextro potissimum crure commemorati, dilucidius multo in dextra sequentis tabulæ tibiæ conspiciuntur.
- v* Transuersum ligamentum à tibiæ in calcem pertinens.
- f* Musculus pollicem in internum latus agens.
- w* In dextro pede musculus notatur, pollicem alijs digitis adducens, seu illum in latus externum mouens. Apparent ad hæc, sub tendinibus musculi quatuor digitos extendentis, ac *a* notati, tendines indicem, medium Θ anularem in externum latus abducentes.

SECUNDA
MUSCULO.RVMTA
BYLA.

SECUNDAE MUSCULORVM TABVLAE CHARACTERVM INDEX.

SECUNDA tabula primæ, quod ad sectionem spectat, omnino correspondet, et in latus uersa eisdem cum illa commonstrat musculos, unâ cum ossium sedibus in superficie prominentibus, ac ut sic dicam, ex carnibus. Quum itaq; hæc spectatu sit dignissima, pari cum præcedente modo singulos musculos uno caractere annotabo. Facies itaq; propemodum uniuersa, et caput quoq; quum paulo minus toto osseum sit, literis nisi paucissimis in hunc modum insignientur.

A Temporalis musculus. Quicquid supra semicirculum hunc quo temporalis muscoli primus exortus circumscribitur, consistit, prorsus ex carne est: nisi hic fortassis accuratè nimium singula animaduertens, frontis os secundum naturam non ex carne esse, uerum tenui musculo sa compage obduci, additum uelis, quam simul cum frontis cute totaq; adeo carnosâ membrinâ rescuimus.

B Os iugale. Foramen illud ad ossis huius terminum sese offerens, auditorius est meatus.

C Musculus à mandendo præsertim, et manforius nuncupatus.

D Musculus buccarum motibus subseruiens, ac ex una maxilla in alteram pronatus.

E Musculus sinister ab inferiori maxilla in os u imaginem referens productus.

F Musculus à pectoris osse in os u referens insertus.

G Musculus sinister, à superiori pectoris ossis sede principium ducens, et in humiliorem cartilagini scuti imaginem representantis regionem insertus. Is enim quum sub musculo *F* insignito latet, non prorsus in latere conspectum fugit.

H, H Musculus à superiori scapulae costa ad os u imagini simile properans, qui ablato adipe et iugulari externa hinc diligenter execta, iuxta humilius *H* est conspicuus. Deinde superius *H* indicat etiam glandulas ad auris radicem repositas.

I A pectoris osse et clauicula principium sumens musculus, et in mamillarem temporis ossis processum insertus.

K, L Musculus scapulam mouentium secundus. ac *K* quidem notat superiorem ipsius partem, quæ scapulam sursum trahit. *L* uero inferiorem, cuius beneficio scapula deorsum agitur. Ad dextrum latus *L* hic quoq; dextri muscoli portio sese offert, uerum in nona musculorum tabula utriusq; lateris musculus literis Γ et Δ est spectatissimus.

M Musculus brachium attollens. præsens musculus læge accuratius in quarta figura Ξ , et in decima Δ indicabitur. quod ideo additum uolui, ne quis hunc musculum multis donatum impressionibus, plures esse ex uera hac integraq; delineatione sibi persuaheat. Quamuis interim hæc impressiones (si quis alius modo musculus) peritos sculptores pictoresq; ludant, quos nō hic solum, sed et in toto externo brachij latere uelim esse attentissimos, quod male musculum quem iam notamus, ueluti in cubiti exteriora protrahant.

N Quanquam ex subsequentiis characteribus nonnullos in utroq; brachio repositos cernis, tantisper tamen sinistro duntaxat animum adhibebis, donec et dextri meminero. *N* itaq; notatur posterior cubitum flectentium, qui in uiuis altius supra brachium attollentis muscoli insertionem enasci uisitur, quam reuera principium ducit. licet hic non nimis inferius incipiat, sed quod pictoribus animaduertendum est, fortassis etiam elatius quam deceat.

O Musculus cubitum extendens, qui ab humeri capitis ceruice principium adipiscitur.

P Musculus cubitum quoq; extendens, cuius origo ab inferiori scapulae costa pendet.

Q Hac sede duo dicti nuper musculi cubitum extendentes in unum coeunt, non amplius duplicis musculi imaginem repræsentantes. Quod autem hic insignius quam reliquo progressu extuberant, præter ipsorum partem summè carnosam tertius cubitum extendentium in causa est, qui hic sub illis occultatus ab humero seu brachij osse pronascitur, atq; in duodecima figura X , in decima tertia autem d indicabitur.

R Hac parte cubiti extensionis autores in posteriorem ulnæ processum, et articuli ligamenta implantantur, nerueam suâ insertionis partem in triangularem hanc sedem porrigentes, quæ ex carnis ulnæ est portio.

S Musculus ab humero enatus, qui in inferiorem radij appendicem insertus, radium in supinum ducit.

T Musculus bicorni tendinè brachiale extendens.

V Musculus indicem medium, & anularem præcipue extendens.

X Musculus parui digiti extensionis primarius auctor.

Y Musculus postbrachiale extendentiū inferior. a Musculus flectentiū brachiale inferior.

b, c Duo hic indicantur muscoli, quorum superior b insignitus brachiali inseritur: inferior autē cut c inscriptum est, in duos diducitur tendines, unum primo pollicis internodio inserēs, alterū duobus superioribus eiusdem internodijs implantans.

1, 2, 3, 4, 5 & 6. His numeris notatur transversum ligamentum in exteriori sede cubiti repositum, quod in tot rursus anulos diuiditur, quot numeros scripsimus. 1 enim indicat ligamentū radio ulnæq; commune. 2 ligamentum ulnæ propriū. 3, 4, 5 & 6 uerò insinuant quatuor ligamēta radio peculiaria.

d Sedes musculi, aut ipse etiam musculus indici pollicem proxime adducens.

e Tendo musculi pollicem ad indicem euertentis. Verū modo tempore iū est & dextro brachio animum accommodare, ac partim easdem notas quas in sinistro spectasti, partim uerò nouas intueri. Idem igitur significant N ac N, P, S, T, a. sed uix hic musculi a insigniti linea conspiciuntur. dein b, c & 4, 5, 6, & d ac e idem in dextra, quod in sinistra manu referunt. At priuata dextræ manus notæ sunt huiusmodi.

Z Anterior cubitū flectentiū musculus. f Musculus superior radium in prouum mouentiū.

g Musculus superior brachiale flectentium.

b Latum producens tendinem musculus.

i Musculus gibbam scapulæ sedem occupans, qui extorsum brachium circumuertit.

k Musculus quo brachium retrorsum ad dorsum elatius quā iam signando musculo ducitur.

l Præsentem musculum nona tabula O, & detectum adhuc magis decima O ostendunt. At quā externum secundum uē ipsius latus nullibi atq; in hac tabula opportuniū ostenditur, hic aliquot characteres adijcere erit operæ precium. Est itaq; musculus hic cuius beneficio brachium agitur deorsum, triangularis quodammodo figuræ, cuius internum latus spinarum apicibus exporrigitur (qui præsentī musculo principium offerunt) ab l ad m pertinens. Exterius uerò latus, quod a sacro osse sursum oblique in priora ad insertionem prope rat ab m ad n usq; pertinet. n enim insinuat huius musculi partem suæ insertioni proximā, quæ citra alterius musculi dissectionem conspici nequit. Atq; hoc latus est, quod in prima tabula N notat, in sequenti uerò V, & rursus longè accuratiū dextrum septimæ tabulæ brachium O litera hanc insertionem commonstrat. Tertium latus ab l ad n porrigitur, quod transversim ductum humiliori basi scapulæ angulo insertitur. Atq; l etiā indicat huius musculi partē musculo cui L inscripsimus subiectā.

Δ Ne paruum o in umbra ad pectoris sedes plus satis lateret, Δ inibi posuim habes, musculum indicans, quo brachium pectori adducitur.

o, o, o Huiusmodi triangulorum quasritu procedentes formæ, insertiones musculi sunt eius qui in o, o, o superiores thoracis costas manus modo insertatur.

p, p, p Exortus abdominis musculi oblique descendenti, qui mutuò cum dicti iam musculi & aliquot o insigniti insertionibus ingrediuntur. Quod autem in uniuersa abdominis sede conspicitur, obliquus ille est musculus: quanquam rectus abdominis musculus nonnihil propter obliquorum tendinum temitatem (quemadmodum & ante sectionem) extuberet.

q Principium notatur primi tibiæ mouentium musculi, quem sequenti figura Σ notatum cernes. Hic autem in dextro femore q etiam indicatur.

r Musculus latum producēs tendinem, quo omnes femur amplexantes musculi circundantur, quiq; tibiæ mouentium sextus habetur. Huius tendo quum non insignem exigat spissitudinem, aliorū musculorum in spectionem minus adhuc ipsa cute occupat: unde etiam hic occurrit musculus, mox t notandus.

s Portio musculi tibiæ mouentium noni, quem in quarta tabula Φ exprimam.

t Musculus tibiæ mouentiū septimus, membranco tendine sexti tibiæ mouētis musculi obiectus.

u Musculus sinistrum femur mouentium primus. Qui uerò dextrum femur agit, etiam magna ex parte hic se offert.

x Regio maioris exteriori, uē processus femoris.

y Conspicua secundi femur mouentis musculi pars. Reliqua autem primo femur mouenti musculo u superius indicato, & illo quē latū producere diximus tendinē, quemq; hic r notauī occultatur.

æ Quartus

- α Quartus tibiā mouentium musculus, qui hic externo ipsius latere est spectatissimus, ac nullibi in dextro crure apparet.
- β In utroq; femore tertius notatur tibiā mouens musculus.
- γ In dextro tantum femore indicatur secundus tibiā mouentium musculus.
- δ In dextro crure bis δ posui, musculum indicaturus, quem ego quintum femoris motorem enumeraturus sum. In sinistro autem crure δ iuxta poplitem ponitur, quintum quoq; notans musculum.
- ε ζ In dextro femore indicatur quintus tibiā mouentium Galeni musculus, noster autem femur mouentium quintus. ac ε quidem huius musculi posteriorem partem indicat, ζ uero posteriorem anterioris partis portionem. Hæc non ambigo abstrusa obscuraq; uideri, attamen si Caput tibiā mouentibus musculus, & Caput femur agentibus dedicanda perlegeris, erunt longe facillima: præcipue quum hos musculos in alijs musculorum tabulis propemodum denudatos uisurus es, uidelicet in septima ad characterem β, in octaua ad Φ & c, in duodecima ad Ξ & Σ. Omnia enim singulis locis haud ueniunt repetenda: imò uereor morosiorē quēpiam & rōdendi studio natum, mihi detracturū, quòd ea in harum tabularum indicibus præmoneam, quæ in sermonis seu Capitiū contextu diffusi ac explicatē persequar. Quanquam etiam hæc & cōtextus ipse studio homini uix sufficiant: ut eos modò mittam, qui omnia oscitanter aggredientes, cōpendia summo ipsorum dispendio quærunt, et Galeni anatomicos libros tanquam ad ipsos non pertinentes relinquunt.
- η Musculus hic extuberans, tibiā mouentium octauus censebitur.
- κ θ Excarnis tibiæ pars, uerū interior malleolus priuatim κ notatur.
- λ In utroq; crure suram constituens musculus, qui mouentium primus numerabitur.
- μ Musculus in utroq; notatur crure, pedem mouentium secundus.
- ν Gracillimus totius corporis tendo, à musculo enatus qui pedem mouentium tertius habetur.
- ξ Maximus suram constituentium musculus, ac pedem mouentium quartus. Quamuis ο & ι, & eiusmodi aliquando characteres nō inuenis, ob hoc quicquam nō notatum fuisse minime arbitrandum est, quum illi characteres (quantum ad sculpturam spectat) nostro ο & ι non absimilia sint.
- ω Musculus tertius quatuor digitorum flectens articulos.
- ς Portiuncula eius musculi, qui pedem mouentium quintus erit.
- ς Transuersum ligamen ab interno malleolo in calcem pronatum.
- τ Musculus pollicem in internum latus ab alijs abducens digitis, qui sanè hic est manifestissimus.
- υ Ligamentum musculo secunda quatuor digitorum internodia flectenti obnatum, & lati tendinis uicem in planta gerens.
- φ In utroq; crure musculus notatur in anteriori tibiæ sede locatus ac pedem mouentium sextus.
- χ Musculus fibulæ exporrectus, qui pedis motorum septimus numeratur.
- ψ Musculus nuper dicto substratus, pedemq; mouentium octauus. huius tendo, ut & septimi, sub Σ est conspicuus.
- ω Musculus quatuor digitos extendēs, ad latus autem sinistrum Ω occurrit huius musculi portio, bicorni tendine in pedis os ante paruum digitum inserta, quam pedem mouentium musculorum nō num appellabimus, quiq; aptius in quarta musculorum tabula Ω indicabitur.
- Θ Tendo musculi pedis pollicem extendentis.
- Λ, Δ Transuersum ligamentum tibiæ ossi & fibulæ commune, in sinistro crure Λ indicatur, in dextro autem Δ.
- Ξ Exterior malleolus, seu fibulæ ossis excarnis sedes.
- Σ Transuersum ligamentum à fibula in calcem pertinens.
- Π Musculus abductionis parui digiti à reliquis autor.

TERTIA
MUSCULO.
RUM TA-
BVLA.



P R A E S E N S tabula anteriorem corporis faciem exprimens, in hoc à prima mus-
sculorum tabula differt, quòd musculos ex carnosâ membrana constitutos, & aliquot etiam fa-
ciei musculos ab adipe liberatos, commonstret, quodq; magis ad musculorum disciplinam, quàm
priores duæ, sit comparata.

A Rectæ secundum frontem ductæ lineæ, frontis & narium cutis musculum notant.

B Temporalis musculus, ubi interdum, sed perquam raro, carnea membrana fibræ etiam car-
neis enutritur.

C Musculus palpebram attollens.

D Musculus palpebram deorsum trahens.

E Mutuus palpebræ musculorum secundum palpebræ longitudinem connexus.

F Musculus media sui parte nasi aliam, altero uerò superius labrum petens. Quemadmodum sanè
uarum musculorum fibrarum in labijs implexum indicare non licuit, ita quodq; characterũ copia
faciem alioquin satis obscuram non sum occupaturus.

G Malum, ac iugalis ossis anterior sedes, quæ prorsus excarnia sunt.

H Musculus à malis pronatus, & superiori labro proprius.

I Masseteris musculi principium, lato quem iam describam, musculo non obiectum.

I Musculus carnosâ constans membrana, & præcipuus buccarum labiorumq; & anterioris colli
cutis motuum dux, qui hic corpori in utroq; latere hæret, reliqua carnosæ membranae parte, quæ
carnea non efficitur, à corpore resecta. Quod autem ad præsentis musculi fibrarum progressum

K, L. attinet, **K** ad **L** usq; musculi principium notat, è regione ossis pectoris, ac mediæ clauiculæ se-

M. dis ossis pectoris proximè incipiens, cuius fibræ recto tramite sursum ad **M** exporriguntur. Ab

N. L. uerò ad **N**, principij pars notatur, è regione reliquæ sedis, clauiculæ & summi humeri sedè
incipiens, cuius fibræ obliquè sursum in anteriora porriguntur. Deinde et si ea musculi pars non

O. sese spectandum offerat, quæ in posteriori ceruicis sedè consistit, nihilominus **O** ad auris radi-
cem positum, transuersas fibras illinc prorepentes utcunq; ostendit. Quare etiam in musculi latè-
ribus describendis, primũ latus tibi fingendum est ab **N** ad **O**, secundum ab **O** ad **H, K** uerò
per **L** ad **N**, tertium indicabit latus. **A** **K** autem ad **M** quartum habes latus. Intensus e-
nim nigricans linea, à **K** ad **M** ducta, dextri musculi cum sinistro interstitij loco habenda est.

P Brachium attollens musculus, quem hic in anteriore corporis facie **L, N** et **Q** propemodum

Q. circumscribunt, is enim inferius, quàm **Q** consistat, sua insertione prorepat.

Δ Musculus brachium pectori adducens, qui in sequenti tabula simul hic uenit inspicendus, ibidem
namq; ab initij liberatus, **Δ** perinde notatur, iisdemq; fere characteribus inibi atq; hic ita cir-
cumscribitur. **K** ad **L** usq; principij ipsius pars, à clauicula principium ducens. **K** uerò ad **R**

R. principij pars est, ex media latitudine ossis pectoris pronata. Quinetiam **R** notat musculi mem-
brancam partem, quæ ad mucronatæ cartilaginis latus, obliquè descendens musculi abdominis

S. neruosa tenuitati exporrigitur. **S** autem significat carneam musculi partem, à sextæ & septi-
mæ costarum cartilaginibus, propter obliquè descendentem abdominis musculum peculiariter
pronatam. **Q** præsentis musculi insertionis index est, qua inter brachium attollentem (qui **P** no-
tatur) & priorem cubitum steculentium **Z** indicandum, in humerum inseritur. Porro si latera
ipsius, & fibrarum insertionem intueri animus sit, sequentem etiam inspicito tabulam, quæ præ-

T. sentis musculi insertionem, **Q** & **T** notatam exhibet, quo ad hunc modum huius illiusq; tabula-
rum characteribus simul iunctis, quinque musculi latera metiaris. Primum à **K** ad **L**. Secun-
dum à **K** ad **R**. Tertium ab **L** ad **Q**. Quartum ab **R** ad **T**, quod subsequens ostendit ta-
bula, in præsentem interim lata musculi insertionem occultata. Atq; hinc etiam quintũ quoq; latus,
à **Q** ad **T** pertinens, in quarta tabula duntaxat est conspicuum.

V Musculus brachium deorsum trahens.

5, 6, 7, 8 His numeris, insertiones musculi thoracem mouentium secundi notantur, quæ costis inferuntur,
quarum regio quum his numeris exprimitur, elatissimam insertionem in quintam fieri costam
promptè colligitis.

⊙ Abdominis musculus obliquè descendens, qui cum suo coniunge uniuersam abdominis sedem co-
operit

- aperit, magnam quoque thoracis sedem integens. Exortus praesentis musculi numeris indicatur, quibus secundi thoracem mouentis musculi insertiones significantur. Ceterum R ad X albam ostendit lineam, quam aliter simplici colore exprimere non datur, & omnium exemplarium tabulas suis coloribus distinguere esset quidem operae precium, ut membranae pars à carnea promptissime distingueretur, uerum sumptus quibusdam esset non admodum mediocris.
- X Penis sua cute, quae praeputium uulgo uocant, liberatus, in quo ducitur recta linea, duorum ipsum constituentium corporum coitum indicans, quae subsequens tabula sub q ostendit dissecta, uerum horum natura omnium lucidissime tabula docet quadragesimo nono Capiti praesentis Libri praelocanda.
- Y Vasa seminaria sua adhuc tunica, quam peritonaeum educit, intacta.
- Z Musculus anterior cubitum flectentium. a & Posterior cubitum flectentium.
- b In interno brachij latere b occultatur, notans musculum cubitum extendentem, qui ab humiliori scapulae costa principium sumit. c Musculus bicorni tendine brachiale extendens.
- d Musculus radium in supinum ducens, ac inferiori radij appendici implantatus.
- e Superior radium in prouum mouentium musculus.
- Δ Musculus brachiale flectentium alter, postbrachiali ante indicem insertus. Ac si ipse notat principium, g tendinis ex musculi uentre exortum, h sedem, qua tendis negligenter secuti desinere putaretur.
- f, g, h. Musculus latum summæ manus producens tendinem, cuius caput i indicatur, tendinis autem i, k, l. ipse principium k. At l. locum insinuat, ubi tendo primum dilatescere incipit.
- m Musculus alter inferiorque brachiale flectentium.
- n Hic obscure uidetur portio musculorum, quorum alterum brachiali, alterum uero pollicis tendines offerre dicam, ac inter digitos mouentes, uigessimis secundi et uigesimali tertij loco habiturus sum.
- o Excarnis primi pollicis internodij sedes. p Musculus ab indice pollicis remotissime abducens.
- q Insignior duorum primum pollicis os flectentium.
- r Musculus minimum digiti maxime à reliquis amouens, ac in sequenti tabula n insignitur.
- s. In dextro crure primus notatur tibiae motus opifex, cuius initium s insignitur, t tendinis illius principium, u eiusdem insertio. Ceterum character 2, insertionem secundi notat tibiam mouentis musculi, 3 uero, insertionem tertij.
- Φ Sextus tibiam mouentium musculus, cuius principium notat, x, y uero sedem, ubi carnosus esse desinit, membranaeque modo toti femoris amplitudine obducitur. Haec licuit aliter ipsius tendinem membranam uel exprimere, quam hic modo in utroque femore obseruatur, in quo tenuissimam ipsius partem, interiori femoris sedi obductam, ueluti laceram membranam dissecuimus, ut sectio aliquantisper membranae naturam commonstraret. Quicquid enim ad externum inaequalis illius lineae sectionis uelatus habetur, ipsa adhuc est sexti musculi membrana seu tendo.
- α Musculus tibiam mouentium nonus.
- β Octauus tibiam mouentium, magis in sinistro crure, quam in dextro, à sexto tibiae motuum autore detectus musculo. Septimo uero tibiam mouenti, characterem non adhibui, quod uniuersus sex to adhuc obtegatur. Quamquam Φ illum quoque insinuare possit, quum sexti musculi membrana non eam attingat crassitiem, qua subditorum musculorum effigiem obliterare queat.
- γ In inguinum regione indicantur muscoli, quos femur mouentium sextum & septimum recensibimus. Ceterum γ glandulas quoque insinuat inguinum unam cum sinu, ex quo uasa cruris potentia rescuit.
- Δ Musculus femoris motorum octauus.
- ε Musculus tibiae motus opificum secundus, cuius tendinem character 2 commonstrat.
- ζ Excarnis tibiae ossis pars, uerum n priuatim internum notat malleolum.
- Υ Sextus pedem mouentium musculus, cuius exortum θ indicat, κ autem principium sui tendinis, cuius ductus citra characterum appositionem manifestus est, quamque ζ insertionis quasi ipsius sedem ostendat.
- λ Musculus septimus pedem mouentium.
- μ Musculi pollicem extendentis tendo. ν Musculus quatuor digitos extendens.
- ξ Musculus pollicem à ceteris digitis in internum latus abducens.
- ο Transuersum ligamen in anteriori tibiae sede positum, ac facta sectione in latera reflexum.
- ω Tendo bicornis musculi pedem mouentium noni.
- ρ Primus pedem mouentium. s Pedis motorum quartus.
- τ Longissimus gracillimusque tendo, à tertio pedis motus autore productus musculo.
- υ Musculus tertium quatuor digitorum os flectens. φ Pedem mouentium quintus.

PRIMA MVSCV-
LORVM TABVLA.



CHARACTERVM QVARTAE MVSCV-
LORVM TABVLAE INDEX.

PRÆSENS tabula quamplurimos præcedentis tabulæ musculos sectionis serie ademptos commonstrat, & deinde plerosq; qui prioribus figuris nondum in conspectum uenire, uidendos offert. quod omnes ad octauam usq; musculorum tabulam subsequentes tantisper præstabit, dum ossa anteriori facie nuda conspiciantur.

- r* Musculus temporalis, cuius principium semicirculo non absimile *A, B* & *C* circumscribitur.
- D* Ossis iugalis externa sedes, quæ excarnis est.
- E* *Maseter*, *E* huius musculi principium a malo exortum. *F* principij ipsius portio auri proxima.
- E, F* *ma*. Cæterum ab *E* ad *F* totus ipsius principij ductus secundum iugalis ossis longitudinem metitur.
- G* *G* infima musculi insertionis sedes notatur. Porro si triangulo hunc assimilare libet, *E, F* & *G* tres angulos tibi proponere finges.
- H* Nerviulus minoris radices tertij paris nervorum cerebri, hæc frontis musculosam compagē petēs.
- I* Nerviulus dictæ modò radices ad superius labrum, & externam alæ nasi sedem propagatus.
- K* Cartilago in quam sinistrum nasus de sinist.
- L* Alæ nasi sinistra dictæ modò cartilaginis extremo alligata incumbensq;. Inter *K* & *L* narium cute iam ablata cum quibusdam membranis ligamentis, in conspectum uenit interior alæ nasi musculus nimisquam tenuis.
- M* Musculus a superiori maxilla in inferiorem insertus, ac buccas mouentium unus.
- N* Musculus sinister inferiori labro peculiaris, cuius sanè corpus minori negotio, quam multiplex ipsius fibrarum intersectio delineari potest, quod etiā in musculo *M* notato uisum uenit. Auris autem foramen citra *O* appositionem sese ostendit, uti etiam auris radici subditæ glandulæ hunc characterem quodammodo exprimentes.
- O* Vix conspicua est eius musculi portio, qui inferiorem maxillam deorsum uellit.
- P* Hac sede os reponitur u imaginem referens.
- Q* Musculus a temporum ossis processu styli formam imitante enatus, ac ossi, simili insertus.
- R* Musculus sinister ab inferiori maxilla in os u referens, insertionem tentans, cuius contunx nonnihil quoq; hic se spectandum præbet.
- S, T* Dexter & sinister ossis u imaginem exprimentis musculi, a pectoris ossis summo pronati.
- V, V* Musculus gracilis & longus, qui a superiori scapulæ costæ ossi u referenti implantatur.
- Θ* Musculus capitis motibus subseruiens, qui ab osse pectoris principium *X* notatum sumit, deinde aliam partem *Y* indicatā, a clauiculæ sede pectoris ossi proxima. Cæterum *Z* insertionem *Z* ipsius insinuat, qua uniuersum mamillarem capitis processum amplexatur.
- a* Clauicula magna ex parte anteriori ipsius sede excarnis.
- b* Musculi scapulæ mouentium secundi insertio.
- c* Musculorum hic magnā obscuritate pariūt uasa caput adeūtia, & nervi in brachii excurrētes.
- d* Musculus a clauicula in primam thoracis costam insertus, ac thoracem mouentium primus.
- Ξ* Musculi brachium attollentis anterior pars, posteriorem decima ostendit tabula adhuc in sua sede repositam, ac *Δ* præcipue insignitam. Proximè autem sequens tabula anteriorem hanc partem ab exortu liberam reflexamq;, ac *γ* notatam commonstrat. Porro in præsentī figura *e, f*, et *g*. *g* conspicuam hic musculi brachium attollentis partem, trianguli ritu describunt.
- b* Musculi brachium pectori adducentis insertio, quam in dextro brachio *Q* & *T* notauit, & *Q, T, Δ*. ipsi musculo *Δ* quoque imposuit, quo hi characteres ad præcedentis tabulæ notas referantur, ad *K, L, R*. quam quoq; *K, L* & *R* spectant.
- i* Pectoris os liberum ab initijs musculorum brachia pectori adducentium.
- 2, 3, 4* Secunda, tertia & quarta thoracis costæ, ad quas reliquæ seriatim subsequuntur, atq; in harum interuallis exteriores musculi intercostales sunt obuij. Lineæ autē in costis ductæ, atq; ad characterum sinistram consistentes, ossa costarum ab earundem cartilaginibus determinant, sunt enim illæ notæ cartilaginibus inscriptæ.
- k* Musculus scapulæ mouentium primus. *l* Musculus thoracem mouentium secundus.
- m* In dextra axilla *m* latitat, musculum notans, quo brachium deorsum trahitur.
- n* Dextri lateris rectus abdominis musculus, hic altius quam oblique ascendens musculi nervosa tenuitas conspiciens.
- o* Abdo-


- o Abdominis musculus oblique descendens, quem hic in posteriora ab abdomine reflexu suum.
- II Abdominis musculus oblique ascendens, ac totam, uti conspicitur, sui lateris abdominis sedem amplectens, quem quodammodo circumscribunt o, n, p, q, & linea secundum inferiorem abdominis sedem ad ilium os, & coxendicis, & pubis ducta.
- p, q Portio obliquorum abdominis musculorum descendantium, quæ ad albam in abdomine apparentem lineam est relicta. Cæterum q priuatim significat penis constructionem, qui ad pubis os, quæ primum flaccidus, deorsum denuo propèdet, dissectus est. Duo itaq; uelut insigniores circuli, duo ipsius sunt corpora, circulus autem sub illis consistens, meatus est urinae seminiq; communis.
- r Vasa seminaria, quæ hic priuatim enarrare non proposui, quemadmodum etiam neq; testis musculus.
- f. sculum, cui ut à uasis distingueretur, f. ascripti. Verum huc 22 figura Libri quinti & edocebit.
- t Musculus cubiti flectentium anterior, cuius interioris principij carnosa parti nullum adhibui characterem, quum is hic, uti neq; in sequenti tabula, adhuc auferri possit. Interuallum autè inter duo ipsius apparens principia, humeri seu brachij os existit.
- u Musculus cubiti extendens, cui ab humiliori scapulae costa principium præbetur.
- x, x Posterior cubiti flectentium musculus. y Musculus superior radium in prouum ducentium.
- æ Radium in supinū agentium longior. β Musculus quatuor digitorū secūdos flectēs articulos.
- Σ Musculus ulnae exorrectus, & brachiale flectens. γ ipsius caput, & ipsius insertio.
- c Musculus alter brachiale flectens, hicq; deorsum dependens.
- ζ Musculus primum parui digiti internodum uersus exteriora flectens.
- u Hic musculus propendet, paruum digitum à reliquis in externum latus abducens.
- θ Transuersum ligamē in interna brachialis sede obuūm, tendinibusq; hanc repentibus obductum.
- i Musculus maior, primum pollicis os flectentium.
- x Propendet hic musculus, cuius beneficio pollicem ab indice maxime remouemus.
- λ Latus summæ manus tendo unā cum ipsius tendine, à summis quatuor digitorū aciebus in dextra manu dependens. Præterea hic in utriusq; manus uolatendines occurrunt mucosis membranis induti, atq; ad digitos protensi.
- μ Secundus femur mouentium musculus. ν Primus femur mouentium musculus.
- ξ Osis sacri osis dextro lateri cōmissi sedes, à qua primum & sextum tibiā mouētes rescuimus.
- Ϟ Caractere & sedes insignitur maioris exteriorisq; femoris processus.
- ϙ Nonus tibiā mouentium musculus, cuius initium supra coxendicis articulum incipiens, notatur, & uerò tendinis ipsius principium, p sedes indicatur, qua præsentis musculi tendo subditis connascitur tendinibus.
- 1 Musculus femur mouentium septimus. τ Musculus femur mouentium sextus.
- υ In sinistro femore musculus ν insignitur, femur mouentium octauus.
- ϙ Quinti femoris motui seruientium. x Secundus tibiā mouentium.
- ϕ Octauus tibiā mouentium. ω Septimus tibiā mouentium musculus, in dextro femore insignitus, quod ibidem is sit conspectior.
- 2 Primus tibiā mouentium musculus. 3 Sextus tibiā mouentium. 4 Sextus pedem mouentium musculus, unā ut duo præcedentes, ab insertionē pendens. Cæterum in sinistro crure etiam obseruatur primi tibiā mouentium, & huius sexti pedem mouentium insertionis portio,
- 5, 6. huius quidem insertioni caractere 6, illius uerò 5 insignito.
- 7 Septimus pedem mouentium musculus.
- 8, 9 Excarnis tibiæ osis pars, à cuius externo latere sextus pedem mouentium musculus ablatus est. Verum 9 priuatim interiorem notat malleolum.
- Υ Musculus quatuor pedis extendens digitos. 10 ipsius exortus insignitur. 11 uerò ipsius sedes, qua portionem suam emittit, quam noni pedem mouentis musculi loco numerabimus, & hic Ω notauimus. 12 Musculi Υ insigniti sedes, quatuor tendines, quibus quatuor digiti extenduntur, pullulans. Ω uti & iam paulo ante scripsi, musculus notatur inter pedis motores nonus, qui bicorni tendine insertionem 13 notatam tentat.
- 14 Musculus pollicem extendens. 15 Musculus pedem mouentium octauus.
- 16 Musculus pedem mouentium secundus. Reliquos autem in posteriori tibiæ sede non notabimus, quod eadem hic cum tribus tabulis præcedentibus sit ratio.

QVINTA

MVSCVLO,

RVM TABV-

LA.



DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER II.
CHARACTERVM QVINTAE MVSCV-
LORVM TABVLAE INDEX.

185

- A** FORAMEN quo nervulus tertij paris nervuorum cerebri, frontis musculus petit.
B Temporalis musculus. **C** Hic magna ossis iugalis portio execta est, ut temporalis cum
D. mascerere, quem **D** insigniuimus, coitus in conspectum ueniret.
E Foramen quo surculus tertij paris nervuorum cerebri, ad superius labrū, & alas nasi deducitur.
F Amplius musculus a superiori maxilla in inferiorem productus, ac buccarum motibus seruiens.
G Nervi utriusque ad hunc characterem occurrentes, labro inferiori exporriguntur. Ceterum su-
 perior characteris sedes, fungosam labrorum substantiā insinuat ad utrumque labrum conspicuā.
H, I Musculus inferiorem maxillam deorsum trahens. Singuli characteres singulos eius musculi ueni-
 tres notant, in quorum medio excarnis musculi pars consistit.
K Portio musculi caput mouentis, ac a pectoris osse & clauicula, mamillari processui insertus.
L Os, imaginem referens. **M** Primus & secundus linguae musculi, ab osse hyoide pronati.
N Laryngis cartilago scutum referens, & iam narrandis musculis adhuc obiecta.
O Dexter duorum musculorum ab osse u referente, in cartilaginem scuto similem insertorum.
P Dexter musculorum, qui a pectoris osse scutum imitanti laryngis cartilagini inseruntur. Ad hu-
 ius musculi exterius latus, cōgeries uisitur soporariae arteriae, interioris uenae iugularis, & sex-
 ti cerebri nervuorum paris. **Q** Aspera arteriae anterior sedes.
R, S Musculus ossi u imaginem exprimenti proprius, & a scapulae superiori costa enatus. singuli
 characteres singulos ipsius indicant uentres. Pars autem in eorum medio consistens, eius muscu-
 li pars est, tendinis substantiae non ab similis.
T Portio musculorum secundi paris caput mouentium. **V** Tertius scapulā mouentium musculus.
X Quoniā hic locus nihil aliud peculiariter, quā septima tabula in homine ostendisset, & quia Ga-
 leni sententiae, quā haec pingeremus, plus aequo fauimus, musculus hic ex cane delineatum cernis,
 quo homines prorsus destituntur, & Galeno tertius thoracem mouentium habetur, sequenti ta-
 bula integer **Γ** notandus.
Y Dextri lateris clauiculam hic a pectoris osse auulsimus, adhuc summo humero connexam, & sibi
Z. adhuc musculus seruantem, qui thoracis motorum primus numerabitur, hicque **Z** insignitur.
a Summus humerus, seu scapulae elatior processus. **b** Interior demissior uel scapulae processus.
c Ligamentū huius articuli peculiariū quartū ab interiori scapulae processu summū humeri petens.
d Ligamentū teres ab apice interioris scapulae processus, in anteriore sedē externi capitis hume-
 ri insertū, ac huius articuli primum. **e** Aliud teres ligamentū, ex eminentissimo scapulae ace-
 tabuli sede, ad externum quoque humeri caput procedēs, atque huius articuli ligamentorū secundū.
f Hac sede duo ligamenta d & e insignita, suis lateribus uniuntur, & uelut transuersum efformāt
 ligamentū, transmittens caput externum musculi cubitum flectentium anterioris, ac mox **?** notādi.
g Pectoris os, cui septem superiorum costarum cartilaginee utrinque connectuntur.
h Prima thoracis costa, reliquae dein etiā unā cū interuallis citra characterū opē sunt conspicuae.
Γ Musculus scapulam mouentium primus. **i** & **k** huius musculi principium notant, quandā manus spe-
 ciem perinde, ac musculus ipsi succumbens, & **m** insignitus representans. **l** tendinē praesentis mu-
 sculi indicat. Porro **i, k** & **l** simul huius musculi trianguli speciem quodammodo ostendunt.
m Musculus qui a scapulae basi pronatus, octo superioribus thoracis costis inseritur.
Δ Dexter rectorū abdominis musculorū. **n** carneū recti abdominis musculi principium triangulo nō
n, o. ab simile. **o** principium eiusdem musculi nerueum, penē uniuersum efformans musculus. Toto in-
p, q. teruallo a p ad q pertinente, recti musculi internis suis lateribus inuicē contigunt. Tota autem
 sede supra q, aut supra umbilicū consistente, tanto magis musculi mutuo se iunguntur, quāto altius
 conscendūt. Ceterum q notat etiā obliquorū abdominis musculorum neruosa tenuitatis, ad
r. transuersum abdominis musculū hac in parte cōnexū. **r** Hac linea carneā recti musculi partem
 finit, quae ultima ipsius insertionis in homine est portio, uti in 4 tab. ad characterē n est cernere.
s. Intercapedine igitur ab r ad s, hic notatur recti sinistae abdominis musculi tendo seu membrana,
t. excarnis uel musculi pars. **t** autē indicat carneā musculi sedē primae costae & secundae thoracis
u, u, u. insertam. **u, u, u** Inscriptiones, seu neruea delineamenta, transuersim recto musculo impressa,
 quibus oblique ascendens musculi neruosa exilitas pertinacissime connascitur.

- x Linea hæc portiunculam notat oblique ascendens musculi, quæ is transuerso abdominis musculo inibi adeo ualide committitur, ut inter diffecandum, nisi relicto cuiusmodi signo, à transuerso liberari nequeat. y Transuersus abdominis musculus.
- α Oblique ascendens abdominis musculus ab abdomine reflexus.
- β V asorum seminalium portio. Cæterum tres illi quodammodo circuli ad rectorum musculorum radicem seu iuxta n, & o ac p conspicui idem notat, quod in mox præcedente tabula, abfecti mirum penis constructionem ac naturam.
- γ Reuersa est musculi brachium attollentis anterior pars.
- δ In sinistro brachio insertionis pars adhuc reliqua est, musculi brachium attollentis.
- ε Excarnis humeri pars, inter duo capita apparens musculi cubitum flectentium anterioris.
- ζ Cubitum flectentium musculus anterior.
- η Musculus cubiti extensionis autor, cuius principium ab inferiori scapulæ costa pronascitur.
- θ Posterior musculus cubitum flectentium.
- ι Superior musculus eorum, qui radium in pronum agunt.
- κ Radium mouentium longissimus, cuius auxilio radius in supinum ducitur.
- ο Quatuor digitorum secundum os flectens musculus. λ ipsius principium sub musculo radio peculia
- λ. μ. ri, & i notato, reconditum. & musculi huius in quatuor carneas partes distributio, quæ postmodum in singulos tendines degenerant.
- ν. ζ Transuersum interioris brachialis sedis ligamentum, longa sectione diuisum, & utrinque in latus reflexum. Verum præterea ν musculum priorem primum pollicis os flectentium commonstrat, ζ autem musculum, cuius ope primum parui digiti internodium extorsum flectitur. Porro quod ad quatuor tendinum, secundum quatuor digitorum os flectentium seriem attinet, omnia sunt con-
- ο. spicua, quamuis interim indici, & paruo, huius indicationis gratia o inscripserim.
- ω Nonnihil hic sese offert musculus, quatuor digitorum tertium flectens os.
- ρ Portio musculi tertium pollicis internodium flectentis, qui in sinistro cubito est conspectior.
- * Musculus ulnæ exporrectus, quo brachiale flectitur. s Secundus femur mouentium musculus.
- τ Apparet hic obscure femoris caput coxendicis ossis sinum subiens, & ligamento obductum, sed in hoc præcipue adhibetur, ut ceruix, seu collum femoris hic indicaretur.
- υ Femoris magnus exterior ue processus.
- φ Femur mouentium septimus. x Femur mouentium sextus.
- ψ Femur mouentium octauus. ω Quintus femur mouentium musculus.
- Λ Septimus tibiæ mouentium musculus. 2 ipsius amplum principium à radice magni femoris processu enatum. 3 hic in tendinem latum desinit cum octauo & noni musculorum tibiæ mouentium
- 2, 3. tendinibus commixtum unitumq;. 4 hæc linea illum in anteriori femoris sede terminat, ubi octauus musculus ipsi primum subijci incipit. Ξ Octauus tibiæ mouentium musculus.
- Π Π octauum quoq; tibiæ mouentium musculum indicat, sed priuatim sinum ostendit, cui nonus tibiæ mouentium musculus insidebat, qui hic propendens insignitur. Maximam itaq; sinus sedem octauus musculus constituit, uerum septimus eius tantam portionem efformat, quanta à linea 4 insignita ad umbram septimi musculi usque protenditur, ita sanè, ut ab utrisque musculis sinus iste confurgat.
- β Hic propendet musculus tibiæ mouentium secundus.
- Σ In hac tibiæ, tibiæ os anteriori sede prorsus excarne cernitur. Superest enim hic duntaxat ex
- Φ. omnibus musculis illi adnatis, musculus pedis pollicem extendens, & modo Φ insignitus, cuius tendini 7 inscriptum conspicias. 3 Septimus pedis mouentium musculus.
- ρ Octauus pedem mouentium.
- Υ Carnea moles in superiori pedis sede reposita, quæ in quatuor carneas partes digesta, quatuor educit tendines, & pollicem, & tres ipsi proximos digitos in latus externum mouet.
- Ω Hic prosternitur musculus quatuor extendens digitos, una cum ipsius portione, quam noni pedis mouentium musculi uice recensuimus, ac cui iam & inscriptum cernis. Musculis posteriorem tibiæ sedem occupantibus nullos adhibui characteres, quod ipsorum eadem cum præcedentibus tabulis adhuc sit series & copia. Atque hac etiam occasione excarnes tibiæ ossis & fibulæ sedes, innotatas conspicias, quod scilicet ex prioribus tabulis iam pridè has didiceris.

SEXTA
MVSCVLO-
RVM TA-
BVLA.



SEXTAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

SEXTAE tabula caput in posteriora reflexum est, & maxillam inferiorē in summo mento diuisam, & utrinq; in latera deductam refert.

A Hic iugalis ossis portionem exsecui. Verūm *A* praeterea insinuat, temporalis musculi in acutum inferioris maxillae processum insertionem.

B Acutus maxillae inferioris processus.

C Sinistra maxillae inferioris pars.

D Musculus in ore delitescens, qui internae inferioris maxillae sedi, ubi latissima est, inseritur.

E Gurgulio à palati sine propendens.

F Glandula sinistra amygdalae non absimilis, ac eminentissime laryngis sedi apposita.

G Lingua, uerūm superior characteris pars, laryngis operculo est contermina.

H Hac sede plures capitis & cervicis moribus famulantes musculi confunduntur.

I Musculus inferiorem maxillam deorsum trahens, hic ab exortu pendet.

K Tertius hominis scapulam mouentium.

L Glandula sinistro laryngis radice lateri adnata.

M Aspera arteria.

N Haec congeries, est uasorum & nervorum lateribus asperae arteriae exporrectorum. quanquā & musculi dorsum mouentium primi aliqua ex parte se ostendant.

P Quoniam hanc pectoris colliq; sedem, illi similem delineare oportuisset, quam sequens ostendit tabula, non abs re fore duxi, ex cane hunc Galeni musculum exprimere, qui à transversis uertebra-

rum cervicis processibus originē *O* notatam ducens, ad quartam usque costam carnosus fertur,

P, Q ubi *P* notatus, in membrancum cessat tendinem *Q* insignitum, & deorsum ad aliquot costas ad huc pertinentem.

R Musculus à scapulae basi principium ducens, thoracemq; mouentium secundus. Pectoris os citra characterū impositionē conspicuū est, quemadmodū & costae, & earundē interualla una cū exte-

rioribus musculis intercostalibus. Quo tamē melius singula expendas, significet *S* tertiae costae

T os. *T* tertiae costae cartilaginem. *V* musculum exteriorem intercostalium, in tertiae & secundae

X costarum interuallo repositum, cuius fibrae deorsum in priora feruntur. *X* uero denotabit exteriorem intercostalium musculum, inter secundae & tertiae costarum cartilagine conspicuum, cuius fibrae sursum in anteriora prorepunt.

a Arteria & uena, sub pectoris osse deorsum ad abdominis superiora propagatae.

Δ Transuersus abdominis musculus, quem costarum ductus seu fines, & ossis sacri ossis sinistro lateri commisi regio, abunde hic circumscribunt. Ceterūm *b* sedem notat, qua oblique ascendens

musculi tendo, abdominis transuerso pertinacissime adnascitur, prius quam rectum conscendat.

c *c* autem indicat asperitatem, quam musculorum oblique ductorum cum transversis musculis connexus inibi molitur, uti recti musculi supra umbilici sedem, uersus pectoris os mutuō debiscunt.

d Foramen uasis seminarijs uirorum uiam praebens.

e Vena & arteria, in rectos abdominis musculos, conterminasq; sedes excurrentes.

f Hic sinistri lateris rectus abdominis musculus, à pubis osse dependet.

g Spinae ossis ilium, carnosus partibus duorum obliquorum abdominis musculorum liberata.

h Scapulis & sinistro brachio mentem accommoda, ibidem namq; *b* superiorem notat scapulae angulum, cui musculus *K* insignitus inseritur, deinde & superiorem quoq; scapulae costam *b* eadem opera tibi indicare poterit.

k Summus humerus, seu scapulae elatior processus. *k* Musculus brachium mouentium quintus.

l Interior scapulae processus, anchorae imaginem referens.

o Musculus anterior cubitum flectentium, cuius exterius caput, quod à scapulae acetabuli superci-

lio nascitur, *m* notat, *n* uero indicat internum caput ab interiori scapulae processu enatum. Quo tamen huius capitis nerueam partem à carnea exquisitiū discernas, huius tabulae dextrum bra-

chium spectabis, in quo *n* nerueam partem denotat, *o* autem carneam. At non haec duntaxat

p tabula eas commonstrat partes, imò priores ad unum omnes. Ceterūm *p* duorum capitū coitum

q indicat, *q* uero tendinis, quem musculus hic educit, principium.


r, r Musculus posterior cubitum flectentium.

f Musculus cubiti extensionis autor, cuius principium ab humiliori scapulae costa enascitur.

Δ Musculus

- A** Musculus radium mouentium longissimus, cuius altissimam partē, quæ hic oculis subijci potest,
t. u. t. indicat. u autem præsentis musculi insertionē notat, quā in inferiorē radij appendicē molitur.
x Musculus superior duorum, qui radium in pronum ducunt.
Ξ Musculus tertium quatuor digitorum os flectens, & æ quidem huius musculi caput insinuat. **B** au-
α. β. tem sedem indicat, qua musculus in quatuor partes carneas discinditur, qui singulos postmodum
 porrigunt tendines. Porro quæ ratione ad tertium usq; digitorum internodiū tendines huius mu-
 sculi porrigantur, & incumbētis musculi tendines transeant, hic in utraq; manu est conspicuum.
γ. δ. Sit tamen doctrinæ gratia γ tendo tertium mediū digiti os accedens, δ autem tendo, qui secun-
 dum os flectit. **ε** Musculus secundum quatuor digitorum flectens articulum.
ζ. ζ. Hos characteres referre oportet ad quatuor musculos, quorum beneficio quatuor digiti addu-
 cuntur pollicis, atq; hi interno lateri tendinum tertium os flectentium exporriguntur.
η. θ. Musculus tertium pollicis os flectens, & notatur. θ autem ipsius tendinem proponit, inter muscu-
 los primum pollicis os flectentes, & eos qui secundum pollicis os flectunt, prorepentem.
κ Musculus maior primum pollicis os flectentium, hic ab insertionē dependet.
λ Musculus minor primū pollicis os flectens, qui sub maiori κ indicato recondebatur. Inter λ ue-
 rò & κ, primum pollicis os nudum ex carneq; apparet.
μ Musculus primum parui digiti os uersus exteriora flectens. Tuberculum uerò ante huius mu-
 sculi initium apparet, ulnæ est sedes, qua ualidiorem ligamenti exporrigit portionem brachia-
 le cubito colligantis.
ξ Magnus femoris ossis processus. **ν** Tertius femur mouentium musculus.
ω Musculus femur mouentium sextus. **ο** Musculus femur mouentium septimus.
ς Quintus femur mouentium musculus. **ε** Musculus femur mouentium octauus.
π Octauus tibiæ mouentium musculus, uniuersum femoris os quodammodo amplectens. & insinua-
τ. tur amplum huius musculi principium, à radice magni femoris processus, & ipsius collo enatum.
 Deinde π priuatim indicat sinus illius portionem, quo nonus tibiæ mouens musculus cōtinetur,
 atq; hic sinus in dextro crure est conspicuus, quemadmodū & carnosæ musculi partis terminus,
υ. qui instar semiglobi extuberans hic υ insignitur.
φ Dependet hic musculus tibiæ mouentium septimus, cuius cavitās argumento est, qui octauum ti-
 biæ mouentium amplexetur musculus, & qui horum tendines unā cōeant. Quod ut commodius
 expenderes, in dextro genu septimus musculus adeò ab octauī musculi tendine dissectus est, ut &
 *. mole pars ibidem in conspectum ueniat * notata.
χ. ψ. Hæc sedes ad undecimam musculorum tabulam potissimum refertur, quæ ostendit portionem
 quarti tibiæ mouentis musculi ex femoris osse pronatam. atq; hic χ notat quarti musculi sedem
 ipsius insertioni proximam. ψ autem eam partem abscissam ostendit, cui coxendicis ossis appen-
 dix principium præbet.
Σ In sinistra tibiā totum externum tibiæ ossis latus conspicuum est. Id dico latus, quod ad externā
 sedem excarnis etiam ante sectionem partis habetur, quam & dextra tibiā totam oculis subij-
 cit. Ceterum Σ priuatim notat ligamentū tibiæ, os & fibulam, quæ hæc inuicem dehiscunt, in-
ω. tercedens. ω autem externum notat malleolum, & partem fibulæ excarnem.
φ Musculus pedem mouentium septimus. 2 ipsius exortum indicat. 5 tendinis principium, quod ante
2. 5. riori & posteriori parte, ac dein interius, quæ fibulam spectat, carne adnutritur. 4 itaq; partē
4. 3. notat anteriorem carneam, 3 uerò posteriorem.
ψ Octauus musculus pedem mouentium, magna sui portione sub septimo occultatus. 6 huius muscu-
6. li tendo, ad posteriorem exterioris malleoli sedem reflexus.
Ω Musculosa moles, cuius beneficio pollex & tres ipsi proximi digiti in externū latus ducuntur.
7 Hic procumbit musculus pollicem extendens.
8 Musculus paruum digiti in exteriora abducens, hac sedē obuius est.
9 Secundus musculus pedem mouentium
 In dextræ tibiæ posteriori sede nullas adhibui notas, quod musculos hac sedē delineatos, omnes
 quæ hæcenus præcesserunt, tabulæ ostenderint. Unde si & hic pariter notas requires, oportu-
 ne has a prima, secunda & tertia tabulis petes. Verum quia in sequenti tabula dependet, cuius
χ pollex intorsum mouetur, huic in præsentī tabula χ inscripsi.

SEPTIMA
MUSCULO-
RVM TABV-
LA.




SEPTIMAE MVSCVLORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

SEPTIMA

- musculorum tabula laxato sine, à quo inter pingendum pendebat, in posteriora tantum procidit, quantum uidendo septo transuerso sufficit. quod etiam in praesenti tabula ad sinistram ea forma appictum cernis, qua exectum, parietiq; suo lentore haerens nobis apparuit. Quo minus autem dextra scapula effracta alae ritu in deorsum decumberet, illam funiculo ita suspendimus, ut ipsius cauum in conspectu sit.
- A** Gurgulio indicatur à palati termino propendens, inferiori interim maxilla prorsus amota.
B Aliquot ceruicis uertebrae corpora. **C, D** Primum par dorsum mouentium.
E Stomachi seu gulae pars sub aspera latitans arteria, quam **F** notauimus. Ceterum uasa, quae utrinq; ad huius latera habentur congeries est, quam soporales efficiunt arteriae cum internis in gularibus uenis, & sexto neruorum cerebri coniugio.
G Musculus alter secundi partis dorsum mouentium. **H** Scapulam mouentium tertius.
I Musculus brachium mouentium quintus.
K Musculus brachium mouentium sextus, cuius insertio **K** insignitur, reliqua ipsius forma ex scapulae imagine deprehenditur. quoniam si praesentis musculi triangularem figuram uolueris consituere, licebit **K, L** & **L** simul conferre.
L, L Musculus thoracem mouentium secundus. **M** Brachium agentium tertius.
N, N Musculus cubitum extendentium, cuius initium superiori **N** insignitur à scapula educitur.
O Portio tendinis musculi, brachium mouentium quarti. **P** Cubitum flectentium posterior.
Q Radium in prouum constituentium superior. **R, R** Anterior cubitum flectentium.
S Radius. **T V** lna. **V** Ligamentum inter radii & ulnae, quae inuicem debescunt intercedentes.
X Radium in prouum mouentium inferior musculus.
Y, Y A dextro radio (qui cum uniuersa extrema manu magis quam sinistra attollitur) dependet, longior radium in supinum ducentium. **a** Minor primum pollicis os flectentium.
1, 2, 3 Tribus his characteribus musculi notantur secundum pollicis os flectentes.
b Dependet musculus tertium pollicis internodium flectens. **c** Musculus tertij quatuor digitorum ossis flexus auctor, quem sedulo intuebere, quod illius tendinibus musculi attendantur, quatuor digitos pollicis adducentes, quorum is qui indicem mouet, d insignitur, perinde ac reliqui tres ab insertione haerens. Quinetiam tendinum secundum quatuor digitorum os flectentis musculi portiones adhuc seruantur. ac portioni quidem indici propriae **e** inscripsi, tendini autem tertium indicis os flectenti **f**. Ceterum in dextra manu dictorum musculorum conspiciuntur insertiones. **g, h**. ac **g** in indice insertionem indicat musculi indicis pollicis adductis. **h** insertionem musculi secundum os flectentis. insertionem eius, qui tertij ossis flexioni praeficitur. Praesentis tabulae thorax, quod ad intercostales spectat musculos, praecedentis tabulae thoraci respondet, unde etiam alijs characteribus non uenit obliterandus.
Δ Septum transuersum, cuius membraneus circulus in septo extra corpus expanso circumscribitur **k, l, m, n**. **k, l, m, n** quod uero exterius hos characteres ambit, atq; foris (ut ita dicam) existit, fibrisq; in **o, p**. terstinguitur, carneam septi partem esse putato. **o, p** Duo ligamenta, seu tendines septi, uertebrae in lumbis consistentium corporibus inserti. **q** Septi scissura, qua septum uertebrae incumbit corporibus, ac magnam arteriam, uenamq; coniugis experte transmittit, aut illis cedit, quarum orificia **q** in corpore huius tabulae positum indicat, quemadmodum & arteriae ramos in **r**. septum excurrentes. **r** Foramen stomacho uiam praebens, qui etiam **r** in corpore insignitur.
s, s Foramen uenae cauae caudici paratum, qui in corpore s notatus conspicitur.
t Musculus femur mouentium sextus. **u** Musculus dorsum mouentium nonus.
x Femur mouentium septimus. **y** Sacrum os hic insignitur, neruiq; aliquot ab ipsius medullaeducti, obuij sunt. **α** Femur mouentium octauus. **β** Quintus femur mouentium.
γ Tibiam mouentium octauus. **ε** Musculus pollicem à ceteris digitis amouens.
Δ Dependet & hic quoq; ab insertione musculoosa moles, pollicem & tres ipsi proximos digitos in externum latus ducens. Quae uero in praesentis tabulae tibij occurrunt, illis respondent, quae prioribus tabulis fuere obuia.



CHARACTERVM OCTAVAE MVSCV-

LORVM TABVLAE INDEX.

- HÆC* tabularum anteriorem corporis faciem exprimentium postrema est, musculos adhuc in anteriori hac sede obuios, ex sectionisq; serie reliquos proponens. *V* t uero interiores intercostalium ostenderet musculos, & eos qui in interna thoracis sede pectoris ossis attenduntur lateribus, os illud una cum costarum cartilaginibus exectum, ad dexteri cruris latus euersum, atq; sub dextræ manus indice propositum cernis.
- A, B* Musculi collum, superiorem uel dorsi partem flectentes, dorsi q; mouentium primū coniugium.
C Musculus a prima enatus costā, ac secundi dorsi mouentium paris alter.
D Exteriores musculi intercostales, in osium interuallis conspicui.
E, E Interiores musculi intercostales, in osium interuallis obuij.
F, F Musculus octo thoracis costis insertus, ipsiusq; motorum secundus.
G *V* trinq; scapula modo sectionis serie, nuda ex carnisq; est, ac sua sede dimota.
H Musculus dependet, brachium antrorsum circumuertens, scapulæq; cauum occupans.
I Musculus superiori scapulæ basi angulo insertus, ipsamq; agentium tertius.
I Posterior cubitum flectentium, cuius principij elatior exteriorq; pars *L* insignitur, demissior uero interiorq; pars *M*. Insertio autem præsentis musculi *N* indicatur.
O Radius. *P* *V* lna. *Q* Tendinis musculi pars cubitum flectentium anterioris.
R Musculus ab insertione dependet, radium in prouum mouentium superior.
S Musculus ab ulna dependet, radium in prouum ducentium inferior.
V Sede *T* insignita ligamētū, brachiale ad cubitū necēss, crassius apparet, ut etiā sede *V* notata.
X Musculi ab insertione propendent, secundum pollicis internodium flectentes.
Δ In postbrachiali dilucidius exprimi nequērunt octo musculi, quatuor digitorum primos articulos flectentes. Cæterum dextra manus in latus picta est, ut musculum *Y* insignitum offerret, qui primum indicis os inorsum flectit.
Θ Sextus femur mouentium musculus, cuius initium ē uertebrarum procedens corporibus *a* insignitur. *b* uero ipsius sedes, ubi tendinem educere incipit.
Λ Septimus femur mouentium musculus. *Ξ* Musculus dorsi mouentium nonus.
Π Sacrum os, ex cuius anterioribus foraminibus nerui proflire hic uidentur.
Φ Quintus femur mouentium musculus. *V* erum *Φ* priuatim huius musculi partem notat posteriorē, *c* rem, *c* autem anteriorem.
ε Pubis ossis anterior sedes, hoc latere ex sectionis serie, carne denudata.
Υ Musculus femur mouentium nonus, anteriorem pubis ossis foraminis sedem occupans.
Ω In sinistro genu tendines, septimi tibiæ mouentium musculi *g* insigniti, & octauus *b* indicati, & *g, h, i.* noni *i* notati, a genu reflexi sunt, ac patellam ipsis innatam, ac *k* insignitam oculis subiiciunt.
k, l. In dextro autem crure octauus tibiæ mouentium musculus, solus ab insertione ac integer dependet, *l* notatus, & patellam sibi innatam seruans, cui *k* inscripsimus.
m Tibiæ ossis anterior sedes, omni prorsus musculo libera.
n Fibulæ etiam anterior sedes, ex dissectionis serie musculis omnibus denudata.
o Ligamentum notatur inter tibiæ os & fibulam inibi repositum, ubi hæc ossa inuicem debiscunt.
*** Qui hic spectantur musculi, illi sunt, quos sexta musculorum tabula expressit literis *Φ* & *Υ*. septimus nimirum & octauus pedē mouentium. In superiori pedis sede modo nulli adhuc reliqui sunt musculi, ossaq; duntaxat ligamētis obducta, in conspectū ueniunt. Cæterum musculi, qui *h, a* p. q. ctenus in tibiæ posteriori sede fuere obuij, sectionis serie auferri incipiunt, ac p. q. notant primū J. t. ac secundum pedem mouentium, a quarto eiusdem motus autore musculo, *t* insignito, ad characterem s propendentes, quo priuatim notatur tendo tertij pedem mouentis musculi.
u Musculi pars hic occurrit, quatuor digitorum tertium articulum flectentis.
x Hic obscure se offert pedem mouentium quintus.
α Pectoris ossis posterior, seu cor spectans sedes.
2, 3, 4, 5, 6, 7 His characteribus septem uerū costarū indicantur cartilagines. Reliquæ autem quatuor cartilagines, octauæ, nonæ, decimæ & undecimæ costarum cartilagines sunt.
β Musculus humanum thoracem mouentium sextus.

R. NONA

N O N A
M V S G V.
L O R V M T A -
B V L A



NONAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

P R A E S E N S tabula omnium posteriorem corporis faciem exprimentium, prima habebitur, hic ordine non a. Si tamen anterioribus seriatim ac uicissim posteriores subsequi uelles, posset haec omnium esse aut tertia, aut quarta. nullum enim abscictum habet musculum, praeter eos, quos carnea membrana constituit, tertiaq; tabula obuij sunt. Praeterea transversa in cubiti externa sede, iuxta brachiale reposita ligamenta hic dissecuimus, quod prima & secunda tabulis abunde conspicua fuerint, hancq; tabulam ad disciplinam prorsus parauerimus.

A Temporalis musculus.

B Os iugale.

C Masseter. Auris uero foramen cum ipsi subiectis glandulis, citra characterum subsidium est obuium.

D Musculus caput mouentium, a pectoris offe, & clauicula enatus, in mamillarem capitis processum inseritur.

I, Δ Musculus secundo loco inter scapulam mouentes recensendus. Atq; huius principium ab occi-

E, F. pitij offe pronatum, E ac F insignitur. E uero usq; ad G musculi principium ab occipite, ad

G. octauae usq; thoracis uertebrae spinam, a mediarum uertebrae apicibus quodammodo enatū.

H, I. **H.** I insertio, quam musculus in scapulae spinam, & summum humerum, latiusculamq; clauiculae sedem molitur. * hac sede praesens musculus, quasi membraneum semicirculum obinet, seu car-

K. nose ipsius fibrae, in semicirculi cessant circumferentiam. **K** hac parte ceruicis collumue, thoracis clatissima parti committitur. Lineae autem lateriue musculum circumscribentia in hunc modum colliguntur. Ab E ad F prima protenditur, ad occiput transversim ducta. Quod autem hu-

ius extremum F notatum, non tantum ab auris radice distare hic uideatur, quantum F remouetur ab E pictura, in causa est oculum fugiens, quod & sinistrum brachium in anteriora porre-

ctum liquido demonstrat, quod forte ignarus, plus aequo breuius esse arbitrabitur. Por-

ro secunda linea praesentis musculi ab E per K ad G metitur. Tertia autem ab F ad H.

Quarta ab H ad G. Atq; his lineis musculus terminatur. Insertionis autem linea ab I ad K pertinens, nulla prorsus separationis nota existit.

L Musculus brachium attollens, eiusq; motorum secundus. . . .

M Musculus gibbam scapulae sedem occupans, brachiumq; mouentium quintus.

N Musculus ab humiliori scapulae costa pronatus, & brachij motus opificum tertius.

O Musculus brachium agentium quartus, sequenti tabula Θ insigniendus.

P In praesentis tabulae dextero latere P, indicat portionem abdominis musculi, quem oblique descendentem uocamus.

Q Nonnihil in dextro brachio occurrit, brachium flectentium musculus.

R Posterior cubiti flectentium musculus.

S Musculus cubiti extensionis autorum, cuius principium ab humeri pendet ceruice.

T Musculus cubiti extendentium, cuius principium ab humiliori scapulae costa pronascitur.

V Inae sedes triangula, nullis obiecta musculis, excarnisue, ac praecipue insertionem excipiens nervose cubiti extendentium musculorum insertionis.

X Musculus radium in supinum agentium, qui in inferiorem radij appendicem inseritur.

Y Musculus bicorni tendine brachiale extendens.

Z Musculum Z insignitum, autorem extensionis indicis, medij ac anularis recensebimus, cuius a, b. initium a indicatur. Sedes uero, quae carnea esse desinit, b insignitur.

Musculus qui nobis extensionis autor parui digiti recensetur. Commixtionem tendinum musculi Z insigniti, ac musculi Θ indicati, quae ad digitorum fit radicem, ita hic delineauimus, quemadmodum crebrius nobis occurrit.

Δ Musculus brachiale extendentium, cui principium offertur ab humero c insignitum. Insertionem uero d indicatam, in postbrachialis os, paruum sustinens digitem molitur.

Ξ In utroq; cubito Ξ insignitur musculus, brachiale flectens, octauoq; brachialis offi insertus, ac in nulla musculorum tabula aeque atq; hic conspicuus. Quemadmodum & musculi latum manus

R 2 tendinem

- q. tendinem producentis initium, hic ad characterem q. est obuium, una cum exortu musculi brachiale flectentis, qui postbrachiali insertus, Δ in tertia musculorum tabula ornatur.
- c Musculi hac oblique prorepentes, illi sunt, quorum alter unum tendinem brachialis ossi, pollicem suffulcanti inserit, alter uero unum tendinem primo pollicis ossi offert, alium secundo & tertio pollicis ossi inferens.
- f Musculus tribus pollicis ossibus externa sede insertus, & pollicem uersus indicem euertens.
- g Musculus pollicem indici proxime adducens.
- h Musculus parui digiti a reliquis abductionis autor.
- II Primus femur mouentium musculus, i, k, l, m & n circumscribitur. Quandoquidem i usq; ad k, sui principij partem notat, quæ ex ossis ilium spina enascitur. k autem ad l, principij partem indicat, ab ossæ coccyge, infimaq; sacri ossis sede pendentem, ubi etiã sinister musculus dextro coniuguus est. m indicat elatiorem ipsius insertionis partem, n autem insertionis infimã notat partem, quæ quia inter musculos tibiam mouentes hic penitus se insinuat, reconditq; omni ex parte non est conspicua.
- o Secundus femur mouentium musculus, magna ex parte primo obiectus.
- p Sextus tibiam mouentium musculus, in latum illum degenerans tendinem, qui femur amplexantibus musculis obuoluitur, attamen non ad eam pertingit crassitiem, ut subditos ipsi musculos obscurare possit.
- q Musculi, quem p notauit, carnosæ partis terminus.
- r Septimus tibiam mouentium musculus, membraneo tendine sexti tibiam mouentium musculi obiectus.
- s Quartus tibiam mouentium musculus, septimi posteriori attensus sedi.
- t Tertius tibiam mouentium musculus, in utroq; crure (quemadmodum & subsequentes aliquot) notatus.
- u Musculus, quem quinti tibiam mouentium loco habemus.
- x Apparet & hic quoq; portio musculi, femur mouentium quinti.
- y Musculus secundus tibiam mouentium.
- α Musculus tibiam mouentium primus.
- β Octauus tibiam mouentium musculus.
- γ Nonus tibiam mouentium musculus.
- δ In hoc sinu tibiam accedens arteria, una cum maxima cruris uena, & neruo quoq; totius corporis crassissimo uehuntur.
- ε Musculus primus pedem mouentium.
- ζ Secundus pedem mouentium musculus.
- η Septimus pedem mouentium musculus.
- θ Octauus pedem mouentium musculus.
- ι Excarnis fibulæ pars, ipsæque adeo exterior malleolus.
- κ Aliqua ex parte portiuncula hic occurrit, musculi pedem mouentium noni.
- λ Musculus paruum digitum a cæteris abducens.
- μ In sinistra sura tendo, tertij partem mouentium musculi notatur.
- ν Interior malleolus.

DECIMA

MUSCULORVM TABVLA.

DE

DE



DECIMAE MUSCULORVM TABV-

LAE CHARACTERVM INDEX.

HAEC omnium tabularum decima, posteriorem uero faciem exprimentium secunda, se-
tionis serie quartam tabulam subsequi posset. In hac itaq; iam praecedentis tabulae muscoli ali-
quot adempti dependent, multiq; in illa non obuij, hic sese comonstrant. Atq; inter reliquos pro-
fus ablati est, quem nona tabula Γ & Δ insigniuimus, quod uidelicet nusquam apte formam
ipsius, dependens ostendere potuisset.

- \mathcal{A} Dexter primi paris caput mouentium musculus.
 B, B Secundi paris caput mouentium dexter.
 C Scapulam mouentium tertius musculus.
 D Clauicula.
 E Musculus humani thoracis motorum tertius, sequenti tabula F notandus.
 Γ Musculus scapulam mouentium quartus, cuius quatuor latera circumscribuntur $G, H, I, K,$
 $G, I, H, K.$
 L Musculus brachium mouentium quintus.
 M Scapulae spina, ac summus humerus.
 Δ Musculus brachium mouentium secundus, quem in posteriori corporis sede prompte circumscri-
 P pferis, si P musculi insertionem esse cognoueris. P namq; ac N & O , trianguli modo, dictam
 N, O musculi partem terminant, anteriori interim parte Ξ , in quarta tabula musculorum insignita.
 Q Brachium mouentium sextus musculus.
 R Musculus brachium mouentium tertius.
 Θ Hac sede aliquot dorsum mouentes musculi exporriguntur, una cum humanum thoracem mouen-
tium quarto.
 \odot Hunc musculum, secunda tabula Γ insignitum proponebat: est autem is, cuius beneficio brachij
 S, T deorsum, uersus dorsum uellitur, idq; mouentium quartus. S & T , musculi huius principij indi-
 V cant longitudinem, V partem ipsius insertioni proximam, quae hic ostendi nequit, uerum in se-
 X ptima tabula O insignita, utcumq; fuit obuia. X autem musculi latus ea sede indicat, ubi ab illi
offe non amplius enascitur. Circumscribes uero praesentis musculi latera ab S ad T , dein a T
 Y per X ad V , in super ab S ad V . Ceterum Y notabit inferiorem scapulae basis angulum
hic extuberantem, & tertio musculi latere interclum.
 Z Oblique descendens abdominis musculi portio.
 a Musculus ab humiliori scapulae costa principium ducens, & cubiti extensionis opifex.
 b Musculus a ceruice capitis humeri iuxta scapulam originem ducens, ac cubiti extensionis autor.
 c Portio anterioris cubiti flexentium musculi.
 d Portio posterioris cubiti flexentium musculi.
 e Musculus radium in supinum agentium longissimus.
 f Musculus bicorni tendine brachiale extendens.
 g Hac sede ligamentum conspicitur membraneum, superiorem radij partem humero colligans.
 h, b Hac sede ulnae, carne omni, musculus ne libera cernitur.
 i Musculus brachiale flexentium, qui octauo brachialis ossi inseritur.
 Λ, Ξ, Π Tres isti characteres, tria notant musculorum principia ab ulna pronata. Primum Λ insignitum, illud est, quod radio ante medij illius longitudinis insertum, musculus habetur, radium in su-
 k, l pinum agentium breuior. Secundum Ξ indicatum, illud est, quod in duas portiones, k & l nota-
tas dirimitur. k enim eam significat portionem, quae tendinem brachialis ossi, pollicem proxime
 m sustinenti offert. l uero inferiorem insinuat portionem, quae dein bipartita, unam, quae m in-
 n scribitur, primo pollicis ossi inserit: alteram n indicatam, in secundum & tertium pollicis inter-
nodum implantat. Porro tertium principium, Π insignitum, illud demum est, quod in duas quoq;
 o, p partes, o & p indicatas discinditur, quarum superior, o notata, tribus pollicis ossibus inseri-
tur. Inferior uero p indicata, indicem, ac medium a pollice abducere creditur.
 q Propendit ab insertione musculus, brachiale unico tendine extendens. Dein praecipuus exten-
 r sionis parui digiti autor, r insignitus, quemadmodum & musculus indicem medium, ac anularem
potissi-

- f. potissimum extendens, ac s indicatus.
- ε Musculus pollicem indici proximè adducens.
- Σ Secundus femur mouentium musculus, cuius exortū, semicirculi formæ quodammodo responden-
tem, u et x notant, quanquā u in anteriora magis adhuc deberet exporrigi, si præsens tabula in
y. latus magis uerteretur. Cæterum y huius musculi indicat insertionem, ut etiam u, & x, & y
uniuersum musculum circumscribunt.
- α Magnus exteriorq; femoris processus.
- β Quartus femur mouentium musculus.
- γ Ligamentum à transuerso quinti ossis sacri ossis processu, in acutum coxendicis ossis processum
pertinens.
- δ Ligamentum à dicta nuper sacri ossis sede, in posteriorem elatioremq; appendicis ossis coxen-
dicis sedem insertum.
- ε Musculus femur mouentium decimus, qui hæc à posteriori pubis ossis sede reflexus, alium uelut
musculum suprà infraq; ipsi attensum commonstrat.
- ζ Quoniam hæc sedes sequenti tabula perinde, atq; hic erit conspicua, neruum cæteris omnibus
corporis neruis summe animaduertendum, ab hac tabula nõ rescuimus. est aut is, quem quartum
femur potentii numerabimus, cui secunda tertiæq; figuris, Capiti undecimo Libri quarti præ-
ponendis, characterē 71 indicatur. Præsens etenim neruus, cuius ductum seriemq; tanto pe-
re expendendā putauerim, is profectò est, secundum quem ex caluarie amplitudine, in dorsifuer-
tebrarum foramen, quod dorsali medulle transmittendæ paratur, humor in pedes confluit, quem
nonnulli haud infrequenter instar tepentis, alij instar frigide aquæ demanare, ac in crus profluere
sentiant. Arbitror autem huius nerui distributionē eo animaduertendā accuratius, quo sæpius
hac mea ætate affectus innumeri sese mihi ex humorū ad neruū hunc defluxu obtulerint. Quine-
tiam eundē in poplite u notatū cernis, quanq; u priuatim huius nerui grandiorē indicet portionē,
quæ & si in alias quamplurimas soboles disseminetur, præcipua tamen ipsius parte pedis, inferio-
ra inter calcem, & interiorem malleolum petit. θ uerò præsentis nerui in poplite bipartiti, mi-
norem insinuat ramum, maxima sui parte in musculos digestum, tibiæ latus, & anteriorem eius-
dem sedē occupantes, qui me Hercule nõ minus quoq; accurate, quam quouis corporis neruus est
obseruandus, si non ob aliud, saltem propter urentia medicamina, quæ subinde hic ægris adhiben-
tur. Præter hoc enim, quod appositionis sedem adamsium Medici hinc cognoscent, etiā expen-
dere erit incundissimum, qui ulcus eorum medicamentorum ui inustum, humorem secundum hunc
neruum decurrentem expurget. Nam quod inuritur ulcus, huic nerui ramo, θ indicato uicinum
est, & quum paulò inferius sit, quam superior fibule consistat appendix, neruus contingi nequit.
Atq; eiusmodi sane pleraq; crebro sermone adijcerem, nisi iridiculum arbitrarer, reliquas medi-
cina partes huic Anatomicæ misceri, aut ego etiā eiusmodi aliqua non essem priuatim suo tem-
pore, uti iam coepi, exaraturus. Quòd autē hic quædam interiecerim, nerui illius occasione factū
est, idq; potissimum, quum locus uacuus ante undecimam tabulam seruandus esset.
- κ.κ In utroque femore κ occurrit, musculum notans femur mouentium primum, qui in sinistro crure
integer à sua sede reflexus est, in insertionem duntaxat corpori commissus, quæ in dextro crure, so-
lum inibi reliqua est, ubi ualidissima spectatur, ubi autem leniter, membranæq; tantum ritu inse-
rebatur, λ ascriptum cernis.
- μ Septimus tibiæ mouentium musculus, non amplius membranco sexti musculi tendine obiectus.
- Φ Tertiū tibiæ mouentium musculus, cuius caput υ insignitur, sedes uerò tendinem primum edu-
cens ζ. Insertionem autem tertia musculorum tabula proponebat, characterē 3 insignitam.
- Υ Quartus tibiæ mouentium musculus.
- ω.ω Quintus tibiæ mouentium.
- ρ Quinti femur mouentis musculi portio.
- ς Secundus tibiæ mouentium.
- τ Portio octauæ tibiæ mouentis musculi, resecto iam interim primo tibiæ mouenti, qui aliàs hic
in orbe occurreret. Quod uerò ad musculos in tibiæ pedeq; repositos attinet, omnia præcedenti
conueniunt tabulæ, ut & duodecimæ, quam inibi characteribus primum occupabimus.

VNDECIMA

MVSCVLO.

RVM TA
BVLA.

VNDECIMAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

- A, A* SINISTER primi caput mouentium paris musculus.
B, B Secundum par musculorū caput mouentium, in sinistro tantum latere characteribus insignitum.
 * Musculus hic obscure occurrit, cuius beneficio inferiorem maxillam deorsum agimus.
C Musculus scapulam mouentium tertius.
D Clauicula.
E Pendet hic musculus, à scapula ossi *u* referenti insertus.
F Humanum thoracem mouentium tertius.
G Brachium mouentium quintus.
I Musculus scapulae gibbum sub illius spina occupans, ac brachium mouentium sextus, cuius initium
H, I. ab *H* ad *I* metitur, insertionis uero sedes *K* indicatur, atq; ita totus trianguli modo *H, I,*
K. *K* circumscribitur.
L Musculus ab humiliori scapulae costa initium ducens, brachiumq; mouentium tertius.
M Hic musculus brachium mouentium secundus, ab exortu liberatus, antrorsum tota parte reflectitur, quam proxime praecedens tabula, *O, N* & *P* circumscribebant. Atq; ita interna musculi sedes, qua humeri articulo incumbit, in conspectum uenit, & trianguli uertex etiam quodammodo proponitur, ad cuius similitudinem huius musculi initium describebant. *N* enim ea musculi pars est, quae basi scapulae fuit proxima, *O* autem illa, cuius initium à summi humeri cum clauicula articulo pēdet. Dein si *D* eam musculi partē esse fixeris, cui clauicula initium largitur, promptē assequeris musculi suo exortu liberi principii insigniter obtusum angulū referre, uti figura modò inserta comprobat, qua interna musculi sedes exprimitur, articulo maxime contermina. Atq; hic *A, B, C* musculi indicant principii, ab *A* quidem & *B* principij portionem à summo humero, & scapulae spina pronatam, à *B* uero ad *C* reliquā principij partē, quae clauiculae debetur. Postremo *D* musculi insertionis sedes insignitur. Quod autem ad trianguli obtusum attinet uerticem, nulli non obuium est *B* humilius ponti, quam *A* & *C*, quibus characteribus triangulum terminari promptē animaduertis.
P Dictus nuper musculus ab omnibus, unde principii ducit, sedibus liberatus, ac ab insertionē duntaxat in dextro brachio pendens, pulchrè ostendit hanc transuersim in humerum fieri.
Q Humanum thoracem mouentium quartus.
R Musculus dorsum mouentium undecimus.
S Dorsum mouentium decimus quintus, seu octauus dorsum mouentium paris alter.
T, T. Characteribus *T, T* duas costas earum, quae iam sectionis serie deteguntur, insigniuimus, *V* uero earundem costarū interuallū, ut intercostalium hic musculorū exterior obseruaretur.
X Musculus thoracem mouentium secundus.
Δ Humanum thoracem mouentium quintus.
a, b Obscurum impenseq; membraneum musculi obliquē ascendens abdominis initium, à spinarum apicibus inter *a* ac *b* pronatum.
c Musculus ab insertionē hic dependet, brachium mouentium quartus.
Θ Musculus cubitum extendens, cuius initium *d* insignitū, à ceruice capitis humeri educitur, quod
d, e. scapulae articulatur. *e* autem sedem indicat, qua praesens musculus ab altero cubitum extendentium, mox *f* indicando, non amplius distinguī nequit.
f Cubitum extendentium musculus, ab humiliori scapulae costa pronatus, ac cum musculo *Θ* insignito coiens.
g Musculus cubitum flectentium posterior.
h, h Longior musculus radium in supinum ducentium.
Λ Musculus bicorni tendine brachiale extendens, cuius initium *i* insignitur. sedes uero, quatenus
i, k, l. dinem educit, *k*, tendinum autem ipsius insertio, *l*.
m Musculus radium in supinum ducentium breuior.




n Radius.

o Vlna.

- o *Ulna. Atq; in horum ossium medio ligamentum occurrit, tota sede illa ossa intercedens committensq; quae inuicem dehiscunt.*
- Ξ *Secundum principium trium principiorum, quae ab ulna originem seriatim sumunt. Ac p quidem eius principij pars est, quae tendinem brachiali offert. q autem tendo, primo pollicis ossi inferitur. r uero is tendo, qui secundo & tertio pollicis inseritur ossibus.*
- p, q. *Musculus pollicem indici proxime admoens.*
- r. *Tertium principium eorū, quae ab ulna pronascuntur, hic quoq; ab insertione pendens. Ac t quidem notat eius portionem, quae indici ac medio tribuitur, u uero eam, quae pollicis est peculiaris.*
- Σ *Tertius femur mouentium musculus, cuius initium z, y, x circumscribitur. Quod uero ad horū characterum latera, superiusq; spectatur, ilium ossis dorsum est, primo secundoq; femur mouentibus musculus liberum. Caterum α tertij illius musculi insertionem proponit.*
- x, y, z. *Quartus femur mouentium musculus, à tribus humilioribus sacri ossis ossibus initium ducens, & β illic primum tendinem educens, ubi β conspicitur.*
- α. *Magnus femoris processus.*
- β. *Secundus femur mouens musculus.*
- γ *Septimus tibiae mouentium musculus. Quid uero γ indicetur, ad characterem Ω paulò post commemoraturus sum.*
- δ *Ligamentum ab osse sacro, in coxendicis ossis acutum pertinens processum.*
- ε *Musculus decimus femur mouentium, hāc ab interiori pubis ossis sede reflexus, ac ueluti inter duos musculos i & κ insignitos praeorens.*
- θ *Caput tertij tibiae mouentium musculi, quod primum eorum censetur, quae à coxendicis ossis appendice pronascuntur.*
- i, κ. *Caput quarti tibiae mouentium, quod quatuor ut minimum capitum à coxendicis ossis appendice pronatorum secundum numeramus.*
- λ *Musculus, quem quinti tibiae mouentium loco habemus, cuius initium ν insignitur, quod tertium eorum capitum habetur, hinc à coxendicis osse educitorum. ζ uero praesentis musculi ostendit finem, cui tertius tibiae mouentium alioquin insidet. o hic quintus musculus, in tendinem desinit, anteriori tibiae ossis sedi implantandum.*
- ν, ζ. *Subsequenti tabula musculum explicabo, quem femur mouentium quintum recensemus, characteribus Ξ, Σ & Π inibi indicandum. In praesenti autem idem musculus, characteribus & ac &, tum ζ ac Ω insignitur, singulisq; peculiaris musculi pars indicatur. Vtrumque enim &, posterioriorem notat musculi partem, ζ uero & Ω anteriorem. Caterum ζ priuatim indicat eius anterioris partis anteriorem portionem. Ω autem posteriore significat portionem anterioris partis.*
- o. *Quartus tibiae mouentium musculus hic ab ipsius parte, quam femoris os educit, ac ρ insignitur, pendet.*
- ρ. *Musculus tibiae mouentium tertius, ab insertione pendens.*
- σ *Musculi tibiae mouentium octauae portio. Tibiae autem nullum adhibui characterem, quod sequenti tabula iidem, qui hic modo proponantur musculi, illic characteribus ex sectionis serie occupandi.*

DVODECI-
MA MVSGV.
LORVM TA
BVLA.



DVODECIMAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

- r** SINISTER primi caput mouentiu musculoru paris musculus, cuius principiu A notat, AB, C. Buerò & C insertionem, quam in occipitis os molitur. D autem sedem indicat, qua dexter musculus a sinistro primum abscedit. Postremo E insinuat internu insertionis dextri musculi latus. Quare si illum musculus in trianguli formā agere uisum fuerit, illum circumscribes lineis, A B, A C, B C. Quinetiam si interuallum inter dextrum musculus & sinistru consistens, quoque trianguli modo spectare uolueris, circumscribes id, a B ad E, dein a B ad D, & ab E ad D.
- F, F** Sinistri lateris musculus secundi paris caput mouentium.
- G** Scapulam mouentium tertius. **H, H** Brachium mouentium quintus.
- I** Summus humerus a connatis ipsi musculis liber. Ceterum neque costas, neque earundem interualla characteribus insigniuimus, quod hic eadem, ut in praecedenti tabula, ad T, T, V sit ratio.
- Δ** Humani thoracis motorum quartus, cuius initium K insignitur. L uero sedes, qua primum a lon
- K, L.** gissimo dorsum mouentiu musculoru N mox notādo, nō amplius pertinaciter (quemadmodū in f
- M, M.** riis a K ad L usque) adnascitur. Tendines autem praesentis musculi aliquot, M, M indicantur.
- N** Dorsum mouentium undecimus. **O** Dorsum mouentium decimus quintus.
- P** Scapulae gibbum musculo liberatum cernitur, qui brachium mouentium sextus habetur, hicque ab
- Q.** insertionem propendens Q insignitur.
- R** Musculus brachium mouentium tertius. **S** Secundus thoracem mouentium.
- T** Musculus cubitum extendentium, qui ab humiliori scapulae costa initium ducit.
- V** In sinistro brachio musculus, cubitum extendentium exterior ab ea sede propendit, qua cum interiori T notato impense coniungitur. In dextro autem brachio propendens ea pars resecta cernitur.
- X** Hac sede ab humero carnea exoritur portio, quam tertij musculorum cubitum extendentium loco habemus, sequenti tabula d notabimus.
- Y** Musculus cubitum flectentium posterior.
- ⊙** Musculus radius in supinum ducens, qui ab humero multo superius, quam externum illius constituit tuberculum, inibi exoritur, ubi a ascriptis, ipsius insertionem b indicantes.
- a, b.** Δ Musculus alter, cuius ope radius in supinum agitur, atque huius initium c indicatur, insertio autem d insignitur.
- c, d.** e Nerua portio, seu insertionis terminus musculi superioris radius in prouum agentium.
- f** Radius. **g** Ulna. **h** Ligamentum radius ulnae, quae inuicem debiscunt committentes.
- i, h** Hanc sedem sinuum uehendis musculis paratorum, & cartilaginis ulnae a brachiali dirimentis nomine, pluribus ornasse characteribus, nisi illa superiori Libro pulchre fuissent obuia.
- l** Hac sede musculis tendinibusque libera, aliter ligamenta, quibus ossa compinguntur, proponi nequeunt.
- m** Postbrachialis os anularem suffulciens digitum, quod ideo priuatim notauimus, ut ossa postbrachialis, ab ipsorum interuallis, musculisque illa occupantibus interstingueres.
- n** Hic musculus reponitur, pollicem indici proxime adducens.
- o** Musculus bicorni tendine brachiale extendens, ab insertionem propendit.
- p** Hic bona transuersi abdominis musculi pars occurrit.
- q** Ilium ossis dorsum nunc prorsus excarne spectatur.
- r** Femoris caput, coxendicis ossis acetabulum subiens ipsum uel ligamentum praesentem ambiens articulum.
- f** Ligamentum a sacro osse in acutum coxendicis ossis processum desinens.
- t, u** Dependet hic tertius femur mouentium musculus, t notatus, una cum quarto, qui u insignitur.
- x** Magnus exterior uel femoris processum.
- α** Decimus femur mouentium musculus, cuius praecipuam partem F notandam, ex decima sexta tabula opportune petes, ad characteres F, G, H. Praesens autem tabula eam musculi partem demonstrat, quae ad peculiarem ipsi in coxendicis osse caelatum sinum restructa, ad magnum femoris ducitur processum.
- β** Musculus gracilis, ab acuto coxendicis ossis enatus processu, elatiorique musculi α insigniti, sedi exporrectus.
- γ** Musculus similiter gracilis, inferiori exporrectus parti eius musculi, quem α notauimus.

≡ Musculus

- Ξ *Musculus femur mouentium quintus. Verum Ξ priuatim notat posteriorem huius musculi partem, cuius caput partim nerueum, ac Δ insignitum, & partim carneum, & notatum, a coxendicis ossis appendice enascitur, hincq; prodeuntium capitum, numero quartum censetur. Hac sede posterior hęc quinti femur mouentis musculi pars, admodum carnea est, veri muris, ut ita dicam, effigiem præ se ferens. ¶ Hic posterior quinti musculi pars, in tendinem degenerat, interiori caputem femoris infertum.*
- Σ, Π Π & Σ, *anteriorē quinti femur mouentium musculi indicant partem, ac Π quidem eius partis posteriorem portionem, Σ uero anteriorem. Quo autem hæc non admodum sanè obuia promptius percipias, eosdem illos Græcorum maiusculos characteres in sequenti tabula repositurus sum, illic dependentes musculi partes notans.*
- Musculus tibiā mouentium septimus.*
- κ, κ *Musculus tibiā mouentium octauus.*
- λ *Ampla depressaq; femoris ossis sedes, supra radicem inferiorum ipsius capitum, posteriori in se de consistens.*
- μ, ν *Quartus tibiā mouentium musculus, hic ab insertione pendens, ac μ quidem partem illius indicat, a coxendicis osse enatam, ν uero partem, cui femur principium præbet.*
- ζ *Tibiā mouentium quintus musculus.*
- φ *Primus pedem mouentium musculus.*
- Υ *Secundus pedem mouentium musculus. Cæterum huius musculi (ut & primi) principium partim carneū, ac ω insignitū uisitur, partim nerueum, ac ρ indicatū. τ autem sedes significatur, ubi primum duo isti primi pedem mouentium musculi contigui sunt. s. Hactenus musculi illi in sura extuberant, hicq; carnei esse desinunt, uerum hæc tubera nona tabula etiam accuratè exprimuntur. u. Tendinis, qui è duobus præsentibus musculis educitur, principium.*
- ω *Initium musculi pedem mouentium tertij, cuius tendinem proponit character &, in sinistra pos. situs tibia.*

D E C I M A E T E R T I A E M V S C V


LORVM TABVLAE, QVAM SEQVENS

pagina proponet, characterum Index.

A, B, C, D, E, F, G *Dextra portio secundi caput mouentium paris, in quò singuli characteres aliquid priuatim insinuant. A enim indicatur musculus secundi paris, acuto principio ex transuersis quintæ & quartæ thoracis uertebraarum processibus enatus. B musculi huius sedes, qua carneus esse desinit, ac uelut in tendinem degenerat. Porro B quoq; musculum significare debet, qui à septimæ ceruicis uertebrae spina enascitur, & cum musculo A insignito commiscetur, congressus autem sedi, C inscriptum est, quod non modo congressum utriusq; musculi notabit uerum etiam ubi uterq; exactè carneus efficitur. D utriusq; musculi insertionem notat. E secundi paris tertius in altero latere musculus indicatur, cuius etiam principium in alto latitat, insertionem interim ipsius ad F conspiciua. Postremo G ac G, secundi paris carnea moles insignitur.*


- H *Musculus dorsum mouentium quintus.*
- I *Portio musculi dorsum mouentium sexti.*
- K *Decimus quintus dorsum mouentium, seu eorum musculorum octauis paris alter.*
- Γ *Vndecimus dorsum agentium musculus, cuius principium à sacro osse pendens L insignitur, ipsius uero ansule tendines uel M, M. Atq; ita elatissimum M, præsentis musculi superiorē rem significat terminum.*
- z *Character z loco N positus, musculum dorsum mouentium nonum indicat, seu quinti paris alterum.*
- O, O *Musculus hic ab exortu propendit, thoracem hominis mouentium quartus, simiarum uero carnumq; septimus.*

DECIMA
TERTIA
TABVLA.



- P, P** Hæ costarum asperitates, earum tubercula referunt, in quæ quartus thoracem mouentium musculus inferebatur. Quod autem ad costas, earundemque interualla attinet, eadem hic atque in aliis quot præcedentibus tabulis est ratio.
- R** Scapula posteriori parte prorsus excarnis.
- V** Tertium ligamentum peculiare articuli humeri.
- X** Dependet musculus brachium mouentium quintus.
- Y** In utroque brachio posterior humeri pars, excarnis prorsus, musculis que libera cernitur.
- a** Posterior cubiti flexentium musculus.
- b, c, d** Musculi cubiti extendentes. Ac b is insignitur, qui ab humiliori scapulæ costa initium ducit, e ille, qui ab humeri capitis ceruice exoritur, d autem carnea pars, quæ ab humero, ad medium ferè longitudinis eius originem sumit.
- e** Radius.
- f, g** Musculus radium in prouum ducentium superior, cuius insertionem priuatim g insigniuit.
- h** Dependet hic musculus, radium in supinum mouentium breuior.
- i** Vlna, radium autem e superioris notat. k autem, ligamentum in utroque cubito indicat, radii ulnæ tota ea sede colligans, qua hæc ossa inuicem dehiscent. Quod uero ad brachialis postbrachialisque ac denum digitorum ossa spectat, omnia hic præcedentibus correspondent tabulis. Verum musculum hic resecuimus, pollicem indicis proxime adducentem. Ac in sinistra manu tres conspiciuntur musculi, secundum pollicis internodum flexentes, characteribusque 1, 2, 3 insigniti. Insuntur musculi primum indicis os inrorsum flexens, hic priuatim l indicatur.
- m** Ilium ossis dorsum, quemadmodum et coxendicis ossis exterior sedes, prorsus excarne occurrunt.
- n** Coccyx quoque os excarne, seu musculis ipsi adnatis liberum cernitur.
- o** Ligamentum a sacro osse, coxendicis acuto processui insertum.
- p** Femoris caput.
- q** Magnus exteriorque femoris processus.
- r** Hic ab insertione propèdet decimum femur mouentium, internam ipsius sedem, quæ ossibus undique attèditur, demonstrans. Atque ita s, t, u huius musculi tendines notat, qui ad coxendicis os reflectuntur.
- u, v, z** Tribus his characteribus, carnea indicatur pars, uaginæ quasi modo decimum femur mouentium musculum inibi deducens, quæ ad coxendicis os reflectitur. Atque ita x huius carnosæ partis supremam indicat sedem, y mediam, z autem infimam.
- a** Portio femur mouentium noni.
- β, γ** In dextro femore due musculorum notantur insertiones, in paruum femoris facili processum. Ac β quidem insertionem indicat musculi femur mouentium sexti, γ autem musculi femur agentium septimi.
- δ, δ** Musculus tibiam mouentium octauus, uniuersum femur propemodum ambiens.
- ε, ε** Aspera femoris indicatur linea, cui quintus femur mouentium musculus inseritur.
- Π, Σ** Quintus femur mouens musculis, ab interno femoris capite propendit, in quo Π posteriorem ipsius notat partem, Π uero Σ anteriorem. atque hic rursum priuatim Π posteriorem indicat portionem partis anterioris, Σ uero anteriorem portionem.
- Φ** Musculus in pedem mouentium classe tertius enumeratus, ac principium Φ indicatum a femoris externo ducens capite, tendinem autem illic educens, ubi Ξ insignitur.
- η, η** Musculus, quem in poplite latitantem uocamus.
- Υ** Quartus pedem mouentium musculus, cuius initium θ indicatur, ipsius autem sedem, qua tendo duorum primorum pedem mouentium musculorum, illi primum pertinacissimè adnascitur, η notauimus.
- θ, κ** η uero tendinis insignitur insertio, qui è duobus illis primis pedem mouentibus et tertio consurgit.
- μ** Hac sede tibie os excarne conspicitur, quemadmodum et magna portio exterioris capitis duorum humiliorum femoris capitum.
- ν** Tendo musculi pedem mouentium octauum.
- ξ** Tendo septimi pedem mouentium.
- Ω** Præsenti caractere indicat a uolui figuram, ad dextrum integri hominis hac decimatertia tabula expressi crus repositam, lapidique innitentem, quo tandè inferior pedis sedes oculis subiiciatur, et sectionis serie musculi in hac apparentes, sensim in sequentibus tabulis proponantur. Significetur itaque primum ω ligamentum, seu membrana substantia, primo digitos mouentium musculo obnatam, latique tendinis uicem in planta subeuntem.
- ς** Musculus pollicem a cæteris digitis inrorsum abducens.
- ς** Musculus abductionis parui digiti a cæteris opifex.
- τ, τ** Primus secundusque pedem mouentium musculi, in integro quidem homine a quarto pedem mouen-

DECIMA
QVARTA
MVSCVLO-
RVM TA-
BVLA.



tium propendentes, in illa autem figura, quam Ω proponit, sua sede repositi.

ν Tendo tertij pedem mouentium musculi.

ϕ Portio quarti pedem mouentium musculi, quem in integro homine Ψ insignitum cernis.

χ Tendo ex primo, secundo & quarto, pedem mouentium musculis conflatus, calciq; insertus, quã ϕ hic priuatim cavitatem proponat, inter anteriorem præsentis tendinis partem, & posteriore sedem aliorum musculorum conspicuam, qui hanc tibiæ sedem occupant.

ψ, ω Excarnis nullisq; musculis, uel ante sectionem obiecta tibiæ ossis pars.

* Hic portiones occurrunt musculorum, qui posteriorem tibiæ sedem sibi uendicant, præter tres primos pedem mouentium musculos.

DECIMAEQVARTAE MVSCVLORVM TABVLAE CHARACTERVM INDEX.

H A E C tabularum posteriorem corporis faciem exprimentium ultima est, scapulis & brachijs carens, et genua flectens, ut plantam altero crure spectandam proponeret. Ad genua uerò ne alia quæpiam integra delineanda esset tabula, caput una cum duabus primis cervicis uertebis reponitur, quartum musculorum caput mouentium par ostensurum.

A, B. Tertium musculorum caput mouentium coniugium, à secundæ cervicis uertebra spina occipiti insertum.

C Mamillaris temporum ossis processus, tam in integra figura, quàm illa quæ ad genua spectatur, conspicuus.

D Hic character cum aliquot subsequentibus, figuræ ad genua locatæ proprius est, transuersum primæ uertebrae cervicis indicans processum.

E Spina secundæ cervicis uertebrae, atq; ita etiam *E* secundam cervicis denotat uertebam.

F, G Quartum caput mouentium musculorum par, à prima cervicis uertebra, occipiti insertum.

H, I In ceruice integrioris figura insinuat, quintum par musculorum caput mouentium, quod ab occipitio in transuersos primæ cervicis uertebrae processus implantatur.

K, L Sextum musculorum caput mouentium par, à spina secundæ uertebrae, transuersis primæ processibus insertum.

M Musculi scapulam mouentium tertij pars, illic conspicua, ubi à transuersis aliquot cervicis uertebrae processibus prodit.

N Dorsum mouentium musculorum tertius. \circ Dorsum mouentium septimus musculus.

P Character *P* in lumbis reponitur, notans nonum dorsum mouentium musculum.

Q Undecimus dorsum mouentium musculus, hic ab ultima ipsius insertione pendens, ac sinum *R* in *R, S.* signitum ostendens, quo decimotertio dorsum mouentium musculo cedit, ipsius autem principium *S* indicatur.

T Decimustertius dorsum mouentium musculus, cuius principium *V* notatur, finis uerò *X*, quod *V, X.* etiam principium decimi quinti dorsum mouentium musculi indicat.

Y Decimus quintus dorsum mouentium, cuius superius extremum *a* insignitum sub septimo dorsum *a.* agentium reconditur.

Hanc decimam quartam musculorum tabulam, propter thoracis formam, costarumq; ductum sedulo intueri operæ precium erit, quum costarum ductum, ut & reliquæ musculorum tabulæ, appositissime ostendat. In ossium autem compage hætenus nunquã costas adeo concinnè inuicem adnexui, ut illæ naturalis situm, quod ad obliquum ipsarum ductum spectat, nanciscerentur. Nimis enim ingens interuallum, inter elatissimam ossis illiū sedem, & duodecimæ thoracis costæ mucronem, in ossium cōpactione mihi semper relinquitur. In musculorum autem tabulis, costarum ductū inter pingendum obseruare fuit promptissimum, quum in suo naturali situ tota sectionis serie semper consistant, quin etiam exteriores intercostalium musculos hic quoq; se spectandos offerre, etiam me tacentē, neminem latere arbitror. Atq; ita etiam ilium ossa, & coxendicis & pubis & femoris ossa adeo sunt conspicua, ut si hic notas desideres, illa à tribus integris Primi libri figuris petendæ ueniant. Quamquam in pubis ossis *b* occurrit, membranam indicans in pubis ossis foramine obuiam.

- c Musculus sextus femur mouentium, ab insertione propendens.
 d Musculus septimus femur mouentium.
 e Hic musculus propendet femur mouentium nonus.
 f, g Carnea pars, seu suoles, priuati musculi, decimum femur mouentem musculum deducentes, atq;
 hic ab insertione pendentes.
 Γ Musculus quem in poplite latitare dicimus, cuiq; Galenus fere totū poplitis flectendi munus per
 h, i. peram concedidit. h ipsius ab externo femoris capite exortus, i insertio eiusdem in tibia os
 insignitur.
 k, h Septimus pedem mouentium musculus.
 l Tendo octauū pedem mouentis musculi, cuius insertio in pedij os paruum sustinens facta, m in-
 m. signitur.
 n, o, p, q A sinistri pedis calce quatuor humi prostrati pendunt musculi, pedis motorum opifices. n enim et
 r, o, duos primos pedem mouentes insinuant, p autem tertium, q uero quartum. Ceterum r ad
 dextri calcis internum latus repositum, tendinis illius insertionem indicat.
 Δ Δ Figuram notat, externo lateri integrioris figuræ dextri pedis hic appositam, quæ sectionis se-
 rie dextrum integrioris figuræ pedem subsequitur, qui succedit figuræ, quam in præcedenti mu-
 sculorum tabula Ω indicabamus.
 f Ligamentum pedis, à digitorum terminis pendet, quod musculo secundos quatuor digitorum ar-
 ticulos flectenti, ⊙ hic notato obnatum fuerat, latiꝫ in extremæ manus uola tendinis uicem
 gerebat.
 t Dependet musculus, pollicem à cæteris digitis abducens.
 u Musculus hic à sua insertione dependet, qui minimum digitum à reliquis in externum latus ab-
 ducit.
 ⊙ Musculus secundum quatuor digitorum os flectens, x ipsius principium à calce enatum, æ illius
 x, æ. in quatuor tendines partito. Ceterum qua ratione huius musculi tendines diuidantur, subditosq;
 transmittant tendines, in hoc dextro maioris figuræ pede expressum habes, ut tamen sese hæc of-
 ferant, attentissimis oculis internam quatuor digitorum sedem intuebere, quanquam et figura Δ
 notata, hæc etiam commonstret, in qua musculus ille ab insertione propendens, ⊙ quoque insi-
 gnitur.
 β Carnea hæc moles illa est, cuius beneficio primum pollicis internodium flectitur, atq; hæc eodem
 β indicata, in figura illa dependet, quam Δ insigniui.
 Λ, Δ, Λ Musculus secundum pollicis os flectens. γ in dextra tibia huius musculi notatur principium.
 γ, δ. A hac sede præsens musculus, ab interno ipsius latere tendinē educit, qui in carnea ipsius substan-
 e. tia aliquosq; incæperat, iuxta characterem ε. Deinde utraq; figura plantam referens, tendi-
 nem hunc quoq; δ notatū habet, quā pollicis iam est proximus.
 Ξ, Ξ, Ξ Musculus quatuor digitorum tertium os flectens, ζ ipsius principium aliquantisper altius ad-
 ζ. huc, sub musculo in poplite latitante, ac Γ notato. η tendo illius, ab interno etiam latere car-
 θ. nœ suæ substantiæ enatus, atq; in pedis planta in quatuor alios tendines inibi, ubi θ occurrit,
 diuisus, qui quatuor digitis postmodum offeruntur.
 κ, κ Hic sese ostendit portio musculi, quem inter pedis motores quintum numeramus.
 λ Musculosa caro, quæ in quatuor portiones deducta, tendinibus exporrigitur, qui tertium qua-
 tuor digitorum os flectunt. Est autem musculosa hæc caro, cuius opera quatuor pedis digiti ad
 pollicem ducuntur. Vt uero et tendines illos, et portiones has musculosæ substantiæ accuratiū
 v. cognoscas, tendinem tertium indicis os flectentem, v notatum conspicias, musculum autem indicem
 μ. pollicis adducentem, μ.




DVARVM DECIMAEQVINTAE MVSCVLO-
RVM TABVLAE FIGVRARVM, EARVN-
demque characterum Index.

D V AE praesentis tabulae figurae in ea effigie seruantur, in qua dextra tibia simul cū pede decimae quartae tabulae sese exhibuerunt. Aeq. prior figura in sectionis serie figuram sub sequitur, quam praecedens tabula Δ notatam ostenderat. Posterior autem huius tabulae figura, succedit priori. Notae autem harum figurarum ita se habent.

- A* 1 Tibiae os.
- B* 1 Fibula.
- C* 1 Musculus dependet, qui in poplite latitat.
- D, E* 1 Musculus quintus pedem mouentium, ac *D* quidem ipsius notat principium, *E* uero tendinem, ab interno musculi latere pronatum.
- F* 1 Sinus cui tendo insidet, secundi pollicis internodij flexionis opifex.
- G* 1 Sinus quo tendo uebitur musculi, tertium quatuor digitorum os flectentis.
- H* 1 Musculus pedem mouentium septimus.
- I* 1 Musculus pedem mouentium octauus.
- K* 1 Insertio sexti pedem mouentis musculi.
- L* 1 Musculosa congeries, primum quatuor digitorum os flectens.
- M* 1 Ossicula ad primum pollicis internodium reposita, quae à sesami seminis imagine nomen inueniunt, quaeq. ab Arabibus dimidiati ciceris formae assimilantur.
- N* 1 Pendet hic musculosa substantia, quae singulis quatuor digitorum internis lateribus porttionem exporrigit, digitos pollicis adducentem.
- O* 1 Musculus pollicis secundum os flectens.
- P* 1 Musculus tertium quatuor digitorum os flectens.
- Q* 1 Portio tendinis, secundum pollicis internodium flectentis, illi tendunt commixta, qui indicis tertium internodium flectit. Sequentes modò characteres, sinistrae figurae hac ratione peculiare sunt.
- R* 2 Tibiae os.
- S* 2 Fibula.

- T* 2 Ligamentum membranicum fibulam tibiae ossi illic committens, ubi haec ossa inuicem dehiscent.
V 2 Musculus pedem mouentium septimus. *X* hac septimi musculi tendo, sub osse cubi tesseram ue
X, Y imitante reflectitur, & latefcit quoq. *Y* tendinis huius in os pedij pollicem sustinens insertio.
a 2 Musculus sub septimo occultatus, & pedem mouentium octauus, cuius insertionem *b* notat, quae
b in pedij os paruum suffulciens digitum perficitur.
1, 2, 3 Tribus his characteribus in posteriori sinistra ue figura, tres sinus indicantur, musculis à poste-
 riori tibiae sede inferiora pedis subeuntibus exsculpti. Atq. 1 sinu notat, quo quinti pedem mouen-
 tis musculi tendo uehitur, 2 sinum tendini tertium, quatuor digitorum os flectenti insinuat. 3 ue-
 ro, sinum indicat nomine tendinis caelatum, cuius beneficio secundus pollicis articulus flectitur.
c 2 Musculus dependet humi quintus pedem mouentiu, in priori figura *D* & *E* notatus, ac in secun-
d da figura ad insertionem *d* insignitus.
c 2 Musculosa moles, primum quatuor digitorum os flectens, hic pendet à pedij ossibus, quae iam nu-
 da ex carneq. spectantur.



DECIMASEXTA
 MUSCULORVM
 TABVLA.

PRÆSENTEM tabulam li-
 cuiſſet ſtatim tertiæ musculorum tabulæ ſub
 ijcere, ſed quoniam corporis duntaxat pars
 exiſtit, huc eam reponere magis uſum eſt,
 qua ſiniſtri femoris, tibiae, pedisq. interna ſu-
 cies nullo liberata musculo exprimitur, unâ
 cum oſſe ſacro, & oſſe ſiniſtro ipſius late-
 ri commiſſo, ut decimus femur mouentium
 musculus alicubi in conſpectum ueniret, qui
 in integris tabulis ea parte conſpici nequi-
 uit, quæ internam pubis oſis & coxendæ
 cis quoq. ſedem occupat. Huius autem
 tabulæ characteres, ut ſe-
 quens pagina proponit,
 ſe habent.

A Os

- A* Os sacrum.
B Os is sacri latus, cui sinistrum ilium os committebatur.
C Ligamentum à sacro osse, in coxendicis ossis appendicem pertinens.
D Sinistri pubis ossis pars, quæ dextro pubis ossi committebatur.
E Notatur quartus femur subiens neruus.
E, F, G Decimus femur mouentium musculus, cuius tres ueluti partes, *E, F, G* insignitæ, in scripti-
H bus quodammodo distinguuntur, quibus ab interna pubis ossis sede, & interna quoque coxendi-
 cis ossis regione, musculus iste carneus pronascitur. Ad sedem uerò *H* indicatam, musculus
 arctior redditur, & ad sinum sibi in coxendicis osse insculptū reflexus, ad magnum femoris per-
 fertur processum.
I Conspicua est portio, sexti femur mouentis musculi.
K Portio septimi femur mouentis musculi.
L Primus tibiæ mouentium musculus, cuius sedes, quæ iuxta internum femoris caput, in tendinem
M cessat, *M* indicatur.
N, O Secundus tibiæ mouentium musculus. *N* & *O* musculi huius principium ab ossis pubis com-
 missura pronatum. *M* quoque & si in primo ponatur musculo, huius secundi musculi etiam sedem
 notat, quæ in tendinem desinit.
P Nonus musculus tibiæ mouentium, parua ipsius portione hic conspicuus.
Q Octauus tibiæ mouentium musculus.
R Tertius tibiæ mouentium musculus, cuius tendo, quemadmodum & primi & secundi, tibiæ mo-
 uentium musculorum quoque *M* indicari potest, & promptissimum etiam est intueri, ubi nam mu-
 sculorum tendines, in anteriorem tibiæ ossis sedem inferantur.
S, T Quintus femur mouentium musculus, uerum *S* posteriorem eius musculi partem notat. *T* au-
 tem quinti femoris musculi anterioris partis posteriorem indicat portionem.
V, V Quintus tibiæ mouentium musculus.
X, Y Excarnis tibiæ ossis pars, uerum *Y* interiorem notat malleolum.
a Primus pedem mouentium musculus.
b Secundus pedem mouentium musculus.
c Tendo tenuissimus, idemque summè gracilis, qui à tertio inter pedis motorum musculo educitur.
d Musculus suram constituentium maximus, pedemque mouentium quartus.
e Musculus quatuor pedis digitorum tertium os flectens.
f Portio musculi inter pedem mouentium quinti.
g Tendo sexti pedem mouentium musculi.
h Tendines digitos extendentes.
i Musculus pollicem à cæteris digitis introsum abducens.
 Absolutis itaque sedecim musculorum tabularum (quas in præsentis Libri initio collocandas du-
 xi) indicibus, proximum modò erit Capitulum contextum aggredi, ac à ligamentorum natura ini-
 tium sermoni statuere.

QVID LIGAMENTVM, AC QVIS ligamentus & differentia. Caput I.

FIGVRA sequentem paginam occupans, & omnem propemodum ligamenti diffe-
 rentiam semel commonstrans, uniuersum femoris os exprimit, unà cum tibiæ osse & fibula, qui-
 bus ea ligamenta adhuc connata hærent, quæ primi Capituli contextu intelligendo subseruiunt.

- A, B, C, D* Femoris os.
B Femoris ossis caput sinum coxendicis ossis subiens.
C, D Femoris ossis humiliora capita, quæ tibiæ articulantur.
E, F, G, H Tibiæ os.
F Eminens superioris appendicis tibiæ ossis processus, qui sinum subingreditur, quem duo humi-
 liora femoris ossis capita efficiunt, & qui ligamentum mox *X* insinuandum educit.

G Sinus

- G Sinus inferioris appendicis tibiae ossis, quo complures ueruntur tendines eorum musculorum, qui anteriorem tibiae sedem occupant.
- H Interior malleolus.
- I, K Fibula, uerum K exterior malleolus priuatim insignitur.
- L, M, Musculus notatur in sura maximus, pedemque mouentium quartus, atque inter reliquos corporis musculos intensissime liuens. Verum M huius musculi tendinem, calcis ossi insertum, particulatim indicat. N autem portiunculam tendinis primi et secundi pedem mouentium musculorum ostendit, quae quarto pedem mouenti musculo connascitur, ac simul cum illo unita, calci inseritur.
- O Tercis ligamentum, femoris os coxendicis ossi iungens.
- P, P Ligamentum orbiculatim femoris cum coxendicis osse articulum amplectens.
- Q Ligamentorum portiones, ex magno externoque femoris processu in musculorum substantiam absumpta, ac potissimum in tibiae mouentium septimi.
- R Portiunculae ligamentorum quoque, a radice interioris minorisque processus femoris pronatae, et in octauum tibiae mouentem musculus praecipue degenerantes.
- S, S Membrancum ligamentum, reliquis etiam omnibus articulis commune, quod uniuersum genu articulum ambit, ea tantum parte excepta, cui mola praepositur.
- T Ligamentum genu articulo proprium, quod externo ipsius lateri attenditur.
- V Ligamentum hoc, etiam genu articulo peculiare censetur, atque externo ipsius lateri attensum uisitur.
- X Ligamentum ex tibiae ossis processu F notato, in femoris os insertum.
- Y Ligamentum superiorem fibulae partem, tibiae ossi connectens.
- Z Ligamentum inferiorem fibulae partem, tibiae alligans.
- a Membrancum ligamentum, fibulam tibiae ossi toto ductu, quo inuicem haec ossa dehiscunt, committens.
- b, c Hic ligamentum notatur, tendines anuli ritu amplectens, qui a tibiae anteriori sede, in pedis superiora porriguntur. Ut uero ipsius natura exactius oculis subijceretur, id sectione secundum longitudinem ducta, diuisum, atque una parte in latus reflexum finximus.
- d Ligamentum a tibiae osse ad calcem insertum, et tendines hac ad pedis inferiora descendentes continens.
- e Ligamentum a fibula ad calcem porrectum, et tendinibus hac pedis inferiora petentibus obductum.
- f Ligamentum cartilagineum, ab interno malleolo, in tali internum latus insertum.
- g Ligamentum quoque cartilagineum, fibulam talo colligans.
- Huc sane et tabulam retulisse praesentis Libri trigesimo Capiti proponendam, quae prima ceruicis uertebrae ad secundam, et prima secundaque ad caput connexum exprimit, nisi quam modo proposui, ut cumque omnem ligamenti differentiam et usum monstraret.



CAPITULUM
PRIMI
figura.



RIMVS Liber omnia, quæ ad humani corporis ossium cartilaginumq; enarrationem spectare duximus, enarrauit, præsens uero ossium cartilaginumq; ligamenta, & ea mouentes musculos prosequetur. Ossium enim & cartilaginum natura primum fuit perdiscenda, & post illa mox ad ligamentorum musculorumq; concisionem properandum, quando quidem hæc corporis partes, cæteris omnibus ueluti fundamenta ac bases subijciuntur. ^a Ligamentum itaque, quod nerui generatim dicti nomine comprehendimus, Græcisq; *συνδεσμος* nuncupatur, proprio, non autem communi significato, corpus est simile ex osse aut cartilagine, aut quauis duriori membrana principium ducens, omnis propemodum sensus expers, durum, sed tamen cartilagine mollius, album, uariosq; in colligando, continendo, obtegendo, & musculis constituendis homini usus præstans. ^b Nisi enim ossium & cartilaginum articuli, ligamenti tenerentur, nihil sanè prohiberet ossa, aut cartilagine in quolibet motu luxari, & à sua naturali sede alia aliò permutata egredi.

Quid ligamentum.

Ligamentum - riuus in colligando.

Ligamenti substantia.

Ligamenti in tendinibus continendis usus.

Quod ne contingat, summus rerum opifex Deus omnes ossium cartilaginumq; articulos ligamenti circundedit, ualidis quidem, at remissionis interim, tensionisq; non parua capacibus. Miranda profectò est Creatoris industria, qui ex coarticulatis inuicem ossibus, corporis substantia enasci uoluerit, cuius beneficio ossa simul ad amissum tutòq; colliguntur, & articulata contineantur, neque promptè per uolentos motus à se inuicem rumpantur, quodq; demum hæc substantia ex continuo, ualidisq; motibus, noxæ suscipiendæ contumax, ob duritiem euaserit. Porro ut ossa cartilagineq; à musculis tracta ocyus sequantur, mollè rursus ligamenti substantiam confingi oportuit, atq; hæc ratione inualidam. Atqui contrarium est ualido & duro, infirmum, debile ac molle. Quæ fuerit igitur rerum Opificis solertia, qui corpus quoddam fabrefecit, usus & naturæ utriusq; abunde compos, & ab iniurijs remotum, ex humanæ fabricæ refectione discas, integrum est. Comperies enim omne ligamentum adeò durum, ut tutò simul colliget, & quantum suo articulo ex usu est, illum moueri non prohibeat, neq; facile abrumpatur, atq; hic præcipuus primariusq; ligamenti usus est, à quo etiam nomen mutuatur. Nam ligamentum ex osse in os (ut humeri & genu articulo ligamenta) aut ex cartilagine in cartilaginem (ut laryngis cartilagine mutuo necessitudine) aut ab osse in cartilaginem (ut quæ costarum cartilagine pectoris ossi committunt) insertum, commissuram ossium ac cartilaginum commune uinculum efficitur, hoc solo nomine, ut illa inuicem colliget, siue hæc manifesto siue ob-

scuro, & qui uix perpendi possit, motu agantur. ^c Secundo usu ligamentum, tendines suis, quibus uehuntur, sinibus continet, ne ex ipsis declinent, aut ab illis eleuentur. huius autem generis ligamenta in homine esse quàm plurima, in manus pedisq; musculorum enarratione docuimus. In externa namq; cubiti sede, quæ brachiale illi articulat, eius classis ligamenta ^d sex uidentur, in interna autem brachialis regione ^e unicum & perquam ualidum, deinde etiam in interna digitorum manus ac pedis sede, unicum in tota ferè ipsorum longitudine consistit. In anteriori uero tibiæ sede, quæ pedi articulat, unum quoque est amplum & ualidum, & ^f alia deniq; inter tibiæ & calcem, ac inter fibulam & calcem obseruantur, quæ omnia in hoc præcipue creata sunt, ne tendo in musculi contractione è proprio sinu assurgat. Nisi enim huiusmodi ligamentum anteriori tibiæ sedi iuxta pedem præpositum, inter reliquos, quibus uia præbet, tendines, illos qui digitorum extensionis authores sunt, transmitteret, & cōtineret, quoties digitos tenderemus, tendines illi antrosum à tibiæ & pedis articulo prominere nihil minus facerent, q̃ si funiculū uni digito alligatum ad genu usq; protēderes, illoq; digitum eleuare, conareris, funiculus namq; ille uersus genu attractus, plurimū à pedis cū tibiæ articulo abscederet. At si aliū funiculū transuersum in sinu tibiæ sedi obligaueris, atq; sub illo, eū quo digitū extendi uolebā, traduxeris, funiculus ille rectus, etiā si, pertrahatur, nō amplius à tibiā abscedet, & tibiæ pediq; transuersi uinculi occasione toto ductu exporrectus, digitū eleuabit. Atq; hæc Naturæ solertia aurigas imitari intuemur anulis illis, quos equorum iugis cōnectunt, ut habena obligiorum panulū traiecta, equos, quibus nō insident, opportuniùs reflectat. Quia uero ligamenta hæc perinde, ac ille anulus habent, transuersim tēdinibus obducuntur, aut potius orbiculatim amplexantur, Græcis *γυαγια* fuere nūcupata, nos autē illa nūc Transuersa, nūc Anularia appellamus. Interior eiusmodi ligamentorū superficies anulis, p quos funes trajecti-



undiq; in figura Capiti huius inio preposi ligamentum occurrit. O.P.S.T.

tab. char. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

tur, penitus respondent, est enim ut plurimum, ut et ipse tendo, secundum cauum orbicularis, laevis, & uelut uiscido humore ceu sinegmate quopiam perfusa. Quippe haec ligamenta non solum tendinibus extrinsecus obducuntur, uerum etiam uelut stratum ipsis sunt. ipsa namque ossis duritiem correctura, inter os & tendines sese insinuant, undiquaque in orbem tendines, contra omnem prorsus connexum amplexantia, & ut anulus habenam, transmittentia. Horum ligamentorum ordini ascribende sunt membranae, transuersim alicui integræ musculorum congerie obductæ, ne illi inter se implicentur, suâ uesede aberrant. huiusmodi enim membranas in tota cubiti, femoris, & tibiæ longitudine musculis præesse recensuimus. Insuper & transuersum primæ ceruicis uertebrae^h ligamentum, dentem in suo sinu continens, ac ne ille aliquando dorsalem medullam cõprimat, instar ualli prohibens, in horum quoque numero recenseri potest. Rursus nisi ridiculos et fictos penitus arbitraret cerebelliⁱ processum, qui uermibus comparantur, motus, inter hæc ligamenta quoque connumerarem, tenuis cerebri membranae partes, quæ anteriore cerebelli sedē cerebri^h naibus, & posterioreⁱ dorsali medullæ cõnectunt. Quandoquidem illas membranae partes Tendinū nomine Galenus dignatus est, arbitratus illas in hoc formatas esse, ne processus uermium modo conficti à sua sede reclinantur. Verum quam his processibus nullum peculiarem motum tribuo, ne utique tenuis membranae partes illorum motibus præesse concedam, sed huc quoque referam membranas, seu ligamenta potius ex ossibus pronata, & quosdam ossium si nus ideo succingentia, ut, & si musculi tendinē uel sinui in cubentem, anuli modo orbiculatim non amplexentur, nihilominus tamen sinui ita subungant, & uiscido quoque humore sic oblinentur, & laeua sint, ut pinguis rotulae modo, musculi & tendinē sibi superuehi sinant, & quomius is atteratur, præstent. Reperies autem non sine summa uoluptate huiusmodi ligamentum, in posteriori coxendicis ossis sede sinui obnatum, ad quem musculus reflectitur, qui internā pubis ossis sedē occupans, femur extorsum circūagitur, deinde etiā in superiori coxendicis ossisⁱ regione, quā duo musculi descendunt, primarij femoris flexus opifices. Huc quoque spectant ligamenta, cartilaginea ligamentorum naturā seruantia, quæ acetabulorumⁱ & ossis sinui cavitatē augent, cuiusmodi ad coxendicis sinus supercilium obnaescitur. Et fortassis huc reponendæ essent ligamentosa^e cartilagineae, quas in genu articulo, & in humeri ad scapulas articulo haberi in Primo libro retulimus. Videtur namque et genu cartilaginibus Galenus Ligamentorum nomē indidisse, licet ad colligationē nimis quam parū conducāt. Porro tertius ligamentorum usus censebitur, quo illa instar indumentī & propugnaculi, corporibus quibusdā obducuntur, in quorum albo inprimis omnia secūdi usus ligamenta cõprehendimus, & priuatim mucosae quasdā membranas, tendinibus tunicae ritu circūdatas, cuiusmodi in manu præcipue obseruatur. Tendines enim musculorum, qui ex cubito ad digitos procedunt, membranis proprijs obteguntur, & potissimum ea tendinū portio, quæ in brachialis sinu, & manus uola, ad digitorum usque radices habetur. Cæterum hæc membranae à tendinibus, ipsisque musculorum peculiaribus membranis potius, quam ab ossibus principium ducunt, unde etiā membranae ordini non ineptè ascribuntur. Quandoquidem si huius generis membranas inter Ligamenta cum Galeno enumerauerimus, reliquæ propemodum corporis membranae huc quoque referentur, quoniam quibusdā obducuntur corporibus, & uelut uincula eorum existunt. Essent autem ex harum numero, peritonaeum præcipue, membrana costarum succingens, intersepientes thoracis cavitatē membranae, dura cerebri membrana, una cum omnibus, quos educunt, processibus. Non enim minus hæc membranae ab ossibus, quam cætera ligamenta, enasci cõspiciuntur, & interim in se aliquid colligant, continent, et amplexantur, proximisque ossibus a stabiliunt. Quartus etiā ligamentorum usus haberi poterit, quo septi alicuius ac interstitij uice illa musculi intercedunt, & musculis duris ossis modo renibus præbent, cuius notæ ligamentum illud profecto est, quod inter ulnā radiūque secundum cubiti longitudinē porrectum musculi internam cubiti sedē occupantes ab exterioribus interdiuidit. Deinde quum musculi huic ligamento attentis, ut os ipsis conceditur moueant, in se contrahuntur, tunc ligamentum id ipsis firmamentum offert, ab quo quoque non æquē ualida eorundem fieret functio. Huius etiā generis illud est, quod tibiæ fibulam membranae cuiusdā ualidioris ritu, ubi in uicē ossa hæc dehiscunt, connectit, postmodum præter ligamentum spinarum interuallum occupans, & dextros musculi à sinistris dirimens. his quoque adnumerari possent membranae, quæ pubis ossium foramina occupant, musculosque anteriori foraminum sedi attentos ab illis, qui posteriori cõmittuntur, quasi ossis modo discernunt. At quintus ligamentorum usus ne utique infimus est, in huius enim ordine ea ligamentorum portio reponenda uenit, quæ musculi constitutionē ingreditur, musculi quoque non infimā substantiā suppetit. Quia autem ratione serieque id fiat, sequenti Capite, quod musculorum constitutionē enarrabit, opportuniū prosequemur. Hic uero suffecerit addidisse, musculi etiam ad ossium cartilaginūque colligatio nem plurimum auxiliari, quia capite suo ex uno osse, aut cartilagine principium ducit, & ipsius sine in aliud

Lib. 8 de Vfu
par.

Ligamenta
aut membranae
sinibus obdu-
ctæ, ad quos
musculi reflect-
untur.

Ligamenta,
ossium ac et
bula augen-
tia.

Li. 2 de Ad-
mi. sectio.
Vfus ligamē-
torum, quæ in
se ut propu-
gnaculi sunt.

Lib. 1 de Ad-
mi. dissect.

Ligamento-
rum usus, quæ
instar intersti-
tij sunt.

Ligamento-
rum usus, quo
musculi con-
structionem
subeunt.
Quæ ligamen-
ta unicuique tan-
tum præstant
usum, quæ plu-
res.

h fi. cap. 3.
K.
i 12 fig. li.
B.D. c. d. E.
l.

h 10 fi. li.
E. F. G. H.
l 9 fi. lib.
H. aut E. a.
H.

m specifi-
tabulae a. b.
7. dein 13 ta-
fi. 12, 13, 14
z.
n 1 fig. ca-
29 lib. i. T.
o 8 ta. o. A.
p 8 fi. cap.
31. lib. 1.

q 4. tabula
manus uo-
la.

Has ostē-
dunt prio-
res figure.
5, 6, 7 libe-
rum.

r 7 tab. V.
dem 3, 7.

stuius ca-
fi. a.
114. 12. b.

u 2 R.
1. ca. 2. C.

in alios, uel cartilaginem implantatur. Atque hac ratione ligamentorum usus commiscere promptū erit. Sunt enim primi duntaxat usus omnia, quæ femoris os coxendicis ossi, & tibiæ femori colligant. nullum enim aliud homini quàm colligandi officium præstant, nisi etiam forsitan aliquis tertio ligamentorum usu, ipsa ossibus obduci assereret. Secundi duntaxat usus nullum reperies, qui omnia tertio usu instar propugnaculi, aut ab ossis iniuria uindictis instar, tendinibus sint. Verum ex his reperies nonnulla, quæ aliud nullum beneficium, quàm secundum & tertium usus conferunt, neque ossa aut cartilagines inuicem nectunt, qualia omnia sunt, quæ uni solummodo ossi propria continuaue censentur, ut² quatuor illa, quæ in externa cubiti sede, radij appendici ascribuntur, &³ unum ulnæ proprium, deinde præter cetera huius generis quædam ad calcis os spectant, quemadmodum suo loco diffuse explicabitur. Alia ex secundum usus ligamentis, etiam primi ligamentorum usus uicem suppleunt, tendinē namque, quem transmittunt, tuentur, & etiam ossa inuicem ligant, suntque illa, quæ duobus ossibus communia conspiciuntur, ex uno osse in aliud pronata, ut⁴ illud sex transuersorum cubiti ligamentorum, quod radio & ulnæ commune dicemus, deinde transuersum quoque⁵ ligamentum, anteriore tibiæ sedem iuxta pedem occupans, & ad fibulam tibiæque relatum, quod duo illa ossa colligās, plurimos etiam tendines unā transmittit. Præterea & transuersum internæ⁶ brachialis sedis ligamentum, pluribus quoque ossibus commune existit. Tertij duntaxat usus illa sunt, quæ tendinibus secundum ipsorum longitudinem obuoluuntur, nisi etiam primi usus sint, quod tendines uicinis sedibus commissos seruent, aut ligent. Quamquam rursus ex his quædam & quinti usus uicē gerant, quandoquidem mucosæ membranæ tendinibus tertium quatuor digitorum os flectentibus, in brachiali & uola obductæ, etiam musculis gracilibus quatuor digitos pollicis adducen-
tib. principiū præbent. In quinti solummodo usus numero propemodū habēda sunt⁷ membræ, in pubis ossium foraminibus obuæ. Id autem quod in⁸ cubito &⁹ tibia habetur, etiam primi usus ligamentum existit, quum & ad ossium connexum egregiē auxiliatur. Quamuis etiam hæc omnia & ad quinti usus ligamentorum classē rejici possent, quod non obscure etiam musculis principiū porrigant. Qui enim internam & externam pubis ossis foraminis sedem obtegunt musculi, ab illius quoque foraminis membrana partim enasci dicuntur, uti etiam ab eiusmodi ligamento in tibia nonnulli musculi originis portionem assument. Porro uti neque ligamentorum usus idem est, & plures inter ligamenta eius gratia consurgunt differentiæ, ita quoque in ortu illa uariant, quum alia¹⁰ solis cartilaginibus principium ducant, ut laryngis ligamenta, alia¹¹ solis ossibus, ut genu, cubiti, humeri, & reliqua ferè corporis ligamenta. Alia autem & cartilagini & ossi communia sunt, ut quæ pectoris os illi infinuatis cartilaginibus adnectunt. Pariratione quædam ligamenta solas nectunt cartilagines, ut laryngis, nasque cartilaginum ligamenta, quædam ossa duntaxat, ut humeri, coxendicis, genu, & reliquorum ferè articulorum ligamenta. Quædam cartilaginem ossi committunt, in quorum numero sunt ligamenta, costarum cartilagines pectoris ossi nectentia. Alia aliam partem quampiam ossi aut cartilagini committunt, ut corporis membranæ ad unam ferè omnes, atque hæc semper duabus partibus sunt communia. Alia uerò uni duntaxat ossi priuata censentur, ut sex cubiti exteriorum ligamentorum, quæ transuersim ducuntur quinque. nam primum quod ulnæ radioque commune est, non ad unicum tantum os referetur. Insuper & quæ pubis ossium foramina opplent membranæ, huc quoque spectant, si modo illæ (quum non ligent) in ligamentorum numero habeantur. Substantia demum alia constant molliori, magisque membranæ, ut omnia ferè quæ in orbem articulos ambiunt, quamquam in illis rursus quædam sit differentia. Digitorum enim internodia mollius ambit ligamentum, quàm humeri articulum, et huius denuo duritiem, coxendicis articuli ligamentum longè superat. Alia autem dura sunt, mediamque inter ligamenta, quæ articulos ambire dixi, & cartilagines, naturam sortiuntur, unde etiam Græci hæc *υδρογονοειδῶν ἢ ὀστέων* *αὐτοῦ*, quasi ligamenta cartilaginea dicas, appellant. Huius generis omnia propemodum sunt, quæ extrinsecus articulis non obtenduntur, sed inter ossa ipsa latitant, quale illud est¹² quod ex medio capitis femoris in coxendicis acetabulum fertur, &¹³ ea quæ uertebrae corpora intercedunt, &¹⁴ id quod ex media tibiæ sede, quæ hæc femur respicit, inter femoris capita ducitur, &¹⁵ quædam malleolos talo nectentia, & quod sacrum os iliumque ossa interuenit, & generatim omnia, quæ inter ossa sedem habent. Vnde etiam & situ ligamenta inter se pugnant, quum alia extrinsecus ossibus obducantur, ut molliora illa. Alia autem inter ipsa ossa, ubi se inuicem respiciunt, continguntque, si-
tuentur, quemadmodum cartilaginea propemodum uniuersa. A¹⁶ forma quoque ligamenta differ-
rentiam mutuuntur, sunt enim quædam prorsus lata, membranæ & tenuia, uti illud, quod secundum cubiti longitudinem inter ulnam radiumque conspiciamus, & illud quod parimodo inter fibulam & tibiā, ubi hæc mutuò dehiscunt, obseruatur, & etiam pleraque in orbem articu-

Ligamentorum differentia
uic.
Ab usu.
Ab ortu.
A partibus
quas conne-
ctunt.

A partibus
quib. commi-
tuntur.

A substantia.

A situ.

A forma.

los circumdantia, eaq̃ tandem omnia, quæ tendinibus musculis que obuoluntur. Alia autem crassa sunt, & ex his quædā teretia, ut¹ ligamentū ex dente secundæ cervicis uertebre, in occipitis os procedens, & id quoq̃ quod transuerſim denti obducitur, ac primæ uertebre est peculiare, deinde & ligamentum femoris caput coxendicis ossi committens, quod in articuli medio locatum teres etiam uiſitur. Alia ampla lataq̃ sunt, ut tertium peculiaritū humeri articuli ligamentorum, præter membraneum quoddam, in orbem articulum ambiens. Insuper genu articuli peculiaria omnia, crassa quidem sunt, non tamen prorsus teretia, ut & cartilaginea illa talum tibiæ & fibulæ colligantia. Rursus quædam continua, & nullo foramine peruiā cernuntur, ut ligamentorum maxima multitudo, quædam uerò aliquid transmissura perforantur, ut ligamenta anuli modo tendines transmittentia, & membrana pubis ossis foraminum, neruo cum uena & arteria uiām præbens, ut & membraneum ligamentum inter tibiæ os & fibulam consistens. Quam iuste uerò hæc singula rerum Conditor distribuerit, seorsum semper in proprijs Capitibus recensere conabor, ubi perpetuò, si quid peculiariter alicui ligamento in colore, substantia, forma, eiusq̃ generis differentijs obtigerit, subiungam. Commune autem omnibus est, quod obtuso admodum sensu (nollem enim dicere nullo) participant, ne propter cerebrum frequentemq̃ motum, & continuū affricum² dolore uexentur. Quæ etiam ferè ratione (quum scilicet natura sicca sunt) ne ocysus exſiccantur, ligamenta quæ articulis sunt peculiaria, mucoſo quodam lentoq̃ humore, ut & articularum cartilagine, oblinuntur. Cuius sanè naturam accuratissimè, si non ob aliud, saltem ad luxatorum restitutionem perdiscere debemus. Quod quum aliàs non semel, tum etiam in Libro de Articulis Diuus Hippocrates nobis insinauit, quum macilentos non natura, neq̃ debita arte redditos, eiusmodi humore ob excrementicios, qui ipsis colliguntur, succos abundare docuit. Præter hoc, quòd rerū Opifex unctuosum hunc humorem inſtar olei ossium, quā inuicem coarctantur, cartilaginibus oblinat, ut huius beneficio, promptè mobilis simul & attritu contumax articulus redderetur.

Ligamenti
communia.

Viscidus liga-
mentorum hu-
mor.

QVID MUSCULVS. CAPVT II.

PRÆSENTI figura musculi structuræ ratio, quæ omnes ferè dissectionis procures musculum formari tradunt, ut cunque exprimitur. Quod enim inter Φ & Ω continetur, nerui cuiusdam est portio supra infraq̃ abtruncata: uerum hæc characterum indice opportuniùs explicabuntur.

- A Nerui in plures furculos distribuendi portio.
- B Nerui A notati soboles musculi constitutionem subiens.
- C Ligamentum quod ab ossè ad musculum constituendum profraſcitur.
- D Ligamenti & nerui ad musculum efformandum congressus, ac prima in fibras distributio, musculiq̃ caput.
- E Sedes quæ fibrarum maxima est diuisio, & quæ musculi uenter consistit.
- F Diuisionis fibrarum concursus commixtioq̃, & tendinis musculi initium.
- G Tendinis pars, quæ mouendo ossi inseritur.



PRIMA SE-
CVNDI CAPITIS
FIGURA.

SEQUENTEM paginā occupans figura musculorū humeri os, & cubiti ossa, & extremā summæ manus sedē ambientū fibras à carne liberās cōmonſtrat, unā cū quarto brachii adeuntū neruo, ut hic quā fieri posset, cōmodissimè musculi fabricæ natura oculis subiceretur.

H Humeri ossis caput, quod scapulæ articulatur.

I Quartus brachium petens neruus.

K Principium musculi cubitum extendentis, qui ab humeri capitis radice exoritur.

L Principium alterius cubitū extendentis musculi, qui ab humiliori scapulæ costa profraſcitur.

M Sedes quæ quartus brachium accedens neruus, duobus cubitum extendentibus musculis propa-
gines offert.

N Cubitum extendentū musculorum finis, seu eorundem in posteriorē ulnæ processum insertio.

O Poste-

- O Posterioris ulnæ processus pars, quæ ex carnis perpetuo cernitur.
- P Quartus brachium petens nervus inibi cõspicuus, quæ posteriore sedi exterioris tuberculi humeri innititur, ac musculus hinc ab humero principium ducẽtibus ramos offert.
- Q Initium est cubitum flectentium muscutorum posterioris.
- R Caput oblongi musculi, qui radij appendici iuxta brachiale insertus, radium in primum ducit.
- S Musculus bicorni tendine brachiale extendens.
- T Musculus brachiale extẽdentiũ alter, qui è regione minimi digiti postbrachiali implantatur.
- V Musculus ulnæ exporrectus, & brachiale flectens.
- X Musculus indicem, medium & anularem extendens.
- Y Musculus quo minimum digitum præcipue extendi docebo.
- Z Carnea pars eius musculi, qui in tres deductus tẽdines, unum brachialis ossi pollicem sustentanti inserit, secundum primo pollicis ossi, tertium secundo pollicis ossi & tertio.
- a Musculus cuius beneficio pollex indici adducitur.



SECUNDA
FIGVRA.



MVSCVLVM motus voluntarij, ex nostroq; arbitratu pẽdenti proprium esse instrumentum, omnibus concessum uidetur dissectionis proceribus, atq; ab omnibus idem musculi cõstructionis modus enarratur. Qui equidem probabilis apparet, ac magnum Conditoris nostri artificium com-
monstrat, attamen quum in paucissimis musculis, aut potius in nullis illum obseruem, secus propemodum atq; illi, de muscutorum cõstructione sentire cogor. Quæ autem omnium ferè sit sententia, nunc quàm potero breuissimè, & simul explicatissimè subiiciam, eorum placita in continuam orationis seriem, quæ ueritati proximè sit consona, & quæ eorum sententiam clarius edoceat, congesturus. Diffiniunt itaque musculum, partem esse instrumentalem ex nervo, ligamento, carne, uenis, & arterijs confabricatam, motusq; voluntarij peculiare organum, in cuius fabrica ad hunc ferè modum Naturæ opus recensent. Musculum sanè huiusmodi instrumentum efformari operæpretium erat, si demum ipsius ope membra, & grauiora ossa motu arbitrario moueri oportebat. Quum bina enim corpora sint simularia, quibus in præsentī sermone (qui de musculi constitutione est) indigemus, ligamentum scilicet, & nervus sua propria uoce dictus, ligamentum uerò sit durum, nervus autem mollis, miranda Creatoris est industria, qui in singulis motui voluntario præfectis partibus, utroq; utitur, neq; in ligamenti locum nervum aliquando transponẽs, neq; in nervi regionem ligamentum. Concessum enim est omnibus, neque durum ad sensum (utpote quod non faciliè afficiatur) neq; molle ad motum (quum imbecillius sit) esse idoneum. Ergo neque per nervos solos mouetur aliqua particula, neque per ligamenta. Nervus enim sensitiuus quidem est, quatenus mollis: inualidior autem, quàm ut moueret, & transferret totum membrum. Ligamentũ uerò rutò quidem colligare, & interim membrorum motibus nõ ob-

Quid muscu-
lus, ipsiusq; cõ-
positionis ra-
tio secundũ ali-
orum anatò-
mes Procerũ
sententiam.
Ligamenti et
nervi in mu-
sculo necessi-
tas.

stare poterat, ipsum tamen motus uoluntarij organum per se nequiuit produci, quum originē ex ossē aut cartilagine, nō autem nerui modo, ex uoluntarij motus fonte obtineat. Nemo enim ambigit huiusmodi fontis seu principij corpus molle oportuisse fieri; quandoquidem neq; ex molli perfecte durum, neq; ex duro molle quicquam enasci possibile est. Propter has igitur necessitates Natura neq; solis ligamenti uti ad motus uoluntarios potuit, quoniam neque sensu, neq; motu praedita sunt, ut quae animae principatus sedi non continuuntur, neq; neruus etiā solis utendum fuerat, cum hi propter mollitiem tenuitatemq; transferre tam magna pondera minime ualerent. Permixtum igitur ex ambobus oportebat aliquod creati motus organū, quod omnino neruo esset durius, & ligamento mollius, & ideo quoq; participare sensu, minus quidē quā neruus, magis autem quā ligamentum. Insuper decuit & id quoq; in medio roboris et imbecillitatis, aliorumq; contrariorum, quae ligamenti & nerui insunt, existere. Atq; hac occasione motus instrumentum, utrisq; ipsum componentibus substantijs cōmunicat, non tamen exactē alteram, neq; solam, neq; eam impermixtā obtinet, sed ex ambabus cōmiscetur. Verū quum nihil alicui per totum confundi potest, non confectum prius in minimas particulas, necessarium fuit utrumq; neruum uidelicet & ligamentū, in fibras tenues discindi, deinde sibi inuicem eas copulari ad uoluntarij motus organi generationem. Perficitur enim nerui ac ligamenti in fibras distributio in hūc modum. Neruus accedit ligamento, ac simul cōmixta in fibras duas quodam modo digeruntur, illae rursus singulae in alias, & haec iterum in plures tantisper diuiduntur, donec in tenuissimas membranasq; fibras procedant, postquam hae ad extremum diffusionis peruenere, rursus ut diuise fuerunt, mutuo concursu coalescentes, & commixtae in unum colliguntur. Et quemadmodum prima diuisio musculi caput constituēbat, ita haec postrema collectio finem musculi efformat, quem Graeci *ἀκροὺς ὀστέων*, quasi enerationem dixeris, et ut nos quoq; tendinē musculorum, appellant. Medium uerō, in quo diuisionis series cōsistit, musculi uentrem nuncupamus, similitudinem à mure, & lacerta, & piscis musculi, aut alioquin communi pisciū forma mutantes. Musculi namq; seu lacerti caput, muris lacertaeq; capiti conferimus, tendinem autem caudę, & uentrē uentri. Ceterum si Natura solummodo ita neruum & ligamentū diuississet, nec medias regiones, fibrarumq; interstitia molli infarsisset substantia, quae fibris, thori ac texturae alicuius, & firmę sedis loco esset, haudquaquā musculi uel tantillo temporis spacio fibras illas infractas incorruptasq; seruarent. Est autem sedes ea ac thorax, simplex caro fibris obducta, quę nō aliter fibris cōmittitur, quā in calathis alijsq; fscellis, in quibus laccharum rerum periti coagulant. Finge igitur fibras ex neruo & ligamento diffusas, iuncis respondere, lacti uerō ipsi sanguinem, et caleo carnem proportionari, nam ut ille ex lacte, ita haec ex sanguine paratur. Quamquam tanto ueriores tibi confinges imaginem, quo per caleum plures crebrioresq; iuncos funiculos uē porrectos, & nō solum ad calci latera attentos imaginatus fueris. Ne autem caro haec, reliquaq; musculi substantia, sanguine nutrimentoq; indiga relinqueretur, & suus innatus calor non refocillaretur, uenas ac arterias, tanquam riuulos quosdam musculi immisceri fuit necessarium. Deinde quoq; membranā uniuersum musculi corpus integrentem à ligamenti, quae musculi caput & finem ossibus committunt, produci oportebat. Commemorata iam musculi constructio, ad amissum nulli prorsus conuenit musculo, quū nullum in uniuerso corpore adinuenias, qui parem ligamenti, seu ex ossē aut cartilagine exortus sui, & nerui portionem sibi assumat. Quod sanē innuebat Galenus, quū Musculum inter ligamentū & neruum natura medium esse assereret, alibi tamen animaduertens non parem nerui portionē, ligamenti portioni in quibusdam musculis misceri. Nam ut ceteros ta ceam, tendo posteriorem in calcis sedem insertus, solus crassior est quatuor femur petentium neruorū radicibus, utcunq; eas simul collegeris. Deinde si nunc omnes tibiae insertos tendines ac reliquos pedis ossa accedentes perpendis, quę nunc cum tendine illo, in calcem inserto erit proportio, ut illa scilicet mediam tendinū portionē neruo, & mediam ligamento formari ostendat. Profecto si tendines neruis hīc comparabuntur, neutiquā nonagesimam tendinū portionē sibi uendicare reperiretur, esset profecto temporalis, & septum transuersum, quippe in hoc duo satis insignes nerui implantantur, illum uerō etiā quinque neruorū propaggines adire docebo, quamuis interim in neutro ne trigecupla nerui cum ligamēto uideatur proportio. Sed quid tanto pere Galeni praecepta tanquam oracula subuerentes, & ipsius libros de Musculorū motu exosculantes, de illis dicemus musculis, qui latissimo oriuntur principio, ac sensum in angustū uersus ipsorū insertionē desinunt: cuiusmodi inter reliquos brachiū attollens est, deinde is qui brachiū pectori admouet, & femoris motibus famulantes propemodū omnes, in quorum exortibus neruū, qui ut Galenus censet, cum ligamento diffundi possit, confingere nequimus.

Musculi natura inter ligamentum & neruū esse medium.

Ligamenti & nerui permixtio.

Musculi caput. Finis seu cauda & tendo. Venter.

Carnis ita musculi.

Vene ac arterie in musculo necessitas. Musculi membrana.

Musculum non a quē nerui, ac ligamenti natura participare. Lix de Motu musculorū.

41 f. D.
b 1 f. E.
c 1 f. E.

d 14. la. ten
do musculi
rum n. o, q
u 11. 4. ch
e 2 fig. 44
u 11. 4. ch
57. 60, 66
71. licet ue
ra propor
tio ex ner
uorum tabu
lis, ut neq;
uenarij, pe
l nequeat.
4. la. r
b 7 la. d.
23 fi. ca.
11 li. 4. n.
i 2 fi. ca. 2.
li. 4. Q. 3.
b, c, d.
h 4 la. 2. 10
la. d.
13 la. d.

mus. Nam statim in eiusmodi musculorū origine multo maior fibrarū est copia, quā in musculi reliqua parte, siquidem in illis musculis, & præcipue qui femoris motibus præfunt, fibræ ab ipso ortu nō amplius in plures diuiduntur, imò sensim ad insertionē properantes inuicē colliguntur, musculos triangularis figuræ efformantes. Vnde etiā conspicuū euadit, si modò illa, quam Anatomici proponunt, nerui ac ligamēti diuisio cōmixtioq; in musculis fieri oporteret, singulis fibris in ortu neruulū debere misceri, quod neutiq; accidere ipsa neruorū series cōmonstrat. Quandoquidē in plerisq; musculis duntaxat neruulum admodum gracilem, neq; magis quā uenā diuisum, ad superficiem musculi nunc interiorē nunc exteriorē, uenē ac arteriā modo exporrigi, membranaq; musculi adherere conspicias, neutiq; autem in fibras per musculi substantiam diffundi. Quod inter plerosq; corporis musculos in illis liquidō condiscēs, qui ab illo osse femoris os accedunt, ex quibus etiā quosdam reperiās, quorū ne superficiei quidem neruus, uti neq; uena & arteria, uix ut contiguus omnino sit, attendatur. Neq; id hīc solum obseruabis, imò etiā in quadratō musculi radiū in pronum mouente, cui nuncq; neruum, uenam & arteriam exporrigi intuitus sum: præter illos neruos, uenas ac arterias, quæ cum tendinibus digitos flectentib; ad extremā manum prorepunt, quæ etiā à musculo illo nō multum distent, ipsum tamen nō contingunt. Adde neq; neruulū obseruari insertum in graciles musculos, qui quatuor digitos oblique pollicii adducunt, ut neq; in illos, qui primi quatuor digitorū ossis flexionibus præfunt. Adiunge præter hos, ab domini etiā musculos (quos prius, quia omnibus notiores sunt, recensere decuerat) nullam nerui cum ligamento proportionē ostendere, quum nequaquā in singulis musculorū, qui oblique & transuersim fibras porrigūt, principiorū sedib; neruus implantetur, et quoniam ipsorū enervatio seu tendo multo latior sit, q̃ musculorū origo. Non est itaq; musculus inter ligamentum & neruū natura medius, neq; etiā illa, quā imaginantur, ligamēti & nerui sit cōmixtio. Nam etsi fortē neruū in musculi alicuius caput inferi animaduersurus sis, nuncq; sanē nerui soboles ligamēti fibrarū modo, ad tendinis usq; principiū diffundi, aut alio pacto ligamēti fibris uniri, uereq; permisceri reperiēs. Neque id profectō in ullo musculo perpendes facilius, q̃ in illis qui ab interno humeri tuberculo principiū capiunt, illo rum etenim capita sunt acuta, & neruorū insertiones in ipso rum substantia, nō solum autem in superficie adipiscuntur. Atq; id etiā in illo animaduertes, qui à fibulæ superiori appendice principiū sumens, ad pedem prorepit, sic & in illis, qui ab inferioribus femoris capitū radicibus ad calcem feruntur. Non enim omnes musculi, nerui implantationē (etiā si quando in ipso rum substantiā neruus porrigitur) in capitis exortu adipiscunt, sed subinde multo inferiūs, q̃ caput habetur, & in medio sui quodāmodo ductus & longitudinis, quod anterior flectentiū cubitum musculorū ostendit, nerui primū propaginē assumens, ubi duo ipsius capita in unū cōiunt. Idem in nōnullis femoris os amplexantibus obseruatur, & in abdominis musculis, & plerisq; qui in collo habentur, & in omnibus ferē qui costis insertiuntur. Verū utcunque nerui, uel in musculi substantiā sese insinuent, siue ipsi tantū superficiei attēdantur, ferē semper sua serie & propaginibus, secundū musculi ductū porriguntur. Rursus tendo elixus neq; sapore, neq; colore, neq; substantiā à ligamento uariat, nisi fortassis illum molliorē, nō quidem omnibus ligamenti, sed tantū quibuldam esse quis contenderet, utut tamen sit, tendo musculi capitis molliciei nequaquā cedit, quāuis id statim in ortu purū esse ligamentū, nemo inficias ire possit. Neque etiā mirandū esset, tendinē ligamento ossa colligāt ut plurimū molliorem, minusq; cartilagineū esse, cū ligamentorū, quæ ossa mutuō colligant, in duritie eadē nō sit ratio. Adde etiā, tendinē elixū cum neruo nō proportionari, hic enim elixus aut crudus, si per transuersum diuidatur, ex multis quasi funiculis constructus apparebit nō aliter, q̃ si chordam aliquā crassiorē diuisisses, tendo autē solidior, & ut ligamentū similis magis, cōtinuusq; uisetur, præcipue si crasum aliquē tendinē ex illis, qui pedē aut tibiā, aut extremā manum adeunt, examini adhibueris. In latis enim & quodāmodo membranis tendinibus series fibrarū est manifestior, quo etiā nomine à ueris membranis inter dissecandū distinguūt, quemadmodū in peritonæi cum obli quorū & transuersorū abdominis musculorū neruosis tenuitatibus collatione est cernere. Et quamuis id in quouis animāte inter edendū intueri integrū sit, in bubula tamē carne id feceris apertissimē, cū pars aliqua menæ apponetur, quā insignis perreptat neruus, qui plerunq; cum uena & arteria inter glandulas conspici consueuit. Inuēto neruo nuncq; tendo deesse poterit, qui modò proposita nō edoceat. Deinde id, quo alij tendinē neruo misceri, atq; ex ligamēto & neruo equaliter, aut plus minus confusus fieri, maximē probare contendūt, prius num ita, ut illi proponūt, res se haberet, perpēdendū erat, priusq; aliquid inferret. Dicūt namq; tendinē capite musculi ob id crassiorē esse, quòdis non capitis solū musculi substantia, sed & neruo quoq; cōstet. Quasi uerò quis rectē dicere possit, exortus musculorū surg simul collectos, quod ad nerueam

*Neruum sit
gulis muscu-
lis, ut alijs dis-
sectionum pro-
fessoribus ui-
sum fuit non
misceri.*

*Omnium mu-
sculorum capi-
tū b. neruus nō
inseti, aut alio
quin attendi,
etiā si al'is
ipso rum substan-
tie neruus in-
seratur.*

*Tendinem li-
gamento, non
autē neruo re-
sponderi.*

*Ex carne mu-
sculi capite,
tendine nō sem-
per esse tenui-
us.*

*Musculorum
capita maxi-
mè carnis ex-
perit, non mi-
nus, quàm ven-
dinem fenerre.
Quid nervi
musculis uere
praesent.*

*Qualiter mu-
sculi suum mu-
nus obeant.*

*Quid uere mu-
sculus sit.*

*Caro præci-
pua musculi
substantia.*

*Adipem et u-
carni possim
atque ad.*

*Tendines
quando muscu-
lis dentur.
Musculi ten-
dines deservit.
Lia, de Mo-
tu musculorum*

attinet substantiam, minores esse illorum musculorum tendine, qui calci inseritur, aut quasi bra-
chium attollens musculus, pauciores fibras in ortu haberet, quam ipsarum collectio ad insertio-
nem ostendit. Erat itaque id prius probandum, quam falsa conclusio inducenda. Quemadmo-
dum & hæc quoque inefficax assumptio est, tendo sensu exactissimo participat, nervo igitur &
ligamento constat. Quasi uero musculorum capita, & præcipue ligamentosa, & prorsus excar-
nea, minus ipsis tendinibus sentiendi ui polleret, & læsa conuulsionis periculum minus, quam
tendines inducerent, etiam si capitibus mox in exortu nervus non inferatur, sed tantum atten-
sus occurrat, isque etiam subinde notabili intervallo à capite remotus. Hac occasione & huiusmo-
di pluribus, quas recensere prolixum foret, efficitur, ut allerere cogar nullam prorsus aliam nervi
in musculos, quam uenæ & arteriæ distributionem esse, & pari etiam ratione neruum, qua ue-
nam arteriamque musculum accedere. Neque ullam aliam in uena arteriaque cum nervo differen-
tiam statuo, quam quod ad finem seu insertionem musculi nervus nunquam, ut aliquando illa
uasa, implantetur, quanquam etiam paucissimos prorsus musculos eius generis enumerare possi-
mus. Sunt autem inter alios recti abdominis, qui & à uenis & arterijs sub pectoris osse deor-
sum deductis, ramulos assumunt, & temporales etiam ab inferioribus suis sedibus uasa ad-
mittit, quum is tamen interim ex elatioribus principium deducat. Præterea ut uena nutriendo
musculo subservit, & arteria ipsius innatum calorem recreat, ita quoque neruum animale spiritum
continuum ipsi deferre, neruumque illo spiritu musculum nunquam indigum relinquere ar-
bitror, ut neque uena alimento musculum destituit. Deinde spiritus animalis ui, & debite pecu-
liarisque musculi constructionis gratia, musculum contrahi laxarique sentio, neque aliter suo mune-
re fungi, quam oculum, reliquaque sensuum organa, quæ singula propriam singularemque fabri-
cam obtinent, & animali spiritui (quæ per nervos cerebrum ipsis porrigit) imbuta, suis funguntur
munijis. Non enim alius animalis spiritus oculo, aut lingua, aut auditus organo, quam musculis
diffunditur. Verum fuit constructionis ratione, & accedente spiritu, oculus uidet, lingua gu-
stat, auditus organum sonos percipit, & sanè musculus ipse uoluntarijs motibus præest. Atque
hac etiam ratione omnia, quibus nervus attenditur, sentiendi ui pollent, nisi propria eorum sub-
stantia id prohibeat. Ceterum ut quamplurimos musculos arteria non contingit, quorundam
autem superficiei tantum attenditur, & aliquando adnascitur, inter dum uero etiam in musculorum
substantia penitus ramos exporrigit, & interim omnium calorem temperat, tam eorum scilicet quos
non proxime contingit, quam illorum quorum superficiei adnascitur, ac penitus in ipsorum substantiam
diffunditur, ita profecto & nervus usu uenit, qui suam facultatem tam illis musculis exporrigunt,
quibus uix attenduntur, quam quorum superficiei adnascuntur, & in quorum substantia aliqua ramo-
rum serie digeruntur. Quanquam nervos propinquius uenis quam arterijs assimilare queas. Pauciores
enim musculi uenis, quam arteriarum actu insertionemque destituuntur, licet etiam quosdam prius recensue-
rim, quos neque nervo, neque uena contingi obseruabis, qui nihilominus interim, ut neque alimen-
to & uitali facultate, ita quoque spiritu animali non priuatur. Est itaque musculus, uoluntarij motus in-
strumentum, uti oculus uisus, & lingua gustus, ex ligamenti natura in fibras copulosas queas, & car-
nehas cõtinente firmanteque fabricatum, uenarum, arteriarum & neruorum furculos in se interdum assu-
mēs, ac neruorum beneficio animali spiritui nunquam, dum sanum est animal, destitutum. Atque hanc carnem,
præcipuum motus organum esse existimo, & nequaquam duntaxat fibrarum thorum & fulcimentum, perin-
de sanè, ac cerebri, cordis, iecoris, pulmonum, lienis, renum & uentriculi propria substantia, prima-
rium suarum functionum autorem esse suo loco dicemus. Quod uero musculorum carni, aut carni simpli-
citer, nullum adipem intexi, omnes hactenus falso prodiderint, obesi boues, quos Brabantia fa-
le cõdiunt, attestatur, in quorum musculorum fibris per carnem adeps attenditur. Adde etiam obesarum
mulierum musculos, qui femur extendunt pinguitudine, adeo oppletos uideri, ut ambigas, num
caro adipi, an adeps carni cõmisceatur. Neque hinc de musculorum superficiei solum loquor, ue-
rum de intima ipsorum substantia, et maxime carne, quam præcipuam musculi partem esse asserui. Ten-
dines autem & enervationes illas, quas caro destituit, in illis tantum musculis habetur, qui longo du-
ctu feruntur. Breues enim tendine carent, & undique carnosius sunt, ut laryngis omnes, si duos re-
ctos exceperis, quatuor tertiam cartilaginem primæ iungentium, illi enim in insertionem ner-
ueam naturam obscure exprimunt. Deinde inter eos, qui ossa mouent (etiam si Galenus sapientius aliter
inculcet) qui primus pollicis flectit articulum, & qui pollicem indici maxime ad mouet. Inter ma-
gnos autem huius generis est quadratus musculus, scapula dorso ad mouens, & musculus, qui à
scapulae basi enatus, octo elatioribus costis implantatur. Verum de musculis tendine carentibus,
tendinumque generibus, iam agemus, musculorum differentias aggrediētes, quibus ne præfens Caput
nimium excresecat, iam peculiare tribuimus, post differentias de musculorum functionibus, ac nu-
mero aliquid subnexuri, priusque priuatam singulorum musculorum enarrationem auspicabimur.

*c obseruab
ta. f. a.
d. 14. r.
c. f. ca. 6 li.
3 e. c. fig.
ca. 12 g.*

*f 6. 7 f. ca.
21 p. Obli-
qui autē 7,
8 f. R.
g 6 ta. 2,
b 11 ta. f.
10 ta. r.
h 7 ta. L.*

Caput III.



DIFFERENTIAS musculorum nō paucās recēnserē promptissimū est; ab illorū uidelicet substantia, ortu, insertione, quam mouent particula, forma, foraminibus, colore, situ, fibrarum specie; & musculi capite, uentre, tendine, ac denique ex mutuo musculorū cōcursu, aut unius musculi uelut in plures separatione. Quæ à substantia petuntur differentia, ex uenis, arterijs, neruisq; imprimis pendent. Nullum enim corporis musculum reperiās, qui non aliquo ligamenti portione in fibras defecta, & carne illas continente firmanteq; constituatur. Verum præter hæc alij neruum, arteriam & uenam in suum corpus quoque diffundi sinunt, ut ^a septum transversum, & maximus totius corporis ^b musculus, qui femur mouentium quintus erit, præterea abdominis omnes ac præcipue recti. In alios neruus nullus, neque uena, neque arteria inseritur, ex quorum classe ^c musculus est, qui latum in manu educit tendinem. deinde præter alios quāplurimos, quadratus ^d musculus radium in prouum uertens, & ^e graciles illi, qui digitos ad pollicem in latera agunt. Solus neruus quibusdam propaginibus in illorum ^f musculorum capita distribuitur, qui à radicibus capitem femoris principium sumunt, atque ad calcem ducuntur. horum nanq; substantia neque uena, neque arteria penitus inseritur. Latus in collo ^g musculus, qui genas mouet, uenis abundat & neruis, tamen arteria interim destituitur. Qui uerò solam nanciscitur arteriam, nullus occurrit. Cæterum adeps, quem interdum musculorum fibris per carnem digestis attendi diximus, in macilentis non reperitur. In obesis autem illi musculi adipe potissimum abundant, qui ilium ossibus obducuntur, ac clunes, & ueluti sedentibus puluina constitunt. In ortu magis adhuc musculi uariant, nam omnes, & si Galenus non semel aliter affirmet, ab ossibus suum principium nequaquam mutuuntur, uerū alij ab osse ipsorum ligamenti originem sumunt, ut ^h qui à femoris osse & coxendicis osse ad tibiam procedunt, & plurima musculorum multitudo. Alij à cartilagine ipsorum ortum obtinent, ut omnes laryngis musculi, quos laryngis proprios nuncupabimus, deinde intercostales musculi, ⁱ qui inter costarū cartilaginū habentur interualla. Alij à membrana quapiam enascuntur, cuiusmodi sunt oculi omnes ^j musculi, à dura membrana uisiorum neruum inuoluentē nati, deinde duo ^k musculi stomachum retro amplexantur, & in scutiformis cartilaginis latera inserti, his nanque ab exter na stomachi tunica principium pendet. Idem & de ^l circulari ani, & uesicæ ceruicis musculo censendū uenit. Alij à membrana tendines obuoluentē enascuntur, ut quatuor graciles ^m musculi, quatuor manus digitos ad pollicem in latus ducentes. Alij ab alio quouis ligamento originem exigunt, cuiusmodi sunt ⁿ duo pollicis primum internodium flectentes, qui à transverso ligamento tendines in brachialis interna sede transmittente enascuntur. Tales etiam sunt, ^o qui in superiori pedis regione locati, pedis digitos extrorsum ad latus mouent, qui à ligamenti tibiam talo, & talum calci, & nauiformi ossi, calcemq; cubiformi ossi colligantibus enascuntur. Alij uelut ex altero musculo procedunt, ut ^p qui à circulari ani musculo, uelut digiti duo, meatum urinarium, quā sub penis corporibus ferri incipit, amplexatur. Alij rursus ex nullo principium ducunt, uerū membranæ partes aliqua sui sede carneæ, ac musculo sæ seu musculi fiunt. Huius ordinis sunt omnes ^q musculi ex carneâ membrana constituti, qui in collo & facie in hominibus habentur, deinde & testis ^r musculus in rubicundo testium uasorum seminalium inuolucro, instar carnosioris lineæ innatus. Quinetiam septi transversi ortum, ex peritonæi, & tunicæ costas succingentis partibus, ipsius centro adnatis pendere fateamur; necesse est, nisi illius ortum cōtra aliorum musculorum rationem, ubi costis inseritur, esse dicamus. Cæterum non omnes musculi ab una duntaxat parte originem sumunt, permulti enim ex pluribus ossibus enascuntur, nam dorsum mouentibus musculis plures ferè uerterbræ principium præbent. Sic & abdominis ^s musculus oblique descendens, à pluribus costis exorditur. Qui brachium pectori admouet, ex pectoris osse, & quarundam costarum cartilaginibus, & ipsa demum clauicula enascitur, quemadmodum & is ^t cuius auxilio brachium attollitur, ex scapula quoque & clauicula procedit. Pariter etiam ^u recti abdominis musculi, à ^v cartilagine pubis ossa interueniente, & ab ipsis ossibus enascuntur, adeo, ut quidam musculi ex pluribus ossibus, alij ex osse cartilagineq; non inepte principium habere dicentur. Alij ex eiusdem ossis pluribus processibus enascuntur, ut ^w prior flectentiū cubitum, qui ab eminentiori sede ceruicis scapulae & processu ipsius interno, quem anchoræ assimilauimus, educitur. Ab insertione uerò integrum est dicere, alios in os, ut qui femur, & tibiam caputq; mouent, inseri. alios uerò in cartilaginem, ut

Vnde rursus
lorum differē
tia petantur.

A substantia.

Ab ortu.

Ab insertione

ryngis omnes, & qui palpebrarum motuum autores sunt, & qui narium alas movent. Alios in cutem, ut labrorum musculos, alios in aliud quidvis, ut oculorum musculos in duram oculi tunicam, & penis quatuor musculos, in penis corpora, & urinæ meatum, dein testis musculi, in uas semen à testibus sursum deferēs. Ad hæc musculos recto intestino proprios, in eius intestini exteriorem tunicam, & circularem uesicæ colli musculum, ad meatus urinæ corpus applantari inferiq; cernimus. Cæterum & ab insertione musculi isto quoq; modo differunt. Quidam à pluribus partibus enati in unicam inferuntur, ut musculus brachium pectori admovent, & is qui brachium attollit, ex pluribus orti sedibus, duntaxat in humeri os inferuntur. Ita etiam qui brachium deorsum trahit, ex pluribus uerterbrarū spinis oritur, attamen in unicum humeri os tantummodo definit. Pari etiā ratione & scapulæ motuū autores musculi ad unum omnes, ex pluribus ossibus initium sumunt, & uni tantum scapulæ implantantur. Quidam uerò ex uno osse exorti in plura inferuntur. Musculus enim qui à scapulæ basi prodit, respirationisq; subministrat, in octo superiores thoracis costas inferitur. Eius quoq; generis sunt, qui quatuor pedis & manus digitos extendunt, deinde qui nali alas simul superius labrum movent, in cutem cartilaginemq; implantantur, quemadmodum & septum transversum, quod alicubi ossi, alicubi cartilagini innascitur. Quidā etiam à pluribus enati ossibus in plura quoq; inferuntur, ut musculus à ceruicis uerterbrarum spinis enatus, qui in aliquot superiores thoracis costas implatur, thoracemq; mouentium in homine tertius habebitur. Præterea dorum mouentes musculi ad unū omnes, in hunc ordinē ferē referuntur. Item his differentiis illæ cōsentiant, quæ ab ea quam musculus mouet, particula desumi possent, quum omnes musculi eius, cui inferuntur, partis uoluntario motui præfint. Porro ab insertione & ortu simul alia sumitur differentia, quū alij musculi ab illo osse orientur, quod mouendo ab illis ossi, cui etiam inferuntur, alligatū est, proximumq; uisitur, ut tres musculi ex ilium osse in femoris os inferunt, septimus & octauus tibiam motum, qui à femoris osse enati tibiæ implantantur. Alij uerò à superiori aliquo osse, & nō illi, cui inferuntur, proximo originem ducunt, ut musculi tibiæ motibus famulantes, qui à magnis ossibus sacro ossi connexis principium obtinent, ex quorum numero sunt uniuersi tibiā mouentes, septimo & octauo tantū exceptis. Istis respondent, qui secundū cubiti aut tibiæ longitudinem extensi digitos aduunt. Forma etiā omnium musculorum haud eadem est. Quidā enim sunt, quos muri aut lacertæ (si ipsi pedes tantū abscisos sinxeris) ac pisci musculo, & alijs multis piscibus appositè cōferas, ut scilicet musculi caput, lacertæ, aut piscis, aut muris capiti, uentrem autem corporis trunco, tendinem uerò caudæ assimulare queas. Est autem huius ordinis musculus, qui ab interno humeri tuberculo enatus, ac radices postbrachialis ossis, quo index sustinetur, insertus, flexioni subseruit. Talis etiam est, qui primus in tibiæ anteriori sede occurrat, & in pedis os, cui magnus digitus articulatur, insertus ad pedis eleuationē famulatur. Sunt & alij eius generis nō pauci, uerū nullus æquē ac duo nuper dicti muris effigiem exprimunt. Qui autem est maximæ pollicis abductionis à cæteris digitis, & alius qui paruū digitum à cæteris maximè in latus amouet, tam in pede, quàm in manu, ad nuper dictā quoq; figurā eleganter accedunt. Vnde etiam arbitror, inter reliquos corporis musculos (quasi nulli essent alij) illos, qui ad pollicis primum articulū habentur, Bruxellensibus, & alijs quibusdā nationibus mures nuncupari, alijs uerò ita appellari cubitū flectentium anteriorem. Itatorū autem uulgi in quibusdā corporis partibus, nescio quem, pisciculum esse fingit, eo nomine indicans musculos piscis imagini non abimiles. Vt cūq; sit, ab eiusmodi murium, aut musculi piscis, aut lacertarum similitudine, omnes musculi à Græcis & Latinis suum nomen sortuntur, etiā si quamplurimi musculi illorum animalium effigiem nulla ex parte referat. Quandoquidem alij figura triangulari consistunt, ut brachium attollens musculus, & is qui scapulam pectori adducit, & qui brachium declinē ad dorsum uellit. Alij quatuor consent angulis, ut scapulam dorso admovent musculus, & qui ad brachiale positus, radij motus in pronum autor est, qui ambo etiā quodammodo quadrati sunt, ut & latus sub colli & genarum cute occurrens musculus, qui ex carnea membrana constituitur. Alij etiam quinque angulos exprimunt, ut is qui brachium pectori adducit, quamuis illum alij non ita exactè illius latera perpendiculariter, triangularem esse asseruerint. Qui ex scapulæ basi natus, octo superioribus costis inferitur, si obiter spectetur, quadrangularis apparebit, at si ipsius in costas insertiones quis perpenderit, tot angulos illius insertionis lateri tribuet, quot digitis implantari uidet. Atq; huius etiam figuræ est, abdominis musculi obliquè descendentes exortus, & quorundam thoracem mouentium insertio. Sed plures anguli etiam tribuuntur musculo, latus tendinem sub manus cute producenti, & alijs omnibus in plures tendines cessantibus. Verū angulis his postpositis, mirabilis formæ est musculus, singulis costarum radicibus tendines exporrigens, quem aloes radici, aut palmiti nō ineptè assimila-

f 10 td. o.

g 7 td. L.
h 5 tab. o. 6
td. 3. 14. td.
o. de n. 3.
i 3 td. F.
k 11 td. F.l 9 td. n. 10
tabule 2. as
tab. 3.
m 5 tab. A.
n 5 td. n.o 3 td. A.
p 14 td. 2.q 1 td. i.
r 1 td. Q.s fig. indicat
u tabule 10
ferta.
t 10 td. r.
u 7 td. X.
x 3 td. r.
y 10 td. 4. td
bulæ Δ.
z 7 td. L.b 3 td. o. 6
charact. 6.
7. 8.

c 12 td. A.

ueris,

*Alia que
mouetur par-
ticula.*

A forma

*Musculi no-
men unde de-
sumptum.*

ueris, ut radices quidem truncus, musculi carnosae esset pars, tendines autem surculi, quos geniculi
latum ab humiliore tantum parte radice pullulat. In palmitis uero lignosa pars, musculo conferetur,
folia autem ab altero duntaxat latereeducta, tendinibus. Quinetiam huius quoque ordinis est, lon-
gissimus dorsum mouentium¹ musculus, qui in apices transuerforū processuum thoracis uerte-
brarum potissimum inferitur.² Septi quoque transuersi figura admodum rara est, accedit autem raia³
(quem *Bodrag* Graeci appellat) piscis effigiei, si modo illi prius caudam secundum longitudinem
diuisam finxeris. Anulis uero respondent, qui facium excretionibus praeficiuntur, tam is scili-
cet⁴ qui ad anum spectat, quam⁵ qui orbiculatim uescicae ceruicem ambit. Pyramidem uero &
turbinem⁶ musculus refert, inter oculi musculos ordine septimus, oculique radici insertus.⁷ Mu-
sculus quem palpebram deorsum agere credimus, nostro C similis uisitur. In tibiae etiam po-
steriori sede iuxta calcem,⁸ musculorum imagines occurrunt, laniorum securi non admodum
ab similes, ut musculus secundum pollicis os flectens, & qui tertium quatuor digitorum os fle-
ctit, & unus qui sub planta tendinem porrigens, ad pedis in posteriora flexionem iuuat. Ho-
rum namque musculorum uenter, securis ferro, tendo autem, capulo obscure respondet. Iam si
utriusque lateris⁹ musculus, qui secundus inter scapulae motores habebitur, consideraueris, non
à satanae qui Iesum in deserto tentauit, sed ab horum musculorum forma Franciscanos, Iaco-
bitas, & praecipue Benedictinos suae cucullae imaginem mutasse contendes, quantum scilicet
eius dorsum scapulasque integit. Verum ne in musculorum figuris recensendis, & potissimum
eorum, qui ad femur tibiaeque pertinent, in monachos alicubi praeter sententiam religionemque
impingam, duntaxat commemoratis à figura differentiis adijciam, quosdam musculos amplio-
rem multo habere insertionem, quam ortum. qualis¹⁰ ille est, qui à scapula pronatus octo tho-
racis costis inferitur, dein¹¹ transuersus abdominis musculus, quemadmodum & oblique descen-
dens. Alij latum obtinent principium, & sensim coarctati in acutum feruntur, ut¹² musculus bra-
chium sursum agens, & alius qui id deorsum ad dorsum trahit, praeterea omnes ab ilium
osse in femur inserti. Alij ortum insertioni aequalem nascuntur, ut¹³ qui scapulae basi inser-
tus eam dorso attrahit, dein & intercostales omnes, praeterea quadratus¹⁴ musculus in cubito,
iuxta brachiale reconditus, radiumque in pronum circumuertens. Ex enarratis musculorum
differentiis liquidò constat, alios esse longos & graciles, ut eum¹⁵ qui ab ilium ossis appendi-
cis anteriori parte in tibiae fertur, totiusque corporis longissimus est, & etiam gracilis.¹⁶ Mu-
sculus à scapula ad hyoides os productus, pro sua proportionem similiter longus & gracilis est,
quemadmodum & testium¹⁷ musculi. Alij autem ampli & longi quoque sunt, ut abdominis
oblique descendentes musculi, & septum transuersum. Alij breues & ampli, ut intercostales,
quorum amplitudo secundum duarum costarum interualli à dorso ad pectoris os ductum
procedit. Tanto autem longiores uisuntur, distantia à superiori costa ad inferiorem spectante, quan-
to ipsorum ductus à costa ad costam recto obliquior est, ac in latus magis declinat. Huc quoque
referri possent insertionis principijque formae, nam aliud principium uelut puncto tantum fit, ut
musculi latum tendinem in manu producentis principium, & principia eorum¹⁸ musculorum, qui
à coxendicis ossis appendice pronati, in tibiae ossa inferuntur. Quidam uero instar simplicis lineae
principium obtinent, ut¹⁹ is quo brachium deorsum, uersus dorsum trahitur, & is quoque qui
scapulae basi insertus, eam dorso attrahit. deinde cum alijs copluribus, qui inter trahentes sur-
sum scapulam prior maiorque recensetur. Alij rursus musculi non lineae simplicis modo, uerum
latae superficiei ritu nascuntur, ut²⁰ tres qui ab ilium osse femur adeunt, & musculi cauum gib-
bamque scapulae sedem occupantes, quorum ope brachium circumagitur. Quinetiam haec lineae superfi-
ciesque, in rectas circulares & angulares rursus subdividi possent. At ne haec curiosius, quam de-
cet, aliquis me persequi arbitretur, ad alias differentias orationem reflectam, si prius addidero,
insertiones similiter alias rectae lineae instar, & secundum ossis longitudinem fieri, cuiusmodi est
musculi brachium pectori admouentis²¹ insertio. aliàs per transuersum & lata apprehensione, ut
musculi brachium attollentis inserti. Velut punctum autem inferitur,²² tendo prioris musculi
flectentium cubitum. Caeterum & ad formam quoque foramina fortassis spectat, quae quibuscumque mu-
sculis insunt, ut²³ septo transuerso bina obtigerunt foramina, quibus uenam caua stomachumque
transmittit, quae autem magnae cedit arteriae, & uertebriis uia praebet, uix foramine peruium est, sed
sectione quadam inibi diuisum dici debet. Verum haec septi foramina cum Hippocrate Galenus
male animaduertit, qui etiam alibi²⁴ orbicularem recti intestini musculus, & illum qui uescicae
ceruicem ambit (quia anulum refertur) perforatos esse recensuit. Est & unus quoque perforator is
musculus, qui à prima thoracis costa pronatus, anteriori transuerforum ceruicis uertebRARUM
processuum sedi inferitur, ac uenam in brachium cum arteria tendentem transmittit. Alij forami-
ne nullo sunt peruij, ut corporis reliqui omnes, nisi fortassis quis intercostales ideo perforatos
esse

A foramini-
bus.

Li. 5 de Admi-
nistrandis se-
dionibus.

esse dixerit, quod uenas, nervos & arterias, ad musculos costis intratos transmittant. Quamquam etiam perforati dici possint^q musculi, qui secundo digitorum quatuor manus & pedis ossi tendines, qui id flectant, largiuntur, quoniam illi tendines longa sectione diuisi, subditum ipsis tendinem ad tertium digitorum os per ipsos cōscendere sinant. In magnitudine autem musculi uariant, quod alij maxima constant mole, ut maximus corporis^r musculus, qui toti propemodum femoris longitudini implantatus, femoris motorum quintus numerabitur. Deinde magnus quoque est femur mouētium^s primus, insuper & tibiæ motorum nonnulli, præcipue autē^t septimus et octauus, sic & pedis motus autorum^u quartus, à fibula principium obtinens. Minimi uerò sunt^x, qui in tertiæ cartilaginis laryngis basi reponuntur, & qui primam cartilaginem secundæ copulant, dein proprii laryngis ferè omnes, ut & penis musculi. Reliqui in horum medio consistunt, nunc maioribus, nunc minoribus accedentes. Omnibus musculis ferè communis obtingit color, ubi enim carne uacant, nervosorum corporum modo al-
bent, quod in principijs & enervationibus præcipue accidit, ubi autē carne abundant, carnis quoque modo rubent, cui fibræ nerueæ permiscetur. Porro ea parte qua rubent, interdum candorem unā obtinent, quod illis musculis usu uenit, qui tendinem, priusquam caro desinat, in sui etiam uentris medio educere uidentur. Est autem talis^a, qui à fibula enatus inter calcem & fibulam, suo tendine inferiora pedis subit, atque in os pedis pollicis præpositum inseritur, pedisq; motorum septimus erit. Sunt etiam & eius generis in tibia nonnulli, quemadmodum & in cubito. alij tale quid in ipsa insertione ostendunt. Musculus enim brachium sursum trahens, propter ipsam insertionem, interna quidem sede, qua os respicit, candicat, externa autem magis rubet. Alij musculi aliqua sui parte prorsus liuidi plumbeiue conspiciuntur, ut fure^c musculorum facile maximus, qui pedem mouentium quartus recensetur, deinde & nonnulli ab ilium osse enati, & præcipue^d qui ex illis articulum proximè integrit, femurq; mouentiū tertius erit, præterea & ex tibiæ motoribus aliquot, præcipue autem septimus & octauus, ubi nonus illis incumbit. Liuior iste musculis accidit, peculiaris ipsorum membranæ gratia, quæ interdum adeo crassa est, ut prorsus non uideatur pellucida, unde quum crassa nerueaq; sit, & caro subtrus rubeat, aut nigricet potius, facile color ex nigro & albo permixtus cōsurgit. Quamuis nō idem carnis rubor in omnibus hominibus occurrat, uti sanè neq; sanguinis, quo caro enutritur, natura eadem est. Porro albam hanc musculi substantiam, quæ adhuc excarnis est, in sermonis contextu nerueam, quasi diceremus ligamentosam, appellabimus, hac uoce illam à carne distinguētes, uerū quæ in harū partium media est, non inopportune liuida nobis uocabitur. Par etiā situs omnibus musculis non contigit, quoniam alij ad corporis habentur superficiē, cutiq; accubunt, ut omnes ex carnea membrana cōstituti, et alij innumeri, quos ferè semper inter articulorum motores primos recensēbo. Alij penitus reconditi delitescunt, ut in poplite latitans^f musculus, pubis ossium foraminibus proximè^g attenti, sub stomacho latitantes. Alij rursus secundum membri longitudinem locantur, ut omnes in tibia repositi, illo tantum excepto, qui in poplite occultatur, obliquum^h quæ situm sibi peculiariter uendicat, ut & illi qui radij mediæ propemodum longitudini inseruntur, proprijsq; radij motibus subserviunt. Transuersum autem ferturⁱ, qui iuxta brachiale locatus, radium in pronum mouet. Quin etiam diuersum musculorum situm, seu potius fibrarum ductum, abdominis musculi eleganter ostendunt, quoniam alij oblique deorsum in priora ferantur^k, alij sursum oblique in priora, alij recta sursum, alij prorsus orbiculatim transuersimq; feruntur. Fibrarum genus omnibus ferè musculis unum duntaxat simplexq; est. Nisi enim^l musculo brachium pectori adducenti, & etiam illi qui^m secundus inter scapulam mouentes est, duplex, & genarum laborumq; musculis multiplicis adhuc fibrarum genus tribuerimus, singulis prorsus musculis, unicum tantum fibrarum genus, musculorum ductui & formæ magna ex parte respondens ascribetur. Musculi autem, quos ab aliorum numero uidebamur secludere, ita se habent. Musculus brachii pectori admoens, fibras quasdam ex superioribus deorsum, uersus exteriora ductas exigit, quasdam uerò ab inferioribus sursum, etiam uersus exteriora. Qui scapulam mouentium secundus est, quasdam à superioribus deorsum in priora, seu extrosum protensas quoq; obtinet, alias autē ab inferioribus sursum similiter in priora, aut extrosum. Vnde illis duobus duplex fibrarum genus accidit, quæ in illo cuius ope brachium pectori admoemus, in aliqua sui sede, idq; potissimum iuxta insertionem, instar x se interfecant, seu decussatim feruntur. Illi autem, qui inter scapulam mouentes secundus censetur, nulla obtingit fibrarum intersectio. Rursus si libra mouentium musculorum, qui ab inferiori maxilla, & malis ortum ducunt, inspexerimus, uariam profecto fibrarum iuxta insertionem differentiam intuebimur. Quemadmodum & latum musculum, qui carne constat membrana, fibras rectas, obliquas & transuersas

exi-

A magnitudine.

A colore.

Neruea musculorum pars.
Carnea.
Liuida.
Differentia à situ.

A fibrarum genere.

q 54. o.
14. o.

r 13. tab.
17. 2.

s 9. tab.
t 5. tab.
u 6. tab.
x 13. tab.
y 6. 7. 8.
cap. 21.

a 6. tab.

b 4. tab.

c 13. tab.
d 11. tab.

e 5. tab.
f 5. tab.
g 5. tab.
h 5. tab.
i 5. tab.
k 5. tab.
l 5. tab.
m 5. tab.
n 5. tab.

f 14. tab.
g 16. tab.
h 8. tab.
i 6. tab.
j 7. tab.
k 14. tab.
l 3. tab.
m 4. tab.
n 5. tab.
o 6. tab.
p 3. tab.
q 9. tab.
r 3. tab.
s 4. tab.

N.

exigere conspiciamus, & prout etiam diuersæ fibræ his musculis obtingunt, ita quoque diuersis famulantur motibus, pro harum illarumque fibrarum tensionis remissionis ratione. Ad hæc, quid de lingua dicemus, omni fibrarum genere intertexta: aliud sanè nihil, quàm & musculis diuersas adesse fibras, & has seorsum suis subservire motibus. Nequaquam enim hanc fibrarum in eodem musculo contrariam seriem inficari possumus, & præcipuè in illis musculis, ubi mutua perficitur fibrarum interfectio, seu ubi fibræ decussatim feruntur. Nollem enim adeò aliorum Anatomicorum (qui omnibus musculis simplex & unicum prorsus fibrarum genus ascribunt) placita turbare, ut musculo brachium eleuanti, & multis femur mouentibus, diuersas fibras cum nuper dictis musculis assignarem, ita uidelicet ac si aliud fibrarum genus in musculo brachium eleuante constituam, quod à clauiculis pronatum, deorsum ad infimum musculi angulum, quo humero implantatur, obliquè retrosum tēdit, et aliud quod à scapulæ spina, deorsum etiam obliquè antrosum fertur, & aliud rursus quod à coniunctio ne summi humeri ad clauiculam recto tramite descendit. Atque idem serè de omnibus musculis ex lato in acutum coarctatis, aut triangularibus affirmari possit. Verùm licebit per me ipsis unum fibrarum genus assignare, si modò interim has differentias, à fibrarum ductu petitas, uti nunc serè proposui, subintelleris, ac etiam fibras nō æquè in omnibus musculi partibus collectas, & tenues esse didiceris. In musculis enim acuto capite enatis, & in crassum tendinem finientibus, in uentris musculi medio, ubi is crassissimus est, fibræ tenuissimæ, inuicem propter carnis interuentum magis distant, quàm in capitis & tendinis initio. Alijs autem musculis in principio & origine, plures & magis distitæ, laxioresque obtingunt fibræ, quàm in fine, ut omnibus serè, qui ex lato principio instar trianguli in acutum feruntur, & ampla superficie principium ducunt. Alijs musculis in ortu fibræ magis constringuntur, quàm in ipsa insertione, quod illi accidit musculo, qui à scapulæ basi enatus octo thoracis costis inseritur. Quin etiam id in septo transuerso usu uenit, cuius fibræ plures, magisque inuicem remotæ sunt in ipsa insertione, quàm in capite, uel reliquo ipsius corpore. Alijs propemodum æqualis undecunque fibrarum est ratio, ut illi qui ad brachiale locatus, radium in pronum ducit, intercostales & laryngis primam cartilaginem secundæ necantes, & musculi orbiculares, qui recto intestino, & uesicæ ceruici obducuntur. Alij rursus musculi toto ipsorum corpore recta ferri uidentur, obliquas tamen habent fibras, ut dorsum mouētium sextum par, cuius musculi tendines in apices transuersorū processu præcipuè inseruntur. Verùm illis etiā musculis aliquid priuatiū euenit, qui duobus donantur uentribus, ex quorum albo illi sunt, qui inferiore maxillam deorsum trahunt, atque illi qui à scapulis ad hyoides os porriguntur. His enim in fibris accidit, ac si duo, unus post aliū scilicet, positi essent musculi, qui acutum caput, & terebrem tendinem ostenderent. In musculorum capitibus exortibusque quamplures confurgunt differentie, quarum prima à forma crassitieque musculorum desumi posset, quam superius commemorauimus. Secunda uerò à substantia ad hunc modum accipi poterit, quod alij penitus carnei in exortu appareāt, fibris duntaxat raris & incompactis interstincti, ut qui ab ilium os se femur accedunt. Alij neruei in ortu apparent, et rursus quidam ex his illico in ipsius ossis contactu carne euadunt, ut maximi in sura musculi origo, & in externa internaque cubiti sede pluriū musculorum principia. Quidam uerò longo ductu neruei permanent, priusquàm carnē adipiscantur, ut inter reliquos tibiā mouentes, qui tertium caput à coxendicis ossis appendice assumit, & tibiæ motorum quintus censetur, dein musculus brachium deorsum ad dorsum trahens. Alij unico quidem capite oriuntur, atque id haud secus, quàm si duo obtinerent. Alia namque principij pars aliquouſque neruea apparet, alia prorsus carnea, quod rectis abdominis euenit musculis, quæ ex pubis ossibus enascuntur, dein duobus ex radice capitem femoris principium ducentibus, & calci insertis. Alij duo exigunt capita, & unum nerueum prorsus est, longoque ductu tale permanet, alterum uerò, ut rectorum abdominis musculorum principia, carneum nerueumque simul uisitur. Atque id in anteriori cubitum flectentium musculo cernere est, cuius caput à scapulæ ceruice enatum, prorsus nerueū cernitur, quod uerò ab anchoram imitanti processu enascitur, nerueum carneūque existit. Atque hic musculus illico monstrat, quosdam musculos plura habere capita, in ipso exortu inuicem neque continua, neque contigua, hoc nanque ultimo commemorato euenit musculo. Alijs unicum est caput, ut uniuersis qui tibiā cubitūque amplexantur, quibus omnibus aut in inferiori, aut superiori parte capita sunt, septo tamen transuerso caput in medio consistit, non autē in altero extremorū. In uentribus musculorū differentia, præcedentibus differentijs serè omnes explicatæ sunt, quū musculorū formas, & fibras recenserem. Neque hīc aliud addendum est, quam uentrem musculi illic propriè reponendū esse, ubi fibræ musculi inuicē minus compinguntur, ac copiosiore carne continentur

*Galenus cum
alibi sepius,
tum maxime
ubi cor, nō esse
musculum pro
bare nititur.*

*A fibrarum
compactis.*

*A musculo
rum capitibus*

*A uentri
bus.*

continentur. Vnde quibusdam musculis, in ipso exortu uentres potissimum habentur, ut qui ab ilium osse in femoris os inseruntur, alij ad finem, ac ad insertionem magis, quam ad caput, ut septum quod carnosius in extremis, atque ipsis adeo insertionibus, quam alibi conspiciuntur. Alijs musculis uentres statim ab ortu incipiunt, ut suram constituentibus. Alijs musculis uenter longius ab ortu conspicitur, ex quorum numero is est, qui brachium deorsum ad dorsum trahit, & unus inter tibiae motores, qui a coxendicis ossis appendice enatus, suum caput diu neruofum nanciscitur, tibiaeque mouentium quintus mihi habebitur. Alijs uenter per uniuersum musculi corpus permanet, ut intercostalibus, & illi qui ad brachiale repositus, radium in prouum agit, & laryngis non pauci. Atque ita aliqui musculi uentrem ad ipsam usque insertionem seruant, ut nunc postremo commemorati. Aliorum uentres longe admodum ab insertionem distant, ut musculi illius, qui a femoris externo capite natus, in calcem tenuissimo longoque tendine fertur, & illi omnes qui ex cubito tibiae procedentes, digitorum motibus famulantur, & is qui membraneum tendinem, musculis secundum femoris longitudinem protensis obductum educit. Alij rursus geminum uentrem ostendunt, cuius generis musculi sunt, quos paulo ante inferiorem maxillam deorsum trahere, & quos a scapulis in hyoidis os pertinere dicebam. Deinde recto abdominis musculo ex abundanti quaedam transuersim ductae impressiones insunt, quae illos musculos ita exornant, ac si pluribus uentribus efformarentur. Huiusmodi uero impressiones seu lineamenta, & circumscriptiones, quas Graeci *μυογενεσις* uocauere, sunt ueluti albae quaedam lineae, in musculari alicuius substantia impressae, quarum quum frequens nobis mentio incidet, non abs re feceris, si has in rectis musculis atque ijs etiam, qui sub stomacho laitant, in musculorum tabulis intueri non grauaberis. Quae a tendinibus lumi possent differentiae, iam ferè ex commemoratis etiam pendet. Quidam enim tendinem enervationemue prorsus non desinunt, ut laborum musculi, & rectum intestinum, & uelut ceruicem ambiens, & laryngis omnes, illis tantum exceptis, qui recto donantur situ, ac secundae cartilaginis tertiam committunt, hi siquidem in insertionem nerueum quid commostrarunt. At non solum illi qui aliud praeter os mouent, tendinibus destituuntur, uerum etiam si secus in Primo de Musculorum motu Galenus sentiat, eorum quibus ossa mouentur, quam plurimi tendinibus carent, neque in insertionem magis nerueum quid, quam omnes musculi in suis uentribus commostrarunt. Est autem eius classis in manu, qui pollicem indici proximè ad ducit, dein duo qui primum pollicis os inflectunt, ac qui ad brachiale positus, radij motus in prouum autor est. Intercostales etiam musculi tendine priuantur, ut ille grandis musculus, qui a scapula ortus octo superioribus thoracis costis inseritur, deinde is qui a clauicula in primam fertur costam. Atque ita etiam insignis musculus inter mouentes dorsum non infimus, qui ab ilium osse in uertebrae lumborum, & infimam costam ducitur, flexionisque dorsi autor est, nullibi nerueum quid ostendit. His accedit septum transuersum, in insertionem nullibi nerueam substantiam exprimens, praeterquam ubi lumborum uertebrae exporrigitur. Neque etiam in homine recti abdominis musculi, ubi costarum cartilaginibus implantantur, tendinem commostrarunt, ut neque in simijs & canibus, quibus ad primam usque costam conscendunt. At in illis quae pectoris ossi exporriguntur, in medio ductu nerueam naturam habent, ac si inter illos prorsus reponendi essent, qui duos uentres exigunt. Neque etiam complures musculi, in occipitij os capitis motuum gratia inserti, tendinem magis in insertionem, quam in ipsorum uentre ostendunt. Porro alij musculi tendines habent, ut eorum qui aliud, quam os mouent, sex oculi musculi, septimus enim in nerueam substantiam non desinit. Ex musculis ossa mouentibus omnes, qui ex cubito extremam adeunt manum, tendinibus ornantur. Tendinum autem quidam, lati membranique sunt, ut sex oculi musculorum tendines, & obliquorum, & transversorum abdominis. Alij omnino teretes, ut qui ex cubito procedentes, digitos flectunt. Alij paulo minus teretes, & latiores non nihil, quam profundiores, ut tendo in calcem insertus, & tendo in latum cessans tendinem, priusquam brachiale attingit. Et alij tendines breues sunt, ut circumuertentium brachium musculorum tendines, & radium mouentium, qui circa mediam radij longitudinem insertionem habent. Alij autem longissimos edunt tendines, ut musculus ab externo femoris capite natus, & gracilem tendinem, priusquam genu articulum prorsus superauit, educens, quin etiam is qui latum in manu educit tendinem, & omnes qui ex cubito & tibia procedentes, digitorum motibus subseruiunt, & praeter nonnullos tibiae insertos, is etiam, qui ex ilium osse natus, in maximam membranam omnibus femoris amplexantibus musculis obductam desinit, ac tibiae ossi, fibulaeque inseritur. Musculi qui tendines educunt, illos alicubi ab extremo porrigunt. Temporalis tamen, ex sui corporis medio tendinem emittere, Galeno in Libris de Vsu partium dicitur. Quid autem hac de re sentiam, Capite de Musculorum

Musculorum
impressiones

Tendini-
bus.

u 8 ta. h. sculorum maxillam mouentium inferiorem scribam. Priuatim etiam robustissimo tendini, ad
 x 2 fi. i. ad. tibiae extensionem auxilianti, os ipsa nimirum patella innascitur. Sic & tendo ex tibia inter fi
 15 X. bulam calcemq; ductus, & sub cubiformi osse, priusquam in pedis os, quod pollicem sustinet,
 inseratur, protensus, quâ sub illo osse reflectitur, instar ossis, durioris uel cartilaginâ indure
 7 stab. o. 6 scit, modicè ibidem dilatatus. Rursus unus musculus plures educit tendines, singulos quasi
 14. 2. ex priuatis sui uentris carnosâ propaginibus educens, ut qui in cubito locati ad quatuor di
 14. 14. tit. 2. gitorum manus flexionem auxiliantur. Alij unum quidem educunt tendinem, at is postmo
 dem d. dum in plures discinditur, ut musculi ex tibia enati tendo, qui in pedis planta, tertijs quatuor
 b 11 ta. A. digitorum ossibus tendines exporrigit, deinde qui bicorni tendine in postbrachialis ossa in
 c 9 ta. 2. feritur, atq; ad brachialis extensionem iuuat. Qui autem indicem mediû, & anularem manus
 extendere creditur, in harum differentiarum medio consistit. Hic namque neque plures edu
 d 14. tab. 11. cit tendines, neque etiam ipsius tendo in plures diuiditur, sed mediû quid inter iam dictos
 o. 5. existit. Rursus plures musculi unum efficiunt tendinem, tres enim surae maximi, tendinem u
 e 13 tab. 6. num in calcem inferunt. Insuper & cubitum extendentes musculi, in unum coeunt, unamq; si
 d. e. mul insertionem efformant. Præterea & tres tibiam extendentium maximi, in unum quoq;
 f 8 tab. 2. b. tendinem, cui patellam innasci diximus, colliguntur. At de musculorum numero & concursu
 i dem h. aliquid nunc subiiciendum uenit, & si quid ex musculorum differentijs omissum sit, quum se
 22 fi. lib. orum singulos percurrâ, in Libri huius progressu explicabitur. Quemadmodum & hæc esse
 54. possit, musculos quosdam habere, qui suo motui opponuntur, alios, ut flexcentibus digitos
 fi. ca. 51. opponuntur, qui eosdem extendunt. Sic qui caput inclinant, contrarios exigunt, qui idem rur
 13. C. sus in posteriore reuolunt. At quidam motus sui nullû habent cōtrarium, tertium nanque mu
 i 2. 5. 4. 13. sculis nulli, qui testes deorsum trahant, opponuntur. Neque etiam anum sursum uellentes,
 64. 22. K. qui eundem priuatim deorsum trahant, oppositos adipiscuntur. Vt neq; etiam circulares illi, qui
 recti intestini finem, & uesicæ ceruicem amplexantur, & postmodum musculi à nobis inuen
 ti, laryngis operculû, quod ὀμφαλὸς Græcis dicitur, sursum atq; in anteriora mouent, nul
 los quoq; oppositi motus socios obtinēt. Sic etiam à musculorû munere differētia pendet, quû
 alij rectis præfint motibus, ut qui quatuor & manus & pedis digitos extendunt. Alij duntaxat
 obliquis subministrant motibus, ut radij motores omnes. Alij utrinque motum præstant, si
 enim à pectoris osse, & clauicula enatus musculus, ac in mamillarum occipitij ossis proces
 sum insertus, qui in dextro est latere, unâ cum sinistro contrahitur, caput flexionem rectissimâ
 experitur, si uerò is solus, qui scēte sinistro agit caput sinistrotorsum, in anteriora circūuertitur.

*A. Mitræ mu.
sculorum in uis
cio oppositio
ne.*

A. munere.

DE MUSCULORVM NUMERO,

Caput IIII.



RDVVM difficileq; esse, musculorum numerum persequi, ac semel, quot
 uniuerſi corporis sint recensere, præcedens de Musculorum differen
 tijs Caput liquidè satis commonstrasse or, non sanè quod illum descri
 bere prorsus impossibile sit, sed quod uaria eadēque non admodum
 absurda, de musculorum numero unicuique sententia esse possit. Ali
 quis nanq; unum dicit esse musculum, qui brachiû pectori adducit eo,
 quod nulla sui parte sibi non continuus contiguusque sit. Alijs uerò du
 orum musculorum loco illum fortassis censendum contendet, quod omnes fibræ ipsius non
 parem ductum obseruent, ipsæq; musculus utcunq; contrarios motus obeat. Eius enim pars,
 cui clauicula, & media pectoris ossis pars clauiculæ proxima, principium præbent, deorsum
 obliquè, uersus musculi in brachiû insertionem suas fibras porrigit, & brachiû pectori ela
 tius, quasi ad guttur clauiculamq; trahit. Inferior autem pars, quæ à reliqua pectoris ossis sede,
 & quibusdam costarum cartilaginibus enascitur, sursum obliquè ad brachiû fibras dirigit,
 brachiû que humiliori pectoris sedi adducit. Vtrisque autem musculi partibus in se colle
 ctis, brachiû pectoris medio admouetur. Præterea ad hanc musculorum continuitatem, &
 unius instar partis circumscriptionem, & nullam, ut inter duos digitos manus, sectionem, sed
 diuersum fibrarum ductum, ac latum musculi principium, diuersumq; eiusdem munus non
 solum, quem nunc recensimus, musculum quis referre potest, uerûm & illum, quem inter
 scapulam mouentium secundum recensēbo, qui continuus quidem est, attamen superiori
 sua parte sursum, uersus occipitium scapulam attrahit, inferiori uerò deorsum uersus dor
 sum. n. tedia autem fede, aut utraque ipsius parte, rectâ retrorsum scapulam mouet. Dein
 huius musculi fibræ supra scapulæ spinam conspicuæ, deorsum in exteriora feruntur. quæ

*Alijs alit nu
merû propter
fibras statui.*

V autem

rioritibz sede magis adhuc est conspicuum, ad medium enim longitudinis tibiz, à musculo quatuor pedis digitos extendente, carnosus educitur musculus, qui in pedis os minimo digito præpositum inseritur, atque ad pedis elevationem in anteriora iuuat, quum digitorum inter tendines, digitos extendant. Adeo utalicui uidebitur, duos hic enumerandos esse musculos, alteri uero unicum, prout hic exortus continuitati, ille uero diuersis tendinibus, & in uaria ossa insertionibus differentiibusq; functionibus animum adhibuerit. Neq; minorem in numero obscuritatem parit, mutuus musculorum connexus. Qui enim à pectoris ossis summo enati, in os v referens inferuntur, internis suis lateribus adeo inuicem adnectuntur, ut quis hos duos esse, alius autem unicum non ineptè dixerit. Quod etiam illi commonstrant, qui à circulari ani musculo enati, uesicæ meatum, ubi primum sub penis corporibus exporrigi incipit, tanquam duo digiti, amplexantur. Numcri etiam musculorum obscuritatem auget eorum dem concursus, ex quorum albo si quis alius, ille profectò est, qui à coxendicis ossis appendice enatus, ualidus deorsum fertur, & ad mediâ femoris lōgitudinem nerueus factus, alteri carnosæ parti connascitur, cui femoris os initium præbet. Atq; ambæ partes, ea scilicet quæ à coxendice ducitur, & ea quam femori ascribimus, unum tendinem simul efformant, elatissimæ fibulæ parti robustissimè insertum adeo, ut & unum & duos musculos ab aliquo hunc recenseri nihil prohibeat, dummodo à uera descriptione non declinetur. Erit autem is tibiam mouerit quartus, in hominibus & simijs conformatione plurimum differens. Simiæ enim musculo à femore nihil adnascitur, sed is unicus, ualidus & latus est musculus, qui ob hoc etiâ Galeno semper Latus nūcupatur. Atq; hinc fit, ut toto sermonis progressu accuratè mihi de musculorū numero cōstituendum sit, ad quos iam tempestiuum est accedere, ne prolixius in generali musculorum explicatione hæsisse uidear. Cæterum ne quid obscuritatis sequens pariat oratio, & præcipuè quum cutis motores pertractaturus sim, aut quoties crebra Carnosæ mēbranæ mentio incidet, nunc cutis & membranæ eius naturam prosequar.

*A mutuo con
nexu.*

A concursu.

*Secundo Li.
de Animi
stransmissi-
onibus.*

DE CVTE, CVTICVLA, ET MEMBRANA

per uniuersum corpus cuti subiecta, præterea & adipe inter cutem
membranamq; carnosam reposito. Caput V.

PARTES hoc Capite describendæ aliter delineari nequeūt, quàm uigesima Quinta libri figura utcuq; exprimuntur, iuxta r, s, t, dein & in uigesima quinta figura eiusdem Libri, iuxta dextram mamillam. Verum istæ partes tales omnino sunt, quas citra omnem figuram nemo non nouit, si modo aut ipse sectionem aliquando aggressus fuerit, aut secanti astiterit.



CUTIS, omnium corporis partium est indumentum, corpori instar natiui tegumenti obductum, non duntaxat omnium hominis partium, sed uniuersæ substantiæ, quam generationi & corruptioni subiectam scimus, duritiæ mollicitq; media. Est enim cutis, ueluti sanguine præditus neruus, ac inter neruum carnemq; quiddam planè mediū perinde, ac si ex mixtis utrisq; constitueretur. Cæterum neruus omnis, exanguis est & frigidus. caro, multo sanguine prædita calidaq;. Media inter utrunq; est cutis, nec planè exanguis, ut neruus, nec sanguine abundans, ut caro. Cutis hæc in homine, Herophilodicta, boum & equorum tergoribus, ex quibus coria adaptantur, respondet, & non pari ratione omnibus subiectis ipsi partibus adhæret, cōnectiturq;. Secus enim in manus uola & pedis plâta subditis partibus adnascitur, aliter rursus in frōte sibi subditæ musculosæ substantiæ, & aliter in labris, palpebris, auribus, naso, ano ac pudēdo, & aliter per uniuersum corpus, substratis partibus cutis committitur, ac inter secandum, diuersa ratione à subditis auferitur. Deinde in omnes cutis regiones non æqualis est neruorum distributio, nec cutis etiâ undecunq; eadem crassities. Internæ enim manuum cuti, plurimæ neruorum fibræ porriguntur, uerticis uerò cuti paucissimæ. Quinetiam faciei cutis mollior & tenuior, uerticis autem, & plâtarum pedum durior uisitur. Quæ internam summæ manus sedem inuestit (nisi labore callosior euaserit) exquisitissimè in duritiæ mollicitq; inter reliquam cutem, & omnia prorsus corpora, media est, quàm proximè æquali ad pondus temperamento accedens. Vt cunq; uerò sit, cutis homini pro magnitudine corporis tenuior, quàm animantibus quadrupedibus obigit, quàm etiam homini profectò in uertice, dorso, cruribus & pedis planta crassa sit admodum, sed non omnibus æqualiter. Quinetiam aliæ cutis partes prorsus immobiles sunt, & circumactum per tinaces, ut uolæ & plantæ cutis, aliæ uersatiles quidem sunt, sed nullo aguntur motu uolū-

CVTIS quid

Cutis substantia.

*Cutis differētia
A connexu.*

*A neruorum copia.
A molli-
tie.*

A motu.

rio, ut tota corporis cutis, ea excepta quæ mouetur, est autem hæc frõtis & faciei uniuersa, & quæ anteriorem colli sedem, latera quoque complectitur. Atque hæc motu participat, aut proprijs in hoc famulantibus musculis, ut frõtis, colli, genarum & labrorum, aut uicinæ ipsius cutis gratia, ut malarum cutis, quæ musculis destituta, simul cum proxima ipsi cute mouetur. Quod

A pilis.

A foraminibus.

CUTICULA quid.

Cuti uenas, & arterias ac nervos porrigit, ipsamque sensus esse comitem.

CARNOSA membrana.

Præfens membrana cur carnosa dicatur.

Quemadmodum neminem latere scio, cutem maximam totius corporis partem esse, perpetuo contextu efformatam, nisi quod tenuibus foraminulis, ad fuliginosorum excrementorum propulsionem, & pilorum generationem paratis, peruia sit, atque etiam in palpebris, naso, auribus, ore, ano, pudendo, & ubi unguibus uiam præbet, interpelletur, perforata quoque conspiciatur. Ad hæc, ex cetera cutis regione, interna summæ manus cutis (ut & pedis plantam inuestiens) maxime continua, minimeque perforata uisitur, quod & nuper natorum cuti aliquibus ascribere reliquit. Verum hæc singula haudquaquam ociose, neque frustra facta esse, suis locis, quum de his partibus, quæ cute obteguntur, priuatim agendum erit, demonstrabo. Cuti, quam *diuina* Græci uocant, alia cuticula tenuis admodum, & prorsus exanguis obducitur, supernasciturque, propemodum ceparum tenuioribus ac pellucidis respondens involucri, nisi quod alicubi & præsertim in uola, & pedis planta, crassior duriorque uisitur. Hanc quum cutis uelut quædam efflorescentia sit, *ωδολογία* Græci appellant. Si uero aliquando attritu in scabie, aurin uulneribus ex unguentorum applicatione, aut ignis admotione, aut feruentis aquæ infusione, aut ex longo itinere auferatur, & interdum uesciculæ ac papulæ instar a cute abscedat, promptissimè aliterque ac uera cutis renascitur, quæ sola sanguinis & uitalis spiritus compos est, ob quod uenarum arteriarumque alicubi, & nervorum tenuissimæ partes, finesque ad eam conflunt, ipsamque simul concretæ quibusdam efformare creduntur. Neque sanè audiendus est Aristoteles, cutem sensu destituens, non secus, quam si carnis cuti subditæ duntaxat beneficio tactus sensus perficeretur, quum cuti proprios, certaque serie nervos exporrigi ex Anatome condicamus, illi precipue, quæ in facie est ac brachio, cubito extremaque manu, deinde & cruribus & pedibus. Per reliquum autem corpus, etiam si non ordinata serie nerui ad cutem deducantur, attamen complures in illam desinunt, sub ipsaque & potissimum ad thoracis latera exporriguntur, membrana cuti subdita (ut & uenæ ipsæ) suffulti, quemadmodum etiam in Quarto libro, qui Neruis de dicabitur, enarraturus sum explicatius. Atque ita musculorum (quos Carnem Aristoteles appellabat) gratia cutis nequaquam sentit, uerum uti diximus propriorum nervorum occasione. Et quanuis uerticis cutis obscuriori sensu sit prædita, attamen sentit, utcumque etiam in commo distissimum Naturæ fuerit, sursum ad uerticem nervos distribuere, ipsaque etiam cutis hic non admodum sensu indigerit. Deinde quis non quotidiana experientia edoctus, cutem a subditis musculis aut ossibus quoque auulsam, & postmodum scalpello ictam, unguibusque compressam sentire non didicit? Neque est, quod Aristotelis sectatorum quispiam hic, nescio quam, Terrestritatem mihi astruat, quum nerui a dorsali medulla enati ipsa cute duriores sint, & his adhuc ipsi tendines, quos potissimum facile affici, nemo inficiatur. Imò si non minus ratione, quam experientia simul fides habenda erit, ausim asserere, musculorum uentres quamplurimos (ut quorundam femur amplexantium) obtusius quam ipsam faciei manusque cutem affici. Atque etiam mihi ridendi uidentur, qui cutem ob hoc sentire posse auersantur, quod nullum hic sit medium, quasi uerò etiam nerui proprijs membranis prorsus denudatæ, aut etiam in medio diuisum grauissimè affici non uideremus, quoties ipsius denudatæ substantiæ acriores pulueres insperguntur. Etsi medium etiam præter rationem in tactus sensu desiderarem, nonne in promptu est ipsa cuticula cuti obnata, & interim (ut putamus) sensu priuata? At nunc membranā quoque aggrediamur, cuti per uniuersum corpus subditam, quæ cuticula longè robustior crassiorque est, & fibris quibusdam raris, his, qui substernuntur illi, musculis adheret, connasciturque, cuti uerò pertinacius committitur. Siquidem quamplurimæ uenæ, & paucissimæ tenuissimæque arteriæ, cutem nutriendas, & nervorum propagines cuti sensum communicantes, hanc membranam transeunt, ipsaque inter cutem, et illam prorepentia hac suffulciuntur, membranamque cuti copulant, præter continuā quandam, sibique proximam fibrarum membranearum seriem, cuius etiā beneficio membrana ualidissimè cuti connascitur. Hæc non eandem in uniuerso corpore crassitiem obtinet, uerum quibusdam corporis sedibus, carnosissimis fibris adaugetur, & crassior reddita, adeo carnosa efficitur, ut musculi nomine donetur. Huiusmodi regio, in tota colli amplitudine habetur, & in fronte, et in reliqua propemodum facie, quibusdam autem animalibus undecumque ferè carnosus oppletur fibris, et præsertim illis, quæ totius corporis cutem (ut nos frontis) mouent. Audio & homines fuisse, qui in thoracis regione, & alibi etiā in corpore cutem mouere

a 3ta. r. b 3ta. d. ad in eius tabula facie.


QUI CUTICULAE, CUTIS, ADIPIS, ET
carnosae membranae natura per sectionem obseruari debeat.

Caput. VI.



TI praecedente Libro, postquam ossium cartilaginumque historiam absolui, rationem modumque tradidi, quo quis haec ad disciplinam opportunè sibi parare queat, ita quoque hoc Libro omnium, quae seriatim tradentur, secandi artificium post cuiusque enarrationem subiungam, ut quis in uno corpore omnem musculorum ac ligamentorum Anatomen rectè aggreffurus, & ordine absoluturus sit. Partium uero quae in sequentibus Libris describentur Anatomen, prout illic commodius fore putauero, suis locis subiiciam. Nunc autè cuticulæ, cutis, adipis, & membranae naturam hunc in modum aggredipossis. Nouacula acutiori, in abdomine, aut quacunque uisum fuerit corporis parte, cutem ad adipem usque recta sectione, & deinde transuersa (ut saltem unum, aut plures angulos moliaris) incides, tam leuiter ac moderatè cuti nouaculam admouens, ut solam ipsam, illam interim carnea membrana, diuidas. Quod sine negotio in homine facies, & praecipuè pinguiori, quum subinde, & potissimè in mulieribus adipis crassities, duorum digitorum latitudinem in thorace & abdomine superet, in coxis autem ac clunibus etiam palmae latitudinem, in mulieribus non nimium obesis uincere, in publicis sectionibus uidimus. Ac proinde sectiones ducende sunt eo accuratiùs, quo macilentius obtigerit corpus. Deinde etià conandum est, ut hanc sectionem citra negotium obire assuecas, cum propter musculos ex carnea membrana conformatos, tum ad discendam neruorum seriem, quam inter cutem membranamque hanc ferri dicemus, & propter innumeras quoque uenas, quae in hoc diligentius erunt discendae, quòd nullas in morbis incidamus, nisi carnea membrana suffulta. Postquam igitur cutem ad adipem usque (nò tacta interim carnea membrana) diffecueris, hamulo aut unguibus, in aliquo ex sectionibus angulo cutem attolles, & diligenter transuersis acutiori nouacula, ad cutem ductis sectionibus, cutem ab adipe, quo usque liberit, separabis. Cuti deinde reflexae ardentem candelam admouebis, ut cuticula ignis ui uesiculae instar abscedat, seorsimque cutem, & cuticulam intuearis. Dum uero cutem ab adipe liberas (quod nisi laborum patiens, discendi cupidus fueris, non diu inde fessè facturus es) neruulos indagare conuenit, & uenas, quae super membranam in adipe praeerrepentes cutem adeunt, deinde ipsa quoque membrana fibris illis frequentibus cuti commissae, sedulo inspicienda est. Iam si obesum ad manum sit cadauer, adipem à membrana liberare contendito, quod eadem prorsus ratione, qua cutem ab adipe seungebas, praestandum est. Cauendumque, ne membrana oscitanter cum adipe auferatur, in quo nostrae aetatis Anatomici aberrarunt, eam membranam in homine reperiri incipientes, atque ita hac potissimum occasione necessariò, ut reliquos corporis musculos, & uenas & neruos, ita etiam ignorantes musculos, ex carnea membrana constitutos, & per illam exporrectas uenas & neruos. Ablato adipe, leuè sectione per carnosam membranam ad subiectos ipsi musculos usque induces, & parua opera, solis ferè digitis per transuersum hinc inde actis, aut buxæ cultello, aut, si uoles, nouacula, illam à subditis partibus separabis, atque aliam membranam à cute separationem esse disces, quam membranam ab illis, quibus incumbit corporibus, auulsionem, quam Herophilus *Alagorij* nuncupauit. Haec enim factu facilis est, ocyusque perficitur, illi operationi penitus respondens, qua bobus, uiculis, ouibus, leporibus cutem citra negotium auferri uidemus, imò auulsio haec adeò prompta est, ut solo flatu hcedis, agnis, & etià iunioribus uiculis, membranam hanc cum cute, à subditis corporibus separari indies cernamus. Verum cutis ab adipe aut à membrana separatio, nisi frequentissimis sectionibus, acutissimisque nouaculis completur. Quod etiam & lanij nos docent, quoties sub axillis cutem auferre conantur, carnosam membranam corporis bouis adnexam (ne nimium carnis auferant) relinquentes. Neque ista tantum uel apud lanios discuntur, uerum etiam cuticulæ naturae, quum lanij obustos prius porcos deradunt, aut potius, quum calidæ aquae ipsos immergentes, pilos unà cum cuticula defalcant.

ANATOMICORVM INSTRVMENTORVM DELINEATIO.



CHARACTERVM SEPTIMI CAPITIS FIGVRÆ INDEX.

PRÆSENTI figura mensæ cuidam incumbentem finximus asserem, quo in ut
 uorum sectionibus opportunè utimur, dein huic asseri omnia propemodum accommodauimus, qui-
 bus in dissectionum administrationibus, adeoq; tota Anatomie quis posset uti. Quo autem singu-
 la leuiori opera assequaris, huic etiam figuræ characteres, ac demum eorum indicem adhibere
 non grauatus sum. Indicetur itaq;

- A, A Mensa, cui reliqua omnia modo seriatim indicanda supersternuntur.
 B, B Asser utius sectionibus administrandis idoneus.
 C, C Varia foramina, quibus laqueos pro animalis mole adhibemus, quæ femora et brachia uincimus.
 D, D Eiusmodi anuli, summis manibus pedibusq; ligandis adaptantur.
 E Huic anulo maxilla superior, libera inferiori, catenula alligatur, ut caput immotum seruetur,
 ac interim neq; uox, neq; respiratio uinculorum occasione præpediantur.
 F, F Diuersa nouacularum genera, quibus spongia accumbit.
 G Cultelli ad earum speciem formati, quibus calami adaptantur.
 H Vulgaris qui mensæ adhibetur culter. I. Grandis ac ualidus culter.
 K Cultri è buxo parati. L Hamuli. M Varij styli una cum siphone.
 N, N Obliquatæ acus cum filo crassiore, quibus literarum fasciculos colligamus.
 n Minores acus, quas uulneribus suendis accommodamus.
 O Serræ P Forficula. Q Malleus ligneus.
 R Arundines inflandis pulmonibus, & alijs quibusdam partibus idoneæ.
 S Filum æneum, ossibus necandis aptum. T Subula forandis ossibus parata.
 V Varia subularum ferra. X Forpex intorquendis filorum extremis comparatus.
 Y Forpex, quo intorti, & ossa iam committentis fili reliquias præscindimus.



Nouacula.

Parui cultri
quibus calami
aptantur.Vulgares cul-
tri.

Buxei.

Hamuli.

Styli.

Siphon.

Acus.

Filum.

VANDO QV IDEM in nouacula hamuliq̃ mentionem incidimus, at-
que in sequentibus, horum ac similium, quæ ad sectionem pertineñt, instru-
mentorum non infrequens sermo occurret, non abs re erit, obiter hinc in-
strumenta, quibus in administratione uti possis, subiungere, etiam si id in
Primi libri calce fieri quoque potuisset. Sunt uerò hæc paucissima, para-
ruq̃ facillima, quanquam tamen adhuc operosiora, pluraque, quam ipse
nunc publicæ etiam sectioni adhibeo, enumeraturus sim. ^a Primum ita-
que plures comparandi sunt cultri, quibus tonfores in radendis pilis utuntur, & quos uulgò
nouacula uocamus. atque ex his quasdam acutas esse conuenit, quasdam autem retusiores,
uerum harum maior semper, quam ipse uelis, futura tibi est copia. Eligendæ sunt minores & le-
uiiores, quamuis etiam grandes aliquot adesse nihil prohibeat, plures autē cōmendæ sunt, aut
à tonforibus petendæ, quòd leui quaq̃ occasione in membranis, aut tendinibus, ligamentisq̃
fundendis corrumpantur, atq̃ quum fragili admodum consent ferro, promptè exiliant, præ-
cipuè si nouas, & acuendo non detritas, operi adhibueris. Quibusdam ex his, & potissimum
minoribus, illud ferri tuberculum non inutiliter aufertur, quod cultrum extra manubrij recti-
tudinem extendi prohibet, atque id tunc in primis tentandum est, quum nullæ reperiuntur
nouaculae obliquo constructæ manubrio, quales illi sunt, quibus nostrates & Galli tonfores
utuntur. Italis enim rudes, & magnis erectisq̃ capulis seu manubrijs cultri in usu sunt, quorum
capuli subinde in obliquis sectionibus incommodo esse solent, unde etiam quo minus manū
ex sententia inflectas, obstaculo sunt. ^b His paruos cultellos, quibus calami aptantur, acutiores
simul retusioresq̃ addendi sunt, & ex his nonnullos orbiculato cuspidē, nonnullos uerò ob-
longo acutoq̃ esse cōuenit. Inter reliquos potiores sunt, prorfus ferrei, alijs enim quā trāuer-
sa ligamenta scindere conamur, capulus facillè frangitur, ipsumq̃ ferrum imbecillius, emollita
ex calidæ aquæ lotionē resina in capulis firmatur. Proforus respuēdi sunt incuruati, ac falcibus
similes, quoniam solo propemodum mucrone inter dissecandū utimur, qui introsum in cur-
uis illis cultellis reflexus, difficulter transuersis^c ligamentis subijciuntur. ^d Præterea non inutiliter
adhibentur duo cultri ex illis, quos mensæ apponimus, quorum alter altero longè sit maior,
sed retusior, & ferreus potius, quam chalybeus, aut saltem non impenitè fragilis. ^e Si uisum fue-
rit, poteris his quoq̃ adicere duos è buxo, aut ligno Indico, quo in morbis curandis utimur,
confictos, atque ex his alterum tenuem, & oblonga cuspidē scindēs, alterum uerò latum, & or-
biculari cuspidē esse fines, uerum rarò admodum illis utor, quum retusiores nouaculae semper
ad manum sint. ^f Licebit etiam hamulos duos effingere, illos referentes, quos Capitis initio ap-
pinximus, consueui autē illos parare ex furculis, quæ mensē in dies apponi solent. Si enim fur-
culam acceperis, atque utraq̃ furculæ crura, lima magis extenuaueris, & deinde eorum api-
ces oblique nonnihil instar semicirculi inflexeris, hamulum tibi elegantem paraueris, cuius
mucrones lima ex sententia acutè est integrum, atque ita unum hamulum retusorem, alte-
rum uerò acutiorem adaptare nihil impedit. Quanquam tamen hamulis relictis, unguis sub-
inde operi in eleuandis quibusdam corporibus utilius adhiberes, nisi sinistra manus umbra
sectionē obtenebraret. ^g Insuper stylos oblongos, breues & crassiores, ex argento aut æneo filo
tibi dissecari curabis, & quosdā ex mollissimo maximeq̃ sequaci plūbo ab Aurifabro quopiā
educi trahiq̃ instar filorū fines, hi enim ad uarios usus, & præsertim ad obliquorum ductuū
naturam inueniendam mirè conferunt. Conduxerit etiam siphonem adesse, si fortassis illum
per penem uesticæ indere liberet, ut in eo manuali artificio redderis expertior. Et quemad-
modum nucleum siphoni affingimus, ita quoque quibusdam styli illum adhiberi, & quos-
dam etiam siphonis modo incuruari conduxerit. Neque profectò mediocriter utiles fue-
rint styli aliquot, instar mediæ canalīs extructi, ita nimirum, ut siphones parantur, in quo-
rum cavitatem sectio molitur, ex qua è uestica calculus euellitur, aut ad eam stylo-
rum for-
mam, in quibus pilosi ferici textores seriatim fericum in pilos secant. Conferunt enim eius-
modi styli in illis sectionibus, in quibus membranam longa sectione diuidimus cauentes,
ne quid subditorum aut membrana amplexorum lædatur. ^h Acus habere conuenit, sed ob-
liquatas potius, quam rectas, quod ilico præstabitur, si communes acus prius ignitæ, in-
star C literæ aut (obliquentur. Conduxerit autem & magnas & paruas adesse, quæ scilicet
filū funiculosq̃ graciles transmittant, & præter obliquatas illas, eiusmodi tibi quoque ad ma-
num sint, quibus in consuendis uulneribus utimur, ut eutem aliquando simul fuere ualeas,
quum metuis te absente, aliquid à spectatoribus discendi cupidus uiciandum. His acubus fi-
lum adaptandum est fericum, quo uulnera cōsuuntur, aut peculiare aliquod, si fortassis quæ-
piam confuta dissoluturbarique ab alijs, quum abes, uereris. Cæterum ad uasa religan-

4 F.

b G.

e stab. cha.
13, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9,
d H, I.
e K.

f L.

g M.

h N deim.

da

da uteris communi illo, quo literarum fasciculos colligamus, quod præstantissimum ex Germania in Italiam adfertur, apud alias autem nationes imbecillius & crassius fit, & minus contortum & laue. ^{i O.} Serra uerò, quam interdum operi accommodamus, ea conducet, qua gangræna, aut eius generis affectibus uitata membra præscindimus, non autem orbicularis, ut quidam etiam Mathematici suis Anatomicis libris appinxerunt, nescio, ex quarum linearum ductu arbitrari, orbiculare caput ferra instar falcis messoriae incuruata serrandum esse. Et si fortassis ferra ad manum minime sit, ab illis opportunè petetur, qui pectines cōficiunt. ^{h P.} Forficula, nisi abscondendis post ligationem funiculis accommodata est, quod etiam quouis cultro obitur. ^{l O.} Mallus, si ipsius usus aliquando ad ^{m l.} grandiore cultrum impellendum, quum aliorum animalium effringis caluarias, erit, quiuis etiam aptus est. Non inopportunè quoque ex arundinibus oblongi ^{n R.} calami aptabuntur, quibus minister aliquis, hoc illudue corpus inflare possit. ^{o B. B.} Asferes, quibus uiuas sectiones cōficiamus, paratu quoque faciles sunt, & illos describemus, ubi uiuorum prosequemur Anatomen, quemadmodum quoque ad finem Primilibri ea recensui ^{s, T, V, X, Y.} instrumenta, quibus in compingendis ossibus rectè quiuis uti queat. Sed nunc ad musculos eo ordine, quo in uno corpore omnes diffecari commodè possint, nos accingamus.

Serra.

Forficula.

Mallus.

Canula.

DE MUSCULO FRONDIS CUTEM

mouente. Caput VIII.



Hanc non
iter quam
Tabule
onte deli-
care licet
le, ad h.

ARNEAM membranam, quæ uniuerse cuti subijcitur, quibusdam corporis sedibus carneis fibris augeri, & alicubi in musculi naturam degenerare, prius commemorauimus. Nunc autem pertractabitur, quonam pacto id sub frontis cute accidit, quam *περὶ τὸν ὄφθαλμον* Græci uocant, quæ admodum & ipsi insinuatæ lineas, *σολίστας* & *ἀναγυγὰς* appellant. Homini quidem ut plurimum nullæ cutis partes, quiescentibus ossibus mouentur, præterquam frontis, faciei, & anteriorem colli sedem ambiens cutis. Ut enim supercilia attollantur, & interdum demissa oculi sedem angustam reddant, ipsamque corrugata muniant, frontis cutis uniuerfa, quæ depilis est, simul cum nasi cute, motu uoluntario opportunè agitur, quod carnosæ membranæ, totius frontis & nasi cuti subtense fit beneficio, hæc namque carneis fibris augetur quàm plurimis, & musculosâ reddita, plures neruorum paginae mutuatur. Deinde frontis nasique cuti membrana hæc tenacius, & citra adipis alicuius, aut perquam modici interuentum connascitur, quàm per reliquum corpus cuti adnecti consuevit. Quod etiam alii imposuit Anatomicis, arbitrantibus frontis cutem, carnosam musculosamque substantiam esse, quum cutis non magis hæc, quàm alibi carniformi substantia donetur, sed duntaxat præfens membrana carnosior reddatur, cuti ipsi (quemadmodum iam diximus) pertinacius, quàm in abdomine, aut dorso, aut cruribus connata haud secus, quàm si membrana, unum corpus cum cute esset efformatura, quâdoquidem sic rectè idem motus amborum, membranæ scilicet, & cutis perficitur. Porro huius musculosæ compaginis fibræ, multo ad latera accumbentes, à nasi summo usque ad mediam frontis sedem (quæ inter primas capillorum radices, & supercilia consistit) & ad huius quoque loci latera, carnosiores uisuntur, omnes sursum recto tramite procurrentes, si modò interim perquam raras exceperis, obliquo ductu exporrectas. Atque hæc sanè recta fibrarum series, non perfunctoriè à Medicis uenit pendenda, ne in fronte transuersas potius, quàm rectas moliantur sectiones. Accidit enim, quum transuersim quandoque sectionem inibi, & maxime iuxta supercilia, ubi carnosiores esse fibras dixi, aliquis tentat ad palpebrarum radices, tum supercilia, tum contiguam ipsis cutem deorsum conuolui, & oculos, quibus incumbunt, aggrauare, ut neque aperiri ex sententiâ queant, neque libère suo munere fungi.

Que cutis
des homini
mouetur.

Frontis mus-
culosâ sub-
stantia.

Fibrarum se-
ries.

In fronte trans-
uersas sectio-
nes non sentian-
das.

MUSCULI FRONDIS CUTEM MOVEN-

tis administratio. Caput IX.



ICTAE modò musculosæ substantiæ administratio, duplex tibi erit. Vna quidem, qua cutem simul cum carnosâ membrana, à membrana caluariam cingente, obidque à Græcis *περικρανίου* nuncupata, auferes. Altera autem, qua cutem à musculosâ substantiâ (quantumuis id difficulter fiat) separabis, carneam membranâ capiti affixam relinquens. Ut uerò utranque in uno cadauere ex sententiâ perficias, de tonsis crinibus à uertice, rectâ per frontem & superciliorum medium ad nasi usque extremum

Duplex admi-
nistratio.

34. A.

Prior. extremum sectionem nouacula per cutem duces, deinde aliam in scincipite, secundum coronam
Posterior. nalis futurę ductum, ad tempora, & aurium radices usq; moliere. Ductis sectionibus, in altero latere, hamulo, aut summis digitis, cutis propter sectionum angulos (qui in elatissima frontis sede, & ipso ferè uertice erunt) eleuanda est, ac simul cum carnea membrana ad supercilia usq; auellenda, eodem prorsus modo, quo carnam membranam à subditis musculis separari superius relatum est. At in alio latere, uarias easdemq; transuersas sectiones experieris, donec relicta ad caluariam carnea membrana, cutem commodè ab ipsa, ad supercilia usque adimas, iam in palpebrarum^b musculis incidens. Neque id tam factu arduum est, atque alij uidentur innuere dissectionis procurs, quum uti antea testatus sum, membrana non eo pacto cuti connascatur, ut unum ex ambobus simul confusis corpus confurgat.

DE MUSCULIS PALPEBRARVM.

Caput X.



QUAMVIS tertia musculorum tabula ad characteres C, D, E, hos musculos utcunq; exprimit, hic tamen istam peculiarem locauimus figuram, in qua A primum indicat palpebrę musculum, b uerò C, musculi illius principium, D secundum musculum, cuius initium e notatur. Mutuus autem duorum musculorum connexus, F insignitur.

*Palpebrarum
 constructio.*



*Duos palpebrę
 musculi.*

*Superiorem
 palpebrę cur
 moueri oportet.*

Vnus musculi.

Alter.

PALPEBRAM utranque tam inferiorem, quam superiorem efformat membrana, quæ à caluariam succingente membrana principium ducit, & unum continuum cum adhærente albæ oculi^a tunica corpus existit, deinde & cutis quoque cum carnea membrana. Atque hæc simul ad palpebrarum fines, & ubi^b cartilago cilia erigens constitit, firmissimè uniuntur adeò sanè, ut quatuor hec, cutis nimirum, duæ membranæ, & cartilago illa, quam tarsum uocauimus, simul unita, palpebram, corpus quoddam rarum, & nulli alteri in homine parti respondens constituent. Caterum per reliquã palpebrarum regionem, cutis carnosæ membranæ, ut in ceteris ferè omnibus corporis partibus, quod ad connexum attinet, committitur, at nullus interim adeps, sed unctuosus duntaxat quidam humor, inter cutem membranamq; iacet. In superiori quoque palpebra secundum uniuersam ipsius amplitudinem ex abundanti, carnea membrana musculosis adaugetur fibris, ac uelut duos efficit musculos, in medio cutis & eius membranæ, quam adherenti albæ oculi tunicæ continuam esse diximus, repositos. Moueri enim oportebat ex nostro arbitratu superiorem palpebram, alioqui in nullum usum nobis accommodaturam. Etenim frustra palpebras Natura largiretur, si aliquando extrinsecus illato, uersus hominis oculos scarabæorum & cancrorum oculis longè molliores, quod percussurum ipsos, & læsurum esset, ex nostro arbitratu eas non clauderemus. Duos itaque tenues, latos, membraneos, ac substantia propemodum omni ex parte sibi similes, Natura miro quodam artificio musculos produxit, unum sanè in maiori oculi ponens angulo, alterum in minori. Qui portionem maioris anguli occupat, ex media anguli sede inibi ad nasi latus incipit, suo principio etiam superciliarum partem naso proximam contingens. Huius finis amplius, quemadmodum totus etiam musculus, cartilagini, in quam pili firmantur, applantatur, mediam ipsius sedem, quæ maiorem respicit angulum, uniuersam occupans. Alter uerò musculus totum minorem angulum amplectitur, ductum quodammodo circularem obtinens. A medio namq; inferioris palpebræ ortus, per minorem angulum circunducitur, & in superiorem palpebram ascendens, in reliquam cartilaginis dimidiam sedem sese inserit, prioriq; musculo, non ad cartilaginem tantum, sed etiam per reliquam superioris palpebræ longitudinem^c committitur adeò sanè, ut nisi fibris ambos distinxeris, uterque unus esse apparebit. Fibræ enim secundi, nostro C, quum palpebra sursum ducta est, respondent, ea autem coniuente, acutum magis efficiunt angulum. Prioris uerò musculi fibræ minus obliquæ conspiciuntur, & uelut ex duplici ducuntur principio, nimirum ex angulo maiori, & supercilij parte naso contermina. Horum musculorum beneficio superior palpebra & attollitur, & deprimitur. Prior enim ipsam ad superiora contrahit, posterior, qui minorem perreptat angulum, ipsam deorsum agit. Simul nanque semper attrahitur, tam altera tarsi pars, cui contractus musculus non implantatur, quam reliqua. Huius autem causa est, tarsi durities, si enim esset membranofus, uel carnosus, uel quomodocunq; libet mollis, præterquam quod cilia non referuaret erecta, motam partem, reliqua

b 3 14. C. D.

a 18 fi. cap.

14 li. 7. 10.

b 15 li. ca. 3.

lib. 11.

c A. de in.

b. 17. 10.

C.

d D. de in.

17. 10.

E.

e F. 10.

E.

reliqua haudquaquam sequeretur. Id quod praevidens Creator, durum cartilagineumque tarsum ipsi palpebrae innexit, in quem utriusque musculi fines inferrentur. Quemadmodum enim si baculum aliquem obliquum & retortum, utra uoles parte apprehensum, attraxeris, sequitur totus, pari modo tarsus quoque utrumque musculum alternatim uniuersus sequitur. Quod uero iam dicti palpebrae motus, eodem ritu cum reliquis totius corporis motibus, qui ex oppositis perficiuntur musculis, celebrentur, omnibus conspicuum esse debet, uno scilicet musculo in se contracto, altero uero à propria functione quiescente, & longiore reddito laxatoque. Si enim uterque musculus conuelleretur, & ad seipsum, sibi continuam tarsi partem alliceret, sursum quidem pars eius, quae magnum respicit angulum, reuelleretur, deorsum autem traheretur ea, quae paruo uicinior est, ac ita non magis aperiretur oculus, quam clauderetur, eaque uideretur palpebra, quam in Praefagiorum Libris Retortam uocauit Hippocrates. Cuius sanè oraculi gratia non oscitanter palpebrarum musculos à studiosis obseruari uelim, est enim, ut omnium propemodum in facie motuum, eorum quoque speculatio ardua. Quod uel Galenus facile attestatur, qui in Libris de Affectuum locorum cognitione, tres palpebrae musculos secus atque alibi recensuit. Duos enim illos, quos iam enumeravi, innuit palpebram deorsum trahere, & tertium à fronte natum, ductus palpebrae ad superiora autorem ponit. Neque adeò adhuc palpebrarum motus admirandus uenit, atque pelliculae illius, quam in auiibus, & testudinibus, aliisque plurimis animalibus ex maiore oculi angulo, quoties oculus conuiuet, toti oculo obduci conspiciamus, & quae aperto oculo rursus ad maiorem oculi angulum collecta, quid simile commonstrat, nostrae carunculae in maiori oculi angulo repositae. Quae itaque ad superioris palpebrae motum pertinent, sic se habent, inferiori interim palpebra optimis rationibus & minori & immobili. Porro musculorum palpebrarum mouentium administratio eiusmodi ferè est, qualem praecedenti Capite descripsimus, optimè tamen cultellis paruis, quibus in aptandis calamis utimur, & hamulis negotium perfeceris. Cutem enim omni industria à carne membrana ad tarsum usque, in utraque palpebra oportet adimere, ac nequaquam perfunctorie cutis cum carne membrana connexum intueri, ad ipsas hic absentiam, ut pars leuior, musculoque sequacior redderetur, perpendere, id namque utiliter affectuum gratia, quos *ὀφθαλμοὶ* Graeci uocant, & alios qui in palpebras non infrequenter procumbunt, fluxus perdisces.

Difficile esse palpebrarum motum, & locorum cognitionem.

Administratio palpebrarum mouentium musculorum.


DE OCULORVM MUSCVLLIS.

Caput XI.

PRIMA
OCVLI MV-
sculorum figura.



SECUNDA
OCVLI MV-
sculorum figura.



PROPOSITARVM IAM FIGVRARVM ET EARVM
dem characterum Index.

QVONIAM in integris musculorum tabulis, oculi musculos depingere non dabatur, ipseque oculus ex caluaria ad musculorum ostensionem euellendus sit, hic ipsorum delineationem reposuimus. Ac in harum prima quidem, oculus simul cum suis musculis in ipsorum sede adhuc repositus, una facie delineatur. Secunda uero, sex primos oculi musculos ab insertionem humi prostratos commonstrat, septimo adhuc ad uisum neruum asseruato. Ceterum notarum Index sequenti proponetur pagina.

- A*, 2. *Anterior oculi sedes, in qua iris consistit.*
B 1, 2 *Visorius nervus inibi resectus, quā primum ex caluaria in oculorum sedem delabitur.*
C, *D*, *E* 1 *Tres in hac facie musculi occurrunt, nondum scilicet aliquo musculo sua sede liberato.*
F, *G* 1 *Interuallorum inter sex primos musculos consistentium, & adipe oppletorum duo in hac facie apparent.*
H, *I*, *K*, *L*, *M*, *N* *Primi sex oculi musculi, uerūm H musculum notat, quo oculus sursum agitur, I quo deorsum, M & N quibus circumagitur, K quo ad maiorem oculi angulum ducitur, L quo ad minorem angulum fertur.*
 O *Septimus oculi musculus, nulla ex parte à uisorio neruo liberatus, ac ab adipe ipsum alioquin integre omnino detectus.*



Oculus motu
uoluntarie me-
uendus.

Oculorū mo-
tus

Musculi sex
primi.

Adeps muscu-
lis oculorum
interpositus.

Septimus ocu-
li musculus.

VONIAM neq; ex lateribus, neq; ex posterioribus, neq; superioribus, uel in
 ferioribus sedib. neque omnino aliter, quā secundū pupillæ rectitudi-
 nem, oculorum uisio perficitur. paucissima utique uideremus, si oculi im-
 mobiles penitus essent. Qua de causa ipsos ita corporis nostri Conditor
 creauit, ut plurimum circumduci possint, & præter hoc, collum ad motus
 promptum reddidit, ideōque potissimum duo facti sunt oculi, etiam no-
 tabili spacio distiti. Ceterū si eos moueri motu uoluntario oportebat, ipsis
 quoq; musculos largiri necessum fuit. Sed quū oculorum motus sint tres, unus, quo hi in-
 trō, uersus nasum adducuntur, & quo extrorsum ad paruū angulū aguntur, secundus, quan-
 do sursum tenduntur, uersus supercilia, & deorsum trahuntur uersus malas. tertius, quo ob-
 scuro admodum motu circumuertuntur, meritō totidem numero duces motuum, musculos
 fabrefieri oportuit, atq; singulis motibus, qui in geminos diuidi possent, binos musculos apta-
 ri necessum fuit. At ex his^b duos quidem in lateribus, singulos scilicet ad utrunque angulum,
 alios autem duos, unum quidem infra, alterum uerō supra, quintum uerō ac sextum, ut cir-
 cumuersionis motui præessent, uariē locari oportuit. Ceterum ex his sex numero musculis
 primi quatuor, quemadmodum rectis oculi motibus præfunt, ita quoq; rectum situm obti-
 nent, & omnes omni ex parte sibi similes sunt. Capita enim ipsorum, uelut ex^a dura cerebri
 membrana neruum uisorium obtegente, & ē neruo^{*} secūdi paris neruorum cerebri, statim in
 nerui uisoriū a caluaria elapsu, originem ducunt. Deinde ipsorum uenter amplior, quā pro-
 fundior, attamen teres propemodum uisitur, & posteriori oculi regioni, neruoq; uisorio, se-
 cundū ipsius a caluaria in oculi usq; radicem ductus longitudinem, incumbit, & quū pro-
 pter mediam oculi sedem (ubi is latissimus est) uenter pertigerit, in latam membraneamq; ener-
 uationem finit. Quæ ultra mediam oculi sedem terminatur, & duræ oculi^c tunicæ, tanquam
 in mouendo osse, recta (sed secundū corporis latitudinem ducta) linea inferitur, iuxta^e iri-
 dem, maiorem uel oculi circum, in anteriori oculi parte conspicuum, & nigrum ab albo (ut
 ita loquar) dirimentem. Porro musculi, circunductionis oculi opifices, forma quidem ac ortu
 prioribus illis respondent, at minores sunt, & ductu in insertioneq; ab illis uariant. Prior nanq;
 a dura cerebri membrana, uisorium neruum ambiens, ē regione minoris anguli originem du-
 cit, & in humiliorem oculi sedem, neruosa sua tenuitate inferitur, obliqua linea iuxta iridem,
 reliquorum quatuor modo. Alter uerō a uisoriū nerui membrana, ē regione maioris angu-
 li nascitur, & duræ oculi tunicæ, neruosa ipsius tenuitate, obliquiori linea, ad superio-
 rem oculi sedem inferit. Atque hinc fit sex istos oculi musculos solo situ, & in duram oculi tu-
 nicam in insertionem, idq; adhuc modiq; uariare. Primi enim quatuor, uti modò dicebam, prorsus
 recti sunt, rectaq; linea inferuntur, alij duo obliquiores uisuntur, obliqua linea insertio-
 nem molientes, qui etiam si circumuersioni conducant, attamen & sursum deorsumq; ocu-
 lum agunt. Atque omnium neruosarum tenuitatum ductus, inter duram oculi tunicam, &
 adhærentem medius consistit. Efformant itaque simul omnes musculi, dum proprium
 adhuc situm seruant, turbinatam figuram, cuius conus ipsorum est exortus, basis uerō, eo-
 rundem insertio. Breuissimo enim ductu neruo connectuntur uisorio, quū in illorum,
 quam unā conformant capacitate, multus cōtineatur^k adeps duriusculus, & albus admodū,
 atque is rursus alteri cuidam obuoluitur musculo. Est enim præter commemoratos sex oculi
 musculos, alius musculus grandis, undecunq; ab illis & eo, quem diximus, adipe circunda-
 tus, ac solus similem figuram, quam priores sex simul efformabant, constituens. Nam muscu-
 lus iste principium quoq; a dura membrana, neruum uisoriū inuoluentem assumit, at paulo an-
 terius, quā sex priores, illorum enim origo ab oculi corpore remotior est, quā eius,
 quem

a 2 fi. unu.
 K. alter L.
 b 2 fi. unu.
 1. alter H.
 c 2 fi. M.
 N.
 d spectat
 e 7 fig. 17
 ca. 14. li. 7.
 e 1. 2. fi. cap.
 2 lib. 4. K.
 * 1. 2. fi. ca.
 2 li. 4. K.
 f figura 16
 e 17 cap.
 14 lib. 7.
 g earundem
 fi. x.

h 18 fi. cap.
 14 li. 7. n.
 aut spectat
 illuc i figur.
 re G. M. Q.
 i tota. fi.
 k 1 fi. F. G.
 l 2 fi. O.

quem nunc enarramus, musculi, cuius principium similiter carnosum est, ut etiam reliquum totius musculi corpus, quod orbiculatim uisorium neruum ambiens, ac à principio in priora porrectum, instar turbinis tantisper dilatetur, dum posteriorem oculi sedem contingat, illique circuli modo implantetur. Atque hanc in sectionem musculus molitur, non quidem neruo uisorio proximam, sed ferè ubi oculus amplissimus fieri incipit. Quemadmodum uerò inter hunc musculum, & sex priores adipem repositum dixi, ita etiam inter neruum ipsum, & præsentem musculum eo intervallo, quo is à neruo abscedit, adeps colligitur. Musculus hic nullam prorsus inscriptionem obtinet, nisi fortassis unam in inferiori ipsius sede, secundum ipsius longitudinem protensam. Vnde etiam miror, hunc non unius musculi loco à cæteris Anatomicis enumeratum fuisse, sed ab alijs duorum, ab alijs trium: quum interim musculum hunc uix obiter omnes descriperint. Ac proinde etiam uereor, ipsos non admodum aptè musculi huius usum expressisse, dum hunc priuatim, retentionis oculi in sua sede autorem esse asserunt, nullum præterea illi usum ascribentes. Quum tamen aptius sex priores musculi id munus sibi uendicare possint, ut quorum externa superficies, membranæ oculi sedem in caluaria exculptam succingenti, fibris multis connascatur. Quinetiam sex isti priores propinquius ipsi capitis ossi, ubi neruus ex caluaria elabitur, pertingunt, ilico enim atque neruus emergit, ex ipsius dura membrana principium mutantur, omni ex parte septimum occultantes. Quanquam fortassis non defuturi sint, qui originem horum musculorum non à dura cerebri membrana, uerum ab illa quæ os succingit, pendere cõtendent, quum interim septimus musculus, multis interuallis undique ab os succingente membrana distet, quod profecto factum nõ fuisset, si modò huius beneficio oculum in sua sede retineri, ac quodammodo ad cerebrum trahi oporteret. Et si fortassis ipsius naturam accuratè rimatus fueris, illum instar tegumenti uisorio neruo obduci concedes, & postmodum etiam oculum rectis motibus agere fateberis, prout nimirum has illas uel sui corporis fibras contraxerit, laxauerit uel.

Septimi officium.

OCULI MUSCULORVM ADMINISTRATIONE. Caput XII.



RECTIVS musculorum oculum mouentium administrationem, illo ex caluariæ sinu euulso, perficies. Euellitur autem promptè uniuersus, integra adhuc caluaria, si omni ex parte oblongo cultello, ad os semper ductis in circuitu sectionibus, à suo sinu ipsum liberaueris, & tandem neruum uisorium, ubi primum ex caluaria procedit, absecueris. Si uerò caluaria fortè ad cerebri inspectionem prius fuerit dissecta, ipsumque cerebrum auulsum, cõduxerit duabus lineis caluariam serra diuidere, una quidem linea à regione maioris anguli, uersus uisorii nerui foramen facta, altera autem à minori angulo ad prioris sectionis, iuxta foramen illud, terminum. Si enim ad eum modum serram in oculorum usque sedem penetrare coegeris, totam superiorem partem sedis oculorum, instar cuiusdam trianguli auferes, ac deinceps undique oculo à pinguedine liberato, illum adimes, aut si usum erit, oculum ab osse undecunque liberatum solius uisorii nerui interuentu, caluariæ appendere sines. Euulsum ministro tenendum porriges sic, ut summis dextræ manus digitis nerui uisorii finem (quem & eleuabit) sinistra autem manu uelut in pugnum coacta, in indice ac pollice anteriorem oculi partem comprehendat. Mox adipem oculo, ut minori molestia humectatus moueretur, circumpositum, & glandulas, uenarum & artieriarum diuisionem intercedentes adimito. Dein consideratis musculorum ductibus, & quam simul omnes constituunt, forma, sex capita primorum à neruo uisorio acutiori cultello liberato, ac singulos deinde musculos leuiter secando, ad mediam usque oculi regionem deducito, unumqueque supra leuam ministri manum, quasi stellam effigiatum extendens. hac nanque ratione cuiusque implantationem, formam, & usum leui negotio cõdisces. Porro nihil æquè diligenter præcauendū uenit, ac ne ad hærentem albam uel oculi tunicam à cornea prorsus abradas, nimiumque oculum emungas, priusquam sex musculorum insectionem intuitus fueris. aliàs enim (nisi fortè exercitator sis) eam uiciabis, neruosam alicuius musculi tenuitatem unā cum adhærente membrana incuriose absecans. Iam ubi adipem in media horum musculorum amplitudine coaceruatum, unguibus, aut cultello à septimo oculi musculo adempseris, illum quoque aggredi integrum est. Primum itaque qui neruum ambiat, circulatimque in oculi radicem implantetur, examina, ipsum à neruo prorsus ad duram usque oculi tunicam radendo. Cæterum si caluariæ adhuc hærentem oculum administrare animus sit, musculorum capita primum liberans, ad eum quem iam

Administratio in oculo à caluaria resectionis oculum eximendi modus.


Administratio oculi musculorum, quum adhuc caluaria hæret.

modum, musculos attrectabis, capita scilicet à neruo adhuc fixo ad insertionem usque (quæ nō procul ab iride consistit) deducens. Commodius tamen, minorq; molestia priorem sectionem obibis. In utroque tamen administrandi modo, oculi situs semper perpendendus est, quem^d caruncula indicabit, maiorem angulum in homine occupans, & (ut creditur) pituitam in genas defluere præcauens. Hæc nanque (dummodo cognoscas, an dextrum, an sinistrum oculum in manus assumpseris) oculi regionem, quæ magnum spectat angulum perpetuò commonstrabit, à qua illico reliqua oculi latera opportunè petes. Interest autem, oculi regiones, propter obliquos musculos, potissimum cognoscere. Aut si lubet, neglecta caruncula, poteris cunctello carneam membranam, priusquam oculum à caluaria relecabis, punctim in aliqua parte radere, hincq; oculi regiones semper augurari.

d 19 ta. ca.
e 4 lib. 720.

DE BUCCARVM, LABRORVM, ET

nasalarum musculis. Caput XIII.



Alterius lateris primus musculus, uel simul omni prius ac secundus.

Li. 4 de Adm. str. lib. 1. de homib.

Nōnullis hominibus alterius moueri.

LIBRO superiori, duo narium ossa in^b duas desinere cartilagines, atq; horum extremo secundum latera alias^c duas molles, & latas cartilagines (quas alas uocant) accumbere alligariq; scriptum fuit. Nunc uerò musculos, qui eas mouent, simul cum buccarum genarum uel labrorumq; motoribus exequemur. Cæterum quum buccarum & labrorum motus dicimus, illi intelligentur, quos quiescente etiam inferioris maxillæ osse obimus. Alijs siquidem musculis maxillæ os, alijs uerò buccæ labraq; motu aguntur uoluntario. Duorum itaque primorum, qui buccas & labra mouent musculorum, in utroque latere^d singuli habentur membranei, admodumq; ampli. Hi enim ex omnium uertebrae ceruicis spinarum regionibus, deinde scapularum, & clauicularum, & pectoris ossis sedibus originem ducunt, ulque ad faciei medium protensi. Sunt autem hi aliud nihil omnino, præterquam membrana (quæ merito carnosaf nobis dicitur) carnosus fibris adaucta, hæc enim in tota paulò antè commemorata sede, musculosaf penitus reddita, aliquid usq; uerè carnosaf efficitur. Cæterum carnosæ hæc fibræ à nullo prorsus osse originem (ut fortassis quispiam ab alijs Anatomicis lusus arbitraretur) ducunt, neque etiam quis musculus hunc ab aliquo osse principium petere, non perperam dicturus est. Is nanque non aliud existit, quam carnea fibræ nuper dictæ membranæ intensæ, & multis neruorum furculis concommitatæ, qui quod à subditis membranæ corporibus in illam excurrant, ipsam firmius substratis sibi partibus connectunt, quàm in reliquo ferè corpore illis, quibus obducitur, musculis hæc affirmari solet. Prorepunt autem primùm eiusmodi neruorū soboles in membranam, secundum totam colli longitudinem, seu à thorace ad occipitium usque ex ea sede, qua spinarū ceruicis uertebrae consistit regio. Item secundum scapularum spinarum ductum, summos humeros, clauiculas, & eminentiorem pectoris ossis regionem, neruuli quoque instar tenuissimorum filorum, à subditis musculis membranæ exporriguntur. Atque hi neruorum furculi omnes, secundum carnearum fibrarum ductum (qui perquam uariis est) reflexæ excurrunt. Fibræ enim^e à pectoris ossis sede, mediaq; clauicularum regione pectoris os spectante sursum, uersus faciem conscendentes, secundum colli longitudinem recto tramite protenduntur. Quæ autem ex reliqua clauiculæ sede, & summi humeri, & scapularum sedibus ad ceruicis usq; spinam incipiunt, oblique sursum contendunt, tantoq; obliquiores uisuntur, quanto ceruicis spinæ sunt propinquiore. Omnes enim fibræ à ceruicis uertebrae spinarum sedibus prorepentes, unà cum eius partis neruorum^f furculis transfuerim feruntur, atque ideo magis, quo musculus occipitio uicinior existit. Porro eiusmodi fibrarum ductus, in ceruice admodum conspicuus est, nullaq; fibrarum interfectio, ut neque etiam in summo mento, & in inferioris maxillæ iuxta aurem regione sese offert. Verum ubi iam labra cōtingunt, fibræ inter se adeò confunduntur, ut rectas, & obliquas, & transfueras iam amplius distinguere prorsus arduum impossibileq; sit, atque id præcipue secundum totā inferioris labri regionem accidit. Labri enim superioris lateri ad alas usque narium duntaxat fibræ porriguntur. Posterius itaque huius musculi initium, à spinæ ceruicis sede omnino promitur, deinde secundum occipitij ossis basim fertur, mox sub spinæ ceruicis sede omnino promitur, deinde secundum occipitij ossis basim fertur, mox sub

d 1 fi. 9. ca.
li. 1. 2. 3.
b 4 ta. K.
c 4 ta. L.

d 3 tab. musculi r. notatur circūscriptus H. 1, O, N, L. K. M.

e 3 tab. 2 K. ad L. f 3 ta. ab L. ad O.

g Hanc neruorum seriem, aliquando ostendit collis figuræ 3 cap. 11. lib. 4. h iuxta H. M. 3 ta. i 3 ta. de O. ad H.

ctus,

6 4. tab. A. Etus, illū quem à mandendo massetera uocabimus, musculum contingit, & paulò ualidius
 ossi in malis, quā alibi in reliquo ipsius ductu connascitur, hinc ad nasi usque radicem pertin
 1 3. ta. quasi gens. Atque hunc ductum musculus adeò seruat exquisitè, ut duo hæc latera musculi diffini
 ab O ad N. antur, unum quidem, secundum spinæ longitudinem protensum, aliud autem, ab occipiti
 m 3. ta. ab O medio ad superius labrum prorepens. Reliqua uerò duo ipsius latera (sortitur enim quatuor)
 ad H, M. haud æquè sunt distincta. Quod enim à spina ad summū usque pectoris ossis, secundum sca
 n 3. ta. quasi pulam & clauiculas exporrigitur, inæquale est ac uarium. Quandoquidem non instar rectæ
 ab N per L lineæ carnosarum fibrarum hic apparet principium, sed instar obliquæ, admodumq; inæqua
 ad K. lis, nunc paululum sub scapulæ spinæ & clauicula incipiens, nunc paulo superius, & nunc è re
 gione. Quartum autè latus, quod à summo mento, ad superiorem pectoris ossis sedem pro
 0 3. ta. ab M tenditur, uix ob id distingui potest, quòd hominibus utriusq; lateris musculi hic adeò coeant,
 ad K. ut duo musculi unus esse uideantur, quodq; hac in parte carnosiores longè, quā in reliqua
 ipsorum sede existant. Cæterum hi musculi buccas, & totum inferius labrum deorsum retra
 hunt, & ad latera simul cum superiori labro abducunt, aut, ut dicam uerius, reliquam faciei cu
 tem, quæ à musculosa frontis & nasi substantia, & palpebræ musculis non mouetur, cir cum
 4. ta. M. 5. git, ad hoc opitulante lato quoque, & quodammodo orbiculari musculo, à tota ferè superio
 ta. E. ris maxillæ longitudine in inferioris longitudinem, ad gingiuarum radicem inserto. Est au
 tem hic musculus similiter membrancus, & uaria fibrarum specie intertextus, totam eam buc
 carum sedem cōplectens, quam inflare possumus. Neq; sanè aliud corpus id uniuersum, quod
 9 3. ta. F. inflatur, censendum est, quā cutis, cui immediatè succumbit primus iam commemoratus
 musculus, deinde prout obefiores homines sunt, adipis maior minorue copia, & postmo
 9 3. ta. G. H. dum quidam superioris labri musculus, & alius labri quoq; eiusdem, & alæ nasi communis,
 5 3. ta. F. quos postea describemus, præterea orbicularis & amplus quoque musculus, cuius naturam
 explicare iam contendimus. Huius itaque musculi internam superficiem, oris amplitudinem
 succingens tunica oblinet, ipsiq; adeò connascitur, ut nullo prorsus modo illacera à musculo,
 aut musculus ab illa auferri queat. Imò secundus hic buccarum musculus, uix aliud est, quā
 carnosarum fibrarum implexus admodum tenuis, ac quodammodo membrancus. Cogno
 sces autem eam, quam diximus, utriusque iam commemorati buccarum musculi, & potissi
 mū in primi functionem promptissimè, si inferiore maxilla superiori adducta, immotaq; pluri
 mū ad quamcunque partem sedemue, labra & buccas duxeris, atque etiam obseruaueris,
 quæ etiam anteriorem colli cutem primi musculi beneficio, unā cum buccis deorsum uellere
 possis. Rursus si immota colli cute, totam buccarum sedem, quam inflare integrum est, nunc
 in oris amplitudinem uolueris, nunc autem extrorsum, nunc sursum, nunc deorsum, nunc
 prorsum, nunc retrorsum duxeris, secundi musculi functionem & motus, quos illius, & æris
 in ore uiobimus, plurimū admiraberis. Et si demum in corpore illum inspexeris, non nisi
 cum summis rerum Opificis, quas proloqueris, laudibus, uarium illum, & quem neuiquam
 explicare posses, fibrarum implexum, & undecunque in hunc procurrentes neruulorum fo
 boles intubere. Toti itaque faciei cuti, ut mobilis reddatur, præter secundum hunc muscu
 lum, & labrorum & nasi proprios, quos statim enarrabimus, musculos, membranam car
 nosam in musculi naturam degenerantem rerum Opifex subiecit. Si modò malarum cutem
 1. ta. I. 5. duntaxat dempseris, illi enim membrana, quam carnosam uocamus, subnascitur quidem
 1. ta. G. 2. uerū hinc nullis carneis enutrita fibris. Nihilominus tamen quum cutis, quæ malis obtendi
 1. ta. 4. tur, inferior pars buccis continetur, superior uerò subiectæ frontis musculosæ compagini
 0. V. uniatur, simul cum reliqua faciei cutem, malarum quoque cutem mouemus. Quā uerò ad hoc
 latorum musculorum, qui carnea membranea constant, munus homini necessarium sit, condi
 scimus, quoties labrorum substantiam deflectere, ac à suo situ auertere cogimur, aut os disten
 dere & contrahere, stringere & laxare, quocunque edentium, bibentium, uel differentium,
 uel aliam quandam functionem obeuntium usus uocauerit. Atque harum omnium functio
 num autores, Galenus in Quarto de Sectionibus administrandis libro, hos tantū musculos
 esse, insinuare uidetur. Sed priuatim neruis huc concurrentibus mouendi officium, nulla
 (ut tamen decebat) habita musculorum mentione, tribuit. Sunt autem nerui eiusmodi utrinq;
 4. ta. I. 5. que binī, quorum unum ex foramine inferioris maxillæ, ad inferius labrum elabi suo loco
 1. ta. G. 2. docebimus, alterum ex oculorum sede peculiare foramen deductum, in malarum regio
 1. ta. 4. nem decumbere audies, his duobus, in alio latere totidem, ab eisdem sedibus sui lateris pro
 0. V. cidentibus respondent. Verū quum eiusmodi nerui musculis indigeant, & omnes labrorum
 1. ta. I. 5. motus, illis latis & tenuibus tantū peragi nequeant, ipsiq; alios exigant auxiliares, meritò
 1. ta. 4. Natura alios quatuor musculos mouendis labris construxit. Quorum principia, euidentiā
 X 2 quidem

Secundus al
 ternus lateris,
 seu omnium 3
 C 4.

Malarum
 cutem musculo
 deservi.

4. ta. I. 5.
 1. ta. G. 2.
 1. ta. 4.
 0. V.
 1. ta. I. 5.
 1. ta. G. 2.
 1. ta. 4.
 0. V.

*Labrorum
constitutio,
dein quatuor
musculi labris
proprijs, seu in
altero latere
sertius, et pos-
tea quatuor,
vel omnium 5,
6, 7, 8.*

quidem & manifesta sunt, antequam labrorum extremis permiscerentur, concreta uerò illis, omnifariam redduntur obscura, & inseparabilia à reliqua labrorum substantia. Vniuersa enim labrorum cute, & oris amplitudinem succingente tunica, toti musculosa naturae commixtis, ac musculis, ut quispiam dixerit, ibidem corruptis, unà cum fungosa, quam postea explicabimus, substantia, hominis labra procreantur. Quatuor itaque sunt musculi, quoniam labris quatuor principia motuum esse oportebat, utrinque uidelicet duo, quorum moles, or ganis illorum beneficio mouendis congruit. Primorum enim duorum, qui superiori labro communes sunt, utrinque¹ unus habetur, qui à maxillae superioris ossis, ubi mala consistit, car noso principio enatus, deorsum oblique in priora fertur, quousque in sui labri latus sese inserat. inferiorum quoque utrinque² unus obseruatur, superiori musculo latior, sed breuior. Exoritur nanque carneus & hic quoque, ab inferioris maxillae humiliori parte ad menti quasi latera, hinc sursum oblique in priora protensus, latusque permanens, in mediam sui labri sedem im plantatur. Sunt itaque omnes quatuor lati, ac quodammodo, quod ad fibras attinet, dupli- ci donati initio, ipsorumque fibrae circa insertionem, x literae modo sese interfecant pertinaci- ter, uti admonuimus, labrorum cuti immixtae. Quatuor his musculis duodecim motus utri ni minimum obitus, quatuor quidem obliquos, in utroque labro duos, & alios octo rectos, in utroque labro quatuor. Duo quidem ad amussim recti fiunt, quando labra plurimum à se inuicem distant, hoc quidem à duobus musculis sursum agentibus ad nares tenso, altero au- tem deorsum ad mentum ducto, dum duo inferiores musculi laborant, dein quando ad se se labra retrahuntur, & inuicem coeunt, uno ex superiore loco deorsum, altero ex humi- liore sursum protenso. Ceterum ab internis horum musculorum fibris, labra introrsum conuertuntur & subimplicantur, ab exterioribus uerò foras euelluntur, ut ita & duo alij in singulis labris recti cōsurgant motus, qui paulo minus toto ad obliquos quasi referendi sunt. Quatuor uerò obliqui motus, unico duntaxat laborante musculo, reliquo interim laxato, ce lebrantur. Si enim dexter superioris labri musculus remisso sinistro contrahitur, dextra la- bri pars obliquo motu, sinistra dependente, attollitur, atque hac ratione reliqui tres obliqui motus labrorum peraguntur. Ut uerò ualidiùs adhuc superius labrum moueretur, atque secun- dum totam ipsius substantiam musculis participaret, illi alia portio³ musculi elargitur, qui narium⁴ alas extrorsum sursumque agit. A malis enim iuxta proprium superioris labri⁵ muscu lum, carneus quidam, sed tenuis membraneusque enascitur musculus, qui in ipso modicè uer- sus priora descensu, in duas portiones partitur, unam nasi alae radici, alteram superioris labri parti, quam Latini Mustacem, Graeci uerò *κόλυμπος* uocant, inferens. Portio nasi alae expor- recta eam extrorsum sursumque mouet, quae labro propria est, id quoque sursum uellit, & tantus huius portiois cum alae portione est connexus, ut superius labrum, immota ala, sursum uehe- menter mouere nequeas. Verum praeter hunc alae musculum, alius in interna narium ampli tudine habetur, ad suae cavitatis externum latus, sub tunica narium amplitudine obducta, reconditus. Est autem hic tenuis & membraneus, interiori alae regioni insertus, illumque in- trō trahens. Musculus hic neruulum habet ab illo, quem per⁶ foramen in magno oculi an- gulo incisum, ad narium amplitudinem, à tertio cerebri neruorum coniugio diffundi com- memorabimus. Atque huiusmodi alarum musculos efformari decebat, qui in repentinis aeris inspirationibus & expirationibus, earum motibus opportunè praeficerentur. Sunt itaque hoc Capite nobis enumerati duodecim musculi, si omnes utriusque lateris iunxerimus, duo quidem lati ex carnea constantes membrana, duo admodum uarij ex una maxilla in aliam pronati, & quatuor labris proprii, & totidem alarum nasi. Nisi fortassis illum, qui labrum superius & alam simul adit, subdividere constitueris, atque ex utriusque lateris musculo duos, propter dissectionem in progressu, & in diuersas partes insertionem, fingere, atque ita quatuordecim musculos statuere uisum sit. Siceriam nihil obstat, & duos qui carnea mem- brana efformantur, unum dicere, quum hi adeò in anteriori colli parte continuentur, ut⁷ di- uisionem nullam notatu dignam ostendant. Rursus si fibris motibusque, cum in hoc, tum in proprijs labrorum musculis animum accommodare uelis, ob idque in plures musculos hos di- uidas, maior sanè tibi, quam nobis haecenus, horum mu- sculorum numerus excrescet.

*Alarum nasi
musculus, hic
autem in alae
ro latere 5, aut
omnium 9 &
10.*

*In altero late-
re 6, aut omni-
um 11 & 12.*

*Musculorum
epilogus.*

y sta. G.

a 3 ta. G. H.

b 4 ta. N.

c 3 ta. F.
d 4 ta. L.
e 3 ta. G.f ad regio-
nem K tab.
4.g 2 fig. ca. 6
li. 4. P.
h 1 fi. 12. ca.
lib. 2. C.i 3 ta. ab 28
ad K.



HORVM musculorum administrationem à^a latiss ac ex carnea constan-
 tibus membrana musculus opportunissime auspicaberis, & primum
 acutiori nouacula in cute rectam sectionem, à summo mento, mediâq;
 inferioris labri sede (ubi cutis in ruborem definit) ad pectus usque, secun-
 dum colli longitudinem duces ita quidem ad amissum, ut sola cutis ad
 subiectum usque musculum, carneam uel membranam diuidatur. Dein-
 de alia ducenda est sectio, ad utriusque labri extremum, secundum rubo-
 ris inem hic, ut orbiculari linea os uniuersum obducatur. His alia per nasi longitudinem ad-
 detur sectio, & si prius frontis musculorum compagem, & palpebræ musculos aggressus fu-
 eris, nulla præter has (nisi sub aure ad medium usque occipiti) in facie sectio est ducenda.
 Alias enim ex summo narium, sub inferiori palpebra & aure, uersus occipitium transuersam
 moliri deberes sectionem. Cæterum à fine sectionis ad pectoris usque os ductæ, transuersa
 una sub clauiculis, & summo humero, & scapularum spina ad dorsum usque perficitur. Li-
 cebit & his transuersam ex faucibus, seu ex gutturis regione, usque ad spinam adjicere. His
 tentatis sectionibus, hamulo cutis leuabitur, ac in altero latere acutiori nouacula, cutis à sub-
 iecto membraneo musculo, omni industria liberabitur. Quod nullibi feceris molestius, quam
 ubi laqueus ceruicem compresserit, hic enim laquei occasione, cutis membraneo musculo
 pertinacissime connata reperitur, & etiam cutis instar cornu adeo inibi mox indurefcit, ut uix
 nouaculam admitat. Quanquam musculorum sectioni corpus opportunius adhibebitur,
 ex quo uenæ prius sectæ, uniuersum sanguinem in aquam calentem effuderint. quandoqui-
 dem tunc non toties uenæ sanguine inanitæ, dum musculos diuidis, uenient colligandæ, atque
 adeo frequenter spongis abstergendæ. Ex altero autem cadaueris latere, unâ cum cute (quod
 factu facillimum est) musculum latum tenuemq; auferes, atque utrinque musculi naturam, &
 fibras neruosq; ac munia (si hinc inde suas, quas prius enarrauimus, partes attraxeris) intue-
 bere. Fibrarum autem huius musculi seriem, nequaquam oscitabundus in tota humiliore infe-
 rioris maxillæ sede præteritis, quin prius eas strumarû, uel ut uulgo dicimus, scrophularum
 gratia diligenter examinaueris, quo in eo abscessus genere, quam usus expet, scilicet ac ma-
 gis induriti tumentes glandulas exfeces. Administratio enim sectionis in hoc affectu extra
 fibrarum ductum tentata, admodum obscenè hinc inde colli cutem aut tendit, aut corrugat.
 Vbi hæc igitur sedulo obseruaueris, eius lateris musculum, quem subdiuis corporibus ademp-
 ta cute affixum reliquisti, omni ex parte adimes, atque administrationem ad proprios la-
 brorum musculos cõuerteris, qui in conspectum ueniunt, quamprimum adipem, qui his præci-
 pue in buccarû regione incumbit, permisceturq; unâ cum lato, qui ex carnea cõstituitur mem-
 brana, musculo ademeris. Liberabis itaque ab inferiori maxilla primum^b duorum, qui infe-
 riori labro elargiuntur capita, sensim ea ad insertionem usque, ut fibras examines, deducens.
 Atque hic labra fungosæ cuiusdam^c substantiæ interuentu, maxillæ ossi connata reperiens,
 quæ labris opitulatur, quoties distrahuntur, tenuesq; fiunt, & quoties contracta incrassan-
 tur, ac corrugantur. Quippe eiusmodi substantia omnino & inanitur, & repletur promptè:
 inanita quidem submittitur, repleta uerò attollitur. Præter hanc substantiam occurrent &
 nerui duo, maioris tertij paris neruorum cerebri radice ramuli, ex maxilla inferiori in eos,
 quos iam dissecas, musculos diffusi. Cæterum posteaquam inferiores liberati fuerint, à ma-
 lis^c duos quoque superiores dissecabis, atque illis ad superius usque labrum deductis, qua-
 tuor musculorum functiones, capita huc illuc trahens spectabis. Postremò^d musculo alæ na-
 si, & superiori labro communi à malis derafo, ac ad alam usque & labrum deducto, eius
 quoque usum contemplabere. Hic uolens prætermitto^e neruum minoris gracilioris uel ter-
 tij paris neruorum cerebri radice propaginem, ex superiori maxilla excidentem, ac nuper di-
 ctis musculis communicatum. Siquidem neruorum omnium seriem, quam dabitur, accu-
 ratissime in Quarto libro prosequar. Atque eadem ratione nullam neque uenarum neque ar-
 teriarum mentionem facio, etiam si lato musculo^b externa iugularis suffulciatur, quoniam
 Tertius liber Venis arterijsq; dedicabitur. Integrum itaque est, ut consideres membranosa li-
 gamina, narium alas alijs nasi cartilaginibus colligantia, & deinde mutuum earum cartilagi-
 num connexum. Nam de narium^f tunica in Neruorum distributione similiter pertractabi-
 tur. In præsentia autem suffecerit adhuc sermone adieciisse, tunicam illam, quæ narium ampli-

Primi ac se-
 cundi duodecim
 præcedentis
 Capitis muscu-
 lorum admini-
 stratio.

Corpus mu-
 sculorum secti
 om oportu-
 num.

Administra-
 tio 5, 6, 7, 8.

Labrorû fun-
 gosâ substanti-
 a.

Administra-
 tio 9 & 10.

Administra-
tio 11. 12.
Administra-
tio 3. 4.

tudinem ambit, aliquouſque cultello à ſubditis partibus abradendum eſſe, ut commodè te-
nuem membraneumq^k muſculū, in trō alam mouentem intuearis. His omnibus reſectis, ſecun-
dus alterius lateris præcedente Capite enarratus mihi¹ muſculus, externa ipſius ſuperficie lon-
gè ſpectatiſſimus eſt, ut tamen ipſius naturam quoque examiſſim obſerues, undecunq^e un-
guibus, hamulisq^e eſt diuellendus, ac poſtmodum à maxillis, & dentium gingiuis deaſus, à
tunica oris cavitatem obtinente uenit liberandus. Et quo huius muſculi rarior magisq^e admi-
randa eſt cōſtructio, fibrarumq^e mirabilis implexus, eo ſtudioſius illum in multas particulas
non mediocri delectatione diſcerpes, atque ad buccarum motum, non autem maxillæ inferioris,
illum auxiliari ſpeculaberis.

DE MUSCULIS INFERIOREM MAXILLAM mouentibus. Caput XV.

Inferiorē ma-
xillam ſuperio-
ri quieſcente
moueri.



INFERIOR^a maxilla homini, quieſcente interim immotaq^e ſuperiori, a figure ca.
motu agitur uoluntario, quemadmodum & animalibus ad unum om-
nibus, ſi fluuiatilem crocodilum exceperis, cui unico ſuperior maxilla mo-
bilis uiſitur, inferiori interim cum temporum oſſibus adeo unita, ut ne tan-
tillum quidem moueri queat, ipſaq^e duos ſinus nancſcatur, quibus ſu-
perior ſingulis utrinque tuberculis latis, nec^b noſtris admodum diſſi-
milibus inarticulatur, magna ex parte lacertarum teſtudinumq^e inferiori
lib. 1.
b 1, 2. fi. ca.
10 lib. 1. A.

Maxilla in-
ferioris motus

Maxilla mu-
ſculorum no-
mina.

maxillæ eleganter reſpondens, quemadmodum etiam totus crocodilus imagine (non autem
magnitudine, & geniculatis caudæ tuberibus) lacertæ ſimilis uiſitur. Cæterum inferior homi-
nis maxilla tribus ducitur motibus, ac unus quidem in mandendo perficitur, quo ad latera,
& prorfum & retrorſum maxilla agitur, ac circumfertur, alius in ore claudendo, tertius ue-
rò in ore aperiendo fit. Motus hi omnes proprijs obeuntur muſculis, ex quibus^c qui uarijs
motibus maxillam præcipuè circumagunt, & prorfum retrorſumq^e mouent, à mandendo
maoſntrigdr Græcis appellantur, quo etiam nomine Græcorum plerique temporum^d muſcu-
los nominarunt, quòd illi ad manducandum quoque ſint utiliſſimi, ac maxillam mordenti-
bus, molientibusq^e quippiam adducant. Deinde ita temporalis quoque nominatur, quòd in-
uicem temporalis & maſſeter adeo connaſcantur, ut Galeno etiam in Libris de Vſu partium,
ac ſi temporalis & maſſeter unus eſſent, impoſuerint, quum temporalis partem, maſſeterem
arbitratus, temporalem muſculum, ex ſui medio tendinem, contra aliorum muſculorum ra-
tionem, educere protulit, & poſt modum (ne ab aliorum Anatomicorum in muſculis nume-
ro aberrante uideretur) maſſeterem etiam quandam enumerauerit ſecus mouit, atque in Quar-
to de Adminiſtrandis ſectiōibus, ubi maſſeterem cognoscens, nihil de illa tendinis mirifica,
falſaq^e & ficta productione comminiſcitur. In eo itaq^e Libro Galenum ſecuti, atque cum ipſo
uocis fugientes æqui uocum,^e muſculos qui potiſſimum claudunt temporales toto ſermonis
progreſſu,^f illos autem, qui maxillam præcipuè antrorſum retrorſumq^e agunt, maſſeteres ſeu
mandibularios uel manſorios appellemus.^g Qui autem in ore occultari dicentur, & ſi eiſdem
ferè præſint munijs, in ore deſiſcentes nominemus, quemadmodum &^h qui ductus maxil-
læ ad inferiora autores cenſentur, os aperientes, ita nanque fictis quodammodo nominibus,
c 4. tab. r.
f 4. tab. d.
g 6. tab. D.
h 5. tab. H.I.

Libro 11.

Maſſeter ſeu
alter. in lace-
ris primus.

rerum ſocietate parabitur memoria. Maſſeter itaque ille eſt muſculus, quem ad poſterio-
rem maxillæ inferioris ſedem, ſub^k oſſe iugali poſſimus manu amplecti. Dum enim pollicem in-
ter auris radicem, & inferiorem maxillā inferis, medium uerò digitum genæ admoues, illumq^e
in oris amplitudinē protrudere tentas, totam maſſeteris externam ſuperficiem contineres, quam
rurſus tactu dignoſces, ſi adductas prius maxillas, adhuc ualidiùs comprimere adniſus fue-
ris, quia tunc maſſeter in ſe magis collectus, pollicem & indicem feriet, ſeſe dilatans ac contra-
hens. Præterea & hunc quoque muſculum in equis uides ſpectatiſſimum, is enim cum^l illo,
quem in ore latitare docebimus, illi ſunt muſculi, quos crebrò in equis amplecti conſueuimus,
obſeruaturi, num carneus aut nerueus equus nobis proponatur. Atque id eo dico diligentiùs,
quo minus aliquem mecum aberrare uelim, aliquot enim Galeni in Libris de Vſu partium lo-
cis deceptus,^m maſſeterem, quem modò deſcribam, aliquando temporalisⁿ muſculi mediam
partem eſſe arbitratus ſum, ac latum in genis^o muſculum, quem ab unā maxilla in aliam duci
prius retuli, maſſeterem eſſe exiſtimaui. Attamen eo uſque nunquam à ueritate reclinauit, quin
tunc duos temporales muſculos, ſemper in altero latere ſtudioſiſſe commonſtrarem, unum ſu-
perio-
riorem, qui uerè eſt temporalis, alterum inferiorem, qui maſſeter eſt, appellans. Maſſeter
enim nerueo,^p & amplo ualidiſſimoq^e principio ab ea malarum^q ſede exoritur, qua in ſima pars
ſuturae
i 3. tab. d. 2.
9. tab. C. 5. tab.
D.
k 3, 5. fi. ca.
6. lib. 1. V. X.
l 6. tab. D.
m 4. tab. r.
n 7. tab. d.
o 4. tab. M.
p 4. tab. E.
q 1. fi. cap. 9.
bb. 1. a.

futura illius consistit, quæ maxillæ superioris^d os, totum minorem oculi sedis angulum occu-
 pans, mediamq[ue] ossis iugalis sedem efformans, maximo eiusdem maxillæ^e ossi cōiungit, quod
 dentium præsepcola continere, ac narium amplitudinem magna ex parte constituit, superior
 Liber declarauit. Deinde à malis hoc masseteris principium in posteriora ducitur, è tota
 inferiori iugalis ossis sede originem ducit, carneum est, quemadmodum etiam totus musculus,
 sis iugalis, quæ à malis ad aurem usque pertinet, masseteris musculi principium enascitur,
 quod impenitè nerueum in malis esse dicebam, quemadmodum etiam illic, ubi ab exterioris iu-
 galis ossis superficiei inferiori parte prodit, nerueum liuidumq[ue] conspicitur. ubi autem ab in-
 teriori iugalis ossis sede originem ducit, carneum est, quemadmodum etiam totus musculus,
 non multo post initium, carneum crassumq[ue] se spectandum offert. Masseter hoc enatus princi-
 pio deorsum tendit, totamq[ue] inferioris maxillæ^f amplitudinem, in externa posterioriq[ue] ipsius
 sede conspicuam amplectitur, illi ualidissimè partim carneus, partim nerueus latissima inser-
 tionem implantatus. Ex tota autem insertionis amplitudine nulla insignior, nullaq[ue] ualidior est
 ea, quam in maxillæ inferioris asperitatem molitur, in infima ipsius sede ueluti processulis ali-
 quot extuberantem, in hac etiam^h sede masseter est angustissimus, & ueluti trianguli alicuius
 obtusioris angulum exprimit. Totus enim masseter quodammodo triangularis est, una
 enim ipsius linea, secundum totam principij amplitudinem, seu iugale os porrigitur, secunda
 à malis, seu anteriori principij parte, ad infimam maxillæ inferioris sedem retrorsum ducitur,
 illam quam nuper diximus, asperitatem contingens. Tertia autem linea ab aure, seu postero-
 ri principij sede, in anteriora deorsum fertur, ad demissiore secundæ lineæ sedem, angulum
 cum illa linea ad eò obtusum constituens, ut ferè hic aliud latius masseteri possit ascribi, atque
 illum quadranguli formam referre, quis non ineptè astrueret. Vtuncque uerò sit, obtulus
 hic angulus, seu si ita uelis, quartum masseteris latus, multò strictius est amplo illius princi-
 pio, unde etiam ilico fibrarum ipsius ductum uariare necesse est. Fibrae nanque ab anteriori
 principij parte originem ducentes, deorsum in posteriora feruntur,^k quæ autem à postero-
 ri principij sede prodeunt, obliquè deorsum in anteriora repunt, omnes ex amplo principio
 ad obtusum, quem recensui, angulum protensæ, maxillæq[ue] inferioris amplitudini, citra ten-
 dinis productionem insertæ. Galenus in Quarto de Administrandis sectionibus attestatur,
 nonnullos dissectionum Professores amplo huic principio (quod ipse Geminum appellat)
 & diuerso fibrarum ductui attendentes, binos ab utroq[ue] latere masseteres collocaße, ut unum
 anterior principij pars constitueret, alterum uerò posterior. Rursus non defuere, qui trian-
 gulare præsentis musculi circumscriptionem expendentes, tres in uno latere masseteres enu-
 merarunt, unumquemq[ue] angulum singulos masseteres esse arbitrati, tale enim quid Galenus
 nobis innuere uidetur. Quamquam arbitrer illos, qui tres masseteres utrinque collocarunt,
 non tribus illis angulis animum adhibuisse, uerum^l hunc, quem describo, masseterem unum
 appellarunt, &^m secundum temporalem, tertium uerò, quem in ore delitescere dico, posue-
 runt. Deinde qui duos recensuerunt, non mihi, ut Galenus asserit, principijs mentem adhi-
 buisse uidentur, sed masseterem hunc nostrum unum posuere, alterum uerò temporalem cum
 illo, qui in ore delitescit. quod uel ex Hippocratis oratione, ubi eos musculos Masseteres
 nominat, colligere promptissimum est. Præterea nisi in ore delitescens musculi munus mas-
 seteri accommodauerimus, neuti quam opportunè manducantium maxillæ inferioris in late-
 ra motus nobis explicabûtur. Quare etiam satius erit, masseteris musculi functionem tunc pri-
 mum persequi, quum temporalem, & in ore delitescentem plenè descripsero. ° Temporalis
 musculus principium^p à uerticis, & temporis, & frontis ossibus, & osse cuneum imitante,
 & eo osse, quod minorem sedis oculi angulum amplectitur, ac maxillæ superioris ossium mihi
 primum habetur.^q Instar semicirculi enim primum, & præcipuè à uerticis ac frontis osse mul-
 to elatius enascitur, quàm commissura squamæformis consistit, temporis os, uerticis ossi com-
 mittens. hinc sensim crassescens, & carnosior redditus arcatusq[ue], in cavitatem ibi in capitis
 ossibus exculptam descendit, à temporis osse, & cuneum imitante, & frontis, & illo quod mi-
 norem oculi sedis angulum constituit, enatus. Quum uerò ad iugale os usq[ue] pertingit, admo-
 dumq[ue] crassus, sed angustus interim euasit, superiori quoq[ue] iugalis ossis sedi adnascitur, mas-
 seteri ad eò continuus, ut uix immeritò temporale & masseterem, unum esse musculû quis cõten-
 deret. Cæterum uniuersum temporalis musculi corpus, ad iugale usq[ue] os carneû est, exteriori
 sede, propter propriam membranæ crassitiem, perquam liuidû, idq[ue] potissimum ad exortus sui
 initium, & ipsius ad os iugale connexum. Interna autem sede, qua ex ossibus ampla illa lataq[ue]
 explanatione enascitur, carneus est, & acutum maxillæ inferioris^r processum cõtingens in bre-

Temporalis
 seu alcerius la-
 teris secundus

uem, sed insigniter ualidum, nerueumq; finit tendinem, sua amplitudine acutum illum maxillæ processum amplectentem, illiq; processui ualidissimè insertum. Ad tendinem hunc omnes temporales musculi fibræ, ex semicirculo uelut ad circuli centrum procurrunt, tendinemq; hunc efformant illorum musculorum ritu, quos gibbum, & cauum scapulæ implere docebimus, & qui ex ilium osse pronati, femoris motibus famulantur. & is cuius beneficio brachium attolliur, adeò profectò, ut satis mirari nequeam, quidnam Peculiare illud sit, tantopere in temporali musculo à Galeno decantatum. Neque satis assequor, quamobrem is Naturam laudibus efferat, quòd ab aliorum musculorum forma hic declinauerit, tendinem educens non ex musculi extremo, ut aliàs semper, sed ex musculi medio. Ego ex tot Galeni in Naturam laudibus aliud nihil colligo, quàm illum arbitratum fuisse, musculum temporalem à nobis descriptum, unà cum massetere unum esse, atque tendinem, quem temporalis acuto maxillæ processui inserit, à temporali & massetere produci. Quod si hieret, ex media musculi sede tendo is enasceretur, temporalis scilicet musculi fibris deorsum ad tendinis generationem deductis, masseteris uerò musculi fibris sursum proreptantibus, & tendinem illum constituentibus. At quid attinet illis Galeni laudibus prolixius immorari, quas ad Naturæ dedecus potius, quàm honorem, (si quis examullum sua perpendat) contexit? præcipuè quum Natura non solum ab aliorum musculorum tendinis productione hic non aberrauerit, & si aberrasset, necessariò colligeretur, eundem musculum maxillam, & sursum & deorsum ducere. pars enim musculi sub tendine posita, necessariò deorsum traheret, quemadmodum superior sursum alliceret. Rerum igitur Opifici hymnos canamus, qui musculum ex tantillo spacio, tanto muneri præfectum produxit, ex quo insignem illum procreauit tendinem, acutum inferioris maxillæ processum amplexantem. Quo autem temporalis musculus robore polleat, & quo nam pacto pro ipsius mole ualidissimum omnium musculorum munus illi concreditum sit, condiscimus, quoties aliquid ui mordemus, & aliquid impetu dentibus confringere adnitimur, aut ingens aliquod onus histriones quosdam leuare conspiciamus. Ut enim uarios hominum in mordendo conatus taceam, nuper Patauî histrionem uidimus, qui ferreum uigintiquinque librarum palum dentibus à terra subleuatum, & aliquandiu in ore erectum, retrorsum à tergo punctum parieti iniecit, quem triginta nouem pedum interuallo ab histrione destitisse metitus ipse sum. Quamquam Turcum nuper Venetijs longè maius robur in mordendo ostendisse audio, qui trabem à quinque uiris illi allatam perinde, ac baculum aliquem, uarijs modis omnium admiratione contrectauit. Vtunque tamen temporalis musculus sit ualidus, multisq; neruorum propaginibus donatus, ac suæ nobilitatis gratia ossuosis uallis interceptus, aptisq; sinibus inclusus, nihilo minus tamen illi alterum quoque musculum, similiter robustum & neruosum, ac in ore delitescentem Natura associauit, eiusdem cum musculo temporali tendinis autorem. Atque huius principium perquam neruosum, ex tota cauitate sinuue exoritur, qui in ossis cuneum referentis processibus, quos uespertilionum alarum imagini comparamus, insculpitur. hunc siquidem sinum unà cum ossis processibus, musculi huius principium ambientibus (ut tutò principium id custodiretur) Natura fabrefecit, simul etiam processus hos longius educens, ut commodè ab ipsis principium illud enasceretur. Cæterum ilico atque cauitatem illam ossis cuneum imitantis excedit, carneum, amplum & crassum, ac forma masseteri perquam simile efficitur, interior enim iste musculus posteriori ac interiori parti maxillæ, ubi hæc latissima est, implantatur, ualidam amplamq; insertionem molitus. Ut uerò commodius præfens musculus à maxilla susciperetur, neque is nimium oris amplitudinem occuparet, leuem, sed amplam cauitatem maxillæ insculptam esse diximus, quando ipsius constructio in Primo libro enarrabatur. Porro musculus hic, quum eodem cum temporali fungatur munere, ac simul is temporali commissus unitusq; aliqua ex parte sit, nonnullis Anatomicorum in ore delitescens, temporalis pars habita est. alij uerò, etiam si inuicem committantur, quum tamen diuersis prodeant principijs, & in uarias eiusdem ossis sedes implantentur, duos ipsos statuunt. Nos autem ita illos distinguimus, ut utrinque unum temporalem, & unum masseterem, & unum in ore delitescentem enuimeremus. Atque his tribus primario usu hoc munus committitur, ut sursum maxillam inferiorem trahant, illamq; superiori iungant. Verum masseteri id priuatim committitur, ut masseterum anterioribus principij paribus contractis, inferior maxilla prorsum ducatur, mentumq; in anteriora promineat. Posterioribus uerò principij sedibus tensis, retrorsum ac uelut ad aures maxilla retrahatur adeò, ut duo hac ratione motus masseterum beneficio peragantur, quibus manducantes indigemus. Atque huic etiam motui suppetias fert temporalis musculus, prout has illasue sui principij fibras tendit

Li. ii. de Usu
partium.

Musculus in
ore delitescens,
seu alterius la-
teris tertius.

Masseteris,
temporalis, et
in ore delite-
scens tertius.

t. ut. p.
t. ut. p.
t. ut. p.
t. ut. p.
t. ut. p.

u. 2. fi. ca. 1.
li. 4. Q. 2.
b. 1. d.
x. 6. tab. D.

y. 1. fi. ca. 1.
li. 1. p. 1.
cha. 2. 3. 4.

4. 2. fi. ca. 1.
li. 1. d.

b. 4. tab. D.

dit, aut remittit. deinde masseterum, & in ore delitescantium musculorum opera, in latus maxilla ducitur. Dextro enim massetere duntaxat, & sinistro in ore delitescente musculo contractis, maxilla in dextrum latus agitur. At sinistri lateris massetere, & dextri lateris in ore delitescente musculo, unâ contractionem molientibus, inferior maxilla in sinistrum latus fertur. Atque his functionibus in ipsa sectione nihil æquè promptum cognitum, iam admonitus repeties. Enarrationi adhuc supersunt alij duo, utrinque^a singuli, & graciles & oblongi, originem ducentes ex prominētibus ossium temporum^a processibus, qui scriptorij styli imaginem referunt. Atque hinc membraneo latiusculoq; capite exorti, statim carnosioresq; fiunt, ac uersus priora maxillæ, ubi summum mentum habetur, procurrentes, interiori eius parti adnascuntur, & dexter musculus sinistro hîc ad insertionem unitur, in ea sanè inferioris maxillæ sede, ubi uel horum musculorum gratia, maxilla exasperatur, & processulos inæqualiter extuberantes gerit. Præsentem musculi, dum in se colliguntur, os aperiant, quemadmodum hæcenus commemorati illud claudunt. Cæterum utrique os aperienti musculo peculiare aliquid, & nulli uniuersi corporis musculo, præterquam^a uni, quem contra Galeni placitum ossi^a referenti ascribam, commune obtinet. His enim in medio itinere, quod ab exortu usque ad insertionem emittuntur, pars carnosior aboletur, & exanguis & nervosus efficitur, ceu tendō, uel ligamentum quoddam carniformibus fibris neutiquam enutritum, ita sanè, ac si quis ex duobus musculorum uentribus, in quorum medio tendinis species cerneretur, utrumque musculum consilari diceret, uerum hîc non perperam, neque ociose à consueto musculorum artificio Natura dedinauit, atque ideo encomio tibi celebranda uenit. Propria nanque exortus eorum musculorum regio, non erat post aures ad capitis basim, unde nunc à stylos imitantibus processibus explantantur, sed ad anteriores colli partes. si enim maximè secundum reuerentiam proprii principij, uterque maxillam deorsum traheret. At si ibidem ab ipsis ceruicis uertebreis producerentur, angustiam non paruam tum ipsi etiam primi maximè tulissent, tum omnibus alijs partibus inibi repositis præbuisent. in nulla enim propemodum totius corporis regione adeò exigua, tantum organorum acervum (quorum interim nullum transponi expedit) reperias, atque hîc in faucibus. Neque enim stomachum, neque laryngem, multo autem minus circumadiacentes eis musculos, neque uenas, neque arterias, neque nervos, neque glandes cum uasorum diuisionibus præfectas, tum ad humectandam laryngem homini opitulantes, neque aliud quiduis hîc in inferioris maxillæ amplitudine, citra noxam, uel sola imaginatione, sua sede mutare posses. Iure itaque musculi inferiorem maxillam deorsum tracturi, nequaquam à ceruicis uertebreis explantantur, sed à longis illis processibus stylos & gallorum calcaria exprimentibus. Et ubi regio potissimum frequentibus organis erat oppleta, hi musculi merito excarnes facti, ibidem in ipsorum medio, non abfimilem tendini partem commonstrant. si enim iuxta has in faucibus angustias crassiores essent, præ loci angustia iter ipsis præcluderetur. Si uerò omni ex parte adeò, ut hîc, fuissent graciles, ad nimiam peruenissent imbecillitatem, quum nullus musculus absque fibris carne amplexis constare possit, quam si haberent, & illius tendinis crassitiem superarent, quid his tanto interuallo, & per tot præcipitia ductis cogitari possit infirmius? Quocirca quoniam eos in his angustijs oportuit fieri, ad patiendum pertinaces & graciles, Natura iure totam eorum, quæ inibi esset carnem, ademit, solos & nudos producens tendines. quando uerò primum extra angustiam constituantur, tunc iam sensim carnem rursus assumunt, musculorumq; uentrem, ut antea circa exortum sibi uendicant.

Musculus
maxillæ
inferioris
ad
aures
et
ad
os
inferius
7. & 8.

MUSCULORVM INFERIOREM MA-

xillam mouentium administratio. Caput XVI.



ORVM qui maxillam inferiorem mouent, musculorum administratio nem debite absolutorum, illam à^a temporali opportunè aggredieris. Capite itaque in latus reclinato, grandiori, quem administrandis sectionibus parasti, cultro, & admoto etiam malleo,^b iugale os ad aures & malas excindes, & id acutiori cultello undequaque à musculo temporali, cui ualli ritu hoc proponitur, & massetere, cui principium exporrigit, liberabis, exactè tum temporalis musculi ad illud os connexum, & masseteris exortum considerans. Ablato iugali osse temporalis musculi principium, quod secundum capitis longitudinem semicirculi instar exoriri dicebatur, undecunque nouacula, aut cultello proximè ab osse abrades, quousque totum musculum à caluariæ, & maxillæ superioris ossibus

Temporalis
administratio.

bus ademeris. Iam temporali musculo deorsum & extrorsum reflexo, intuebere nervo ossi-
mum ipsius tendinem, acutum maxillae inferioris processum, quasi in se occultatum, ample-
xantem. Deinceps qui is musculo in ore delitescenti, & masseteri committatur, spectabis. po-
stremo, si aperto ore, musculi temporalis initia sursum trahere non detrectaueris, ipsius mu-

Masseter.

nus promptè etiam condisces. Nunc integrum est, masseterem à iugali osse & malis libera-
tum, ab humiliori maxilla similiter cultello deradere, atque illius insertionem non oscitanter
perpendere, animum adhibens, à massetere nullam portionem conferri ad musculi tempo-
ralis tendinem, maxillae processui insertum. Integrum quoque erit, masseteris officium inda-
gare, posteaquam sectionis serie, maxillam inferiorem carne denudaueris. Omnibus enim
membris, quorum motum in mortuis animalibus examinare instituiamus, commune est, ut
uniuersam carnem ab illis ossibus, quorum motus indagatur, auferamus, ac illi duntaxat mu-
sculi, quorum beneficio ipsa mouentur, intacti maneant. Proinde maxilla inferiori his, quae
illi inferius adnascuntur, corporibus liberata, si masseteris musculi principia huc atque illuc
traxeris, facillimè his maxillam in latera, ac prorsum retrorsumq; agi, & denum ad superio-
ra etiam allici spectabis. ^{c 4. l. a.}

*Musculi in
ore delitescen-
tis.*

Musculum in ore delitescentem ad amussim, nisi inferiori maxilla ^{d 6. l. a.}
in menti regione per medium dissecta, administrare poteris, ac proinde grandiori cultro o-
peri adhibito, ipsam à summo mento auspicatus, per medios dentes incisos diuides. di-
uisam utrinque manibus apprehendes, ut utranque ipsius partem in latera reflectens, ac il-
lam ueluti ex superioris maxillae ^{c 4. s. f. ca.} sinu luxans. Mox oris tunicam circa maxillae extrema, ^{6 lib. 1. b.}
tis instar separabis, quousque musculus in ore reconditus sese ex omni parte offerat. quem
si uisum fuerit, aut ossibus commissum relinques, aut ab ipsis derasum abijcies, ipsius quo-
que functionem non oscitanter expendens. Verùm sectioni non obueris, si musculi eius ad-
ministratiōi tantisper supersederis, donec linguae & ossis ^{f 5. l. a.} u imitantis musculos unà cum
illo aggredieris, ne modò hunc uidere studens, illos imprudenter laceres. Musculum qui
os aperit, ad maxillae inferioris longitudinem protensum reperiēs, atque, ut diximus, maxil-
lae in interna summi menti sede insertum. Hic nullam peculiarem administrationem exigit,
si prius masseterem, & glandulas cum uenis & arterijs, quae auribus subijciuntur, rescueris.
Huius initium, si uersus stylium imitantem processum protrahetur, maxillam deorsum uel-
lere uidebitur, atque id nonnihil oblique in unum latus, si unius tantum musculi initium tra-
xeris. Vtroque autem attracto, rectus, neque in alteram partem inclinans, perficietur ma-
xillae ad inferiora ductus. At horum musculorum perinde, ac in ore delitescentium sectio,
tunc demum opportuniùs perficitur, quum linguae, & ossis hyoidis, & laryngis musculi u-
nà aggrediuntur. Ligamenta maxillam inferiorem superiori alligantia, ligamentis alios
articulos membranæ instar ambientibus respondent, nihil sibi quicquam peculiare uendi-
cantia. Tamen si ligamento orbiculatim dissecto, articulum dissolueris, in huius articuli pec-
uliarem incidēs cartilaginem, quae neutro ossi connata, sed solum in il-
lorum medio posita, ligamento articulum ambiente adnascitur, & uim
ossium in magno, uehementiq; maxillae inferioris motu excipit, & mode-
ratur. Lineamenta uerò musculorum, quae in Quarto de Sectionibus
administrandis libro Galenus post aures obseruari docuit, neutiquam hactenus in homini-
bus reperi, quanquam in canibus aures mouentium musculorum naturam, formam, or-
tum, functionemq; optimè affecutus fuerim. dein hos musculos nonnihil, sed minus quam
obscurè, simiam ostendere obseruau. Interdum etiam quibusdā raris fibris carneis, membra-
na, quam carnosam uocamus, supra aures augetur, & modicè auri proximam cutem, & ipsam
quoque aurem motu agit arbitrario.

*Musculi max-
illae deorsum
trahentis.*

*Musculi eius
obliquus mo-
tus.*

*LIGAMENTA
maxillae arti-
culorum.*

*Peculiaris
cartilago arti-
culorū inferio-
ris maxillae cū
superiori.*

*Musculosa
in temporibus
lineamenta.*

DE MUSCULIS OSSIS u IMAGINEM referentis. Caput XVII.



*Musculi
huius ossi com-
munes aut pro-
prii.*

^{a tota 1. 2}
^{f. ca. 13. l. a.}
^{e 1. f. ca.}
^{2. l. 2. A.}
S^a HYOIDES in faucibus superiori laryngis sedi praecari, & ra-
dici linguae fundamenti uice, super quod moueri eam oporteat, & plu-
rium musculorum uelut anchoram esse, iam antea diximus. Ex musculis
uerò qui ossi committuntur, alij quidem ipsi sunt proprii, & solius huius
ossis gratia constructi, qui omnes ex alijs ossibus principium fumentes
huius ossi u simili inseruntur. alij autem ex osse hoc procedentes, alijs or-
ganis famulantur. Qui igitur ossi ipsi peculiare propriiq; sunt, hoc po-
tissimum praestant, ne os non admodum stabili firmatum basi, hinc inde ad latera, uel sursum
aut

aut deorsum, uel prorsum aut retrorsum conuellatur. Sunt porrò hi ad minimum numerum redacti septem, ad maximum autem octo, utrinque nimirum quatuor, ut uniuerſi quatuor conſtituant paria.¹ Primus cæteris ualidior & craſſior, biſidusq; aut geminus eſt, ſcutiformi laryngis cartilagini, & aſperæ arteriæ in collo exporrecuſus. Lato nanque & carneo principio ex eminentiori pectoris offis ſede, ad partem magis internam exoritur, recta que ſurſum tenſus, ac parem ſemper ipſi origini latitudinem ſeruans, in² anteriorem hyoidis offis partem inferitur, carnoſo innexu totam amplitudinem mediſ officuli, cui hyoidis offis latera firmantur, apprehendens. Huic muſculo ſecundum ipſius longitudinem in medio linea incifa eſt, cuius occasione, ex duobus muſculis ille conſtare non inepre dicitur, ac duorum muſculorum, ſeu uniſ paris uice enumeratur, qui hyoides os deorſum, ſi quando uiolentiùs à ſuperioribus muſculis ſurſum uellitur, retrahunt, &³ ſcutiformi cartilagini, & aſperæ arteriæ, propugnaculi loco haberi poſſunt.⁴ Tertius igitur & quartus, utrinq; unus his duobus opponuntur, & ampli, breues, ac omni ex parte carni, à maxilla inferiori, ſub ſummo mento interiùs enaſcuntur. Hinc procedentes, ac ad modum modicè arciores redditæ, & deorſum protenſæ, hyoidi offi duobus primis contermini inferuntur, eandem prorsus inſerionis latitudinem, in anteriori offis ſede cum illis exigètes. Ac proinde hi os ſurſum oppoſito duobus inferioribus, ſeu primis motu, deinde & modicè in exteriora protrahunt, quemadmodum & humiliores quoq; in exteriora os perquam obſcurè promouent.⁵ Quintus uerò ac ſextus, ab utroque latere ſinguli admodum graciles, teretesq; ſunt muſculi, qui ab offis temporis⁶ proceſſum radi cibus, quos ſtylum & gallicalaria referre diximus, explantati hyoidis offi inferuntur, ad latus amplitudinis, quam primi quatuor muſculi occuparunt. eſt autem hæc regio, ubi offis latera cum medio officulo coeunt. Muſculi hi toto ductu illis⁷ muſculis exterioribus attenduntur, quos maxillam inferiorem deorſum trahere retuli, qui etiam ab eiſdem ſtylum imitantibus proceſſibus, ſed paulo humiliùs, quàm hi hyoidis offis muſculi exoritur. Porrò his duobus offis u referentis muſculis, ne id aut in dextrum, aut in ſiniſtrum reuellatur, munus cõcreditum eſt, & præterea illud quoque ſurſum nonnihil introrſumq; contrahunt. At⁸ ſeptimus & octauus, præſentis offis muſculi, utrinque etiam ſinguli graciles longiq; uiſuntur, nullus enim uniuerſi corporis his ſimul & gracilior & longior occurrit. Deinde uterque eneruationem quandam ſibi cum muſculis, maxillam deorſum trahentibus priuatim uendicat,⁹ in medio nãque ipſius ductu carneus eſſe deſinit, tendinis aliquouſq; naturã oſtendens, à qua denuo carneus euadit, ac ueluti duos muſculi uentres nan ciſcitur. Principium etenim carneum, ex elatiori ſcapulæ coſta, iuxta ipſius ceruicem, & proceſſus anchoram imitantis¹⁰ radicem obtinet, & ſub¹¹ muſculo ſcapulam ad occipitum trahenti occultatus, ſurſum oblique protenditur, ſub¹² muſculo à pectoris offe & clauicula, in mamillarem capitis proceſſum inſerto, qui hunc hyoidis offis muſculum adeò comprimit, ut carnoſus ſub illo eſſe deſinat, tendinisq; ſpeciem oſtendat perinde, ac ſi digniori illi caput mouenti muſculo cederet, aut ipſe durior factus, in contractione impetum mouentis muſculi faciliùs exolueret. Nam ſimul atque illum ſuperauit, rursus carneus apparet, quouſq; in eam hyoidis offis regionem implantetur, in¹³ quam ſextum & ſeptimum, inſerionem moliri dictum eſt. Galenus Quarto de Adminiſtrandis ſectionibus libro ipſos ſcapularum proprios eſſe arbitratur, horum ope illas ſurſum ad guttur agi aſſerens, quàm uerò id ueritati conſonum ſit, obſeruari peroptarim, mihi enim hyoidis offis, non ſcapularum proprii uidentur, nec quicquam his cum ſcapularum motu commune eſſe exiſtimo. Quippe minores ſunt, minusq; firmi (quum ipſi hyoidi committantur) baſi ſtabiliuntur, quàm qui ſcapulam (cui brachium, cubitus & extrema manus appendent) attollere obliquo motu poſſint. Deinde ſubſtantia formaq; cæteris hyoidis offis muſculis, nequaquam autem ſcapularum motuum autoribus, reſpondent. Quod Veteres pulchrè norunt, ex quorum ſententia Galenus in Libro undecimo de Partium uſu, hos muſculos hyoidi offi aſcribit, licet rursus ſui oblitus, in Decimotercio de Partium uſu eoſdem inter ſcapulæ motores commemoret, ſacile in illis, ut in alijs plerifque ſcapulæ muſculis aberrans. Quin etiam hyoides os his muſculis omnino indiget, ſi demum id contrario motu agi debuit, quem quintus & ſextus muſculi perficiunt. Videntur ſanè mihi poſtremo loco enumerati muſculi, deorſum ac utrinque ad latera hyoides os detrahere. & niſi his illa cõcederetur actio, hyoidis offis ſitus prorsus fallax eſſet. Adde muſculis his, ubi ſcapulæ committuntur,¹⁴ neruulum applantari, nequaquam autem ubi hyoidi inferuntur. Erunt itaque mea quidem ſententia octo muſculi, ſolius hyoidis offis occasione eſſe formati, in hoc ſcilicet, ne hinc inde ex ſua ſede id turbaretur, fundamentumq; plus ſatis infirmum linguæ, & ipſi quoque laryngi efficiatur. At muſculi quos hyoidi offi non proprios eſſe dixi, ex ipſo originem mutantur, atque horum quatuor laryngi, & alijs

Propriorum
primum par,
ſeu alterius la
teris.

Secundum
pari.

Tertiū pari

Quartū pari

Quintū pari,
ſcapularū mo
tibus non ſub
ſeruire.

Muſculi hyo
idi offi non
proprii.

& alij linguae porriguntur. ¹ Primi duo laryngem adeuntes, lati & carnosi sunt, & ab inferiori hyoidis ossis sede enati, ac postea anticae scutiformis cartilaginis parti, secundum ipsius longitudinem attensi, tandem humiliori eius cartilaginis sedi secundum latitudinem inferuntur. ² Alij duo paulo minus teretes sunt & graciles, deinde toti carnosi, ex ³ mediaq[ue] ossis hyoidis interna sede enati, implantantur radici laryngis ⁴ operculi, quod *ἐπὶ γλῶττις* Græcis dicitur, quod uero horum sit munus, & quos ex his Galenus prætermiserit, in musculorum laryngis enarratione docebitur. Linguae autem ⁵ musculorū sermo, mox post subsequens Caput insituetur.

PROPRIORVM HYOIDIS OSSIS

musculorum administratio. Caput XVIII.

Secundi partem administratio.

Primi partem.

Tertij partem.

Quartæ partem.




OMM ODE horum musculorū sectionem administraturus ceruici (ut in posteriora pendente capite, ea exporrigatur) truncū aut oblongum lapidem subiicies, & uenis, arterijs, glandulisq[ue] in harū distributionibus locatis utcunq[ue] resectis, minoribus cultellis sectionē aspiciabere præcaues, ne angulosus lapis posteriorem ceruicis sedem occupātes musculos comprimendo uiciet. Ac primū quidem ab inferiori maxilla, quæ adhuc integra est (nisi illam ¹ musculi maxillam attolentis, & in ore ² delitescens occatione tregeris) obliquos & latos musculos, qui ³ tertij & quarti loco habebantur, derades eos usque ad regionem, qua hyoidi ossi implantantur, dissecans. Deinde ⁴ primi & secundi capite à pectoris ossis liberato, utrumque uersus os hyoides deducito, illos à ⁵ musculis separans, qui duobus his hyoidis ossis musculis substrati, à pectoris ossis in scutiformem laryngis cartilaginem pertinent. Quum enim horum ossis hyoidis musculorū originem aggredieris, studendum est, ne initia ⁶ musculorum à pectoris ossis & clauicula, ad mamillarem capitis processum ascendenti uicies, aut etiam ex eadem sede natos, nuperq[ue] dictos scutiformis cartilaginis musculi ⁷ una auferas. ⁸ Quintum & sextum summis digitis, aut exiguo cultello à conterminis partibus, usque ad stylum referentes capitis processus deduces, illorumq[ue] initia illinc liberabis. ⁹ Secundum & octauū uix, nisi secundo scapulam mouentium ¹⁰ musculo, & illo qui à pectoris ossis & clauicula mamillarem processum petit, abscēdis, aggredi promptum est. nihil tamen prohibet ipsos à uicinis partibus exiguō longoque cultello buxco, aut solis digitis liberare, ipsorumq[ue] capite apprehenso, id à scapula cultello diuidere. Quamquam hos, donec musculos scapulam mouentes aggredieris, interdum seruandos duco, ut quemadmodum non semel tentauī, tu quoque experiaris, num musculi illi scapulam omni prorsus carne liberā sursum agere possint, contemplerisq[ue], quā bellē primo quodque tensionis impetu rumpentur. Caterū proprijs octo hyoidis ossis musculis hac ratione ab ipsorū principijs pendentibus, integrū erit cuiusq[ue] musculi munus indagare, quolibet musculo ad suum principium leuiter acto. Musculorum hyoidi ossi non propriorum sectio, in eum locum referuabitur, qui earundem partium, quibus illi inferuntur, Anatomen pertractabit.

DE LINGVÆ MUSCULIS.

Caput XIX.

PRIMA DECIMINONI SECUNDA CAPITIS FIGVRA.



TER

TERTIA FIGVRA, CVIVS

SICVT ET DVARVM PRÆCE-

dentium ac omnium characterum In-
dex modò subijcitur.

PRIMA figura linguam unà cum ipsius musculis, à reliquo liberatam corpore, ex dextro latere commonstrat, musculorū dextri lateris naturam ac situm, quam fieri licet, proximè exprimens.

Secunda figura eadem, quæ prima, oculis subijcit, verum ut primi linguæ musculi, ac item noni natura aliquo pacto hic magis, quam in prima conspiceretur, tertium & septimum, linguæ musculos sursum refleximus, quinto interim deorsum ab ipsius insertionē propendente.

Tertia figura nouem linguæ musculos abscisos habet, ac lingua secundum longitudinem diuisa cernitur, linguæ ligamento hic ab utrisq; linguæ corporibus dirempto, & corporum superficie, quæ ligamento continuatur, hic apparente. Atq; cum in modum hominis (ut semel dicam) linguæ constructio est expressa, quo nobis hanc picturis assequi datum fuit.

A, A, 1, 2, 3 Linguæ portio ante confectionem in hiantē ore conspicua, & tunica adhuc obiecta ipsi, ac toti ori, & stomacho, item & asperæ arteriæ communi.

B, B, 1 Hæc linea dictæ nuper tunica partem notat, secundum inferioris maxillæ latera ab ore diffusam. Linguæ enim portio supra lineam consistens, illa adhuc obtegitur tunica, quæ autem sub linea cernitur, hic (uti etiam nunquam) illa tunica non succingitur.

C, 1 Iam dictæ prius tunica portio, quam hic à palati intimo unà cum lingua præscindimus.

D, D, 1, 2 Primus linguæ musculus.

E, 1, 2 Tertius linguæ musculus.

F, 1, 2 Quintus linguæ musculus.

G, 1, 2 Septimus linguæ musculus.

H, 1, 2 Nonus linguæ musculus. *I, 3* Linguæ ligamentū, cui linguæ corporū fibræ continuantur.

K, K, 3 Dextri linguæ corporis fibrarū species. *L, L, 3* Sinistri linguæ corporis fibrarū species.



LINGVÆ moles ori exquisitè congruit, in omnē enim eius sedem commode pertingit, quod sanè, si minor esset, ipsi negaretur. neque rursus præ oris angustia impeditur, quamuis tamen id facillimè contingit, si aliquando in magnitudinem præter naturam excreuerit. Quoniam uerò promptè ipsam impetu atque ex nostro arbitratu moueri in omnem partem conueniebat, hanc musculosam fieri summus rerum Opifex uoluit. Insuper quoniam deorsum oportebat eam detrahi, & sursum uersus palatum agi, atque ad latera circumduci, postremò prorsum, retrorsum, atque ipsam hinc inde reflexam, & in se collectam moueri, operæpretium fuit multos illi elargiri musculos, qui uariorum motuum autores existerent. Linguam autem fortem & magnam, ad basim stabilitatis gratia, tenuem uerò, ad terminum mucronem uē, ut celeriter moueretur, merito factam esse neminem latet. Verum qui, qualesq; & quot numero ipsam agant musculi, cognitu est quàm difficillimum. Adeò enim inuicem connectuntur, ipsorumq; fibræ mutuo tam uariè cōeunt, ut iustum numerum, formamq; musculorum, & motuum linguæ differentias cognoscere, non iniuria arduum censeatur. Imò linguæ constructionem hæcenus à nemine ad amussim perspectam fuisse, neq; etiam ocyus fore metuo adeò, ut fateri cogamur eò Conditoris nostri in effingendo ex terra Adamo artem industriamq; processisse, ut tota hæc nō inueniatur, quantumuis longo temporis spacio, idq; à Viris illustribus fuerit indagata. Quousq; tamen in linguæ constructione Galenus eximium Naturæ miraculum artificiumq; perspexerit, minimè constat, ea siquidem Libri de Administrandis sectionibus pars, in qua linguæ musculos proculdubio recensuit, nobis unà cum Libris de Musculorum resectione interijt, aut potius apud cōmunis utilitatis inuidiosissimos homines, nullum sui usum præbens supprimitur, à tuncisq; ac blattis corrodenda & secanda (quum ipsa sectionem docere deberet) latitat. In Libris autem de Partium ulu per transversam, leuiterq; duntaxat de linguæ motu, absq; peculiari alicuius muscularum

Linguæ magnitudinem iustam esse, illamq; musculis egere.

Difficile esse musculorū linguæ cognitionem.

Y enar.

*Quid lingua
in musculis ra-
rum habeat.*

enarratione meminit. Ego quantum hactenus affectus sum, linguarum quippiam, ac proprium præter ceteros musculos fortiri obseruo, ad radicem enim proprios quosdam, ac suis fibris utcumque distinctos exigit musculos. Atque ex his quorundam fines illic terminare uidentur, ubi lingua in longitudinem ferri incipit, cum sua radice quodammodo angulum constituens. est autem is locus, ubi^a corpus laryngem in ciborum uoratu obturans ostenditur. Alij musculi hic neuiquam cessant, sed mixti inuicem, raram corporis partem efformant, nempe duorum ueluti oblongorum musculorum concursum, qui ligamentum quoddam tenuissimum, membraneum, ac ad linguæ crassitudinem latum, in ipsorum medio plerumque adipiscuntur. Sic lanè, ut uniuersum linguæ corpus ante sectionem nobis apparens, ex duobus illis musculosis corporibus, ligamento hoc, accurrentibus uenis, arterijs & nervis, atque hæc omnia integre duplici membrana, conformetur, una quidem musculis omnibus communi, quæ est interior. Altera autem eius tunica pars censetur, quæ uniuersam oris amplitudinem luccingit, & eadem continuaque cum interna asperæ arteriæ ac stomachi tunica existit, priuatimque tertij paris nervorum cerebri præcipuas^b portiones, sibi insertas uendicat, quarum beneficio lingua gustatorium organum efficitur. Rarum uero id atque peculiare, quod duo hæc musculosa corpora obtinere diximus, ad hunc quasi modum sese habet. Quum ceteri corporis musculi unicum ferè fibrarum genus, aut rectum scilicet, aut obliquum, aut transuersum duntaxat obtrineant, hæc interim corpora obliquas, transuersas, rectasque fibras simul adepta mihi uidentur, quæ inuicem adeo coeunt, commiscunturque, ut in his aliquod fibrarum genus sectione assequi propemodum sit impossibile, imò musculosa hæc corpora quippiam non ab simile cordis^c substantiæ, in ea fibrarum contrariarum comixtione adipiscuntur, quanquam non adeo atque cor, solida consistat substantia. Sed carnosæ fibræ in pinguioribus, & iam ætate prouectis animalibus, pinguedinem in lingua adnatam obtinent, & fibræ multo quoque rariùs in lingua conferuntur, quàm in compactissima cordis substantia. Atque hæc uel inter edendum cuius euadunt perspicua, quàm scilicet à musculorum carnis natura, formaque & gustu, linguæ pars, quæ in delictijs haberi solet, uariet. Verum ex quibusnam musculis hæc linguæ pars formetur, ac unde musculi linguæ, quos inter dissecandum obseruavi, originem ducant, nunc opportune subiicietur.

*Linguae pars
ante sectionem
cõspicua, quibus
cõstet partibus.*

*Inter mani-
festos lingue
musculos duo
primi.
Tertius &
quartus.*

^d Duo quidem sunt recti, & impenso crassi, obscureque ab inuicem, ac si plures duobus essent, alii quot locis discreti, qui ex media, superiorique ossis u^e imaginè referentis sede, carnei, sed utcumque fungosi principium ducunt, ac secundum linguæ longitudinem protensi, ipsius medio rectè inseruntur, quam contracti rectè intrò, & uelut ad posteriora uellunt. ^e Tertius & quartus, ex duobus superioribus ossis hyoidis offiis oriuntur, quæ ad ipsius latera haberi, ac ipsorum sine ad stylos usque imitantes capitis processus desinere diximus. Quanquam etiam interdum hi musculi ab^f humilioribus ossis hyoidis lateribus, quæ superioribus scutiformis cartilaginis processibus colliguntur, principium sumant tunc nimirum, quum superiora hyoidis ossis latera non planè ossæ, cum ligamentorum natura aliquid commune adipiscuntur, quod non infrequenter, & potissimum in mulieribus obseruatur. Musculi igitur illinc exortum adepti, & oblique quodammodo procedentes, linguæ lateribus implantantur. Si horum alter uno remisso laxatoque tendatur, lingua, & potissimum sua radice, in latum deorsum uellitur, at si simul uterque agat, lingua in neutram partem inclinans deorsum, uersus interiora quoque mouetur. ^g Quintus & sextus, similiter carnosi & utcumque crassi, duobus nuper dictis opponuntur, ac à temporum ossium^h processibus, qui styli acusque imaginem referunt, explantati, linguæ ad nuper dictorum fines innascuntur. Hi quoties ambo conuellantur, uersus interiora linguam sursum agunt, at si alter duntaxat in se colligatur, lingua sursum tracta ad alterum latum inclinatur. Sunt & alij duo linguam ad inferiora contrahentes, ac ad latera inuoluentes, qui ex inferioris maxillæ lateribus, intus ad dentium molarium radicem utrinque lato, & utcumque mucoso principio enati, linguæ secundum ipsius longitudinem usque ad ligamenti finem, quo faucibus illa colligatur, sese inferunt, non quidem prorsus in linguæ medium, sedⁱ duorum, quos primos enuerauimus, musculorum latera. Horum altero tantum suas fibras colligente, conspicua ante sectionem linguæ pars, in contracti musculi latum conniuet, at utroque laborante, pertinaciter lingua faucibus recto motu adigitur. Post hos^j carnea quædam moles ab^k interna quoque inferioris maxillæ sede, ex menti regione enascitur, ab illis præcipue processibus, ipsorumque lateribus, qui inæqualiter in interna inferioris maxillæ ad summum mentum sede extuberant. Præfens moles sursum retrorsumque ad fauces ducta, in linguæ radicem, amplam insertionem molitur, quemadmodum etiam lato principio originem sumit. Hæc moles linguam ad mentum contrahere uidetur, nunc exquisitè ad laborum medium, nunc autem ad latum, prout nimirum has illas uel fibras laxat, & intendit, fibræ enim ipsius rectæ, secundum totam illius amplitudinem,

*Quintus &
sextus.*

*Septimus &
octauus.*

Nonus.

a 2 fi. ca. 21

hæc ferè
tertia fi. se-
natam pro-
ponit literis
K, K, L, L, L,
131.

b 2 fi. cap. a
li. 4 X, Y.

c 11 fili. 6
141.

d 12 fi. D.

e figure cd.
13 lib. 1. sed
precipue 2
figure D. 4 fi.
C.
f 12 fi. E.
g 1, 2 fi. ca.
13 lib. 1. K.
h eandem
fi. E. E.

i 1, 2 fi. F.

k 3, 4, 5 fig.
ca. 6 lib. 1. l.
1, 2 fi. E.

m 12 fi. G.

n 1, 2 fi. D.

o 1, 2 fi. H.

p 2 fi. ca. 10
li. 1 H.

ab anteriori sede retrorsum ductæ conspiciuntur. deinde præter fibras, uelut quasdam inscriptiones quoque rectâ progredientes exigit, quasi harum occasione, plurium musculorum numero etiam habenda esset. Enarratos iam musculos, qui undique attentum habent adipem, inter dissecandum ad linguam porrigi in scholis ostendi, & horum plurimos circa ipsorum finem inuicem confundi, ac duo, quæ prius innuimus, musculosa corpora constituere. hæc triplex fibrarum genus obtinere superius dictum est, quæ inuicem adeo permiscuntur, ut eas inter noscere sit quam difficillimum. Inter reliquas tamen obliquas transuersasq; in corporum medio plurimæ reperiuntur, quæ mihi utrinque in proprium linguæ ligamentum longè tenuissimum, & membranæ non ab simile, tanquam in ipsorum firmamentum desinere uidentur, rectæ uerò pauciores sese offerunt, omnes propemodum in externa eorum corporum superficie excurrentes. Transuersarum fibrarum beneficio linguæ corpus ante sectionem apparet, in se contrahi incrassatq; & rursus egeri tenuariq; arbitror. id enim in ligamentum fibrarum insertio, tibi dissecanti utcumque commonstrabit. Rectis uerò fibris, lingua in semicirculum, ad palatum faucesq; conuolui spectatur, prout nimirum aut superiores, aut inferiores tenæ fuerint. Porro obliquis fibris, in latera linguam agi omnino coniecto sic sanè, ut alij interim musculi linguæ moueant radicem, alij uerò linguæ corpus, ante confectionem in hiantem ore conspiciunt. Ligamentum uerò, cui fibræ firmantur linguæ, ossis uice datum est. Haud enim decessisset, linguæ secundum ipsius longitudinem os, aut cartilaginem quantumuis etiam in minutissimas diuisam uertebas, innasce, quum tam uarijs diuersisq; moribus, inter mandendum loquendumq; moueri linguam oportuerit, ipsaq; interim nullum corpus suffulciat, ac quouis etiam serpente agilior fluctuosiorq; esse debeat.

Musculosa substantia lingua partis ante sectionem cernitur.

LINGVÆ MUSCULORVM ADMINISTRATIONE. Caput XX.

Administratio. Caput XX.



MUSCULORVM linguæ sectio communis cum reliquis erit. Deducta igitur, quantum licet, utraq; maxilla, & oris tunica, cutis modo à subditis organis, quam licet, exquisitissimè cultello undecumq; detracta, omnium primi secabuntur obliqui, quorum principium à processibus styli imitantibus pendet, quod iam ab oblongis illis officulis uenit liberandum. Iam hos ad linguæ radicem studiose secutus, eam carneam molem, quam nono loco recensui, ab inferiori maxilla liberabis, atque quam poteris, accuratissimè ipsius inscriptiones, & ipsi immixtum adipem, deinde illius etiā exortus, & implantationis latitudinem spectabis. atq; hæc perfectis promptissimè, si modo ad dentium incisuram radicem, & sub mento uicissim sectionem tentaueris. Mox post hos aggredieris, qui ab internæ maxillæ sedis lateribus enascuntur, & linguam ad latera mouent. post hos autem, aliorum duorum obliquorum, ab ossis hyoidis lateribus originem ducentium principia liberabis. Postremò autem illi ab hyoide osse auferentur, quos primos recensuimus, quiq; maximam linguæ radicem partem constituere uidebuntur. In huiusmodi administratione exiguum cultellum, liberandis musculorum capitibus operi accommodabis, ad reliquam uerò separationem buxum cultellum, quod mucosi admodum sint musculi, adhibere nihil prohibet. Cæterum linguæ reliquum corpus ad hunc modum aggredi consulo, ante omnia id ambiens crassior membrana, toti communis ori deradetur, firmius enim connascitur, quam ut citra coctionem, cutis modo à lingua auferri possit. Deinde & illa membrana, quæ musculis omnibus est communis, quamq; frustra separare contenderes, relicta, sectio ad linguæ medium super id, quod diximus, ligamentum, & secundum linguæ longitudinem ducetur, non superficialis tantum, sed quæ ad medium usq; linguæ penetret, ut etiam uniuersam diuidat. Mox hamulis & cultellis, fibrarum corporis linguæ naturam sedulo inquires, ac qui fibræ ligamento committantur, eas inuicem uariant, & commisceantur, perspicias, num scilicet eo, quo dictum est modo, aut dissimiliter sese habeant. Ego nanque, ut mihi linguæ constructio apparuit, hæc trado, lubens, si quid notius ueriusq; occurreret, inperiturus. Porro neruos à septimo præcipue pari neruorum cerebri, & à sexto, linguæ musculis motus principium præbentes de industria, ut & cæteros neruos, in Quartum librū reuocatio, atq; ideo etiā hic, nisi de ligamento linguæ faucibus colligante, paucissima recensenda supersunt. Est autem id ligamentum, quod ad palatum reflexa lingua, aperto ore sub ipsa conspiciuntur, magni usus gratia efformatum. Nisi enim id esset ligamentum, lingua nimum aliquando retrorsum in se colligeretur, nec facile exerta intrò retraheretur, præterea neq; sedem obtineret stabile & tutâ, ut quæ undiq; esset soluta. Vtq; enim munere ligamentum fun-

Administratio quinti & sexti.

Noni.

Septimi & octauæ.

Tertij & 4.

Primi & 2.


Reliqui linguæ corporis administratio.

Ligamentum linguam suam colligans.

gitur, nimirū ut & basis linguae sit firma, & linguae finis promptē quoquoerum pertingat. At uerò si ligamentum in modicā linguae partem procederet, minus quidem, quàm si omnino factum non fuisset, sed proximē, & propemodū similiter linguae in cōmodaretur. si rursus idem ad plurimum linguae spaciū pertingeret, neūquam ad palatum, neque ad superiores dentes, neque ad alias multas oris sedes lingua extenderetur. Tam igitur exacta est uincoli commensuratio, ut siue adieceris, siue abstuleris aliquid, quantumuis exiguum, uicietur totius linguae functio. quod indies in artis operibus experimur, quoties id ligamentum praescindimus, aut propter nimiam humiditatem laxum reficcamus.

DE LARYNGIS MUSCULIS. CAP. XXI.

QVONIAM in integris musculorum tabulis in praesentis Libri initio seriatim positis, omnes laryngis musculi oculis subijci nequierunt, nō abs re fore putauī, in huius Capitis fronte priuatim laryngis musculos, hac figurarum copia exhibere.



TREDECIM VIGESIMIPRIMI CAPITIS FIGURARUM, & earundem characterum Index.

PRIMA figura ossis u imaginem referentis, & hic suis musculis omnibus liberati anterior facies exprimitur, una cum anteriori laryngis, & asperæ arteriæ caudicis (qui in collo consistit) sede, nullo interim laryngis musculo resecto. Qui uerò musculi hic sint conspicui, characterum index dilucidè explicabit.

Secunda figura eadem, quæ prima ex dextro latere commonstrat, quanquā hic non tantam asperæ arteriæ caudicis portionem asseruauerimus, dein etiam hinc superiora ossis u referentis latera resecuimus.

Tertia secunda penitus respondet, nisi quod hæc ex posteriori facie eadē, quæ illa ex latere commonstrat, uerū & hic quoque ex industria superiora ossis hyoidis latera adhuc delineantur.

Quarta anteriorem laryngis sedem, cum portione caudicis asperæ arteriæ proponit, resecto iam hyoide osse, cum musculis ab illo, & a pectoris osse, laryngi oblatis. Seruantur itaq; adhuc ex communibus laryngis musculis, quintus & sextus, ac dein musculi laryngis operculo proprii.

Quinta

Quinta figura à quarta sectionis ordine nihil uariat, eadem quæ quarta, ex sinistro latere eleganter spectanda offerens.

Sexta laryngem à reliquo asperæ arteriæ caudicis liberatam, ita posteriori facie exprimit, ut neque stomachi, neque communis alicuius musculi portione adhuc reliquerim, interea tamen nullam laryngis cartilagineum sua sede dimouimus.

Septima laryngem ex dextro latere ita expressam continet, ut ipsius operculum iam resectum sit, una cum musculis primæ cartilaginis secundam necentibus. Deinde primæ cartilaginis in hoc latere inferior processus, à secunda liberatus est, ipsaq; prima antrorsum, atque à secunda sic re flexa occurrit, ut media primæ cartilaginis sedes, in posteriori regione nuda cernatur.

Octaua à septima in hoc differt, quod hic rectos musculos illorum quatuor, qui tertiam cartilaginem secundæ necunt, rescidimus, ipsaq; secunda cartilago magis detecta appareat.

Nona rursus ab octaua in hoc uariat, quod præter musculos nuper dictos, etiam quatuor tertiam secundæ iungentium obliquos, et deinde duos in tertie cartilaginis basi positos abstulimus, seruatis duntaxat cum tribus cartilaginibus illis musculis, qui tertiam primæ alligant.

Decima ex anteriori laryngis sede se spectandâ præbet, ablata iam prima cartilagine, et duntaxat cum secunda et tertia apparentibus musculis, tertiam primæ committentibus.

Undecima laryngis musculis ostendendis non seruit, uerum hanc, ut et duas sequentes, ostendendæ laryngis linguæ gratia delineauimus. Exprimitur itaq; hic larynx, à reliquo asperæ arteriæ trunco, et suis communibus musculis libera, quæ asseruato adhuc ipsius operculo, posteriori suæ sedi incumbit, superioremq; faciem commonstrat.

Duodecima in hoc ab undecima differt, quod hæc inferiorè laryngis sedem delineatâ contineat.

Decimatertia hoc à duodecima habet peculiare, quod laryngis rimam seu lingulam, magis coarctatam occlusiue repræsentet. Cæterum characterum index erit eiusmodi.

A In prima, 2 et 3 figuris hyoidis notatur os, non prorsus suis membranulis liberum.

B In prima, 2 et 3, humilior hyoidis osis latus, superiori scutiformis cartilaginis alligatum præ-

C. cessui, qui C in 2, 3 et 4 indicatur.

D In prima et tertia superius notatur hyoidis osis latus, à secunda figura inibi resectum, ubi E

E. ascriptum cernis.

F Musculus ab hyoidis osis inferiori sede enatus, ac humiliori primæ cartilaginis sedi insertus.

In prima figura dexter et sinister est conspicuus, in secunda dexter duntaxat.

G Musculus ex posteriori osis summo, ad humiliorem primæ cartilaginis sedem deductus. Prima dextrum et sinistrum quoq; exprimit, at secunda dextrum tantummodo portionem.

H Gula, seu stomachus, in 2, 3 et 5 conspicuus.

I Musculus ex posteriori sede stomachi, cartilaginis scutum referentis, lateri insertus. Ac tertia dextrum et leuum fere uniuersum ostendit, et potissimum utriusq; initium, Secunda dextrum et minimam sinistri portionem. Quinta uero sinistri insertionem exprimit, ut etiam prima et quarta utriusq; insertionem proponit.

K Duo musculi dissectionum ignorati Professoribus, et ab osse u referente enati, ac in laryngis operculi radicem inserti. hi occurrunt in secunda figura et tertia et quarta.

L *ἐπὶ τῷ λάρυγγι* seu (ut nos uocamus) laryngis operculum, in secunda figura, et deinde in 3, 4, 5, 6, et 11 conspicuum.

M Glandula laryngis radicit, ad asperæ arteriæ latera adnexa, in 2, 3, 4 et 5.

N Musculus à prima cartilagine ad secundam protensus, exterior uel primam cartilaginem secundæ iungentium. Dextri musculi et sinistri pars in prima uidetur, uterq; autem integer in quarta apparet.

O Musculus à secunda cartilagine in primam protensus, alterius uel lateris interior, secundæ cartilaginem primæ connectentium. in quinta solus sinister exprimitur.

P Musculus ab infima secundæ cartilaginis sede, posteriori in parte principium ducens, et tertiæ cartilagini insertus. Sexta dextrum et sinistrum ostendit, septima dextrum, et quodammodo sinistrum.

Q Sedes iam dicti musculi, in octaua et nona.

R Musculus à latere secundæ cartilaginis, in tertiâ cartilaginis insertus. Septima et octaua dextrum duntaxat ostendunt.

S Sinus secundæ cartilaginis, in octaua & nona notatur, cui inferior primæ cartilaginis processus, *T* in octaua & nona insignitus connascitur.

V Musculus in basi tertie cartilaginis situm obtinens. Sexta utriusq; lateris musculum repræsentat, Septima dextrum, & sinistri portunculam, Octaua etiam dextrum.

X In nona figura sinus indicatur, cui musculus insidet, tertie cartilaginis basin in altero latere occupans, ac *V* caractere iam expressus.

a Musculus ex tota primæ cartilaginis lāgitudine enatus, ac tertie insertus, aut musculus primæ

b cartilagini tertiā copulans. Decima dextrū *a* insignitū, & sinistrū *b* insignitū indicat, ablata interim prima cartilagine. Septima uerō octaua & nona, integrum dextri lateris musculū *a* notatum exprimunt, & elatiorem sinistri sedem, quam ob hoc quoq; *b* litera in illis figuris notauit.

c Lingule seu rimæ, in medio laryngis obuiæ superior sedes, in decima figura conspiciuntur.

d Inferior facies lingule, quam in decimatertia magis, quam duodecima apertam expressimus.

c, e Duo sinus, utriusq; unus, qui clausa lingula seu rimā, in humiliori ipsius sede ad latera euadit conspicui, in duodecima & decimatertia.

f Callus in medio rimæ apparens, ubi ipsa potissimum conuiet in decimatertia.

g Ne fortasse aliquid obscuritatis cartilagine literis nō insignitæ adferat, illas quoq; adnotamus. *g* itaq; prima est cartilago, in anteriori parte se offerēs, in 1 figura, dein in 2, 4, 5, 12, 13.

h Prima cartilago, in tertia figura & 6, 7, 8, 9, posteriori facie se offerens.

i Secunda cartilago anteriori facie conspicua, in prima, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13.

k Secunda cartilago posteriori facie spectatur, in sexta, 7, 8, 9, 11, 12, 13.

l Tertia cartilago occurrit in secunda, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11.



T R E S laryngis² cartilagine Libro superiori descripsi, tertiam cartilaginem, etiam si³ duplex sit, ne aliorum dissectionis Professorum placita prorsus inturbarentur, unius loco enumerans. Præterea his cartilaginibus⁴ corpus similiter cartilaginofum, sed adiposæ membranæq; substantiæ etiam compos, incumbere retuli, quod *ωρυσσώσις* nuncupatur.⁵ *κλωσίδες* uerō, corpus quoddam, aut potius laryngis sedem, in medio ipsius locatam esse recenseui, rimulæ seu fissuræ lingularum, quibus tibiæ inslantur, perquam similem. Nunc autem harum cartilaginū musculos persequar, in Quarto libro ipsorum⁶ neruos priuatim enarraturus. Quando itaq; ex pluribus cartilaginibus larynx, ut apte clauderetur, aperireturq; constructa est, & quia spiritus, retentionis uocisq; occasione, motu uoluntario, & ex nostro pendente impetu moueri eam oportet, meritō musculos cartilaginum motores Natura ipsi communicauit, quorum quidam laryngi duntaxat proprii sunt, quidam alijs quoque partibus communes.⁷ Proprios humana larynx duodecim nanciscitur, atq; horum quatuor primam cartilaginem, quam scutiformem uocamus, secundæ, quæ innominata est, iungunt, quatuor secundam tertie cōnectunt, duo tertiam primæ copulant, & duo in basi tertie cartilaginis, quæ secundæ coarticulatur, sedem habent. Communes Galenus octo numerauit, tamen lex tantū explicauit, qui soli scutiformi cartilagini, non autem alijs duabus committuntur. Ego præter eos sex, alios duos obseruaui, non quidem scutiformi cartilagini nexos, sed ipsi laryngis operculo, quapropter etiam hi inter eos, qui Galeno Communes nuncupantur, referendi neutiquā ueniunt. Cuiusmodi uerō ipsi sint, unā cum reliquis iam ordine prosequar, sumptq; sermonis initio à proprijs, qui omnes, ut lingulæ laryngis aperiat, claudant ue, à rerum Opifice sunt procreati. Quatuor itaq; primam secundæ iungentiū, ad inferiora laryngis utriusq;

Duodecim
proprijs esse
laryngis mus-
culos.
Communes sex.
Lib. de *V* su
par.
Duo laryn-
gis operculi.

Proprijs
1, 2, 3, 4.

² duo habetur, in priori parte ipsius uersus latera locati. atq; hi breues sunt, sed laui, tenues ac carnosī, unus alteri incumbit, ac utriusq; se inuicē fibris ad *x* literæ similitudinē interfecāt. Exterior nanq; ab inferiori primæ cartilaginis sede fibrarū originē ducit, quæ deorsum obliquē in priora procedentes, secundæ cartilaginis parti, priora laryngis spectanti inferuntur. Interior huic subiectus, ac in ortu fibrarūq; ductū exteriori omni ex parte similis, à secundæ cartilaginis sede, quæ primæ subijciuntur, originē ducit, primæ cartilaginis humiliori sedi implātatus. huius fibræ ex postica parte, obliquē in anticam ascendunt. Quatuor isti musculi, utriusq; nimirum duo, inter costalibus musculis apprimē respondētes, primā secundamq; cartilaginem inuicem adducunt, laryngis rimulam clausuri. Ad hunc sanē modum quatuor illos musculos interdū, neq; id infrequenter locatos in scholis ostendi, aliquando tamen unicum utrinque duntaxat reperi, ductum fibrarum¹ anterioris nobis enarrati musculi seruātem, sed interim paulō crassiorē.

Rursus

a Spectat.
de sin. fig.
cap. 2. 1. 1.
b 9, 10, 11.
c tota 12, 13.
d conuict.
e 2. 1. 1. 1.
f 4. in 12, 13.
g

f paul. post.
lingul. par.
sim adnot.
buntur.

g 1. 4. fig. 1.
mus 2. alter.
sfi. o.

h 6 tab. V.
x. sed po-
tius con-
8 tabule D.
cum E.
i 3 fi. 2.

Rursus autem, quum alterum duntaxat adesse obseruauim, nō semel ac præcipue in uiris, duos gracies, sed carneos animaduerti musculos, qui ex media longitudine^h spinæ secundæ cartilaginis enati, ac tandem deorsum oblique ducti, in processus inferiores primæ cartilaginis



Præfens figura, sextæ huius Capitis fœti præpositæ omni ex parte respondet, nisi quod hec priuatim musculos stricendos exhibet, quos a secundæ cartilaginis spina, ad inferiores primæ cartilaginis processum aliquid deductos uidet. *A* namq; *C* prima laryngis notatur cartilago, *B* uero spina secundæ cartilaginis. *C* autem *D* duo musculi a secundæ cartilaginis spina principium sumentes, ac in primam cartilagem inferi.

D. insertionem moliebatur. atq; hi manifestò primam quoq; cartilagem secundæ propinquius accommodabant, rimulā illam, seu lingulā hac functione arcantes. Ex quatuor uerò mulculis

Propriorum

5, 6, 7, 8.

secundæ tertiā committētibz, duo quoq; utrinq; habētur, ac^m unus quidē exactē in tota poste

riori secundæ cartilaginis sede, secundū ipsius longitudinē, qua stomachū spectat, locat, qui car

neo principio ab in sumā secundæ cartilaginisⁿ parte enatus, ac deinde rectā sursum procedēs, tan

tisper lateris, donec tertiæ cartilaginis radicē, qua secundæ coarticulat, neruosa utcunq; implan

tatione inferatur. Huic musculo per secundæ cartilaginis longitudinē, quā fertur, ^p sinus excul

pitur tantus quidē, ut musculo utriusq; lateris ablato, secunda cartilago in acuram^m lineā, & ue

luti dorsi uertebrarū spinam, inibi desinere uideatur. Alter musculus nunc dicto cōiuguus, &

omnino carneus, a secundæ cartilaginis sede enascitur, quæ primæ cartilaginis internā regionē

respicit, primæq; cartilaginis inferiorē processum admittit. Ex hac itaq; sede præfens musculus,

carnosum latumq; principium ducens, ac sursum oblique protensus, tertiæ cartilagini inferitur,

totā sui lateris tertiæ cartilaginis radicis sedem occupās, a priori musculo nō amplexā. Hi qua

tuor tertiā cartilagem utrinq; ad exteriora laryngis retrorsum euertunt, lingulā, aut ipsam, si

uoles, laryngem aperientes. Atq; duo quidē primi posteriorē cartilaginis secundæ sedem occu

pantes, recto motu id præstāt, reliqui autē, ut obliquo situ præditi sunt, ita quoq; tertiā cartilagi

nem in posteriora oblique reuellunt. Nonus & decimus, qui tertiā primæ copulat, etiā utrinq;

lingulā lati, & ut cæteri laryngis, carnei, enascuntur autē inuicē continui exⁿ media primæ

cartilaginis sede, secundū totā ipsius internæ sedis lōgitudinē. Dexter (idē de sinistro subaudi)

uelut triplex sui principium ostendit, propter quasdā ipsius inscriptiones, adeo illi impressas, ut

harū occasione triplex musculus esse uideat. hic a principio oblique sursum ascendit, & dextræ

tertiæ cartilaginis partis anteriori sedi implantatur. Duobus his tertiā cartilago primæ adducit,

illorumq; beneficio duæ tertiæ cartilaginisⁿ partes, contractis nimirū mulculis cōiuent, ipsaq;

lingula horum potissimum auxilio cōprimitur. Hi sanē musculi omnium totius corporis cum

temporalibus, pro ipsorū mole, ualidissimo fungūtur munere, quū tot mulculis expirationem

molientibus, in spiritus retentione opponantur, quanq; & huc quoq; reliqui laryngem arcitēs

musculi faciant. Vnde decimus ac duodecimus, in basi tertiæ cartilaginis cōsistunt, ea nimirū re

gione, quā^h stomacho larynx cōmittitur, tertiæq; cartilago secundæ cartilagini coarticulatur.

Sunt autē ab utroq; latere singuli, qui ex radice tertiæ cartilaginis, quā hac primæ proxima est,

principium sumunt, & secundum basim tertiæ cartilaginis modicē sursum protensi, ad tertiæ car

tilaginis medium (ubi duæ ipsius partes inuicē colligantur) finiunt, se mutuo inibi cōtingentes.

Sunt itaq; præfentes musculi breues, & exteriori quodāmodo pyri modo rotundi, intus uerò

omni ex parte cartilagini tertiæ cōnati, & ubi se inuicem contingūt, latiores crassioresq; sunt,

quā statim in ipsorū exortu. Ambo musculi tertiæ cartilaginis basim cōstringentes, atq; duas

eius cartilaginis partes inuicē comprimētes lingulā claudūt, arcitāq;. Et hi sanē argumēto sunt,

tertiā cartilaginē necessariō esse geminā, quū si simplex esset, ab illis mulculis cōstringi haud

posset, uti neq; aⁿ duobus tertiā primæ iungentibus ocludi, neq; aⁿ quatuor secundæ tertiā

neccitibus aperiri potuisset. Ex duodecim igitur laryngis peculiaribus mulculis, octo laryn

gem arcēt, quatuor scilicet primā secundæ neccitēs, & duo tertiā primæ cōmittentes, ac

demum duo in basi tertiæ cartilaginis repositi, quatuor uerò ipsam referant illi nimirū, qui ter

tiam secundæ cōmittunt. Alij autem musculi, quos cōmunes uocamus, utriusq; etiam motus

cipijs ortum ducentes, qui sursum secundum anteriorem asperam arteriae sedem protensi, ac sensim latiores redditi, illi, quam diximus, primae cartilaginis sedem inferuntur. Quintus ac sextus communium laryngis musculorum, transuersi sunt, & ipsorum utrinque habentur singuli stomachum amplexantes, hi enim ex stomachi postica parte, uerterbas ceruicis respiciente, secundum stomachi longitudinem principium sumunt, adeo inuicem continui, ut utrorumque musculorum idem unicumque principium esse propemodum dixeris. Hinc amplius & carnosius, uersus priora transuersim protensi, lateribus primae cartilaginis, secundum ipsorum laterum longitudinem implantantur, tota amplitudine, qua stomachum contingunt, impenitus ipsi connati continuique. Hi quos postremo recensuimus, musculi ad posteriora contrahunt primae cartilaginis latera, secundae cartilagini eam ita applicantes, ut laryngem quoque, seu lingulam illam coarctent. Qui uero ab osse hyoide procedunt, primam cartilaginem à posterioribus sursum quodammodo abducentes, laryngem dilatant. Verum his contrariam functionem adipiscuntur musculi, à pectoris osse, primae cartilagini inferti, illi namque humiliores, primae cartilaginis sedes contrahunt, easdemque deorsum uellunt, nonnihil unam contrahentes stringentesque asperam arteriam, ne quicquam, quum uocem edit homo, reduplicetur, neque plurimum dilatetur.

Communium
functio.

Duo musculi
laryngis oper-
culi.

Præter hos sex, alios duos animaduerti propemodum teretes, ac ex media interiori ossis hyoidis sede explantatos, & utrinque singulos radici eius corporis, quod laryngis censetur operculum, infertos. Hi liquidò admodum (si modò quis ipsorum nouerit administrationem) uisui sese offerunt, Galeno tamen, quum in nullis, quæ hodie extant, Operibus ipsorum meminerit, incognitos fuisse opinor, non enim (quod fortè quis arbitraretur) in communium laryngis musculorum numerum sunt reiciendi. Quamuis enim hos octo Galenus esse dixerit, & interim sex tantum descripserit, omnes tamen octo, primae cartilagini committi postmodum sermoni subnexuit. Porro his duobus id munus concreditum est, ut laryngis operculum, cibus potusque depressum denuo eleuent, ipsorum namque principijs uersus hyoides os tractis, operculum illud erigi conspicitur. Veruntamen musculos, qui his duobus opposito munere fungerentur, nullos obseruauimus, neque id mirum est, quum cibus & potus, suo potere euersum eleuatumque laryngis operculum facile comprimant, & ipsum mole sua etiam grauatum, laryngi promptè applicetur. Quamuis non hi solum musculi oppositis destituantur, sed & illi quorum beneficio rectum intestinum, & testes sursum allici dicuntur. Corpora enim, quæ ex sua natura plus satis deorsum tendunt, nec peculiarem motum in ductu, qui deorsum fit, exigunt, ad eam actionem minimè proprijs indigent musculis. Larynx rarè aut peculiare ligamentum prorsus nullum obtinuit, præter membranae articulos orbiculatim cingentia, deinde in ipsius medio lingula consistit, cuius etiam superiori Libro mentio incidit, quæ conformatur ex cartilaginum articulatione, & præcipuè cartilaginis tertiæ partibus, quæ primam cartilaginem acutis processibus spectant, mox & eas colligante ligamento, & pingui totam laryngem succingente tunica, cuius sanè naturam, ac constructionis artificium ut proprijs manibus ex dissectione, uti modò subiiciam, discas, optarim.

Laryngis li-
gamenta.

LARYNGIS MUSCULORVM ADMINISTRATIO. Caput XXII.



Administra-
tio primi et 2
communium.

Communium
terrij et 4.

Communium
5 et 6.

ABRICAM laryngis huncin modum in boue primum, aut in uitulo, deinde in homine auspicaberis. Ex alia quapiam larynge emundatas cartilagine operi adhibebis, ut hæc uelut ossium (quæ musculorum sectioni perpetuò adesse oportet) uicem gerant, deinde dissecis hyoidei ossi proprijs musculis, statim tibi occurrent duo ab osse hyoide, ad primam cartilaginem procedentes musculi, quorum principia paruo cultello ab osse liberans, paulatim musculos à cartilagine radendo, ad ipsorum usque infertionem sequeris. Caterum pari ratione à pectoris osse ad primam cartilaginem ductos, primum ab osse separabis, ac postea ipsos ab aspera arteria leuiter diuellens, ad primam usque cartilaginem, cui inferuntur, illos deduces. Vbi quatuor hos diligenter intutus fueris, sectionem per palati tunicam, fauciumque intima duces, ac laryngem cum stomacho è faucibus eximes, ad eum prorsus modum, quo sanij bouum laryngas execare consueuerunt. Liberatam postmodum laryngem cum aspera arteria & stomachi portione, omnino ab animante auferes, ac abiecta lingua, uniuersam laryngem Sodali, ac tecum Anatomes studioso tenendū porriges. Qualis mihi in laryngis constructione discenda sedulo fuit, præstatis ingenij Iuuenis, ANTONIVS SVCCHA, nostræ communis Bruxellæ, adeoque totius Belgicæ, ob singularem medicinæ ac mathematicæ cognitionem, magna & rara spes. Hæc itaque ratione accommodata larynge, mox musculos ex stomachi

i 1, 2, 3, 4, 5
fig. 1.
fig. 2, 3, 5
fig. 4.

1 5 14. Q.

m 2, 3, 4. fig.
K.
n 2, 3, 4, 5
fig. 1.

o 2, 3 fig. A.

p fig. cap. 50
B. C. intesti-
ni musculi
notantur, si
gura autem
22 li. 5 4 te-
stis.
q spectatur
11, 12, 13 fig.
guris.

d 4. 14. S. T.
R. Q. V. Y.
b 5 14. O.

c 5 14. P.

d 2, 3, 5 fig.
ca. 11.

stomachi posteriori parte ad primæ cartilaginis latera productos inspicio. quod ut fiat prom-
ptius, ipsos longa sectione, ubi capita sese contingunt, diuidito, & hamulo, aut summis digitis
alterius capite apprehenso, totum à stomacho ad primæ usque cartilaginis latera accuratè sepa-
rato. Licebit modò sex horum musculorum, laryngi cõmunium actionem discere, dummodo
ipforum capita huc illuc, uersus sua principia attraxeris. quo facto, omnes ilico à prima cartila-
gine liberabis, atque ad duos, quos operculi laryngis radici implantari dictum est, sectionem
conferes. Linguae tunicam, quæ cum palati tunica & laryngis & stomachi interiori ipsiusq;
dẽmum operculi cõmunis est, ad operculi radicem orbiculari linea incidēs, ac hamo exceptam
cutis modo excoriabis. Mox enim illorum musculorũ fines in promptu erunt, quos postea-
quam ad hyoides os, leniter ipsos ab adipe illis proximè accumbente separando deduxeris, ab
osse ipsos dissecabis. Vt autem illorum functionem discas, laryngis operculum digito depri-
mes, ipforumq; capitibus uersus hyoides os attractis, operculum euerit, atque antrorsum ten-
di eleuariq; conspicias. Modò & hos quoque musculos & stomachum, ipsũq; si libuerit,
operculum à larynge in totum adimes, ut tres laryngis cartilagine, cum duodecim ipsi pro-
prijs musculis solæ relinquantur. Quum tamen reliquam asperæ arteriæ partem à secunda car-
tilagine absecas, inspicio glandulas hominis laryngi appositas, & ut in Sexto libro exequar,
utcunque carneas. In boue autem, harum loco carneam prorsus reperies substantiã, ad secun-
dæ cartilaginis latera repositam, & musculo cuiuspiam similem, qui septimus & octauus cõmu-
nium laryngis musculorum in boue censi possit, quum interim homo eius substantiæ, seu mu-
sculorum uice, quemadmodum nuper dixi, grandes insignesq; obtineat glandulas. Carterũ
nunc tempus est, ut ad amussim^h lingule seu rimæ formam intuearis. cernes enim laryngem su-
periori parte & inferiori amplam esse, in medio autem rimam oblongam habere ex ea, quam
diximus, substantia conformatã. Vt uerò hanc proprijs manibus subinde distendas, aperiasq;
priusquàm musculorum sectionem auspiceris, dextrę manus pollice, medioq; digito, laryngis
latera comprehendēs, in indice interim interiori tertiæ cartilaginis amplitudini inserto, sinistra
autem manus pollicem ac indicem, inferiori laryngis orificio immittēs, ac duobus illis sinistra
manus digitis, secundam cartilaginem à prima abducere conaberis, dextræq; manus indice,
tertiã cartilaginem extrorsum euerēs. Liquidissimè enim hac ratione inspicias, quĩ lingula
aperiatur. Si uerò sinistra manu secundã primæ adduxeris, & dextræ manus pollice ac indice,
tertiã cartilaginem uersus interiora protruseris, ac inuicem duas ipsius partes coniuere fece-
ris, lingulam ad amussim claudi intuebere. Scribo autem hæc paulo fusiũs, ut Galenus aliquan-
do intelligatur, nec posthac laryngis operculum, uocis principalissimum organum, qui hodie
sese Galenicis profitentur, contendant, & idem corpus, *γλωττιδα* uel lingulam, & *ὑπογλωττιδα*,
seu laryngis nobis uocatum operculum esse opinentur, ignorãtes profectò lingulam in medio
esse laryngis, ac tibiũ linguĩ, quibus illæ insistantur, quã simillimam existere. Quum itaq;
lingulam tuis manibus, utcunque usum fuerit, & claueris, & aperueris, proprios laryngis
musculos dissecabis, à quatuor primæ cartilagini secundam necsentibus auspicatus. Leui
itaq; ac transuersa sectione, exteriorem musculum à scutiformi cartilagine liberabis præcauens,
ne interiorem simul conuulneres, hoc ablato, interiorẽ similiter à secunda cartilagine abrades,
mentem adhibens illi, quam dixi, fibrarum interfectioni. Neq; hoc duntaxat ad amussim, num
scilicet unus duo ue sint, rimaberis, sed etiam, dum stomachum à larynge liberas, diligenter
expendēs, num^k eos, quos interdum obseruari dicebam, musculos reperiturus sis, qui à se-
cundæ cartilaginis spina, in primæ cartilaginis humiliores processus inferuntur. Quatuor itaq;
secundam cartilaginem primæ iungentibus à larynge resectis, in altero laryngis latere^l pro-
cessum inferiorem primæ cartilaginis, à secunda liberabis, ac primam hac ratione à secunda an-
trorsum reflectēs, duos inspecturus musculos, tertiam primæ colligantes. Vbi hos utcunque
examinaueris, integrum erit exiguo, sed acutiori cultello secundam cartilaginem, à reliquis dua-
bus adimere, aut si uoles, ad duos musculos illi tertiam necsentēs appensam seruare, ac postmo-
dum te adⁿ quatuor tertiam secundæ necsentēs conferre. quos licebit à suis principijs, quæ ex
secunda cartilagine sumunt, liberare, atque ad tertiam, cui inferuntur, deducere. Postremò^o qui
in tertiæ cartilaginis sunt basi, auferēs similiter quoque eorum principia primum liberans, ac
ad finem usque, quo se mutuo contingunt, deradens, huiusmodi enim administratione perpe-
tuo integrum erit, musculorum functionem discere, dum scilicet ipforum principia ad locum,
unde originem sumunt, attrahuntur. Ablatis musculis cartilagine inuicem separabis, nec fieri
poterit, quin tunc accuratè lingule substantiã perspectissimam habeas, quemadmodum & na-
turam illius quoque, & usum, & formam; ex administrationibus nimirum, quas proprijs ma-
nibus iam es aggressus.

*Duorũ laryn-
gis operculi.*

*Laryngis rĩ-
mule seu lingũ-
la quo modo
libellanda.*

*Administra-
tio prioriorũ
12.3 C 4.*

*Prioriorum
9 C 10.*

*Prioriorum
5, 6, 7 C 8.
Prioriorum
11 C 12.*

Alius uicinie
quam sectio-
nis ordo.



Brachij mo-
uentis quo-
rum.

Primus bra-
chium mouen-
tium.

ICINITATIS quidem ordo, ante musculos brachium mouentes, capi-
tis & dorsi, & scapulae motuum duces oportuisse describi indicabit, si de-
mum partes iam dissectis uiciniores prosequi institutum esset. Verum quum
integras adhuc brachium mouentibus musculis, scapulam mouentes admi-
nistrari nequeant, multoq; minus illis nondum ablati, aut capitis aut dor-
si administrare datum sit, operæ pretium me facturum duxi, si brachij & dein
scapulae motores, ante caput mouentes musculos, sectionis nomine aggre-
diar. Quanquam si secus cuius uisum fuerit, Capita facile ita transponeretur, ceu ego, in horum
Librorum epitome sectionem non moratus, sed uicinatem potius secutus, præstiti adeo, ut
cuius integrum fuerit, modò hoc, modò illud Caput aggredi, prout sibi muscutorum tradendo
rum seriem proponet. Brachium itaq; antrorsum ad pectus, & retrorsum uersus dorsum, & sur-
sum ad ceruicem caputq; & deorsum ad thoracis latera mouetur; & præter hos motus quodam-
modo in gyrum quoque agitur, aut ita circunueritur, ac si baculum aliquem, in utraque ma-
nus non flexas, sed secundum longitudinem tantum mutuo appositas acciperes, ac deinde al-
ternatim, prorsum retrorsumq; actis manibus, baculum uolueres. Quemadmodum enim bacu-
lum siue deorsum porrectum, siue sursum siue antrorsum prominentè, illo modo mouere pos-
sis, ita quoque brachium, siue id pectori admotum, siue sursum actum, aut deorsum propen-
dens seruaueris, semper circumuerti poterit adeo, ut brachium triplici motui genere agatur.

Brachium itaque pectori^a unicus adducit musculus, originem fumens^b ex media pectoris
ossis latitudine, & ipsi inferis cartilaginibus, deinde quoque priuatim^c ex septimæ & octauæ
costarum cartilaginibus, &^d ex media clauiculæ sede, qua hæc pectoris os spectat. Principij pars à
clauicula procedens, omnino carnosa apparet, quæ uerò ex pectoris ossis secundum dextrum
sinistrumq; medio enascitur, alteriusq; lateris musculi initio contigua est, neruosiore membrano-
siorq; & minus crassa uisitur. Attamen, quæ ex ossis pectoris latere, ipsiq; intarticularis cartilagi-
nibus pronascitur, penitus iam carnosa existit, quæ uerò priuatim ex septimæ octauæq; costa-
rum cartilaginibus, iuxta mucronatam cartilagine exoritur, membranea, & tenuis aliquo-
tusque conspicitur. Musculus ex his principijs prodians, & paulatim crassior carnosiorq; red-
ditus, sensim arctatur, atque in acutum tantisper procedit, quousque amplo & nerueo, admo-
dumq; robusto, sed breui^e tendine, humero secundum ipsius longitudinem implantetur. Fit
uerò tendinis huius insertio^f, subter humeri capitis ceruicem, in interiore ipsius regione, non-
nihil interim in priora uergens. Huius musculi fibræ inuicem uariant, & paulò ante tendi-
nis productionem, adhuc in carne musculi parte, deinde & secundum totam tendinis ampli-
tudinem, ad x literæ similitudinem sese decussatim intersecant. Quæ enim ex clauicula, & me-
dia pectoris ossis longitudine clauiculæ proxima enascuntur, ex superioribus deorsum obli-
quæ in exteriora procedentes, superiorem tendinis partem, secundum totam ipsius amplitudi-
nem efficiunt, carnosaq; toto ductu, præterquam in musculi in humero insertionem, perma-
nent. Sed quæ ex reliqua ossis pectoris sede, ac ex septimæ & octauæ costarum cartilaginibus pri-
uatim originem mutantur, oblique sursum protensa, inferiorem tendinis partem, secundum
ipsius latitudinem constituunt, & citius carnem ipsarum, qua implentur, suffulciunturq; quàm
superiores amittunt. Superius enim ad insertionem usque, musculus carneam naturam refer-
uat, inferius autem multò ante insertionem, liuidus nerueusq; conspicitur, quod superiores fi-
bræ procul dubio, propter breuiorem ductum adeptæ sunt. Id namq; omnibus commune esse
diximus musculis, ut tanto breuiori donentur tendine, quo succinctiori ductu, pro motu ipso
rum ratione feruntur. Cæterum superiora inferioraq; in tendine uoco, non quæ humeri caput
propinquius accedunt, aut remotius ab illo reclinant, sed ad tendinis, quæ secundum latitudinem
perficitur, insertionem, has positionis differentias in præsentem refero non secus, ac si hanc char-
tam, subdita altiore superiore uel dicerem. Est itaq; musculus hic quodammodo quinquila-
tris, sed inæqualibus costis constitutus. Vna namque, secundum mediam clauiculæ longitudi-
nem ducitur, secunda ad ossis pectoris longitudinem procedit, tertia secundum insertionis lon-
gitudinem fertur, quarta à media clauiculæ sede, ad insertionis partem, humeri capiti propinquo
rem proficiscitur, quinta uerò à remotiori ab humeri capite insertionis parte, ad pectoris ossis
mucronatam cartilagine protenditur. Atq; hæc costa, illa demum est, quæ anteriore cavitatis
axillæ sedem efformat, posteriorem uerò ille constituit^g musculus, quem brachii deorsum dor-
so ad mouere audies. Cæterum ut brachii pectori adducens musculus, differentes fibras, ac la-
tum

a 233. 4. b
c 1. ca. l.
b 3 tab. d
ad R.
c 314. ab
uersus s.
d 3 tab. d
ad L.

e 314. Q.
tab. Q. T.
brachii.
f uicula. f.
g 314. cap.
lib. i.
g hic consp.
res 3 tabula
musculum
d cum mu-
sculo d 4.
bule.

h prima co-
sta 3. 4. tab.
K. L. secun-
da à K. ad
tertia d. 14.
Q. T. quar-
ta à L. ad Q.
quin. ab R.
ad T.
i 314. V. 10.
ta. o.

tum & amplum, uariumq; principium sortitur, sic quoque alijs atque alijs pectoris regionibus brachium admouet. Si enim superiores ipsius fibræ, à clauicula, & superiori pectoris ossis sede ductæ contrahantur, uersus pectoris superiora, & ad clauiculam brachium adducitur, sin inferiores fibræ tendantur, præsens musculus humilioris brachij ad pectus adductionis opifex fit, si quidem ad^k mucronatam cartilaginem, & spurias costas, quæ ueris uicino res sunt, brachium allicientur. At si utræque laborauerint fibræ, in neutram partem brachium inclinans pectori adigent. Quia igitur hic musculus amplum, atque ex uarijs natum ossibus principium obtinet, & fibras sese interfecantes, cōtrariæq; serie ductas, & ad hæc motus etiam differentes adipiscitur, nihil obstitit fortassis, ipsum geminum pronunciare, ac duorum musculorum loco cum aliquot etiam dissectionis Proceribus enumerare, quanquam unius duntaxat uice mihi toto orationis contextu habebitur. Verum quum inferior musculi pars, quæ humiliores fibras producit, uersus inferiora brachium pectori adducit, meritò quoque minor, & secundum profundum tenuior superiori euasit, quæ sursum magis membrum agit, & cui uehementior ualidiorq; functio concedita est. Præter hunc musculum (pace interim Galeni dixerim) nullus alijs brachium pectori admouet. Nam quem inter brachij musculos primum enumerat, quemq; iuxta mamillas exiguum, ad humeri articulum ascendere, ac ad spurias costas brachium adigere scribit, in homine neutiquam reperiens. Non enim nos fugere posset, quum hunc obliquè sub cute, in aliorum superficie extantem, sursum ad articulum humeri propere Galenus recenset, & illum in membranæ definentem exilitatem, articulo inferi affirmet, propter humeri ossis^l sinum, " exterius caput musculi flectentium cubitum anterioris amplexantem. Nec quispiam me illum oscitante cum cute auferre arbitrabitur, qui aut humeri articuli musculorum sectionem aggressus fuerit, aut administranti adstiterit. Et quomodo, quæso, musculus aliquis ex mammillarum regione incipiens, & aliorum superficiei incumbens, etiam si uel fibræ cuiusdam crassitiem duntaxat æquaret, à quopiam in homine ignorari posset: si demum^m inter illum, quem modò recensui, musculum, & illum, quem brachium attollere audies, ad articulum conscenderet. Nam etsi eius musculi pars, cuti subiecta adimeretur, illa pars necessario (ut cumq; quis uel ultro illum refecare proposuisset) semper sese offerret, quæ inter duos illos musculos sese insinuans, articulo proxima esset. At quorsum attinet, mihi hîc oscitantæ exultationem prætexere, quum uerbulo Galenum siniarum, me autem pro uiribus, hominum constructionem describere, uel hic brachij musculus, cum cæteris innumeris attestetur homines enim hoc priuantur, uerum in simijs & potissimum caudatis (quorum mihi maior copia, quàm non caudatarum accidit) ad hunc modum obseruatur. Cute detracta, is quem nos in homine primum occurrere diximus, pari modo in simijs cōspicitur, nullo prorsus alio tectus musculo. Verum sub huius humillimaⁿ costa seu latere, super obliqui abdominis musculi (quem descendente uulgo dicimus) principium, gracile membranæq; musculi initium reperitur, longè sub papillæ regione consistens. Initium hoc carnosum euadens, sed gracile interim permanens, sub magno illo brachium pectori adducente musculo, sursum obliquè ad articulum porrigitur, eam prorsus, quam Galenus tradidit, in sectionem tentans. Neque huius musculi insertio, ut neque ipsius ductus, nisi magno illo musculo penitus eleuato, in conspectum ueniunt, atque id non perfuntoriè, ut Galenum intelligas, etiam si hominum duntaxat medicinam nonnulli sese profiteri iactitent, uenit obseruandum. Nisi enim hunc Galeni musculum, suo progressu ita occultatum, & tantum membranæ principio modicè admodum extare cognoueris, erroneus omnino, atque admodum difficilis Quintus de Administrandis sectionibus liber statim in ipsa fronte uidebitur, quum Galenus passim illum in aliorum, ac proinde etiam in eius, quem nos brachium pectori attrahere diximus, superficie, sub cute exporrectum minùs rectè tradiderit. Quamuis interim sedulo studiosos horret, ut meæ sententiæ non ita promptè, propter Galeni obseruantiam, ascribentes intueantur, num & homo quoque cum simijs illum musculum communem sibi uendicet, & rursus num caudatis simijs in aliorum superficie (ut Galenus testatur) extet. Præter hunc, Galenus alium describit^o musculum, quem altioris brachij ad pectus ductionis autorem esse existimat. Iste profectò in homine nequaquam me fugit, at minime tamen, ut Galenus autumat, brachium pectori uersus elatiora admouet, imò scapulæ gratia, ut scilicet eam ad pectus ducat, creatus est, quod & ipsius origo, & ductus, illiusq; tendinis insertio, luce clariùs, & præcipuè in homine demonstrant. Principium enim sumit sub^p musculo, quem ego brachium pectori accommodare retuli, & ille huic omnino substernitur. Enascitur autem carnosum principio à secunda, tertia, quarta & quinta, nonnunquam (sed perquam rarò) & sexta, superioribus thoracis costis, non quidem (etsi Galenus non semel aliter affirmet) ubi pectoris ossi coarctantur, & ex ipso pectoris

Musculus
brachium pe-
ctori addu-
cens, quo sima
abundat.
Li. 5 de Adm-
nistrandis se-
ctionibus, c.
13 de Partium
usu.

Musculus qui
scapulam an-
teriorum agit,
à Galeno mu-
sculo pro brachij
motore habetur.

Li. 3 de Ad-
mi. sect.

pectoris ossē, sed antea quā costarum ossa in cartilaginem pectoris ossi inarticulandam definire incipiunt, nec prorsus recto tramite, rectā ue linea enascitur, sed quasi digitis quibusdam ex costarum ossibus longius exortis procedit. Hinc ad exteriora porrectus angustior, sed crassior efficitur, quousque ad humeri cum scapula articulum, in latum nerueumq^{ue} tendinem carne mixtum finiāt, quo^{us} processus anchorae imaginem referentis interno lateri implantatur, illic neruosior euadens, ubi is processus ex suo appendice^{us} neruosiores interni capitis partem emittit, eius musculi, quem inter cubitum flectentes anteriorem recensēbimus. Nequaquam autem tendo iste, articuli ligamentum in homine contingit, ut sanē, sed admodum adhuc obscurē, in caudatis simijs, quibus anchoram imitans processus modicē extuberat, deinde nullam scapulæ regionem uacare, præter hunc processum reperias, cui tendo ille commo-
dē implantari possit. Ad hæc, si musculi huius naturam ad amussim perpendideris, procul dubio cum alterius alicuius usus gratia, tum etiam præcipuē huius musculi insertionis occasione, illum scapulæ processum à Natura productum astrues, quandoquidem processus is, musculo illi non mediocriter aptam insertionis sedem exporrigat. Huius musculi fibræ sese non de-
cussatim intersecant, quemadmodum^{us} musculi, qui nobis brachium adducere dictus est. Quum itaq^{ue} hoc situ ac figura musculus iste à Natura creatus sit, qui obsecro, ad altiora, quā primi musculi^{us} superior pars, brachium pectori admouebit. Eius enim principium, longē à prioris musculi superiori principio superatur, quum hoc à clauicula, & superiori pectoris ossis sede, insigniter etiam deorsum obliquē feratur, illud uerò ex secunda costa & tertia, primum, ut uel elatissimē procedat, longēq^{ue} inferius habeatur, ac minus obliquum ductum (qui etiam ad^{us} superiora ferē pertinet) molitur. Quamobrem si hæc omnia haud segnitè perpende-
ris, & Galeno concesseris musculi^{us} insertionē, quæ ē regione humeri capitis perficitur, nonnihil articuli ligamentum apprehendere necessariō fateberis eam, quam musculus iste molire-
tur brachij adductionem, neque humiliorem, neque altiore fieri ea, quā à primo musculo effici dudum dixi. Quum itaque solius scapulæ gratia, non autem brachij, musculum hunc procreatum in hominibus certissimē noui, ipsius denuō in scapulam mouentiū musculorum enarratione sermo instituetur, ac proinde etiam in præsentia reliquos brachij motores aggre-
diar. Vnum igitur^{us} musculum, omnium adductionum brachij ad pectus autorem esse cen-
seo, & qui brachium ad superiora attollit, pariter quoque unum statuo. Est porro hic muscu-
lus carnosus, uaria quoque, sed continua principia sortitus, ac uelut ex diuersis musculis (si
lato ipsius principio, & uarijs inscriptionibus attenderis) conformatus. Ex media enim cla-
uiculæ parte, secundum ipsius longitudinem, quæ scapulam spectat, principium ducit, muscu-
lo brachium pectori adducenti^{us} contiguus. Deinde ex summo humero,^{us} ubi is clauiculæ com-
mittitur,^{us} & tota quoque scapulæ spina musculus hic^{us} exoritur. Ex tota hac clauiculæ, sum-
mi humeri, & scapulæ spinæ regione, principium nerueum continua linea enascitur, quod
uix bene pronatum, ilico carnosum, crassumq^{ue} admodum & extuberans efficitur. Mox à prin-
cipio musculus carnosus permanens,^{us} in angustum sensim, tanquam in trianguli uerticem
tantisper porrigitur, donec humero tendine amplo, & ex carne neruosaq^{ue} substantia mixto,
robustoq^{ue}, ad humeri ossis latitudinem, non modicē sub ipsius ceruice^{us} inseratur. Ipsius in-
sertio, quæ intus, quā extra neruosior est, non ad amussim secundum transuersum perfici-
tur, sed modicē obliqua ab anterioribus, deorsum in posteriora nonnihil uergit, nihilq^{ue} mi-
nus quā decliuis rectā ue (etsi Galenus secus attestetur) est, qui ipsi eandem insertionis for-
mam tribuit, cum^{us} musculo brachium pectori adducente, quā secundum rectum, ac hume-
ri longitudinem perfici diximus. Totus itaque musculus, si quis illum obiter intueatur, trian-
guli imaginem præ se fert, ac proinde à Δ similitudine, illum Græci *Δευροδόν* appellarunt.
Quemadmodum etiā ob id, quod humeri ad scapulam articulo, quem *ἀνω* Græci uocarunt,
infernitur, illumq^{ue} quodāmodo cōtegit, *ἐπὶ σπυλῶ* eundem musculum nominarūt, ego autem
toto sermonis cōtextu, musculum appellabo brachium attollentē. Cæterum costæ, musculum
hunc describentes ita se habent.^{us} Prima à media clauiculæ longitudinis sede, ad summum hu-
merum cōtendit, & hinc per scapulæ spinam, ad eiusdem usq^{ue} basim. Secunda, à clauicula obli-
quē, deorsum ad insertionis internū latas ducitur, aut ea est, quæ hunc musculū, & brachium
pectori reducentem musculum intercedit ea regione, qua inuicem ambo committuntur. Tertia
uerò costa, à scapulæ basi, ubi eius spina eminere incipit, ad externū latas insertionis obliquē,
deorsum in priora contendit. Cæterum ueteres Græci, qui suos pueros corporis fabricā sedu-
lò edocebant, omniaq^{ue}, ut uerisimile est, ad quasdam species puerorum gratia referebant, hac
triangulari figura non contenti, uidentur & exortum præsentis musculi cuidā trianguli uertici
assimilasse, quem musculus nō antea ostendit, quā suo principio undiq^{ue} liberatus, in planum
ponatur.

Secundus bra-
chium mouen-
tium.

L. 1. 5 de Ad-
muni. sect.

Notat tri-
anguli, de quo
hic agitur uer-
ticem.



ponitur. Quum enim ita extenditur, principij pars, quæ brachium pectori adducenti musculo proxima est, & deinde quæ ad basim scapulæ habetur, ambo magis prominent, & attolluntur ea parte principij, quæ à summo humero pendet, quasi ualde obtrusum trianguli uerticem hæc pars exprimeret. Hunc autem triangulum efformabis, dum alicui longe costæ duas alias breuissimas adijcies, duæ enim hæc obtusum angulū efformabunt, cui præsentis musculi exortus effigies à Veteribus comparabatur. Huius fibræ inuicem non aliter uariant, quàm quòd anteriores, quæ clauiculæ debentur, deorsum obliquè in posteriora ferantur, posteriores uerò, quæ à scapulæ spina pendent, obliquè in priora descendant. Quæ autem à summo humero, & ipsius cum clauiculæ articulo pronascuntur, rectà deorsum procurrunt, nullo tamen interrim pacto musculi brachium ad pectus ducentis fibrarū ritu, se inuicem decussatim interfecāt, nihilominus tamen ob inscriptiones nonnullas obliquè ductas, fibræ implicari parumper cōspiciuntur. Si itaque musculi pars, quæ à clauicula principium ducit, tensa fuerit, brachium sursum ad anteriora colli, & faciem attolletur. Si uerò fibræ à summo humero, & clauiculæ sede ipsi commissa, originem mutantes contrahantur, brachium rectà, & in neutram partem uertgens assurgit. At si posterior musculi pars, ex scapulæ spina prodiens in se colligatur, ad posteriora ceruicis, ipsumque occiput, brachium agetur. Musculi huius initia, ex tota amplitudine illorum, quæ diximus, ossium non exoriuntur, sed duntaxat instar crassioris lineæ, undecunque à prominentiori illarum sede aded, ut parua omnino initij crassities occurrat. Neque id prorsus negligendum est, quum præter hunc musculum, qui brachium motu proprio attollat, nullus sit, neque etiam brachium hoc donatum musculo, alio egeat, qui eodē cum illo furigatur munere. Quanquam non ignorem, Galenum hīc alios quosdam describere, at id tam uerè, ut sibi in Decimotertio de Partium usu, & Quinto de Administrandis sectionibus minime constet, cuius loca si omnia prosequeretur, in nimiam prolixitatem præsens Caput excresceret. Quapropter unumquemque dissectionis, & Galenicæ doctrinæ (quam omnes amplecti debemus) studiosum sedulo hortor, ut hæc nostra cum Galeni lectione, diligenti interim inspectione, & sectione, quam suo loco statim prosequar, adhibita, conferre haudquaquam dedigneur, hocque adhuc addi sinat, cercopithecis prorsus eandem esse speciem musculi brachij attollentis, cum hominum musculo. nam & in illis animalibus hunc musculum, uel Galeni gratia, non ignauiter aggressus sum. Canes autem, equi, boues in hoc articulo, non solum in ossibus, sed maxime in musculis & ligamentis, ab hominis constructione uariant. ^p Musculus brachium rectà ad deorsum agens, cōtrario munere illius⁹ musculi fungitur, qui omnibus suis contractis fibris, brachium pectori admouet, seu in anteriora agit, hic quoque carnosus similiter & crassus est, & inter ceteros huius articuli musculos utcumque teres. Oritur autem carneo principio, ex inferiori scapulæ basis⁹ angulo, à basi quidem modicam principij partē assumens, sed insignem ab inferiori scapulæ costā, ex media enim costā illius longitudine, basi scapulæ propinqua, & ab externa gibbæ humilioris basis eius anguli sede, continua carnosaque origine enascitur. Ad medium igitur longitudinis, inferioris costæ musculus hic, à scapulæ osse abscedit, & modicè sursum in priora tensus, humerum seu brachij os accedēs, in ualidum breuemque, sed latum cessat tendinem, illi ferè forma respondētē, quem musculus brachium pectori adducens, humero inserit. Neque solum forma (quam ad latitudinem & crassitiē ac insertionem, secundum humeri longitudinem refero) præsentis musculi tendo, illius tendinē respondet, qui ad pectus mouet, uerum in eandem ferè regionem, illi duo musculi implantantur, in eorum medio interuallū demittentes, cui tendo⁹ musculi inferatur, quem deorsum uersus dorsum, ad illa brachium mouere paulo post subiiciam. Quamuis interim tendo musculi ab inferiori scapulæ costā pronati, paulo uiciniū humeri capiti implantetur, quàm illius tendo, quem brachium pectori adigere relatum est. Neque hīc rursus me fugit, præsentē musculum inter brachium circumuertentes, à Galeno perperam recenserī, atque ab illo⁹ musculum triangularem, & scapulæ gibbum occupantem, & mihi in circumuertentium brachium clausum ponendum, ab ipso autorem ductus brachij ad dorsum poni. Verum studio, quum mihi res secus habere uideatur, ab ipsius dogmate recedo, uti profectò & tu quoque es facturus, ubi affectu exuto, & iam admonitis sectionem aggredieris, aut debite administrantibus astantibus. Nollem enim mihi hīc fidem ex Libro dari, quum certa semper lege orem, ne qua fides Libris in ijs partibus habeatur, quæ nondum per sectionem uisæ sint. Brachium deorsum trahitur, à⁹ magno quodam, latèque admodum musculo, qui à spinarum apicibus, quæ à sexta thoracis uertebra spina, ad ossis sacri usque medium habentur, principium sumit, non quidem id pluriū brachij motuum opificum modo crassum, sed omnino instar amplæ membranæ tenuè continuumque, ac recta linea à dictarum modo spinarum apicibus pronatum.

Z Verum

Tertius brachium mouentium.

Li. 5 de Partium usu, Li. 5 de Administrandis sectionibus.

Quartus brachium mouentium.

Verum ubi musculos dorsum mouentes, id principium perreptaui, eamque costarum regionem contingit, quae maxime in dorso, uersus posteriora exuberat, carnosum densumque efficitur, & uniuersus musculus ad eum modum auctus, in angustum tantisper procedit, donec tendinem latum, ualidum, sed breuem humero inferat, subter ipsius ceruicem, & secundum ipsius longitudinem, in medio tendinis brachium pectori ad mouentis, & tendinis qui brachium recta ad dorsum agit. Hic itaque musculus etiam triangularis est, sed plane inaequalibus conformatur costis, ac duas quidem longissimas exigit, unam, quae secundum dorsum longitudinem porrigitur, alteram, quae ab osse sacro, per ilia & inferiorem thoracis partem, sursum ad tendinis insertionem conscendit, atque alterum axillae cavitatis uallum constituit. Tertia uero praesentis musculi costa, a sexta thoracis uetebrae spina, super angulum scapulae, quae basis humilior pars ostendit, ad insertionem tendinis uehitur, atque haec transuersim quodam modo repens, reliquis duabus costis multo breuior est. Ac pro trianguli costarum inaequalitate, etiam huius musculi fibrae differunt, quae enim per ilia, et spurium costarum extrema sursum porrigitur, prolixissima, ac minus obliquae sunt, quae uero ab inferiorum uetebrae thoracis spinis nascuntur, breuiiores sunt, & transuersim magis propereunt. Musculus iste motus brachij deorsum opifex est, non quidem id simplici motu, sed composito, pro fibrarum uarietate, praestans. quando quidem prout superiores fibrae, aut inferiores in se colliguntur, contrahunturue, ita quoque deorsum, nunc ad superiora, nunc ad inferiora, brachium uersus dorsum deprimitur. Porro musculus hic, dum scapulae humilioris transcendit angulum, fibris quibusdam scapulae committi, atque ipsi aliqua insigniori apprehensione adnasci, Galenus scriptum reliquit. Deinde huius insertionis beneficio, non modo brachium duntaxat, ab hoc musculo moueri asserit, imò etiam illum detractionis scapulae ad inferiora autorem esse commemorat. Profecto etsi quam maxime uerear, Galeni placitis obuiam ire, & lubens hoc Capite, saltem unicuique musculum circa controuersiam plenè describere optem, haudquaquam tamè, ut res sese habet, hic subticere queo. Praesens enim musculus, dum humilioris scapulae basis angulum integit, scapulae ossi, nisi musculorum, qui ab illo pronascuntur, interuentu, contiguus uisitur, ne utique autem ossi connatus, ut neque etiam, cui incumbit ibidem musculorum regioni, aliqua peculiari insertionem committitur, connasciturque. Non enim aliter inibi subditis adnectitur musculis, quam musculis dorsum mouentibus, & thoracis & abdominis, qui huic musculo non minus, quam illi scapulam occupantes substernuntur. Quum itaque musculus hic, nullam in scapulam moliat insertionem, proprio etiam motu una cum brachio eam nequaquam, ut Galenus opinabatur, deorsum uellit. Etsi illum tota ea sede, qua angulo scapulae superuehitur, scapulae innasci dare, id tantum me Hercules transuersis perficietur fibris, illis inquam, quae in elastissima suae originis sede habentur, atque a sexta, septima, octaua, nonae & decimae thoracis uetebrae spinis dependent, quae sanè non deorsum scapulam mouerent, sed recta ad dorsum. Huius enim musculi eminentior pars, aliàs a spinis, quam Galenus arbitratur, principium ducit, nam aliquousque illi musculo substernitur, quem scapulam mouentium secundum numeramus, quemque Galenus inter posteriores scapulam mouentes, Demissiore uocat, amplum hunc brachij musculum, ibidem principij sui uerticem assumere astruens, ubi ille demissior scapulae musculus cessat. At quum suo rursus loco de scapulae motoribus sermonem instituamus, ad brachij musculos iam reflectenda est oratio, inter quos Galenus alium enumerat musculum, eiusdem functionis cum nuper dicto, gratia efformatum, ut scilicet brachium deorsum trahat, atque hunc quidem latum amplumque esse recenset, sed tenuem interim. Membranam enim, quam nos carnosam uocamus, fibris carnis augeri narrat, quum primum illa contingit, ac fibras has sursum tensas, carnosiores tantisper efficit, donec membrana ampli & tenuis musculi naturae, quem buccas mouere diximus, respondeat, humerumque implantetur. Deinde hunc musculum Galenus omnes, qui illum praecesserunt confectio num Procures, in hominum potius corporibus, quam cum Galeno in simijs se exercitantes lauisse, atque ab ipso in simijs inuentum nusquam non iactitat. ego profecto in simijs, & canibus, plurimisque quadrupedibus ipsum obseruauit, non tamen in omnibus aequè latum carnosumue. At in simia (ut id priuatim dicam) ad hunc modum mihi apparuit, membrana carnosissima, secundum spinæ totius longitudinem firmius subditis organis, quam alibi connascitur haud aliter, quam si ex spinarum apicibus principij sui portionem, aliorum ligamentorum conficit, illiūque os contingit, carnis, sed tenuibus rarisque fibris adaugetur, quae sursum oblique uersus axillam properepentes, ac ex lata basi sensim in arcum collectae, musculum amplum at tenuem exprimunt, qui in mucronem desinens obscure, uixque admodum in humerum implantatur,

*L. 13 de Part.
tiori usu, & 5
de Admitt.
strans d. ffe,
et. onibus.*

*Musculus alius
quo simiae et
canes abutuntur,
dant.
L. 12 cy 5 de
A. b. m. n. f. f.
f. f. f. f. f. f. f.
de l' f. f. f. f. f. f. f.
um*

*b. 2. tab. 1.
uersus n.
tab. S. T.
uersus
c. 4. ta. C.
T. musculi
d. 7. tab. 1.
e. 10. ta. p.
ma. co. f. a.
S. d. T. 1.
T. per X.
V. 3. ab S.
V.
f. ad f. e. d.
Y. ta. 10.*

*g. ad f. e. d.
Y. tab. 10.*

*b. 9. ta. 1.
uerum h.
de parte
f. uis a. in
gnita tab.
um agi.
mus.*

i. 3. ta. 1.

tendini

k 3, 4. l. d. o. tendini eius^k musculi continuus, qui brachium pectori adducere commemoratus est. In canibus manifestam insertionem in humerum non ostendit, & videtur musculi brachium pectori adducentis tendini aliquo pacto admisceri, aut potius propriae eius musculi membranae adnatae. In equis quoque, bobus, & ouibus, & id genus animalibus, admodum euadit conspicuus, unde etiam consulo illum in boue potissimum perpendi, quod fiet promptissime, si excoriati bouis axillam inspexeris. Apparebit nanque is amplus, & conterminis musculis rubicundior, & caeteris partibus albis apparentibus, ex illo maximam portionem ablatam esse conperies, quam lanij cuti adnatam relinquunt eo, quod carnosam membranam unam cum cute auferre, inter excoriandum consueuere, atque ideo etiam tantam praesentis musculi partem, quanta nondum prorsus, & insigniter carnosam apparet, auferunt. Quapropter etiam iuuabit, excoriantes lanios uidere, qui longe acutiori cultello, maioriq; mora in axilla cutem adimunt, quam in reliquo corpore, ubi membranam unam cum cute a subditis corporibus separant. Non inutile quoque erit, excoriata cutem iubere tibi exporrigi, ut & cutem eorum musculorum portionem adhuc adnatam contempleris, obferuesq; huic musculosa carni paulo rectiores fibras intertextas esse, quam amplo illi musculo, quem brachium deorsum ad spinam mouere testatur. Atque haec in simia, & quae proximè nominata sunt, animantibus didici, at in homine me reperisse nequeo affirmare, quantum uis rectè cutem ab adipe, & quum obesus accidit corpus, adipem a membrana carnosam, & membranam a subditis illi musculis, per totum thoracem abdomenq; non diuisam, laceram uel semper dissecere. Liberaui enim subinde ab adipe cutem, et adipem postmodum a membrana, & denuo membranam ab his, quibus incumbat musculus, ac deinde manibus membranam tetendi, sed haecenus illam nullis carnosissimis fibris, secundum thoracis latera nutritam auctamq; obseruaui, nec etiam spectatorum aliquis, quotquot mihi secanti unquam assistere, membranam hanc musculosam fieri, asserere ualuit. Praeterea si membrana, quam musculum fieri Galenus asruit, brachium deorsum traheret, proculdubio aut humero, aut articuli saltem ligamento neceretur, quod & si de simijs fortassis, & bobus dici possit, quia alium, quam homines, motum, propter crebrum in terram prioribus pedibus innixum exigunt, in hominibus tamen nullam insertionem membranae carnosae in humerum fieri, audacissime pronuncio. Nam praeterquam quod membrana in homine fibras carneas sub axillis nullas demonstrat, integrum est eam per totam axillae regionem, ab huius loci musculis, & articulo non minus liberare, quam in inguinibus, & poplite, quod haudquaquam perficeretur, si membrana in tendinem in os brachij infereretur. Porro quum omnibus dissectionum studiosis integrum sit, num haec, quae de membrana in hominibus proposui, ueritati sint consona, proprijs manibus inquirere, aut alijs dissectionibus iam admoniti assistere possint, his prolixius immorari haud conuenit. Addam tamen & hoc, si musculus iste cum, quem Galenus narrat, ductum, situm, & fibrarum seriem napeisceretur, quod non alio plane fungeretur munere, quam inferiores eius^m musculi fibrae, quem nos brachium deprimere asseruimus. Nequaquam enim, ut Galenus arbitrat, huius membranae carnosae musculi beneficio, brachium rectè deorsum, & in neutrum latus inclinans duceretur, quum prorsus obliquas, ex Galeni etiam descriptione, fibras nancisceretur. Caterum in nullam partem uergens brachium deorsum uellitur, quum et inferior^m musculi adducentis ad pectus pars, & inferiores fibrae deprimentis^m musculi simul agunt, accedente una quoque brachij pondere. Atque duae iam dictae musculorum partes, ille sunt, quae axillae cauitatem efformant, quasq; in Libro de Articulis Hippocrates Tendinum nomine nuncupauit, quemadmodum & Veteres, qui etiam Tendines nuncuparunt, musculos occipitis ossi connexos, ac in medio foueam efformantes, & Graecis *ivres* quoque appellatos. Qui brachium circumagunt, tres mihi constituuntur musculi, omnes ex scapula ducentes originem, & latis tendinibus, articulum continentibus membranarum implantati. Primus itaque, qui ordinem brachium mouentium quintum haberi potest, scapulae^m sinum occupat, qui inter superiores scapulae costam, & eiusdem spinam, seu magni illius processus radicem uisitur. Procedit enim a scapulae basi, et omnino carnosus totam, quam diximus, scapulae cauitatem implet, ossi semper ualide, ac si ab ipso toto progressu enascetur, conatus. Quum uero ad superiorem cervicis scapulae sedem pertingit, sub ligamento ualidissimo, suum humerum interiori scapulae processui (quem anchorae assimilamus) colligante, in anteriora contendit, et in amplum ualidumq; cessans tendinem, articulum humeri ad scapulam superat, eius articuli ligamento pertinacissime, obliqua quodammodo insertionem implantatus. Est itaque musculus hic oblongus, & exterius gibbus, intus autem illi responderet cauitati, quam implet, deinde fibras secundum suam longitudinem exporrectas habet, quae si brachium attollentis^m musculi fibris cōferantur, transuersae prorsus existunt. Huius musculi Galenū non meminisse opinor, nisi forte inter brachium attol-

*Axillarum
nulli.*

*Quintus bra-
chium mouen-
tium.*

lêtes (quos uarios, neq̃ semper eodẽ recenſet) illũ reponat, quãuis ipſi ad ſuperiora cõtractio, quam obſcurẽ uerſus anteriora molitur, præcipuẽ demãdata nõ ſit. Deinde Galeni deſcriptio num nulla illi cõgruit, etiãſi ſcapulæ eminentiori coſtæ quendam exporrectũ obiter narret, quem ſi quis hunc noſtrũ eſſe dixerit, nõ tamen ipſi inſignem cum brachium attollente muſculo connexum (imò uix contactum) tribuere poterit. Sextus brachiũ mouentium muſculus admodũ eſt carnoſus, ac concauã internamq̃ ſcapulæ ſedem opplet, ex^a baſi torius ſcapulæ carneã originẽ deducens, & in triangulũ uerticẽ, ad ſcapulæ formã tantũ per arctatus, dum in interiorẽ articuli regionẽ pertingat, cui amplo tendine, quaſi in ſemicirculũ implãtatur. Huius muſculi ſuperius latus^b illi admodũ continuum exiſtit, quem poſtremò recenſui, adeò fanẽ, ut niſi diligenter animũ adhibueris, uterq̃ unus eſſe tibi appareat. illumq̃ muſculum ad^c elatiorẽ ſcapulæ coſtã, in flexionẽ in anteriora feciſſe, atq̃ ita etiam portionẽ gibbæ ſedis ſcapulæ occupare aſſeres. Septimus uerò brachiũ mouentiũ muſculus ille eſt, quẽ Galenus in Decimotertio de Partium uſu (nam in Quinto de Adminiſtrandis ſectionibus omnes à ſcapula in humerũ porrecti muſculi mirẽ cõfunduntur) brachium retrorſum, ad dorſum agi credidit, illũ enim, qui uerẽ id munus præſtat, quemq̃ inter huius Capitis muſculos tertio loco recenſui, Galenus circumuertentis ad exteriora uice deſcripſit. Ceterũ hic ſeptimus muſculus, cuius ope brachiũ ad exteriora circumagi ſcio, uniuerſum ſcapulæ gibbum, quod ſub ipſius ſpina habetur, implet. Exoritur enim carnoſus ex ſcapulæ baſi, deinde arctior ad ſcapulæ formam^d redditus, tandem articuli ligamento, tendine amplo at breui, tanquam in ſemicirculum extrinſecus inferitur ita, ut trium muſculorum brachium circumagentium tendines, in orbem quaſi uniuerſum articuli ligamentum amplexentur, & qua ratione ſinguli ſuis fungantur munijſ, facile demonſtrent. Ligamenta uerò ſcapularum ceruici, caput humeri colligantia, ubi brachium mouentium muſculorum ſectionem abſoluero, peculiari Capite pertractabo.

Sextus brachium mouentium.

Septimus.

MUSCULORVM BRACHII MOVENTIUM adminiſtratio. Caput XXIIII.



Qui corpus in
borum muſcu-
lorum admini-
ſtratione ere-
ctum ſeruare
poſſit.

I haectenus ad brachium mouentes uſque muſculos, cæteros, & præcipuẽ latum illum, qui buccarũ motibus præeſt, diſſecueris, cutis quoq̃ ex parte ſuperiori ſcapulæ, & pectore ablata erit, ac proinde cutis ab abdomine & uniuerſo thorace, uſq̃ ad femora, & oſſis ſacri mucronẽ nunc dũtaxat adimetur. & hanc quidem aurantiũ more integram exoriabis, unica tantũ linea à pectore ad pubis uſque os ducta, aut per uaria fruſta, prout commodior apparebit ratio, eam diſſecabis. Ego autem interdũ, quando hominis ſectionem mihi adminiſtrare ſoleo, ſub inferiori maxilla per utrũq̃ os iugale, robuſtum funem traieci ad capitis uerticem, laquei modo uinctum, idq̃ aut ad frõtem, aut ad occipitium magis, prout aut erecto, aut depreſſo capite cadauer ſuſpendere animus fuit. Longiorem enim laquei finem, trochleæ cuidam cameræ trahi affixæ tranſpoſui, illoq̃ corpus tanquam ſuſpenſum, modò altiũs, modò demiſſiũs detrahi, atq̃ in omnem partem, prout negotio competebar, circumuolui curabam, & quum rurfus lubebat, in meſam inclinari ſinebam, facile enim ſub trochleæ regione meſa accommodatur. Atq̃ hoc modo in omnibus muſculorum tabulis delineandis, cadauer ſuſpenſum fuit, quemadmodum Septima tabula utcuq̃ oſtendit, quamuis dum illa delinearetur, funis ad occipitium reflexus erat propter muſculos, qui in collo illic ſunt conſpicui. Et ſi fortassis maxilla inferior, ex diſſectionis ſerie ablata ſit, aut etiam iugalia oſſa fuerint effracta, nihilominus ſinus temporalibus muſculis excuſpti, laqueũ ſatis ualidẽ amplectitur. Cauendũ enim eſt, ne ceruici laqueus circũponatur, niſi iam aliquot occipitiĩ oſſi cõnexi muſculi fuerint reſecti. Atq̃ eiũſmodi corporis ſuſpenſio ideo maxime cõducit, quòd moleſtẽ admodũ corpus humanũ in meſam prociũbens, modò in pectus, modò in dorſum conuolui poſſit. Et licet fortassis opportunẽ cadauer uertatur, tamen muſculi tunc adeò producantur, aut ex innixu lateſcunt, cõprimunturq̃, ut diſſecti propriam formã & ſpeciem uix retineant. Quocunq̃ modo igitur uifum fuerit, aut ea, qua dixi, ratione ſuſpenſo, aut in meſa reſoſito cadauere, cutem unã cum adipe abſq̃ ulla membranæ carnoſioris læſione, ab uniuerſo thorace abdomineq̃ auferes. Quod proſectò, niſi laboris ſis ſtudioſus, diſcendiq̃ cupidus, moleſtẽ ac difficulter perfeceriſ, cum tot ſectionibus cutis prorfus aliter liberãda ueniat, quàm ſi carnoſam membranã unã cum cute adimeres. Ablata cute unã rufus lineã, à media pectoris regione, ad pubis uſq̃ os, in membrana carnoſa duces, & deinde aliam à pubis oſe tranſuerſim, ſecundũ coxendicis articulum, ad ſacri oſſis uſq̃ ſpinam, & tertiam à ſummo humero, ad uſq̃ mediam brachij regionem, ſecundũ ipſius longitudinẽ. His ductis ſectionibus,

Muſculi, quẽ
carnoſa mem-
brana in ſin-
tium & canũ
axillis conſti-
tuit, examen.

t 7 tab. r. 3
tab. H.
u 7 ta. ab L
ad L.
x 7 ta. ab
L. L. uerſus
K.
y 7 ta. I.
z 1 fi. ca. 2
li. ab A per
a ad z.
a 11 ta. r.
tab. i. 9 M.
10. 12 Q.
b 13 ta. S.
c 2 fi. ca. 3
li. inter G
I, H, D, T.
Y.
d 11 tab. d
H, 1 ad K.
e 11 tab. d
H, 1 ad K.

d 3 q. r.

b 3, 8 fi. e
6 li. 1 V.

c 1d uide
eſt ad 6
A.

bis, membranam carnofam hamulo aut ungubus apprehendes, & ab uniuerſo thorace & abdomine, ad ſpinam progrediens, eam auferes, ipſam interim glandulis, quæ in axillis habentur, adhuc connexam ſinens. Auulſa itaq; ad axillæ uſq; cauitatem membrana, hæc ad lucem extendenda eſt, ac diligenter aduertendum, num ea ſub axillis in carnoſum degeneret muſculus, à lumbis, & ſpuris coſtis incipientem. Si forte (quod non futurum ſcio) hanc carnoſis ſiſbris auctâ inſpexeris, ea qua poteris diligentia, illâ ab axillis ſepara animum adhibens, num humero tendine aliquo inſeratur, aut hiſ partibus (ut in reliquo thorace ſolet) fibroſis tantum nexibus adhæreat. Atque ſedulo cauebis, ne eò ruditatis uenias, ut adeps, qui in thoracis lateribus, totoq; dorſo occurrit, carnis loco tibi imponat. Videnim quodam, tam rudes, ac ſimilariſ partibus dignoſcendis adeò negligeſter uerſatos, ut primo intuitu, adipem dorſi carnem eſſe arbitrantur, quod multò magis illum hîc, quàm alibi propter incubitum rubere cernerent. Quando enim cadauer una atq; altera die dorſo incubuit, tota incubitis ſedes, quaſi inflammatione obſeſſa rubet, atq; ideo & eius ſedis adeps. Hac itaque adminiſtratione, num membrana hæc muſculus efficiatur, & an cuius moueâ, an brachij gratia talis facta ſit, promptè examinaſ. Mihi autem hæc membrana in hominibus neque muſculoſa eſt, neq; humero tendine inſeri, imò ne ipſum quidem contingere uiſa eſt. Cæterum ubi uniuerſam membranam, à corporis trunco, & media brachij regione liberaueris, brachium pectori adducentem muſculum aggredieris, ante omnia perpendens, num alicubi promineat ille gracilis muſculus, quo caudatæ ſimæ donantur, quicq; à mamillarum regionibus, furſum oblique ferunt. Verum quum iſte in hominibus non ſit, iam muſculi brachium pectori adducens caput, à clauicula, & tota oſſis pectoris regione, ipſiq; inſertis cartilaginibus, nouacula aut cultello abraſes, achamulus aut ſummis digitis apprehenſum, ad humerum uſque à ſubiectis corporibus, aut digitis aut buxeo cultello ſeparabis. Dum uerò muſculi huius caput nouaculâ liberaſ, accuratè ſtudendum eſt, ne quid aliud unâ cum illo auferas. In canibus enim ac ſimijs, uerarum coſtarum cartilaginibus muſculus obtenditur, quem ferè recti abdominis muſculi partem eſſe dicemus, & qui à Galeno reſpirationis gratia creatus dicitur, ac uice proprij thoracis muſculi, à recto diſtincti habetur, quemadmodum in muſculorum thoracè mouentium enarratione dicturi ſumus latius. Nunc enim in hoc admonéo, ut etiam ſi ego in homine minùs hîc reperiã, ſtudioſi tamen illum obſeruare conentur, atque commiſſiones inter diſſecandum ſeſe admoſneant, eiufmodi muſculum ex Galeni ſententia hîc latere, ac proinde non oſcitant muſculum brachium pectori adducentem oportere ſuo principio liberari, aut obiter liberatum abijci. Neque huic ſolùm animus accommoſdandus eſt, uerùm et illi, qui in ſimijs ſub muſculo brachium ad pectus mouente occultatus, ad articuli ligamentum exporrigi aliter, atque in hominibus dicebatur. Atque ita non mirandum eſt, me quum hominibus fabricam oſtendo, etiam perpetuò aut ſimiam, aut canem publicæ ſectioni adhibere. Cæterum magnum hunc pectori brachium adigentem, in præſentia humero adhuc appenſum relinquens, ad reliquos brachij accedes, quos commodè adminiſtrare nequis, niſi priùs ablato muſculo, qui ab occipiti offe procedens, per totam ceruicem extenditur, & totiſ ſcapulæ ſpinæ, ſummoq; humero, unâ & huic proxime clauiculæ ſedi inſeritur, tum hinc per ſcapulæ gibba, & baſim deorſum protenſus, donec mucrone ſuo octauæ thoracis uertebræ ſpinæ committatur. Eſt enim muſculus iſte ab occipitio, ad octauam uſque thoracis uertebram, ſpinarum apicibus quodammodo cõnexus, ab ipſiſq; principium ſumit. At de hoc muſculo unâ & cæteriſ ſcapulam mouentibus, poſtea agemus. nunc autem obiter eius mentio incidit, quòd poſteriores brachium mouentes conſpiciprè nequeant, niſi ille à ſpina & occipitio, ad ipſum uſq; inſertionē, ſectione liberatus fuerit. Adminiſtratur uerò nouacula aut cultello, ſecundum ſpinæ dorſi longitudinem facta ſectione, quæ muſculum illum duntaxat ad ſubiecta uſque uulneret, deinde altera ſecundum occipitium eſt duſcenda, quæ ibidem etiam muſculi principium, ab occipiti offe liberet. At ſi fortaiſ ſubiectum aliquem muſculum illis ſectionibus uitare metuis, buxeum cultellum exterioribus muſculi lateribus ſubdes, illi ſcilicet lateri, quod ab occipitio ad clauiculam fertur, & deinde illi, quod à ſummo humero ſeu clauicula, ad octauæ thoracis uertebræ ſpinâ deſcendit. Cultello enim lateribus indito, & furſum deorſumq; actò, à ſubditis muſculis illum ſcapulam muſculum abſcedere coges, atq; ipſius nerui principij craſſitie facile tunc cõiecturabis, muſculumq; à ſubſtracis corporibus iam liberatum, paruo negotio ad ipſius inſertionem perduces. Verum rurfus ſub hoc, ut in peculiari huius muſculi enarratione ſumus dicturi, obſeruandum eſt, ne unâ cum illo muſculus ab occipitio in ſcapulam procedēs auferatur, quem Galenus unâ cum illo, quem nunc diſſecaſti, ſcapulam quoque furſum trahere prodidit. Neq; hoc eo dico, quaſi homines illum cum ſimijs communem

Primi brachii
mouētium
musculi admi-
nistratio.

*Li. 6 de Ad-
ministrandis
confectioni-
bus.*

Adri. secunde
scapulam mo-
uentum. ut re-
liquos brachij
scite aggredia-
ris.

Z₃ haberent,

habrent, uerum ut nō perfunctorie, an illo quoq; homines donentur, animaduertas, & simia administrationi simul adhibita, hæc nostra cum Galeno (si modò diligens Naturæ sis admirator) conseras, neque etiam canibus hic confidas, qui quemadmodum equi, & boues, & cætera, quæ clauiculis carent, animalia, plurimum in brachium & scapulam mouentibus musculis, à simijs uariant. Quæ adhuc alium habent musculum, ab externa sede tranſuerſorum proceſſuum quatuor primarum ceruicis uertebrearum enatum, & in ſcapulæ ſpinam inferum, quo homines quoque carent, eſſet tamen & iſte quoq; ſi reperiretur, iam diſſecandus. In ſimijs igitur, tribus illis musculis abſectis, in homine uerò, primo duntaxat liberato, ^k musculum cuius beneficio brachium attollitur, à ſuo principio ſeparabis, eius caput ab uniuerſa ſcapulæ ſpina, ſummo humero, & clauiculæ mediâ ſede, nouacula aut cultello proximè ſemper offi adiecto, abſecans, donec illum tranſuerſam in humerum inſertionem moliri conſpexeris. Brachium tamen attollens musculus, poſtquam eius triangularem figuram, et præcipuè illius capitis, quod abſectum, iam obtuſum trianguli uerticem oſtendet, perpendeſis, non ſolùm in ſuperficie undique eſt intuentus, ſed ſumma diligentia inquirendum uenit, num tota illa moles articulum exterius integens, quamq; nos unius musculi loco habemus, plures musculi ſint mutuò ſibi incumbentes, quemadmodum Galenus in Quinto libro de Adminiſtrandis conſectionibus uidetur innuere, immeritò uti aliàs ſæpius, ueteribus diſſectionis Profeſſoribus (qui in hominum cadaueribus ſeſe exercebant) neſcio quam, oſcitantiam imponens. Examinabis itaque uniuerſum musculi principiũ, atq; quomodo craſſeſcat, carnoſusq; ſenſim musculus efficiatur, conſiderabis, ac deinde tendine etiam (qui ſimplex eſt) examinato, per tranſuerſum in omnibus musculi ſedibus illum diuides, ut aliquando fatearis illum nihil minus, quàm duplicatum eſſe, neq; illam referre ſpeciem, quàm tres primi ab illo offe enati, & femoris motibus famulantes musculi pulchrè exprimunt, ſi ſimul mutuò incumbentes, uniusq; musculi loco enumerati perpendantur. Cæterum duobus primis brachium mouentibus musculis, ab humero abſectis, ^m musculum, qui deorſum brachium mouet, à ſubditis illi partibus ad inſertionem uſque liberabis, quod factum eſt faciliſſimum, ſi ſecundùm ſpinæ longitudinem, à qua principium aſſumit, lineam duxeris, quæ membraneum ipſius principium duntaxat perſecet. Quum itaq; principium liberaueris, hamulo aut digitis id apprehendes, uniuerſum musculus buxo cultello, aut etiam nouacula reuſiori, à ſubditis musculis ſeparans. In hac adminiſtratione, ⁿ quali ter musculus iſte baſis ſcapulæ humiliorem angulum tranſcendat, ſcapulæq; adhæreat, contueberis, & deinde ſi principium ipſius uariè ad originis locum protenderis, manifeſtè quo modo hic musculus brachium detrahat, & nihil minus quàm ſcapulam moueat, addiſces. Porro quum lineam illam moliris, qua eius musculi principium à ſpinarum apicibus liberas, cauendum ſanè eſt, ne unà quoq; diſſeces ^o initium abdominis musculi oblique aſcendentis, et deinde ^p illius, qui tranſuerſim à ſpinis quoque uertebrearum enatus, in decimam & undecimam, thoracis coſtas inferi dicetur. Quapropter ſi tuis manibus parum fidis, idem in hoc musculo tentabis, quod in illo experiendum probauimus, qui ^q ſecundus ſcapulam mouentium nobis numeratur, ut ſcilicet protenſam manum, aut buxum cultellum externo musculi lateri ſubdas, atq; illum tranſuerſim ſurſum deorſumq; actum, tantisper moueas, donec ad ſpinarum uſque apices musculum, à ſubditis organis diuiſum eſſe conieceris, hac nanque ratione principij ſui membranæ craſſitiem promptè cognofceſ, & quàm altè cultellus aut nouacula ad hoc ſeparandum immitti debeat, exquiſitè intelligeſ. Verum omnino opportunè feceris, ſi ſtylũ aliquem longiorem, rotundumq; ornatum tuberculo, ſub musculi principio rectè protenderis, & ſenſim cultello ſub musculo ad ſtyli latus demiſſo, principium diuiſeris, cultelli ſemper acie extrorſum ducta, & leuiter obliquata, ſurſumq; ſemper cum ſtylo protuſa ad eum ſerè modum, quo char tam diuidimus. Niſi etiam eo artificio uti uelis, quo in eruendis è ueſica calculis utimur, quum ſiphonem inſtar dimidiæ canalis effictum, ueſicæ ceruici indimus, ut dein in eius cavitatem ſectio moliaturo prorſus modo, quo piloſi ſerici textores, ſericum in pilos diuidunt, his enim rationibus omnia pulchrè diuiduntur, quæ ſecundùm ſtyli longitudinem diſſecanda ſubinde in poſterum audies. Quando igitur musculus, quo brachium declinæ agitatur, ad humerum perduxeris, tendinẽ ipſius ab humero liberabis, ac demum ^r musculo retrorſum brachium trahenti te accingens, ipſius initium ſimiliter ab humiliori ſcapulæ coſta abſciendes, & accuratè indagabis, num Galenus uerius huic circumuertendi munus attribuerit, quàm ^s musculo gibbam ſcapulæ ſedem occupanti, quem que ego in circumuertentium albo recenſui. Poteris itaque hunc tam diu humero appenſum relinquere, donec illum, qui ſcapulæ gibbum opplet, à ſcapula ad articuli uſque ligamentum abraſeris, ut eo uerius ſingula expendere ualeas. ^t Musculus, qui ſcapulæ cavitati incumbit, quæ inter ſpinam & ſuperio-

Admiſſi ſecundi
brachium mo-
uentium.

Quartus admi-
niſtratio.

Tertius admi-
niſtratio.

Septimi.

Quinti.

k 4. tab.

10. d. a.

l 9. d. 7. n.

14. 2. 11. f.

2.

m 10. d.

n 10. d.

o 12. d.

p 11. d.

q 9. d. 7.

r 10. d.

s 11. tab.

t 13. tab.

u 12. d.

H.

7 tab. r.

superiorem ipsius costam uisitur, à scapula derades duabus lineis, una per spinæ scapulæ superius latus, altera secundum elatiorem eiusdem costam, ductis, & deinde, quæ humeri articuli ligamento musculus committatur, examinato. Brachium circumagentium⁶ musculus, qui internam scapulæ sedem sibi uendicat, nisi prius scapulam sectionis serie à clauiculis solueris, non commodè se spectandum offert, et integris adhuc scapulam mouentibus musculis, importunè scapulā à clauicula separaueris, aut etiam unā cum clauicula à thorace eam abstuleris. Quandoquunque igitur scapulam à clauicula, sectionis serie liberatam uideris, aut scapula in totum à thorace ablata fuerit, eius musculi, quem ordine brachij motorum sextum reuli, administratio facillima erit, quandoquidem oculus tum uniuersus ex scapulæ eraditur cavitare, quod ubi præstiteris, huius simul & aliorum officium absque negotio examinabis. Quanquam interdum etiam⁷ quinti nobis enumerati musculi sectionem, donec scapulam à clauicula solueris, referuandam censeo, quum is in scapulæ cauo thoraci proximo prorsus recondatur.

Sexti

7 tab. l.

DE LIGAMENTIS HUMERI AD scapulam articuli. Caput XXV.

Hec scri-

tum petes

1. & 2. fi.

23. li. A.

C, D, E,

F, G.

2. fi. ca. 21.

li. A, B.

fig. ult.

arum li. 1.

4. 2.

d magna

ex parte

u brachi-

i mouent.

fig. cap.

li. 1. H, I.

5 tab. ca.

t m mu-

sculo.

id quum

ham obit

it crassi-

t, scus

incarne

le, quam

occur.

ubi in ta-

ulis ossa

ecta spe-

ntur, ut

tabula.

5 tab. d.

E, F.

6 tab. v.

8 5 tab. b.

fi. cap.

13 li. D.

1 5 t. a. c.

fi. ca. 21.

li. 1. A.

2. fi. ca.

lib. 1. E.

ta H fi.

gure 1.

7 tab. in

infusculo.

8 5 t. a. f.

13 t. a. v.

7 E ad F.

cap. 23.

lib. 1.

t. a. c. 2. b.

ad d.



PRIMO Libro⁸ rotundum magnūq; humeri caput, & non admodū latum, neq; insigniter profundū scapulæ⁹ acetabulū (propter uarios, quos brachio obimus, motus) meritò extructa esse reuli. Ne autē laxus adeo articulus male cūto dīretur, & quouis ferē motu sua sede humerus excideret, processus quosdam scapulæ, & uaria deinde ligamenta inuicem ossa colligantia, Naturam produxisse subiunxi. Cæterum quum iam articulum munientes processus, ac plerofq; hunc stringentes¹⁰ musculos ab solut, tempus lanè exigit, ut articuli etiam ligamenta nunc percurram. Superiori itaque Libro scripsimus, quī superior humeri pars, quodāmodo in duo inæqualia capita distinguere-
tur, in interius scilicet, quod amplum, & semiglobi instar rotundum est, & propter illi obna-
tam cartilaginem læue, articulationi¹¹ idoneum, exterius autem asperum inæqualēq; uisitur,
leui quodam patuloq; sinu, ab interno orbiculatim distinctum. Et rursus propter aliū¹² si-
num, in anteriori parte exterioris capitis exculptum, ac¹³ exterius caput musculi cubitum fle-
scientium anterioris transmittentem, exterius hoc humeri caput ueluti geminum conspīcitur,
utrinque ad sinus illius latera magis, quā in reliqua parte extuberans. Atque hæc omnia, præ-
sens articuli ligamentorum occasione potissimum sunt fabricata, interius quidem caput, ar-
ticulationis gratia, exterius uerò, ut ligamentorum inflectionem susceperet, aut ex se eadem por-
rigeret. Sunt autem tria robusta, quæ humerum in scapulæ acetabulum connectunt ligamen-
ta, præter commune, omnes articulos instar membranæ, nunc tenuioris nunc crassioris am-
biens uinculum.¹⁴ Quod itaque amplum & membranosum est, omnibusque articulis com-
mune, orbiculatim ex supercilijs ceruicis scapulæ principium assumit, ac totum articulum am-
biens, in radicem interni capitis humeri primū inferitur, & deinde totius exterioris capitis
amplitudini, ac utriusque ceruicis implantatur. Aliorum uerò trium¹⁵ duo quidem ad amūssim
instar neruorum teretia uisuntur, tertium uerò nonnihil amplum. Enascitur autem¹⁶ primū
ex¹⁷ apice interioris processus scapulæ, & hinc procedens, internis anterioribusq;¹⁸ partibus ex-
terioris humeri capitis circūtenditur, ualidissimè huius capitis sedis impressioni adnatum.

Ligamē

meruū p.

le contin.

t. d.

Cæter

culus ce.

ne

Tria p. d.

pria.

Primum.

Secundū.

Tertium.

Alterum uerò, quod crassius maiusq; isto est, ex ceruicis scapulæ superiori¹⁹ parte, ubi summo humero submittitur, ortum ducit, & interius humeri caput superans, inferitur toti illi exterioris capitis²⁰ regioni, quæ ad externum latus eius sinus extuberat, qui exterius²¹ caput musculi cubitum fleicientium anterioris uiam præbet. Huius ligamenti anterioris latus, posteriori primi ligamenti connascitur lateri,²² ac simul ambo uelut transuersum ligamentum efformant, caput eius musculi in suum sinum feruans.²³ Reliquum uerò tertium, ex eadem cum secundo re-
gione principium nanciscitur, ac obliquè hinc porrectum, inferitur in totam posteriorem
exterioris capitis humeri²⁴ sedem adeo, ut præsens ligamentum posteriorem articuli ambiat
regionem, ut enim amplum obtinet principium, ita quoque ampliorem molitur in humerum
inflectionem. Cæterum præter hæc tria, quæ præcipuè humerum, ne deorsum extrorsum-
que ab acetabulo scapulæ labatur, continent, aliud est adhuc²⁵ ligamentum, humerum sursum
& in anteriora, ad mediam nimirum inter summū humerum & interiorem scapulæ processum
sedem luxari prohibens, hoc enim similiter ualidum, ab interiori quoque processu scapulæ, sur-
sum obliquè ad summum humerum porrigitur, articulum humeri cum scapula nusquam

Ligamen ab


interiori sed.

pule processu

in superiorem

pertinens.

enarrabit. Sunt itaque hæ duæ præsentis musculilinéæ. Vna transuersim secundum occipitium porrecta, quæ etsi tenuis sit, carnea tamen uisitur. altera rectâ per spinam deorsum ab occipiti medio, ad octauam usque thoracis uertebra descendit. Præter has autem, aliæ duæ obliquæ sunt, una ex termino transuersæ linæ, quo aurem spectat, obliquè deorsum uersus anteriora, seu in dextro musculo dextrorsum protèditur, quo usq; latiore clauiculæ partem contingat, summo humero coarticulatam. Alia linæ quæ similiter obliqua est, à linæ postremò commemoratæ fine, quo ipsa clauiculam tangit, deorsum uersus posteriora obliquè tantisper descendit, dum unâ cum termino rectæ linæ, secundum spinam exporrectæ, acutum angulum constituit, è regione octauæ thoracis uertebra consistentem.



præsentis trianguli angulus, FI inscriptus.

Quatuor his lineis musculus describitur, uerum præter has, musculus aliam transuersam, in ipsius medio quodammodo nanciscitur, eam nimirum, quæ toti scapulæ spine, & summo humero, & clauiculæ latiori parti inserta tatur. Hac parte qua suam molitur insertionem (quæ uelut ipsius tendo est) nervosus simul et carnosus uisitur, ea uero sede, qua scapulæ cervicem spectat, & quarta ipsius linæ à clauicula, deorsum ad octauam thoracis uertebra prorepit, semicirculum quodammodo membranæ commonstrat, quasi hîc (ne forte scapulæ gibbum occupantes musculos artius premat) craffior carneusq; esse nequiret. Reliqua autem sede, uti iam admonuimus (nisi quâ dorsi spinæ committitur) omnino carnosus existit, sed tamen undique tenuis est, ea sui sede excepta, qua toti superiori summi humeri sedi, & latiori clauiculæ parti ualidissime implantatur. Porro fibras, non uno omnes modo porrectas habet, nam quæ ab occipitio, cervicisq; uertebra rum spinis deorsum protenduntur, obliquè ut & exterior eius musculi partis linæ, ad anteriora deorsum tantisper prorepunt, donec scapulæ spinæ, & summo humero, & latiori clauiculæ sedi inserantur. Præsentis fibræ eo semper obliquiores magisue transuersæ redduntur, quo à cervicis uertebra rum spinis, thoraci propinquo ribus principium ducunt adeò, ut illæ, quas cervicis radix exporrigit, iam paulò minùs toto transuersæ sint. Quæ uero à thoracis uertebra rum spinis uerè enascuntur, sursum uersus anteriora tensæ, tanto quoque rectiores, minùsque transuersæ uisuntur, quo octauæ thoracis uertebra sunt uiciniores. Eiusmodi fibrarum series commonstrat, huius musculi beneficio non modò uniuersam scapulam sursum attrahi, sed etiam deorsum uelli, rectâq; ad dorsum agi. Si nanque superior musculi pars, inter secundum uersus suam originem trahatur, totam scapulam sursum attolli conspicias. At si humilior musculi pars, quæ inter scapulæ spinam, & octauam thoracis uertebra consistit, ad suum exortum tensa fuerit, scapula deorsum uellitur. Deinde uniuerso musculo inter diffecandum attracto, & præcipue quâ ex inferioribus cervicis, & superioribus thoracis uertebra rum spinis enascitur, scapulæ molem rectâ retrorsum duci cernimus. Atque hinc fit, ut præsens musculus motibus omnino pugnantibus præficiatur, ac, uti prius relatum est, fibras contraria serie ductas quoque exigat, quanuis interim nulla prorsus sui sede hunc disunctum inconiunctum ue esse, quis uerè dixerit. Proinde unitatis ratione, præsens musculus unius loco mihi habetur, quo minùs autem functionis gratia is duorum, aut plurium uice à quopiam recenseri queat, per me non obstitit. At Galenum miror, qui hunc musculum disungens, ad medium fere Libri quarti de Administrandis sectionibus, superioris musculi partis prolixius, quàm de aliquo totius corporis, contra Lycum nimis profectò inuidiosè disceptans meminuit. Ad calcem uerò eius Libri, inferiorem musculi partem uix obiter nominauit, tunc scilicet, quum scapulam duobus proprijs musculis, ad dorsum agi insinuaret, quorum inferior est huius nostri musculi humilior pars, à thoracis uertebra rum spinis præcipue originem assumens, quam etiam alibi Demissiore scapulæ musculum appellauit. Vtunque sit, parua hîc nobis cum Galeno futura est dissensio, si ambos à se enarratos musculos, unum continuum corpus esse annuerit. Nam etsi fortassis musculi huius insertio, quæ instar latæ ac obliquè admodum procedentis linæ perficitur (quantum uis etiam & in insertionem muscu-

musculus continuus sit) illum in duos distinguere apparet, nulla tamen prorsus discriminis
 nota (nisi forte diuersus fibrarū ductus) inter spinam dorsī, & scapulæ basim habebitur. Vbi
 tamen distinctionem lineamq; confingere debes, si modò superiorem Galeni musculum tra-
 pezīæ figuræ quouis pacto assimilaturus sis. Ea siquidem linea, quæ à cervicis radice, secun-
 dum scapulæ spinam, & summum humerum, & latiorē claviculæ sedem duceretur, compa-
 randa uenit basi trianguli rectanguli, in cuius summo lineæ æque distans à basi ducta sit. Quæ
 admodum ea musculi linea, quæ secundum spinæ cervicis longitudinem fertur, illi trianguli
 lineæ assimilatur, quæ perpendiculariter trianguli illius basi incidit.^b Quæ autem ad occipitiū
 transuersim ducitur, illi lineæ correspondet, quæ in trianguli uertice æque cum basi distat. At
 quæ ab occipitio ad claviculam procedit, obliquo trianguli lateri confertur. Caterum nūc
 magis à Galeni dogmatibus mihi redinandum est, idq; præcipue propter simiarum ad homi-
 nes differentiam. Primum enim, si Galeno credideris, teipsum insitiæ oscitantiaq; inter secan-
 dum insimulabis, quum deinceps alios musculos scapulam attolentes in homine sedulo in-
 dagare conaberis. Ex Galeni enim placito, sub eminentiori nobis dicti iam musculi terces
 alium inquires, qui illo longè gracilior minorq; sed tamen carnosus totus esse deberet, & qui
 ex occipitij osse sub nuper dicto principio enatus, deorsum modicè uersus anteriora, oblique
 descenderet, & altiori basis scapulæ angulo exporrectus, in latum tendinem desineret, ad me-
 dium usque basis scapulæ interius insertum, è regione radices spinæ scapulæ. Huicid munus
 concreditum esset, ut scapulæ basim fursum, seu ad occiput attraheret, uerum hunc frustra
 mecum in homine (quod ipse illo destituitur) indagabis, quū interim promptissimè in cau-
 datis simijs occurrat, eam prorsus naturam, quam Galenus ipsi tribuit, quamq; ego iam descri-
 psi, seruans. Quod non eo in medium adfero, quasi illum musculum in hominibus inuestiga-
 ri nollem, sed ne librorum lectioni plus satis fidei tribuēs, me illum præterisse arbitreris, aut si
 sectionē aggrediaris, intelligas, quo nam pacto hominis musculos sis reperturus, quanq; præ-
 ter meritum Galenus ueteres dissectionum Professores subinde suis delusus simijs insimulet.
 Denuo in caudatis simijs alium obseruamus musculū, à Galeno quoq; enumeratum, qui car-
 noso principio, ex primæ cervicis uertebrae transuerso processu, dein & ex tertiæ & quartæ uer-
 tebræ transuersis processibus nascitur, non quidem ex interna ipsorum fede, sed ab externa
 tur, emerit, teres, sed tamen latior, quàm profundior apparens, deorsum in posteriora, uersus
 scapulæ basis superiorem angulum perfertur, ipsius internæ sedi carnosus latiorq; redditus in-
 fertur. Rursus simiæ alio quoq; musculo donantur, quem inter Galeni musculos scapulas
 attolentes, si Quartū de Administrandis sectionibus ad amussim discusseris, quarto loco enu-
 merari reperiēs. Atq; hic mihi ab interna transuersi primæ cervicis uertebrae processus fede, de
 incept & tertiæ quoq; & quartæ cervicis uertebrae transuersis processibus, carneo princi-
 pio nasci uisus est, quod prædicto musculo latius redditum, deorsum quoque, sed minus in
 posteriora tantisper ducitur, dum carnea lataq; insertionē, in scapulæ spinā inferatur, in ea spi-
 næ sede, qua hæc summum humerum producit, quæ quodammodo è regione cervicis scapu-
 læ consistit. Caterum ut homines prorsus secundo Galeni musculo, qui ab occipite in simijs
 exoriri dictus est, destituantur, ita etiam & quarto. Verum tertium musculum homo com-
 munem nanciscitur, sed nonnihil quàm simiæ ualidiorem. Exoritur enim homini musculus
 ualidus à^b transuerso primæ cervicis uertebrae processu, deinde & transuerso processu ter-
 tiæ uertebrae, quartæ & quintæ, quasi disunctis constaret principijs, uno nimirum, quod
 primæ cervicis uertebrae debetur, altero autem, quod tribus secundæ uertebrae proximè
 subiectis ascribitur. Quanquam etiam interdum à^m transuerso secundæ quoque uertebrae
 processu musculus hūc, sed parua origine nasci uisus sit. Porro principia hæc, simulatque
 ex reliquis cervicis uertebrae amplexantibus musculis emergunt, unā coeunt, & ualidum
 efformant musculum nonnihil latiorē, quàm profundiorē, quilàta, sed carnea insertionē,
 inⁿ internam superioris anguli scapulæ basis sedem inferitur, scapulamq; fursum uersus ante-
 riora, cervicisq; latera trahit. Non inopportune itaq; hic musculus nobis scapulā attolentiū al-
 ter dicitur, aut saltem omnium scapulæ motorum tertius in hac nostra serie locabitur. Gale-
 nus suis omnibus scapulam attolentibus musculis, addidit oblongum gracilemque muscu-
 lum, quem ex ossis hyoidis lateribus procedentem scapulæ, propter ipsius ceruicem, interiori
 ex parte inferi scriptum reliquit, & eius musculi beneficio in anteriora colli, scapulam attol-
 li opinatus est. Ego autem in Capite de hyoidis ossis musculis, eius ossis gratia, non autem sca-
 pulæ, hūc musculum efformatū asserui, ac proinde cuiusnā motus autor is censerī debeat, dili-
 genti sectione uenit indagandū. In hoc enim simijs nulla cū hominibus est differētia, nisi quod
 simijs

Musculus
 scapulæ attol-
 lens, quo simiæ
 abundat.

Tertius mu-
 sculus simiæ
 scapulam at-
 tollentiū.

Quartus, quē
 simiæ sibi pri-
 uatim sicut
 quam homines
 uendicant.

Tertius homi-
 nis scapulam
 mouentium.

Musculus
 inter scapu-
 lam attollen-
 tes à Galeno
 perperam de-
 scripseris.

simijs toto progressu carneus uideatur, hominibus autem in medio ductu gracilescit, tendi-
nis speciem cōmonstrans, & duobus quasi musculorum uentribus donatus. Quod sanē Ga-
lenus, si hominem unquam secuisset, non minus animaduertisset, quā^p musculos inferio-
rem maxillam deorsum ducentes duobus donari uentribus. ^{Quartus ho-} Vnus adhuc musculorum scapu-
lulam mouentium reliquus est, qui hanc retrorsum ^{minis scapulā} a dorso spinam, uersus superiora nonni-
hil agit. Hic autem amplus & tenuis, sed omni ex parte carneus uisitur, qui à quinta, sexta, &
septimæ ceruicis uertebrae, deinde trium primarum thoracis uertebrae spinis^p princi-
piū ducens, toti propemodum scapulae basi carneus, ac aequē ut in exortu latus^p inferitur,
fibras obtinens non prorsus transuersas, at non nihil oblique à dorso, deorsum ad scapulae ba-
sim ductas. Quibus uerò musculis hic quadrilateris musculus, & alij omnes regantur, quibus
ue illi obducantur, sectionis semper series, et musculorum tabulae leui negotio commonstrat.
Quod profectō non oscitanter in illo^p musculo obseruandum praecepimus, qui brachij ad
dorsum uersus inferiora motus autor est, quem Galenus in Libro decimotertio de Vsu parti-
um scapulam quoque deorsum ducere parū rectē prodidit, ego autem huius quoque mo-
dō memini, ne quis in musculorum scapulam mouentium numero, Galeni nomine alium,
quā hactenus narraui, requirat.

*Quartus ho-
minis scapulā
mouentium.*

*Musculum
quo brachium
deorsum
scapulam non
mouere.*

MUSCULORVM SCAPVLAM MOVEN-

tium administratio. Caput XXVII.



PRAESENTIVM musculorū administrationē pari, quae reliquos omnes,
methodo aggredieris. Primi enim, quo scapula pectori adducitur, princi-
piū, nouacula à costis, unde prodit, liberandū est, & deinde toto muscu-
lo à thorace ad internum usq; scapulae processum separato, ipsiusq; attra-
ctis principijs, cuius potissimum motus opifex habendus sit, inquirens,
num scilicet brachium potius, ut Galenus docebat, quā scapulam uti
ego dicebam, moueat. Secundum musculus, quem & scapulam attolle-
re & deorsum trahere dixi, in musculorum brachium mouentium administratione iam antea
es aggressus, unde etiā hic ipsius sectionem prolixius repetere penitus abs re foret. Verū
tertium, qui à ceruicis uertebrae ad scapulae basis superiorem angulum ducitur, suo principio
prorsus liberandus non est, nisi aliquot ceruicis musculis antea praefectis. Ac proinde opera-
pretium erit illum transuersem, ubi primum ex ceruicis musculis emergit, abscondere, atq; ipsius
principio ad uertebrae relicto, illum à scapula liberare, ipsius tamen functione prius perpen-
sa. Quartum musculus leui longaq; sectione à spinarum apicibus secabis, atque ubi ipsius in-
sertionem adamussim obseruaueris, eundem à scapula amoue bis sedulo cauens, ne tertium ho-
minis thoracem mouentium musculum simul reseces, aut saltem imprudenter suo principio
liberes. Deinde si adhuc^p longus ille musculus, quem contra Galeni sententiam, hyoidi ossi
propriū esset retuli, asseruatus sit, non oscitanter specta, num scapulae, an illius ossis gratia crea-
tus sit. Nunc cultello, quā licebit proximē, ligamenta à summo humero et clauiculis, quā in-
uicem committuntur, resecabis, summum humerum à clauiculis liberans, & peculiarem hu-
ius articuli cartilaginem obseruans; quae illi similis est, quae in maxillae inferioris ad superio-
rem articulo, & clauiculae rursus cum pectoris osse nexu adinuenitur. Deinde accuratē per-
pendes, num tertium aliquod os hic, præter clauiculam, & summum humerum, cum ipsius ap-
pendice, dictaq; nunc cartilagine existat, cuius Hippocratem in Libro de Articulis, de brachij
luxationibus differenter meminisse Galenus docet. Sed quid de illo osse sentiā, Primo libro
sum executus, ubi itaque clauiculam à scapula diremeris, haec in sua sede diligenter seruan-
da uenit. Verū uasis ex thorace in brachium proreptantibus funiculis binis interceptis, &
deinde in funiculorum medio resectis, scapulam à thorace euerteris, ut iam circumuertentis bra-
chij^p musculi naturam inspicias, qui cauam scapulae sedem occupat. Hoc itaque ab osse un-
dique eraso, atque ad articuli ligamentum deducto, & eius functione perpen-
sa, illum quoque abijcies, ut nunc scapula nulli alteri firmata parti, à thorace maximi^p musculi interuētū haerere
uideatur, qui thoracem mouentium secundus, & à scapulae basi enatus, octo superioribus tho-
racis costis manus ritu inferitur, cuiusq; naturam cum reliquis respirationi seruientibus muscu-
lis, tertio ab hoc Capite exequar. In praesentia enim ad capitis musculos est accedendum.

*Primi admi-
nistratio.*

Secundi.

Tertij.

Quarti.

*Clauicula à
scapula libera-
tio.*

DE MUSCULIS CAPVT MOVEN

tibus. Caput XXVIII.

Capitis motus



VPERIORI Libro, primæ secundæq; ceruicis uertebrae constructio-
nem diffusè admodum persequentes, caput proprijs motibus, & secunda-
rijs moueri retulimus. Vt enim elevato brachio cubitus unà attollitur,
ac eques cum equo promouetur, ita quoq; motam ceruicem caput neces-
sariò subsequitur. Ac proinde, quot proprijs motibus ceruix agitur, toti
dem etiam secundarijs caput mouetur, ac ceruix quidem extenditur, seu
in posteriora uersus dorsum ducitur, & in anteriora flectitur, deinde u-

trinque ad latera, ad humeros scilicet etiam inclinatur, ut cunq; aut flexa aut extensa, erecta ue-
sit. Caput autem uno proprio motu, uel quiescente etiam ceruice flectitur, & extenditur, seu in
posteriora anterioraq; fertur, ad latera autè nō, nisi ceruicis beneficio agi potest, quandoquidē
immota rigidaq; ceruice, nemini ad humeros caput inclinare conceditur. Vt quē id parum
rectē in Quarto de Administrandis sectionibus. Libro Galeno uisum fuerit. Ceterum præter
flexionē et extensionē, quas caput mea quidem sententia, repugnantēq; Galeni placito, super
primam ceruicis obit uertebra, alium etiam capiti motum superiori Libro largitum esse pro-
didimus, qui alter proprius capitis motus est, cuius ope in star rotæ quodammodo, ad axem
circunducitur, siue flexum siue extensum cum ceruice, aut citra ceruicem fuerit, atq; hunc ad

Qui musculi
hoc Capite ex-
narrandi.

Porro sumum
A. de Admini-
strandis sectio-
nibus.

secundam uertebra confici, contra Galeni dogmata dictum est. Quamobrem etiā nunc ope
repretium fuerit musculos omnes recensere, qui priuatis capitis motibus famulantur, & dein-
de eos, qui ceruicis ductibus præfunt. Quanquam rursus de ceruicis musculis, in dorsum mo-
uentium musculorum enarratione pertractandum erit, quos quā examussim Galenus de-
scripserit, ex ipsius Libris discas, uelim. Ego enim suis uestigijs, si modò clare uereq; eos descri-
bere debeā, nequaquam perpetuò hæsurus sum, quāuis interim pro uiribus, ut & hinc is Ana-
tomiorum coryphæus intelligatur, ad ipsius seriem me accingam. Primum itaq; sex musculo-
rum coniugationes, seu paria mihi ueniunt explicanda, quæ in posteriori ceruicis sede locata,
partim capitis, partim autem primæ ceruicis uertebrae motibus famulantur. Verum anteaquā
ad horum enarrationem Galenus accessit, duo alia musculorum paria ex dissectionis serie præ-
posuit, scapulae motibus seruientia, quorum^a unum homines cum simijs commune nanciscū-
tur id scilicet, cuius alterius lateris musculus in scapulae spinam, summum humerum, & latius-
culam clauiculæ partem inferi dictus est. Altero autem pari homines destituuntur, cuius in
altero latere musculus ab occipitio enatus, ad altiore basis scapulae angulum in simijs pro-
tendi cōmemoratus est. Atq; hinc fit, ut id, quod nunc primum appellaturus sum, Galeno ter-
tia serie enumeretur.^b Primum itaq; capitis musculorū par duobus, utrinq; scilicet singulis cō-

Primum par
musculorū aut
caput, aut pri-
mam uertebra
mouentium.

stat musculis, originem ducentibus ex apice quintæ thoracis uertebrae spinæ, dein etiam ex
quartæ, tertiæ, & primæ uertebrae thoracis spinarū apicibus. Principium hoc, quā primum
ex quinta thoracis prodit uertebra, acutum refert angulum, qui sursum tensus, sensim ita late-
scit, ut musculus ad tertiā secundāq; thoracis uertebra iam porrectus, adeo amplificetur,
ut externum ipsius latus è regione transuerforum processuum earundem uertebrae confi-
stat. Musculi hanc seruantes latitudinē, sursum feruntur à quinq; inferiorum ceruicis uertebra-
rum spinis (sed nimis quā leuiter) exortum assumentes.^d quando autē ad tertiā ceruicis uer-
tebrae spinam conscenderūt, quū hætenus toto progressu dexter sinistro coniunctus fuerit, u-
trinq; ab inuicē sensim magis magisq; tantisper abscedunt, quousq; transuersa^e linea occipitijs,
ossi carnea lataq; insertione implantentur. Eius enim insertionis tanta est amplitudo, quan-
tum internum alterius musculi latus, à mediā occipitijs sede, & externum latus ab auris radice
remouentur adeo, ut insertionis amplitudo utriusq; musculi tanta sit, quā tum ab una aure ad
alteram occipitijs est interualli, quod musculorū insertionem nō occupatur. Cæterum illius mus-
culorum ab inuicem recessus forma,^f triangularis exactè uisitur, si modò unam lineam trans-
uersim ad occipitium, ab interno unius musculi latere, ad internū latus alterius duxeris, & de-
inde alias duas ab eius lineæ terminis, secundum utriusq; musculi internum latus, ad tertiā cer-
uicis uertebrae spinam, ueluti ad trianguli uerticem porrexeris. Rursus singuli musculi^g trian-
gulari forma constant, si lineam secundum spinæ longitudinem ad occipitium usq; ductam,
unius lateris loco habueris, & secundū lateris uice, lineam secundum externum musculi latus
exporrectam, & tertij lateris loco lineam, quæ transuersim musculi insertionem ad occipitiū
describit. Fibrae horum musculorum, à spinis uertebrae sursum obliquē, quasi ad transuer-
sos superiorum uertebrae processus, tantisper ducuntur, dum simul omnes in occipitium
finiant.

a 9 tab.

b 12 tab.
10, 11 tab.
c 12 tab.

d 12 tab.

e 12 tab.
C.f 12 tab.
E, D.g 12 tab.
A, C, A.
B.

finiant. Præfentes enim musculi, modicam prorsus & exiguam in transuersos uertebra-
processus insertionem moluntur.^h Secundum musculorum par admodum sanè uarium, &
secus multò in homine, quàm canibus & simijs obseruamus. His nanque ex transuersis terciæ
quartæ uel thoracis uertebrae processibus, & insuper secundæ ac primæ quoque thoracis, &
quinque humiliorum ceruicis uertebra-
rum transuersis processibus, musculi istius paris ena-
scuntur, & ad earundem uertebra-
rum spinas procedentes, ipsis nonnullis insertionibus applan-
tantur. Deinde dexter sinistro committitur, & nusquam toto progressu ab illo recedit, simulq;
ambo in occipitij medium ampla insertionem innascuntur, quæ sua latitudine longè superant
uniuersum spacium, quod inter externum musculorum latus, aurisq; radicem metiri possis.
Præterea præfentes musculi prorsus carnei apparent, nullibi nerueum aliquid (quod notatu di-
gnum sit) ostendentes. Attamen obliquas quasdam impressiones expriment, ex transuersis
inferiorum uertebra-
rum processibus, ad superiorum quodammodo spinas excurrentes, at illæ
leuioræ censendæ sunt, neque adeò penetrant, ut his aliqua ex parte musculum diuidi quis dice-
re queat. Quamquam indubiè Galenus nonnullos dissectionū Professores, non duos huius pa-
ris musculos tantum enumerasse, uerùm quosdā quatuor, quosdā uerò sex ibidem recensuisse
uideatur testari. at hi fortassis ex illorū fuisse albo, qui aliter ac Galenus homines aggrediebant.
In simijs enim & canibus (de quibus hactenus in hoc secundo pari locutus sum) unum dunta-
taxat utrinque musculum recenserem, quandoquidem si illis attendendum foret impressioni-
bus, totidem ferè musculorum loco uterq; habendus esset, quot sunt ex transuersis uertebra-
rum processibus exortus, & in earundem spinas insertiones. Ceterum in homine multò aliter
hanc coniugationem, ac Galenus illam descripsit, aut enumerauit potius, obseruaui. Apparent
enim quàm plurimi utrinq; musculi, serie multiplici inuicem commixti, & occipitio implantati,
non tamen eodem modo omnes principium ducunt, & insertionem moluntur. Illico enim atq;
primum musculorum par subdu-
ctum est, ⁱ musculus occurrit, qui acutum principium ex me-
dio transuersorū processuum quintæ & quartæ thoracis uertebrae educit, & ilico ab exortu car-
neus apparens, muris & lacertæ formam adipiscitur, quum uerò sursum ad ceruicis initium
perrepat, carnosus esse definit, ac ueluti in teretis tendinis naturam cessat, ⁱ musculum imita-
tus, qui maxillam humiliorem deorsum trahit, duobusq; uentribus donatur. Quandoquidem
inibi, qua musculus iste secundi paris caput mouentium, ceruicis radicem superat, carnosus
denuo esse incipit, quousque in occipitij ossis medium ⁿ inseratur. Verùm priusquam inseritur,
cum ipso alius coit musculus, ex septimæ ceruicis uertebrae spina, nerueo teretiq; principio ena-
tus, qui sursum ascendens, carnosus quoque euadit, dictoq; musculo ^o ante ipsius in occipitium
insertionem commiscetur, unā cum illo in occipitium implantatus. Atque in hac insertionē
dextri lateris musculi, lateris sinistri musculis cōtigni sunt, neq; ab inuicē (ut primum par) remo-
uentur. ^p Alius deinceps occurrit, qui ueluti alterius lateris tertius esse possit, ac ex apice transuer-
si secundæ thoracis uertebrae, & primæ etiam processus, partim carneus, partim nerueus ena-
scitur, & sursum uersus exteriora oblique exporrectus carnosus uel, ac latior redditus, occipiti-
o ad radicem ^o mamillaris in capite processus, ualidè inseritur. Sub his, ⁱ magna moles carneā
consistit, secundo in canibus pari quodammodo respondens, quæ à transuersis uertebra-
rum processibus, oblique sursum ad spinas exporrecta, occipitij ossi inseritur, fibras obtinens ab ex-
terioribus sursum intrò oblique repentes. Atque eiusmodi secundum musculorum coniugi-
um, in homine non semel in publicis sectionibus ostendi, nunc autem cuius integrū erit, utrin-
que in hoc coniugio quatuor musculos collocare, primum scilicet, secundum & tertium, tres
illos ante carneam molem enarratos, & quartum, ipsam carneam molem. Nisi fortassis quis de
nuo illam carnē in tot musculos subdiuidere proposuisset, quot in ipsa impressiones, aut exor-
tus insertionesq; uisuntur. At consultius fore arbitror, si unicū tantum par ex omnibus his, &
unum duntaxat utrinq; musculum numero statuerimus, quum cætera paria duobus tantum
conformentur musculis, & omnes huius secundi paris musculi eiusdem functionis gratia pro-
creati sint. Hoc enim (ut etiam primum par) capitis & obscure admodum, ceruicis quoque per-
ficit extensionem, aut in posteriorem ductum, quem duntaxat rectum, & in neutram partem incli-
nantem perfici nequaquam ambigo. Si itaque musculi utriusque lateris tendantur, nihil aliud
etiam, quàm caput rectissimè extendent, & si alternatim laborauerint, iam alterius motus opifi-
ces reddentur. non enim extendent, sed circumuersionis capitis motui (quem supra secundam
uertebra-
rum pernici docuimus) famulabūtur. Cæterū hæc accuratius intelliges, ubi uniuersum
de capitis musculis sermonem audieris, & hæc nostra cum Galeni scriptis, adhibita sectione
perpenderis. ^q Tertium par duobus gracilibus constat musculis, neutiquam cum prædictis
mole correspondentibus. Ex secundæ enim ceruicis uertebrae spinæ extremo, duo enascun-
tur

Secundū par
impenje uari-
um.

Primi ac se-
cundi parium
mutus.

Tertium par

tur musculi non admodum neruei, qui sursum porrecti, in occipitij medium teretes inferuntur, in ipsa infertione minus, quam in ortu inuicem contigui, ab ipso enim nonnihil oblique sursum ducuntur, sensim mutuo abscedentes. Hi si simul tendantur, caput quoque solum in posteriora agunt, at si alter tantum in se colligatur, ductus ratione, circumuersionis capitis (ut duo priora paria) opifex erit. ^k Quartum par capitis etiam extensioni praefectum, sub tertio occu-

Quartum par.

Quintum par.

Sextum par.

litur, illi quod ad substantiam, formam, ductumque attinet, simile. A posteriori enim primae uertebrae sede, ubi aliae in spinam desinunt, ipsa quoque linea modo prominens tuberculum processum uer-
exigit, utrinque ad processum eius latera unus nascitur musculus gracilis, & omnino carnis. Ambo quarti paris musculi in exortu contigui sunt, at sursum porrecti, modiceque ab inuicem re-
moti, occipitio inferuntur. Porro ^m quintum par, musculorum forma & substantia, duobus
praedictis paribus respondens, iuxta externum latus tertij paris, ab occipitij osse principium
obtinere, atque illinc deorsum oblique descendens, in apicem ⁿ transuersi primae cervicis uerte-
brae processum inferitur, dexter quidem musculus in dextrum processum, sinister uero in fini-
strum. ^o Sextum par a spina secundae cervicis uertebrae nascitur, & oblique sursum proce-
dens, in transuersum quoque primae cervicis uertebrae processum implantatur, pari prorsus
cum quinto coniugio ratione formaque. Sunt enim utriusque paris musculi oblongi, carni, &
paulo minus toto teretes. In cane uero & simijs multo, quam in hominibus crassiores & infi-
gniores, ut etiam horum animalium secundae cervicis uertebrae spina perquam ampla lataque ui-
deatur, at in illis aequae ac in hominibus tertium par cum quinto & sexto, pares aequalesque trian-
gulos utrinque formare conspiciuntur. Si enim trium illorum parium dextros musculos unam con-
tuleris, in dextro latere ^q triangulum statues, si uero sinistri lateris musculos inuicem compara-
ueris, etiam & hic triangulum fieri obseruabis, cuius unus angulus consistit in occipitij medio,
secundus ad secundae uertebrae spinam, tertius in sinistri lateris transuerso primae uertebrae pro-
cessu. Caeterum quinti & sexti parium munus est, primam uertebrae unam cum capite supra
secundam circumuertere. Vtriusque enim paris dextris musculis ad suum principium contra-
ctis, prima uertebra in posteriora sinistrorsum circumuertitur, sinistris autem laborantibus, in
posteriora dextrorsum motus perficitur. Atque ad hunc modum posteriores capitis musculi,
qui numero duodecim erunt (nisi in plures duobus musculis secundum par diuisis) habent,

*Musculi a
pectoris osse
et clauiculis in
caput inferri,
atque in huius
capitis numer
7013, C. 14.*

*Munus 13 et
14. musculo-
rum.*

*Musculi sub
stomacho lati-
tantes, & cer-
uicis flexioni
praefecti.*

anteriores uero hac ratione. ^r Vtrinque a media superiori ossis pectoris regione, secundum
ipsius amplitudinem, & clauiculae parte pectoris ossi ibidem coarticulata, amplum & neruo-
sum, membraneumque musculi prodit caput, neruosius ex pectoris osse, quam a clauicula pro-
natum. Caput hoc unicum, quod ad continuitatem attinet, uisitur, ac oblique uersus superiora
procedens, carnosum densumque, & paulo latius quam profundius efficitur musculus, qui
carnoso crassoque admodum ^s sine, mamillari in temporis osse processui innascitur, illum sua
amplitudine uniuersum amplexus, sicane, ut & unicus duntaxat utrobique in hominibus mi-
hi perceptus sit musculus, citra etiam sectionem (quod ualidus, ac proxime ^t membraneo latoque
in collo musculo subditus sit) conspicuus. Caeterum in quibusdam quadrupedibus, muscu-
lum ad superiora procurrentem, in medio ductu diuisum obseruauimus, cuius una pars mamilla-
ri processui, altera ad auris radicem caluariae inferebatur. Tres autem fines hactenus in nullo
comperi animante, multoque minus principium a pectoris osse & clauicula procedens, in duas
tres uel partes manifeste dissectum. Quauis interim hos musculos utrinque ab aliquibus Ana-
tomicis tres, aliquando & duos enumeratos fuisse non ignorem, uerum hic numerus pro musculi
finium ratione, in simijs & canibus inter dissectionis peritos uariatur, licet plerique hos a capite
natos, pectoris ossi & clauiculis inferri, thoracisque motibus praefici contendunt. at apud nemi-
nem interim lego, qui mentione digna descriptione eos donauerit, tantum abest, ut uere ipsorum
functionem naturamque nobis expresserit. Vtriusque enim lateris musculus contrarij prorsus mu-
niji praeficitur, quatuor primorum parium, quae in cervicis posteriori sede locata recensuimus,
ambobus enim tensis contractisque, caput in anteriora, siue rigida siue inclinata ceruice flecti-
tur. Si uero dexter duntaxat contrahatur, caput in anteriora sinistrorsum circumuertitur, fini-
stro autem solo laborante, caput in anteriora dextrorsum circumagitur. Neque quicquam aequae
examussum posteriorum capitis motibus famulantium musculorum functionem ostensurum
est, atque duo hi priores, quorum officium iam admonitus promptissime capis. Quando qui-
dem si funiculum transuersum occipitio circumduxeris, cuius fines utrinque supra aures deorsum
ad pectus porrigantur, ac postmodum utrinque finem unum traxeris, caput in anteriora flectetur, si
autem alternatim fines uellentur, in gyrum caput mouebitur. Sint itaque hi nostrorum capitis mo-
tibus subseruientium musculorum, decimus tertius & decimus quartus. Verum praeter hos, alij
conspiciuntur musculi, quos ferè sub ^u stomacho latitantes Veteres appellasse uidentur, hi namque
quatuor

k 14. l. d. F. 2.

l 3, 4, 11. f. i. cap. 15. l. 2. X.

m 14. l. d. H. 2.

n 14. l. d. D.

o 14. l. d. K. 2.

p ab E. ad D. 14. l. d.

q huius com-
p. in 14. tab. sunt A, B, K, alteri-
us autem tri-
anguli co-
p. in 14. l. d.

r alterius la-
teris muscu-
lus. A. l. d. 3. l. d. F. 2. l. d. K. 2. l. d. D. 2. l. d. X. 2. l. d. Y. 2. l. d. Z. 2. l. d. 3. f. i. cap. 6. l. 1. 2. h. y 3. l. d. 2.

4 8. l. d. A. B. 2. l. d. 7. tab. B. aut 14. f. i. 5. A. B.

quatuor primarum thoracis uer-tebrarū & omnium ceruicis corporibus connascuntur, ac par-tim ab iisdem principium ducunt, partimq; ipsis inferuntur, non nimis liquidò postmodum in occipitis os inserti, iuxta¹ anteriorem foraminis dorsalem medullam transmittentis sedem. At hos exactius inter dorsum mouentes musculos recensēbimus, flectunt enim superiorem dor-si partem, capite interim proprio motu horum ope uix flexo. Quamobrem etiam inter capitis musculos uix ueniunt enumerandi, quemadmodum neque² ali; adhuc quatuor (utrinque ni-mirum duæ) coniugationes ad ceruicis latera repositi, qui ceruicem ad latera, non autem ca-pul proprio motu agunt. Et rursum³ alia coniugatio ceruicē extendens hīc prætereunda est, ac ad reliquū de dorsum mouētib; musculis sermonem asseruanda, quum illæ nisi secundariò ca-pul moueāt, ea nimirum ratione, qua brachium mouentes musculi, cubitum & extremam ma-num mouent.

CAPVT MOVENTIUM MUSCULORVM

administratio. Caput XXIX.



ORVM qui capitis motibus præfunt, musculorum administrationem, resupinato cadauere, aut ad eum, quem prius dixi, modum suspenso, à primo pari auspicaberis, primum perpen-dens membraneum⁴ cuius-dam musculi principium, quod ex inferiorum ceruicis uer-tebrarum spi-nis enatum, primo capitis musculorū pari, reliquisq; hīc dorsum mouen-tibus musculis insertitur, ac tandem aliquot superioribus thoracis cos-tis insertum, respirationis opifex efficitur. Licebit itaque huius musculi (qui hominis thoracem mouentium tertius erit) principium, à uer-tebrarum spinis cultello li-berare, & musculo ad insertionem usq; à subditis diuulso, illum ibidem à costis appensum tan-tisper sinere, dum thoracis musculos aggressurus sis. In præsentia enim cultellum retusiorē, aut baxeū, sub externo primi paris musculi latere subijcies, & illum à subditis liberare conaberis, deinde secundum spinæ longitudinem ducta sectione, ipsum ad insertionem usque in occiput duces, quod ubi in utroq; latere præsteris, huius paris musculos ab occipitio nō amputatos, ita ad latera aliquot reflectes, ut reliquam sectionem non impedian. Mox uarios⁵ secundi paris musculos considerabis, ea illos serie, qua enumerauī, à uer-tebris absecans, atque ad occipitium deducēs, ut modò illorum tractus principijs, quarum functionū potissimum autores sint, rectē perspicias, quod tunc demum optimē uisitur, quum cerebrum ex caluaria ademptum est, ipsaq; inferiorior maxilla absecta. Tertium par à spina secundæ ceruicis uer-tebræ postmodum libe-rabis, sensim illud ad occipitium usque, à quarto pari subleuans, præcauensq; ne & id unā im-prudens auferas. hoc enim nunc à prima uer-tebra sepārandum uenis, atq; ut cætera, ad suam, quam molitur, insertionem ducendum. Quintum in super par, ab occipitio liberatū ad trans-uersos primæ uer-tebræ processūs, quemadmodum sextum à spina secundæ uer-tebræ ad eos-dem processūs ducetur. Mox reflexo cadauere à pectoris ossē & clauiculis, anteriorum mu-sculorum principia sunt acuto cultello resecāda, mente interim adhibita, num plura musculorū principia simul cōcurrant, aut utrinq; plures musculi obseruari queant. Vbi uerò & hos ad ma-illarem processum perduxeris, illorumq; insertionē rimatus fueris, cosdem à capite absecato atq; ceruicis proprijs musculis in præsentia relictis, ad ligamēta capiti & duarum primarū cer-uicis uer-tebrarum peculiaria, sectionē confer, quibus nunc priuatim Caput dedicabimus.

Primi paris
administratio.

Secundi pa-
ris.

Terrij.

Quartj.

Quintj.

Sextj.
Decimterij
& 14. muscu-
lorum.

DE CAPITIS ET PRIMÆ SECUN-

daq; ceruicis uer-tebrarum ligamentis. Caput XXX.

PRÆSENS figura, primam secundamq; cer-uicis exprimit uer-tebras, posteriori sede delineatas, unā cum earundem ligamentis hoc Capite describendis. Characteres autem figuræ inscripti ita habent.

A, B, C Prima ceruicis uer-tebra secūde cōnexa. Verūm A pri-uatim dexter primæ uer-tebræ sinus, qui dextrum occipitis ossis caput suscipit, indicatur. B autem sinister sinus, cui sinistrum oc-cipitis ossis caput insidet. C uerò prima uer-tebræ sedes, ubi in spinam alie terminantur. D, D, G, H Secunda ceruicis uer-tebra.

E, E Ligamentum membraneum, primam ceruicis uer-tebram secundæ uer-tebræ necens.



G Corpus secundæ uerthebræ dentem producens.

H Dens, acutus uel secundæ cervicis uerthebræ processus.

I Teres ligamentum, à dente in occipitij os insertum.

K Transuersum ligamentū, dentem in sinu cōtinens, qui dentis gratia in prima uerthebra calatur.



Ligamentum
primæ uer-
thebræ capiti
m tens.

Secundæ uer-
thebræ capiti.

Ligamentum
transuersum
denti obductū.

Primam uer-
thebram secun-
dæ colligans.

Ligamentum
transuersum
ad mini-
stratio.

VLLA non admiratione dignam capitis cum prima uerthebra articula-
tionem, & secundæ cum prima, secundæq; rursus cum capite coniunctio-
nem esse, superioris Libri decimumquintū Caput explicauit. Præfens au-
tem sermo, ligamenta his articulis præfecta obiter perstringet, hæc namq;
spectatori Naturæ industriam, quantumuis etiam perfunctorie enarrentur,
abundè commonstrant. Quando itaque primam cervicis uerthebram
capiti copulari necessum fuit, meritò uniuersum articulum ambiens^a liga-
mentum (quod & cæteris articulis cōmune censetur) forte robustumq; Natura procreauit, ra-
rum tamen nihil, aut peculiare, præter robur crassitiemq; id ligamentum adipiscitur. Cæterum
quod secundam cervicis uerthebram capitis ossi cōmittit, teres & ualidissimum est, & cartilagi-
nis naturæ participat, hoc ex uertice^c dentis enatum, occipitis ossi inseritur, quā anteriorem
foraminis regionem, quo dorsalis medulla delabitur, constituit. Id ligamentū firmissimè secun-
dam uerthebram occipitis ossi colligans, unā cum dente ueluti axem efformat, secundū quam
caput, primæ uerthebræ interuentu in gyrum agitur. Verū ne dens ille^e internam primæ uer-
thebræ sedem occupans, & dorsali medullæ ibidem prælocatus, quandoq; ex suo sinu in uehe-
mentioribus capitis motibus deuiet, luxetur uel, atq; tunc dorsali medullā comprimat, aut fran-
gat, aliud ligamentū rerum Opifex procreauit, quod ex uno latere interioris regionis primæ
uerthebræ prodicens, alteri lateri inseritur, posteriori dentis sedi transuersim obductum, Præfens
ligamentum, quia egregiè robustum neruosumq; existit, cartilaginisq; naturæ compos, ac de-
mum inter dentem dorsalemq; medullam locatum est, apūssimè dentem in sibi priuatim excul-
pta concauitate, ne uacillet, luxetur uel, continet, dorsaliq; medullæ firmissimū & tutum propu-
gnaculum efficitur, & interim quo minus prima uerthebra simul cum capite super secundam cir-
cumuertatur, haud quaquam prohibet. Atq; id ligamentum est, quod superiori Libro manife-
stissimè demonstrare dicebam, caput super secundā uerthebrā, ad anteriora posteriora uel neuti-
quam moueri posse. Reliquū est^f aliud ligamentum, primam uerthebram secundæ colligans,
membraneum quidem, & eiusdem cum ambientibus cæteris articulos ligamenti naturæ & u-
sus. Constat enim non solum primam uerthebrā capitis ossi debuissè articulari, sed etiam pri-
mam secundæ. Si enim unā hæc uerthebræ capitū ossi adnascerentur, prohiberent sanè motus
mutuos. ea namq; quæ quiescit, uelleret, & detineret agentē, nunc autem uicissim utraq; potest
suo motu agi, alia interim sua sede firmata. Vt autem hæc ligamenta examussim administres,
conduxerit musculos cervicem mouentes, suo loco describendos, prius esse dissectos, ac tunc
demum acuto cultello membraneū ligamentum, primam uerthebram capiti colligans, opportu-
nè diuidetur, & capite ad anteriora inflexo, dorsalem medullam quoq; per transuersum abscer-
bis, ut teres ligamentum dentem capiti colligans, in conspectum ueniat. Quod ubi intuitus fue-
ris, transuerso quoq; ictu id diuides, atq; ligamentū illud transuersim denti obuolutū, dentemq;
in sua cavitāte cōtinens, diligēter obseruabis, & mota omni ex parte prima uerthebra, qui motus
supra secundā & primā complentur, discēs. Postremò membraneū ligamētum, primam uerte-
bram secundæ copulās, in circuitu quoq; acuto cultello aggredieris, & auulsa prima uerthebra,
denuò dentis sinum, & ligamentum dentem complectens, & quod ex ipsius uertice procedit,
considerabis. Cætera autem ligamenta reliquas uerthebras colligantia, in id Caput commodè
reiciantur, quod dorsum mouentium musculorum administrationem subsequetur.

DE MUSCULIS ABDOMINIS. CA. XXXI.



VEREOR, ne & hic pariter morosior quispiam disciplinæ ordinem forte
culpaturus sit, quòd ante abdominis musculos, aut manus, aut thoracis,
aut dorsi motores non fuerim aggressus. Nihil enim prohibet, cubitum
mouentes musculos modò pertractare. Sed quum hos, uicinitatis ratione
dorsum agentes musculi præcedāt, & ante dorsi musculos, quòd ad sectio-
nis seriem attinet, thoracem mouentes, & ante hos thoracis musculos, eos
quos abdominis uocamus, dissecari operæpretium sit, proximum est, hos
abdominis persequi. Quanquam (ut & antea admonui) integrū ciuuis fuerit, paginas aliquot
inuertere,

inuertere, & Caput, quod ordine prius esse arbitrabitur, reliquis lectione præponere. Musculi itaque, quos abdominis, Anatomes professores nuncupant, ab omnibus octo (utrinque nimirum quatuor) constituuntur, quatuor quidem obliqui, duo recti, & totidem transuersi. Obliqui in utroque latere bini sunt, qui inuicem incumbunt, & contrarias seque mutuo decussatim intersecantes fibras exigunt. ^a Superioris enim fibræ, deorsum uersus priora obliquè procedunt, quem huius fibrarum ductus gratia descendente uulgo dicimus. ^b Inferioris uerò fibræ, sursum obliquè ad anteriora tendunt, qui ob id obliquè ascendens nuncupatur. Rectorum ab utroque latere ^c unicus est, qui quum fibras secundum corporis longitudinem extensas obtineat, rectus nuncupatur. ^d Transuersus similiter utrinque unus habetur, cui id nomen, quòd eius fibræ secundum corporis latitudinem, aut à dextris ad sinistra nullo obliquo ductu ferantur, inditum est. ^e Obliquè descendēs cæteris abdominis musculis supersteruntur, & ex sexta, septima, octaua & nona, costis, priusquam in cartilagine siniant, carnosum principium sumit propter muscolum, quem ex scapulae basi pronatū, octo elatioribus thoracis costis inferi, thoracemque mouere dicemus, neque hoc amplum principium instar rectæ sit lineæ, uerū instar manus. Ille enim thoracis musculus, costis quasi digitos singulis porrigendo inseritur, ex quorum interuallis prominentiores obliquè descendentes musculi partes, digitorum ritu enascuntur non secus, quàm si sinistrae manus interuallis, dextræ manus digitos infereres, & muscolum thoracis motibus famulantem, sinistrae manui conferres, dextræ uerò obliquè descendente assimilares. Deinde post nonam costam, à tribus etiam inferioribus costis iste musculus enascitur, illam semper originem imitatus, quam ad magni thoracis musculi interualla adipiscitur, non quidem amplius cum illo thoracis musculo ingressu mutuo commissus, uerū cum ^f alio quodam, qui ab inferiorum thoracis uertebrae, & unius alteriusque lumborum spinis enatus, decimæ & undecimæ thoracis costæ potissimum inseri, in thoracis musculorum enarratione dicitur. Is enim manus quoque ritu costis, priusquam in cartilagine cessare incipiunt, implantatur, atque obliquè descendentes musculi principium, manus quoque modo ex eius musculi interuallis, ab ipsis costis alternatim procedit. atque hoc obliqui musculi principium, undique carnosum quidem est, sed tenue. Verū musculus sensim carnosior crassiorque euadens, deorsum in priora fertur, illa (quæ quasi inania inter ilium os & infimam costam, ^g *νεφρανός, & λαιόνος* Græci uocant) carnosam ipsius parte amplectens, quousque ad ilium os perreperit, cuius ^h summitati secundum totum ipsius appendicis ductum, carneus inseritur. Est autem appendix illa, toti ossi ilium parti obducta, quam ipsius spinam propriè uocari relatum est. Quum uerò carnosam ipsius pars, ex ilium regionibus, ad anteriora mediaque, secundum abdominis longitudinem properat, in neruosa exilitate membranæ quàm simillimam degenerat, quæ sextæ & septimæ costarum cartilaginibus, & pectoris ossis mucroni, & rectis musculis expanditur, firmissimèque superioris ossis coxendicis, & pubis regioni implantatur, tota illa nimirum sede, quæ ab ilium ossis appendice, seu spinæ antica parte, ad pubis usque ossium ⁱ cartilagine protenditur, non quod illo ductu ab ilium osse, ad pubis ossium usque commissuram ossi inferatur, sed duntaxat, ubi os ex carne reperit. Quæ enim ^j duo femur flectentes musculi, super coxendicis & pubis os deorsum prorepunt, obliquus hic musculus ossi non implantatur, sunt uerò illi musculi, femur mouentium sextus & septimus. ^k Secundum autem corporis longitudinem, in abdominis medio dexter musculus, cum membranea tenuitate sinistra ita sanè coit, ut simul utrique descendentes ueluti tunicam quandam, uniuerso abdomini obductam efforment. ^l Obliquus huic substratus, ex superiori ossis ilium regione, quam ipsius spinam circumscribere diximus, enascitur, ac simul tenuem membranæque originem, à lumborum uertebrae & ossis sacri spinis assumit, quæ in musculi progressu, carnosæ fibræ tandem adaugetur, enutritur ue. Musculus iste sursum tendens, illa carnosæ sui parte integit, & quatuor inferiorum costarum, quas spurias uocant, sinibus carnosus & hic quoque inseritur. Vbi autem abdominis priora & medium conscendit, in neruosam definit exilitatem, quæ inter rectum muscolum, qui ipsi subijcitur, & dictum obliqui descendentes musculi tendine sic unitur, ut ex utriusque lateris musculi, simul toti quoque abdomini tegumentum quodammodo efficiatur. Membranei horum musculorum tendines, eundem cum reliqua musculorum parte fibrarum ductum exigunt. Descendentium enim fibræ omnes, deorsum obliquè ad anteriora propagantur, ascendentiū uerò, sursum in priora perrepant, atque duorum musculorum mutuo incumbentiū fibræ decussatim, seu instar *x* literæ se inuicem intersecant. Cæterum ea sede, qua ascendentes descendentesque tendines, super abdominis mediū inuicem insternuntur, utriusque firmissimè simul tanta

Octo abdominis musculorum breuis enumeratio.

Obliquè descendens.

Obliquè ascendens.

amplitudine connati occurrunt, quanta media recti musculi existit latitudo, atq; id adeo ualide secundum abdominis longitudinem perficitur, ut hic in abdominis medio, quatuor obliquorum musculorum tendines, unum producere quis arbitraretur, nisi duos uirg; haberi, accuratissima sectio, fibrarumq; ductus cōmonstrarent. Vbi dextri sinistres cōnascuntur, uniunturq; nulla prorsus separationis neq; coitus lineā exprimūt, sed paulo crassiores redditi, in abdominis medio, recta linea sese inter rectos musculos^m ubi illi inuicē distant, imprimētes, robustissime transuerforū musculorū nervosis tenuitatibus, ipsiq; adeo peritonæoⁿ cōnascuntur.^o Quod etiam obliquorū ascendētiū nervosis tenuitatibus usu uenit, secundū externā rectorū musculorū latera, priusquā illos cōscendunt, per abdominis enim longitudinem, instar lineæ infertionem ualidam moliantur, in nervosas transuerforū tenuitates, & etiam ad quasdā rectorū musculorū^p impressiōnes, quas paulo posteriūs exequar. Sub obliquorū itaq; nervosis

Recti.

tenuitatibus, recti abdominis musculi reconduntur, singuli ex media ossis pubis regione,ⁱ duplici quodāmodo principio ducentes originē, uno quidē superiori interioreq; altero inferiori ac exteriori, non quod hæc principia, singulis musculis disuncta incōtinuā ue sint, sed ipsa musculi origo, diuersam substantiā ad hunc modum exprimit. Superior principij pars introrsum nonnihil uergēs, exactē carnea est, ac ex lato in angustū desinens, priusquam ad mediā lūminis regionem pertingat, quasi in acutum angulum terminatur. Inferius uerō, quod & extrorsum paulo magis prominet, neruofum est, carnis omnino expers, uerū sursum porrectum sensim dilatescit, totumq; rectum musculū producere conspiciunt. Recti itaq; musculi, duobus eiusmodi principijs singuli ex pubis osse nati,ⁱ inuicem contigui sunt, rectā sursum porrecti, donec ad umbilicum peruenerint, ibidem enim nonnihil mutuō distātes, modicēq; ampliores facti, ad pectus usq; feruntur, cui supra mucronatam cartilaginē, ad ossis pectoris latera, illiq; cōnexas cartilagines, lati carnosiq;^u implantātur. Musculi hi non uno fibrarū ductū, secundum totam longitudinem ferri uidētur, sed singuli in abdominis regione diuersā^u delineamēta, seu inscriptiōnes (quas Græcis *σπριγγραφές* appellari diximus) transuersim, & incurua albaq; lineā, ipsis indictas exprimunt, nō aliter sanē, quā si rectorum singuli plurium musculorū numero essent habendi. Non enim rectā ab osse pubis, ad pectus fibræ nūquam inclinātes ferūtur, sed ad nunc dictas circumscriptiones impressiōnes^u ue nonnihil implicatē obliquātur, atq; ex alijs aliæ produci quodāmodo apparēt. Deinde musculis rectis, nō propter pubis os nerui duntaxat inferruntur, sed interiori quoq; ex parte, ubi his impressiōnibus musculi donātur. Istarū impressiōnum duæ plurimū supra umbilicū consistūt, & interdū una sub umbilico in lūmine, aliquando etiam tres supra umbilicū. Neq; has Naturam musculis frustra largitam arbitror, uerū ut commodiūs rectā sursum in priora nonnihil declinantes porrigerētur, & nō instar duorum palorum erecti, sed secundum orbicularem abdominis regionē obliquati, peritonæum appositē

Recti musculi pars, quæ si mie abundant.

premerēt, eoq; quod narraturi sumus, munere opportuniūs fungerētur. Porro quū thoracem mouentes exequemur musculos,^u unum in simijs & canibus enumerabimus, qui inter ipsos ordine quintus futurus est. Hunc uerū costarū cartilaginibus, ad pectoris ossis latus exportectum, docebimus totum membranē, præterq; ad primæ secundæq; costæ interuallum, ubi carnosior redditus, in primam costam definit. Professio musculus hic in omnibus animalibus, in quibus sectione deprehenditur, mihi quantūuis accuratē secanti, pars recti abdominis musculi esse uidetur, & rectum musculū ad primam usq; thoracis costam in illis animalibus ascendere prorsus assero. Quod in canibus caudatisq; simijs maxime euadit conspicuum, nec quisquam inficias ire potest, illis unum musculum à pubis osse, ad primā usq; costam exporrigi. In hominibus (ut uerum fatear) eundem musculū nunquam obseruaui, atq; illo homines quū breuissimo donentur pectore, facile carent, quapropter etiam in hac mea hominis fabricæ descriptione, neutiquam recti partem, aut ipsi cōiunctum esse affirmo. Omnibus modō commemoratis mus-

Transuersi.

culis sub sunt^a transuersi, utriusq; unus, qui ex transuersis lumborum uertebrarū processibus, tenui membraneoq; principio enascitur, deinde in progressu ex dorsum mouentibus emergēs musculis, & carnosus adauctus fibris, superiori ilium ossis regioni, & spuriarum costarū finibus exactē carneus cōnascitur, carnosā ipsius parte uniuersa inuestiens ilia. Vbi uerō uersus abdominis medium,^b ad exteriora rectorum musculorum latera usque prorepit, in neruofam exilitatem finit, quæ pubis ossi, & mucronatæ cartilagini implantatur. Per reliquam inter hæc extrema longitudinem, iste membranofus tendo, neruofæ exilitati alterius transuersi musculi continuatur, ac simul ambo tunicæ instar uniuersum abdomen circūcingunt, in hoc obliquos musculos imitati. Verū horum musculorū neruofa tenuitas non æque, atque obliquorum lata est, transuersi enim nonnihil sub rectis musculis, & potissimum iuxta pectoris regionem, carni conspicuntur. Præsentibus musculis^c peritonæum subnascitur, membrana nutritioni famu-

m s tab. a q
sursum.
n 6 tab. c.
o s tab. x.
6 tab. b

p s tab. u.
u. u.
q s tab. a. d.
t. a. n. 6 tab. f.
r s tab. n. no-
tatur super
rius, o infu-
rius.

s s tab. p. ad
q.
t s tab. a. q
sursum.
u s tab. r. d.
tab. n.
x s tab. u. u.
u.

y s tab. ab. h
per s ab. h.

a 6 tab. a. s
t. a. y. 22 tab.
p.

b 6 tab. b.

c prima. si
s lib.

famulantibus organis circumposita, huic membranae transuersi adeo conuascuntur, ut arduum sit, illos ab hac in homine illaceros liberare. Carnosae tamen musculorum partes, uix aliter peritonaeo committuntur, quam mutuo incumbentes musculi, inuicem haerere solent. Transuersi enim musculi propria musculorum membrana illic, quae peritonaeo obducuntur, neuiquam (& si plerique secus arbitrentur) destituti secantibus occurrunt. Neque unquam alius musculorum abdominis, quam nunc enarrauimus, situs uisitur. Vti forsitan aliquis librorum duntaxat operam agens, prompte colligeret, pugnantibus nimirum Galeni locis delusus. Quandoquidem hos aliter recenseret in Libris de Affectu locorum cognitione, rursus aliter in Libris de Partium usu, & aliter prorsus in Libris de Administrandis sectionibus, ubi eos ita enumerat, ut in Sexto libro curatiuae methodi ipsorum situm recte describit. Octo abdominis musculi, praeter communem omnium musculorum usum, quo corpori calefaciendo, refrigerando auxiliatur, & propugnacula quaedam censentur, primario usu thoracis motibus praesunt, ut in proprio de thoracis mouentium musculorum Capite dicturi sumus prolixius. Deinde homini ad durorum recrementorum expulsionem aptissime subseruiunt, quando enim omnes simul tensi laborant, septo transuerso interim ex spiritus retentione depresso, ita intestina simul comprimunt, ut ex angusto loco in ampliore (qui inferior est) feces protrudant, expellantque, & rursus ad uentriculum superiora uel illos deferri, praecaveant nihilo secus, quam si duabus ad brachiale tantum iunctis manibus, & semper magis magisque sensim ad extremam usque digitorum aciem distantibus, madentem spongiam imponeres, & manibus paulatim coeuntibus, aquam exprimere nitereris. Verum hoc musculorum abdominis munus, nisi cognita septi transuersi functione situmque, aperte percipi nequit. Pari etiam ratione, quo pacto parientibus abdominis musculi (ut commodius fetus propellatur) conferant, non apte cognoscitur. Atque haec adhuc minus ab illis assequitur, qui septum transuersum, dum contrahitur, thoracemque aperit, deorsum pelli arbitrantur, non animaduertentes, quum aerem intro ducimus, ac thoracem continuo, citra spiritus retentionem, thoracisque repleti compressione distendimus, septum transuersum nullum impetum in excretionem moliri, quod scilicet perpetuo sursum tractum non deprimatur, quemadmodum id in firma sede, retento spiritu, & ui interim compresso thorace, permanet. Ceterum nostri seculi medicos, qui hos tantum musculos recenserent ita uidentur, ac si alij in corpore nulli essent, omnino delirare existimandum est, qui rectis musculis cibum in uentrem attrahi, transuersis autem expelli, & obliquis retineri coterunt, praesentibus musculis attribuentes, quod uere uentriculi intestinorumque fibris ascribendum fuerat. Sed haec absurdiora sunt, quam quae in medium adduci debeant, quum aliae fibrae uoluntario motui, aliae uero naturali, quia a nostro non pendet impetu, famulentur. Neuiquam sane haec ab ipsis confingenda uenerunt, at laudandus erat rerum Opifex, qui quum abdomen osse destitutum necessario creari uoluit, tam astringas tunicas, inuolucraque ipsi parauit, quae praeter quod tegumenta, & aptissima receptacula sunt, thoracis quoque motibus, uti monuimus, utilissime subministrant.

Abdominis musculorum usus.

ABDOMINIS MUSCULORVM ADMINISTRATIONE. Caput XXXII.



ADMINISTRATIONEM hanc, aut a musculorum capitibus, aut tunc terminis aggredi nihil prohibet. Verum facilius est, musculorumque naturam accuratius commonstrat, quae ab exortibus auspicatur. Qualitercunque igitur sectionem exordiri proposueris, cutem unam cum carnosa membrana, ab uniuerso abdomine, & lumborum regionibus, ad femora usque liberatum esse oportet, unam cum musculo, quem brachium deorsum trahere ostendimus, quanquam is iam pridem ex sectionis ferie, simul cum cute ac membrana, in brachium mouentium musculorum sectione ablatus sit. His ademptis, & perquam tenui fibrosa membrana musculis, praeter carneam, obducta, unguibus hinc inde leuiter (ut ipsius naturam discas) diuisa, priorem sectionem in hunc modum aggredieris. Cadauer ad alterum latus inuolucrum est, ut commodum & lumborum uertebis, & abdominis medio manus adhibeas. Deinde a dextra costa niteris musculi abdominis oblique descendens principium, paruo cultello, aut exigua nouacula liberare, leui sectione ducta secundum reliquas costas uersus dorsum, & secundum superiorem illum ossis regionem, ad pubis ossis usque medium. hanc sectionem adeo ducis leuiter, ut nihil praeter praesentem musculum uulneres. Mox ab his ossium regionibus eleuato musculi principio, conaberis paulatim ab oblique ascendente, descendente eoque liberare, dum ad abdominis usque medium illum perduxeris, praecauens ne unam tanquam oblique descendens musculi partem auferas, tenuem musculum, qui ad decimam undecimamque thoracis costam, cum obliquo muscu interuallis committitur. Si enim

Duplicem esse horum musculorum administrationem.

Administratio a musculorum exortibus. Oblique descendens.

hunc scopolum uitaueris, & in uiris quoque abstineris à tunica uasa seminaria inuolvente, musciculum uersus medium abdominis promptissimè duces. Ceterum ubi ad mediam usque recti musculi amplitudinem peruenit erit, pertinaciùs cum ascendenti musculi tendine, obliqui descendenti tendo coire uidebitur, quem ut integrum, & non uulneratum lacerum ue ad lineam (quæ in abdominis medio ambientibus merito, quod illi nulla subit caro, candidior apparet) disseces, impossibile arbitror, ut cunque acuta nouacula usus fueris, nam retusiori nihil prorsus promouebis. Quamobrem reflexo pendenteq; à media recti musculi amplitudine primo abdominis musculo, ascendente, qui secundus est, similiter aggredieris, ducta nimirum à pubis osse, per superiorem illum ossis regionem, & lumborum uertebras, & fines quatuor inferiorum costarum sectione, quæ ab his omnibus musculo separare possit, & ab illo etiam respirationis musculo abstineat, qui decimæ & undecimæ costæ potissimum inferitur. Post sectionem, musculi huius principia hamulo aut unguibus attolles, & à transuerso, cui insidet, in priora procedens liberabis. Quod usq; ad exteriorem costam, latus ue recti musculi eius lateris, cuius sectionem administras, mediocri negotio perfeceris, si modò in uiris uasorum seminalium tunicis (quæ ad testium musculorum sectionem seruandæ sunt) animum adhibeas, ne unâ etiam illæ præcendantur. Vbi uerò recti musculi latus externum membranofus oblique ascendenti musculi tendo spectat, acutiori nouacula separandus est, neque id quidem oscitanter, ne totum obliqui musculi tendinè pertundas, ipsumq; hîc finire arbitreris. Tantus enim huius tendinis cum transuersi musculi neruosa exilitate iuxta externum recti musculi latus, occurrit nexus, ut aliquando obliqui ascendenti tendinè diuidi putauerim, & unam ipsius partem transuerso musculo conatam, sub rectis musculis procedere, alterâ uerò super rectos expandi arbitratus fuërim, atque id potissimum supra umbilici regionè est cõspectius. Verum si ad amussim oblique ascendenti tendinem à transuerso liberaueris, recto musculo illum supersterni cõperies, à quo ad albam usq; abdominis lineam accuratè separandus uenit, quod in carnosus recti musculi partibus factu est promptissimû, at in nerueis illis recti musculi inscriptionibus arduum esse obseruabis. Obliquorum enim tendo pertinaciùs in his recto musculo, quàm in reliquis sedibus, ubi carnosus est, conascitur, neq; adeò promptè ab illis examussim discindit, aut potius eradit. Hic modò doceberis, quâ ascendenti descendentiq; tendines, circa abdominis mediû inuicem conascantur, ubi recti musculi mediæ amplitudini (quæ interior est) in cumbunt, & arduè, nec nisi maxima industria, & acutiori nouacula, ad albam usq; abdominis lineam separari queunt. Ceterû posteaquàm unius lateris, cuius iam sectionè aggredieris, obliquos abdominis musculos ad albam usq; lineam perduxeris, expende, qualiter obliquorum tendines, rursus transuersorum tenuitatibus in ea abdominis regione adnascantur, quæ recti musculi ab inuicem magis seiunguntur. Vtroq; obliquo musculo in illud cadaueris latus, quod mensè in cubit pendente, sola manu rectum musciculum à transuerso si neruea tenuitate separabis, dextræ manus digitis ab exteriore musculi latere iniectis, & secundû abdominis longitudinè hinc inde sub musculo ductis. Quû primû rectus musculus à transuerso abscessit, integrû est, recti musculi fibras unâ cum transuersis illis inscriptionibus contueri, ac tandem musculum à thorace nouacula liberatû, ab abdomine detrahere, ita tamen, ut adhuc pubis ossi hæreat, ipsiusq; hîc initium accuratè examines. At quû hunc à pectore in cane, aut simia adimes, studendû est, ne continuû illi membranè tendinè simul auferas, aut uulneres, qui secundum pectoris longitudinè, à recto musculo, ad primâ thoracis costam porrigitur, ac re uera in eiusmodi animantibus recti pars esse conspicitur. Est autè hic tendo musculus ue, à quo in musculi brachii pectori ad ductis administratione præcepti quoq; abstinendum, & num homines hunc cum simijs cõmunem habeant indagandû. Transuersum parî modo, quo obliquos aggressus es, opportunè administrais, ducta similiter leui sectione à pubis osse, per ilium os, & transuersos uertebrarû lumborû processus, aut potius musculorû dorsum hîc mouentiu exterioris latus, atq; demû ad fines spuriarum costarum, quæ intacto peritonæo solû musculû penetret. Mox transuersi principia hamulo eleuabis, et nouacula, quàm poteris, attentiùs à peritonæo paulatim liberabis, donec ad neruosam ipsius deueneris exilitatè, quæ maiori adhibita cura, à peritonæo ita separada est, ut neq; peritonæum, neq; tendo, neruosa ue ea tenuitas laceretur, quod quidem nō adeò arduû est, atq; operosum, & precipuè iuxta abdominis elatiora nō procul à pectore, nam in sumine tendo ipse (ut etiâ peritonæû) nimis quàm tenuis occurrit. Nunc uerò ubi & hunc musculû ad mediû abdominis perduxeris, ac à peritonæo, ut licuit, optimè liberaueris, rursus in suum locû quatuor huius lateris musculos repones. Mox cadauere in dorsum reflexo, secundâ administrandi rationè aggredieris, quæ à tendinum finibus, in abdominis medio auspicatur. Duces itaq; à pectoris osse ad pubem usq; per totam abdominis longitudinè, super mediû recti musculi eius lateris,

Candidior in
abdomine li-
nea.

Obliqui ascen-
dentis.

Nexus ner-
uosa tenuita-
tis oblique a-
scen. musc. cum
transuerso.

Recti admi-
nistratio.

Transuersi.

Alteræ abdo-
minis musculo
transuersi admi-
nistratio, uerius
ipsius summi-
nitia.

Obliqui descen-
dentis.

cuius administrationem moliris, ad eū leuem sectionem, ut nihil præter ⁷ oblique descendentes
 musculi tendinem penetret. Atque hanc sectionem ad mediam recti musculi amplitudinem ten-
 tandam scribo, quod nollem frustra per albam lineam, quæ in abdominis medio occurrit, eam
 sectionem experiri, siquidem impossibile arbitror descendentes tendinem non vulneratur, &
 illa se quoque ascendentes tendine, seorsum liberare, quamquam & ab alba linea interdum sectio-
 nem inchoari non improbauerim, utcunque etiam laceratos tendines inuicem separares. Qua-
 propter hac illa uel sectione ducta, adniteris hamulo descendentes tendinem attollere, ac à subie-
 cto ipsi musculo nouacula dissecare, quousque uniuersum musculum, uelut dorsī spinam undi-
 que liberatum deduxeris. post hunc, ⁸ ascendentes tendinem à recto separabis, principium sepa-
 rationis ab alba linea exorsus. In hoc opere rursus intueberis, qui tendo ille transuersi recti
 musculi inscriptionibus adnascatur, ac cum nervosa transuersi musculi tenuitate, ad externum
 recti musculi latus coalescat. Insuper à reliqua transuersi musculi parte, oblique ascendentem
 auelles ipsum à pubis & coxendicis & ilium ossibus, & inferioribus thoracis costis, ad lumbo-
 rum usque uertebraarum spinas abscans: Rectum similiter, ut alterius lateris dissecasti, à trans-
 uerso musculo attolles, & ipsius capite à pubis osse absecto, illum super thoracem resectes. Mo-
 dō recta sectione secundum albæ lineæ longitudinē ducta, quæ duntaxat nervosam ^h transuersi
 musculi tenuitatem illa se peritonæo diuidat, conaberis eam à peritonæo diligenter separare,
 quod quidem in homine, & potissimum iuxta pubem, ^c uasorumque seminalium transitum, fac-
 turus es difficillimē, in porcis autem minimo negotio. Cæterum transuersi musculi, tendine
 usque ad carnem ipsius regionem à peritonæo, liberato, eum quoque tantisper auferes quousque
 uniuersus musculus à peritonæo dissectus pendeat. Integrum iam quoque est, & huius lateris
 musculos in pristinum locum reponere, & ad amissum eorum formam, situm, & fibrarum du-
 ctus examinare, ac demum resectis illis, ad testium musculos te accingere.

Obliquè ascendentis.

Ref.

Transversia

DE VIRILIVM TESTIVM ET MVLIÆ
brisuteri musculis. Caput XXXIII.

LICVISSET hac aliquot *Quinti libri figuras* reponere, ex quibus testis illi utriusque musculorum natura utcumque peti posset, utrum ne easdem figuras diuersis in locis proponeremus, hic tantum adijcimus, in quibusnam figuris praesentes musculi conspici queant. Testis itaque musculus, non nihil spectatur tertia tabula ad 1, & uigesima secunda figura Libri quinti. Veri autem musculosa substantia eiusdem Libri uigesima quarta figura ad characterem O, uti fieri potuit, exprimitur.



N A M tempestivum est, ad musculorum thoracem & dorsum & femur moventium inspectionem, peritonæum administrare, atque cum eo quoque testium musculos aggredi. Pertingunt itaque ad unumquenque testem, singuli musculi graciles admodum, ex ea vasorum seminaliū & testis tunica ciformati, quæ à peritonæo principium ducens, vasā simul cum teste continet. Hæc enim in posteriori ipsius sede illico, in ipso à peritonæo exortu, longis, ac inuicē sibi proximis, carneisq; fibris ita adaugetur, ut fibræ illæ gracilis oblongiq; musculi naturam expriment, qui illi testis tunica semper innatus deorsum protenditur, ac tandem iuxta infimā testis sedem, unā cum illa tunica uasī ei seminario appllantur, quod à testibus iam paratum semen assumit, idq; sursum in peritonæo amplitudinem deducens, in vesicæ ceruicem se profundit. Neq; aliqua prorsus parte, testibus, aut seminarijs uasis tunica illa pertinaciter adnascitur, quā uel simul cum musculosa ipsius substantia, insertionem ad eius uasis inflexum molitur, qui ad infimam testis sedem reflectitur adeò, ut musculus ipse nusquam testem contingat. Responderit itaq; testis musculus illis, qui ex carnosa membrana efformantur, quandoquidem est aliud nihil prorsus est, quàm carnea fibræ uasorum seminalium, & testis inuolucro innatæ, quemadmodum carnosa membrana musculi, carneis quoque fibris per membranā digestis constituuntur. Porro testium musculorum beneficio, uiri arbitrio motu testis movegetur (ut & ipsi musculi graciles tenuesq; sunt) sursum alliciunt, ne testes plus æquo laxati, ac ad anteriora pendentes, nimio oneri seminarijs uasis sint. Hunc usum musculi in coitu potissimum præstant, si enim testes uasis seminarijs oneri semper essent, atque hæc ad inferiora protracta perpetuò arcerentur, non adeò commodè semen transmitterent, atque modò, quū testium à musculis iam attractorū pondere subleuata, magis patefuerint. Constat itaq; musculos hos (qui *νεκροσπινδοί* Græcis uocantur) ex eorum classe censendos esse, qui

Virilis testis.
musculus.

qui nullum fortiantur musculum, contrarij motus autorem. Nullus enim, qui testes ad inferio-
ra reuellat, extractus est, quandoquidem testes, quos nisi rectè deorsum, nec in ullam partem
inclinantes prolabi decebat, abundè à naturali ipsis indita grauitate dimittuntur, idq̃ subin-
deò, ut ne minimùm quidem sursum aëris, senibusq̃ allici queant. Quid uerò Arabibus in
mentem uenerit, ignoro, qui binos in uiris cuiusq̃ testis musculos, in mulieribus autè unicum
haberi scriptum reliquerunt. Vnicum enim hæcenus ad singulos porrigi testes semper in ma-
sculis obseruauim. Mulieribus porrò Natura similiter musculos largitur, quos in peritonæo, ut
& reliqua ipsarum generationis organa, recòdidit. Ea nanque peritonæi pars, seu processus, f 24. fil. li.
qui utrinque à lateribus, ad uterum instar^b mesenterij pertingit, uenasq̃ & arterias utero dedu-
cit, & demum cum alterius lateris peritonæi processu, exteriorē uteri^c tunicam procreat, car-
nolis quoq̃ adaugetur fibris, ex illius regionibus deorsum oblique, ad uteri latera perreptan-
tibus, adeò sanè, ut & mulieribus utrinque singuli sint musculi, illis specie similes, quibus uiri
testes donantur. Et quamuis plerunq̃e graciles sint, neque admodum carnei, crassius ue, ego ta-
men eos aliquando in nonnullis mulieribus uteri cornua esse arbitratus sum, Galeni uteri de-
scriptione eleganter delusus, qui non muliebrem, ad uaccinum & caprinum describit^d uterum,
cornua arietū cornibus longè simillima obtinentem secus multò, quàm muliebris uterus. Por-
rò his uteri musculis, obscura uteri ad superiora attractio perficitur, quam mulieres tunc facili-
ter percipiunt, quum illa trahere colligereq̃ conātur, atque adeò (ut sic dicam) uteri ceruicis os, to-
tumq̃ uterum, penitiùs in peritonæi amplitudinē allicere student, l 25. fil. li.

Musculi mu-
liebris uteri.

In Libro de
Vteri sectio-
ne.

MUSCULORVM TESTIVM ADMINI- STRATIO. Caput XXXIII.



Quæ ea que
peritonæo cõ-
uincitur, modò
rescindenda ue-
niant.
Virilis muscu-
li administratio.

VENIAMODVM in Quinto libro musculorum, quos testibus ascri-
psi, mentionem incidere necessum erit, ita quoq̃ eorum administrationem
cum reliquarū partiū illo Libro enarrandarū sectione pertractabo. Quod
tamen ad administrationē hoc Libro persequendam spectat, à mucronata
pectoris ossis cartilagine, ad pubis usq̃ os, nouacula peritonæum diuides,
alia rursus sectione per transversum utrinq̃, ab umbilici regionibus ducta.
Mox absque delectu, in uiris omnia, quæ peritonæo cinguntur, præter re-
cti intestini^b finem, & uescicam, auferes. His itaq̃, ut in Quinto libro docebimus, ademptis, &
etiam scorto à testibus unā cum carnea membrana ipsi subdita liberato, ^d stylum exiguum ab
interiori peritonæi parte meatui indes, qui seminarijs uasis in humiliori peritonæi regione, ad
inguina uiam præbet. Posteaquā uerò stylum ad testem usque protruleris, atq̃ ad illius latus,
seu (si modò talis stylus ad manum sit) in ipsius rimam ac canalem, cultellum indideris, longa
sectione à peritonæo ad testem usq̃ secundum styli longitudinē facta, membranā tunicam ue,
uasa cum testibus inuestientē diuides. Atque ita uasa in conspectū cum testibus sese offerent, &
extenso quoq̃ uasorū inuolucro, gracilem testis, musculū, quo inuolucrum id uelut enutritur,
conspicies. Hoc musculo ab humillima uasis à testibus semen deferētis inflexione liberato, eius
naturā promptissimè cõdisces, qualiterq̃ testem sursum trahat, intueberis. Licet modò testi-
bus cum suis uasis musculisq̃ absēctis, penis & uescicæ ceruicis musculos aggredi, at quum ante
hos integrū sit, & thoracis & dorsi & manus dissecare, ad thoracis sese iam conuertet oratio.
Cæterū mulierū musculi aperto iam peritonæo, & intestinis ad latera sursumq̃ reductis & mu-
lieris testibus quoq̃ subleuatis, in conspectū citra aliam sectionē ueniūt, dummodo uteri lateri-
bus membranisque, illum peritonæo alligantibus animum accommodare non pigeat. At hæc
uniuersa (ut & antea admonuimus) in Quinto libro accuratius prosequemur.

Muliebris
musculi admini-
stratio.

DE MUSCULIS THORACEM MO- uentibus. Caput XXXV.



Thoracis mo-
tum iure arbi-
trarium esse.

THORACEM eius motus, quo respirantes indigemus, gratia, non uno
cõformatum osse, aut omnino osseum esse, superiori Libro declaratum
est. Iam uerò proximū erit, thoracis motum ex nostro arbitratu debuisse
pendere, nō autem naturalem esse, sermone persequi, dein si uoluntarium
esse, ex usu hominī fuerit, quibus is motus perficiatur musculis, subiun-
gere. Summus itaq̃ rerum Opifex respirationē hominī animalis spiritus resi-
ciendi, & cordis occasione largitus est, quòd & ipsum quidē substantia
aëris indigeat, & plurimū seruens in eo calor refrigerari expetat. Inspiratio quidem cor resfri-
gerat,

26 fil. E. 1.
27 fil. 1.
28 fil. 1.
29 fil. 1.
30 fil. 1.
31 fil. 1.
32 fil. 1.
33 fil. 1.
34 fil. 1.
35 fil. 1.
36 fil. 1.
37 fil. 1.
38 fil. 1.
39 fil. 1.
40 fil. 1.
41 fil. 1.
42 fil. 1.
43 fil. 1.
44 fil. 1.
45 fil. 1.
46 fil. 1.
47 fil. 1.
48 fil. 1.
49 fil. 1.
50 fil. 1.

uti facti
est in 2
lib. 5.

20 fil. li.
o, dem p.
c uti in 2
fil. 1. 5 ad
fil. 2, 4, 20.
d id facti
rus, quo 20
fil. 1. 5 ad
gestima di-
fere.
e 22 fig. lib.
54.

uti ferē
offerit 24.
fil. lib. 5.

21 fil. 1.
19 fil. 1.

gerat, supeditata ei frigida qualitate. exspiratio autem feruentis in eo, & quasi combusta, & fuliginosi recrementi effusione expulsiōeque, cordi etiam refrigerando conducit. Atque huius potissimum causa duobus contrariis motibus respiratio perficitur, attrahit enim in distentione & dilatatione, euacuat uero in constrictione, eisdem scilicet motibus, quibus & cor ipsum perpetuò fungitur. Quamquam respirationis cordisque motus, genere plurimum uariant. Si quidem cor naturali motu, uelimus nolimus, mouetur, respiratio autem adeo ex nostra pendet uoluntate, ut quosdam spiritus retentione sese necauisse legamus, atque id magnoperè non ad bene uiuendum duntaxat, sed etiam ad ipsam uitam, homini utile censetur. Si enim idem rhythmus consonantiaque respirationis cum cordis pulsu necessariò esset, neque ipsa respiratio ex nostro impetu uoluntateque penderet, multum diuque loqui nequiremus, quod non exiguum commoda uitæ noxam præstaret. Porro si non possemus interdum citra respirationem per sumum, uel puluerem, uel quampiam prauam & uenenosam aeris qualitatem, uel loca putrescentibus cadaueribus, cloacis, aut alijs occasionibus inquinata incedere, ea uitam ipsam quam celerrimè læderent, hominemque prorsus corrumpere. Constat itaque, ex nostro impetu, aeris per asperam arteriam in pulmones inspirationem, atque rursus fuliginosorum recrementorum cordis expirationem oportuisse celebrari. Cum uero pulmo thoracis motum, quoties ille comprimatur, dilatatur uic, uacui potissimum ui sequatur, musculos thoracem mouentes debuisse extrui certissimum est, qui thoracem dilatarent, arctarentque. Erunt autem hi in uniuersum unà cum octo abdominis musculis in homine, octuaginta nouem, utrinque scilicet quatuor & quadraginta, ac postmodum unus utriusque lateri communis. Verum canes & simiæ duobus abundat utrinque, ut simul tres habeant & nonaginta, quos Galeni intelligendi occasione, in serie sua enumerare haud grauabor, enumerationem ab altero tantum latere uniuersam absoluturus, ut deinde enarrato utriusque lateris communi musculo, amborum laterum musculos unà numeri gratia coniungam. Primus itaque ex inferiori interiorique clauiculæ regione, secundum ipsius longitudinem, quā primam respicit costam, exoritur, principium carnosum undique obtinens, & carnosio quoque termino primæ costæ, quæ pectoris ossi committitur, antica ex parte insertus. Musculus hic brevis, sed amplius est & tenuis, ac omnino carneus, fibras fortitur impense obliquas, propemodumque transuersas, quæ à clauicula antrorsum procedentes, supremæ thoracis costæ, & nonnihil pectoris ossi, quæ eius costæ cartilaginem excipit, implantatur. huius beneficio prima costa, sursum uersus exteriora retrahitur, hacque ratione ibidem thorax dilatatur. Secundus musculus grandis est, carnosio principio, ex tota scapulæ basi interiori in parte enatus, hinc carnosus perpetuò procedens, ac costis exporrectus, admodum latefcit, tenuior tantisper redditus, donec primæ, secundæ, tertiæ, quartæ, quintæ, sextæ, septimæ & octauæ, ali quando & nonne, thoracis costis sese inserat, atque id media potissimum costarum sede, si modò costæ longitudinem à uertebribus, ad os pectoris usque metiatis, qui locus est, multò anteaquam costæ in cartilaginem cessant. Reliqua autem parte, qua musculus costis exporrigitur, ipsis duntaxat incumbit, exiguisque tantum fibris (ut mutuò instrati solent muscoli) illis committitur. Cæterum non recta simplici linea ipsius, quem dixi, finis costis implantatur, sed hic tanquam in digitos discretus est, qui per costarum ossa prolixiores, quam musculi pars, quæ interuallis con nascitur, in priora procedunt, contrario nimirum modo, quo oblique descendens ab dominis musculus, ex inferioribus sex costis suam assumit originem. Hic enim ex interuallis costarum prolixius suos digitos educit, atque cum secundo respirationis musculo serratam compagem efficit. Secundi thoracem mouentium musculi fibræ, si quando ad suum principium, quod ex scapulæ basi pendere credimus, tendantur, uniuersas costas (præter inferiores, quibus musculus non inseritur) uersus exteriora uellunt thoracem dilatantes. Hic musculus in hominibus ita ferè habet, in canibus uero & caudatis simijs secus, non enim solum ipsis in octo costas inseritur, sed etiam ualidissime transuersis septimæ & sextæ & quintæ & quartæ ceruicis uertebrarum processibus implantatur, aut (si ausim eloqui) ab illis processibus sui principij portionem mutuatur. Velim enim non oscitanter expendi, an præsens musculus à scapula, costis & uertebribus illis insertus, thoraci mouendo seruiat, an uero à costis, illisque uertebribus initium ducens scapulæ implantetur, ipsiusque secundum thoracis latera, antrorsum motus occasio haberi queat. Duorum qui iam subsequuntur in numero musculorum, unus tantum hominibus adest, is scilicet quæ ordine quartum statuemus, nam tertio simiæ ac canes tantum donantur, numero autem ipsum quoque, sicut paulo superius monui, ne quis Galeni lectioni nimium citra sectionem confusus, aliquos me præterisse musculos præter meritum nugetur. Tertius itaque, & quartus, ab utroque secundi musculi latere habentur, unus in priore ipsius sede, alter in posteriore, ambo simul cum secundo (si modò id præstet) thoracem dilatantes. Tertius

*Musculorum
thoracem mouen-
tium nume-
rus.*

*Primus tho-
racem mouen-
tium.*

Secundus.

*Tertius &
quartus in nu-
mero, uerum
tertio simiæ
abundant.*

3

qui secundum anteriora secundi musculi exporrigitur, carnosus ex interiori parte transuersi secundae ceruicis uertebrae processus enascitur, ac deorsum protensus, ex sequentibus quoque principium ducit, donec uarijs auctus exortibus, primae thoracis costae committatur. hic enim lator, sed tenuior efficitur, & quatuor superioribus thoracis costis, perpetuo carnosus iniicitur. Vbi uero quartam, interdum, idque praecipue in canibus, quintam praetergreditur costam, in membraneum neruofumque ligamentum definit, quod subsequenter costis ad septimam aliquando, & octauam usque exporrigitur, singulis, quibus incumbit, costis firmiter adnatum. Procedit uero huius musculi carnosae pars, quae costis committitur, una cum ipsius membraneo tendine, iuxta musculi secundi regionem, quae in digitos diffusa, costis implantatur. Hunc in caudatis simijs, & canibus liquidissime ita in publicis sectionibus sese habere ostendi, non tamen instar manus suas insertiones tentantem, in hominibus autem, me unquam aut reperisse, aut ostendisse minus affirmare possum, quam audacter asseruere, illo homines carere. quod non ita dictum esse uelim, ut postposita Galeni autoritate, studiosi illum in hominibus indagare cessent. Quartum in huius Capitis musculorum serie, homines iuxta ac simiae canesque adipiscuntur, sed nonnihil diuersum. Hominibus enim ex trium inferiorum ceruicis uertebrae, ac primae thoracis uertebrae spinis, membraneum latumque exoritur principium, quod primo caput mouentium musculorum pari & hac sede repositis, dorsum thoracemque mouentibus musculis instratum, in priora, seu si dextrum spectas musculum, dextrorsum dechiuis exporrigitur, carneum euadens, latique musculi naturam ostendens, simulatque primi illius parvis extensus superauit. Deinde ubi primam thoracis costam contingit, in latera sensim oblique ductus, in tres ueluti digitos tripartitur, singulos tribus quatuor primarum costarum interuallis exporrigens, illisque sese costis inferens. Canibus porro ex eodem principio musculus iste prodit, nisi etiam altius nonnihil exoritur, uerum ubi membraneum eius principium magis oblique, quam transuersim descendens, ad tertiam thoracis deuenit costam, carnosus latusque inibi conspicitur, qui tertiae costae, & tribus ordine deorsum ipsi succedentibus implantatur, in priora, seu in latus semper oblique tantisper descendens, donec aliquouique sub secundi thoracem mouentis musculi principio reconditus, atque in digitos discretus finiat. Ceterum duos hos musculos, tertium uidelicet & quartum, thoracem quoque attollere distendereque in simijs est manifestissimum, quemadmodum etiam in hominibus quartum musculum eidem muneri praesse, tres itaque in hominibus, quatuor uero in canibus & simijs haecenus descripsi.

Quintus numero, quo humanus thorax destituitur.

Quintus igitur ordine, quo & homines distinguuntur, anteriori costarum parti, quae pectoris ossi proximae sunt, exporrigitur, paulo enim supra latus mucronatae cartilaginis, membranei ualidiq; ligamenti instar, super costarum cartilaginum fines, sursum nonnihil in posteriora inclinans procedit, quousque secundae costae supersteratur. Ibidem enim tendo illae membraneo ligamento respondens, carnosus adaugetur fibris, & haec carnosae musculi pars, primae costae cartilaginis principio, & ipsius ossis fini adnata, ad superiorem eius costae regionem terminatur. Verum non hic magnam teretemque carnem obtinet, sed tenuem utcunque, & tendinis sui modo latam, superiori ipsius sede orbicularem, & in externo latere, quam in interno, quo pectoris os respicit, longiorem. Tendo iste, seu ligamentum (utcumque appellare uisum fuerit) costarum cartilaginibus, quas ascendit, firmissime adnascitur, caro autem, carneaue ipsius portio, superiori secundae costae parti, & toti primae secundaeque costae interuallum adnata uisitur. Musculum hunc (ut in abdominis musculorum enarratione admonui) nullum peculiarem esse arbitror, nam recti abdominis musculi portio, quantum uis accuratè dissecanti apparet. Videtur enim carnosae recti musculi pars, quae paulo supra mucronatae cartilaginis latus consistit, in hunc membraneum ualidumque tendinem definire, atque ita sursum cōscendens denuo carnosae sine primae costae inferi, eiusque musculi naturam referre, qui maxillam inferiorem deorsum trahit, qui in medio tendinis speciem exprimens, duobus uentribus donatur. Aut si haec costis exporrecta portio, recti musculi pars non censenda sit, nemo illius termino hanc firmissime connatam, aut potius ex ipsa enata ibit inficias. Utcumque uero res habeat, siue peculiaris sit musculus, siue recti portio, eiusdem semper functionis opifex erit, nimirum uerarum costarum terminos pectoris ossi coarticulatos comprimendi cōstringendiq; ob idque & thoracem arcuandi. Ceterum quum in hominibus mihi nunquam uisus sit (uti neque ijs, qui Galenum praecesserunt, Anatomicis sese in hominum cadaueribus exercitibus) hominis duntaxat tres musculos haecenus recensui, in simijs uero & canibus quinque, atque id adhuc ea conditione, ut reclamantibus oculis, quintum musculum à recto abdominis distinctum recensamus. Sextus igitur simiarum, & quartus hominum, ad dorsum mouentium musculorum latera, costarum radicibus, & transuersorum uertebrae processuum apicibus exporrigitur. Originem enim ducit cum

Hominis quartus, simiarum 6.

longissimo

¹ longissimo dorsum mouentium musculo, ex posteriori ossis sacri regione, & interiori ilium ossis sede, quam extra sacrum os in posteriora prominere nouimus. Hinc cum undecimo dorsum mouente musculo, transuersis uertebraŕum lumborum processibus innixus, sursum deducitur, tam pertinaciter toto per lumbos ductu illi musculo cōmixtus cōnatusq; ut merito ipsius pars cēferi queat, neque facile ab ipso sectione dirimi possit. Quū primū uerō uterq; duodecimā thoracis respicit uertebraŕum, sextus hic musculus à dorsum mouente undecimo, notatu digno intervallo abscedit adeò, ut inibi incuriosè secantibus ex illo principiū sumere uideretur. Hinc modicè obliquus sursum in latus conscendit, & decem superioribus costis, ex carnosā sua substantia tendines paulò minus toto teretes pullulat, non perpetuò carnis cōstans partibus, quantū uis etiam Galenus hunc undique carnosos partibus constare in Quarto de Administrandis sectionibus libro prodiderit. Inferuntur autem illi tendines costarum^b tuberculis, quæ ex ipsis paulò postea, quā à transuersis uertebraŕum processibus abceſſerunt, extuberare relatum est. Cessat autem musculus hic ad primam thoracis uertebraŕum, interdum tamen adeò conscendit, ut & transuerso septimæ ceruicis uertebraŕum processui tendinem quoque non minùs, quā costis offerat. Vndecimæ & duodecimæ costæ carnosus duntaxat iniicitur, quo enim altius musculus ascendit, eo nunc dicti tendines magis euadunt conspicui, ipseq; musculus quasi à tendinum generatione absumptus, sensim gracilior redditur, eas infimas thoracis costas, & omnes reliquas deorsum trahens, easq; comprimens, ac denique thoracem arcans.

² Septimus musculus, homini pariter & canī cōmunis in posteriori thoracis sede, secundum inferiora collocatur, originem ducens membranam latamq; ex undecimæ & duodecimæ ac aliquando decimæ thoracis uertebraŕum spinis, tum aliquot etiam primarum lumborū uertebraŕum spinis. Principiū hoc³ musculus dorsum agētib; & quarto humani thoracis super sternitur, transuersim rectā in priora porrectum. Vbi autem septimus musculus hos transcendit, costarumq; ossibus committitur, statim carnis adaugetur fibris, & tandem uelut in aliquot diuisus digitos, nonæ, decimæ, undecimæ & duodecimæ costarum intervalis, ipsisq; costis sese inserit, implantatur uerò ipsis multò antè, quā in cartilaginē cessant. Atq; hic musculus hominibus longè latior est, quā simijs & canibus, quanuis etiam in canibus insignior, quā in simijs uisitur, & in omnibus serratam quoque compagem, cum abdominis^c musculo obliquè descendente efformat. Musculus iste retractionis earum, quibus inseritur, costarum opifex est, unde etiam thoracem distendētū numero opportunè ascribitur.

⁴ Octauus hominibus ac simijs & canibus communis, in thoracis cavitāte situm sibi peculiariter uendicat, extenditur autem per uniuersum pectoris ossis latus, sub tota uerarū costarum cartilaginum regione, prope modum costarum os, exteriori ipsius latere contingens. Est autē musculus iste triangularis, ex duobus longissimis lateribus, & uno breui constructus, & tenuis, omniq; ex parte carnosus. Fibras sortitur obliquas, ex ossis pectoris lateribus, sursum in posteriora protēlas, nisi fortassis mauis asserere, ipsas à costis ad pectus, à posterioribus deorsum in priora ferri, huncq; musculum huius sedis intercostalibus annumerare. Adnascitur autem omnibus uerarum costarum cartilaginibus,⁵ illas ad pectoris os, in sinus nimirum, quibus illæ inarticulantur, attrahens, & eo motu thoracem quoque arcans, & costarum cartilagines inuicem colligans.

⁶ Super sunt præter utrique lateri communem adhuc, utrinque duo & uiginti, ac deinde duodecim. In singulis enim costarum intervalis, quæ undecim in alterutro latere sunt, bini producuntur musculi, unde & intercostalium musculorum nomen mutantur. Siquidem ad illorum generationem, per totam costarum longitudinem,⁷ ab inferiori regione superioris costæ, in superiorem humilioris, & in descensu proxime sedem, neruosæ quædā fibræ deorsum producantur.⁸ Et rursus à superiori parte inferioris costæ, aliæ fibræ in inferiorē elatioris costæ sedē obliquè sursum procedunt sic sanè, ut in singulis costarū intervalis duo intercostales musculi habeantur, qui mutuò incumbunt, ac fibras decussatim prorepentes fortiuntur, & per uniuersum intervalum semper carnosus permanent, nec ob loci angustiam in tendinē cessant. Ac pròinde intercostalium musculorū alios exteriores, alios uerò interiores non ineptè dicimus.

⁹ Externi in singulis costarum intervalis, simulatque costam¹⁰ à transuerso uertebraŕum processu, in anteriora obliquè prorepit, principiū habent, ac fibris constant ex superiori costā, in inferiorem obliquè in priora deorsum prorepantibus. Hunc fibrarum ductum, per uniuersa spuriarum costarum interualla, tam quæ inter ossa, quā quæ inter cartilagines consistunt, exteriores musculi seruant, & uerarum costarum musculi, usque ad costarum partem, qua in cartilaginē finiunt, eam quoque retinent.

¹¹ Vbi autē uerarum costarum ossa in cartilaginē degenerant, mox fibrarum ductus uariat, ab inferioris namq; costæ cartilagine, sursum in priora obliquè, uersus superioris costæ cartilaginē fibræ inibi procedunt, donec & in hac parte exterior musculus

Hominis
SimiarumHominis
SimiarumIntercostales
musculi utrinque
triginta
quatuor.Externi
intercostales.

b pectoris

pectoris ossi committitur. Externis his intercostalibus musculis id priuatim accidit, quod lo-
 ge magis neruosi excarnesque uisuntur in ea costarum sede, quae a uertebri primū abscedit,
 quam per reliquam interualli longitudinem. deinde non solum ab inferiori sede superioris co-
 stae, in superiorem humilioris costae sedem ducuntur, uerum etiam ab externa superioris costae
 incipiunt sede, & in externam inferioris inseruntur. Internorum intercostalium musculorum
 fibrae, praedictis situm contrarium exigunt, & exteriores ad x literae similitudinem intersecant.
 Interni inter costales. Interniores enim musculi, quae uertebRARUM corporibus proximi sunt, ex inferiori costae superi-
 oris sede, in elatioris costae inferiorē sedem, fibras oblique sursum in priora protensas mittunt.
 Hanc fibRARUM seriem interiores musculi, per singula spuriarum costarum interualla retinent,
 & in uerarum quoque interuallis, ad eam usque costarum sedem, ubi in cartilaginem degener-
 rant, ibidem enim ilico ac interni eō deueniunt, fibRARUM ductum emutant, nam a superioris
 costae cartilagine, in inferioris, fibrae in priora deorsum oblique protenduntur. Atque ut semel
 dicam, in uerarum costarum interuallis musculi, qui inter costarum ossa habentur, omnino his,
 quae inter cartilagine existunt, contrario fibRARUM situ donantur. quod quum pressius Ara-
 bes animaduertent, in singulis interuallis non duos, sed quatuor musculos esse, ueterū quo-
 rundam Anatomicorum modo tradiderunt, quanquam de sex tantū uerarum costarum (quae
 septem numero censentur) interuallis id uerē afferuerint. Nam in spurijs costis, bini duntaxat
 musculi numerari queunt. Quum itaque sex sint uerarum costarum interualla, nihil ex fibRARUM
 serie obstitit, utrinque quatuor & triginta intercostales musculos enumerare, quem-
 admodum & ego paulō antē, quum adhuc utrinque duos & uiginti, ac deinde utrobique etiam
 duodecim, praeter musculum utrique lateri communem, enarrationi deesse dicerem. In-
 tercostalium musculorum beneficio Galenus plerisque locis thoracem stringi & laxari censet,
 at quum duplices hi sint, exteriores expirationem moliri prodidit, quod est costas simul addu-
 cere, thoracemque comprimere, interioribus autem inspirandi munus ascripsit, quod est costas
 ab inuicem abducere, amplioremque thoracis cavitatem efficere. Interdū uerō non sibi constans,
 exteriores inspirationi, interiores autem expirationi praefisse uoluit, num uerō, uel altera, quae-
 cunque magis tibi arridet, harum sententiarum ueritati sit consona, diligenter (at seposito inter-
 rim affectu) perpendas, uelim. Ego enim Galeno deditissimus non ausim ilico ipsius placitis
 prorsus contraniti, & multō minus obiter illis assentiri, quandoquidem haecenus, qua ratione
 intercostales, siue interiores siue exteriores musculi, costas dirimere, ac ab inuicem deducere
 queant, haud quaquam comperi, quantumuis etiam uiuas Galeni sectiones animaduertērim,
 & primū solus mihi has, & deinde publicē in scholis Patauj ac Bononiae easdem aggressus fue-
 rim, quae profectō contrarium potius Galeni dogmatibus probant, quā quod illis subscri-
 bant. Ad haec, intercostalium musculorum situs, figura, fibrae, aliaque omnia ad eorum dem fa-
 bricam spectantia, dilucidius hos musculos inuicem costas adducere, quā laxare suadent. Ex-
 teriores quidem inter uerarum costarum ossa, & per uniuersa spuriarum interualla repositi,
 inferiorem costam superiori adducere apparent, interiores autem, superiorem inferiori. De-
 inde exteriores musculos, inter uerarum costarum cartilagine collo catos, superiorem cartila-
 ginem inferiori, & interiores inferiorem cartilaginem superiori atrahere existimo. quod si sit,
 quid id aliud est, quā simul omnes thoracē arctare, angustiorēque efficere? Neque me Hercule
 a ratione absōnum est, ad expirationem thoracis uel arctationē, Naturam omnes musculos in-
 tercostales produxisse, quum fortiori motu impetuque ad efflationem, uocem, tussim, sternuta-
 tionem, faciem excretionem, ad partum facilius excludēdum, breuiter ad thoracis compressi-
 onem, quā ad inspirationem indigeamus. Quauis interim musculi inspirationis autores, in-
 ualidi pauci que sint. Iam omnes unius lateris musculos, qui in altero latere pares fortiu-
 tur, explicauimus, ac proinde opportunum erit, orationem ad musculum utrique parti com-
 munē deflectere. Est autē is, quem Graeci *σπληνικός*, & *σπληνικός*, & *σπληνικός*, Latini uerō Septū
 transversum, seu mu-
 sculus uerigi, la-
 teris commu-
 nis.
 Septū trans-
 uersum, seu mu-
 sculus uerigi, la-
 teris commu-
 nis.

o 8 ta. E. B.
 ac de in figu-
 ra illic inter-
 nam pectus
 ris sedem o-
 stendens.

p 7 ta. A.

q 7 ta. A. B.
 fil. 61, 1. 2
 fil. R. 3. fil.
 H. 4. Q. 5
 E. 6. 7. 8. 9. 10.
 1.

r 7 ta inter
 h. l. m. n.

s Insuper
 nem unuer-
 sam 7 osten-
 dis ta.

lum efficiantur. Duodecimæ autem costæ cartilagini non solum inferitur, sed toti ipsius longi tudini carnosus adnascitur, & ad inferiorum costarum extrema, oblique ascendente abdominis musculo, & longè magis transuerso admodum unitur. Cæterum septi fibræ ad uertebras drosi prorepentes, non in undecimâ thoracis uertebam, quam spectant, insertionē moluntur, quòd magna arteria sub septo transuerso repens, & sextus femur mouens musculus, adeò undecimæ uertebræ obducantur, ut septum ipsi connasci nequeat. Ac proinde fibræ, quas hîc undecimæ thoracis uertebræ connecti oportebat, in duo membranæ, sed perquam ualida definunt ligamenta, seu tendines. Qui deorsum ad magnæ arteriæ latera protensi, lumborum musculis inibi coherent, & sensim arctiores redditi, ac arteriæ nonnihil sese subijcientes, tantisper porriguntur, donec lumborum uertebras excarnes reperiāt, ipsisq; robustissimè & longo ductu inferantur. Vniuersum itaq; septum paulò minus toto orbiculare est, situm uerò obliquum exigit, nam à pectoris offe per spuriarum costarum extrema, ad eam quam diximus, in lumborum uertebris regionem protenditur, situmq; ob id à prioribus deorsum ad posteriora uergentem obtinet. Quinetiam duos fortitur circulos, unum membranè, qui caput ipsius putatur, alterum hunc succingentem, qui carneus est, uerum quemadmodum hic semper, quo costis propinquius accedit, carnosior efficitur, ita & ille, quo septi centro uicinior est, membranosiore uadit, non tamè ambo exacti circuli imaginem referunt, sed talem, qualè quis latè esse diceret, & una parte in acutū angulū cessare. Membraneus enim sursum, atq; in anteriora acutū porrigit angulū, carneus autè deorsum, atq; ad inferiora illis reticulis quàm similimus, quibus in parue p.læ ludo utimur, & præcipuè si eius reticuli capulus dissolutus, modicèq; patefcens fuerit, & ipsum lignum (quo breuius & latius reddatur) non segniter parietibus attusum. Cæterum uniuersum septi transuersi corpus, duabus obducitur membranæ, totam enim inferiorem ipsius amplitudinem, qua nutritionis organa spectat, peritonæum succingit, superior uerò uniuersa latitudo, cor pulmonemq; respiciens, tunica costas succingente obducitur. Quinetiam contra aliorum musculorum naturam, paucis demptis, septum transuersum quibusdam foraminibus peruium est, quæ Galenus ex Hippocratis sententia duo esse recensuit, unum, quod uertebris, arteriæ magnæ, & descendenti ad uentriculi orificium stomacho uiam præbet, alterum, quo uena cava in thoracem transscendit. Nobis uerò tria esse obseruantur, primum, ubi ab inuicem deducuntur ligamentorum aut tendinum illorum principia, quæ solam trāsmittunt arteriam, & finem uenæ pari carentis, quæ costas enutrit, & ramos deinde sexti paris neruorum cerebri, qui ad costarum radices, sub membrana costas succingente propagantur, ac post modum iecori, lien, renibus, intestinis & omento numerosa serie inferuntur. Si quis modò uertebras his cum Galeno adnumerare uelit, permitto quidem, quanquam improprie admodum uertebris septum uiam præbere uideatur, imò uix appositè, uiam, qua arteria fertur, foraminis nomine donamus, quum hæc potius semicirculum in septi transuersi circumferentia exculptum, quàm foramen referat, septumq; uertebrarum, corporum superiori seu anteriori partem, non autem lateribus committatur. Secundum foramen, ad septi transuersi medium, uersus dextrum tamen constitit, & uenæ cavae in thoracem reptanti extructum est, cuius corpori septum firmissimè, membranarum ipsi obnatarum beneficio connascitur, quemadmodum & hæ membranæ reliquis quoq; quibus septum iter præbet, pertinaciter committuntur. Tertium foramen paulò inferius, quàm media septi sedes est, ad sinistrum latus modicè uergens habetur, quo stomachus, & sexti neruorum paris ramus, ad uentriculi orificium dimittuntur longè profectò secus, ac Hippocrates, Galenus, cæteriq; Anatomicorum proceres arbitrati sunt. Meg huic sententiæ non sectio duntaxat, sed & ipsa ratio quoq; astipulatur, arduus enim fuisset stomachi anfractus, si dorso propter duodecimam thoracis uertebam in primo foramine innixus, sursum ad priora in uentriculi superius orificium detorqueretur. Est enim primum foramen paulò inferius, quàm media uentriculi regio, & ipse uentriculus ea parte, qua stomachus illum ingreditur, teres existit, neque magis uersus priora, quàm posteriora stomachus cum ipso continuum corpus efficitur. Cæterum quum hæc de septi forma natura que dixisse sufficiat, meritò nunc ipsius functionem exequar. Plato existimauit hunc musculum duntaxat concupiscibilis, seu naturalis animæ & animosæ septum esse transuersum, Aristoteles uerò, quum has animas, unius tantum in cor repositæ partes esse arbitraretur, in hoc septum à Natura procreatum affirmauit, ut cordis sedem à uentre dirimat, & animæ originem inoffensam à ciborum exhalationibus, & caloris aduentitij copia feruet, uerum id non modò præstat, sed inter musculos thoracem mouentes, ad respirationem, ac ad propellenda uentris recrementa in primis conducit, huius officium quo thoracem mouet, obscurum est, neque sat scio, an quispiam uerè id scriptum posteris reliquerit, aut etiam illud ex proposito tradere aggressus sit. Id enim Galeno

Septi forami
na.

Septi minus

(si ausim proloqui) peculiare est, ut quum prolixissimus sit, fabula quamiam sese surripiat, atq; quod maximè explicandum fuerat, quasi id non ex proposito faceret, tacitè prætereat. Profectò nisi quis exactissimè septi situm formamq; cognoscat, & in uiuorū sectionibus ipsius munus examinauerit, id neutiquam se oscitanti offeret. Porro quantū hæcenus assequor, septum tranſuersum proprio motu ossis pectoris inferiorē terminū, & spuriarum costarū extrema, ad suum caput tanquam ad centrū intrò trahit, nonnihil quoq; sursum uellens. Septi enim tranſuersi caput in medio mouendarum partium reponitur, & elatiori sui capitis sedi, quæ thoracis amplitudinem respicit, nerui à ceruice decurrentes inferuntur. Quum itaque septum in se conuelliatur, & spuriarum costarum extrema quodammodo ad centrū colligit, solam inferiorem, eandemq; anteriorem thoracis partem, quam spuriarum costarum cartilagine constitunt, arctat. posteriorem uerò, quæ ab harum cartilagine ad uertebras usque habetur, dilatat, ac inuicem quinque inferiores costas dirimit, unā cum sexta & septima, thoracis costis, quarum etiam cartilaginibus septum applantatur. Hac igitur ratione inferiorē thoracis partem septum tranſuersum dilatat, ac distendit. Vt uerò quod dico, assequaris manifestius, primū utranque manū notharum costarū cartilaginibus accommodato, & ui attracto spiritu, qui intrò sursumq; cartilaginū extrema uellantur, sentito, deinde hīc una manu relicta, alteram posteriori costarū regioni extēsam impone, & rursus spiritu assumpto, qualiter iuxta dorsum costæ dirimantur, & cartilagine inuicem conniueant, examinato, nisi fortassis canis, aliud uel animal ad manum sit, cuius uiua sectio septi functionem doceat. Atque in hac administratione cauendum est, ne dum animal intrò spiritū ducit, id expirare arbitreris, quod sanè faceres promptissimè, si duntaxat spuriarum costarum extremis, illisq; sedibus animū adhiberes, quibus septum implatur. Neque adhuc me latet, quosdam nostræ ætatis præcipuos uiros, qui mihi interdum administrant aſſutere, proprium septi motum ad inferiora fieri contendere, quos præter^o neruorum infertionem, quæ ex ceruicis dorsali medulla in superiorē septi sedem perficitur, & uiuam sectio nem longè euidentissimā docere oportuit, quòd alium exonerātes spiritum, ualide compresso interim thorace, retineamus, non autem continuò inspiramus, & thoracem dilatemus, quod sanè tum faciendum esset, si in thoracis dilatatione septū deorsum duceretur, ut scilicet tunc cum abdominis musculis, excretioni opitularetur. Atq; id etiam docet ualidissima inspiratio, quoties illam ita moliri conaris, ut spuriarum costarū cartilagine, sursum introrsumq; moueri non statueris, quandoquidē quum ui illas retines, una atq; altera inspiratione facta, ita cartilaginum sedes laborat, ac si ui eam pugnis collisisses. Verū opinor & te quoque uarijs modis hæc experiri, quemadmodum & ego nunc adeò uarijs respirationibus attento, ut prælassitudine calamen ē manibus ueniat reponēdus, addā tamen, & suffo catos liquidò meæ sentētiæ subscribere. His nanque quoniam distento dilatatoq; thorace, septum tranſuersum ad superiora attractum distentumq; adeò inter secandū apparet, ut septum in thoracis amplitudinē allatum, iecur & uentriculū in thoracē trahat, difficilēq; illorū sectionē nobis exhibeat, quæ tamen ilico prompta euadit, si thorax alicubi inter costas, aut ipsum septum perforetur, id enim tunc statim flaccidum, instar madidi panni deorsum concidit, ac plus, quā uoles, iecur, & uentriculū propendere sinit. quod, quonā pacto fiat, illi demū non ignorant, quibus musculorum contractionis & laxationis ratio perspecta est. Hæcenus omnes musculos solis costarū motibus subseruientes explicauimus, qui simul omnes in simijs numero sunt octuaginta quinque, hominibus autē octuaginta unus. Quū uerò & his octo abdominis musculos, in thoracē cōprimētium classem prorsus reponendos subnectimus, in homine omnes sunt octuaginta nouē, in simijs autē tres & nonaginta.^p Obliqui enim descendentes si tendantur, admodū humiliorem thoracis sedē cōprimēt, thoracē arctant. Recti uerò, cū obliquē ascendētibus costas deorsum trahunt, thoracem faciunt. Porro eos qui brachiū & scapulam mouent, parum etiam thoracis motibus auxiliari, aliquis arbitrari posset, si aliquando thoracē fortius cōstringerent. uerū ita longè ad huc magis respirationis musculorū numerus excreceret, qui omnes, non in omnibus respirationibus simul operantur. Sed singulis respirationis speciebus, Natura proprios largitur musculos. Sunt autē primū respirationis duo genera, inspiratio scilicet, & expiratio, & hæc rursus singula duplices partes habent. Expirationū enim alia est naturalis, & nō uiolēta, quæ nulla nisi naturalis iurgēte necessitate fit, alia uehēmēs & uiolēta, quam efflationē nuncupamus. Sic quoq; inspiratio alia naturalis, alia ad uocis generationē, aut ad aliud quippiā uiolēta existit, atq; hæc rursus differtēte plurimum maioris minoris uel ratione inter se uariāt. Naturalis inspirationis & expirationis septum duntaxat autor censetur, abundē enim ipso contracto tenso uel, medici thoracem dilatare, inspirationēq; perficere arbitrantur. deinde rursus laxato septo, thoracem sua

*Musculorū
thoracem mouentium
enumeratio, &
quando illi suo
fungantur officio.*

o 23 ff. ca.
11 li. 4. n. 13
et 1 ff. lib.
6 p.

p 234. a.
q 214. a.
r 4 tab. n.
f 6 tab. a.

t 7 tab. a.

gravitate

grauitate promptè concidere, expirationem moliriq; affirmant. Atq; id est, quod Galenus naturallem expirationem circa musculorū opem perfici scriptum reliquit. At si aut cordis caloris qualitas increseat, aut ad uocē, aliud uē muuus maioris indigueris aēre, mox^a primus, secūsus, & hominis^r tertius & quintus, ac simiarū canumq; tertius, utrinq; unā cum septo operabunt, & ex Galeni suffragio^b interiores intercostales musculi quoq; agent. Quanquam nesciam, num exterioribus, an uerò interioribus musculis intercostalibus inspirandi munus Galenus assignauerit. Si autem maioris expirationis efflationis uē, ad uocem, clamores, tibias ac tubas, & id genus instrumenta inflanda necessitas ingruerit, exteriores intercostalium musculi sese operi accingent, unā cum interioribus, nam & hos quoque costas inuicem adducere, thoracemq; arctare autumo. His statim in opere succedet, qui in simijs recti abdominis musculi pars esse dicebatur, præterea qui ad longissimi dorsi mouentis musculi latus utrinq; porrigitur, & qui in thoracis cauitate, sub uerarum costarum cartilaginibus latitat, postremò ipsi abdominis musculi, uix autem aut brachium, aut scapulam mouentium aliqui.

Li. de Motu musculorum

MUSCULORVM THORACEM MOVEN

tium administratio. Caput XXXVI.



MNIBVS musculis, quos hucusque diffecari docuimus, reiectis, musculorum thoracem mouentium administrationem à primo auspicabere, haud quamquam omittēs, quin simiā, aut si eius nō detur copia, canem unā operi adhibeas. Acuto igitur cultello membraneū, sed impense ualidum ligamentum, quod clauicula pectoris ossi necitur, primū discindes, mollem nerueamq; cartilaginem expendens, quæ præter cartilaginem ossibus obnatam, pectoris os & clauiculā interuenit. Ad hæc, inter reliqua huius

*Primi admi-
nistratio.*

articuli ligamenta, ualidum quoddam ligamentum inquires, quod ab humiliori clauiculæ sede enatum, illic pectoris ossi inseritur, ubi primæ costæ cartilago, pectoris ossi adnascitur. Mox clauiculam à prima thoracis costa nunc sursum, nunc deorsum reflectes, ac primi musculi originem & insertionem, simul cum fibrarū ductu cōsiderabis, & musculo dein à clauicula libera-

Secundi.

to, illum pectori adhuc adherere fines. Secundus musculus, quoniam scapula modò à thorace dependet, totus sese offert, unde etiam circa aliam operam, à scapulæ basi diffecandus est, & usque ad insertiones, quas in costas molitur, deducendus. In hac administratione sedulò animaduertes, num secundus musculus à scapulæ basi in costas porrectus, thoracis motibus suppetias ferat, num uerò à costis initium ducens, in scapulam inferatur, ipsumq; moueat, atque ad hanc speculationem non mediocriter cōfert, quòd in canibus, tot transuersis uertebrae ceruicis processibus illum aut inferi, aut ab eisde enasci intueberis. Adempta nunc pariter cum brachio scapula, illam aliquòd repones, quo postmodum hæc ad musculorum brachium, & cubi-

*Tertij canis
musculi admi-
nistratio.*

tum, & extremam manum occupantium sectionem subseruiat. Cæterum iam tertium canini thoracis musculum aggredieris, & illo à uertebri liberato, ac ad insertionem diuulso, ligamenti ipsius seu tendinis naturam ad amissum examinabis. Quum itaque huius naturam in cane didiceris, in homine tibi is quoque quaerendus est, atque ubi aliquantisper frustra illum inuestigaueris, ad quartam canis, hominis uerò tertiam sectionē conferes, huiusq; membraneo

*Tertij homi-
nis. 4. canis.*

principio à uertebrae, unde prodit, spinis longa sectione liberato, musculum ad suas, quibus inseritur, costas, à subiectis illi sedibus detrahes, nisi fortassis huius principium, quando capitis aggrediebaris musculos, à spina diremeris, & à primo illorum musculorum pari auulseris.

*Quinti homi-
nis. 7. canis.*

Septimum canis, hominis autem quintum similiter à suis quoque, unde enascitur, spinis auferes, ac ipsum à dorsi hinc mouentibus musculis, & canis sexto, hominis autem quarto thoracem mouentium, ad terminum, quo costis implantatur, liberatum thorace appendere fines. Postquam hos prædicta modò ratione administrueris, integrū est singulos ad suum principium tuis manibus trahere, ipsumq; motum, quo thoracem dilatare creduntur, obseruare, ac postmodum in totum à thorace illos reijcere. Vt uerò quintum canis ad amissum examines, dummodo abdominis musculos aggredienti is sese tibi non obtulerit, aut eisdem nondum diffeceris, optarim te transuersa linea, recti musculi carnosam partem, quæ pectus con-

scendere incipit, in totum diuidere, ac superiori parte hamulo aut digitis eleuata, eam à costarum cartilaginibus nouacula liberare. Conspicies enim unā cum carnosa musculi recti parte, latum illud ligamentum seu tendinem, à costarum cartilaginibus separari, atque, ut dixi, à carnosa recti parte enasci, ac quintum nobis inter thoracis motores enarratum musculum, recti abdominis musculi portionem censendum esse. Atque id quidem in canibus & caudatis simijs

inuenies, in hominibus autem (utpote quibus breuissimum pectus cōtigit) neuiquam, quamuis interim accuratē, num & is quoq; musculus homini obtingat, expendendum suadeo. Hæc intuitus, ^m quarti hominis, canis uerò sexti musculi caput, ab ⁿ undecimo dorsum mouente diuides, ac illum à costis omnibus diffecans, qui ipsi inferatur, inuestigabis. huius itaque functione obseruata, & ipso musculo à thorace absciso, intercostales musculi exteriores uniuersi manifestissimè oculis sese obijciunt. Quò autem & interiores cōtuearis, leui admodum sectione, in uno costarum interuallo, secundum inferiorem costæ sedem, conaberis exteriorem musculum diuidere, ac paulatim hamulo eleuatum, ab inferiori separare, ilico enim ipsorum natura, & fibræ occurrent inuicem contrario situ incumbentes, quanquam & interiores, aperto thorace, rursus licebit examinare. Hortor interim, utcunque eos indagaueris, ut diligentissimè inquiras, num & interiores, & exteriores diuersis fungantur munijs, ac illi inspirationi, hi uerò expirationi (aut contrà) famulentur, an simul omnes mea sententia eidem muneri præficiantur, omnesq; thoracem arcent. Quoniam autem iam antea, quæ peritonæo succinguntur, exempta sunt, iecur inquam, lien, uentriculus, intestina & renes, nulla sectione adhibita, inferior ^o septi transuersi pars, conspicua euadit, ubi mox duos inspicis circulos, membraneum unum, & carnosum alterum, ad hæc tria, quæ dixi, foramina, & tendines, ligamenta uel lumborum uerterbris adnata. Vt uerò fibras ad amulsum, & tendines illos, reliquamq; sedem septi inferiorem exactius intuearis, peritonæum ab inferiori septi superficie manibus uenit dirimendum, quod in porcis citra omne fiet negocium, in homine autem & cane non item. Cæterum ut superior septi pars thoracis amplitudinem respiciens, in conspectum quoque ueniat, in homine cultro aliquo mediocri, aut nouacula, aut paruo etiam cultello (quum cartilagine hominum, quàm canum & simiarum molliores sint) ^p à primæ costæ cartilagine, quæ ossi ipsius costæ committitur, sectionem ad infimam usque costam, per cartilagine urinque molieris. deinde mucronata cartilagine, sinistra manu eleuata, ab inferiori ossi pectoris regione, & huius loci cartilaginibus septum transuersum in abrades. Deinceps erectis cum pectoris ossi cartilaginibus, ^q membranas interiori ossi sedi connatas, ac thoracis amplitudinem intersepientes, & uenas simul & arterias, è iugulo pectori exporrectas absecabis, donec pectoris os ab omnibus liberatum, cum cartilaginibus à thorace commodè auferas. Reposito itaque paulisper pectoris ossi, à septo membranæ thoracis amplitudinem intersepientes, & cordis etiam inuolucrum, rescindentur, ^r quod longè secus, quàm Galenus undique arbitrat, magna sui parte septo in hominibus adnascitur, multò sanè aliter, quàm in canibus, & Galeni similijs. Insuper à septo neros ipsi infertos, uenam cauam, & stomachum absecabis, id à lumbis sensim cum suis ligamentis abradens, liberatum uerò, ac mensæ exporrectum, rursus si libuerit, examinabis. Iam pectoris os in manus assumes, atque in parte ipsius interiori, secundum illius longitudinem singulos utriusq; ^s musculos tenues, carnosos, & amplos exporrigi conspicias. licebit hos à pectoris ossi ac cartilaginibus, nouacula acutiori liberare, & cuius motus autores sint, inquirere. Vbi & hos absecueris, interiores intercostalium contemplaberis, ac corde, pulmone, uenis, arterijs, stomacho, & si quæ alia in thoracis capacitate habentur, ablatis, thoracis musculorum administrationi summam manum impones.

Quarti hominis & canis.

Septi transversus.

Sexti hominis, canis & elui.

m 12. d. A.
n 12. d. B.
13. tab. r.

Petebec
8 tabula.

o 7. d. A.

p uti factū
est in 8. tab.
bula.

q Hæc pectoris
lib. 6.

r Spectas
riam: &
4. fig. lib. 6.

s 8. d. A.

DE THORACIS LIGAMENTIS.

Caput XXXVII.



IGNIORA notatu thoracis ligamenta, ad duodecim thoracis uertebrae spectant, unde & hæc cum reliquis dorsi ligamentis examinanda ueniunt. Costis autem ad uertebrae nullum peculiare ligamentum obducitur, præter membraneum, articulis omnibus commune, quod hic durissimum est, & cartilaginis naturæ particeps, atque id potissimum ^a inter transuersi processus radicem, seu primæ costæ ad uertebrae articulum, & transuersi processus apicem, uel secundum articulum accidit. Cartilagine ipsi costis non alligantur, uerum uti dictum est, ipsa costarum ossa in illas degenerant. Pectoris ossi, qua cartilagine ipsi oblongis capitulis inarticularunt, nulla quoque propria adsunt ligamenta, nam duntaxat membraneum obtinet alijs articulis commune. Nil enim pectoris os, in ligamenti sibi peculiare uendicat. Verum ut & cæteris ossibus, membrana quædam, quam quòd os ambit, ^m *σπασμα* Græci uocant, pectoris ossi obducitur, atque hæc ualida ac quasi duplicata est, & hanc etiam ipsæ costarum cartilagine, unà cum costarum

a 3. fig. ca. 19
ab a ad c.
atque ita ex
ostium sedu
bus ligame
torum pote
naturæ, quæ
quum mem
branae sint,
pectus no
stis propo
ni nequeat.

starum ossibus communem exigunt. Atque hæc in thoracis constructione illa est membra-
na, quæ Veteribus Altera costas succingens tunica nuncupabatur, ut scilicet una sit conti-
nua, totam ambiens thoracis cavitatem, peritonæi naturam seruans, altera autem singulis co-
stis propria, ipsisq; & pectoris ossi omni ex parte obuoluta. Licebit itaque eiusmodi mem-
branas & ligamenta, exiguis cultellis in pectoris osse & cartilaginibus obseruare, quæ autem
costas uertebribus committunt ligamenta, non nisi ablatis dorsum mouentibus musculis, oppor-
tunè aggrediuntur.

DE MUSCULIS DORSVM MOVEN.

tibus. Caput XXXVIII.



MUSCULORVM sanè uicinitas, ilico musculis caput mouentibus illos,
qui dorsi motibus præ sunt, subiungi oportuisse nobis insinuat. Verùm
quum ante thoracis & abdominis musculos, dorsum agentes muscoli
aptè administrari nequeant, nunc primum eorum quoque sermonem ag-
gredi tempestiuū fuerit. In quo me Hercule (si modò in aliqua musculorū
enarratione ossium cognitio necessaria sit) memoriam in promptu ha-
bere oportet, eorum quæ superiori Libro de dorsi fabrica narrauimus.

Non altius itaque uniuersum dorsum in ceruicem, thoracem, lumbos, sacrum os, & coccy-
os partientes, neque diuersam uertebRARUM articulationis rationem repetentès, neque etiam
duodecimæ thoracis uertebRæ, aut quæcunque ea sit, quæ suprà infraq; suscipitur, & ossis sa-
cri quietem enarrantes, quot motibus dorsum agatur, modò recensamus. Vniuersum dor-
sum à capite ad sacrum usque os, instar semicirculi quodammodo in neutrum latus inclinans
flectitur, deinde in rectam ueluti lineam, in neutram uergens partem crigitur, postea in la-
tus quoque, nec antrosum, nec retrosum exporrectum, instar semicirculi quoque inuol-
uitur, ut iam quatuor simplices sint dorsi totius motus, flexio scilicet, & extensio, & ad dex-
trum, ac sinistrum latus inclinatio. atque hi motus (si qui alij corporis) in obliquum quoque
seu in alteram partem uergentes fiunt. Flectimus enim dorsum non solum rectà, sed etiam dex-
trosum aut sinistrosum magis inclinatum. sic etiam, quum ueluti in semicirculum ad latus
id inuoluimus, ad anteriora quoque, & ad posteriora, non autem solum rectà in latus, illud
ducere ualemus. Rursus hos motus, uti iam diximus, totum simul peragit dorsum, aut dorsi
parte, quæ sub ceruice est, quiescente, sola ceruix eisdè prorsus, quos iam toti dorso tribuimus,
motibus pollet, quos non solum quiescente reliqua dorsi parte ceruix obit, sed etiam reliquo
dorso, aut flexo, aut extenso, aut in latus inclinato, quandoquidem laxè admodum & priua-
tim ceruicem mouere homini utilissimum fuit, & imprimis quum in contrarios oppositos ue
motus reliquis dorsi partibus ceruix agi queat. Vtuncque enim lumborum uertebRas unà
cum thorace in anteriora flexeris, atque in flexione reseruaueris, nihil obstitit, quo minus cer-
uix in posteriora ualidè reclinari extendiq; possit. Lumborū autem uertebRARUM motus, à tho-
racis uertebRARUM motu non admodum distinctus est, unà enim ferè mouentur, præterquam
quòd lumborum uertebRas, laxior motus in omni differentia cō creditus sit, quod tum costa-
rum uertebRas thoracis adnexarum occasione perficitur, tum etiam musculorum, qui ipsis mo-
tibus præficiuntur. Totus enim thorax unà quodammodo in latus inclinatur, quum tamen
singulæ lumborū uertebRæ priuatim id magis possint. Verùm ut hæc omnia ossium articulatio
commonstrat, ita multò maximè hos motus ipsi spinales dorsales ue musculi docent, nimis
quàm frigide, & nequaquam omnes à Galeno descripti. Erunt autem omnes utriusque lateris
musculi simul in minimum numerū redacti, sexdecim, octo nimirum paribus complexi, quo-
rum ceruicis primum recensebimus, ab illis qui sub stomacho latitare dicuntur, exoriri.

Primus itaq; qui parem in altero latere secundum habet, à quintæ thoracis uertebRæ cor-
poris latere, ubi ipsi costa coarticulatur, principium sumit, quod carneum tenueq; & acuti
instar anguli uisitur, & sursum oblique conscendens, uersus medium magis quartæ thoracis
uertebRæ corporis, obliquo fibrarum ductu proficiscitur. Illæ nanque ab exterioribus, sur-
sum oblique in interiora præeunt adeò, ut iam ad tertie thoracis uertebRæ corpus utriusq;
lateris musculi ampliores facti, inuicem quodammodo uiciniores fiant, in exortu enim tan-
tùm ab inuicem distabant, quanta corporis uertebRæ est latitudo. Atque hanc feriem (ut scili-
cet ex inferioris uertebRæ corporis latere, principium seu explantationem ducant, atque ma-
gis uersus medium superioris uertebRæ corporis insertionem moliantur) perpetuò seruant,
quousq; sensim mutuò appropinquantes, ad anticam primæ ceruicis uertebRæ sedem usq; con-

b 4 scenderint

Quot moti-
bus dorsum
agatur.Sexdecim dor-
sum mouentes
musculi.Primus ac se-
cundus, seu pri-
mum par.figura cap.
4. h. hec
repropo-
nit.Scorfm
zulos ad
abimus.
tabu. E
14. 15
A. B.
ta. A. B.
ta. C. C.

scenderint, cuius ibidem extuberanti^d processui, nervosa in fessione simul ambo coeuntes, tanquam trianguli uertice inferuntur, non admodum manifeste occipitis ossi, ad anteriorem dorsalis medullae foraminis^e sedem implantati. Ego hos musculos duorum duntaxat loco, ut scilicet unus utrinque habeatur numero, quamuis ex Galeni sententia singulos, duorum uice, aut trium etiam nonnulli enumerasse uideantur, quod quibusdam (uti opinor) inscriptionibus, secundum ipsorum fibrarum ductum exporrectis, instarq; albae lineae apparentibus animum attenderint, quamuis interim haec neque semper eadem, neq; tam paucae appareant, ut eorum beneficio utrinque solum duo tres uel recenseri possent musculi, deinde etiam longe minus penetrant, quam ut in plures musculos alterius lateris musculum distinguere possent. At si musculi principis insertionibusq; dissectionum Proceres attenti fuere, multo pluribus, quam tribus musculis hic noster conformaretur, nam tres musculi ad tres superiores thoracis uerthebras ducerentur, & septem ad septem ceruicis, quare longe satius est, utrinq; unum enumerare musculum, aut, uti iam dixi, decem. Duobus his musculis ceruix proprio motu, & obscure caput ipsum flectitur, si enim utriusq; musculi partes simul omnes egerint, recta efficietur ceruicis flexio, uerthebris scilicet mutuo sese succedentibus, at si alteruter tantum in se colligatur, in contractu latus ceruicis inclinabitur, uti etiam musculi exortus, insertio, & fibrarum ductus, ipsiusq; continuas, luce clarius commonstrant. Ceterum hi musculi non solum ceruicem creduntur flectere, at etiam, uti paulo post audies, thoracis uerthebras superiores. Quod uero Galenus parum recte in Decimotertio de Partium usu hos musculos caput releuare, & sursum ducere docuerit, etiam si non prolixius id modo exequar, neminem latere sat scio. Tertius & quartus, quorum al-

Tertius &
quartus.

Præsentis figura musculi, quem hic describimus, fibrarum naturæ expressit, ac latera ruditer delineauimus. Significat igitur A ad B, ipsius latus uerthebris exporrectum, C ad B, latus secundum costam ductum. O autem ad A latus, quod ab anteriore costae sede, oblique sursum ad musculi apicem contendit.



stæ cartilagine, ad transuersum primæ ceruicis uerthebræ processum. Huius musculi & sui coniugis functionem orationi adiciam, ubi quintum & sextum expressero. Quintus itaque, qui sextum in sinistro latere sibi parem sortitur, principium in dorso assumit, ex transuersi sextæ thoracis uerthebræ processus radice, ad primum eius uerthebræ posterioris processus, seu spinæ exortum. Hinc ascendens ex reliquarum quinque superiorum thoracis uerthebrarum transuersis processibus enascitur, sensim crassior ualidiorq; redditus, quousq; admodum pertinaciter in externam sedem transuersi processus septimæ ceruicis uerthebræ, insertionem tentet, huius enim primum musculus inferitur, & deinde reliquarum omnium ceruicis uerthebrarum transuersis processibus, ad^e exteriorem eorundem sedem, quamquam inuolidam, & non admodum patentem, in transuersum primæ uerthebræ processum implantationem (ut neque etiam tertius musculus) perficiat. Quinto itaq; & tertio musculo, qui dextris uerthebrarum processibus inferuntur, ceruix duntaxat in dextrum latus inclinatur, recto quidem ductu, utrisque musculis una laborantibus, obliquo autem, alterutro duntaxat se colligente. Tertius enim, quiescente quinto, in latus quidem, sed magis antrorsum ceruicem inclinat, quintus autem in posteriora magis. Septimus musculus, cui in sinistro latere octauus respondet, a septimæ thoracis uerthebræ spinæ radice, deinceps & reliquarum succedentium uerthebrarum spinarum quoq; radicibus, ubi inuicem uerthebræ articulantur, principium sumit, non autem a spinarum lateribus, quæ^f musculo occupantur, quem decimum quintum enumerabo. Quando septimus hic musculus sensim ad ceruicem exporrectus, infimam ceruicis uerthebram contingit, uehementius amplioriq; sede ab illa enascitur, & obscuram admodum insertionem illarum fibrarum, quæ a thoracis uerte-

Musculi 3,
4, 5, 6, minimus.

Septimus &
octauus.

d 2, 10 fig.
cap. 15 lib. 1
M.
c 1 fi. ca. 19
li. 1 G.

f 7 id. G. 8
C. 14. ta. N.

g 1 fig. 19
ca. 11. 1 A, B
clatissima.

h 1d expref-
simus in 14-
bulis epitom-
es horam
librorum.

i 13 id. H.

k 9, 10 fig.
ca. 15, 16, 17.
c 8 fi. cha.
5, 6.
l 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

m 14. id. C.
13. id. I.

n 14. id. X.

uvertebris originem duxere, in illius uvertebræ spinam molitur. Reliqui autem cervicis uvertebrarum spinis ualide innascitur, atque ab earundem transversorum processuum radice, noua semper initia educit, enatas perpetuo fibras spinæ superioris uvertebræ tantisper inferens, donec ualidissimè in totam ^{7 fl. cap.} inferiorem spinæ secundæ cervicis uvertebræ sedem implantetur, ^{15 lib. s. f.} duntaxat uvertebrarum spinis inuicem dirempti. Horum musculorum fibræ, non prorsus recta sursum conscendunt, uerùm ab exterioribus sursum modicè intrò feruntur, quare etiam & hi quoq; musculi obliqui præfunt motibus. Si enim septimus unà cum octauo cōtrahatur, recta cervicis peragitur extensio, aut sinistro laborante, & quiescente dextro, sinistro sursum extensio fiet. Quemadmodum solius dextri lateris musculo contracto, in dextrum quoque latus cervix magis extenditur. Atque hi omnes, cervicis potissimùm famulantur motibus, ac inter musculos caput agentes subinde recenterunt, etiam si caput secundariò duntaxat moueant.


⁷ Tit. 4.8
⁸ h. 13. 15
⁹ 14. P.
¹⁰ 13. 16b. r.
¹¹ 14. 14. T.

musculos, seu lumborum carnes (ut Interpretis uoce utar) descripsit, & num etiam simia, aut canis (qui hic mulculis admodum ab homine uariar) ipsius narratio conueniat, penes te esto iudici. Ipse enim simia non admodum quadrat, & longè minus homini, quod tum demum (si modo Galeni, uti sanè debemus omnes, studiosius fueris) abundè intelliges, quando hæc nostra adhibitis sectionibus, cum ipsius oraculis contuleris. Nolo enim prolixius sermonem uera narrante, & aliàs satis diffusum quibudam discepcionibus hîc interrumpere, id satis effectus, si mea hæc cum Galeno puenire monent. Lebeuisti.

Nonus & da
cimus.

*In Quinto, et
secundo de Ad-
mi. sectio.*

Qui muscoli
in anteriori
lumborum se-
de occurrunt.



modum ad medium ossis ilium spinæ longitudinis confistit. Fibre autem ipsius, ab exterioribus introrsum oblique ad superiora ascendant, & quæ ab osse sacro principium ducunt, quintæ & infimæ lumborum uertebre inferuntur. quæ autem has ordine insequuntur, sensim in superiores uertebbras desinunt. Huic musculo, qui inter dorsum mouentes nonius mihi enumeratur, & decimo, qui noni musculi cõium est,

inferiōris dorsi p̄rtis, lumborum scilicet uertebra-
rum, flectendi munus concreditum est, ipsiq;
ambo duntaxat, illius motus autores sunt. Sed quum
horum utriq; unus consistat, & is obli-
quis donetur fibris, p̄sentes muscoli obliquam
quoque flexionem molientur, prout hic ille
ue solus in se colligitur. Sola itaque inferior dorsi
pars, proprios musculos flexionis opifices ex-
igit, quorum etiam beneficio media dorsi pars,
ipsa uidelicet thoracis uertebæ, quorum cor-
pora sunt ex carnea, nōnihil inclinātur superioribus
scilicet, unā cū ceruice, inferioribus uerō,
simul cum uertebis lumborū inflexis. Quanquam
non ineptē fortassis quispiam dixerit thora-
cis flexioni (quæ non nisi uniuerso thorace simul
inflexo perficitur) etiam rectos abdominis
musculos, thoracē deorsum trahentes, suppetias
ferre. Super sunt ad huc enarrationi sex mu-
sculi, in utroq; latere terni, in exteriori dorsi
sede repositi. ^{Vndecimus} itaque & duodecimus
dorsum mouentium utrobique sunt singuli, & soli
duntaxat ex se adhuc recensendis Galeno co-
gniti, quanuis etiam neque undecimi seu duodecimi
(quum par utriusque sit ratio) descriptio-
nem rectē nobis tradiderit. Vndecimus enim, quem
in dextro latere, uti duodecimum in altero
reponimus, ex longioribus totius corporis est
musculus, ab infima nanque ossis sacri sede, ad
primam usq; thoracis uertebra[m] exporrigitur,
illi thoracis musculo natura similis, quem ipsi
in exortu, & in lumbis progressu connatum, atque
in omnī costarum radicibus, ubi primum
a transuersis uertebra-
rum processibus abscedunt, insertionem moliri
diximus. Hic enim dorsi
musculus, de quo in p̄senti sermonem instituimus,
ex totius ossis sacri spinæ summo, secundū
ipsius longitudinem, & deinde ex spinis quinque
uertebra-
rum lumborū, neruo ualidoq;
admodum principio enascitur, quod illi, quem
in tota serie decimum tertium appellauimus,
infernitur. At principium id tota quoque ossis
ilium interna sede, quæ extra transuersam
ossis sacri regionem prominēt, carnosum omni-
no educitur, & ut sedes, a qua musculus exor-
tatur, acuta est, ita quoque acuti instar anguli
musculus uisitur. Hinc sursum ascendens, atq;
ueluti dicebam, admodum neruosus crassusque,
ab ossis sacri & uertebra-
rum lumborum
spinis principium ducens, carnosior paulatim
ad externū ipsius latus efficitur, transuersis
lumborum uertebra-
rum processibus insertus, ac ueluti teretis
musculi imaginem carnosam suam sede
exprimens. Si enim & neruoso ipsius, quod
ex spina pendet principio attenderes, latior
multo quam profundior dicendus esset, attamen
externa ipsius sede læuis æqualis ue est,
interna autem parte, propter suę carnosę
partis crassitiem, & neruosę tenuitatem,
secundū ipsius
longitudinem sinus quo dammodo illi incisus
uidetur, quo decimo tertio nobis enarrando
musculo cedit, & locum porrigit. Vbi uerō
ad undecimā usq; thoracis uertebra[m] conscendit,
arctior longē redditus, neq; reliquis
superiorum uertebra-
rum spinis adeo connatus, sensim ad
primam usque thoracis uertebra[m] angustior
redditur, transuersis omnibus thoracis uertebra-
rum processibus innixus, quibus singulis
ex interna sua sede, tendinē instar ansulę
cuiusdam cum ipsi articuli termino insertum
pari omnino modo, quo quartus hominis
thoracem mouens musculus, qui costis singulis
tendinē quoque offerebat, uerū is thoracis
musculus ab externo ipsius latere eiusmodi
tendines remotius a se dispargit. Dorsi autem
musculus, non ex altero latere, sed potius ab
interna anteriori ue sede tendines emittit,
non recto tramite, uerū oblique uersus
exteriora sursum expansos. Quemadmodū
etiam musculi fibrę, omnes oblique sunt.
Vnde quoque euenit thoracē
lumbosq; horum musculorū, undecimi
scilicet & duodecimi ope, rectā, & etiam
in latera extendi. Ambobus enim æquē
contractis, tota illa dorsi pars, cui p̄sentes
musculi inferuntur, in neutrum latus
uergens extenditur, ac altero tantum
protenso, in ipsius latus spina inuoluitur
extensionem experta, quod sanē nihil
minori negotio, quam ipsa sectio docet.
Decimus tertius, cui in sinistro latere
decimus quartus respondet, atque sub
undecimo occulitur, ab illa ossis sacri
sede principium obtinet, quæ ab ipsius
spina ad connexum eius, cum ilium offe-
pertinet. Atq; ut illa sedes sursum
ascendens modicē lateat, ita musculi huius
quoque initium, infima sede acutum
est, & latius modicē redditum, tandem
ad transuersum quintę lumborum
uertebra-
rum processibus initium ducens, ad
undecimę usque thoracis uertebra-
spinam
conscendit, & gracilior tenuiorq; factus,
inibi ad undecimę thoracis uertebra-
spinam
in acutum angulū finitur. Exortus, quem
decimustertius musculus ab osse sacro
ducit, sui coniugis exortui contiguus
est, quemadmodum etiam per reliquum
in altiori progressum p̄sentes muscu-
li inuicem cōmittuntur. Vtrique enim
se se inter spinarū interualla insinuan-
tes inuicem internis lateribus cōmittuntur,
tantū mutuo dehiscentes, quanta
ligamenti est crassities, quod inter
spinarū interualla reponi secundo
ab hoc Capite audietur. Horum
musculorum fibrę, ab inferioribus
sursum uersus interiora oblique
assurgunt, & ex inferiorum
uertebra-
rum transuersis processibus

Vndecimus
& duodeci-
mus.

Ad finem sili-
de Admi. secti-
onibus.

Decimustertius
& 14.

f. Ostendi
hoc 814.

g. 14. A.

h. 13. ta. p. 13
ta. N. 14. 14
bulla Q. R.
S.

i. 16. tab. L.
et ac ali-
ferre tibium
mouentes.
h. 14. tab. A.

l. 14. tab. T.
m. Quæ cō-
sistit ad fin-
istram H. 1.
figu. cap. 2.
lib. 1.
n. 14. ta. S.

o. 14. ta. Q.
p. 14. ta. R.

q. 14. ta. in
ter Q. et
R.

r. 15. ta. M.
M.

s. 12. tab. A.
decim. M.

t. 14. ta. T.
u. 14. ta. Q.
R. 3.
x. 14. ta. V.

y. 14. ta. X.

processibus, & spinarum radicibus enatae, in totam superiorum uertebra-
rum in posteriori se-
de amplitudinem perpetuo sese inferunt. Quotiescunque igitur utriusque lateris musculus in
se colligitur, suasque fibras contrahit, lumborum uertebra-
rum, & si quae thoracis sub uertebra
utrinque suscepta reperiantur, spinæ ad se inuicem conuiuent, earundemque interualla constri-
guntur adeo, ut simul contracti musculi totam illam spinæ partem, cui committuntur, apposi-
tissime extendant. at altero in se tantum collectio, in obliquum hæc dorsi pars extenditur, latera
lemque illam in semicirculum quodammodo inuolutionem patitur. ² Decimus quintus &
decimus sextus, utrinque etiam unus, ab undecima thoracis uertebra ad primam usque ipsius
protenduntur, totam spinarum amplitudinem, quæ ab ipsarum radice ad apicem usque confi-
sit, amplectentes, & uti postremo loco dicti, omnino carnei, sed ualidissimis nervosisque fibris
admodum intertexti. Hi musculi ³ ad duodecimam thoracis uertebra-
rum, aut ad eam, quæ utrin-
que suscipitur, tenues sunt, quemadmodum decim tertij quoque ad eandem uertebra-
rum infer-
tio tenuis prorsus uisitur, at sursum exporrecti paulatim crassescunt, ⁴ quousque ad quintæ
thoracis uertebra-
rum spinam ascendunt. hic enim tota sua mole crassiores euadunt, & sursum ten-
si, denuo extenuantur, ut propter primæ thoracis uertebra-
rum spinam, paræ crassitiem, cum illa,
quæ ad undecimam est, fortiantur. His quoque musculis interualla spinarum opplentur, & inui-
cem inibi contigui sunt, quum inter illos, ut & in lumborum uertebra-
rum spinis, nihil mediet,
præter membranæ ligamentum à superiori spina, in inferiorē porrectum, & illo ligamento
respondens, ⁵ quod inter radium ac ulnam, & tibiæ os ac fibulam, quæ hæc ossa inuicem dehi-
scunt, haberi dicam. Functio uero horum musculorum potissima est, spinas, quibus inferuntur,
mutuò colligere, atque ita eam dorsi partem, cui adnascuntur, cum reliquis musculis extendere.
Sed ut præsentis musculi inter reliquos dorsi motuum autores, rectis fibris magna ex parte do-
nantur, ita quoque ipsi admodum modicè obliquis motibus præfunt.

MUSCULORVM DORSVM MOVENTIVM

administratio. Caput XXXIX.

DORSVM mouentium musculorum administrandi ratio iam in prom-
ptu est, si huc ulque sectionis nostræ seriè obseruaueris. In anteriori enim
dorsi parte, illi etiam citra sectionem conspicui sunt, quos ¹ primum, & se-
cundum nominauimus. si uero horum ortum, & insertionem lubet ex
actius condiscere, illos à suis uertebis paruo & acutiori cultello abrades.
Deinde ² tercio à prima thoracis costa liberato, quæ transuersis ceruicis
uertebra-
rum inferatur processibus, examina-
bis. In lumbis quoniam peri-
tonæum, & septum quoque transuersum auulsa iam sunt, si hominem diuidis, licebit musculum,
quem nos ³ primum in lumbis recensuimus, ac femoris motibus famulare diximus, suo princi-
pio à uertebra-
rum corporibus liberare, & ad coxendicis usque os, à subdito illi ⁴ musculo, qui
noster lumborum secundus est, dorsum autem mouentium nonus, solis manibus diuellere, ut
omni ex parte nonus musculus in conspectum ueniat, quem ab osse ilium & sacro osse erasum,
à transuersis lumborum uertebra-
rum processibus, & earundem corporibus, & duodecima tho-
racis costa acutiori cultello discindes, eius naturam munusque non oscitanter intuius. At si ca-
nis, aut caudata simia ad manum sit, primò illum discababis, quem in illis animalibus membra-
neo neruoque principio, à coxendicis ossis elatiori sede enasci conspicias, quique oblique uersus
interiora sursum ascendens, ac carnosus auctus substantia, in superiorum lumborum & inferio-
rum aliquot thoracis uertebra-
rum corporibus inferitur, dorsi quoque flexioni subseruiens,
quam canes in circulum magis, quàm homines moliuntur. Si enim hunc indagaueris, Galeni
de lumborum carnibus enarratio, tibi aliquantulo reddetur dilucidior. Hoc igitur quo homines
destituuntur adempto, reliquos duos canibus & hominibus in lumbis communes in cane quoque
discababis, ut nonnullam in illis quoque musculis differentiã Galeni intelligendi gratia intuearis,
& mireris pariter, quid Galeno in mentem uenerit, quod subinde aliorum Anatomicorum uera
euerat dogmata, quod secus corporis humani partes docuissent, quàm ipse suarum simiarum
partes obseruauerat. Atque ita demum ipse expendito, quoties propter pietatem in Galenum,
ab ipsius locis à ueritate absolis mihi temperem, eorumque uolens nullam mentionem faciam,
simulque breuitati parcem. Resupinato igitur iam cadauere, ⁵ quintum musculum à thoracis
uertebis, paruo cultello continuo derades, donec illum in omnibus insertionibus conspexeris.
Huic septimus succedet, similiter à uertebis deradendus. At in hac functione cauendū est,
ne decim quinti musculi portionē septimi loco abscindas, inuicem enim pertinaciter herent, &
decimus



Administratio primi & 2.

Tertij & 4. Noni & 10.

Ad finem & de Administratio omibus.

Quinti & 6 Administratio.

Septimi & 8.

Vndecimi &
duodecimi.

decimus quintus septimi musculi principium aliquouſque^b ſubit. Nunc nouacula, aut ualido acutioriꝝ cultello, ſecundum ſpinarum in lumbis & in oſſe ſacro ductum, tentanda eſt ſectio, quæ^c undecimi musculi principium à ſpinis liberet. Ne uerò ſimul^d decimum tertium (ut Galenus proculdubio in ſimijſ alioquin ad ſectionem aptiſſimis fecit) imprudens auferas, ac decimi partem eſſe arbitreris, ſectio illa non altius injicienda eſt, quàm ut undecimi duntaxat exortu diuidat, atq; huius craſſitiem facile cõiecturabis, ſi paruo cultello musculũ à tranſuerſis lumborũ uertebrarũ proceſſibus eleues, atq; à decimo tertio ſubleuatũ, ad ſpinas quoq; uertebrarum illũ inuertas. Hoc itaq; musculo à lumborũ, & oſſis ſacri ſpinis liberato, cauendũ eſt, ne illũ thoracis uertebrarũ ſpinis ad eò connatũ arbitreris, ut^e decimũ quintum musculum unã cum undecimo auferas, atq; cum reliquis omnibus Anatomicis hallucineris. Poſtquam igitur internum musculi latus, utcunq; à ſubditis connatisq; ſibi partibus diremptum conſpexeris, ab ilium quoq; oſſe deradetur, & principio ipſius apprehenſo, ſenſim musculum attolles, ipſum ab illis, quibus inferitur, partibus liberans, ut tandem intuearis^f tendines illos, quos à ſealoeſ radices inſtar, in tranſuerſorum thoracis uertebrarum proceſſum apices elegantiſſima ſerie digeri. Hoc adempto, citra aliam ſectionem^g decimum tertius, & decimus quintus, ſunt in conſpectu, ut tamen illorum naturã ad amuſſim inquiras, neceſſum eſt & hos quoque à uertebris ſedulo deradere, quod ſanẽ in ſpinã musculis eo operoſiſ præſtiteris, quo iſdem pluribus oſſibus & innascentur, & à pluribus ortum ducant. Ob quod laudandus etiam uenit rerum Opifex, qui ita musculos hos fabrefecit, ut ſeorſum unam quanq; dorſi partem ſuccedentibus motibus agere poſſimus, ne ſimul uniuerſum, multas actiones impedituri, mouere cogamur. Cæterum ubi & hos abſtuleris, tranſuerſam duces ſectionem, quæ ſacrum os & inſimã lumborum uertebram, ab anteriori fede, ad dorſalem uſque medullã penetret, ut deinde in flexo unã cum coſtis thorace, dorſum ab oſſe ſacro diuidere queas, uertebrarum ligamẽta iam indagaturus.

Decimũ tertij
& 14, 15, 16.


DE VERTEBRARVM LIGAMENTIS.

Caput. XL.

Ligamenta
vertebrarum
corpora com-
munitentia.
L. de Oſſi-
bus.



LIGAMENTA primam uertebrã capiti, & ſecundam primã, & ſecundam rursus capiti colligantia ſuperius enarraui, quæ autẽ reliquas uertebras inuicem cõiungunt, nunc pertractabo, ab illis, quæ uertebrarum corpora colligant, ſermonis facturus initium. Inter ſecundã itaq; & tertiam uertebrã ceruicis, ac deinceps inter reliquarum omnium uertebrarum corpora, ſubſtantia quædam reponitur, quam Galenus Cartilaginem uocat, & qua uertebras inuicẽ haud colligari, aliter, ac qui illum præceſſerunt diſſectionis Proceres, aſſerit. Nam nõ huius cartilaginis beneficio ipſas cõmitti uult, uerũ tertiam dorſalis medullæ tunica inter uertebrarũ corpora ſe inſinuãtis interuentu. Cuius modi uerò ſit tertiam hæc tunica, in dorſalis medullæ proximẽ adnatas, uertebrarũ amplitudinem (quæ dorſali uiam præbet) membrana quadã oſſibus undiq; cõnata ſuccingĩ audies. Eiuſmodi in uertebrarum amplitudine occurrẽs membrana, nihil prorſus, niſi fortaiſſis craſſitie ab illa diſfert, quæ quoniã oſſi circũducitur, *σπίλον* Græcis nuncupatur. Num uerò Galeni ſentẽtiã, an Veterũ illorũ, qui in diſſectionibus, quantũ Galeni ſcripta liquidò oſtendũt, admodũ fuere ſeduli, accedendum ſit, penes te eſto iudiciũ. Nam & ſi humanũ cadauer ad manũ non ſit, nõ tamẽ fieri poterit, quin tibi iam à lectione ſurgẽti, alius cuius animalis dorſum menſe adhibeatur, uel etiãſ piſce uel ſcendũ erit, ac proinde uel ludi cauſa (dum modo diuina illa Diui Hippocratis in Libro de Articulis oracula non faſtidieris) unã uertebram ab alia ſeiungito, & quacunq; etiam corporis adhibita cartilagine, tecum perpendito, num illa uertebrarũ cartilago, exquiſite cartilaginis naturam obtineat, num uerò ligamẽti cartilaginofa. Hac enim ratione manibus pedibusq; in Veterum ſententiam, relicto procul Galeni placito, iturus es, neq; tibi perſuade-



Ve leuiori negotio, quæ hic pertracto, aſſequaris, duas e rhonace uertebras, anteriori facie ex puerili corpore depicẽdas habes. In quibus 1. notat ſuperioris uertebræ cartilaginẽ, ſui corporis inferiorẽ appẽdicẽ, 2. ipſuſq; corpus interuentum, 3. cuiſdẽ uertebræ humiliores appẽdicẽ, 4. cartilaginẽ ligamentum, ſuperioris inferioriſq; uertebræ appẽdices intercedẽs, 5. ſuperiorẽ inferioris uertebræ appẽdicẽ, 6. cartilaginẽ, diſtẽtem modò appẽdicẽ ſue uertebræ copulãtem.

ri ſines, membranam quandã, cuius beneficio uertebræ inuicem cõnecterẽtur, duci inter uertebrẽs os, & cartilaginẽ hanc ligamentofam, fibroſam, mollem, mucofam, neq; cartilaginis modo ſolidam cõtinuam uel ne forte duntaxat de duritiẽ loqui uideamur. Quum tamen hæc expendes

b 1 Ad a 4
tabulæ.
i 15 tab. r.
h 14 tab. T.

l 14 tab. Y.

m 13 ta. M.
M.

n 14 ta. T.
o 14 ta. Y.

a Neque
hæc etiam
ligamẽta ſe-
cus, quan-
quis ad oſſi-
um circum-
ſcriptionem
ſingere poſ-
ſet, propon-
re nobis li-
cuit, quæ
etiam ad oſ-
ſis conſe-
res.
b ſi. ca. 14
l. 1 B, R.

pendes, sedulo cauendū est, ne in agni aut hœdi, aut recens nati uiculi spinā incidens cartilago, inter appendicē corporis uertebrae, & ipsum corpus repolita, tibi imponat, illamq; cartilaginem esse arbitreris, de qua hic sermonē instituimus. Quin potius in illis uertebribus perpendito tres cartilagini, ut sic dicā, ordines duobus ossibus inter duas uertebrae dirēptos, ac postmodū illis ordinibus animaduēsis, cartilaginem naturas obserua, firmitusq; adhuc Veterū dogmata subscribito. Conspicies enim duas cartilagine inter utrarumq; uertebrae corpora, et ipsarū appendices positas, ad amissim esse cartilagine, nihilq; ab illis differre, quæ reliquos appendices & ossa interueniunt. At cartilaginem inter appendices mediā, profectio (nisi Galeni nomine oculis parū fidas tuis) nihil, prorsus aliud quā ligamentū esse dices, quod Asclepiadū familiæ, quæ pueros suos in caduerū sectionibus tanta cura exercebāt, *νόστος γὰρ δὲ πάλαι οὕτως οὖρα* appellauerunt, atque huius interuenti, non autem tertiæ dorsalis medullæ tunicæ, uertebrae corpora colligari astrues, nulla interim interueniente membrana. Quapropter si Veteribus accedis, inter ligamenta cartilaginis natura pollentia, has uertebrae cartilagine cōnumera. Ceterū alijs adhuc ligamētis uertebrae corpora colligantur, per totā enim dorso longitudinē, ualidissima ligamēta toti uertebrae corporū ambitui obuoluuntur, quæ etsi undiq; crassa, spissa & robusta, sed mucoso interim humore oblita sint, attamē in anteriori corporis sede ad utrūq; latus, ob sui crassitiem conspectiora euadunt. Quum itaq; hæc ligamenta, aut si unius nomine omnia complecti uelis, ligamentum hoc durum forteq; euaserit, et omnibus uertebribus ex quo obducatur, obstaculo sanē est, ne in extensione dorso nimium porrigatur, incurretur uel. Dorso enim si plurimum reflecteretur, stomacho, arteriæ magnæ, & uenæ cavae fuisset summē noxiū, plerumq; enim hæc extensa frangerentur, & si plus satis laxa, et ad extendendū promptā hæc Natura creasset, in dorso flexu in se cōplicarentur. Est itaq; ligamentum id ita in duritie tēperatum, et suo mucore, ut Hippocrates dicebat, imbutum, ut tantum extendi dorso permittat, quantum homini sit ex usu, & ut tutō simul uertebrae colliget, & dorso ex tot conformatum ossibus, unius corporis modo efformet. Rursus ex singulis transversis processibus in singulos, membraneum ligamētum tota interuallā amplitudine porrigitur. Sic etiam in spinarum interuallis, ab una spina ad alteram, membranea ligamenta continentur, spinas inuicem colligantia, & ueluti musculorum interstitia. Ac in uertebrae apicibus hæc membrana ad eō crassescunt, ut ad apicem simul cōeūntes quasi toti dorso spinæ ligamentum constituant, cartilaginis etiam naturæ compos. Deinde ubi ascendentes uertebrae processus descendentes coarticulantur, membranea quoque ligamenta (sed perquam ualida) articulum undique ambiunt. At priuatum quoddam idq; subflauum ligamentum, omnibus corporis ligamentis si non robustius, profectio saltem non inualidius, inter singulas uertebrae habetur. Ex interna enim sede foraminis uertebrae, quod dorsali medullæ exsculptum est, ad radicem spinæ posterioris uertebrae processus inter duos ascendentes, aut descendentes processus ligamentū exoritur, quod semper in subsequēntis uertebrae eandē sedem inseritur. Quod uerō nihil interstiti, nūā superiori uertebra ad inferiorē, aut contrā, ab inferiori in superiorē ligamentū inseri dicā, cuius manifestum esse arbitror, nam etsi hinc ligamētum enasci, et illic inferi dixerō, neminem ambigere putarim, utrumq; os, seu utrumque, qui enarratur, locum, parcm operam ad ligamēti generationem conferre. In canibus, & illis animalibus, quæ rectum tergo leui opera accōmodant, & longē laxiores ceruicis uertebrae articulos, & etiam longiores ceruicis uertebrae, quā homo obtinent, ligamentum quoddam obseruamus, cuius naturam Galeni gratia hic non grauior subiungere. In canibus igitur simulatque secundum par musculorum capitis motibus famulantū aggressus es, in ceruice ligamentum sese offert rarum, & nulli in uniuerso corpore respondens, nisi fortassis illis uertebrae ligamentis, quæ postremo loco recensuimus, id enim cæteris durius est, & colore flauum, & in fibras multas dissolui potest. Enascitur autem id ex apicis septimæ ceruicis uertebrae spinæ lateribus, & sursum ascendens, nulli connascitur uertebrae, quousque ad secundam ceruicis pertigerit, cuius spinæ lateribus in summo apice inseritur. aliquibus quoque animalibus, ut ouibus, occipiti ossi inseritur. Ligamentum hoc peculiari inuolutū est membrana, geminūq; apparet ob impressionē illius longitudinē exporrectionem. Porro huius ligamenti naturā discere licebit, quoties uiculi, aut porcelli, aut hœdi, aut uetustioris etiam bouis ceruix mensæ apponitur. Est enim ligamentum hoc, flauum illud corpus, quod ex carnibus liberatum canibus offerre solemus, nam inter reliqua corporis ligamenta solum tanquā efusi inceptum reijcitur. Vnde etiam à robore Bruxellenibus Vvas nuncupatur, qui huius esum puellis ad comam prolixiorē cōciliandam commendant, hinc opinor ipsas ridentes, quod uelut in comam inter reliquas corporis partes dissoluatur, et præterea flauī pallidīq; coloris uisatur, hoc præcipuo usu accommodum est, ne uertebrae ceruicis suo

*Ligamēta alij
scilicet,
quā ad cor-
pora uertebra-
rum posita.*

*Propria est
num ligamen-
ta.*

Administra-
tio ligamentor-
um.

loco promptè exiliant, quum illæ laxè admodum coarticulentur, & præ cæteris uertebreis admodum obliquè agantur. Atq; ita etiam in bobus secundum totius dorsi longitudinem ferè, utrinque unum amplum huius naturæ ligamentum, inter musculos dorsum mouentes occultatum, secundum spinas ferri conspiciamus, quale Galenus hominibus ferè in Libris de Partium usu tribuit. Ligamentorum dorsi administratio peculiare nihil obinet. Quum enim spinales dorsales uel musculi omnes adempti sunt, in anteriori dorsi parte, secundum omnem corporis uertebrearum circumferentiam, membrana illa duraq; & mucore quodam imbibita ligamenta in conspectu sunt, quæ cultellis paruis transuersem ipsi subditis, à uertebrearum corporibus liberare potes, non præteriens haud unum hic simplexq; ligamentum apparere, ac uelut multas membranulas inuicem incumbentes adnatasq;. Postmodum costis à uertebreis dearticulatis, earum quoq; ligamenta inspicias, quemadmodum & membrana illa transuerforum processuum et spinarum interualla occupantia. Ut uerò ad amussim cartilagineum inter uertebrearum corpora ligamentum uideas, aliquot uertebrae inuicem sunt cultro aliquo dirimendæ. Dum uerò uertebrae, quarum corpora iam seiuixisti, in spinam reflectis, & dorsalem medullam extrahis, tunicam membranæ uel, uertebrearum cauitatem sublinentem intueris, atq; uertebreis ab inuicem prorsus dissectis, ualidum illud ligamentum occurrit, in medio ascendentium descenditumq; processuum locatum. Reiectis nunc uertebreis, & aliquò quod adhuc ex reliquo corpore superest, reposito, scapulam & brachium, quod reponi antea uolebam, repetes, musculos qui humerum, cubitum, & extremam manum amplexantur, iam sciatim aggressurus.

DE MUSCULO NERVOSA SVA EXI

litate mediæ uolæ, & internæ digitorum cuti subnato.

Caput XLI.



Lib. 2. de Ad-
mu. Cy. 1. et 2. de
V. su. par.

VANDOQVIDEM musculos ea doctrinæ serie exequi semel institutum est, quo in uno corpore omnes administrare soleo, commodum fore arbitratus sum, nunc musculos in summa manu, & cubito & brachio repositos priuatis Capitibus aggredi, ac postmodum communi omnium Capite, ipsorum confectionem, atque simul collectorum numerum subnectere. Ut itaque Galeni ordini in his musculis, quos cæteris omnibus prolixius descripsit, me accomodem, à musculo exordiar, qui propemodum toti depili, nudæq; manus regioni, dilatente neruosa ipsius exilitate subtenditur, ac neruoso tereti^h principio, ex interioris humeriⁱ tuberculi apice enascitur, medioⁱ duorum brachiale flexibile^h musculorum (qui ex eodè tuberculo prodeunt) incubens adnatusq;, nō tamen in illorum capitum medio (ut alij scribunt) repositus. Principium hoc illico carnosum crassiusq; redditū, musculi uentrem non impensè crassum constituit, qui priusquam ad medium longitudinis cubiti obliquè nonnihil, uersus mediam cubiti amplitudinem ductus proreperit, rursus tenuis gracilisq; factus, in tendinem angustum, sed ampliorem, quàm profundiorē, & neutiquam prorsus teretem cessat. Hic ad brachialis usque radicem pertingens, sensim in brachialis interiori sede latescere incipit, ac summe manus cuti, ad extremam usque digitorum aciem subnascitur. Atque id fibrosis nexibus adeo ualidis continuisq; perficitur, ut internam manus cutem à neruosa tendinis tenuitate, uel etiam acutiori nouacula liberare arduum sit. Verū internam Galeni suffragio acquiescendum minimè est, si hunc toti depili manus summæ cuti in hominibus subnasci (ut de suis docet simijs) arbitratus fuerit. Siquidem tendo mediæ uolæ cuti in palma tantum subnascitur, non autem cutem contingit, quæ obducitur^e musculo, quem paruum digitum à cæteris in obliquum abducere docebimus, neque etiam cuti subtenditur, inuestienti^h musculofam carnem, quæ primo pollicis articulo incumbens, ex pluribus muscularis constituitur. Ad hæc, nullæ huius tendinis portiones in digitorum latera excurrunt. quinimo per quam obscurè præsens tendo, internæ etiam digitorum regioni obnasci uisitur. Musculus tendinem hunc producus gracilis est, atque in cubiti medio super reliquos huius regionis, uti monuimus, exporrigitur, nulloque peculiari ligamento ulla ex parte amplexus, in summa duntaxat manu dilatescit. non enim decuisset hunc magnum extrui, quum nullius ossis motu illum præfici credamus. Vt enim cutis circumactū pertinax depilisq; fieret, ac proinde ad accuratius sentiendum manus aptior efficeretur, cuti internæ summæ manus, hunc tendinem substerni (sed fortè nimis) nobis persuasum habemus. Conueniebat namque, ut manus apprehendens instrumentum, hanc internam ipsius cutem adipisceretur, non modo ægre

Quis modi in-
ternam sum-
mæ manus cu-
tem parari de-
cui.

a 1 tab. Y. a
ta. h. 3. ta. n.
4. ta. n.
b 3 ta. i.
c 1, 2. fi. ed.
23. li. 5.
d 4. ta. u. u. 18
A, alter m.
qui etiam
9. ta. 2. indi-
catur. ubi
etiam spe-
ctabitis cha-
ract. q.
e 3 ta. li. ad l.
f sub l. 3. ta.
bule.

g 3 ta. n.

h 3 ta. p. q.

dò ægrè mobilem, cum ob alia quædam, tum maxime ob exactiorem tutioremq; corporum comprehensionem, sed & cutem totius corporis, reliqua cute sensu exactiori præditam, internæ manus sedi merito obduci decuit. Non enim aliud apprehendēs, & aliud tangens instrumentum esse oportebat, neque denuo aliud quidem, externa corpora leuando & transferendo, aut omnino pertractando assumere, aliud uerò post hæc de apprehensorum calore, frigore, duritie, & mollitie, alijsq; quæ tactu percipiuntur, qualitatibus iudicare ex usu erat. Sed mox ubi manus quiduis apprehendit, satius fuit hanc apprehensi naturā unā cognoscere, idq; internis duntaxat partibus, quibus quoque est apprehendens organum. Si igitur propterea tangens organum oportuit eam fieri, quoniam & apprehendens est instrumentum, iure manus eisdem partibus tangens, quibus apprehendens extructa est. Quanquam non huius tendinis beneficio, manus accuratum tactus sensum nanciscitur, uerum plurium neruorum auxilio, ex quibus ad singulos digitos¹ quatuor surculos in Quarto libro propagari docebimus, duos nimirum externæ digitorum sedi, et totidem internæ, qui exteriores mole admodum superant. Confert quoque non parum ad exquisitum tactum, depilem esse interiorem manus cutem, quod eam à tendine sub illa dilatato præcipue obtinere Galenus affirmat. si enim admodum pilosa foret, nequaquam sibi appropinquantia tangeret, quod pili nimirum tangendo corpori ante cutem occurrerent, illiusq; contactum arcerent. Quoniam autem tendo iste etiam huius regionis cutem duram efficit, cuius manifestum est, et id ad plurimos usus nobis conducere, horum itaq; gratia, tendo internæ manus summæ cuti subnatus est. Ostendi uerò non semel Patauij et Bononię hunc, quem narramus, musculum ceterò defuisse, ac portionem tendinum brachiale flectentium, priusquam illi brachiale ascendant, in latum tendinem desisse. Interdum uerò non ab illis tendinibus portionem, quæ lati tendinis uicem gerit, porrigi uidimus, uerum à² ligamento transuerso tendinibus in interna brachialis sede obducto. Quemadmodum etiam in hominibus secus, atq; in simijs, sub pede nullus tendo dilatescit, nam à calcis osse in³ membranam nasci audies, lati tendinis naturam appositissimè exprimentem. Cæterum interim ob nonnulla Galeni loca haud colligendum est, hos tendines neruam ue naturam, cuti citra alicuius interuentum adnasci, aut nullo intervallo cutem à tendine semoueri. Inter tendinem namq; & cutem in manu et pede, adeps plurimus continetur, cuius naturam iam iam explicabo, illum aliorum Anatomicorum more carneam substantiam nuncupaturus, neq; hanc solam habent homines, imò canes plurimam quoque obtinēt. Vniuersum enim tuberculum, quod ad illorum quatuor digitorum radicem prominet, & quo pedem præcipue figunt, adiposæ eius substantiæ præsentia extuberat, utcumq; interim adipe inter carneam membranam & cutem, simiæ ac canes prorsus destituantur.

Musculus
suo
tendine latif.
centem, non se
mel desisse.

Inter cutem
& tendinem,
adipem repo-
ni.

Lib. 2, 3 de
Vsu part. et 1,
2 lib. de Admi-
scitionibus.

DE CARNEA SUBSTANTIA, IN-

teriori digitorum regioni, ipsorumq; radicibus, & mediæ uolæ
superstrata. Caput XLII.

SUBSTANTIAM præsentī Capite describendam nulla figura expressimus, neq; illam secus delineare integrum erat, quā cutem & adipem in dextro pectoris latere fingere conati sumus in uigesima quinta Quinti libri figura.



ER uniuersam quatuor digitorum, & secundi tertijq; articuli pollicis longitudinem, ac quatuor manus monticulos, quos in Chiromantia ad quatuor digitorum radices reponimus, & ad uolæ medium, carneam quædam substantia reperitur, quæ inter latum¹ tendinem & cutem partim interiacet, partim (sed minori portione) tendini subiicitur. Cæterum hæc substantia non quidem, quemadmodum in musculorum uentribus exacta simplexue caro existit, sed substantia quædam subalba, & (quo id aptius explicem) duriori neruosoq; adipi, seu pinguedini respondens. Opinor enim ab ossæ, & neruæ, quæ undecunque pinguedini huic accedit substantia, ipsam duriores effici, illius ritu, quæ in ossium articulis subinde colligitur. Præterea pinguedo hæc, frequentibus² neruorum fibris, uenarumq; terminis adaucta, medium quippiam inter carnem & induratum adipem adipiscitur, ac etiam in summè extenuatis, & marasmode mortuis ipsius portio semper inter secundum aliter, quā reliquus adeps occurrit. Verum Arabes hallucinantur, hanc substantiam extra musculi corpus, carnem simplicem immixtamq; esse affirmantes illorum modo,

c 2 qui

qui nescio quam, simplicem carnem in gingivis ac pene collocant. Haudquaquam enim expenderunt innumeras nervorum fibras, & capillorum modo tenues uenas, hanc substantiam intercurrentes, illamque nec colore, uel substantia, nec a qualitate continuitate uel etiam musculorum carnem (quæ alioquin tot fibris implicatur) referre. Natura huiusmodi substantiæ, quam nisi duriusculæ conglobatæque pinguedini ad amissum assimilaueris, tanquam stratum aliquod, aut terram præparauit, cui apte infiniti nervulorum furculi implantentur, quos ob exquisitum tactus sensum, à maioribus nervorum propaginibus, internam manus sedem aduentibus diffundi undique oportuit. Cæterum, etsi hæc pinguedo durior admodumque neruea sit, nihilominus in rerum substantia mollis est, ac proinde occurrantibus cedit, et ad aliud quippiam, neque id minimum, digitis conducit. Media enim inter digitum flectentes tendines, & dura, quæ apprehendimus, corpora reponitur, & aptissimè tendines, ne aut premantur, aut contundantur, munit, unde etiam meritò huius substantiæ quàm plurimum infernæ pedis cuti subijcitur, præterea ossium rectitudinem tunc corrigit, quando in circulum manus quippiam est comprehensura. Ac proinde externæ digitorum regioni hanc rerum Opifex minimè communicauit, ut quæ ibidem inutile pondus digitis inferret. Haudquaquam ergo, neque illo absolutissimo indigeat tactus sensu, neque quicquam in obliquum apprehendat, neque toties subulas scalpellæ, & id genus artium instrumenta propellat. Quinetiam in interna manus fede, ipsis quidem articulis minimum, in partibus uerò inter articulos medijs, plurimum huiusmodi substantiæ industrius rerum Conditor produxit. Haudquaquam enim ossium sedes, quibus illa inuicem coarticulantur, huiusmodi substantia indiguit, quæ flecti debeat, & substantia ea, præterquam quod nihil commodi præstaret, obstaculo motui fieret, tum grauens ut superflua, tum etiam articuli spacium excludens occupansque, & etiam prohibens, quo minus articuli in acutos angulos flecti possent. Latere autem digitorum tantum eius substantiæ adnutriuit, quantum medias ibidem regiones, quæ uacue mansissent, repleere potuit, quo et inde manus, non solum ut diuisum in multas partes organum, sed etiam uelut uariè diuisum suo munere fungi ualerent. Adductis enim inuicem digitis, ita eorum media regio ab hac substantia oppletur, ut si quid etiam liquidi manu supina continere libuerit, id non elabatur. Postremò huius substantiæ beneficio extrema manus, illa mollit, subigit, & terit, quæ mediocriter mollia, molientibus & terentibus organis indigent, qualia per omnes artes sunt plurima. Quantum uerò huiusmodi substantia ad corpora summis digitis apprehendenda auxilij præstet, nemini non perspicissimum est, quem minimè latet, si ossium finibus nihil, quod cederet, appositum fuisset, ea facile debuisse rumpi, nec illis potuisse plurima corpora eleuari. quod modo huius substantiæ, & renitentium illi unguium opera obimus felicissimè. Atque eiusmodi sunt huius substantiæ proprii usus, communis uerò, quem cum carne adipisque parem exigit, is censetur, quo æstus tempore refrigerare, frigoris uerò calefacere apta putatur.

DE MUSCULIS MANUS DIGITOS

mouentibus. Caput XLIII.

Digitorum
motus.



QUOD SIVM quinque digitorum constructionem superiori Libro prosequentes, longè aliam articuli speciem in primis quinque digitorum internodijs, & in secundo pollicis haberi scripsimus, quàm in secundo & tertio quatuor digitorum, & tertio pollicis internodio. Hæc nanque internodia mutuo ea articuli specie ingrediuntur, quam γγγλυμοι Græci uocant. Superius enim os in suum inferius excipit, ipsumque inferius in suis finibus superioris ossis tubercula admittit. Vnde etiam simplicem tantum motum hæc internodia, seu articuli exigunt, qui extensione & flexione nusquam ne tantillum quidem in latus declinantibus perficitur. At quatuor digitorum prima internodia in articulatione cum illis, quibus sustentantur ossibus, coarctantur. Vnicus enim inferioris ossis sinus, unum caput superioris ossis excipit, quapropter etiam non simplici tantum motu, sed duplici aguntur, flexione nimirum extensioneque, & postea ad latera obliquo deductu inclinantur, seu ut semper loqui instituimus, ad hos illæque digitos adducuntur, uel abducuntur. Porro cuius perspicuum esse arbitror, nihil referre num flexionem & extensionem simul pro simplici motu, aut pro duplici, ut unus scilicet flexione, alter uerò extensione perficiatur, enumerem, aut rursus motum, qui in latere sit, unius loco habeam, aut duorum motuum uice recenscam, ut scilicet unus in hoc, alter uerò in oppositum latus perfici dicatur. Cæterum hos omnes digito-

a Seriatim
hanc ostendunt
figura
ca. 27 lib. 1.

digitorum ossium motus uiginti & octo musculis celebrari docebimus, à digitos flectentibus sermonem inchoaturi, in quo^h musculi cuiusdam brachiali inserti necessario incider mentio, quem quia cum digitorum musculis numerabimus, hoc Capite nouem & uiginti describentur.

Primi musculi^d principium teres, & statim ab exortu grande, ac ex carne neruea^q substantia mixtum, ex interiori humeriⁱ tuberculo enascitur. non quidem ex superiori magisq^q prominente tuberculi sede, sed ab interiori subⁱ musculi ad summam manus internam cutem latum tendinem porrigentis, &^s duorum quos brachiale flectere audies, capitibus, præterea & sub^h illius ferè musculi origine, qui inter radium in prouum agentes, superior enumerabitur. quanquam potius ex anteriori sede & inferius illa origine, primus hic digitorum musculus initium ducat. Musculus iste à crasso alioquin suo exortu latior efficitur, atque uersus ulnæ radij^q medium perreptans, perquam obscure ab ipsis principij sui portionem assumit. Hinc exactè carnosus et teres, in amplitudinem tamè modicè depressus, ad brachiale prorepit. Antequam uerò brachialis radicem contingat, notabili satis à brachiali interuallo,

ipsius uenter in angustum magisⁱ coactus, in quatuor carnosas partes diuiditur, quæ singule neruosiore angustioresq^q factæ, ilico in exactos tendines cessant. Hi examussum teretes simul communi membrana utcunque tenui & mucosa inuoluti, brachialis cum cubito articulum ipsumq^q brachiale transcendunt, communi omnes^s ligamento in brachialis sinu obducti. Est autem ligamentum id ualidum, & transuersum, ex una brachialis parte in alteram pronatum, anuliq^q formam (quod ad eius cavitatem spectat) præcipuè referens, & totam brachialis sinus amplitudinem, quæ ex ipsa originem ducit, succingens. Simulatque uerò tendines ligamentum id præteriere, inuicem diducti, tres acutos & interuallis pares constituunt angulos, & singuli unumquemq^q quatuor digitorum sibi præpositum adeunt, ac secundi digitorum ossis radici latiores membranci^q facti inferuntur, toti ossis longitudini implantantur.

Dum uerò primus digitorum os perreptant, transuerso quoque & robusto admodum ligamento obuoluuntur, quod ex uno ossis latere natum, alteri inferitur: aut potius id ex tota internæ ossis sedis amplitudine enatum, canalem oblongum seu anulum effingit, quo primi musculi tendo unà cum^m alio quem huic subijci dicemus, per digiti longitudinem securissimè deducitur, ac ne sua sede à digito declinet, eleuetur uè, pulchre amplexitur, ita tamen ut tendini liberum iter citra omnem connexum per ligamentum pateat. Tendines enim quæ primis digitorum ossibus porriguntur, neque transuersis ligamentis, neque ossibus, uel quouis pacto adnexi hærent, sed ligamenta uelut per anulos sibi laxè exculptos, minime impediti perreptant. Cæterum his primi musculi tendinibus^s ubi primo digitorum ossi incumbunt, & priusquam secundum conscenderunt (quanquam secus Galeno uisum fuit) peculiarerarumq^q ex abundanti id accidit, quod longa sectione diuisi, alium ipsis substratum transmittant tendinem, de quo statim ac præsentis musculi functionem sermoni addidero, sum pertractaturus. Functio autem ipsius est, secundum quatuor digitorum os flectere, illud brachialis medio ubi inuicem adhuc ipsius colligantur tendines, quam potest proximè adiuuens. Et quemadmodum minimi digiti secundum os, cæteris digitorum secundis ossibus minus est, ita quoque & eius digiti tendo reliquis tribus gracilior uisitur, ut & illa musculi carnosæ pars parui digiti tendinem promens, cæteras gracilitate superat.

Secundus musculus^s primo subiectus ab interiori humeriⁱ tuberculo sub primi capite, sui initij uix aliquam portionem assumit. Ex ulnæ enim anterioriⁱ processu, quo illa humero coartatur, secundus hic musculus potissimum enascitur, idq^q præcipuè ab eius processu radice, quandoquidem ipsius superior pars seu apex, illiusⁱ musculi excipitur insertione, qui inter cubitum flectentes est posterior. Secundus itaque musculus hincⁱ prodiens, exactè carnosus & teres (nonnihil latus tamen, & ut primus modicè depressus) euadit, & mediam cubiti sedem comprehendens ulnæ adhuc adnascitur, à qua exortus sui robur non modicum ea sede asciscit, qua ulnæ^s membraneo connectitur ligamento, inter radium & ulnam tota cubiti ferè longitudine consistenti. Quando uerò musculus parum ultra mediam cubiti longitudinem descendit, aliquanto angustior redditus, in quatuor carnosas portiones similiter ac primus finditur, quæ ante brachiale in teretes cessant tendines, tanto primi musculi tendinibus ipsiorem, quantum secundi musculi moles primi magnitudinem superat. Hi tendines communi membrana perquam mucosa, ac cæteris omnibus membranarum rubicundiori inuoluuntur, simulq^q coherentes, sub primi musculi tendinibus perⁱ transuersum internæ brachialis sedis ligamentum, in manus uolam contendunt, in qua (quemadmodum primi tendines) æquales angulos efficientes, mox inuicem dirimuntur, singuli ad unum quatuor digitorum excurrentes. Quemadmodum autem per uniuersam cubiti longitudinem & brachiale

Digitos mouentes musculi.
l. 28.

Primus.

Lib. de V. su par.

Secundus.

chiale secundus musculus primo subternitur, ita quoque primi tendinibus secundi tendi-
 nes subiiciuntur, & eodem simul ambo secundum primi ossis digitorum longitudinem,
 transuerso ligamento obducuntur, æque atque in uola & brachialis sinu teretes. Minimè
 enim ueritati consonum est, primi musculi tendinem in primo internodio, ut Galenus asse-
 rit, dilatarì. Porro ut secundi musculi tendines ad tertium digiti internodium peringerent,
 primi iam musculi tendinibus in secundum os necessariò insertionem molientibus, operæ
 precium fuit secundi musculi tendines, aut ad tendinum primi musculi latera porrigi, aut
 quum ipsi rectà subiiciuntur, incumbentem ipsis tendinem perforari, hacq; ratione substra-
 tum secundi musculi tendinem transmitti. At quum ossium latitudo, ut tendines secundi mu-
 sculi ad latus declinent, minimè admittit: & si fortè ad latus ducerentur, obliquum sanè si-
 tum, ac proinde obliquum etiam motum exigent: reliquum profectò fuit, longa sectio-
 ne superiorem tendinem, qui primi musculi soboles est, à summo rerum Opifice mirabi-
 li industria findi, qua sectione secundi musculi tendo uectus, ad tertij ossis radicem pertin-
 geret. Verum etsi tendines primi musculi perforentur, ob id tamen cum Galeno neutiquam
 credendum est eos secundi digitorum ossis lateribus inferi, quum maximè internæ illorum
 sedi implantentur, ac suis apicibus post perforationem, sub secundi musculi tendinibus
 colligantur, & perinde ac si non fuissent perforati, sed tantum latiores redditi, insertionem
 moliantur. Cæterum ut in brachiali & tota primi ossis longitudine, tendines transuerso li-
 gamento cinguntur: sic quoque in secundi ossis tota longitudine aliud ligamentum tendi-
 nem hac porrectum obuoluit, aut, ut semel dicam, eiusmodi ligamentum toti internæ digi-
 torum sedi obtenditur, quod nulla membrana, nullo ue alio uinculo, aut fibra etiam, tendi-
 nibus in interna digitorum sede adnascitur, nec ibidem quicquam membraneum inter-
 duos tendines inuicem suffultos interuenit. In uola tamen priusquam tendines digitorum
 ligamenta subeunt, singuli proprijs induuntur membranulis, quæ tendinibus, quibusdam
 fibrosis nexibus adnascuntur. Tertius musculus à secundo mihi prorsus distinguitur,
 non anxie interim sollicito, num secundo illum adnumeret, ac secundum tunc in quinque
 carnosas partes totidemque tendines diffissum rectè proferas, dummodo uera tertij muscu-
 li descriptio subiiciatur, qui tota cubiti longitudine, superiori lateri secundi musculi expor-
 rigitur, illi nusquam, nisi fortassis ad cubiti cum humero articulum, continuus, sed perinde
 ac cæteri musculi mutuo accumbentes solent, toto progressu illi duntaxat coherens. Ena-
 scitur quidem carneo teretiq; principio ex ulnæ sede, qua hæc radij capitulum in proprium
 sinum amplectitur, ac ubi radius ab ulna primum dehiscit. Hinc enatus radio attenditur,
 uniuersæ ipsius propemodum longitudini adnatus, & ab ipso principium continuè du-
 cens, ex ea potissimum sede, ubi membraneum ligamen secundum cubiti longitudinem
 porrectum ex radio ad ulnam enascitur, quod etiam huic musculo principij portionem of-
 fert. Quum uerò musculus radio ad hunc modum expansus ad brachiale properat, in te-
 retem cessat tendinem peculiari membrana, quam mucus imbuat, obtectum, non autem
 communi membrana, quæ in brachialis sinu secundi musculi tendines inuestit. Quine-
 tiam tertij musculi tendo nulli secundi musculi quatuor tendinum subiicitur, quamuis e-
 tiam per transuersum brachialis ligamentum feratur, illius ligamenti lateri attensus, quod
 ad pollicis radicem consistit: ubi etiam brachialis os pollicem sustinens, sinum huic ten-
 dini insculptum gerere, in primo Libro diximus. Tendo ad hunc sinum reflexus, atque me-
 dius inter musculos primum pollicis os & secundum flectentes occultatus, ad secundum
 pollicis repit internodium, ubi transuerso ligamento in tota secundi ossis longitudine ex-
 ceptus, tertium os accedit, cui latescens ualide inseritur. In caudatis simijs, hunc muscu-
 lum non reperi, uerum à tendine secundi musculi medium digitum petente, in medio
 uolæ, exigua portio enascitur, quæ transuersim ad pollicem ducta, ultimo ipsius ossi im-
 plantatur. Atque hæc tendinis portiuncula, peculiarem portionem carnosam, ut cæteri
 quatuor secundi musculi tendines, neutiquam adipiscitur, aut etiam illi, medij digiti ten-
 dini alligatur, at ab ipso prorsus enascitur, super indicis tendinem uecta. Porro si hunc
 sermonem permulta Galeni placitis in primo libro de Partium humani corporis usu reni-
 tentia adduxisse animaduertis, & potissimum illi figmento, quo is pollicem non ad uo-
 lam uersus brachialis medium, cæterorum digitorum modo, sed super alios, & ad uolæ
 medium, flecti comminiscitur, non me incutiat, aut in Galenum impietatis prius insimu-
 lato, quàm proprijs manibus sectionem obieris, aut alteri accurate secanti, admonitus,
 altiteris, rem uniuersam diligenter expendens. Reperies nanque non modò quæ iam com-
 memorauimus, sententiæ Galeni meritò reluctari, sed & id quoque maximè, quod de secundi
 tertijq;

*Lib. 1. de Part.
usu.
Secundi mu-
sculi tendinum
per primiten-
dines transi-
tus.*

*Lib. 1. de Ad-
mi. sectio.*

*Tertius mu-
sculus.*

*Tertius quali-
ter in caudatis
simijs habeat.*

*Pleraq; hic
Galeni placitis
contraria
proponit.*

*z Hic ferit
tim spectat
extremas
manus 5, 6, 7
tabularum.*

*a 6 tab. 28
14. 5. 7 tab.
b 6 tab. 2.*

*c 1 fi. cap.
24. li. 1. L. 1.
denb.*

*d 7 tab. Vin
ter 5. T.*

*e 6 tab. 2.
f 6 tab. 2.*

g 4 tab. 1.

*h 1, 2, 4. fi.
cap. 25 lib. 1.*

*Processus
P notatur,
ad cuius in-
ternum la-
tus finis
iste spectat.*

*i 6 tab. 28.
7 tab. 14. 5.*

*h quasi à te-
dine, in 6
tab. notato
ad 8 portio
quæritur.*

tertij^q musculi functione subnexurus sum: ut nunc taceam Galenum suis lufum fimij, non uerè tendinem^l tertij musculi graciliorem illis dicere, qui à^m secundo musculo producantur. Opinatur enim Galenus, & cum illo omnis refectionis professorum chorus, secundum musculum quatuor digitorum primum tertium^l que os flectere, & quem nos tertium recensuimus, secundi pollicis ossis & tertij flexum moliri: quum tamen ambo duntaxat tertij quinque digitorum ossis, ut primus secundi, flexionis reuera opifices sint. Nullum enim musculum os mouere, nisi eidem inferatur, Galeno cæterisq; Anatomicis firmissimi axiomatis loco habetur. at secundi musculi tendines neque primo quatuor digitorum ossi, neque tertij tendo pollicis secundo ossi, ne obscurissimè quidem inferitur applantatur^{ue}: ergo nec eorum quidpiam hi musculi agunt. Neminem enim fore arbitror, qui ex primo de Partium usu astruet, secundi musculi tendinem primo internodio dilatentem implantari: quum Galenus in dissectione temporis successu exercitator, tribus interiectis de transuerso ligamento uocibus, integram paginam ibidem restituere conatus fuerit: parum tamen sui memor, quum interfectiones tendinum in digitos, simul in numerum colligit. Ac proinde si beneficio transuersi ligamenti, quod in primis quatuor digitorum ossibus, & secundo pollicis existit, hæc ossa à secundi & tertij musculi tendinibus flecti, quis pro Galeno certans illius^q que posteriora uerioraque sensa capiens contenderit, respondeat is quæso, cur minus & primi musculi tendines, prima quatuor digitorum ossa flectant: quum & hi eodem ligamento contineantur. Non enim quicquam prorsus est, cuius beneficio potius secundi musculi, quàm primi tendinibus prima internodia flecti, quis demonstrare posset. Quinetiam in medium adferat obsecro, quamobrem Galenus non senserit secundi quatuor digitorum ossis flexionis, tendines secundi musculi autores esse: quum tamen & in secundi ossis radice totaque ipsius longitudine hi tendines transuerso obuolentur ligamento. Ad hæc illum me docere optarim, quamobrem & primus, & secundus, & tertius digitos mouentium musculi etiam brachiale non flectant, quum & in interna brachialis sede^o transuerso ualidoque ligamento non mediocri ductus longitudine contineantur. Similiter rationem comminisci uelim, quapropter quamplurimi tibiam occupantes musculi, qui pedem aduantes, ac^o transuersis ligamenti inter tibiam ossis extremum & calcem, ac rursus inter fibulæ apicem exteriorem ue malleolum ac calcem obuoluuntur, non illorum ligamentorum etiam auxilium pedem moueant, quum tamen in his omnibus par sit ratio: uti etiam in omnibus cæteris musculis, qui transuerso ligamento in alio ossè, quàm unde principium duxere, induuntur. Ac proinde plerosque in^u cubiti exteriori sede, & in^u tibiam anteriori regione tendines ibidem ligamenti circundatos in medium, ad robur huic meo paradoxo conciliandum, non adfero. Vti itaque tres hæcenus ex digitorum musculis enarratos brachiale non flectere certo certius constat, ita quoque nisi suorum quibus inferuntur ossium flexionis opifices censendi sunt. Deinde si primi musculi quoque tendinibus prima quatuor digitorum ossa, & secunda tendinibus secundi musculi non inflectuntur, haudquaquam secundi tendinum ui, prima quatuor digitorum ossa, & tertij musculi beneficio secundum pollicis os flecti credendum est. Proprios enim his quoque ossibus sagax rerum parens Natura musculos largitur, quos ubi sermonem trium primorum absoluerò, seriatim persequar: id adhuc admonens, ut si quis fortè secundi musculi ac primi auxilio, primum quatuor digitorum os, & tertio item musculo secundum pollicis flecti arbitratus fuerit, non officitanter cuiusque internodij flexionis uim perpendat. nam primum internodium, quod ex ipsius sententia, primi ac secundi musculorum tendinibus, præter alios totidem paulo post explicandos musculos inflecteretur, uix tamen firmitus flexionis robur, quàm tertium internodium commonstrat, utcunque etiam unicus tantum tendo huius motus dux censeatur. Tres itaque nunc dictos musculos ex diffitis regionibus, per totam nimirum cubiti longitudinem Natura produxit, ne si fortè in extrema manu principium assumerent, eam carne obruentes, magnam ponderosam^{que} redderent: quod quantum ad uaria quæ manu obeunt munia incommodi intulisset, quiuis promptissimè colligit. Deinde robur in flexione maius requirebatur, quàm quod breuibus musculis præstari ualebat, qui ex proximis ijs quæ mouenda erant ossibus principium ducerent. Atque hanc pariter ob causam, ut digitus scilicet ualida flexione pollerent, non unius tantum musculi beneficio tres digitorum articuli flectuntur, sed singuli proprios exigunt. Illi quidem quos recta duntaxat, & in neutrum latus inclinante flexione agi oportuit, unico eodemque ualido contenti fuere tendine: articuli autem, qui in latera etiam inclinationem experiri debebant, pluribus tendinibus musculis^{que}, & illis non admodum ualidis (ut

*Naturæ in
musculis digi-
tos flectenti-
bus industria*

*T*ransuerso-
rum ligamen-
torum usus. etiam illorum flexio infirma est) egerunt. Porro tendinibus transuersa ligamenta se-
cundum digitorum ossa obducuntur, ne quoties secundum aut tertium digitorum os in-
flectimus, tendines tanquam recti protensiq; funiculi, & uirgulae secundum ossium flexio-
nem non incuruatae, à flexo iam osse ad cubitum tensae exurgerent, & cutem in miram altitu-
dinem eleuantes manus uolam turpiter implerent. Ligamenta enim et si tendines musculo-
rum uentris beneficio contrahantur, eos tamen ossibus quibus non inferuntur, adiacere co-
gunt. In uola uero & brachialis sede mucosis membranis tendines induuntur, quo tutiores
procederent, easq; membranas tanquam propugnacula & muros fortiuntur. Sed secundi
musculi membranæ alius quoque usus existit, siquidem^a musculi oblongi & parui, quorum
ope digitos quatuor pollicis adducimus, ab illa enasci audies. Quum itaque secundum qua-
tuor digitorum internodium à primo musculo flectatur, tertium autem à secundo, & tertium
pollicis à tertio, tandem opportunum erit, musculos prima quatuor digitorum ossa, & pri-
mum secundumque pollicis flectentes aggredi. Sunt autem hi omnes numero tredecim: ad
singulos nimirum quinque digitorum primos articulos bini, & ad secundum pollicis terni.
*T*redecim
post tertium
ordine in nu-
mero succe-
dentes. ^a Qui quatuor famulantur digitis, omnes recta secundum postbrachialis longitudinem di-
gitos adeunt, omni propemodum ex parte carnei, ac postbrachialis^b ossibus connati. Inse-
runtur autem lateribus interiori in sede, primorum ossium. Duorum igitur paruum digi-
tum flectentium^c unus ab exteriori latere superioris partis postbrachialis ossis, quod paruo
prælocatur, carnosio principio oritur, etiam nonnihil inibi adnatus brachiali. Hinc recta di-
gitum accedens, ad primum usque digitum os carnosus permanet. ubi uero os contingit, latius-
culo tendine exterioris ossis lateri, uersus interiora tamen inferitur. Alter ex interiori eius-
dem postbrachialis ossis latere, ad superius iuxta brachiale extremum, originem ducit, & in-
ter id os & sibi proximum ad digitum tendens, carnosum quoque permanet, donec mem-
braneo tendine interiori lateri primi ossis parui digiti implantetur. Quando utrique muscu-
li colliguntur, primum digitum os, in neutrum latus uergens flectitur. Si uero exterior egerit, in-
teriori quiescente, digitus in exteriorem partem nonnihil inclinans flectitur. At solo interio-
ri laborante, ad interiora conuiens digitus flexionem experietur. Ad hunc sanè modum alio-
rum trium digitorum musculi habent, adeò ut bini in singulis postbrachialis ossium inter-
uallis (quæ tria sunt) reponantur, & is qui indicis interiori lateri inferitur, interno postbra-
chialis ossis indicem sustentis lateri adnascitur, in uolam magis quàm in externam manus
regionem, ut & ceteri primos articulos flectentes musculi, protuberans. ^b Musculi au-
tem quorum beneficio primum pollicis internodium flectitur, unà cum^c musculo, qui pol-
licem à cæteris digitis maxime abducere dicitur, carnem molem constituunt, quæ ad polli-
cis radicem reposita montem, quem chiromantici modò Veneri, modò Marti ascribunt, effin-
git. Galenus in Libris de Usu partium hanc molem falso unicum esse musculum arbitratu
est, quem pollicis ab indice abductionis autorem recensuit. Quemadmodum etiam uerita-
ti parcens, ^d molem illam carnem quam chiromantici lunæ monti tribuunt, unum quoque
musculum quo paruus ab alijs abducitur esse, ibidem docuit, quum interim maiorem ipsius
portionem exterior musculus primum minimi digiti os flectentium procreet. ^e Primus ita-
que pollicis musculus ex superiori transuersi brachialis ligamenti sede carneus enascitur, &
toti primi pollicis ossis longitudini interna regione attensus, perpetuò carneus illi inferitur,
perquam obscure secundum pollicis contingens internodium. ^f Secundus, qui nuper di-
cto prorsus occultitur, longèque minor ipso est, ex transuerso quoque ligamento, & ^g osse
brachialis pollicem fulciente enatus, in primi pollicis ossis radicem implantatur, non ultra
medium longitudinis primi eius ossis pertingens. Sunt itaque hi duo pollicis musculi inter
digitorum motores duodecim^h & decimustertius, si modò octo musculos quatuor digito-
rum prima internodia flectentes ante hos enumerare uisum sit. Porro qui secundum polli-
cis os flectunt, ⁱ tres numero censentur, magis differentem situm ab illis, qui quatuor digito-
rum prima ossa flectunt, obtinentes, quàm duo primi pollicis ossis flexus opifices. Qui enim
quatuor famulantur digitis, recta secundum manus longitudinem procedunt: qui autem
primum pollicis os flectunt, nonnihil oblique ducuntur. sed præsentis musculi secundi pol-
licis internodij flexionis autores, quodammodo transuersi cernuntur. Operæ precium nam-
que erat, quatuor digitos uersus brachiale inclinari: pollicem uero illis in functione opposi-
tum, ad ipsos inflecti. Merito igitur tres musculi secundum pollicis os flectentes, ex uola tan-
quam è quarta circuli parte, principia sortiuntur, nimirum ad eius lineæ circumscrip-
tionem, quæ uitalis & cordis Chiromanticis appellari consuevit. quamuis nonnihil ulterius,
quàm ea consistat linea, ex uola initium ducant, ad trianguli illius quem in media uola collo-
cant

*Illorum duo,
qui pollicis pri-
mo ossi famu-
lantur.*

*Tres qui se-
cundo pollicis
ossi famulan-
tur.*

u 6 ta. f ad
y. 7 tabul. d
ad f.

x Sub a 8
tabula.
y 12 si. ca.
25 li. 1, 11,
111, 1111.
z 4 ta. f

a 8 ta. X.

b 6 ta. n. n.
c 2 tab. p. 4.
tab. n.

d 3 ta. r. ac
decim 4. tab.
ad f.

e 4 tab. 16
tab. n.

f 4 ta. f.
g 6 ta. n. 7
tab. a.

h Figuræ
cap. 25 lib. n
charact. 5.

i 7, 13 tab.
charact. 10
2, 3, 8 ta. X.

cant, superius & exterius latus. Primus itaque musculus obliquum latumque principium ducit, ex postbrachialis ossis, cui medius innititur, modicè subter ipsius capitulum, quod si-
num primi ossis digiti subingreditur. Hinc carnosus prorepens non nihil angustior redditur, & membraneo tendine, secundi pollicis ossis lateri, quod indicem spectat, uersus interiora se inserit. Secundus superiori suo latere iam dicto musculo cōiguus, ex media sede postbrachialis ossis, quod medio præponitur, originem ducit, non nihil tamen & os, quo anularis fulcitur, contingens. Origo huius quoque tenuis lataque est, & statim carnea ad insertionem usque conspicitur, quam in medio interioris partis secundi pollicis internodij tentat. Tertius huic inferiori ex parte contiguus, ex postbrachialis ossis, quo anularis sustinetur radice, quæ brachiali coarctatur, originem pariter latiusculam sumit, et oblique pollicem accedens, lateri interiori secundi pollicis internodij, uersus priora implantatur. Isti tres musculi dum unà tenduntur, fortissime secundum pollicis internodium flectunt, primo autem duntaxat agente, ad superiora uersus indicem pollex dirigitur, dum uerò secundus solus contrahitur, ad medios digitos pollex flectitur, quemadmodum infimo ad suum principium contracto, pollicis ad inferiora, & magis uersus paruum digitum flexio perficitur. Hos tres, & si in caudatis simijs obseruētur, Galenus non modò ignorauit, uerum etiam falsas rationes in Primo de Partium usu astruit, quibus imperitior aliquis animum adhibens, ne hos quidem aggredi tentaret. Neque etiam uerisimile est, quum secundò administrationes anatomicas emitteret, hos musculos ipsi cognitos fuisse, quum illos nullibi descripsit, quemadmodum fecerunt Arabes, hos, quantum auguror, cognoscentes, & duos, qui primi pollicis ossis flexioni præfunt, negligentes. Undecim namque musculos, in extrema manu digitis flectendis extructos recensuerunt, octo quidem ad quatuor digitos, tres autem ad pollicem referentes. Quanquā rursus ambigem, nū casu ipsi Undecim, loco Decem ex Galeno scripserint, quū citra aliam descriptionē, musculos tantum Orisij more enumerent. Quinetiam in Primo de Administrandis sectionibus Galeni libro omnes, quos hactenus uidī, codices tres mendas in numeris habent. Octo namque Duorum loco illic leguntur, ubi extremæ manus musculi, pollicis obliquis motibus seruiētes enarrantur, & rursus ad calcem propemodum libri, quo cubitum mouentes musculi recensentur, Tres scribuntur ubi Duo, in super Duo ubi Tres scribendi fuerant, non secus sanè, quàm malè etiā Primi usus, pro Secundi illic legitur, ubi Galenus in eodem Libro ligamentorum usus commemorat. Verum hæc cum innumeris alijs, pro mea uirili in Galeno sunt restituta, quem IO. BAPTISTA MONTANVS in gymnasio Patauino medicinae Professor eximius, non sine incredibili artis Candidatorum utilitate, nuper in absolutissimum ordinem redegit, maximi ac penè diuini ingenij uir, ob singularem illā tum Medicinæ, tum cæterarum scientiarum cognitionem, nulli ætatis nostræ medicorum secundus, & præstantissimis laboribus suis, quos in publicum dedit, ac pertinaci indefessaque in docendo diligentia, de studiosis omnibus quàm optimè meritis. Cui uiro utinam Deus aliquis aurem statim uellicet, ei que in animum inducat, ut & alias cogitationes suas longè pulcherrimas, & iam dudum præ maturas in lucem prodire patiatur, eas que posteris uel non inuideat, uel eorum calumnias, qui iudices cætero-
um esse solum cupiunt, ipsique nihil unquam præstare queunt, non ita reformidet. Hactenus itaque sexdecim musculos, quibus digiti mouentur, commemorauī, ac proinde nunc decimus septimus, qui digitos extendentium primus erit, describetur, in cuius enarratione hoc mihi Galeni intelligendi gratia uelim donari, ut illum in quatuor diffundi tendines liceat afferere, & deinceps adijcere musculos, qui ex cubito procedunt, & quatuor digitos à pollice abducere creduntur, bipartitò in duos tendines digeri, & eam quem Galenus narrat, insertionem in digitorum ossa moliri. Atque id mihi tantisper concedi optauerim, quousque omnes tres musculos sermone absoluerò, tunc enim primum uariam ipsorum tendinum commixtionem coitumque, ac munus denique subiungere licebit. Quanquam interim in reliqua præsentium musculorum descriptione, in ortu nimirum, ductu, substantia, forma, & id genus reliquis nusquam aberraturus sum, quemadmodum etiam in falsam tendinum seriem nequaquam impingerem, si mihi eadem perpetuò hæc occurrisset, & Galeni obseruanda auctoritas negligētui à me haberetur. Sed age negotium, uti sese enarrandum offeret, aggrediamur. Decimus septimus principio ex carne nerveaque substantia mixto, & utcunque lato, ab elatori sede exterioris humeri^o tuberculi enascitur, & per mediam cubiti sedem, magnus & carnosus, & paulò minùs toto teres porrigitur, nulli alteri connatus ossi, neque aliunde, quàm ab humero principium ducens. Quum uerò propter radij extremum, cui brachiale inarticulatur, pertrigerit, arcitior redditus, in quatuor breues carnosas portiones, in musculi substantia non procul diremptas finditur, quæ simul communi membrana indute, fibrisque

Tres secundū
pollex ex flecten-
tes muscu-
li Galeno u-
gnorati.

Decimus septi-
mus digitos
mouentium.

lx. 2

ca. 13

taf.

us 9 ta.

alter 10

ta p

9 ta. d.

ca. 13

ta. p.

9 ta. b.

fibrisq̃ tenuibus inuicem coherentes, atque in tendinē illico ab ipsarum a musculi uentre deductū degenerantes, per¹ sinum in radij exteriori sede excuatis, radij cum ulnæ articulo proximus. Huic itaque sinui utrunque amplo, & admittendorum corporum magnitudini ad amissum respondentem, quatuor hi tendines incumbunt, & transuerso¹ ligamento ipsis peculiari, & radio quoque proprio obuoluntur, ne aliquando ex sinu declinent, & ne contracto ipsorum musculo in altum exurgant. Cæterum ut Galenus radij sinus non aperte expressit, ita quoque falsò hos tendines communis radio & ulnæ¹ ligamento contineri tradidit. Nam communis amborum ossium ligamento & sinu is^o musculus uicitur, quem ego decimum octauum in tota serie paulò post recensabo. Quum itaque proprium ipsorum ligamentum tendines isti transenderūt, brachialisq̃ iam incumbunt, latentes & ab inuicem ducti, tres æquales constituunt angulos, & singuli ad unumquemq̃ quatuor digitorum properunt. Illico autem atque digiti principium contingunt, adhuc multo ampliores tenuioresq̃ reddit, primi ossis radici inseruntur, ac sic per totam digiti lōgitudinem ascendentes, medio exterioris ossium regionis adnascuntur, non autem, ut Galenus malè arbitrat, hīs duntaxat ossium sedibus, ubi articularum consistunt compages. Cæterum quia ratione aliorum musculorum tendinibus, hi in digitorum sede commisceantur, quum quatuor digitos, à pollice in obliquum abducentes musculos sermone absoluerò, audietur es. Nunc enim & si decimus septimus musculus^o tres tantum tendines ut plurimum nobis exhibeat, quatuor illi Galeni nominelargiti sumus.² Decimus octauus musculus gracilis longusq̃ est, inferiori lateri decimiseptimi secundum cubiti longitudinem exprorectus. Ab exteriori enim humeri¹ tuberculo, hic musculus principium sumit inter decimiseptimi caput, & principium alterius¹ musculi, qui postbrachialis ossi, quo minimus digitus fulcitur, insertus, brachialis extensionis dux censetur. A principio musculus hic secundum latus decimiseptimi carnosus fertur, quousque cubiti finem attingit, ubi in duos bipartitus tendines, communis radio & ulnæ¹ sinu, & ligamento utitur. Tendines statim atque brachiale superant, inuicem dirimuntur, & unus ad paruum, alter anularem contendit digitum, ac singuli in sui digiti primum os implantantur, membranae instar, exteriori lateri uersus posteriora tamen sese inferentes. Hic musculus duobus, quibus inferitur, digitis à pollice abducendis creatus à Galeno dicitur, quum interim obliquum situm nequaquam adipiscatur, quemadmodum sanè¹ decimus nonus, duobus ultimo enarratis substratus, obliquo ductu donatur. Ab exteriori nanque ulnæ processu, posteriori humeri sedi coarticulato, usque ad ulnæ sedem, quæ non multò ante brachiale est, continua serie, tanquam ex recta linea¹ musculi quidam enascuntur, omnes obliquo situ præditi. Atque hi tres exigunt radices principia ue, ac primum quidem, quod elasticum & humero uicinus est, ad musculum refertur radio peculiarem. Secundum autem, primo iam ordine succedens, ad pollicem & brachiale spectat, cuius seriem, ac in plures ueluti musculos distributionem, musculorum pollicem extendentium enarratio docebit.³ Tertium autem, quo in præsentia potissimum egemus, quod & secundo principio ordine succedit, ab ulnæ osse ultra medium ipsius longitudinis, uersus brachiale enascitur, neutiquam uerò (ut Galenus parum bene asserit) à tota ulna, aut ulnæ superiori parte brachio proxima. Hoc principium exactè carneum, & instar oblongæ lineæ originem ducens, paulò angustius ab exortu redditur, & oblique deorsum, uersus radij ad brachiale appendicem descendens, in⁴ duas carnosas portiones discinditur, quarum inferior decimus nonus efformat musculū, à superiori illius principij parte distinctum, quem doctrinæ gratia uigessimum primum, & pollicem uersus alios digitos euerterentem appellaturus sum. Hoc igitur tertium principium in duos musculos distinguam, quāuis interim principij ratione nō obstem, quo min⁹ ambas ipsius partes, unus musculi loco qui uis recensere possit. Decimus itaque nonus digitos mouentium musculus, ab ulna eo, quo dixi, modo enatus, oblique radij appendicem petit, ac priusquam hūc contingit, in duos inuicem coherentes tendines finitur, qui proprio sinui in radij appendice incumbentes, & peculiari¹ ligamento transuersim obuincti, super brachiale expanduntur, atq̃ hīc dirēpti, illorū superior indici, inferior autē medio exporrigitur, exteriori inferioriue digitorum lateri, uersus posteriora implantati. Sinus autem horum tendinū nomine, in radij extremo priuatim exculptus, inter⁵ sinū decimiseptimi musculi gratia incisum, & illum quo bicornis tendo eius¹ musculi uehitur, cuius beneficio brachiale extenditur. Atq̃ hic etiā sinus⁶ alteram portionē tertij illius ex ulna prodeūtis principij trāsmittit, quā pollicis motibus famulari audies. Haud enim arbitrandū est, ambas tertij principij portiones unico sinu et ligamento uti, et huic decimo nono musculo ligamentū peculiare nō obduci. Quod uerò præfens musculus à pollice abduc-

19, 18 & 17
musculorum
tendines & mu-
scul.

tionis

tionis eorum, quibus inferitur, digitorum autor sit, situs ipsius insertioque liquidissime commo-
strant. Cæterum hunc non semper in indicem & medium, digitos, tendinem porrigere obser-
uaturus es, sed dūtaxat in indicem. Sic etiam^b decimooctauum musculum in minimum &
anularem simul, tendines, qui statim in brachiali dirempti fuerunt, digerere non semper cōspi-
cies, sed frequentissime unicum tendinem in paruum digitum ferri obseruabis, eius digiti extē-
sionis ducē. Pariterⁱ decimusseptimus in tres tantum tendines diuidi uidebitur, qui in brachi-
ali inuicem deducti, in dici medio, & anulari implantabuntur, in minimum autem digitum sta-
tim à brachiali tendinem, ut ad cæteros digitos, ferri rarissime reperi, quū decimus nonus par-
ui digiti extensionis autor sit. At his omnibus tendinibus, ubi post brachiali membranulis et fi-
brosis nexibus committuntur, priuatim id accidit, ut singuli lateſcentes uelut in plures diui-
dantur, ut iam latiores multò, & tenuiores redditi, ad digitorum radices, mirabili neque sem-
per eadem serie inuicem miscantur, unius digiti tendinis portione etiam cōspicua, ad alterius
digiti tendinem pertinente. Quod & in tuis manibus conspiciari poteris, animum, quando di-
gitos flectis, ac reflectis, et in latera ducis, digitorum radici adhibens. Quamuis in manu cute li-
berata, id intueri magis conduxerit, ut non mireris, cur Galeni tendinum serie minus ilico ac-
cesserim, arbitrerque decimusseptimum, decimooctauum, & decimunnonum quatuor di-
gitorum, unā et extensionis & abductionis à pollice opifices esse, ob uariam illam, quæ per ob-
liqua prorsus sit, commixtionem, & rectum situm, & ipsorum insertionem, quam in totam di-
giti longitudinem moluntur. Nullam tamen prorsus tendinum commixtionem unquā per-
fici obseruaui, cuius beneficio uel obscurissime paruum digitum à pollice abduci ausim asserere,
imò rectus ille musculi decimooctauum ductus insertioque arguunt, nulla prorsus ratione par-
uum digitum eius opera, extrorsum à pollice abduci. Atque eiusmodi etiam quid in pede ob-
seruari, suo loco dicam. Habeto igitur mea quidem sententia decimooctauum pro præci-
puo parui digiti extensionis autore. Decimus autem nonum insigniter ad indicis & aliquan-
do medijs à pollice abductionem, idoneum esse neminem ambigere conuenit. Verum quia
paruum adeo atque ex abundantia à cæteris abduci oportuit, quoties rotundas figuras manu
complectimur, & quum huiusmodi motus^k decimooctauo musculo acceptus ferri nequeat,
rerum Opifex^l musculum breuem, sed ualidum in extrema manu reposuit, illi motui præfe-
ctum. A^m quarto enim brachialis osse, quod rectum appellauimus, musculi huius princi-
pium prodit, quod per lunæ monticulum ad paruum digitum pergens, toto ductu carneum
uisitur, muris seu lacertæ formam eleganter exprimens, quippe musculus iste, in exortu utcum-
que tenuis, in medio teres crassusque est, in insertione autem, quam in externo primi ossis parui
digiti latus molitur, gracilis tenuisque, & nerueus euadit. sit itaque hic ordine uigessimus. Cæ-
terumⁿ uigessimus primus, pollicis peculiaris celsetur, estque ille altera^o tertij ex ulna pendētis prin-
cipij portio, quam à^p decimonono, qui ad in dicem & medium potissimum fertur, distingui-
mus. Ab ulnæ itaque exteriori sede, iuxta^q ligamentum membraneum inter cubiti ossa, qua in
uicem dehiscunt, consistens, & iuxta medium longitudinis cubiti iste musculus enascitur, uer-
sus radium oblique properans. Priusquam uerò radij inferiorem contingit appendicem, in
paulò minus toto teretem cessat tēdinem, qui communi cum^r tendine bicorni, quo brachiale
extenditur, sinu, et^s ligamento plerumque deductus, ad brachiale contendit, & ilico lateſcens to-
tius pollicis longitudini inferitur, non quidē in medio exterioris regionis, sed exteriori ipsius
latere, quod indicem spectat. Cuius autem motus hic musculus opifex sit, ilico subiiciam, at-
que duos sequētes nunc musculos descripsero, in quorum enarratione ambigo, num illos pri-
mum unius, aut duorum, aut trium musculorum loco recensere debeam. Sed agē, ac si unus
esset, illos pertractemus, eundem postea, uti uisum erit, in plures diuisuri. Ex^u tribus mu-
sculorum radicibus seu principijs, quæ ab ulna secundum ipsius longitudinem exoriri re-
lata sunt, ^x medium principium utcumque uisitur amplum, longæque latis linea enatum, &
oblique super radium conscendens, illi infertur^y musculo, quem bicorni tendine in bra-
chiale inferi, idque extendere docebo. Simulatque uerò principium hoc cum musculo inte-
gri, in^z duas impares portiones diuiditur, à se nullo intervallo distantes, sed mutuò incum-
bentium musculorum ritu inuicem hærentes, superior portio aliquandiu carnea perma-
nens, in tendinem quodammodo teretem cessat, inferum exteriori brachialis^z ossis sedi,
quod pollicem sustinet. Inferior autem principij portio statim, ac aliquousque in anteriora
prorepsit, in^b duas rursus carneas partes distinguitur, quæ singule in tendinē finiunt, ac cum
superioris portionis tendine, proprio^c sinu in radij appendice leuiter inciso insident, pe-
culiarique^d ligamento tres simul tendines obducuntur. Postquam uerò inferioris portionis
tendines brachiale superarunt, unus in primi pollicis internodij radicem implantatur, illic in
exter-

Vigessimus.

Vigessimus
primus.Vigessimus
cunctus, qui si-
musculum asse-
re censetur.

externam ipsius regionem iuxta internum latus finiens. Alter tendo membranoso tantum nexu primi pollicis ossis longitudini adherens, in secundi ossis radicē exteriori sede, uersus internū latus inferitur, neque is inibi totus definit, uerū ad summū usque pollicis apicē, secundo et tertio ossibus pertinaciter quoque adnascitur. Duorum inferioris portionis tendinū alter tantum, quē nunc enarrauimus, Anatomes professoribus perspectus fuit, unde etiam aliqui attendentes principij continuitati, musculum hunc unum esse tradiderunt, alij uerō quoniam in progressu dirimitur, & unus tendo brachiali, alter uerō, qui ipsis cognitus erat, pollicis inferitur, duos hic musculos constituerunt. Nobis autem integrum esset, trium musculorum loco hunc enumerare, singulos musculos singulis tendinibus ascribentes, quanquam nos opportuniū facturos existimo, si duos tantum enumerauerimus, inferiorem portionem, quā pollicis ossibus tendines duos offert, uigessimū secundum in hoc Capite appellantes. Superiorem uerō portionem, quā brachialis etiam extensioni, & obscuro cuidam radij circumductui secundario opem fert, uigesimalterij nomine habiturū sumus, nisi quia digitorum motibus nō famulatur, in horum musculorum serie illi locum abnegaueris, quod non inculamus, modō tuum interim placitum, in subsequentium musculorum numero recensendo, memoria non exciderit. Nos enim ac si praesenti Capite enumeraretur, reliquum de digitorum musculis sermone percurreremus, silentio non praeterentes, in caudis simijs unicum duntaxat apparere tendinem, qui partim in pollicem, partim in brachiale inferitur, secus longē, quā hominibus ut plurimum accidere nouimus. Vigesimo itaque secundo, & quem prius enumerauimus, uigesimaliter primo pollex recta eueritur, extenditur uē, quoties utriusque musculi unā contrahuntur, quippe uigesimo secundo duntaxat contractio, pollex oblique à ceteris digitis abductus extensionem patitur, à uigesimo autem primo ad indicem magis eueritur solet. quare etiam integrum est, hos musculos in digitos ad latera ducentium, & etiam in extendentium classem, ut uisum fuerit, reponere. In hunc usque locū seruasse illi decimo octauum, & decimum nonum, ut iam musculos obliquis motibus praefectos simul enarrarem, nisi uaria illa tendinum iuxta digitorum radices commixtio obstiisset, & nisi decimo octauus extendētibz potius, quā abducentibus fuisset adnumerandus, deinde huius commixtionis & decimo octauī musculi ductus gratia, necessario et illi prius recensui, cuius beneficio paruus digitus à reliquis ualidissime abducitur, qui ordine uigessimus erat. Ac proinde adhuc reliqui sunt, duo obliquis pollicis motibus famulantes, & alij quatuor, quibus digiti quatuor ad pollicem ducuntur. Pollex enim quum instar alterius manus, reliquis digitis opponi debuit, merito musculos sibi uendicat, quorum beneficio à ceteris maxime abducitur, & rursus uariarum actionum gratia commodissime indici admoetur. Qui igitur pollicē maxime abducit, atque in tota serie uigessimus quartus censi potest, ab anteriori sede ossis brachialis, cui pollex innititur nerueo principio, quod statim carneum euadit, enascitur, ac deorsum protensus, secundo pollicis ossi, membraneo tendine inferitur. Hic musculus unā cum duobus, primū pollicis internodij flectētibz, quibus iste insertitur, carnosam uolē partem efformat, quā ad pollicis radicē consistit. Galenus in Libris de Partium usu praesentem musculum, nō admodum uerē in primum pollicis os inferi scriptum reliquit, quū notabili & uera insertionē ipsi nō adnascatur, sed duntaxat fibrosis nexibus inualidē hereat. Verū non mirum est, Galenum eiusmodi insertionem nos docuisse, quum id scribens, duos musculos primum pollicis os flectentes ignorauerit, ac illos uigesimali quarti musculi partes esse arbitratu fuerit. Musculus iste interioris pollicem euerit, qui ordine uigessimus secundus erat, actionem excipit, atque ita quā maxime pollicem ab indicem mouet, id priuatim adeptus, quod inter extremā manus & cubiti musculos, solus quodammodo liueat, propriae ipsius, quae crassior est, membranæ gratia. Alter musculus obliquis pollicis motibus seruies, ex interiori latere, uersus posteriora tamē, ossis postbrachialis, quod indici praepositur, initium ducit carneum, & secundum totam eius ossis longitudinem enatum. Musculus iste inferitur carnea implantatione, toti externo lateri primi pollicis ossis, membraneum tendinem radici quoque secundi ossis porrigens, huius fibræ transversæ quodammodo sunt, à brachiali ad pollicem ductæ. Vnde etiā huius musculi auxilio pollex indici proximē accommodatur, illoque musculo pollicem ad exteriora euerit, (qui in nostra serie uigessimus primus est) actio excipitur. Porro musculi quatuor digitos pollicis adducentes, quia in firmiū digitos uersus pollicem oblique adduci, quā ab illo reduci oportebat, nequaquam ex cubito principium sumunt, sed graciles & teretes sunt musculi, singulis quatuor secūdi musculi tendinibus (qui quatuor digitorum tertium os flectunt) exporrecti, oriuntur enim ex membraneo inuolucro, tendines illos, cum brachialis sinum, & transversum ipsius ligamentum perreptant, induente. Hinc simul singuli cum singulis tendinibus ad digitos procedentes, ac ante.

Vigessimum
et hoc Capite
enumeratum,
digitorum nō
seruire moti-
bus.

Vigesimaliter
secundū etiam
officiū.

Sex musculi
digitos mouen-
tes ad huc reli-
qui.

ac interiori tendinis lateri attenti, in digitorum radicem inferuntur, ad internum eorundem la-
tus, uersus interiora insertionem membranam moliti, ista nanque sede illos inferi decuit, qui
in latius ad pollicem, quatuor digitos erant reclinaturi. Præsentibus musculis hoc sanè rarum,
perinde ac oculi⁷ musculis obuenit, quod non ex osse aut cartilagine, sed ex membraneo ten-
dinum in uolucro originem sumperint. Iam si his quoque musculis tuum numerum discipli-
næ gratia auxeris, in uniuersum uigintinouem in hoc Capite descripti exurgent, quorum ui-
gintiocto digitorum duces sunt, uigesimalotertio interim ad brachiale relato. Porro mira-
bitur forsitan aliquis, cur minus^a musculos quatuor digitos pollicis adducentes, & eum qui
paruum à cæteris abducit, primo quatuor digitorum ossi dixerim inferi, nulla interim mentio-
ne succedentium internodiorum facta, quum tamen Galenus in omnibus digitorum ossibus,
secundum totam illorum longitudinem tendines, membranæ modo inferi cónasciç in Primo
de Administrandis sectionibus scriptum reliquerit secus, quàm in Libro de Partium usu, ac il-
lo etiam priores Anatomici. Ego nequaquam inficias eo, uti neq; aliquis, qui mihi refecati asti-
tit unquam, digitorum ossa secundum longitudinem, è regione insertionis illorum musculo-
rum membranæ obduci, uerum non talibus, quales commemorati modò musculi porrigere
deberent, quandoquidem illæ nullum fibrarum genus, secundum longitudinem excurrere
ostendunt, neque parem etiam ductum, cum musculorum ex cubito in exteriorem digitorum
sedem inferentium tendinibus retinent. Quinetiam solius primi in quatuor digitis articuli, &
primi secundiq; in pollice beneficio, digiti in obliquum aguntur, cuius causa, dum digitorum
ossa persequeretur, articulationis differentia esse commemorabatur. Si itaq; quispiam eiusmodi
membranas, musculorū in obliqua agentū tendines esse cum Galeno contenderit, frustra eos,
& ligamenti tantum uice secundis & tertijs digitorum ossibus commissos fateatur, oportet.
Quod autem illorum tendines, qui ex cubito procedentes, à Galeno abductionis autores sim-
pliciter enarrantur, toti digitorum longitudini liquidò inferuntur, uehementius colligere co-
gor, eos musculos extensioni etiā præesse. Denuo studiosior aliquis in Galeni Libris uersa-
tus, illumq; contraria de insertionem tendinum docere animaduertens opperietur, donec omnes
musculorum digitos mouentium insertiones in unum numerum redegero, Galenum in Pri-
mo de Partium usu imitaturus, qui eas parum rectè persequitur, quoniam⁶ tredecim musculos,
qui in extrema manu locati digitorum flexus autores sunt, omittens, falso^c secundi musculi ten-
dines, primo quatuor digitorū ossi implantatos tradit. Cæterum si obiter^e decimumseptimum
in quatuor tendines, digitos extendentes, & decimumoctauum & decimumnonum in binos
tendines, qui quatuor digitos à pollice abducant, diuidi concesserimus, & deinde tum in om-
nes digitorum acies, ut extendentes inferi annuerimus, ut interimⁱ illi, qui in extrema manu
reponuntur, lateralisq; motibus priuatim præsent, ita habeant, uti nos descripsimus, sexa-
ginta omnes ueræ insertiones (non accubitus leues uel annexus dico) erunt. In primum scilicet
pollicis articulum quinque, in secundum septem, in tertium tres, in minimi digiti primum inter-
nodium sex, in reliquorum autem trium digitorum prima internodia duntaxat quinque, in
quatuor uerò digitorum secundum & tertium internodium tres. Quæ porro eiusmodi sint in-
sertiones, ipse tecum, ut musculos rursus in memoriam, quasi in epilogum cóntrahas, repetito,
atque deinde rursus perpendito, quot uniuersæ essent, si etiam musculi obliquis motibus præ-
fecti, qui in summa manu reponuntur, insertiones in succedentia ossa, quæ in obliquum (nisi
secundariò) non aguntur, ex Galeni sententia molirentur, & deinde etiam^k uigesimali secundi
musculi utrunque tendinem, primo pollicis ossi inferi uera insertionem admiseris, ut nunc pri-
mum pollicis internodium sex admittat insertiones (^l qui enim pollicem maximè abducit, in
primum ipsius os non inseritur) tertium autem pollicis quinque, & secunda tertiq; interno-
dia indicis, medij, & anularis etiam quatuor, parui autem digiti secundum & tertium interno-
dium, quinque insertiones obtineant, consurgant omnes, septuaginta tres. Si etiam ligamen-
torum beneficio ossibus applicationes (nollem enim cum Galeno insertiones dicere) adnume-
raueris, & secundum quinque digitorum internodium una applicatione, & primum quatuor
digitorum duabus auxeris, inuenies (nisi me additio fugerit) octuaginta sex, nam primo pol-
licis internodio^m tertij musculi tendinem tribuere nequis, quanuis hic numerus adhuc & la-
ti tendinis applicationes sibi uendicare possit, ut tria quatuor digitorum, & duo pollicis inter-
nodia, adhuc una augeantur commissione, numerusq; nonaginta octo constituat. Quem si ad
utramque manum conferens duplicaueris, quot numeris, centum & octodecim Galeni *ἐμφυ-*
σας & παραφύσας modò superastit

*Ex uigintino-
uem descriptis
musculis, 28 di-
gitorum moti-
bus famulari.*

*De tendinum
insertionibus
nonnulla.*

*Musculorū
insertionū col-
lectio.*

*Lib. 1. de V su
partium.*

Brachialis
motus.
Primus mu-
sculus.



VM brachiali reliqua summæ manus pars flectitur, ac extenditur, deinde etiam obliquo (ut vocamus) motu in utrunque latus agitur, id quod quatuor musculorum beneficio. Quorum^a primus ex^b interiori humeri tuberculo^c principium ex carnea nervea^d substantia mixtum assumit, hinc totius ulnæ longitudini adnatus, & semper in progressu ab ipsa principij sui robur assumens, atque hoc præcipue in superiori ipsius sede, non procul ab articulo cubiti ad humerum. Exporgitur autem hic musculus inferiori lateri musculorum, qui ex cubito enati digitorum flexionibus præfunt, unde etiam internam ulnæ sedem^e magna ex parte amplectitur, quemadmodum & medium quoque sedis ipsius inferioris, toto fere ulnæ ductu occupat, quo scribentes innititur. Reliquum autem inferioris illius ulnæ sedis, quod exterius est, aliis musculis sibi uendicat, quem ante paruum digitum postbrachiali insertum, huius extensionem moliri audies. Duo enim illi musculi inuicem fibrosis nexibus ualide hærentes, uelut stratum quoddam & puluinar, quo commodè totum cubitum inniti sinimus, efformant. Cæterum primus hic musculus, quum ad ulnæ usque finem prorepit, paulò ante cubiti cum brachiali articulum, in^f ualidum, & quodammodo teretem cessat tendinem, carniformi semper substantia ad brachiale usque auctum, qui dum articulum transcedit, prorsus excarnis est, ualidissima insertione, inferiori^g quarti brachialis ossis sedi implantatus, quod non immeritò rectum cartilaginolum^h appellatur, acⁱ unico tantum ossi commissum, in Primo libro dicebatur. Præsens tendo, quæ ulnæ appendice articuloque brachialis suffulcitur, peculiare ligamentum, quod ipsi transuerfim obducatur, nullum exigit, sed cõmuni omnium musculorum membrana, quæ ligamenti uice est, quamque inter manus ligamenta etiam recensebimus, circumdatur, & perquam ualide brachialis cum cubito articuli ligamenti connectitur.

Secundus. Secundus brachiale mouentium musculus, ex interiori quoque humeri tuberculo exoritur, illius, quem nuper commemorauimus, capiti proximus, & unâ cum illius quoque capite instratum obtinens^m caput eius musculi, qui internæ summæ manus cuti dilatentem exporgit tendinem. Secundus itaque musculus, ab interno humeri tubereⁿ enatus, obliquo ingressu ad elatius^o primi digiti flectentis musculi latus contendit, ipsi magna ex parte instratus, & radio exporrectus. Ante brachialis autem radicem in exacte teretem degenerat tendinem, qui simulatque brachiale ad pollicis radicem^p cõtigerit, incuriose illum secantibus, ibidem brachialis ossibus inseri putatur. Verum ubi^q musculus ab indice pollicem abducens, unâ cum duobus primum pollicis internodium flectentibus, à brachiali liberatus fuerit, hic brachialis musculus conspicitur internam brachialis sedem præterire, atque latefcens in postbrachialis^r ossis, quod indici præponitur, radicem inferi, internæque transuerfi hinc^s ligamenti sedi ualide adnasci. Duo

Tertius. Tertius musculus, qui Galeni suffragio minimum digitum, & anularem à pollice abducit, nostro autem, præcipuus extensionis minimi digiti autor est. Siquidem plurimum ex eo tuberculo certa serie prodeuntium capitum, hic brachialis musculus, humillimam & ulnæ proximam sedem obtinet, unde etiam & ex^t posteriori ulnæ processu, qui humero ad articulatur, hic musculus principium ducit, illi instratus^u musculo, qui hinc quoque originem sumens, radium adit, illum in supinum acturus. Hinc citaque tertius brachialis musculus^v prodiens, humiliorem exterioremque ulnæ regionem amplexatur, inter primum brachiale flectentium, & quem nos paruum digitum extendere proposuimus, exporrectus. Quando uerò brachiali appropinquat, in teretem finit^w tendinem, qui sinui in appendice ulnæ ad processus stilum innitantis internum latus exculpto, innititur^x transuerso ligamento, quod unicum ulnæ proprium nanascitur, obductus. Quum primum ligamento superato, brachiali superuehitur, latior factus

Quartus. postbrachialis^y ossi minimum sustinenti, non procul à brachiali inseritur. Alter exteriorum, qui ordine quartus est, latiusculo^z principio longè supra exterius humeri tuberculum enascitur, ubi humerus uelut in oblongam^{aa} acutiem prominat. Hinc carnosus, & longa utrumque linea prodiens, radio insertitur, & propter illius longitudinis medium, in robustum degenerat^{ab} tendinem, qui bicornis bipartitus uelut ab ortu uisitur, utramque partem paulo minus toto teretem gerens, est enim nonnihil latior, quam profundior. Hæ partes autem tendines & si inuicem dirimantur, non tamen digno notatu intervallo diffusi, recto tramite radio exporguntur, ad illius appendicem iuxta brachiale cõtendentes. quò quum peruenerint, inuicem iam magis magisque, sed non tamen insigniter seiuncti, illis priuatim exculpto^{ac} sinui incumbunt, & com.

& communi ipsi & illi¹ musculo, qui pollicem uersus indicem evertit, ligamento circunda-
tur. Quod deinceps superantes, ac magis tum quàm prius, inuicem distantes, in postbrachiale
amplis insertionibus² implantantur. unus enim in radicem ossis indicem sustententis, alter ue-
rò in radium eius cui medius innititur, insertionem tentat. Quartus hic musculus unà cum ter-
tio, brachiale, si ambo tendantur, extrorsum reflectunt, extendunt³ ue. Atq; his auxiliatur⁴ mu-
sculus, quem brachialis ossi, quo pollex sustentitur, inferi tunc docuimus, quum digitorum du-
ces recensentes, hunc musculum in tota serie uigessimum tertium nominaremus: & ut his duo-
bus brachiale extenditur, ita etiam duobus interioribus seu primis idem pulchrè flectitur. Dein
eisdem musculis, quibus brachialis flexio extensioq; conceditur, brachiale ad latera quoque
ducimus.⁵ Si enim interior musculus, & exterior, qui indicem spectant, reliquis duobus la-
xatis contrahantur, brachiale introrsum atque ad interius latus agitur. At si his laxatis, alij duo
qui minimum respiciunt digitum, tensi fuerint, ad exteriora in latus brachiale mouebitur. Con-
stat itaque Naturam admodum industrie, duos musculos flexioni, & totidem extensioni præ-
fecisse. Quando quidem si uni flexionem commisisset, neq; is certæ articuli totius, neque firmæ
flexionis dux fuisset, imò promptè cir-⁶cūuersatilis laxaq; ut uerò nunc habet, firma prorsus ac
ruta perficitur flexio. Ad hæc præter flexionem & extensionem, brachiale alijs indiguit moti-
bus, ac proinde alios creati tendines operæ precium esset, qui ad latera motuum opifices habe-
rentur. Sed nunc demum, quum duo flectunt, & duo extendunt, ilico quidem & obliquos bra-
chialis motus adepti sumus. Caterū præter hos quos brachiali tribuimus motus, Galenus ipsi
in pronum ac supinum uersione adscripsit, peculiarem ab ea, quam secundariò manus extrema,
radij beneficio sortitur. Mihi nullum extremæ manus aut brachialis quiescente radio, in pro-
num supinum ue motum perfici, hæcenus percipere licuit.⁷ Deinde radij sinus, cui brachiale
inarticulatur, oblongus est, & ipsum quoque brachiale, quâ sinui imponitur, oblongum quo-
que, neq; ut humeri, aut femoris superius caput, rotundum uisitur, adeò ut eiusmodi ossium ar-
ticulus confurgat, qui ad motus in gyrum prorsus ineptus existit. Adde, quam nos primi ob-
seruauimus, neque perfunctoriè perpendendam cartilaginem, quæ a radio pronata, brachiale
& ulnam, in star interstitij cuiusdam mediat, ostenditq; totam brachialis ad cubitum articulatio-
nem propemodum soli radio ferendam esse acceptam, quod ne in puncto quidem citra dictæ
modò cartilaginis interuentum, brachiale contingit. Non enim audiendus est Galenus in Li-
bro de Ossibus, in quo⁸ processui styli imaginem exprimentem nimium fauens (ne dicā Naturæ
opera destruens) præter omnem ratione, illius processus beneficio, manum extremā in latera
obliquaq; agi protulit, parum attendens, si eam processus ille, quam ipsi tribuit, cōstructionem
obtinuisset, non solum motui, in latera non iuuaturum, imò tanquam palum aliquem prorsus
præpediturum: quanquam rursus alibi illum ad proprios manus in pronum & supinum mo-
tus cōducere, uideatur docere. At quum nullum eiusmodi motum, nisi radij ope, & secundariò
in manu expendere ualeo, præter animi sententiam musculos, quibus illi motus celebrentur,
ementiri nequaquam uisum est. Galenus tamen ut & hos motus brachiali præbet, sic quoque
quatuor enarratos musculos illorum autores esse contendit, prout hic nimirum ille ue contra-
hatur, aut quiescat. cuius sententiam si non oscitanter perpenderis, hæc illum finxisse, ima-
ginatumq; citius, quàm in refectione perpexisse (ut alia in Libris de Vsu partium pleraque)
animaduertes.

Musculorū
manus.

Brachiale
proprio motu
in supinum &
prorum non
agi.
Lib. de Par-
tum usu.

Libris de V.
su part.

DE MUSCULIS RADIUM PRONVM ET SUPINVM CONSTITUENTIBUS. Caput XLV.



VMMODO in præsentem meminere eorum, quæ² de radij ad rotundum
humeri capitulum articulo, & brachialis rursus cum radio, radij³ & ul-
næ inter se commissuris, superiori Libro tradidimus, nunc mediocri ne-
gocio percipies, qua ratione radius à proprijs tractus musculis, quiescen-
te interim ad humerum ulna, in pronum supinum⁴ que circunducatur, &
quoniam pacto radij auxilio, extrema manus eosdem motus necessariò se-
quatur. Quando itaque radius ulnæ & superiori ipsius & inferiori extre-
mo articulatur, ac secundum reliquam longitudinem duo illa ossa inuicem distant, operæ pre-
cium fuit & in prioribus ac posterioribus radij regionibus, musculos, qui illum mouerent,
extremi. Sunt autem hi quatuor, duo quidem superiori radij extremo subseruientes, reliqui au-
tem duo inferiori: atque ex his duo internam cubiti sedem, alij duo externam occuparunt. inte-
riores radium in pronum mouent, exteriores eundem ad supinum conuellunt.⁵ Interior, qui

Quatuor ra-
dium peculiari-
ter agentes
musculi.
Primus.

d 2 radij

*Lib. 1. de Art.
mi. sectio.*

Secundus.

*Primo de
Administran
dis sectio.*

Tertius.

Quartus.

radij partem brachiali proximam mouet, secundum ulnae longitudinem, ex tota amplitudine interioris ipsius sedis enascitur, qua brachiali proxima est. hinc carneus, ad interiorem radij regionem tranuersum procedit, ipsi carneus adhuc inferus. Habet itaque musculus hic, si cum reliquis secundum cubiti longitudinem expansis conferatur, fibras tranuersas, ex ulna nimirum in radium recta conscendentes. Neque hic musculus, ut uisum est dissectionis Professoribus, radium ulnaeque intercedit, sed secundum cubiti amplitudinem, totam interiorum radij ulnaeque sedem complectitur, & ad amissum quadratus est. Tantam enim obinet longitudinem, quanta est latitudo interioris cubiti regionis, quam simul cum radio ulna constituit, deinde tam latus uisitur, quam longus, ad haec omni ex parte carneus, & in ipsius medio spissus extuberansque obseruatur, instar puluinaris ipsum transcendentibus ad digitos tendentibus substratus. Huius musculi fibrae, radij partem quae brachiale spectat introrsum trahentes, radium in prouum adigunt. Exterior musculus contrarij motus autor, huic neque situ neque figura respondet. Si enim Natura in exteriori sede eiusmodi carneum musculum constituisse, cubiti pars brachiali praeposita, minimè leuis, carnisque expers mansisset, neque commodè tot musculorum tendines hic reponi potuissent. Proinde quum exteriorem interiori parem effingere nequiuisset, ualidioris motu hunc, quam interiorem, radium ducere oportuit, breuissimo per cubitum expansorum musculo, qui interior est, longissimum omnium qui cubitum perrepant, Natura opposuit, quantum scilicet ad musculi uentrem, & longiorem carnis ductum attinet. Alias nanque perperam illum omnium longissimum esse Galenus dixisset, quum plerique ad digitos protensi, simpliciter multo longiores sint: neque id fortassis solum tendinum gratia, sed si quis diligenter omnes perpendat, uentris quoque. Ab externa itaque humeri regione elatius, quam musculi bifido tendine brachiale extendentis caput consistit, huius radij musculi principium educitur: quod quia secundum humeri longitudinem latum nascitur, carneumque est, longe supra exterius humeri tuberculum incipit. Musculus hinc deorsum expansus, & latus ualidusque apparet, radio insertitur, superiori lateri musculi bifido tendine brachiale extendentis contiguus. Vbi uero ad radij finem, cui brachiale coarctatur, processit, in exactum finit tendinem, qui membranae modo latecens, radij appendicis superiori regioni inferitur, quadantenus in interiora productus. Musculus iste interiorem radij partem, quae brachiali committitur, in exteriora trahens, radium supinum efficit. Ceterum musculi, superiores radij finem humero proximum in prouum supinumque ducentes, in hunc modum habent. Interior ex interioris humeri tuberculi radice, & ex interiori ulnae latere, qua humero articulatur, carneo ualidoque principio enascitur. hinc admodum oblique internam radij sedem conscendit, carnea insertione ante medium ipsius longitudinis insertus. A carnea hac insertione, neruea implantatio ad medium usque radij longitudinis exporrigitur, radijque superiori regioni hic ualidissime inferitur, peculiarem inibi in radio asperitatem, cui inferatur, sibi uendicans. Musculus iste, quoties contrahitur, intrò radium ducens, illum constituit prouum. exterior, qui peculiarium radij musculorum quartus est, ductu figuraque nunc dicto propemodum par, enascitur ab exteriori articuli cubiti regione, ab articulo circumdante ligamento, ualide etiam ex ulna in posterioris sui processu, quem *ἀντὶ τῆς ὀφθαλμοῦ* Græci uocant, externum latus, principij sui portionem sumens. Hinc ad radium in priora conscendit, & radio propter interioris musculi insertionem applantatur. huius tamen insertio non aequè atque interioris neruosa est, neque adeò in radij longitudinem producit. Attamen ductus breuitas hos duos, ut & primum, qui ad brachiale habetur, exacto tendine destituit. Musculus itaque, quem postremo recensui, superiores radij partem extrorsum oblique conuellens, radium ad supinum adigit. Cōstat igitur totum radij os, interiorum musculorum beneficio prouum, exteriorum autem supinum effici; ac deinceps radij ope, summam manum eosdem motus ostendere.

DE MUSCULIS CUBITVM FLECTENTIBUS & EXTENDENTIBUS. Caput XLVI.

*Cubiti motus
ueniens musculi
aut 3, aut 4,
aut 3.*



V E M A D M O D V M radius sui cum humero articuli beneficio prouus supinusque constituitur, ita quoque ulna cum humero articulus appositissime cubiti totius flexioni extensionisque famulatur, & interim radius in eum modum humero est articulatus, ut simul cum ulna ad humerum flexi extendique queat. Musculi uero horum motuum duces, si in maximum redigantur numerum, duo flexionem, & tres extensionem perficiunt. si autem ad minorem referantur, aut duo, aut unus, erunt extendentes: duo tamen, utcumque numeraueris, flectentes. In canibus & caudatis simijs necessario tres semper

per extendentes recensentur: quorum etiam descriptionem ilico, atque hominis musculos enarrauero, subnectam, quo accuratius Primi de Administrandis sectionibus Galeni libri calcem assequaris. Atque hos ea tamen tradam lege, ut omnia de cubitum mouentium musculorum signa Secundi de Vsu partium libri, non cogar recensere. quandoquidem quum ueram illorum musculorum naturam didiceris, abunde (si modò ueritatis cum Galeno studiosus fueris) ea tuo Marte refelles, stupens profectò, qua ratione eiusmodi sensui repugnantià Galenus posteris prodiderit, ac postea etiam sectione peritior factus, non reco-

Primus flectentium.

Li. 3 de Admini. sectio.

Secundus, seu flectentium posterior.

gnouerit. ^b Primus flectentium, duobus ualidissimis & mutuò distantibus enascitur principijs: ^c unum quidem exactè nerueum, & ad amissum teres exoritur, ab eminentiori ^d parte ceruicis scapulæ, seu ex superiori ipsius acetabuli supercilij sede. Hoc sub ^e ligamenti humeri articulum continetibus, & huic principio transuersi instar ligamenti obductis, super humeri caput in anteriora procedit; ^f sinuq; uehitur, ipsi in prioribus capitis & ceruicis humeri regionibus priuatim celato. ^g Alterum prioris musculi principium, à radice interioris ^h processus scapulæ, quem anchoræ comparamus, duplex quodammodo enascitur, non quidem distinctum, sed duplicem substantiæ speciem exprimens, & dicto nuper ⁱ principio (& si Galeno secus uisum fuerit) multò latius. Principij enim ^k pars, ab apice processus initium ducens, exactè, ut exterius musculi principij, neruea est & crassa, & propemodum teres: ^l pars autem huic continua, ac ex reliqua processus sede prodiens, carnea lataq; uisitur. Neutrius istorum principiorum, statim ab exortu deorsum tendens, humeri ossi adnascitur. Verum aliquantulo sub humeri capitis ceruice, ubi ambo ^m inuicem coitura unum efformare musculum incipiunt, carnosa pars interioris principij, ab interno scapulæ processu enata, humeri ossi lata & utrunque carnea insertione adnascitur, priuatam ossis ⁿ asperitatem, cui aptè committatur, nanciscens. Consistit autem hæc asperitas ad radicem eius ^o sinus, quem exterius no musculi præsentis capiti incisum diximus. Eiusmodi insertio adeò ualida interdum mihi apparuit, & carnosa pars interioris principij pars adeò procera uisa est, ut proprium musculum à scapulæ interiori processu in humerum nasci arbitratus fuero, qui brachium etiam attolleret. Postquam uerò hic anterior cubitum flectentium musculus, ex duobus illis efformatus principijs, hanc insertionem in humerum molitus est, ab humero iam abscedens, & ad amissum teretis carnosiq; ^p musculi effigiem, ante resectionem in macilentioribus & musculosis conspicuam præferens, alium conscendit ^q musculum, ipsi toto progressu subtensum, non amplius enim, uel puncto etiam, primus hic musculus, humerum seu brachij os contingit. Cæterum paulò supra cubiti articulum, ^r neruosiior excarnisq; redditus, in robustum & crassum, & ad amissum teretem finit tendinem, qui articulo expansus, & subdito ipsi musculo sussultus, in interiorē radij partem, modicè latefcens ^s inseritur, non nihil & articuli ligamento adnatus. Ut uerò commodior tendinis in radium efficeretur insertio, iam antea ^t latum, & modicè prominentem, inæqualemq; admodum in radij superiori sine processum extrui diximus. Atque hæc primi musculi est series, hoc sibi cum alijs quibusdam proprium uendicantis, quod liuidus comperiatur. ^u Secundus musculus huic succumbit omnino carneus, & nusquam insigniter nerueam ostendens substantiam, præterea longè primo musculo breuior, multoq; iuxta humiliorem ipsius ^v sedem latior existit. Ex humero enim ea sede principium ducere incipit, ubi infima musculorum brachium mouentium fit ^w insertio, quam attollens brachium musculus cum illo qui brachium pectori admo- uet, molitur. A latere nanque exteriori insertionis brachium attollentis musculi, secundus hic musculus carneum ^x principium ab humero sumit, quod acutum est, & sensim deorsum obliquè in priora humeri tendens, secundum attollentis musculi insertionis formam (quæ transuersa est) dilatefcit, ac ab exterioribus introrsum modicè uersus inferiora declinat. Quum autem principium id, ad intimum insertionis brachium attollentis musculi latus prorepfit, ^y sursum denuò ad internum insertionis latus modicè repit, non adeò altè conscendens, atque iuxta externum ipsius latus enascebatur. Propter medium igitur longitudinis humeri secundus cubitum mouentium musculus enascitur carneo latoq; principio, quod ^z bicornè est, & in sui medio obtusum exprimit angulum. Quandoquidem principij exortus, linea ab externo latere humeri in anteriora deorsum obliquè fertur, & hinc ab anteriori parte sursum obliquè, uersus internum humeri latus ducitur, adeò ut unum principij cornu in externo humeri habeat latere, alterum uerò in interno, & angulus in antica humeri sede consistat. Porro si præsens obliquæ huius lineæ ductus, illaq; duo principij cornua tanti æstimes, ut duplici principio posteriorem hunc musculum cum nonnullis Anatomicis enasci dicas, nunc me uerissimè, & multò aliter quàm ipsos, huius musculi initia enarrasse puta, atque mihi u-

nus principij loco duo, quæ ponis, principia haberi finito, ne omnibus latis musculorum exortibus, præter morem plura principia cogar ascribere. Nisi enim id mihi donares, omnia lata musculorum principia ageminanda, aut si cum hoc secundi musculi principio cõferantur, pleraque principia etiã decuplanda præter omnem rationẽ forent. Præfens itaque musculus hoc enatus principio, sensim crassior carnosiorque efficitur, deorsum rectã protensus, & humero ualidissime adnatus, ex ipsoque exortus sui robur toto descensu tantisper assumens, quousque cubiti articulum cõtingat, quem sua amplitudine carneaque substantia in tota anteriori sede integens, ualidissime articuli ligamento, & anteriori ulnæ ac radij sedi, ampla implantatione inseritur, sua sede, qua articulum transcendis, montis speciem appositissime representans. Cæterum ut huius musculi ductus recto perficitur tramite, ita quoque prorsus rectas exigit fibras, quemadmodum & primus, quem nulla ratione huius subiecti fibras instar x literæ decussatim incumbere ausim asserere. Et quantumuis accuratè horum musculorũ functionẽ intueor, haud aliud colligo, quàm utrumque rectissimæ cubiti flexionis autorem esse, siue ambos unã, siue seorsim singulos duntaxat contrahi ponamus. & cur, quæso, Galeni dissectionis professorũ principis gratia, quas nunquam conspiciamus, cubiti flexiones nos decet cõtingere? Vt scilicet cubitum rectã, & deinde in alterum latus inclinantem, flecti dicamus, ut primum utrisque musculis simul rectam flexionem, ac insuper singulis priuatim ad latera flexionem tribuamus, quando Galenus sibi non constat, utriusnam musculo, in internum latus, an in externum, flexionis munus assignari debeat. Aliter enim longè in Libris de Humani corporis partium usu, atque in Libris de Administrandis confectionibus, de horum musculorum dignitate usque sentit. In his namque posteriorem musculum cubiti flexionis in exteriora inclinantis autorem esse censet, anteriorem uero flexum moliri tradit introrsum uergentem. In illis autem, musculum anteriorem introrsum magis, posteriorem uerò extrorsum magis flectere scriptum reliquit. Verum non ignoro, quum hæc perpendis (si modo ueritatis amator discendi cupidis sis) te cubiti flexionem sedulo moliri, atque quum digitos summo humero adducis, arbitrari rectam flexionem effici: quum uerò ad clauiculam pectorisque ossis summum, extremam manum ducis, in externum latus flexionem fieri: dum autem uersus scapulam digitos agis, in externum latus inclinantem cubiti flexionem celebrari. Ac proinde unã mecum Galeno nimium fidens colligis, ipsum rectissimè has flexionis species proposuisse, etiam si interim in enarranda musculorum functione, sibi in commemoratis modò libris haudquaquam consentiat. Cæterum iam paulo post secus autumabis, quando humeri quoque in scapulae acetabulo motum unã expenderis. Conare igitur nudis alicunde ascitis ossibus, ab omni circumductu tuum ipsius brachium immotum seruare, atque tunc demum stude in eodem brachij situ diuersam cubiti flexionem moliri: quam si tunc obseraueris, tempus erit fibrarum decussationem seu intersectionem, & diuersum cubiti flexionis opificum musculorum ductum cum Galeno (etiam si tale quid nihil sit) comminisci. Porro quum præter rectissimam flexionem aliam nullam fieri conspicias, summi rerũ Opificis solertiã encomio celebrabis, quòd huic motui duos ualidissimos præfecerit musculos, quia illum ualidum & ad plurima utilem homini futurum cognosceret. Atque huiusmodi rectissimos duntaxat motus in omnibus articulis, qui uerè mutuo ingressu, quem *γῆγλυμμοι* appellamus, committuntur, obseruabis. Quomodo cunque enim quemlibet quatuor digitorum moueris, nunquam secundum & tertium internodium primario motu in latus aut flecti, aut extendi intueberis. Pariter etiam neque tibiam. & si Galenus coxendicis articulo deceptus, illi diuersos, & impense obliquos motus assignauerit. At de tibiæ motu suo agemus loco. nunc enim ad uulge cum humero cõmissuram reuertendũ est, quæ mutuo ingressu (si modo totius corporis alia quæpiam) perficitur: ut interim de radij ad humerum connexu nihil afferam, qui omnino ne introrsum cubitus flecti posset, uel solus prohiberet, nisi fortè quis Galeno nimium deditus, externum humeri capitulũ instar laxi cuiusdam tumoris esse contenderit, ut scilicet in flexione, quæ extrorsum perficeretur, radio tanquam digito cederet, & denuo quum introrsum cubitus flecteretur, humerus nõ amplius compressus extuberaret. Quæ modò de flexione dixi, eadem de extensione proposita arbitrator: quam & si uarijs modis experiri queas, nullo tamen melius cubitum ne tantillum quidem in latus agi animaduertes, quàm si exactè protensum, uel pilo in alterum latus dimouere frustra conatus fueris. Inter cubitum extendentes musculos, primus ualido latoque & nerueo prorsus principio, ex humiliori scapulae costa non procul ab eiusdem ceruice exoritur, peculiarem illic unde prodeat sinum obrinens. Cæterum principium id paulo post exortum carne adaugetur, musculumque constituit, qui rectã deorsum ad internum latus posterioris sedis humeri fertur, illi non nisi magno latis sub ceruicis ipsius interuallo firmiter adnatus, iuxta infimam

Primi &
musculorum
munus.

Lib. 3 de Usu
part. 1. & 2 de
Admi. sectio.

Extendentiu
primus.

c. 814. N.

d. 11. l. 1. f. 13.
9. 12. T. 2. P.
10. 13. b. 4. u.
5. 8. 6. f. 7. N.
10. 3.
c. 13. f. 64. 22.
li. 1. Q.

nanq

nanque sedem insertionis¹ musculi brachium ad spinam versus inferiora trahentis, iste cubi-
tum mouens musculus primum humero connascitur, aut potius² alia ex humero inibi enata
carnosi musculi pars, ipsi commiscetur, quemadmodum caudatæ simiæ & canis musculi mani-
festò arguunt. In his nanque musculus, qui ab inferiori scapulæ costâ enascitur, ab illo qui hic
ex humero prodit, omnino distinguitur. Carnosa igitur explantatione primus noster muscu-
lus adactus deorsum rectâ fertur, medio interni lateris humeri & medio posterioris sedis hu-
meri tantisper adnatus, dum partim carneus, partim nerveus, amplissimè in internū latus³ po-
sterioris ulnæ processus inferatur, in descensu semper ab ea quam dixi humeri sede ad finem usq;
ipsius, humero adnatus, ac ex ipso principij robur assumens. Integrū itaq; est, in hominē hunc
musculum uniuersum, aut unum dicere, aut duos: ut⁴ unus quidem à scapula enascatur,⁵ al-
ter autem ab humero, qui cum illo cōfunditur, cui scapula principium præbet. At Galeni no-
mine, quum in caudatis simijs duo manifesti apparent, duos illos in præsentia ponamus.⁶ Ter-
tius igitur extendentium, qui in uniuersa cubiti musculorum serie quintus censetur, à poste-
riori sede ceruicis humeri, ad capitis ipsius radicem nervosus⁷ enascitur, & sensim rectâ deor-
sum descendens, & externam sedem posterioris humeri regionis occupans, carnosus euadit,
& pertinacissimè humero adnatus ab ipso principij sui uigorem mutuatur.⁸ Priusquam uerò
medium longitudinis brachij hic musculus superauit, duobus nuper dictis ita commisce-
tur, & cum ipsis adeò coit, ut nullo prorsus pacto in hominibus discerni queant, nihilq; aliud
quàm unum ex tribus effici musculū asserere possis. Quamuis interim tertius musculus suum
quem à principio obtinebat ductum obseruet, atque ualidissimè in externum latus posterioris
ulnæ⁹ processus partim carneus, partim nerveus inferatur. Atque ita tribus his musculis mu-
tuò cōiunctis, totus ille posterior ulnæ processus amplexatur, in sui sedis inferiori parte, cui
innititur, nervosiorē insertionis partem, quàm in lateribus, & superius exigēs. Mutuus enim
ille musculorum concursus, ac ueluti ex omnibus unus efformatus musculus, in posteriori se-
de admodum liuidus cōspicitur, tanto nervosior euadens, quāto ulnæ processui propius acce-
dit. Vtunque uerò inter se musculi hi concurrant, nullus tamen ab initio inceptum fibrarum
ductum deperdit, sed rectæ omnes deorsum, nusquam implexæ, neque sese decussatim inter-
secantes feruntur, & eandem omnes functionem obeunt, qua cubitum in neutrum latus incli-
nantem extendunt. Liqueat igitur tres hos musculos unius loco recenseri posse, qui ex tribus
conformatus esset principijs, aut duorum, si uidelicet primum & secundum unius loco habue-
ris. At in caudatis simijs & canibus fieri id nequit, nam his animalibus perinde ac equo, & bo-
ui, & alijs plerisque, quæ anterioribus cruribus inniuntur, atque in ingressu ualida extensio-
ne cubiti indigent, tres obtigerunt musculi egregiè conspicui, præter unum gracillimum in
caudatis simijs à scapula ad ulnam porrectum, & penitus à Galeno prætermisum. Quum in-
terim canibus unicus tantum flexionis autor adsit, ut sanè simijs duo, illis prorsus similes qui
in homine uisuntur, nisi quod posterior nonnihil posterius ab humero in simijs procedit, &
nervosior in ipsa insertionē conspicitur. Caterum simijs exteriorum primus ex scapulæ humi-
liori costâ, ut hominibus, oritur: sed duo principia mox inuicem cōiuncta obtinet, & deorsum
tensus, carnosusq; admodum redditus, nulli connascitur musculo, sed paulò supra cubiti ar-
ticulum extenuatus, nerveusq; factus, internæ sedi posterioris ulnæ processus inferitur. Se-
cundus huic subiaceret, & ubi homini secundus nasci dictus est, exoritur, toti humeri longitu-
dini tantisper adnatus, quousque ualida insertionē mediæ, & posticæ processus ulnæ sedi in-
feratur. Tertius, ut in hominibus, ab humeri ceruice principium ducit: inde carnosus eua-
dens, & nulli musculo, præterquam fibrosis nexibus, hærens, in exteriorem sedem postero-
ris ulnæ processus implantatur. Atque hi sunt musculi, quos post scriptos de Vsu partium li-
bros Galenus diligenter secuit: quamuis obscurè interim, ne ipsius errorem animaduertere-
mus, nobis in libris de Administrandis sectionibus eos expressit, non passim libros de Vsu
partium, quos iam olim Boëtho dedicarat, reformaturus. Quanquam tamen suo exemplari,
quod postea ad posteros demanauit, illum nonnullas lineas inseruisse certò colligo, at in
cubiti motus ducum enarratione, in libris de Vsu partium nihil sub incudem reuocauit.
Quæ omnia ostensurus sum meis in Galeni Anatomica annotationibus, iam pridem non in-
felicitè ceptis, ac seorsum aut cum Galeni libris multo quàm an-
tea emendationibus aliquando cūdendis.

*Carnosa pars
qua primus ex-
tendens aut
getur, quem se-
cundum consti-
tueret licet.*

*Li. de Adm.
ni. sectio.
Tertius ex-
tendens.*

*Quomodo in
canibus cubiti
agētes muscu-
li habent.*

*In Galeni
Anatomica
Annotationi-
bus.*

quæ in secundo ordine reponuntur, quibusq; postbrachiale coarctatur. Quæ cubitum seu radii ulnamq; brachiali colligant, membraneis reliquorum articulorum ligamentis respondent. sed ab apice processus styli imitantis, ligamentum huius articuli durius efficitur, quasi hinc peculiare quodammodo teres in brachialis os duceretur, quod rectum est, & cæteris magis cartilaginofum, uniq; tantum ossi commissum. Huic ligamento Galenus digniorem, quam ego assequor, usum tribuit. nam ad nullum mihi motum priuatim magis, quam uniuersum huius articuli ligamentum famulari uidetur. Quin etiam ex apice radii appendicis simile & insignius quoque in brachiale fertur, quod liquidissimè eum usum, quem Galenus alteri ascribit, uanum esse comonstrat. Radius uerò & ulna, propter brachiale & cubiti cum humero articulum, ligamentis ualidis, in circuitu ossa ambientibus alligatur. At accuratissimè tibi in memoriam reuocanda uenit ea^a cartilago, quam à radio procedentem ulnam à brachiali distinguere diximus, quæ ualidè etià ulnæ ad radicem acuti illius processus, quasi ligamenti naturam nacta inseritur. Per totam longitudinē, qua inuicem radius & ulna dehiscunt, ualidum & membraneum^b ligamentum habetur, ab acutiori ulnæ^c linea in radii^d lineam insertum. Hoc non simplex conspicitur membrana, uerum (ut pleraq; ligamenta) ex fibris conflatum spectatur, à radio deorsum in ulnam oblique proreptantibus. Huius beneficio, præterquam quòd ipso ossa inuicem alligantur, interiores cubiti musculi ab exterioribus dirimuntur, & ut antea monui, ex ipso^e musculi etiam nonnulli suorum principiorum robur asciscunt. Radius humeri exteriori capiti ualidis, sed membraneis ligamentis perinde ac cæteri articuli, alligatur. Et quamuis tutissimus sit ulnæ cum humero articulus, tamen robustis quoque ligamentis humerum ulnæ Natura commisit, quæ similiter articulum in circuitu amplexetur. Præter hæc ligamina in manu nulla sunt, nisi & horum albo^f ligamenta, quæ in musculorum constitutionem ingrediuntur, & proprias ipsorum membranas efformant, reponere statueris. quæ interdum in tantam pertingunt crassitiem, ut quum musculi caro ipsis subsit, liuorem quandam musculis inducant. Atque eiusmodi crassius ligamentum uentri obducitur^g musculi, pollicem à cæteris digitis maxime abducentis. Præter hunc, h^h musculus anterior flectentium cubitum, uentrem quoque liuescentem, ob membranæ crassitiem adipiscitur, quemadmodum etiam illi idq; admodum clarè, qui cubitum extenduntⁱ multò ante ipsorum insertionem, quam in ulnæ posteriorem processum moliantur.

Ligamenta musculorum constitutionem subeuntia.

ADMINISTRATIO MUSCULORVM ET

ligamentorum manus, ac dein quot quaq; sede reponantur musculi. Caput XLVIII.



IN præsentia brachium id cum scapula depromendum est, quod ad manus musculorum administrationē, quum thoracis aggredereris musculos, aliquò relocandum præcepi. Priusquam uerò sectionem auspiceris, quot in singulis partibus musculi reponantur, in memoriā reuoca. quod ut promptius facias, nunc omnes in compendium tibi digeram. In extrema manu utcunque illos numeres, uiginti enarrauimus. ^a decem nimirum, quibus prima quinque digitorum interno dia flectuntur, quorum bini ad singulos referuntur digitos. ^b tres, quibus secundum pollicis flectitur internodium, ^c unus pollicem maxime à reliquis digitis abducens, ^d alius eundem proximè cæteris digitis admouēs, ^e tertius qui minimum à cæteris ualidissimè in latus remouet: postremò ^f quatuor illi graciles musculi, quorum beneficio quatuor digiti ad pollicē obliquo ductu aguntur. Internā cubiti sedem octo musculi occupant, quorum ^g primus latum educit tendinem. ^h secundus & ⁱ tertius, quibus brachiale flectitur, ^k quartus secundū quatuor digitorum flectens os, ^l quintus qui tertium quatuor digitorum os flectit, ^m sextus qui tertij pollicis ossis flexus est autor. ⁿ septimus & ^o octauus, radii in prouum ducunt. Si uerò musculum, tertium quatuor digitorum os flectentē, unum esse cum illo qui tertio pollicis ossi famulatur, putaueris, interna cubiti sedes septem tantum musculi habitura est. In externa autē cubiti regione nos decem numerauimus: ^p tres scilicet, qui quatuor digitos extendunt, & à pollice abducunt, ^q unum qui pollicē ad indicē magis evertit, ^r alium qui pollicem evertens, eundem ab indicē magis remouet, ^s alium illi proximū, ac ad brachialis extensionem aliquid accommodantem, ^t duos insignes brachiale extendentes, & ^u duos quorum opē radius in supinū ducitur. Si uerò illud principium, quod ex ulna nasci, & in duas carnosas partes diffundi diximus, quorum alterā indicem præcipuè, & medium digitū, altera pollicem petebat, unius musculi uice enumeratū esse uelis, hinc reponetur nouem; dein si secundum principium

Quot musculi in extrema manu.

In interna cubiti sede.

In externa.

*In brachio.**Sectionē spe-
clantū negli-
gentia.**Manus exco-
riatio.**Musculi le-
tescentem ten-
dinem educa-
tis administra-
tio.**Lib. 1 de Ad-
mi. sectio.*

capitulum iunxeris, uniusque musculi loco habueris, octo erunt. nam bis unum, ubi nos duos constituimus, recenseris. In anteriori brachij sede duo flectentes cubitum sunt, in posteriori autem sede extendentes, aut tres, aut duo, aut unus, pro ratione nimirum collectionis in pauciores, uel distributionis in plures, quam tuo arbitratu proponere nihil obstat, si modò accurate illorum situm, connexum, amplitudinem, compositionem, functionem, & id genus alia secundo didiceris. Quippe ridiculum est de numero anxium esse, quanquam in publicis sectionibus, quum huius aut illius articuli musculos ita ostendi, ut non minus quam proprii ungues cognosci possint, per pauci studiosorum aliud recensere ualeant, quam hac prælectione quadraginta ostensos esse musculos. id satis arbitrati, si numero condiscipulum deterreant, negotijque difficultatem, & me unica ostensione nimium multa aggredientem incusent. In hoc tamen, qui inter illos diligentiores uideri uolunt, sedulo student, ut in quibus à Galeno dissentiam, sæpe quid uelim, non intelligentes excipiant & ad hos & illos ipsi indoctiores transcribant. Quo labore ut ipsos liberem, hæc à me toties efflagitata candidiori animo, quam à plerisque accipienda erunt, describere nequitiam grauior: unumquemque amicè monens, ne quis huic libro, neque alteri cuiquam, utcunque ueritate auctoritateque probato fidem præbeat, nisi accuratissima sectione, quæ scribuntur, prius, idque non semel inspexerit. Porro hanc, brachio eius quod fecas, cadaueris assumpto, ad hunc modum in manus musculis administraturus es.

Primum cutem cum adipe & membrana, quam carnosam uocare libuit, adimes: atque id perfeceris commodissime, si ab externa brachij sede, secundum radij ductum, & pollicis exteriora sectionem duxeris, quæ cutem membranamque carnosam diuidat. Dein ad cuiusque digitilatus alia ducenda est sectio, quæ depilem (ut sic dicam) manus cutem, ab exteriori dirimat, ut illa cum brachij & cubiti cute auelli queat, ea quæ internam summæ manus sedem integrit, adhuc relicta. Neque in cute adimenda nunc alio indiges artificio, quam quo lanij boues excoriant. Quum tamen ad radicem brachialis, in interna manus sede per uentum fuerit, transuersa sectione cutem nunc liberatâ ab illa, quæ in uola adhuc reliqua est, refecabis. hæc namque latefcentis tendinis nomine asseruanda uenit. Priusquam uero tendinem illum aggrediaris, accurate perpendito, totam cubiti sedem paulò minus toto liuescentem, ob membranam quæ musculis proximè adnata, illos inuicem committit, atque ne ipsi sua sede declinent, amplectitur. In conspectum enim cubitum occupantes musculi iam ueniunt, sed ita commissi, ut solum lineas, quæ ipsos dirimant, intuearis: quum tamen mutuo prorsus disuncti apparebunt, si leues duntaxat sectiones secundum dictas modò lineas duxeris. Huius membranæ naturam eo obseruabis diligentius, quo magis perfunctorie, imò nihil prorsus Anatomici illius meminerint. Cæterum ut latefcentem uideas tendinem, animum accommoda cubiti internæ sedi, in cuius longitudine ipsius musculus, & tendo, quum adhuc gracilis est, exporrigitur. Cultello itaque à brachialis radice sectionem leuem, ad tendinis & musculi latus utrinque, uersus internum humeri tuberculum molieris, & postmodum iuxta brachiale, tendinem à sublati organo liberabis, & cultello transuersim ipsi subiecto, & sinistræ manus digitis tendine eleuato, uniuersum musculum ad ipsius usque caput separabis. Deinceps acutiori nouacula cutem manus adhuc reliquam, à uola & digitis absecare conator, à brachiali sectiones semper transuersas molitus, eadem omnino ratione, quæ cutem à carnea membrana diuidere iam dudum assueuisti. Quemadmodum enim in illa sectione membranam corpori affixam seruas, ita quoque tendinem dilatescentem manui iam hædere sinis. Quum uero id tentas, duriusculus sese offeret adeps, cutem & tendinem illum intercedens, qui tanto diligentius quoque animaduertendus est, quanto tendinem magis à cute dirimit: & tendinem non toti cuti proximè adnatum, sed duntaxat fibrosis nexibus membranæ carnosæ modo, & adipis interuentu, pertinacissime commissum ostendit. Examinata cute, musculi caput ab humero liberatum, à brachiali pendere fines latefcentem tendinem, à subditis quoque aut nouacula, aut paruo, sed acutiori cultello auulsurus. Si uero aliquando uisum fuerit, tendinem unâ cum cute adimere, id feceris facillimè, si tendinem priusquam cutem separas, unâ cum cute abstuleris. at tunc arduum erit, tendinem à cute integrum liberare: quamuis non adeò, ut Galenus arbitratu est, qui nihil medium inter cutem & tendinem posuisse uidetur. Porro si hic musculus in interna cubiti sede sese non offerat, atque duorum musculorum, qui brachiale flectunt, capitibus ad humeri interius tuberculum, nullum musculum incumbere uideris, præsentem musculum deesse conijcito: quod sanè non infrequenter tibi occursum scio. Non quòd negligentia illum præteriturus sis, uerum quòd prorsus deerit, eius uicem tunc supplente inferiori, interdum etiâ superiori brachiale flectenti musculo, aut transuersi in brachiali ligamenti portione, quam pari modo ut latum tendinem indagabis. Iam itaque omnia cute libera sunt, unde etiam & quosdam extremæ manus musculos citra aliam sectionem aggredi possis,

x 6 ta. o. 8
ta. r.
y 13 tab. b.
c. d.d 3 ta. mu-
sculi n.b Versus
tabula.

c 3 ta. A.

d 3 tab. m
c 3 ta. A.
f 4 tab. A.

possis, eum uidelicet⁶ qui pollicem à reliquis digitis remotissimè abducit, & deinde^h duos primum ipsius internodii flectentes, sic &ⁱ musculum, cuius beneficio paruus digitus à reliquis maximè abducitur, &^k exteriorem primum eius digiti os flectentium difficiliè liceret. At opportuniùs feceris, si donec omnes summæ manus musculos adimere possis, hos seruaueris, atq; ad internam cubiti sedem te rursus contuleris, in qua primum administrandi ueniunt^l duo brachiale flectentes, quos rectissimè primum ab ipsorum tendinibus, iuxta brachialis radicem aggredieris. Si enim hos à subditis musculis aliquantisper auulsos eleuaueris, ac deinde transuersis sectionibus, illos ad internum usque humeri tuberculum à subditis liberaueris, uniuersam ipsorum ferè naturam mediocri negotio spectabis. Inferioris nanque capite absecto, & musculo ab ulna liberato, ut is duntaxat ab insertione^m dependat, ipsum ut uisum fuerit, aut adimes, aut adhuc appensum sines. Superioris autem tendo, à brachiali nō est absecandus, uerū aut musculus suo liberatus capite, in latus est reponendus, autⁿ tendo nonnihil ante brachiale uenit rescandus, ut in sectionis serie, eius tendinis insertio reddatur conspicua. Mox^o primus digitus mouentium sese totus offert, quem uel solis digitis à subdito dirimes, quemadmodum etiam omnes, quorum latera non committit neuosa illa membrana, quæ communis ligamentum tenere fungitur. Vbi itaque ipsius capite adhuc ad exortum commissio, quatuor ipsius ante brachiale carnosas portiones inspexeris, ualidus cultellus in transuersum^p ligamentum recta est iniiciendus, ut huius acie antrorsum ducta, id ligamentum diuidatur. Dein eadem ratione secundum indicis longitudinem, transuersum internæ ipsius sedis ligamentum diuides, mentem accommodans, ne hæc prorepentes tendines lædas, quod optimè caueris, dummodo cultelli dorsum semper tendines respiciat, ipseq; cultellus rectus sit. Eandem sectionem in tribus reliquis digitis moliri in præsentia posses, nisi sensum magis magisque horum ligamentorum naturam aut discere, aut alijs ostendere propositum esset. In indice itaq; duntaxat, aut alio quouis digito hac ducta sectione, primi musculi digitos mouentium caput liberato, & illo apprehenso, & ad te sursum tracto, id ex brachialis sinu tantisper reponito, quousq; quatuor ipsius tendines ad quatuor digitos porrigi conspexeris, & deinde priuatim illius tendinis insertionem obseruaueris, qui indicis exporrigi. Hac enim inspecta, & musculo sursum in suam sedem reposito, eius caput trahendū uenit, ut ipsius innotescat munus, intuearisq; qua ratione primo indicis articulo in flexu secūdi, tendo ille adniti nolit, uti sanè reliqui transuersis adhuc ligamentis inuoluti inniuntur, proxime ue attenduntur. Nunc ligamenti trium reliquorum digitorum, ac cuiusq; tendinis insertionem & perforationem, qua subditum transmittunt tendinem, notatis, musculum à manu in anteriora reflexum mensæ exporriges, aut si in sinu manum habueris, propendēre à digitis sines, ac^q eum qui tertium quatuor digitorum internodium flectit, suo capite liberabis, quod nonnihil occultitur sub musculo, superiorem radij partem in pronum ducente. Priusquam tamen id ab ulna abrasas, cōducet ex brachialis sinu quatuor ipsius tendines attollere, & animum adhibere, quī citra omnem operam musculus hos tendines producens ab^r illo diuellatur, qui ipsius superiori lateri accumbēs, tertij pollicis ossis flexionis autor habetur adeo, ut utrunque musculi unius loco in homine habere nequeas. Liberato itaque secundi musculi capite & ipsius quoque exortu, quem ab ulnæ^s ligamento assumit (quod inter radium & ulnam, ubi inuicem hæc ossa dehiscunt, obuūm est) uniuersum musculū ex brachialis sinu repones, eius mucosam perpendens membranā, & tendinum ipsius seriem. Cauendum tamen est, ne quum eos attollere studes, gracilem^t musculum singulis tendinibus exporretum uiolēs, hic enim quum tendini committitur, atq; etiam primo digiti ossi inseritur, ad tertium usque articulum secundi musculi tendines oscitater eleuare prohibet. Quum itaq; hos tendines^u primi musculi tendinibus trajici atque in tertium os inseri uideris, utrunq; musculum in suum locum reponito, examinaturus num secūdi musculi tendines primū digitorū os flectant soli, aut simul cum ipsis primi musculi tendines, & eius generis reliqua, quæ in horum musculorum functionis enarratione proposuimus. Primo musculo à digitis resecto, secundum in brachialis sinu transuersim diuides, ut ipsius tendines adhuc in uola referuentur, gracilium musculorum causa, quatuor digitos pollicis adducentium. Modò^x tertium musculum pollicis subseruientem à radio liberabis, & ad tertium pollicis internodium duces, ipsius tamen transuerso ligamento, ut in reliquis digitis, prius diuiso. Hunc ubi abstuleris, musculi brachiale flectentium superioris insertionem speculabere^y, quam in radicem postbrachialis^z ossis indicem sustententis molitur. Atque nunc tibi in interna cubiti sede adhuc² duo tantum musculi super sunt, radium in pronum mouentes, qui quum citra aliam operam conspicui sint, donec & horum oppositos uideas, opportuniùs seruabuntur. In præsentī itaque ad externam cubiti sedem accedas, in ea potissimum obseruaturus³ transuersa ligamenta, quæ ac si unum essent,

Primi & secundi brachiale mouentium.

Primi digitos mouentium.

Secundi.

Tertij digitos mouentium administratio.

Transuersorum ligamentorum in externa cubiti sede.

essent, sese offerent, uerum dum tendinibus, quos ligamenta continent, mentem accommo-
dabis, ac seorsum unumquodque, ut in interna digitorum sede præcepimus, administraueris, ut
minimum sex numero occurrent, quæ antequam musculos separe, diuidere possis, nisi prius
in cubito cuiusque musculi tendinem separare statueris. At commodius erit aut simul omnia an-
te musculos, aut priuatim unumquodque saltem ante suum musculum aggredi. Primus autem esse
potest, qui postbrachiali ante paruum digitum insertus id extendit, cuius tendo ex suo^d sinu
eueabitur, & deinde acuto cultello, aut nouacula totus musculus ab ulna liberabitur accuratè
interim ab illo, qui superiori ipsius lateri committitur, quicquid parui digiti extensioni potissimum
famulatur, diuisus. Vbi itaque huius caput ab externo humeri tuberculo dissecueris, illi postmo-
dum à postbrachiali liberabis, nisi appensum ipsi asseruare lubeat, quo tandè brachiale exten-
dentium & flectentium musculorum munus conspiciari ualeas. Post hunc is ex sinu attolleretur,
qui minimos digitos à cæteris deberet abducere, cuius tendines, aut tendo potius ad digitos
ducendus non est, nisi ab externo humeri tuberculo is, cum¹ subsequenti iam in enarratione mus-
culo (qui digitos mouentium decimusseptimus numerabatur) liberatus fuerit. Illum autem di-
ligenter ex suo, quem nos ipsi tribuimus, sinu attolles, atque ab illis, qui superiori ipsius lateri
exporriguntur, diuisum, ab humero quoque rescabis, nunc sedulo animaduertens, num in
tres, aut quatuor ducatur tendines, & quibusnam digitis illi inserantur, quæque ipsorum ad digi-
torum radices sit commixtio. Idem in illo, qui paruū digitū præcipue extendit, molieris, neutrum
ab ipsis digitis absecans, nisi & modò² subsequenter ad insertionem usque deduxeris. Occur-
rent enim nunc³ tria illa, quæ ulna producit principia, quorum inferius, & brachiali propin-
quius obseruandū uenit, à quo musculus pronascitur, qui indicem & medium à pollice abdu-
cit. Huius itaque principij portionem, quæ illum musculum constituit, ab ulna diuides, atque ex
suo peculiari⁴ sinu eleuatam, & sensim à brachiali & postbrachiali, quibus fibroso nexu hæret,
liberatum, ad digitos usque deduces, ad amissim nunc trium illorum musculorum tendines,
& insertionem perpendens, quam multò accuratius inueberis, quam ego illam (quum uaria
sit) describere possim. Cæterum illis à digitorum internodijs ad unguium usque radicem resec-
tis, qui pollicem euerit, aggredieris, ab ulna itaque⁵, reliqua tertij principij parte resec-
ta, musculus pollicem uersus indicem euerit, ad ipsius insertionem ducetur, similiter⁶ secundi principij mu-
sculi, qui bicornem transcendunt tendinem, ad pollicem & brachiale usque auellentur, atque
una cum reliquis à digitis reijcientur.⁷ Qui bicorni tendine brachiale extendit, modò prorsus
est conspicuus, nisi quod nonnihil sub⁸ musculo longiori radium mouentium occultatur. hic
itaque suo exortu liberatus, ad postbrachiale ducetur, & ipsius examinata functione, etiam cum
cæteris abijci poterit. Super sunt adhuc in externa cubiti sede,⁹ duo radium in supinum ag-
tes, qui citra sectionem etiam, ut &¹⁰ interiores radij duces, sunt conspicui, longissimi tantum¹¹ ca-
pite excepto, quod penitus nonnihil inter¹² posteriore cubiti flectentium musculum, & ex-
tendentium¹³ exteriorem latitat, non tamen adeò impensè, ut non liceat ipsius capite ab hume-
ro resec-
to, illum ad insertionem usque cum reliquis radium mouentibus musculis perducere.
Si itaque nunc¹⁴ ligamentum in cubiti longitudine inter ossa positum animaduertieris, extremæ
manus musculos ordine aggredi tempeltuum fuerit, ex quibus¹⁵ quatuor statim graciles eua-
dunt conspicui, quos Natura¹⁶ tendinibus tertium digitorum os flectentibus exporrex-
it. Dein-
ceps¹⁷ ille liberatur, qui pollicem ab indice maximè remouet, mox¹⁸ duo primum pollicis inter-
nodium flectentes, Deinde¹⁹ tres secundum pollicis os flectentes, quos eo diligentius obserua-
re oportet, quo magis antehac dissectionis Professoribus incogniti fuerint. Hos subsequetur,
qui pollicem indici proximè accommodat, dein²⁰ qui paruū ualidissimè abducit, ut tantū
octo adhuc sint reliqui, quorum ope prima quatuor digitorum internodia flectimus. Iam digi-
torum articulos diuides, ligamenti & articuli speciem obseruas, & attentissimè perpendens,²¹ os-
siculorum usum, quæ à selsami seminis similitudine nomen mutuatur. Reperies enim in interiori
secundij pollicis articuli regione, duo reliquis in manu insigniora, in hoc ibidè fabricata, ut quū
in articulatione illum articulum Natura fieri uoluerit, is tamen firmitus esset, & ad flexionem in
acutissimum angulum pertinax, & obliquorum etiam motuum obscurissimè particeps. Deinde
tanto minora eius classis ossa in primis reliquorum internodijs uidebis, quanto in acutum ma-
gis hos articulos Natura flecti uoluit, & ipsos obliquioribus motibus, quam secundum polli-
cis internodium, donare uisum fuit. Insuper primum pollicis articulum diuides, eiusmodi ossi-
bus destitutum, & laxum admodum. Idem quoque in postbrachialis & brachialis ossibus expe-
rieris, at longè diligentissimè brachialis ad cubitum articulo animum accommodabis, quod hic²²
cartilago examinanda ueniat, ulnam à brachiali dirimens. Quinetiam perpende, obsecro²³, sty-
li imitantè processum non procerius extra sinum, quo brachiale excipitur, prominere, quam
radij

Tertij brachi-
ale mouentiu.

Decimoctla-
ui & 17 digi-
tos mouentiu
administratio.

Decimoini
administratio.

21, 22 digitos
mouentiu, et
dein eius qui in
illorum descri-
ptione 23 nu-
meratur.

Quarti bra-
chiale mouen-
tium.
Radium mo-
uentium admi-
nistratio.

Quatuor mu-
sculorum qua-
tuor digitos
pollicis adduce-
tium, & alio-
rum extremam
manu occupan-
tium.

Ligamento-
rum reliquorum
administratio.

c 9 tab.
d 2 fi. ca.
24 lib. a.
e 9 tab.

f 9 tab.

g 10 tab.
h 10 tab.
i, n.

i 24 fi.
24 lib. d.

k 10 tab.
l 10 tab.
dem h, l.

m 11 tab.
n 12 tab.

o 12 tab.
p 7 tab. c.
x.

q 12 tab.
r 12 tab. y.
ta. r.

s 11 tab.
aut illic n.
ter o &
occulitur.
t 7 ta. v.
ter s, t.
ta. h.

u 6 tab. f.
7 ta. d.
x 6 tab. d.

7 f.
7 3 ta. p.
x 6 ta. n.

a 7 ta. che.
1, 2, 3.

b 11 tab. f.
c 3 tab. r.
d sub a.

tabula.
e f. ca. a.
l. n. t.

v, x, z.
f 12 fig. ca.
24 lib. 1. t.
g carunden.
f. R.


radij appendicis^h mucronem. Dein expendito, parem ligamenti huius articuli in utroque latereⁱ formam esse, ut una^k mecum omnibus quoque similem usum ascribas, ne quum Naturam celebrare instituis, illi inartificioissimam constructionem, cum Galeno imponas. Reiecta nunc summa manu, prior^k eum cubitum flectentium musculum suis principijs liberato, quorum exterius ex suo sinu eleuandum est, & ligamento articuli humeri ipsum continente recta sectione dissecto, id a scapulae collo adimetur. Interius ualido quoque cultello ab interiori scapulae processu diuidetur, & utroque principio deorsum reflexo, huius musculi carnosam insertio in os humeri animaduertetur: qua dissecta ad radium usque, sola manu a subdito musculo iste prior auelletur. Vbi uero huius insertionem intuitus fueris, is appensus seruiabitur, & posterior ab humero densus ad ipsius quoque insertionem ducetur. Posteriores eadem ratione aggredieris, primum^m illum qui ab humeri ceruice pronascitur liberans, ac deinⁿ illo cui scapula initium praeber, ut postmodum hoc deorsum tracto, secundum animaduertas ipsi innatum, ac sub illo ab humero prodeuntem. Quod tum demum ex sententia feceris opportunissimè, ubi hos in cane aut simia prius spectaueris. Quando itaque hi ad insertionem producti sunt, neque ullam fibrarum insertionem animaduueris, cubiti articulum subinde flectito & reflectito, examinaturus num uel tantillum quidem extra rectum tramitem dimoueri queat, quod quum in articulo solis ligamenti haerenti, & iam prope modum luxato, obseruas, quid fieri in nobis arbitrabere, articulo tot musculis adhuc uestito. Vt tamen haec omnia exactius rimeris, ossa inuicem se iungenda sunt, non solum humeri cum ulna articuli gratia, uerum & radij cum humero, & radij rursus cum ulna. Praeter hoc enim quod nihil utilius sese inspicendum in tota resectione luxationum gratia offert, ita profecto eiusmodi articulorum inspectione, nulla in uniuersa Anatome mihi iucundior speculatio occurrit.

Cubitus motus
admi-
nistratio.

DE MUSCULIS PENI PECULIARI-
bus. Caput XLIX.

QVADRAGESIMI NONI CAPUT

TIS TABULA.



c QVADRA-

QVADRAGESIMI NONI CAPITIS TABV

lae, eiusdemq; figurarum & characterum Index.

PRÆCEDENTĒM paginam occupans tabula, quatuor complectens

figuras numero insignitas, nō huic tantum Capiti, uerū etiam & alijs plerisq; utilis erit. Ne ue-
rō dein pluribus præfigēda sit Capitibus, hic omnes suarum notarum indices sum explicaturus.

- 1 Prima itaq; figura corporis in mensa proni, & oculo ad perinæum, seu inter femineum directo, ostendit femora in latera admodum distensa, & penis corpus uniuerso interim scorto cum testi-
bus, cute, adipe, uenis, neruis, & arterijs undiq; abscētis.
- 2 Secunda figura nuda quodammodo commonstrat ossa, quæ sacri ossis lateribus committuntur, ac ilium & coxendicum & pubis ossa appellantur. His femorum ossium portiones adhuc appen-
dent, unā cum ani & penis musculis: quos ideo ab ipsorum exortu dependere finximus, ut penis
corporum origo urinæq; & semini communis meatus inibi in conspectu esset, qua sursum sub pu-
bis ossibus flectitur.
- 3 Tertia, penem transuersim dissectum in hoc ostendit, ut penis corporum substantia, & coalitus,
& cum urinæ meatu connexus oculis subijcerentur.
- 4 Quarta figura integrum commonstrat penem, unā cum uesica hic exporrectum, ut proprius uesi-
cæ ceruicis musculus intueri possit.

A, B 1, 2, 3, 4 Duo penis corpora, penem quodammodo uniuersum constituentia.

C, C 2, 4 Duorum penis corporum exortus.

D 1, 2, 3, 4 Penis glans, quam alij præputium nuncupant: eo nomine cutem, qua penis obtegitur,
non dignantes.

E, E 3 Fungosa rubraq; penis corporum substantia.

F 3 Mutuus penis corporum connexus, & neruea eorundem substantia, quæ orbiculatim fungo-
sam substantiam complectitur.

G 1, 2, 3, 4 Vesicæ meatus, urinæ seminiq; genitali communis.

H, I 1, 2 Duo primi penis musculi, in prima quidem figura suam seruantes sedem, in secunda autem ab
eorundem principio dependentes.

K, L 1, 2 Duo posteriores penis musculi, seu tertius & quartus, qui in prima figura integri, in secun-
da uerō ab insertione pendentes conspiciuntur.

M 1, 2 Musculus orbiculatim recti intestini finem ambiens, faciūq; excretioni præfectus.

N, 4 Vesicæ ceruicis musculus, urinam, ne præter nostrum arbitrium defluat, cohibens.

O, O 2 Membrana pubis ossium foramina occupans.

P, 2 Teres ligamentum, à coxendicis osse in rotundum femoris caput insertum.

Q, 4 Vesicæ corpus.

R, 4 Glandosum corpus, uasorum semen deferentium insertionem excipiens.

S, S 4 Portiunculae sunt meatuum, quibus urina è renibus in uescam ducitur.

T, T 4 Portiunculae sunt meatuum, semen in uescicæ ceruicem eiaculantium. Musculos autem in prima
figura femur amplexantes, characteribus non insigniuius, quod illi in musculorum tabulis dili-
gentissime annotati fuerint.



Penis consti-
tutio.

Primi duo pe-
nis musculi.

T S I penis constructionis enarratio in quintum librum, ubi generatio-
nis organa persequetur, opportunè referuanda ueniet, nihilominus ta-
men in præsentī tantam huius mentionem facere expedit, quanta ad mu-
sculorum penis descriptionē exusu est. Penem itaq; præter^a cutem qua
inuoluitur^b, duo grandia, & neruea, & intus spongiæ modo caua effor-
māt corpora, quorum dextrum à pubis ossis dextri^c sede enascitur, pau-
lò inferius quā ubi inuicem pubis ossa dehiscere incipiunt. hoc uersus
sinistrum latus modicè exporrectum, cum sinistro coit corpore, à pubis osse sinistro principiū
ducente. His corporibus tota penis constat moles. atq; hæc corpora ad inferiorem ipsorum se-
dem, qua coeunt uescicæ^e meatum sibi toto ipsorum ductu ad^f glandis usque radicem subna-
tum exigūt, ubi canalem hunc urinæ seminiq; communem, corpora illa in unum prorsus cor-
pus confusa amplexantur, quemadmodum quinto libro auditurus es prolixius. Nunc enim
ad quatuor musculorum descriptionem, modo dicta, abundè sufficiunt. Ab anteriori itaq; se-
de anularis^g musculi, quem rectio intestino ut excrementorū præstigectioni obnatum esse do-
cebimus,

a 20 fi. lib.
s r.
b Præsentī
ca. figurar.
A, B.
c s fi. B.
d 2 fi. ca. 2.
lib. 1. q. uer.
hic 2, 4. fig.
C, C exor-
tus nota-
tur.
e 1, 2, 3. fi.
f 1, 2, 3. 4.
fi. D.
g 1, 2. fi. B.

cebumus,¹ duo carnei nascuntur muscoli,¹ illis prorsus similes qui à pectoris ossè ad os v referens porriguntur. Ambo enim inuicem proximi sunt, & internis lateribus mutuò cōmittuntur, rectaq; sursum in priora ad urinarij² meatus sub corporibus illis ad superiora reflexum ascendentes, eius meatus lateribus inferuntur, & inuicem dirempti, corpora penis nonnihil digitorum modò amplexantur.¹ Alij duo utrinq; habentur singuli, ab appendice ossis coxendicis paulo inferiùs quàm penis corpora, principium ducentes. quod carneum est, & gracile, et obliquè sursum procedentem efficit musculum, qui carnosus semper permanēs, sui lateris corpori non procul ab exortu inferitur. Quatuor his musculis penis radix uoluntario impetu trahitur, hinc & erectionis quandam uim, præter naturalem facultatem ipsi insitam, obtinens. Quancum duo priores musculi in urinæ feminisq; excretionibus, communem illum urinæ seminiq; meatum ueluti digitis quibusdam aperire uideantur, ne meatus in obliquo hoc reflexu restrictus, eiusmodi humorum expulsionem prohiberet, & potissimum feminis, cuius eiaculatione (etsi urina multo crassius sit) impetu Natura perfici uoluit. Nisi enim hi musculi inferiorem meatus sedem in hoc reflexu deorsum uellerent, in penis tentigine totus meatus occluderetur, quòd ipsius superior pars à distentis corporibus adeò pertinaciter huc illuc alliceretur. Porro, ut musculos hos commodè aggrediaris, reliqua cadaueris pars, quæ adhuc reliqua est, refumetur, ac distentis quàmmaximè possis femoribus, orbicularem sectionem inani ambitu duces, qua cutem ad adipem usque (quem hic habes copiosissimum, maximeq; humidum) diuidas. Deinde longam sectionem per futuram in penis inferiori sede ac scorto conspiciuam in cute perperinæum (quod interfemineum alij uocant) molieris, quæ ad anteriore usq; orbicularis lineæ sedem peringat. Postmodum cutem hamulis, aut digitis eleuatam, hinc inde à subditis organis nouacula diuellis, atque musculos qui sese abspecta cute offerunt, paruo cultello à suis exortibus liberatos, ad insertionem usque perduces, non per transfennam singulos seorsum expendens, cum calculorum eruendorum gratia, tum fistularum ulcerumq; nomine hac sede non infrequenter homines infestantium. Deinde eo obseruandi ius quoq; exactius, quo minus aliquid à Galeno de his prodirum habemus. Quàdoquidem locus in quo illos in opere de Administrandis sectionibus profecutus est, unà cum quinque & dimidio eius operis libris incuria temporum intercidit, unà cum ipsis de Musculis peculiari libro, in quibus proculdubio horum mentionem illum fecisse Arabum libri commonstrat: unde etiam prorsus sperandum est, in Bochara Persiæ ciuitate cuiatem Auicennam fuisse sat nouimus, hos libros omnes aliquando non inuidentibus superis, inueniendos. Nisi fortassis Auicenna etiam illis libris destitutus, Orobasiij duntaxat operibus usus fuerit, è quibus uerbotenus hoc quidquid de hominis fabrica prodidit, descripsisse uidetur.

Tertius & quartus.

Musculorum officium.

Administratio.

DE CERVICIS VESICÆ MUSCULO,

urinam, ne præter arbitrium ex uesica profluat, inhibente.

Caput L.

HUIUS musculi effigiem in uiris quarta figura tabulæ præcedenti Capiti præpositæ commonstrat, N littera notatam, quemadmodum & uigesima secunda & uigesima tertia figuræ ad characterem p. Muliebris uerò uesicæ musculum proponit uigesima quinta libri quinti figuræ γ. Quòd autem illas figuras hic non proponam, hinc potissimum fit, quòd eisdem figuris paginas occupandas minime duxi.

4. fi. cap.
49 Q.
eiusdē p.
R.
eiusdē p.
N.



25. fi. lib. 5.
B.
eiusdē
fi. A.
eiusdē
fi. γ.
27. fi. lib. 5.
L.

D uirilis² uesicæ finem, ubi in collum ceruicem uè terminatur,² glandosum quoddam corpus ipsi obnasci, quintus liber declarabit, qui etià uersum meatus ductum explicaturus est. Musculus autē iam nobis propositus inter glandosum id corpus & reflexum consistit, quē uesicæ ceruix sub pubis ossè primū molitur. Musculus totā fere hāc meatus sedē orbiculatim ambit. Est namq; orbicularis, & oblongi anuli, aut oblongi rotundiq; meatus effigiem exprimit, fibris transuersim circularibus intertextus, & superiùs iuxta glandosum corpus crassior quàm inferiùs. Atq; ita in uiris habet. In mulieribus uerò, quarum⁴ uesicæ⁵ ceruicis eiusmodi corpus glandosum non adnascitur,⁴ musculus totum meatum ambit, qui à uesicæ corpore in superiorem sedem colli uteri nō procul à pudendo⁶ subingreditur: & musculus hic quanto in mulieribus proluxior est, tanto etiam tenuior uisitur, eundem tamen prorsus usum in his ac in uiris præstās. Primariò enim in hoc ipsum Natura condidit, ut meatus uesicæ præficeretur, obstaculo futurus ne transuersæ uesicæ fibræ motu suo naturali urinam præter nostram uoluntatem excernant. Operæ precium

Virilis uesicæ musculus.

Muliebris.

Musculi usus.

enim fuit egerendis ex corpore recrementis motus præesse uoluntarios. si casu enim naturalis duntaxat motui excrementorum propulsio committeretur, continuo recrementa emanaret: atque id præterquam quodd fecidissimum censeretur, ad plurimas actiones, quas tota uita obimus, insignes noxas inferret. Quo minus igitur uesicæ circulares fibræ, urinam quories ipsa aut copia, aut mala quapiam qualitate hominē grauāt, etiā citra hominis impetum propelleret, Natura meatui uesicæ hunc musculum præfecit, quo laxato urina tranfuerfarum uesicæ fibrarum ui pressa excernitur, interdum etiā huic functioni auxiliantibus^b abdominis musculis, & septo tranfuerfo spiritus compressu ad inferiora depulso. Quum uerò urina effluxit denuò musculus constringitur, quicquid ex urina reliquum meatui adhuc inhaeret protrudens. Relinquuntur autem tres quatuor ueguttulæ, quæ emissā iam urina promanare solēt. Atque hic alter præsentis musculi usus censendus est. Quod uerò ad excretionis promptitudinē uelocitatemque quicquā (ut Galenus asserit) auxilietur, quodq̃is præcipuus ipsius sit usus, nequeo satis assequi. Quo enim magis remittitur, suamque comprimēdi uim laxat, eo liberiorē reddit meatum, qui apertus & amplius maiorem urinæ à circularibus uesicæ fibris pressæ copiam transmittit, quā si laxatus musculus nō nihil suas fibras ad expulsiōem dum urina profluit quoque intenderet, ac nescio qua ratione per uiuersum egerendi tempus ageret, ita angustiorē meatum reddens, scelericioremque urinæ excretionem uitians. Nec profectò aliud (& si Galenus secus arbitretur) est, quo meatus ne præter arbitrium urina emanaret, arceretur, ab hoc, quem modò narramus, musculo. Quandoquidem à Galeno in mediū adductam meatus angustiam & longitudinē uarijs circumactibus iunctam, refellit muliercularū urinæ^c meatus: qui etsi perinde ac uiroꝝ ad insertionem usque, quam in uteri ceruicem molitur, arctus sit, brevis tamen est, & rectā deorsum breui intervallo uteri collo exporrigitur. Cæterum ceruicis uesicæ musculi administrationem in secundum post hoc Caput reijciam, ibidem illum unā cum sedis musculis aggressurus.

Lib. 5 de V. su
par.

DE RECTI INTESTINI MUSCULIS.

Caput LI.



- ^a **RECTI** intestini portio cū suis musculis à corpore resecta, quā dū reliqua eximimus intestina, in corpore adhuc relinquere solemus.
^A Rectum intestinum, quod in libri quinti tabulis euadet conspicuum, præsertim autem octaua figura & uigesima secunda.
^{B, C} Duo musculi, intestinum post egestionem sursum trahentes.
^D Musculosa substantia penis radici adnata, in mulieribus porrò ad infimam pudendi partem commissa.
^E Insuper ^D sedes notatur, à qua in penem musculi duo pronascitur.
^E Circularis musculus, ne præter arbitrium excrementa deijciantur præcauens.



Musculi se-
dem accollen-
tes.

AVDATA nunquā satis Natura^a recti intestini extremo musculos largitur, qui in fecium excretionē protrusum recti intestini finem, alacriter sursum reuellunt: dein alium dat musculū, qui intempestiuam in uoluntariamque excrementorum egestionem prohibet.^b Musculi itaque sedem sursum attrahentes, lati & tenues, neque admodum carnosī aut rubentes sunt, uix ab aliquibus ossibus originem ducentes. ^A Ligamētis enim ex pubis ossibus, & coxendicis osse, & sacro exortis, quæ huius regionis musculis obducuntur, ipsaque demum peritonæi infima sede utrinque singuli enascuntur musculi, qui deorsum protensi, rectum intestinum amplexantur,^c extimæ ipsius tunicæ inserti. Præsentēs musculi quum lati admodum sint, & suis finibus totam intestini latitudinem ambiant, ipsorum^d portio radici quoque penis, mulieribus uerò uteri collo adnascitur. Quod nonnulli perpendentes, tres sedem sursum agentes musculos recensuerunt. Vtuncque uerò sit, omnes horum musculorum partes pari præficiuntur muneri, quo sedē ilico ab excretionē sursum alliciunt, qui deorsum pellebatur uia abdominis musculorum, & septi tranfuerfi, auxiliantibus etiā subinde omnibus thoracem arctantibus spiritumque continentibus musculis. Cæterum illis qui anum sursum ducunt musculis nullus ē regione opponitur contrariæ functionis opifex, quemadmodū in omnibus ferè alijs partibus musculi equidem opponi consueuerunt. Neque oscitanter hic Natura priuatim ab aliorum musculorum constructione aberrauit. sciebat enim interdū à musculis octo abdominis unā cum septo tranfuerfo,

b 3 14. 9.
tab. 7. 5. d.
a.
i 7 14. d.

a 8 fi. li. 5. ad
X ad a. c.
20 fi. li. 5. o.
c 22 *.
b 22. c 22. b
fi. lib. 5. b. c.

c 9 fig. lib. 5.
L.

d D.

uerso, sedem adeò propellendam, ut ne à relatis quidem musculis promptè queat reuelli. Ab horum fine¹ alius præterea musculus extremum recti intestini ad cutem usq; amplectitur, qui prædictis similiter non admodum carneus, sed mucore quodam oblitus existit, fibras tamen orbiculares transuersas² ue adipiscitur. Elatiori parte qua dictis musculis connascitur crassior, quam inferiori est: quâ autem cuti (ut laborum³ musculi) permiscetur, peculiare cum ipsa corpus efformat. Cohæret autem fibrosis nexibus⁴ meatui uesicæ in uiris, in mulieribus uerò ceruicis uteri principio. Quanquam etiam⁵ duorum musculorum, quibus in uiris principium porrigit interuentum, peni committatur. Cæterum posteriori sua regione, quatuor ad ossis sacri finem locatis ossiculis (quæ Galeno incognita ostendimus) adnascitur. Ex lateribus connectitur teretibus⁶ ligamentis à sacro osse incoxendicis os pronatis. Præfens musculus non adeò, atq; medentium uulgaris arbitrat, breuis est, sed longus, & secundum magnum recti intestini longitudinis interuallum exporrectus uisitur. Quod non perfunctoriè ab illis uenit perpendendum, qui sedis fistulas & excrescentias, quas *συνέκματα* & *πρόσθυλάματα* Græci appellât, subinde præscindere ueretur, huius musculi muneris abolendi metu. Licet enim musculi portio aut ferro diuidatur, aut quauis alia occasione diuulsa laceretur, tamen quum latior secundum intestini longitudinem sit, eius munus non ita promptè in eiusmodi administrationibus aboletur. Musculus iste circulatim intestinum ambiens, illius orificium stringit, ne præter uoluntatem intestina naturali suo motu recrementa continuo egerant, sed ut tæpe stitue dum aut mole, aut uitiata quapiam qualitate hominē excrementa molestât, musculus hic laxatus instar fidi ianitoris ea transmittat. Quemadmodum itaq; huius musculi cum uesicæ meatum⁷ amplepxante eadem est effigies, ita etiam utrorumque par usus, quo nimirum constingunt: ob quod etiam ambo nonnulli *συνκτῆρας*, quali dicas constrictores, appellarunt.

Musculus orbicularis in recto obductus.

COLLI VESICÆ ET ANI MUSCULORUM administratio. Caput LII.



COLLI uesicæ & ani musculorum administratio ab ipsa uesica inchoabitur. hanc enim à peritonæo¹ quâ internæ pubis ossis regioni obtenditur, cultello aut nouacula liberare adeò conuenit, ut ipsa non amplius aliqua sua sede peritonæo sit continua. Deinde penem à pubis ossibus dirimere oportet: quod ubi inuicem hæc committuntur, medio cri negotio perficiet, quum nerueis duntaxat & fibrosis nexibus penis ibidem hæreat. At ubi inuicem ossa remouentur, penisq; corpora² initium ducunt, acutiori cultello horum corporum initia proximè ab exortu sunt abradenda, ut penis ab ossibus liber pendeat. Mox cultro aliquo pubis ossa inuicem dirimes, sectione per ipsorum cartilaginem ducta, quam sanè leuiori opera quam plerique autumant perfeceris, si modò ossium medium ad admussum tetigeris. Hæc sectio quoniam prius femora erant distensa, ilico ut inuicem ossa abscedant, occasio erit. Quo uerò remotius ossa disiungas, uehementius quoque femora abducenda sunt, quod feceris longè commodissime, si uno cadaueris crure à mensa pendente, & reliquo adhuc illi incumbente, in mensæ latus acutum ue, os sacrum collocaueris, & deinde utrinque femoribus & ilium ossibus reflexis, ossa pubis quantum lubet diduxeris. Nunc uesica uniuerfa cum pene in conspectu adeò iacet, ut etiam³ musculum uesicæ collo obductum promptè animaduersurus sis. Ut autem sedis⁴ musculos pariter intuearis, cultello sensim uesica simul cum ipsius ceruice à recto intestino transuersis sectionibus separanda est. In quo opere sanguinem, si is ex uenis & arterijs profluxerit, spōgia sedulo elues. Vix enim (nisi fortassis admodum operose omnia uasa uinculis ita intercipere possis) fiet, quin inter dissecandum uas aliquod, aut casu punctum ictum, aut transuersim necessariò incisum, sanguinem profundat. Ablata igitur uesica, et connexu recti intestini musculorum ad penis radicem et ad musculum uesicæ perpenso, eius intestini musculos aggredieris, qui sanè citra operosam sectionem sunt summe conspicui, si modo diligenter ab ipsis sanguinem, qui hic solet esse molestissimus, absterferis. Operæ precium nunc foret, ualidiùs adhuc pubis ossibus diremptis, cultro aliquo acutiori ligamentum sacrum os ilium ossi connectens in sinistro latere diuidere, ut utrumque crus cum osse quod sacro committitur seorsum tractari possit, dextroq; cruri sacrum adhuc hæreat, aut sinistro, prout nimirum musculos qui adhuc reliqui sunt, in dextro aut sinistro crure aggredi uisum erit. Ad hanc effigiem crus illud conspicitur, quod decimam sextam musculorum tabulam constituit.



Galenus in li. 3
de Usu par-
te de tibiam mo-
uentibus mus-
culis senten-
tia.

Galenus in 2 de
Admin. sectio.
sententia cum
tribus musculor-
um descripti-
one, enarra-
tur.
Tibiam movent.

PROXIMUM quidem nunc erat femur mouentes musculos describere, si demum explicatis antea musculis situ uiciniore aggredi institutum fuisset: uerum quando sectionis potius, quam uiciniore seriem sequi propositum est, ante musculos femoris motuum opifices, tibiae motores in praesentia ueniunt pertractandi, nam quousque hos asseruas integros, commodè illos administrare nequis. Ceterum quo tibiae mouentes musculi insigniores, & proceriores, magisque conspicui sint, eo etiam minus Galeni sententia, & potissimum in illorum functionibus explicandis assentire queo, quauis interim etiam non omni ex parte is sibi consentiat. Quandoquidem non procul a calcæ tertij de Partium usu libri tibiae motores recensens, atque sua potius imaginatione aliorumque dissectionis professorum libris, quam uera sectione ductus, nouem musculos enumerat, quos femoris os amplexantes, atque omnium huius loci musculorum maximi sunt, rectè ad genu feruntur: horum quidem unus implantatur patellæ carnosæ apprehensione, duo autem reliqui unum maximum procreant tendinem, qui latescens implantatur toti patellæ, stringens eam exquisitè, & continens eum si iubeatur extendens, unà cum toto ipsius genu articulo. Alij uerò duo musculi utraque praedictorum parte, hic quidè externus, ille autè internus, in tibiae lateribus inseruntur, ambo ducit. Enascitur autem ille quidem ex commissura ossium pubis, hic uerò ab extremis partibus ossis coxendicis: optimè enim sic utriusque crus ad motus obliquos abducitur erant. In medio autem inter hos spacio, aliae tres sunt musculorum explantationes, paruis motibus ipsum genu mouentes. Flectit enim genu, et ad interiora adducit tibiae is qui est continuus interioribus: abducit autem extrorsum simul flectendo, uelut inuoluens eam, is qui tangit externos. Reliquus, qui & medius omnium est, in femoris caput internum insertus, flectit quidem totum quoque femur, cum eo autem simul & totam tibiae euellit, immitens se eis quæ articulum ambiunt ligamentis usque ad alterum maximorum musculorum, qui in tibia reponitur, ut simul quoque tibiae ipsam totam trahat. Reliquus uerò nouè musculorum articulum genu mouentium gracilis & longus, ex ilium osse enatus, tibiae sursum extēdit: in ea potissimum figura crus totum statuens, in qua molientes, ac subigentes, pedē ad inguina alterius cruris sursum ducimus. Post hæc uerba Galenus Naturā in horum musculorum constructione laudaturus, procul dubio in primis exemplaribus subiunxerat, mirifice & hinc Naturā omnia prouidisse, et quæ reliquo cōtextu subsequuntur. At eum musculū, quem in poplite latitare innuit tēporis successu, et in resectione simiarū peritior, cognoscēs, hæc quoque suo quod ad nos demanauit, exemplari interiecit. Præter autē hos omnes est paruus musculus in poplite, genu quoque flectens. Ut simul omnes ab ipso hac serie enarrati, numero decem censeantur. Hæc sanè ipsius oratio clarissima est, ex qua quiuis etiam citra inspectionē quos enarrat musculos imaginatione sibi pulchrè cōfingit, at quam sit ueritati cōsona, partim ab ipso in secundo de Administrandis sectionibus, partim uerò ex sectione discito. Verum quando ipsius orationis series in secundo de administrandis sectionibus longior est, quam ut tota hinc describi debeat, ego femoris musculos eo ordine, quo ibidē recensentur, enarraturus sum, Galeni sententiā post musculi descriptionē cōtinuò subiiciens, ac pariter addens, in quo ordine in prescripta ex libris de Partium usu oratione hunc illum uē enumerauerit. Nihilominus priusquam musculos aggrediar, id summo studio abs te cōtendo, ut quot motib. tibiae agis, accuratè examines. Galenus in libris de Usu partium, ut præcedēs attestatur oratio, tibiae extendi simpliciter dixit, non adiungēs eā magis aut introrsum aut extrorsum, aut prorsus in mediū rectā extēdi. At flexionē uidet triplicē enumerare: unā quæ tibiae retrorsum, seu in posteriora sursum uersus exteriora duci innuit. alterā, quæ introrsum illā sursum tractā agi dicit. tertiam, quæ tibiae in neutrum latus inclinantē, rectā flectimus. Quanquā tertium hunc ductū duntaxat flexionis nomine, & præcipuè in secundo de Administrandis sectionibus donare uideat. Deinde in prescripto ipsius sermone, secus atque in libris de Administrandis sectionibus tibiae in latera moueri affirmat, quū unū musculū hanc extrorsum abducere, alterū introrsum adducere scribit. Postea, ubique motū tibiae assignat, quo hæc sursum oblique uelut ad alterius cruris femur ducit, hoc motu tibiae agi ab illis cōspicimus, qui pedibus coria in ligneis stratis emollit, aut quū pistores massam apud plerasque nationes calcāt. Atque hos motus ita Galenus enarrat, ut proprios prorsus tibi illos esse arbitret, ipsi quoque peculiare musculos assignet,

Quoniam in orationis serie tibiae mouentes musculos seorsim singulos pertrahebimus, ante nostram enarrationē nullas notas marginum adijcimus.

a Intelligi opinor priusquam pedem mouerimus, in 12 tab. figurum.

b 14 tab. v.

gnet, quū interim rectissima flexione et extēfione tibia, quiescēte femore, solū agatur. Si enim tibia cū pede in latus digna animaduersione ducit, id sanē femoris sit beneficio. Neq; est quod huic paradoxo corroborādo plixiūs insistā, quū ipse iam admonitus luce clarius animaduertas, tuā tibiā immoto prorsus femore, dūtaxat rectissimo tramite flecti extēdīq;. Quanquā quū motus hos examinas, nō perfunctorie animus femoris motibus adhibēdus sit, nisi enim gnauiter attēderis, te inficio femoris caput in coxendicis osse sitū murabit, unde etiā mox alia tibiā flexio extēfioq;, quā prius, apparebit. Sed quum in re maximopere notāda, nō adeo secordē nūc fore quēpiam arbitrer, quin adhibitis ossibus hęc sedulo timentur, atq; in ipsa sectione expēdat, musculos ipsos aggrediar ea lege, ut secūdo de Administrandis sectionibus Galenilibro adapetto hęc legas. nisi enim illius libri obstarēt enarratio, diuersa lōgēq; faciliore, quā Gale nus serie, presentes musculos recenserē. Primus itaq; acuto exortu^a principiū, ē neruea substantia & modica carne cōmixtum ducit, ab^e anteriori ossis illū spinā sede, aut ab illū ossis appendicis anteriori extremo. Hic musculus non procul ab origine totus carneus euadit, & modicē dilatescens, gracilis permanet: eius tamē latitudo ipsius crassitiem spissitudinem uē duplo (ut sic dicam) superat, & hanc formam musculus ad tendinis usq; productionē retinet, qui ab illū ossis spina, deorsum oblique uersus interiora sensim ad eō prorepat, ut internū femoris latus tandem iuxta mediam femoris lōgitudinem exquisitē occupet: hinc adhuc magis in interiora retrorsum paulatim procedens, ē regione^f interni femoris capitis iuxta genu cōsistit, ad quod ueluti obliquo ductu reflexus, antrosum descendit, tendinem in anteriorem tibiā sedē^h infrens. Porro musculus tendinē hunc tum primum producit, quando ad anteriora secundū femoris caput reflexus, gracilior teresq; efficitur. Tendo enim ipsius non latus, sed adamuissim (quicquid Galenus suis fidens simijs asserat) teres est, tibiā ossi ad internū latus acutē illiusⁱ lineā secundum ipsius longitudinē exporrectā insertus. Hunc musculū Galenus in secūdo de Administrandis sectionibus primū enumerat, in præscripta autē oratione nonū, & utrobique huius musculi beneficio tibiā sursum ad alterius cruris inguina, aut ad femur allici arbitraturs. qui motus nō huius solū musculi opera, uerum femur mouentium & tibię musculorum auxilio unā perficitur. Tibia namq; suis musculis flexa, & femore deinde suorū musculorū ope sursum in interiora ducto, motus ille succedit. Nisi enim flexa prius tibia femoris motū sequeretur, eiusmodi motu tibia nequaquā alterius cruris femori, aut tibiā, obduceretur.^h Secundus musculus amplo, et prorsus nerueoⁱ principio ex pubis osse enascitur. Vbi enim pubis ossa in uicē^m cartilagine cōmittuntur, secundum cōmissurā longitudinē duo sibi contigua oriuntur musculorū principia, quorū alterum ad dextrū crus, alterū uerō ad sinistrū defertur, secundū hunc musculū constituens. Tanta itaq; huius musculi principij est amplitudo, quāta pubis ossium cōmissurā est lōgitudo. Principiū hoc nō procul ab origine strictius crassiusq;, et carneum prorsus efficitur, ut eius latitudini crassities uix cedat, & musculus paulo minus toto teres euadat, qui deorsum per femoris interiora descendēs, sensim gracilior tantisper efficitur, ut iam internū femoris caput non procul à genu articulo cōtingens, in exactū teretēq; tendinē finiat, eadē sede qua primi musculi tendo tibiā innatū, sed tanto interiūs, seu posterius, quanta primi musculi tēdinis est crassities. Hic musculus in parū obesis mulieribus, rigidum quoddā & durū ligamentum, seu neruus, seu tale quid esse apparet, eō quod excarnis in illis musculus neruea substantia dūtaxat habeat, & exiguo adipe obtegatur. Præsentis musculi beneficio Galenus in præscripta oratione, tibiā ad internū latus duci attestatur, illū in serie quintum enumerans. In secundo autē de Administrandis sectionibus libro, tibiā elatiūs & interiūs musculi huius auxilio attolli prodidit, hoc est (si modò rectē ipsius sententiā assequor) præsentē musculū tibiā uersus interiora maximē inclinantē flectere. quod enim attollere ipse dixit, mihi flexū insinuat. Perficeret autē eiusmodi morū, si tibię extremū unā cum pede alteri tibię imponeres, qui motus & flectentiū tibiā musculorū ope, & femur quoq; introsum ducentium flectentiūq; auxilio celebratur. Quippe si crus utrūq; rectū, neq; prorsus inflexū habueris, nō integrū tibi erit immoto femore alterius cruris tibiā, uel minimum, alteri cruri implicare, aut uel obscurissimē rigidi etiā cruris tibiā in alterū latus, immoto femore, deducere.^o Tertius cū alijs ut minimum tribus musculis, ex infima coxēdicis ossis sede enascitur. Ab eius nāq; ossis^p appendice (que nobis statibus in eius ossis infima sede, in simijs uerō & canibus quū anterioribus innituntē pedibus, in extima habet) ordinata serie multorū musculorū capita principiū ducūt, quorū tertius hic musculus omnīū^u postremū exigit. Ab elatiori em̄ & maximē posteriori eius appendicis^v sede, nerueū gracileq; principiū educitur: quod deorsum descendēs, aliquantulū sub origine carneū fit, teretē quodāmodo constitūēs musculū, suo principio iam lōgē crassiorē. Hic deorsum per femoris posteriora prorepat, aliquantulū oblique tantisper ductus, donec ad posteriorem se-

Primus tibiā mouentium.

Lib. de Aō. mi. sectio.

Secundus.

Tertius.

*Lib. 2 de Ad-
mi. sectio.*

dem interni femoris capitis propter genu pertingat. ¹ Ibidem enim extenuatus, & in teretem quoque (non uero ut Galenus docet, latum) degenerans tendinem, in tibiae anteriora reflectitur, eadem regione qua nuper commemorati, insertionem tentans. Sed eius musculus tendo hoc sibi priuatim uendicat, quod anteriori tibiae sedi ad internum acutè illius lineae latus hærens, ad medium usque longitudinis tibiae properet, alijs tendinibus tibiae insertis, haud æque descendentes. Galenus nulli musculo tibiā mouenti, adeo obliquum assignat ductum, atque huic tertio: non animaduertens, primum ² musculum longe obliquius duci, quum is scilicet ab illo osse antrorsum in interiora femoris ad posteriora usque propemodum descendat, & hinc rursus obliquo ductu in priora tibiae feratur. Deinde ³ musculus qui ordine quartus erit, obliquior tertio uisitur, illum namque similiter atque hunc à coxendicis osse pronatum, in anteriora tibiae secundum femoris externum caput, prorepere audies. Vnde etiam tanto obliquiorem ipso tertio quartus iste situm exigit quanto coxendicis ossis sedes, unde uterque principium sumit, femoris interiora magis spectat. Tertius musculus in præscripta Galeni oratione sextus est, quem inibi inquit tibiā in internum latus inclinantem flectere. In libris uero de Administrandis sectionibus ut obliquissimum ipsi ductum assignat, ita quoque obliquissimi motus illum autorem statuit. Necesse enim (inquit) est, tibiā hac tractam ansa, retrorsum sursumque ferri, & hac in orbem conuolui. Atque hunc quidem motum obimus, at non quiescente femore.

Quartus. necessum enim est hoc motu tibiā flecti, & femur extrorsum circumuerti. ⁴ Quartus musculus non æque latum principium, atque tertius, ex coxendicis ossis ⁵ appendice ducit. Huius enim ⁶ principium gracilius est, sed spissum tamen. Deinde ad tertij musculi ⁷ principij externum latus non nihil sub ipso occultatum enascitur. Falsum enim est, quod à Galeno in quinti musculi enarratione, de capitibus à coxendicis ossis appendice principium ducentibus asserit, quum quatuor capitum ab illo osse originem ducentium, quarti huius musculi extimū esse scribit, & deinde succedere tertij musculi caput. Cæterum principium quarti musculi paulo sub exortu primum efficitur carneū, exacti musculi formam multo quam tertij crassiores referens, ac per femoris posteriora sensim deorsum, uersus exteriora descendens. Quum uero musculus femoris mediā longitudinē superauit, tenuior redditur, & externa sui sede nerueus admodū, quasi tendinem educturus, apparet. In interna autem sede, alia pars carnosā hinc ex femore pronata ipsi ubi tendinē uidetur procreaturus, ita adnascitur, ac si alius hic oriretur musculus, qui quartum augeret: atque simul ex ambobus unus efformaretur musculus, qui denuo crassescens carnei cuiusdam musculi imaginem exprimit, & deorsum profectus exteriori parti admodum neruosis, insigni tendine fibule implantatur, ualidam insertionē in ⁸ processum superioris appendicis fibulae pertinaciter molitus. Huius enim tendinis occasione fibula acutum huiusmodi processum, quā tibiae coarctatur, exigit. Quinetiam femoris externum caput in externo ipsius latere oblongum sinum gerit, tendinis huius occasione, ut aptè ac tutò uehementer, priuatim exculptum. Cæterum siue quartum hunc musculum unius loco, aut duorum enumeres, nihil interest: quanquam Galeni gratia, ne ordinem perturbes, unicum opportunius statues. Is enim quum hunc musculum in homine non uiderit, unicum duntaxat istum recenset, atque ut in caudatis simijs illū ego reperi describit. In simijs enim à femoris osse enascens portio, quarto musculo non admiscetur, sed is unus est admodum insignis et latus. Vnde etiam Galenus illum perpetuò latum, in libris de Administrandis sectionibus appellat. Hunc musculum præscriptæ ex tertio de Partium usu orationis septimū collocabimus, quo ibidem Galenus asserit tibiā extrorsum, simul cum flexione abduci & quodammodo inuolui. In secundo autē de Administrandis sectionibus, totam tibiā huius ope simplici motu in externā partē agi attestatur, eorū quæ in libris de Vsu partium tradiderat oblitus, et proculdubio huius musculi naturā exactissimè propter cursoris symptomate allecū, sedulo huius musculi naturā in simijs perpendisse, atque tunc (ut sanè debuisset in omnibus) didicisse, hunc simplici quod ad genu articulū attinet, motui à natura fuisse præfectum, & flexionem in neutrum latus inclinantem moliri, utcunque etiam obliquo ductu quartus hic musculus ad tibiā prorepit.

*Lib. 2 de Ad-
mi. sectio.*

Quem Galenus quintū recenset, de quo uerè quintus sit.

Porro quintum musculū Galenus recenset, quem à coxendicis osse tertium caput sub tertij tibiā mouentis musculi & quarti ⁹ principijs assumere testatur, quæ non in tibiae anteriora tendinem cum reliquis porrigere scribit, uerū ad femoris caput & ¹⁰ musculi tibiae principij, parte interna inferi, & simul ligamentum articulum circundans apprehendere. Præfens musculus, in præscripta Galeni ex libris de Vsu partium oratione est numero octauus, cuius auxilio totum femur flecti, & cum eo simul totam tibiā euelli, ibidem docet. In secundo autem de Administrandis sectionibus primum hūc tibiā sensim in exteriora circūuerrere, ac motu tertij

tertij nobis cōmemorati musculi fungi dixerat, quamuis non æquē ualido. Secundò autē de huius musculi functione differens, inquit: Si hūc musculum ad caput suum tendas, cum femore etiam tibiā retrorsum in trorsumq; ferri uidetur. Deinde rursus non ita multo pōst subiungit: Poplitis, aut tibiā flexum inter infirmas tibiā actiones referendum, ac proinde Naturam neque magnis, neque multis musculis ipsius flexum commississe, uerum (inquit) propemodū dixerim, ex commemoratis unum solum capiti interioris suræ^h musculi insinuatū, ut dixi, tibiā flexus autorem existere: quanquam non magis ipsam flectere, quā ad internam regionem abducere uideatur. Hic quidem musculus leuiter & obscurē quodammodo genu articulum mouet. Postmodum alios incusat Anatomicos, qui magno cuiuspiam musculo ad femoris motum prorsus spectante, flexionem tibię tribuerunt, quum is inquit: Vel omnino non attrahit tibiā, uel certē parum, quia & finis ipsius in os tibię, ne minima quidem parte ingreditur. Verū coacti sunt hunc poplitis flexuræ autorem dicere, quòd nimirum ignorarent alterum musculum articulo latenter quidem insinuatū, qui uel solus ipsum flectere potest, uel maxima potentiā præditus est, porrò hunc prius cernere non est, quā à tibiā musculos ademeris, qui suram efficiunt. Deinceps Galenus coxæ articuli musculos aggrediens, quendam primum enarrat, quo alios Anatomicos genu articulum flecti perperam arbitratos asserit. Huius modi sanè Galeni sententijs colligere promptum est, quantum illi in Anatome, qua potissimū excelluit, quaq; passim gloriatur, fidendum sit, & quā bellē ab ipso humani corporis fabricā nobis discere datum sit, quamq; dilucida nostra redderetur oratio, nisi toties Galeno contradicendū foret. Sed age ceptum negociū absoluiamus, summa Galeni auctoritate ob oculos perpetuò uersante. Musculus itaque iste quem quintum enarrat, quartum caput à coxendicis ossis appendice sumis, nō autem (ut ipse innuit) terciū. Alius enim est¹ musculus, quem hīc Galenus præterij, qui^m tertium caput ab illo appendice nanciscitur, et, ut paulo pōst dicam, in anteriora tibiā sub tertio musculo repositus deducitur. Sub hoc igitur qui Galenū latuit, ille² musculus quem is quintum recenser, exoritur ualido & admodum crasso³ principio, quod posteriori sua sede planē nerueum uisitur, anteriori autem magis carneum et latum. Principiū hoc carne auctū, maximum mole constituit musculū, qui priusquam mediam femoris superat longitudinē, gracilior fieri incipit, adeò ut paulò supra inferiora femoris capita in teretē finiat⁴ tendinem, pro musculi portione nimis quā gracilem. Hic tendo⁵ radici interioris femoris capitis ad capitis illius interius latus inferitur, contiguus⁶ exortui primi pedem mouentis musculi, ab interiori femoris capite ducentis originem. Quintus hīc Galeni musculus in posteriori ipsius sede, et utrinq; in lateribus nulli connatus est musculo, præterquā communi connexu, quo inuicem incumbentes musculos fibris aliquo thērere scimus. Verū anteriori ipsius sedi, quæ femoris os spectat, illi continua connataq; est⁷ tota ea musculosa substantia, quæ antè rursus quā huius musculi initium,⁸ à coxendicis ossis appendice ad pubis usque ossium commissuram enascitur. Quam uerò hæc musculosa substantia in femur insertionem molitur, quæ uerò fibris donetur, dum femoris motores pertractabuntur, exequar: ubi hunc quintum Galeni musculum cum illa unius loco recensebo, illum quintum femoris motuum opificem enumeraturus. In præsentia autem id duntaxat addendum est, infimum⁹ eius musculosæ substantiæ insertionis terminum, non procul ab inferioribus femoris capitibus distare. Ad proinde Galenum de hac locutum arbitror, quum alios incusaret Anatomicos, atq; illos perperam eiusmodi musculū tibiā flexionis autorem posuisse affirmaret. Habeto itaq; in præsentia eam quā nobis modò musculosam substantiā nuncupare libuit, eius musculi loco, quem inter coxendicis articuli motores Galenus primū enumerat: quinti autē tibiā motorū Galeni musculi uice,¹⁰ illū quem tendinē in interioris femoris capitis radicē inferere retuli. Nisi fortē nō nimis in Galeni uerba iuratus, semel & longē rectius dicere mauis, illū, eundem musculū et primū femoris motorē, & quintū tibiā perperā constituere. Vt cunq; uerò statueris, inter diffecandū Galeni loca & hæc nostra reuoluens, sedulò inspicias, nū quintus hīc Galeni musculus inter tibiā mouentes recēseri debeat. Mihi quidē pro quinto femoris motu dūce habebitur, modò uix annuētī illū uel obscurissimē proprio motu tibiā mouere, & nullā mentione dignam in flectionē ab huius musculi tendine in articuli genu ligamēta moliri. De¹¹ musculo autē in poplite latitāte, ad reliquorū tibiā mouentiū enarrationis calcē, nonnulla priuato Capite subiciā, in præsentia ad Galeni seriē & numerū sermonē, ut cepti, accommodans. Quū itaq; quintū Galeni musculū non inter tibiā motuū duces, sed omnino inter femoris enumerare uisum sit,¹² quintū sermoni ego illū addā, quē paulo antè à Galeno prætermisum dixi.¹³ A¹⁴ coxendicis ossis ap-
pēdice sub tertij et quarti musculi capitibus, et ante caput quinti à Galeno enumerati musculi,¹⁵ aliud neruosum principiū enascitur, quod meritò inter capita ab illo appēdice originē ducētia,

In de Admi
mi. sedio.

tertium enumerabitur. Hoc similiter neruosum est, & nisi aliquousque sub exortu carneum efficitur, sensim crassescens. Quum tamen ad mediam femoris longitudinem musculus iste descendit, exacte carnosus uisitur, quanquam interim posteriori ipsius sede (ut paulo post dicam) liuidus appareat. Ad hunc igitur modum praefens musculus deorsum per femoris posteriora delatus, & carnosus permanens, secundum posteriorem interioris femoris capitis sedem refertur, & simulatque elastissimam tibiae partem contigit, in teretem cessat tendinem, interiori lateri anterioris tibiae partis insertum, in ea nimirum regione, in quam primum, secundum & tertium tibiam mouentes musculos ipsorum tendines porrigere relatum est. Verum quinti huius musculi tendo non aequè deorsum atque tertij musculi tendo in tibiam prorepat. Vix enim tibiae appendicem praetergreditur, sed minime interim (ne quis hoc in Galeni gratiam expectet) in femoris internum caput aut articuli huius ligamentum inseritur. Huic musculo ex abundantia sinus quidam oblongus accidit, in posteriori ipsius sede statim ab exortu ad mediam usque femoris propemodum longitudinem ipsi insculptus. Totus hic sinus liuidus admodum est, & musculi tertij gratia incisus uisitur. is namque sinui incumbit, ipseque sinus illius molae curate congruit. Ceterum quum huic quinto musculo idem ortus et par omnino ductus cum tertio sit, etiam una cum illo tibiae flexioni non segniter opem fert. Si hic musculus in internu femoris caput insertionem uel obscurissimam moliretur, aut quauis primaria ratione femur flexeretur, & minus obliquo ductu quam tertius donaretur, forte nihil obfaret hunc quintum Galeni musculum fuisse, aliqua ratione arbitrari: et quem ego quintum Galeni esse dixi, illum esse de quo Anatomicos redarguit. Sed quum ita res non habeat, patientur Galeni manes & nos ueritate protulisse: qui etiam suis simijs nimium confusus, alios dissectionis professores non semel immerito in simulauit. ^b Sextus musculus eo accuratius uenit inspicendus, quod rariorem inter reliquos musculos Naturam adipiscitur. A latere enim externo primi musculi ab illo ossis spina nascitur, intus acutum carneumque caput obinens, quod muris lacertae uero modo latefcens, deorsum ad regionem coxendicis articuli fertur, ubi rursus caput id seu musculus angustior redditur, & priusquam magnu exterioremque femoris processum perreperit, non amplius carneus conspicitur, adeo ut sextus musculus aliud nihil tandem erit, quam longissima & latissima membrana tendinis naturam referens, cui nunc descripta & carnei exactique musculi formam representans pars innascitur. Statim enim ab initio in exteriori parte in star late membranae in conspectum uenit, aliquousque coxendicis articulum amplexantibus musculis obductae. Quum uero membrana magnum femoris processum superauit, totam anteriorem femur amplexantium musculorum sedem, deinde & posteriorem & exteriore cutis quasi modo tantisper integit, quousque ad genu articulum descendat: quem ubi similiter quoque membrana obuoluit, ipsa in anteriorem tibiae sedem et externum illius latus inseritur. Ceterum ipsius membranae, seu tendinis, utcumque appellare libeat, non eadem undique est crassities. Totam namque pars, quae anteriori femoris sedi, et posteriori obducitur, tenuissima est: atque haec tanto tenuior conspicitur, quanto interiorem femoris regionem uicinius accedit. Ea uero membranae pars, quae externo femoris lateri exporrigitur, ualida crassaque est, & accurate lati tendinis speciem exprimit. Huius fibrae recto tramite, quousque anteriori tibiae parti ad latus magis externum & ad fibulam inserantur, decliues descendunt. Tendo autem hic ad insertionis sedem illis tendinibus commiscetur, qui cum ipso quoque tibiam extendere dicuntur. Praefens namque musculus extendentium numero uenit ascribendus, quanquam insignem usum femur ambientibus musculis etiam praestet, transuersi cuiusdam ligamenti ritu omnes, quos amplectitur musculos, in sua sede (ne aliquo scilicet permurentur) continens. Atque eiusmodi membranae uices gerit, cuiusmodi cubitum occupantibus musculis circulatim obnasci, prius insinuauimus. Quam uero perfunctorie Galenus hunc musculum describat, tria quibus illum dignatur uerba, in secundo de Administrandis sectionibus ostendunt. Arbitror enim huc in libris de Usu partium Galenum latuisse, quum in trium quos ibidem recenset tibiam extendentium classem illum non reposuerit, & quia quarti praescriptae orationis musculi ortum sermoni addiderit. Si enim simpliciter, ut de ceteris musculis loquitur, quarti insertionem et motum expressisset, arbitratu fuissem hunc sextum ab ipso eius musculi loco haberi, quem in externum latus tibiae abducere tradidit. Quod sane hic musculus, si siu ipsius ductusque species, praestaret, modo tibia uel minimum in latus ageretur. Verum qui explicatius de quarto musculo locutus, eius originem sermoni addidit, liquidò Galenus demonstrat se sextum hunc non proponere, quandoquidem hic non ab appendice coxendicis ossis cum tertio, quarto et quinto nobis enarratis principium ducit: ut ipse tamen innuebat, ab extrema sede ossis coxendicis abducentem musculum exoriri affirmas. Adeo sane, ut fateri cogamur, hunc musculum Galeno in praescripta oratione incognitum fuisse, & quem

& quemadmodum fallos tibiæ motus sibi effinxit, ita quoque musculus aliquem suam imaginatione excogitatum, nobis tradidisse. Tres qui adhuc enarrandi super sunt, dilucide fortassis recenserentur, si quem Galenus postremum numerat, nunc septimi loco describeremus. uerum quum hoc Capite Galeni ordinem sequi uisum sit, eos etiã qui adhuc reliqui sunt, sua serie aggre diamur: postea in horum omnium administratione, uti nobis cõsultius uidebitur, omnes dissecturi. Septimus itaq; neruea lataq; & ampla origine ab externo femoris ossis latere nascitur, totam radicem magni femoris processum in orbem amplexus. Origo hæc statim ab initio crassa carnosaq; efficitur, & ilico à femoris osse abscedens, illi insertitur in musculo, quem octauum nominabimus. Is namq; aliqua sui portione huic septimo subtenfus in causa est, quominus septimus tota femoris longitudine ipsius ossi, quemadmodum octauus, adnascatur. Septimus itaq; musculus sua amplitudine totum externum femoris latus circa omnem, præterquam in exortu, ad os connexum amplectitur, magnam quoque anterioris & posterioris sedis femoris partem occupans. Hic toto descensu carnosus uisitur, paulo supra molam aut patellam in amplum tendinem desinens, quem octauus musculi & noni tendinibus commixtū, simul cum illis patellam apprehendere, atque tandem in anteriore tibiæ sedem inseri audies. Quancumq; etiam septimi musculi tendinis posterior pars ualide flexi musculi permiscetur tendini, qui præ cæteris femur amplexantibus musculus huius septimi externam sedem integit. Posteriori autem septimi sedi quartus huius Capitis musculus adtenditur, quemadmodum anteriori is qui nonus omnium futurus est. Quotus uero ordine iam septimus musculus in præscripta Galeni oratione habendus sit, ubi & duos alios adhuc absoluero, ipse augurabere. Octauus musculus totam propemodum femoris ossis amplitudinem succingit: In posteriori enim duntaxat fede iuxta femoris longitudinis medium, nudam relinquit lineã, cui maximus totius corporis musculus, seu femur mouentium quintus, inseri docebitur. Deinde ad radicem quoq; inferiorum femoris capitum, posteriorem quoq; femoris amplitudinem octauus hic musculus non integit, cuius principium à femoris ossis ceruicene nerue exortur: sed sensim carne adactum, à femoris quoq; magni processu radice ipsius portio ita enascitur, ac si eius obliqui ductus gratia, duo principia obtinere non inepte diceretur: ac unum quidem femoris ceruici, alterum uero magno illius processui ferendum esset acceptum. Vt cumque sit, musculus obliqua hæc & ampla origine enatus deorsum descendit, uti diximus, femoris os adeo ambiens, ut duo ipsius latera in posteriori femoris regione paulo minus toto sint contigua. Quo uero magis descendit, crassior semper carnosiorq; efficitur, quousq; ad internum latus anterioris in femore regionis, quodammodo in crassum & admodum carneum semicirculum propter patellam extuberet, ex quo latus ualidiusq; enatus tendo patellam, sicuti paulo post dicam, amplectitur. Hic musculus tota ipsius longitudine è directo semper illius carnei semicirculi & ceruicis femoris carnosior crassiorque apparet, quam quã septimo musculo subternitur. sub illo enim tenuior euasit, attamen carnosus inibi quoque permanet. Quando itaque secundum femoris longitudinem in anterioris ipsius sedis interno latere octauus musculus percerius extuberat, & septimi quoque anterior pars è directo lateris exterioris eius sedis femoris quæ anterior est, exporrigitur, in medio anterioris femoris sedis septimus unã cum octauo sinum efformant impense liuidum, cui tota femoris longitudine musculus innititur, quem ordine nonum esse dicam, simulatque octauum musculum in Galeni oratione proculdubio primum esse addidero: quandoquidem adhuc quodammodo carnosus molæ seu patellæ iniicitur. Nonus (cui Galenus exortus sedem perperam assignat) nõ ex femoris osse enascitur, uerum ex illius ossis tuberculo, in anteriori ipsius regione super coxæ dissis ossis acetabuli prominente. Ab hoc enim tuberculo nonus musculus principium nerueum acutumq; assumit, quod deorsum rectã in femoris anteriora descendens, lacertæ muris que formam adipiscitur carnea substantia auctus, et illi sinui incumbens, quem septimum musculum cum octauo efformare nuper retulimus. Priusquam uero nonus medium longitudinis femoris descendendo superarit, artior graciliorq; sensim efficitur, ut multo supra genu articulum in tendinem finiat, utcumque amplum, sed tunc: qui rectã patellam accedens, in anteriori ipsius sede denuo dilatatur, tendinibus septimi & octauus musculi permixtus. At tamen hic tendo alijs non adeo ualide, atque septimi & octauus musculi tendines inuicem, con nascitur. quandoquidem transuersis, quæ nouacula ducuntur, sectionibus, non admodum laceratus, à subditis tendinibus ad anteriorem usque tibiæ sedem auelli potest. Vt cumque sit, hic ex tribus postremo enarratis musculis, unus tendo conflat, cui patellæ corpus uniuersum innascitur. Nihil enim ipsius patellæ tendine non obducitur, præter interiorem ipsius superficie, quæ læui cartilagine incrustata, sinu inferiorum femoris capitum respicit, mutuoq; ingressu

ingressu cum illo respondet. Quum uero tendo iste ad eum modum patellam amplexus, & interna ipsius sede, qua femoris ossi non connascitur, multo adipe & mucoso uiscidoque humore imbutus, genu articulum transcendit, arcior & crassior efficitur, ualidissime in anteriorem tibiae sedem, non procul sub articulo, implantatus. In caudatis uero simijs non aequè arcitur, neque etiam pariter crassescit, sed membraneus quodammodo tibiae inferius multo, quam hominibus, inseritur. Deinde illis quoque simijs reliqui tendines in tibia implantati, membranosiores latioresque quam hominibus obtigerunt. Quod uel Galeni nomine expendendum est diligentissime, qui omnes propemodum teretes tibiae mouentium musculorum tendines, ac si lati amplius essent, ut in simijs uiderat, describit. Stigitur septimum & nonum secundum & tertij loco in praescripta ex tertio de Vsu partium oratione enumerari uoles, per me quidem licet, si modò neque numero duntaxat nimium attentus, neque libris fidens, rem ipsam aggrediari, aut alteri sedulo administranti astes. Quod non solum in nouem enarratis tibiae motoribus obseruabis, uerum etiam in musculo sub alijs in poplite recondito, cuius naturam secundo ab hoc Capite ipsi dedicando, sum explicaturus.

Lib. 2 de Ad
mi. sectio.

NOVEM TIBIAM MOVENTIUM MUSCULORUM administratio. Caput LIIII.

Sexti musculi
administratio.



Eorum qui a
coxendicis ossis
appendice
enascuntur.

Tertij &
quartij
Lib. 2 de Ad
mi. confectio.

Quinti.

SECTIONEM tibiae mouentium musculorum in illo crure aggredieris, cui dum pubis ossa in ani musculorum administratione se iungeres, sacrum os adnexum fuisse. Ab ilium igitur ossis summo ad medium usque tibiae longa ducetur sectio, cutem, adipem, & carneam membranam diuidens, absque omni enim arte cutis cum carne membrana laniorum artificio ad mediam usque tibiae longitudinem attollenda est. Mox secundum femoris longitudinem in interna ipsius parte obseruabitur sexti musculi membrana, seu tendo, quem cutis modo à subiectis liberare conuenit. eius igitur parte quae anteriorem femoris sedem ambit, ad externum femoris latus deducta, eam quoque quae posteriorem sedem integit, similiter uersus externum latus dirimere necessum est, quo manu transuersim inter ipsius tendinem & septimum musculum interiecta, & sursum deorsumque mota, tendinis insertionem & musculi quoque originem intuearis. Vbi originis locum inueneris, nouacula, aut cultello, hanc ab ilium ossis spina absecabis, & illam digitis attollens, ad tibiae usque totum musculum auelles, accuratè tendinis istius amplissimi naturam, & carnosam huius musculi partem inspiciens, & musculum à sua insertione pendentem relinquens, quo postea ipsius functioni rectius innotescat. Post hunc, primi musculi caput ab anteriori summaque ossis ilium parte cultello liberabis, & ipsius capite digitis apprehenso, absque negotio ad insertionem usque à subditis diuelles. Mox nouacula à pubis osse, quae id alterius lateris pubis ossi cartilaginis interuentu committebatur, secundi musculi initium dirimes, & illo similiter digitis apprehenso, musculum uniuersum ad insertionem usque perduces. Iam nonnum aggredi liceret, uerum commodius feceris, si uerso crure illos qui à coxendicis osse oriuntur, prius administraueris. Quod ut rectè succedat, necesse est insignem musculum, qui alteram natem constituit, auferre, qui à spina ossis coccygis & posteriori parte ossis ilium spinæ enatus, magno femoris processui potissimum inseritur, femur, uti suo loco audies, moturus. Nouacula igitur huius musculi carneum principium ab illis unde prodit ossium sedibus est abradendum, ut à subditis musculis quoque eleuatum, in latus commodè reflecti possit. Alias enim ex coxendicis ossis appendice pronati musculi sese suis capitibus non ostenderent, quae sua exortus serie iam ueniunt dirimenda. Caeterum ut exactius uoti compos fias, digitis in posteriori femoris sede, adhibita quoque si uoles retulidori nouacula, musculos inuicem se iunges, ut caput mutuo incumbentium crassitiem leuiori cura coniectari liceat. Animum itaque hic adhibebis, num tertij musculi caput ut ego dixi, quarti insternatur, num uero tertij caput, quarti musculi capiti, ut Galeno uidetur, succumbat, & quoniam pacto è regione illa inuicem magna ex parte situentur connascanturque. Quod ubi praestiteris, utrunque à coxendicis osse absecabis, & tertij capite in manum sumpto, ad ipsius usque insertionem à subditis detrahes. hoc solum perpendens, qualiter quinti à me commemorati musculi sinui incumbat. Quum uero quarti etiam musculi caput similiter diuellis, sedulo attendendum est illi carnosae parti, quae à femore pronata, quantum augeat. Haec enim cultello à femoris osse liberanda est, priusquam totus musculus ad insertionem perducipossit. Iam quintus Galeni musculus erat dissectus, uerum noster ipsi incumbens sese adeo manifestè offert, ut ad-

ut admodum Naturæ artificii admiraturus sis, quæ illum sinum tam affabre exculpfit, ut tertius musculus, in illo repositus⁹ unâ cum hoc, ac si unus ambo essent, à Galeno auulsus fuerit, quapropter huius quoque capite ab ossis coxendicis appendice liberato, totus musculus ad suam quoque insertionem detrahetur. In præsentia quintus Galeni musculus se ad amussim in lateribus, & posteriori sede ostendit. Verum quia femoris motibus subministrat, opportuniùs in femur agentium musculorum sectione administrabitur. Quanquam nihil etiam prohibeat ipsius⁷ capite nerueo à coxendicis appendice liberato, illud deorsum trahere, transuersis que sectionibus ab illo, qui ipsi in anteriori sede adnascitur musculo diuidere. Vt simul & huius, & carnosæ illius partis insertionem ortumq; intuearis, numq; ego hæcenus uera tibi enarrauerim, obserues. Verso nunc crure,⁸ noni musculi principium altius nonnihil inter⁴ quosdam femoris motores reconditum, ab ossis coxendicis⁵ tuberculo separabis. quod ubi digitis attraxeris, ad patellam usque citra sectionem adinetur, & liquida ipsius substantia, quæ⁶ sinui octauo & septimi musculi infidet, unâ cum ipso sinu spectandam sese exhibebit. Hoc ad patellam relicto,⁷ septimi musculi exortum ab osse sedulo derades, & musculi principio sensim in exteriora reflexo, ab octauo musculo illum ad patellam usq; liberabis.⁸ Octauum uerò operosius à femore deradere conuenit, quum undiq; ferè ossi adnascatur: ubi tamen ad patellam usq; abrasus, atque unâ cum septimo & nono à femoris osse reflexus erit, operæ precium feceris, si singulorum musculorū motum expendaris, quod pari ratione atq; in alijs musculis præstiturus es, illorum scilicet capitibus ad sedes unde pronascuntur attractis. Verum hîc tibie motus propter frequentia in genu & femore uulnera tibi tantus esse debet, ut pede à tibia absccto, & tibia carnibus quàm possis examussim citra horū musculorū læsionem ademptis, ipsos aggredi debeas, ut num ego de tibie motibus immeritò secus atq; alij omnes senserim discas. Neq; sanè pedem cum tibie carnibus ademptum esse, sat est: imò nihil æquè conducet, atq; omnem carnem coxendicis articulo incumbentem unâ auferre, ne femoris motus tibi cum alijs Anatomicis in hoc opere illudat. Nudo enim articulo, semper unâ intuebere, num femoris caput, uel tantillum in suo sinu mutetur. Et quo minus præter rectam flexionem extensionemq; tibiam immoto femore, aliam nullā moliri cōspicaberis, expende quanto minus id in nobis tibia præstet, quum tot carnibus undique femur circumuestitur. Porro extendentium⁹ tendinum permixtio nouarum inquirenda uenit: ut scilicet intuearis, quis musculorum insigniorem commixti tendinis portionem obtulerit. Quinetiam attendendum erit, cuiusmodi patellæ in illo tendine nexus sit: ac demum qui nullius ligamēti beneficio, imò nullius prorsus corporis interuentu patella femori innitatur.

Noni.

Septimi.
Octauo.

DE MUSCULO IN POPLITE OCULTO

to, qui non rectè Galeno præcipuus tibie flexionis autor habetur. Caput LV.

Libra de Anatomia.



INTER tibie motuum duces Galenum, quendam² musculum in poplite latitantem recensuisse, antè diximus: modò autem qua sede is contineatur, cuiusq; formæ, ductus, & magnitudinis sit, narrabimus. Ex ligamētis itaq; femur tibie cōnectentibus (quorum naturam peculiari capite unâ cum coxendicis articuli & pedis ossium ligamenti persequar)³ unum in externo genu articuli latere habetur, admodum ualidū & crassum. Ab huius itaq; posteriori parte nerueum musculi⁴ principium exoritur, quod sua amplitudine in exteriori latere posteriorem genu articuli sedem contingit, atque ex tota hac ligamēto rum regione prodit. Hinc uerò principium id carnosus adauctum fibris, admodum oblique deorsum uersus interiora descendit, musculum efformans paulò longiorem, quàm ampliorem.⁵ Finis enim huius, seu insertio⁶ iuxta radicem appendicis tibie ossis consistit, in ipsius posteriori parte adeò ampla, atque totius musculi uisitur latitudo. Deinde ut musculus hic obliquus est, obliquam quoque molitur insertionem. à posterioris enim tibie sedis interno latere, deorsum uersus internum latus oblique ita descendit, ut minima huius musculi pars genu ligamentis, maxima uerò tibie committatur. Neque solum huius insignior portio in tibia consistit, at tibie quoq; ossi, quemadmodum retulimus, proluxa & ampla insertionem implantatur. femoris autem ossi nullibi connatus est, multoq; minus ab hoc originem ducit. Præsentī musculo alius nullus, aut in exortu, aut in insertionem subiicitur, sed articuli ligamenti & ossibus proximè attensus, sub illis⁷ musculis occultatur, qui ab inferioribus femoris capitibus enati, surā cum⁸ tertio quodam musculo efformant. adeo ut non iniuria hunc in poplite latitantem Galenus uocauerit, num uerò huic tibie flectendæ munus rectè tribuerit, ipse ratiocinator. Eo usq; enim

f Galenus

Galenus huic musculo (quod forte illum primus inuenisset, aut quod alij Dissectores illum flectendi opificem non recensuissent) fuit, ut in secundo de Administrandis sectionibus hunc solum posse poplitem flectere, aut maxima potentia prædium esse scripserit. Mihi uerò non modò haud maxima potentia ad tibiam flectendam ualere uidetur, sed nulla prorsus. Quandoquidem musculus hic obliquus recto motui præfici nequit; deinde adeò est inualidus, ut ne tantillum tibiam sursum uellere possit. Ad hæc, nulla huic cum reliquis tibiam agentibus est proportio, quum breuissimus & tenuissimus sit, femorisq; ossi, & multò minus illi ossi quod sacri ossis lateri commissum uidemus, non cōnascatur. At hæc inter secundum exactius multò obseruabis, quum hic musculus inuentu facilis sit. ilico nanque ac suræ musculi à femoris capitibus enati, à femore liberantur, ac deorsum reflexi pendunt, is musculus est admodum conspicuus. Priusquam uerò ex dissectionis ordine is detegatur, femur mouentes musculos describemus: quorum administratione absoluta, pedis, & deinde digitorum motoribus nos accingemus, in quorum Anatome obliquus hic in poplite latitans musculus spectandum se offert: ac ostendit pariter, num commune aliquod munus obeat cum superiori radium in prorum mouente musculo.

DE MUSCULIS FEMUR MOVENTI-
bus. Caput LVI.

Femoris mo-
uus.



Primus fe-
mur mouen-
tium.

Secundus fe-
mur mouen-
tium.

FEMUR decem, aut si in maximum redigantur numerum, quatuordecim proprijs agitur musculis, qui id extendunt, flectunt, in trorsum alteri cruri adducunt, extrorsum in latus amouent, & circumagunt. Flectitur itaque femur ad inguina, nobis id sursum antrorsumq; ferentibus, Extenditur autem nobis deorsum, & uersus terram id deducuntibus. Summam autem extensionem habet stantibus, tunc maximè quum uni pedi innitentes, alterum crus in posteriora, quàm licet remotissimè pretendimus. Vnde etiam meritò Natura magnis & fortibus multisq; musculis extensionem concedidit, quos iam enitar persequi, eum Galeni ordinè seruaturus, quem ad calcem decimi quinti de Partium usu est secutus. Is namq; longè mihi potior, & ex aliorum dissectionis procerū suffragio magis descriptus apparet, quàm is quo coxæ articuli musculos in secundo de Administrandis sectionibus aggreditur. Primus itaq; ipsorum sub summa cute cōsistit, alterius lateris natem præcipuè efformans. Exoritur enim lato & admodum carnoso principio, ex tota spinæ ossis ilium posteriori parte, quæ uersus os sacrum magis eminet, deinde etiam spinæ superioris regionis portionem quoque suo exortu apprehendit. Infimam autem sui exortus partem à coccygis ossis & in summi ossis sacri posteriori sede assumit: in qua etiam sede utriusq; lateris musculus, musculo alterius lateris contiguus uisitur. Ex his ilium ossis spinæ sedibus, & sacro osse, & coccygis osse musculus uelut ex semicirculo pronatus, in corporis latus nonnihil oblique deorsum prorepat, toti coxendicis articulo superuectus. Vbi uerò articulo infertur, gracilior angustiorq; tantisper efficitur, donec in latum & ualidum finiatur tendinem, quo exteriori magni femoris processus parti secundum ipsius longitudinem oblique inseritur. Principium enim insertionis paulò sub superiori eius processu apice nonnihil uersus anteriora molitur: hinc deorsum, in posteriora modicè descendens, & magnam eandemq; ualidam sui tendinis portionem, in processu eius radicem, longa linea secundum femoris posteriora inferens. Secundus magna ex parte primo femoris musculo substratus, ab anteriori superiori ossis ilium spinæ regione lato quoque & carneo exortu enascitur, totam ferè ilium ossis spinæ sedem occupans, à qua primus initium nō mutauit. Verum hac tantum sede secundus musculus non cōtensus, ab ilium ossis dorso, ubi primus musculus ab osse primùm abscedit, sub illo quoq; enascitur, adeò ut huius quoque initium tanquàm ex semicirculo prodeat, posteriori sua sede, etiā in exortu primo musculo subiectum. Ex hac ossis ilium sede deorsum oblique nonnihil ad latus descendit, ut sensim arctior redditus, primum musculum totus subeat, articulum quoque coxendicis integens: cuius regione in membraneum, sed ualidum tendinem cessat, qui elatiori magni femoris processus parti implantatur: anteriorem quoque processus regionem aliquantulum comprehendens, latamq; & transuersam insertionem (si cum primo conferatur) molitur. Quum itaque primi musculi fibræ, quasi transuersim in latus minimum scilicet deorsum inclinatae prorepan, secundi autem recto quasi ductu decliues, & modicè admodum in latus protensa propagentur, utriusque musculi fibræ sibi mutuò x literæ modo decussatim incumbunt. Hic musculus similiter ac primus, nulla ex parte aut amplior, aut crassior, aut carnosior conspicitur, quàm ubi

b 1, 2, 3 fig.
ca. 29 li. 1.

i 7 ta. Q.

d 9 tab. n. 3
tab. u. 10 n.
b 9 tab. u. 1
f. l.

c Ossis circumscriptionem petes
ex 2 fi. cap.
29 li. 1.

d 9 ta. m.
e 9 ta. ab m.
ad n.

f 1 fi. ca. 30
lib. 1 S. de m.
T.

g 10 ta. 2 a.
uersus a.

h 10 ta. 2. 2
ta. y. 4. tab.
m. 5. 9. 0. 32

i 9 ta. u.
h Hic con-

feres 9, 10
et 11 tabulas
inter se.

l 10 ta. 11. x.
m 10 ta. y.
n 2 fi. ca. 30

lib. 1 V.

poris seu quinti femur mouentium musculi parti, reliqua musculi pars " adnasceretur, illa di-
 stincti & peculiaris musculi uice ab omnibus merito haberetur. Nunc autem quum poste-
 rior hæc pars adnatam continuamque eiusdem musculi aliam habeat partem, nihil obstat di-
 uersis doctrinæ modis, aut unum (uti nos hæcenus fecimus) uniuersum hunc musculum appel-
 lare, aut primum in " duos illum distinguere: ut scilicet unus esset, qui femoris interno capiti
 tendinem porrigat, alter uero qui acutæ femoris lineæ implantatur. Atque hæc una est in-
 scriptio, istam posteriorem partem ab anteriori distinguens. Verum & " anterior rursus pars
 inscriptionem quoque obtinet, non tamen adeo manifestam, ac modo narratam, uerum ta-
 lem, cuius gratia hanc partem in duas portiones, aut si quis uelit, in duos musculos subdivi-
 uidere, integrum sit. Huius nanque anterioris quinti musculi partis portio, quæ enascitur ab
 anteriori appendicis ossis coxendicis sede, quæ à pubis ossium commissura ad infimam us-
 que coxendicis partem pertinet, ab illa anterioris musculi partis portione, inscriptione qua-
 dam dirimitur, quæ à reliqua appendicis sede usque ad posterioris partis musculi totius an-
 teriorem regionem pronascitur. Præterea duæ hæc anterioris partis portiones, non inscrip-
 tione impressione uel solum distinguuntur, sed etiam fibrarum ductu, ac item insertione: quem-
 admodum etiam totius musculi posterior pars ab anteriori fibrarum insertionis occasione
 differt. " Portio nanque anterioris partis, quæ pubis ossium commissuræ proxima est, admo-
 dum obliquas & ferè transversas exigit fibras, quæ ab exortu retrorsum ad radicem parui fe-
 moris processus contendunt, & superiori parti acutæ femoris lineæ inseruntur. Reliqua au-
 tem anterioris partis portio, quæ ad infimam magis coxendicis ossis sedem principium du-
 cit, obliquas quidem exigit fibras, sed propemodum rectas, & inferiori asperæ prominentiæque
 lineæ sedi continuo implantatas. Ac proinde aut mecum unum constituito in uno femore
 musculum, aut si uisum fuerit utraque partes duorum muscularum uice enumerato: aut si
 maiori adhuc numero, iam in sectione peritior, caperis, anteriorem partem in duos muscu-
 los subdividito, tres enarraturus, ea tamen lege, ut situi, functioni, figuræ, crassitie, nervo-
 sæ & carnosæ parti magis quam numero attendas, & obserues pariter me de hominum, non
 autem simiarum musculis secus quam Galenum loqui. ne si forte aliquando illum legens me
 posteriorem huius quinti musculi partem, quæ radici interioris capitis femoris implantatur,
 oscitanter spectasse arbitreris, quod illam tendine insertionem moliri scripserim, quum inte-
 rim carneam insertionem in caudatis simijs tentet. Hæcenus commemoratis quinque mu-
 sculis, tensio femoris primario concreditur, & ijdem quoque femori in motu, qui in latum &
 in circumactum quoque fit, ut nunc audies, famulantur. " Primus enim ualidæ & in neutram uer-
 gentis partem extensionis autor est, amplo ipsius principio, & lato tendine femur reuellens.
 Si uero elatiorem duntaxat sui principij partem tetenderit, aut humiliorem, non quidem in
 neutrum latum inclinantem efficiet tensionem, uerum in hoc illud uel latum uergentem. " Se-
 cundus autem extendit simul, & sursum uersus exteriora trahendo femur, ipsius caput intrò
 in coxendicis ossis acetabulum adigit. " Tertius & " quartus femur quoque modicè sursum
 trahentes, tendunt, Deinde & quartus etiam foras circumagit: tertius autem femur circum-
 uertit paulò magis in posteriora tendens, quam sursum trahens. At utrique multò infirmius
 motui qui in gyrum fit subministrant, quam musculi, quibus hoc proprium munus dele-
 gari paulò potè audies. Caterum " quinti musculi fibræ posteriores, seu musculi illius poste-
 rior pars, rectis donata fibris, crus firmum stabilit, ac terræ affigit, femur extendens. Antero-
 ris autem partis posterior portio, non minus id ipsum suis fibris præstat, cum modica tamen
 femoris ad interiora adductione. Altiores uero fibræ, quæ ossis pubis " cartilagini uicinæ sunt,
 aut potius anterioris musculi partis prior portio, introrsum ducit femur, & fibræ huius por-
 tionis altiores, ita femur ducentes, illud quoque sursum reuellunt, flexionisque quodammodo
 autores euadunt. Nunc enarratis quinque musculis, flectentes opponuntur, qui illis paucio-
 res sunt, nempe tres tantum proprii, quos sextum, septimum & octauum memoriæ confir-
 mandæ gratia numerabimus. " Sextus itaque is est musculus, quem dum dorsum mouentes
 musculos recensere, atque de lumborum musculis sermo incidisset, Galeni gratia, descripsi,
 quod is in lumborum muscularum enarratione ab hominum compositione, suis simijs dele-
 ctatus, aberrauerit. Hic igitur musculus ex undecimæ & duodecimæ thoracis, & primæ, &
 secundæ, & tertiæ lumborum uertebrae lateribus, carneo enascitur " principio, quod si-
 mulatque prodijt, musculum teretem constituit, deorsum obliquè uersus exteriora descen-
 dentem. Procurrit enim per interiora ossis illum semper carnosus permanens, " quousque ad
 eam ossis pubis " regionem deuenit, quæ coxendicis ossis nomen assumit. Hic nanque in ua-
 lidum & teretem cessans tendinem, dictam nunc pubis ossis sedem transcendit, & deorsum
 produ-

Quinque pri-
 morum femo-
 ris musculorū
 munus.

Sextus.

Lib. 2. de Ad-
 mus. sect.

n u c ad o
 in 814.

o 13 tab. 27.
 distinguuntur
 a 2 c 7 n.
 p inter o 13
 c 8 tab.
 q 13 tab. 27.
 r, que dis-
 tinguuntur
 in 7 c 2.

r conferri
 ter se 12 14.
 2, 7, 2.

9 14. 17.

10 14. 2.

11 14. 2.

12 14. 2.

13 14. 2.

14 14. 2.

15 14. 2.

16 14. 2.

17 14. 2.

18 14. 2.

19 14. 2.

20 14. 2.

21 14. 2.

22 14. 2.

23 14. 2.

24 14. 2.

25 14. 2.

26 14. 2.

productus, tandem interiori seu minori femoris⁶ processui⁷ implantatur, elatiorem processum partem occupans, Musculi huius gratia, ubi pubis osse expanditur, uelut sinus aliquis insculpitur ligamento ex osse nato obductus, ut simul tuto nec errabundus hac sexti musculi tendo descenderet, nec intensus laxatus ue ossis duritie uitaretur. ^{Septimus} Septimus ex tota interiori ossis ilium⁸ regione tanquam ex semicirculo quoque carnosam originem accipit, & lato hoceductus principio, paulatim arctior crassiorq; redditur, deorsum in priora corporis procedens. Ex omnibus enim eius lati principij fibris teres efformatur musculus, qui per altiore ossis coxendicis⁹ regionem uectus, adhuc carnosus ad minorem femoris processum descendit. Vbi uero processui uicinius appropinquat, in teretem quoque cessat¹⁰ tendinem, qui humiliori eius processus parti, praedicto nunc tendini proximus inseritur. Porro qua hic musculus super coxendicis ossis elatiora deorsum tendit, cavitatem quoque quodammodo & sinum, ne uagabundus feratur, in osse obtinet. ^{Octauus} Octauus musculus oscitanter secantibus femur mouentium¹¹ quinti & maximi totius corporis musculi portio censetur, ex pubis osse carneo amplexu initio in homine enatus. Ex tota enim ossis pubis¹² linea, ab anteriori coxendicis ossis acetabuli sede ad ossium pubis usque commissuram extuberante, musculus hic principium ducit, quod ad posteriora admodum oblique descendens, aequè amplum tantisper asseruatur, donec breui, sed amplo, tendine femoris ossi¹³ inferatur. Fit uero ipsius insertio e regione parui femoris processus in interiori femoris lato, oblique deorsum uersus posteriora tendens. Hic musculus in hominibus liuidum se spectandum offert, at non aequè, atque in caudatis simijs, quibus musculus iste minor & non similiter lato principio enatus conspicitur. ^{Sexti, 7, 8 mus.} Tribus his musculis Natura ut simul femur flecterent, & introrsum uersus alterum crus ad mouerent, commisit, Sextus enim, quem flectentium primum recensuimus, sursum ualide femur attrahit flectitq; ad interiora id adigens. Septimus similiter femur sursum attollendo flectit, & paulò insignius sexto, uersus interiora, admouet. Octauus modicè sursum femur contrahit, infirmæq; flexionis autor censetur, uerum adhuc magis septimo introrsum uellit. Ita profectò ut flectentes & extendentes musculos, duobus quoque reliquis ad interiora exterioraq; motibus, Natura præfecerit. Porro tribus flectentibus, ^{Nonus} musculus quem inter tibiæ motores nonum enumeraui, aliquid auxilij suppeditare creditur. Non enim adeò absolum est, & hunc secundariò quum tibiæ extendit, ad femoris flexionem accommodare, quum ex coxendicis ossis¹⁴ tuberculo quopiam enatus, rectà deorsum in priorem tibiæ partem excurrit. Verum quemadmodum hunc femoris flexioni opem ferre arbitramur, omnes etiam reliquos tibiæ mouentes, qui ex coxendicis, aut pubis, aut ilium osse in tibiæ procurrunte secundariò femoris motuum opifices esse, merito (quamuis non ita rectè) assereremus. Cæterum duo adhuc supersunt musculi femur contorquentes, quos in præsentis sermone nonum ac decimum numerabimus. ^{Decimus} Nonus itaque liuidus, & ut cæteri huius articuli, carnosus uisitur, & transuersim in exteriora protensus, totum pubis ossis¹⁵ foramen exterius contegit. Deinde per exteriorem¹⁶ ceruicis femoris sedem productus, ualido satis & utcunque amplo tendine, insertionem molitur, in magni femoris processus¹⁷ sinum, qui femoris ceruicem & caput ossis coxendicis acetabulum subintrans, e directio respicit. ^{Decimus} Decimus internam dicti nuper foraminis sedem occupat, nono longè ualidior, & ob Naturæ artificium accuratè perpendendus. Huius nanque principium exoritur à tota¹⁸ linea, quæ ab interna ilium ossis sede, qua primi ossis sacri ossis transuerso processui committitur, per internam coxendicis ossis & pubis regionem, ad pubis usque ossium commissuræ elatiorem partem protenditur. Latum hoc decimi musculi principium, quod ueluti tribus lineis seu inscriptionibus insignitur, similiter ut reliquorum ferè præsentis articuli musculorum capita, carnosum est, & totam internam accedens processum. Atque hunc sanè reflexum magna Conditoris industria musculus molitur, quæ enim musculus ad¹⁹ sinum hunc circumuoluitur, externa parte carnosus est, ea autem parte qua sinum tangit, omnino neruofus conspicitur, & ueluti²⁰ tres teretes com monstrat tendines, serie quadam ad sinum reflexos. Tendines hi lati in musculi substantia incipiunt paulò anteaquam musculus sinum contingat, sed quæ sinui obuoluuntur strictiores euadunt, singuli rursus in magno hoc sinu peculiarem sinum sibi uendicantes. Amplius enim sinus duos leuiter extuberantes ostendit lineas, quæ transuersim ductæ magnum sinum

ueluti in tres partiantur, tribus eius musculi tendinibus celatos. Tendines ubi sinum superarunt, inuicem collecti in unum finiunt tendinem,^b sinui magni femoris processus unâ cum nono musculo implantatum. Quum itaq; tres hos tendines, qui exteriori parte carnem obnatam habent, intueberis, facile colliges hâc Naturam decimo musculo robur additum uoluisse: ne si carneus omnino esset, in reflexu & motu, ossis duritia compressus laceraretur. Quin etiam sinui ligamentum, seu crassa ualidaq; membrana obnaſcitur, ne ossis contactus musculum in reflexu uitaret. Ad hæc, ligamentum id læue admodum, & uiscido unctuosq; humore oblitum est, quo facilius musculi ad sinum efficeretur circumactus: quod Naturæ artificium in rotulis & cardinibus sedulo imitatur, non solum motum accelerantes, uerum ut seriùs, qui reflectitur funis, attritu corrumpatur studentes. Præterea ut solo rotulæ sinui funem non committimus, sed rotulam in trochleo aut furcula (ne ex sinu funis labatur) firmamus, ita quoque Natura ossium sinu non contenta, à superiori sinus parte¹ unum, & ab inferiori alterum eduxit musculum, qui ambo unâ cum decimo porrecti, illum quo minus sua sede declinaret, asseruant. Ab acuto enim coxendicis ossis^c processu, carneus enascitur musculus, superiori parti decimi musculi ad ipsius usque infertionem adnatus. Deinde ab appendice quoque ossis coxendicis alius similiter carnosus & gracilis prodit, inferiori decimi musculi sedi ad infertionem exporrectus. Verque enim in sinum magni femoris processus infertionem cum decimo molitur, & cum ipso circumductui femoris subministrat. Cæterum subinde non solum eiusmodi musculos ad elatiorem & humiliorem reflexum sedem pronasci conspicias, imò etiam ab interna regione, ubi iam flexus nō amplius obliquatus ad femur ducitur, carnosam substantiam à coxendicis osse enasci obseruaturus es, quasi tres illi tendines in carneam à coxendicis osse pronatam substantiam, post flexum immitterentur, itaq; inuoluti ad magnum femoris processum contenderent. In tuo igitur est arbitrata, aut hos musculos, aut carneam molem tendines excipientem decimo iungere, atque ita proprios femoris musculos decem enumerare: aut si mauis, utrunque distinguas, & duodecim recensebas. Rursus si quintum musculum in tres diuiseris, omnes erunt quatuordecim. In nostro itaque numero decimus unâ cum duobus illis gracilibus femur in posteriora circumagat, nonus uerò in anteriora, nihilò secus quam si baculum inter duas manus extensas repositum, alternatim in priora & posteriora ductis manibus circumuerteres. Nonus enim & decimus manibus respondent, baculo autem femur non ineptè assimilaues.

*Carnes portiones decimo musculo atten-
se.*

Quot femur mouentes musculi possint consistere.

MUSCULORVM FEMVR MOVENTIVM

administratio. Caput LVII.



Primi musculi administratio.

Secundi.

Tertij.

Quartij.

PRIMI qui femoris motibus præfunt musculorum administratio, nem, ab extendentibus meritò in illo crure, in quo tibiæ motores aggreſſus es, exordieris. Assumpta itaque ex minus fragili ferro nouacula, quæ ossis impetum aliquando sustinere possit,^a primi musculi caput (si modò dum mouentes tibiæ musculos dissecares, illud non abstuleris) ab osse coccyge & ilium ossis dorſo, transuersis sectionibus niteris abradere, quouſque in secundum musculum incidas. Quando autem uniuersi musculi principium ab osse deraſum erit, licebit hoc reflectere, & solis manibus (nisi nouacula quoque uti uoles) à subditis partibus ad magnum usque femoris processum liberare. Quod ubi præſtiteris, ipsius longam intueberis^b infertionem, procul etiam sub magni femoris processus radice descendente. Hæc enim non uulgariter uenit perpendicularis, uti neque huius musculi forma, substantia, fibrarū ductus, & munus, uel abſceſſuum duntaxat nomine, quos crebro in ipſo & præcipue iuxta magnū processum in illis tendine incidimus.^c Secundus dein pariter ab ilium osse nouacula dirimendus est, mente adhibita, ne tertij quoque principium unâ adimatur. exortus enim cōtinuitas, quæ linea duntaxat interſtingitur, utrunque musculum unâ facile auferri ſinit. Vbi itaq; ſenſim reflexo ſecundi musculi initio, & transuersis ſemper ſecundū ilium ossis dorſum factis ſectionibus, ad tertij musculi principij deuenieris, ſecundus iam totus uenit reflectendus, & manibus attractus, ad infertionem uſq; à tertio diſtendendus.^d Tertius quoq; eadem ratione ab ossis ilium dorſo, poſt ſecundum abra detur: atq; hoc ad ipsius etiam infertionem deducto, quartus ab ossis ſacri lateribus cultello auferetur, & manibus apprehenſus, ad magnum uſq; femoris processum à ligamento cui inniſcitur, & coxendicis articulo dirimetur. Facillima enim horum, poſtquam primum adminiſtraueris, eſt aggreſſio, qua

*i unus et al.
1.12 p. 13 x.
14 f. alter
carundem
td. n. 7. & g.
h 2 fi. ca. 29
li. 1 d.*

l 13 t. 7.

a 9 t. 7.

*b scd. m. 18
ſiniſtro crm
re.*

c scd. 7.

d 11 t. 7.

qua obita, licebit singulorum motibus examinatis, omnes quatuor abijcere. ^{Quintum} post hos muscolum à coxendicis ossis infima sede, & pubis osse acutiori nouacula simul totum calidè abrades, & ad suam in femur insertionem illum perducens, eam accuratè obseruato, non neglectis ipsius inscriptionibus, seu delineamentis, fibrarumq; ductus differentia. Animum etiam dum hunc præcindis accommoda, ne simul quoque octauum muscolum, tanquam quinti partem incautus auferas. Quinto itaque à femore rescisso, acutiori cultello à lateribus corporum undecimæ & duodecimæ thoracis uertebrae, & trium primarum lumborum, sexti musculi caput uenit liberandum, & capite eius apprehenso, totus musculus ad paruum usque femoris processum, à subditis est dirimendus. quod si uoles, solius manus ope, perfeceris. Nisi fortè & hunc muscolum, quum dorsum mouentes administrares, iam dudum inspexeris. Postquam uerò ipsius tendinem, & quo super pubis os fertur^h sinum indagaueris, septimus opportunè aggredietur. Hunc itaque nouacula transuersis ductis sectionibus, ab interna ossis ilium sede ad coxendicis usque os quà descendit erades, & musculo manibus eleuato, ad minorem usque femoris processum, ipsius insertionem consideraturus, detrahes: non præterita interim sinus sui, quo deducitur, inspectione. Mox octauum transuersa linea à pubis osse abscictum usque ad insertionem, quæ similiter suo principio lata est, diuelles: obseruans interea, ne nonum quoque imprudens adimas. Duo qui adhuc supersunt musculi, quoniam pubis ossa dum uelica & scidis spectares musculos, dirempta sunt, atque iam unum tantum crus, in quo tibiam mouentes musculi administrabas, ad manum habes, facile secabuntur. Nonum itaque & decimum à pubis osse & coxendicis abrades, & ipsorum connexum & in maioris femoris processum sinum, ac implantationem examinabis, nequaquam perfunctoriè præteriens decimi reflexum, & quæ ad huius latera undiq; nascitur, musculosam substantiam cum decimo musculo ad insertionem usque exporrectam. Hæc enim citra corporis nostri Opificis solertia laudem hymnumq; nunquam prætergredieris. Quum hos femur circumuertentes rescueris, membrana se spectandam offert, totum pubis ossis foramen comprehendens, & hoc loco sibi utrinque incumbentes musculos dirimens. Similiter etiam ab acuto coxendicis ossis processu, in quinti sacri ossis latus^p durum ligamentum produci contueberis, cui^q quartus femur mouentium musculus innitebatur, quodq; hæc ossa firmitus committit. Deinde aliud iam dudum sese obtulit ab eodem sacri ossis latere, cui nuper dictum inseritur, enatum, atq; in posteriorem, illicq; elatiorem coxendicis ossis appendicis^s sedem insertum, quod recti intestini, ut & mox in enarratione præcedens, musculorum firmamentum efficitur. Articuli uerò coxendicis ligamenta, unà cum genu articuli, & pedis ligamentis in unum Caput reijciam, pedis & digitorum ipsius musculorum sermoni subnectendum.

DE LATESCENTE TENDINE, CVTI plantæ subnato. Caput LVIII.



MNES quos hæcenus non commemorauimus musculi, in tibia & pede reponuntur pedis, ipsiusq; digitorum motibus famulantes. Quo autem & hi aptius pertractentur, primum pedis motores recensebimus, & deinde qui digitorum duces existunt, ut tunc postmodum quot quaque sede sint, unà colligentes, eorundem administrationem subnectamus. Verum quanto Galeni oratio in secundo de Administrandis sectionibus obscurior imperfectiorq; est, & non undiq; suis in tertio de Partium usu placitis respondet, tanto eiusmodi musculorum diligentior nobis sermo instituendus uenit. Neque profectò cum Galeno arbitrari conuenit, simiam ab homine duntaxat in pedis digitorum diductu differre, quòd scilicet simia longiores, & magis discretos digitos quàm homines adipiscatur. Imò musculis magna sanè est differentia: quam si non omnem, ne prolixior fiam, explicuero, prout orationis tamen ordo requireret, quæ mihi animo obuersabitur, lubens enarraturus sum: sedulo studiosos hinc admonens, ut non solum uera hominis musculorum enarratione & inspectione contenti, simiam quoque aggrediantur, quo Galenum (qui nusquam æquè ac in Anatome arduus est) feliciter intelligant, ne quum hunc (uti profectò debemus omnes) profiteri instituerint, suos præceptores imitati, elegantissimam, maximamq; ipsius librorum copiam, qui Anatomica complectuntur, negligant: & solum illis quæ quibus mediocriter in liberalibus studiis cruditis citra omnem præceptoris operam assequitur, sese totos dedant: memores, quàm turpiter in leuib; Galeni operibus pedem, qui sese Galenicos hodie ap-

Ordo in reliis
quorum adhuc
musculorum
tractatione ob
seruandus.

Magna simie ad hominem
differen-
tia.

*Simia ab ho-
mine in tendi-
ne pedis subna-
ro differentia.*

pellitant, retrahere cogantur, quoties in sectionis & corporis partium mentionem Galenus in-
cidit. incidit autem creberrimè, tum quòd dissectionibus mirificè oblectabatur, tum quòd me-
dico in corporis quod sibi curandum proponit, mentionem subinde sit, prorumpendum. At
age^a tendinem plantæ cuti sub tensum aggrediamur, in quo in primis homo à simia insigniter
differt. Hæc nãque proprium qui hunc producat tendinem exigim musculum, ab externi fe-
moris capitis radice in posteriori sede carnosio principio enatum, & sub^b duobus musculis oc-
cultatum, qui ab inferioribus femoris capitibus enati, prominentem in sura partem efformare,
atque in calcis os inferi dicuntur. His itaque musculus is simiæ musculus cooperus deorsum
carnosus fertur, ^c illi forma perquam similis, qui latum in manu producit tendinem. Postquam
uero ad mediam usque longitudinis tibiæ descendit, in gracilem cessat tendinem, qui duobus
illis musculis non amplius obiectus, ad horum tendinis, quem ipsi producant, internum latus
porrigitur, declivius ad posteriorem calcis sedem descendens, quæ priuatim in caudatis simijs, ut
& canibus, sinum sibi exsculptum gerit, quo hic tendo non errabundo ductu, tutò uehitur: calcis
ossi interim, nisi fortassis transuerfi alicuius quo obducitur ligamenti interuentu, non adnatus:
atq; in hoc à Galeni descriptione in primo de Administrandis sectionibus libro uarians, quòd
in duas non diffindatur partes, altera quidem calci insertus, altera uero in latum tendinè expli-
catus. Calcem enim totus superat, & in pedis plantam dilatescit, ^d musculo quem secundum
quatuor digitorum articulos flectere audies, obnatus, atque manifestius in inferiorem quinque
pedis digitorum sedem protensus, quàm latus manus tendo digitos accedit. Deinde ut latus
tendo manus cuti citra alicuius corporis medium non obnascitur: ita neque in pede, quando
quidem multus adeps tendinem & cutem intercedit, id^e que possimum in hominibus, quibus
nullus omnino musculus latum tendinem educit. Verum ab infima calcis parte, qua terræ in-
nitimur, ^e ualidum ligamentum prodit, totam inferiorem pedis amplitudinem subiens, si u-
num utrinque musculum exceperis, cui id non obducitur. In interno quidem pedis latere is
^f musculus est, qui pollicem à cæteris abducere dicitur. in externo autem, ^g qui minimum di-
gitum à cæteris amouet. Obnascitur itaque hoc ligamentum longè manus tendine crassius, &
robustius, toti inferiori sedi eius^h musculi, quem secundos quatuor digitorum articulos fle-
ctere docebimus, atque id eo sit pacto, ut quis propriam eius musculi membranam hoc liga-
mentum diceret, nisi iuxta digitorum radices, quæ eius musculi tendines transuersum digito-
rum ligamentum subeunt, id abscederet. & dein transuersis digitorum ligamentis obductum,
ac in quinque partes discretum, inferiori quinque digitorum sedi obnascereetur. Cæterum uti
paulo antè monuimus, plurima duriusculi adipis copia ligamentum id (aut utcunque appella-
re tibi uisum sit) & cutem intercedit, quanquam interim fibrosis nexibus admodum frequen-
tibus ipsi committatur. Eiusmodi itaque ligamentum priuatim homines tendinis lati uice exi-
gunt: quod si fortè ab aliquo ducendum fuisset tendine, profectò illum ualidum crassumq; ad-
modum procreari oportuisset. Nam si manus tendinem cum hoc corpore ligamentoso contu-
leris, quadrupla tendinis per cubitum exporrecti crassities, in tibia neutiquam suffecerit. Nihil
lo minus tamen in hominis tibiæ posteriori sedeⁱ musculum reponi audies, qui carnosio prin-
cipio ab exteriori femoris capite enatus, & carnosus priusquam bene poplitem superauit esse
desinens, tendinem producit, longè illo qui manus latum tendinem educit, graciliorem. Ve-
rùm hic tendo pedis plantam hæcenus mihi neutiquam subire uisus est, at interno calcis lateri
ad posteriorem ipsius sedem implantatur, neutiquam summè posticam calcis sedem, ut ille cau-
daturum simiarum musculi tendo, attingens, multoq; adhuc minus sinum in hac calcis ossis
sede sibi uendicans, quo non errabundus uehatur. Quòd uero latio commemoratum in ho-
minis pede ligamentum, & simiæ latus tendo, parem usum cum illo qui manum subit tendine
præstent, conformationis similitudo argumento est, atque id eo adhuc firmitus persuadet, lati
in manu tendinis non infrequens defectus. Haud semel enim illum in manu deesse, & ^k trans-
uersum in interna brachialis sede repositum ligamentum sui portionem porrigere, quæ ten-
dinis lati uicem supplebat, in homine secus multo quàm in simijs comperi. Vti etiam à^l tendi-
nibus brachiale flectentibus, eum tendinem produci interdum obseruatum est, nunc ab illo
qui quarto brachialis ossi insertus brachialis flexus autor est, nunc ab illo qui per transuersum
brachialis internæ sedis ligamentum ductus, post brachialis ossi indicem
suffulcanti multo antè inseri dicebatur.



UNIVERSVM pedem perinde ac extremam manum flectimus, & extendimus, & deinde in latera (quamuis interim obscurissimè) ducimus, idque plurium & diligentissimè ob crebra quæ ipsis contingunt uulnera distortionibusque obseruandorum musculorum beneficio. Qui uerò articuli his motibus subministrant, in pedis ossium enarratione, superiori libro non obiter percurramus. hic autem pedem mouentium musculorum numerus à posteriore tibiæ sedem occupantibus, opportunè inchoabitur. ^m Primus itaque à radice interni femoris ^o capitis unico enascitur principio, si modò ipsius continuitatem spectes. si autem substantiæ animè attenderis, id principium duplex apparebit. ^o unum quidem superius, & magis iuxta femoris medium interius: ^p alterum uerò inferius, & nonnihil exterius, pari omnino modo, quo rectum abdominis musculum ⁱ enasci retulimus. Superior nanque principij huius musculi pars carnea lataque est, & deorsum protensa, paulo sub genu articulo cum reliqua in intj parte confunditur, quæ exactè nerua liuidaque in exortu erat, & deorsum recta per genu articuli posteriora descendens, ualde carneum crassumque efformat musculum, qui formam exacti (ut sic dicam) musculi refert. Priusquam uerò musculus iste ad medium tibiæ longitudinis iam angustior redditus pertingat, carnosus esse desinit, & ex suæ inferioris partis amplitudine tendinem latum educit, in cuius medium aliquandiu adhuc carnosus musculi pars porrigitur. Atque hic musculus in interno latere posterioris tibiæ sedis ducitur: in externo autem latere ^o secundus musculus consistit, qui similiter ac primus ab externo femoris capite enatus, deorsum fertur, omni ex parte primo musculo similis. Quum uerò utrique à femoris capitibus deorsum tendunt, non procul ab exortu sese ⁱ contingunt, inuicem fibrosis nexibus herentes. At quo magis deorsum prorepunt, eo ualidiùs conuascuntur, ut iam tendo, quem singuli producant, ⁱ unus omnino sit, ab utrisque enatus musculis. Interior tamen, seu primus musculus nonnihil diutius carneus, quam secundus, deorsum ducitur, quod in musculosis citra confectionem est euidentissimum. Duo enim in sura prominentes musculorum uentres, carnea partes sunt præsentium musculorum, suræ magnam molem efformantium. Tendo autem ab ambobus musculis enatus, & paulò angustior redditus, in caudatis simijs in posteriorem calcis sedem ualidissimè inseritur. In hominibus uerò non multo sub carnosus musculorum sede, subiecto cuidam ^o musculo ⁱ adnascitur, quem quartum inter pedis motores recensimus. Atque hic connexus adeò est pertinax, ut nulla ratione hunc tendinem ad calcem usque à subiecto musculo dirimere queas, & asserere cogaris, ab hoc tendine & quarti musculi tendine, ⁱ unum efformari in posteriorem calcis sedem insertum. Ac proinde etiam Galeno succensebis, dum alios sectionis professores falso increpat, quòd duorum primorum musculorum tendines tertio cuidam tendini commisceri, neque alteri non connexos in calcem inferi scripserint. Hoc nanque uerè de hominibus illi prodiderunt, parum solliciti, num tendines secus in simijs calci implantarentur. ^a Tertius musculus ille est, quem superiori Capite tendinem insigniter gracilem producere diximus. Ab externo enim femoris propter genu articulum capite teres enascitur principium, iamiam in ipso exortu carneum & gracile. Ab ortu tamen non ita procul dilatescit, exacti musculi uentrem utcunque crassiusculum referens: uerum mox sub poplite uenter iste ^o gracilescens, summè gracilem tenuemque educit tendinem, qui quemadmodum & musculi uenter, sub duobus nuper commemoratis musculis occultatus, & super quartum expansus, sensim oblique deorsum prorepat, quousque ad internum duorum primorum musculorum tendinis latus ^o elabatur, ubi is quarto musculo ualidissimè connecti incipit. Tertij musculi tendo hinc deorsum ad internum usque calcis latus fertur, iuxta posteriorem calcis sedem ipsi implantatus, non autem pedis plantam subiens, illius musculi modo, quem in simia latum plantæ tendinem educere priùs recensui. ^a Quartus non solum suram constituentium musculorum, uerum etiam omnium tibiæ amplexantium maxime, posteriorem tibiæ regionem sua amplitudine occupat. Enascitur enim ex posteriori se de ⁱ coarticulationis fibulæ ad tibiæ, neruo & ualido initio, quòd deorsum modice ductum adeò dilatescit, ut latitudinem tibiæ ossis & fibulæ uincat. non tamen æquè crassus est, ac latus ampliusue. Ex hac uerò amplitudine priusquam medium tibiæ longitudinis superauit, sensim arctatur, & paulo supra calcis regionem in ualidissimum & crassum degenerat tendinem, non solum ab ipso ^o formatum, sed etiam à primi & secundi musculi tendinis concursu. Ex tribus itaque his musculis procreatus tendo, uniuersæ posteriori calcis ^b sedi implantatur, quam

Pedis morus.

Primus pedis mouentium

Secundus.

Lib. de Ad. m. secti.

Tertius.

Quartus.

quam Natura, quo facilior promptiorque tendinis perliceretur insertio, depressam asperamque effinxit. Cæterum quia calcis os extra tibiæ ossis rectitudinem¹ prominet, & ipse quartus musculus propemodum toto progressu tibiæ ossi & fibulæ incumbit, paulo ante insertionem² tendo à tibiæ ossis procul abscedit triangulam efformans cavitatem, cuius basis est longitudo calcis extra tibiæ ossis rectitudinem prominentis: alia autem duo cavitatis latera constituuntur, unum quidem tendinis ipsius anteriori sede, alterum uerò posteriori regione illorum³ musculorum, qui sub quarto reconditi, posteriorem tibiæ regionem occupare dicuntur. Atque hæc ea demum est cavitatis, cui Homerus Achillem in Hectoris crure funem traicisse, illumque ad currum religatum, circum mœnia Troiæ traxisse cecinit. Quod etiā lanios, quum boues aut oves iugulatas attollunt, imitari conspicimus, baculum transuersum sub hoc tendine transmittentes. Porro quartus musculus externa sede, qua primi duo illi incumbunt, admodum liuidus est: quemadmodum & primus quoque & secundus, ea potissimum parte qua quartum respiciunt musculum. Interna uerò sede quartus non admodum liuet, & ipsius etiam tendo in anteriori sede longius carniformi substantia nutritur, quam in posteriori. Non enim à fine carniformis musculi huius substantiæ, ad calcem usque insigne intervallum in hominibus uisitur: quamuis & id quoque notatu dignum sit. In simijs uerò etiam quartus hic musculus quodammodo carneus calci inferitur: quod Galenus animaduertens, alios Anatomicos infirmulat, quos hominum cadauera, non autem cum ipso duntaxat simiarum, sedulo secuisse, uel ex his constat quæ præter meritum illis à Galeno imponuntur, digno sanè qui interdum (nisi ipsius obfaretur autoritas, & quam illi tribuimus fides) à nobis notaretur, cuiusque etiam errata enumerarentur: idque tunc potissimum, dum pro hominum Anatome suarum simiarum historiam, secus ac ueteres illi, nobis obtrudit. ^m Quintus pedem mouentium musculus in posteriori tibiæ sede locatus, sub⁴ duobus musculis adhuc occultatur, quos digitorum pedis flexui famulari docebimus. Priusquam enim quintus in conspectum ueniat, ^o quatuor commemoratos iam pedis musculos, pariter cum duobus illis digitorum flexui subseruientibus ademptos esse conuenit. Quintus nanque⁵ ligamento membraneo proximè incumbit, quod in tota tibiæ longitudo porrectum, tibiæ ossi fibulam colligat. ^p Principium siquidem quinti musculi à tibiæ ossis, & fibula, quæ hæc ossa inuicem dehiscere incipiunt, exoritur, & statim ab exortu carneum latumque uisitur, eadem prorsus latitudine ad inferiorem usque tibiæ ossis appendicem progrediens. Hac latitudine præfens musculus posteriorem illius membranei ligamenti sedem & magnam quoque tibiæ ossis posterioris regionis partem integit, ligamento interim, & interno fibulæ lateri adnatus, ab ipsisque toto progressu, exortus sui robur asciscens. Cæterum illico atque inferiorem tibiæ ossis contigit appendicem, & propemodum æquè latus adhuc atque in media tibiæ sede conspicitur, ab interno ipsius latere teretem profert tendinem, qui iam aliquosque in musculi carniformi substantia incipere uidebatur. Vbi igitur tendo prorsus excarnis est, deorsum fertur, ^s sinui incumbens in posteriori sede appendicis tibiæ processum, qui interiore malleolum constituit, exculpro. In hoc sinu transuersum ligamentum⁶ tendini obducitur, hinc oblique pedis inferiora subeunt. Sub omnibus enim⁷ musculis inferiorem pedis sedem occupantibus, præfens tendo tantisper prorepat, dum in inferiorem⁸ tarsi ossis sedem ualide inferatur, quod cubum tesseramue imitanti ossi proximum est, quodque cum alio sibi commissio cunei formam appositissimè exprimere, præsentisque musculi gratia priuato⁹ processu donari, in primo libro diximus. Est itaque quintus musculus ex³ illorum albo, qui sua carniformi substantia non arcuati, ex altero tantum latere tendinem teretem emittunt, ac maximè laniorum securis imaginem præ se ferunt. Quinetiam unus quoque eorum est, qui peculiari sinu ligamentoque transuerso utuntur. Inter calcem enim inferioremque malleolum tria peculiaris huius generis ligamenta, & ^h sinus tres consistunt, tribus tendinibus parata. Quod autem ligamentum ex tribus malleolo proximum est, quinti pedis musculi tendini, quemadmodum etiam paulo ante diximus, proprium censetur. Reliqua autè duo illis creata sunt¹⁰ musculis, qui quinto superstrati extrema digitorum internodia flectere cōmemorabuntur. ^s Sextus pedem mouentium musculus in anteriori tibiæ sede locatur, omnium huius regionis anterior, & exacti musculi formam representans. ^e Enascitur autem ab anteriori sede coarticulationis fibulæ cum tibiæ ossis, ab utrifque ossibus, & communi illorum¹ ligamento exortus sui portionem assuimens. Exortus iste acuto incipit angulo, qui illico dilatatus musculi ventrem ostendit nonnihil latiore quam profundiore. Priusquam uerò medium longitudinis tibiæ superat, sensim arcuatur, & multo supra pedem, in teretem finit⁶ tendinem, qui deorsum per tibiæ ossis anteriora prorepens, in transuersum^h ligamentum à tibiæ ossis in fibulam pronatum subit, & simulatque transuersum id ligamentum superauit, deorsum in pedis interiora descendens, modicè patentis sinu in

tarsi

i Obfer
id in 2
ultimar
fi. lib. 1.
h 13 lib.
l 14. lib.
m.

m 15 lib.
E. de
m 2 p. 3 q
x 14. m
16 f.
n 14. lib.
m.

o 14. lib.
o. p. q.
p 15 lib.
ter. S. R.
q 15 lib.
r 15 lib.

s 2, 4. fi.
s 16. m.
15 chara.
t 16 lib.
u 13. tab.
dein 14.
w 13. m.
tendin.
s 15 lib.
L.

x 12, 20.
fi. ca. 33 lib.
chara. 3.
y 13. fi. ca.
33 lib. 1. lib.
d 14. lib.
m. 15. O. P.
b 15 lib. ch.

12, 23.
c 14. lib. 1. lib.
m.
d 3 tab. v.
2. 2. p. 4. lib.
chara. 1.
t. 16 lib.
c 3. lib. d.
f. fi. ca. 1.
23 lib. m.
h 1 tab. A.
t. d. 1. lib. 1.

Quintus.

S. xus.

deorsum uersus fibulae posteriora reflectitur. Verum hic tendo septimi tendine omnino non integitur, sed in priora prominens, anteriori septimi tendinis lateri attenditur, & sinui in posteriori fibulae appendicis sede exculpro incumbens, transuerso etiam ligamento circumdatur. Hinc rursus in priora descendens, processui pedis ossis ualidissime inferitur, quod tesseram referenti ossi adnexam, paruum pedis digitum sustinet. Verum hic tendo aliorum hactenus dictorum ritu, non simplicem¹ insertionem perficit, uerum nonnihil ante insertionem ipsius tendo bicornis redditur, duplici insertione dicto ossi implantatus. Neque est, quod quispiam Galeno confusus, sextum nobis commemoratum musculus, in duos quoque tendines diuidi arbitretur. Hominibus enim ad eum quem scripsi modum sextus musculus habet, aliter sane quam in caudatis simijs obseruatur. non enim in his tantum duplex tendo uisitur, uerum etiam duo sunt musculi admodum conspicui, quorum anterior posteriore minor est, ambo in pedis os pollicis praepositum implantati. Caeterum quando his (& si ad Galenum intelligendum iuent) non admodum concinne sermonem uera enarrantem interpellimus, nonum musculum iam praedictis addamus, quem quis proprium per se musculum recensere poterit, alius uero² alterius cuiusdam partem non inepte dicet, prout nimirum ille motui & insertioni, hic uero³ connexui & principio attenderit. A musculo enim, qui in anteriori tibiae sede locatus, quatuor pedis digitos extendit, carnosa quaedam portio iuxta mediam tibiae longitudinis ab externo ipsius latere enascitur. Quae deorsum ducta in tendinem degenerat, qui⁴ transuersum anterioris tibiae sedis ligamentum subit, & superiori pedis regioni exporrectus, fibrosisque nexibus subditis⁵ musculis commissus, in⁶ duas portiunculas bipartitur, quas pedis ossi paruum digitum suffulcanti inferit, non procul ab eius ossis superiori sede, qua imitanti tesseram ossi aligatur. Nihil itaque prohibet, hunc musculum aut partem digitos extendentis recensere, aut illum numero ab extensionis opifice distinguere, illumque nonum musculum enumerare, ut hactenus enumerati nouem censeantur pedis motibus famulantes. Primus itaque, & secundus, & quartus, qui suram seu tibiae uentrem praecipue efformant, atque in posteriori tibiae sede locati ualidissimum ferè corporis tendinem simul constituunt, robustissimi pedis motus autores sunt. Calcem enim sursum in posteriora trahunt, pedemque terrae firmant, seu in posteriora deorsum reflectunt, atque his⁷ quintus suppetias fert, pedem quoque terrae admouens, & interdum ut summis tantum digitis erigi queamus, in posteriora ducens. Neque est quod magnopere illius tendinis in calcem inferri officium praedicem, quum secundum mortem homini nihil pestilentius inferre pleraque nationes studeant, tendinis illius praecisione. Quod uero munus tertio pedem mouentium musculo concedatur, non ita affirmare possum, nam latum tendinem in pedem non producit, & sanè inualidior uisitur, quam qui cum insignibus illis quatuor musculis, in pedis extensione conferri queat. Si tamen hunc tantum opus subire posse quis crediderit, id addendum prorsus erit, eum obliquo & in internū latus, pedis motui suppetias ferre, quem admodum & praedicti quoque faciunt: prout hi illi ue soli, aut tendantur, aut laxentur, quemadmodum de brachialis motoribus dictum est. Caeterum⁸ sextus una cum⁹ septimo, octauo & nono contrarij motus, quum simul tenduntur, duces sunt. pedem enim sursum ad tibiae anteriora flectunt, motu sanè non aequè atque posteriores digno & ualido. Si uero alternatim cum posteriori tibiae sedem occupantibus musculis contrahuntur, in hoc illud ue latus pedem agent, atque ita, qui flexionis extensionisque autores sunt, etiam motus in latera appositissime obeunt.

Nonus.

Nouem musculorum pedem mouentium.

DE MUSCULIS PEDIS DIGITOS MOVENTIBUS. Caput LX.

Pedis digitorum motus.



DIGITI pedis iisdem prorsus motibus aguntur, quibus quatuor manus digitos duci relatum est. Pedis enim pollicis (qui duobus tantum ossibus donatur) primum internodiū pari omnino ratione cum primis reliquorum digitorum internodijs flectitur, non autem ut in manu, opposito flexu alijs digitis obducitur. Atque hic primorum articularum flexus, aut rectus est, aut in alteram partem modicè inclinans, quemadmodum primos quatuor manus digitorum articulos moueri diximus. Secundū autem pollicis internodium, & secunda quoque & tertia reliquorum digitorum internodia, simplici duntaxat ac in neutrum latus uergenti donantur flexione ac extensione, nullo interim proprio motu in latus (quemadmodum neque manus digiti) praedita. quum interim prima internodia & adductionis & abductionis motum in pede non minus quam in manu nanciscantur. Caeterum ut motus digitorum manus & pedis par quodammodo est ratio, ita ferè etiam similes

milis musculorum in utrisq; est series. Vnde etiam in illorū descriptione non inopportune eundem ordinem, quem in manus musculis obseruauimus, aggrediemur. ¹ Primus itaq; is futurus est, qui quatuor digitorum secunda flectit internodia, in hoc à manus^b musculo uarians, quòd breuior sit, & pro sua mole amplior & tenuior, quodq; nō ex tibia (quemadmodum musculus digitorū manus ē cubito) porrigitur. Totus namq; infernā duntaxat pedis sedem occupat, uniuersa ipsius carnosae substantiae pertinaciter subnatum habens^c ligamentū, quod lati in manu tendinis uices gerere, iam antea proditum est. ² Ab inferna itaque calcis ossis sede, & anteriori illius calcis tuberculi parte, quod terrae innititur, primus hic musculus^d principiū ducit, partim nerueum, & partim carneum, quod ilico ab exortu prorsus carnosum euadens, sensim dilatatur, multo latius, quā crassius redditum. Quum uerò mediam pedis longitudinem ad digitos repens^e superauit, in quatuor carnosas portiunculas dirimitur, quae inuicem ductae, & aequales constituentes angulos, singulae unum producunt tendinem, ad sibi prepositum digitum excurrentem. Tendo iste similiter ac in manu, ad primi internodij radicem transuerso ligamento excipitur, quouique longa sectione diuisus, & subiecto sibi tendini^f uiam praebens, in secundi internodij radicem implantetur, & toti ossis sui longitudini latescens innascatur. Huius musculi beneficiū, secundum quatuor digitorum flectimus articulum, eum quā possumus proximē ad calcem recta linea protrahentes. ³ Secundus uerò & ⁴ tertius digitorum musculi, tertij quatuor digitorum & secundi pollicis articuli flexus opifices sunt. Atque hi non in pedis planta reponuntur, sed in tibiae posteriori sede locati, totam illius longitudinem perreptant. Sunt porro hi, quos^g quarto pedem mouentium musculo, qui suram constituentium maximus est, proximē subterni, & quinto pedis musculo incumbere diximus. Vt uerò eandem cum quinto pedis musculo sedem occupant, ita quoq; illi forma admodum similes sunt, latiores enim quā spissiores uisuntur, deinde de toti carni in tibiae regione existunt: & quum ad calcem usque descendere, ab interno tantum^h latere non admodum prius arctati, teretem promunt tendinem, peculiari sinu & transuerso ligamento, inter tibiae & calcem, inferiora pedis subeuntem. Eorum itaqueⁱ prior, qui digitos mouentium secundus censetur, à posteriori sede connexus fibulae ad tibiae, enascitur, statim ab ortu carnosus, & latus utcunque, uersus tibiae extremum prorrepens. Toto hoc progressu, maximo suram efformante^j musculo contegitur: anteriori autem parte qua tibiae posteriorem sedem respicit, fibulae posteriori^k parti attenditur, ipsi etiam aliquandiu adnatus: deinde qui ordine^l tertius futurus est, externo suo latere ipsi secundo hic quoque subijcitur. Illico uerò atq; secundus ad infimam tibiae sedem descendit, ab interno ipsius^m latere tendinem edit teretem, qui prius aliquandiu in carne pronasci uisus est. Huius tendinis nomine ad internum calcis latus, ubi talum excipit, ¹ sinus inculpitur, qui transuersoⁿ ligamento obductus, praesentis musculi tendinem tuissimē deducit. Postquam tendo ligamentum id superauit, pedis inferiora oblique subit, & inter^o illos qui quatuor digitos pollicis adducere dicuntur, & eos qui primum digitorum internodium flectunt, prorrepit, totus propemodum ad pollicem contendens. A praesenti enim tendine ad plantae ferē mediū^p portiuncula diffunditur, quae aliquot^q tendinibus eius quem tertium numerabo commiscetur, atque una cum illis tendinibus ad tertij indicis, & quasi ad medij quoq; digiti, articuli flexionem auxiliatur. Reliqua autem tendinis secundi digitos mouentium musculi portio (quae profectò ualidissima est) ad pollicem uti diximus oblique perfertur, atque secundum pollicis longitudinem transuerso ligamento exceptus, in secundi pollicis internodij longitudinem lata infertione^r implantatur, eius internodij flexionis autor. Tertius musculus, qui quinto pedē mouentiū infernitur, pari prorsus ratione cum secundo digitorum musculo in posteriori tibiae sede ex-
porrigitur ad internum magis latus, quā secundus, respiciens, longe enim^s magis tibiae ossi, quā fibulae innititur. Quum autem ad calcem ferē descendit, atque adhuc latus conspici-
tur, ab interno ipsius^t latere teretem promit tendinem, cui peculiarem^u sinum & transuersum ligamentum Natura fabrefecit, in medio duorum qui hic quoque habentur sinuum. Tertij itaque musculi tendo, hoc ductus sinu, teres adhuc pedis inferiora subit, secundi musculi^v tendini uersus plantae cutem magis subiectus, & cum illo x literae inaginem efformans. Secundi enim musculi tendo ab exterioribus introrsum oblique in anteriora fertur: tertij autem tendo quodammodo ab interioribus extrorsum contendit, ob idque in plantae medio cum secundi tendine decussatim constituitur. Tertij musculi tendo pedis plantam hoc modo subintrans, modicē^w dilatatur, ac in quatuor alios tendines digeritur, singuli ad unum quatuor digitorum excurrentes, illis que manus^x tendinibus respondentibus, qui tertium quatuor digitorum articulum inflectunt. Sub primi enim musculi tendinibus occultati,

Primus pedis
mouentium.

Secundus &
tertius.

digitorum radices subeunt, unā cum¹ primi musculi tendinibus tranſuerſo¹ ligamento, ut in manu quoque obducti. Vt uerò ad tertium uſq̃ internodium prorperent, primi musculi tendines ſeſſione per longum diuiſos permeant: & latiores redditū, tertij internodij longitudini implantantur. Cæterum tendini qui indicem adit, & interdum illi pariter qui medio exporrigitur, hoc priuatim obtingit, ut in plantæ medio¹ portiunculam ſecundi musculi tendinis ad pollicem proficiſcentis nanciſcantur, quæ cum illis digitorum tendinibus omnino coit, & permiscetur. Interdum uerò quantumuis accuratè ſingula obſerues, à ſecundi tendine nihil porrigi, ſed hunc totum in pollicem abſumi conſpicias. Atque ita ſanè tres digitorum primi musculi habent, quorum primus ſecundum quatuor digitorum fleſcit internodium. Reliqui autem duo, ultimi quinque digitorum internodij flexionis opifices ſunt.

*Lib. 3. de Vſu
per.*

*Lib. 2. de Ad-
mi. ſeſſio.*

Verum hinc non ambigo ſtudioſiſſimum quemque, qui accuratiſſimè Galeni loca iam pridem euoluit, atq̃ ſi rectè iplius ſenſa tenet, illū ſibi haud conformia dicere, & libros iplius hic quoq̃ uitiatos eſſe intelligit, auidè expectare, quamobrem à Galeno diſſentiam. Cui in præſentia aliud nihil additū eſſe uelim, in quā uerifiſſima me hætenus de pedis digitorum musculis in hominibus enarrauiſſe, & Galeni loca (ut iam audies) uix ſimijs conuenire. Vt itaque nunc præteream functionem, quam cum manus digitorum musculis communem eſſe cenſui, quum¹ ſecundus musculus ſecundi pollicis internodij flexus autor poneretur, nulla primi articuli, quod ad flexum attinet, facta mentione: quemadmodum¹ tertij musculi beneficio tertium reliquorum digitorum internodium moueri iam antea ſcripſi. Quum interim ex Galeni ſententia primos etiam articulos duobus poſterioribus musculis fleſci, dictum eſſe oportuerat. Arbitratur enim Galenus, eandem hinc atque in manu horum muscularum functionem eſſe. Imò exactè in ſecundo de Adminiſtrandis ſeſſionibus ſuum iplius pendens placitum, quo tranſuerſorum ligamentorum ope primos manus digitorum articulos fleſci innuerat: dixit ab illis qui tertio digitorum internodio inferuntur in pede, nō ſolum tertios primosq̃ articulos in flexionem duci, uerū primū, ſecundū & tertium internodiū iplorum ope fleſci, quod ſanè neceſſum eſſet, ſi modo tranſuerſi ligamenti uel tendines illa quibus tantū incūbunt, oſſa mouere donaremus. At ita non ſuffecerat adhuc illis¹ tendinibus, quos nos tertium internodiū fleſcere diximus, à Galeno inſigne illud fleſcendi munus aſcribi, quinetiam¹ primum muſculum, qui ſecūdis quatuor digitorum internodijs inferitur, prima quoq̃ internodia fleſcere, orationi addendum uenerat, quum & illius musculi tendines eodem cum alijs tendinibus in primo digito

*Primus 3.
3. musculi
quo modo in ſi-
mijs ſe habeat.*

rum oſſe ligamēto obuelentur. Cæterum functione poſtpoſita, qualiter in caudatis ſimijs præſentes musculi habeant enarrare nō grauabor, haud interim immemor Galeni loci, quo tendines nō eodem ſemper modo permiſceri tradidit, ne fortè quis me iplius dogmata nimis perfunctoriè arbitretur expendere. Simiæ igitur primū muſculū, quo ſecunda digitorū fleſcuntur internodia, cū hominibus cōmunem habent: at tanto longioribus donatū tendinibus, quāto interuallo ſimiæ pes hominū pedē unā cū digitis in longitudine pro proportionē ſuperat. Secundus quoq̃ & tertius in tibia eodē modo ſimijs atq̃ hominibus collocantur, quū tamē tendinē educūt, nō ex altero latere illū promūt, ſed cæterorū muscularū modo coarctati illū emittunt, quod etiā in ſimiarū quinto pedē mouentiū musculo uſu uenit. Deinde tendines quoq̃ pedis plantā ut in hominib. ſubeunt, & ubi x. literæ inſtar in ſeſſione moliuntur, ſecundi musculi tendini tertij musculi proſus permiſcet, atq̃ ex ambobus unus quodāmodo conſurgit tendō, à quo tranſuerſim portiuncula ad pollicē fertur, illi proſus ſimilis quā in caudatarū ſimiarū manu à tendine indicē accedente, in uolæ medio ad pollicē ferri retulimus. Reliqua uerò huius permixtionis pars in quatuor tendines diuiditur, eam portionē quæ pollicis exporrigi mole uincētes, hi ut in homine ſub primi musculi tendinibus deducti, tandē latiores redditū tertio internodio inferūtur.

*Musculi pri-
mos articulos
fleſcentes, verū
tum musculi
in numero ſuc-
cedentes, ac de-
cem nobis enu-
merat.*

Musculi primos digitorum pedis articulos fleſcentes, in homine illis ſerè reſpondent, qui in extrema manu inter poſtbrachialis oſſa conduntur, uerū in pede ita exactè ac in manu diſtingui nequeunt. Rudis enim indigeſtaq̃ moles in planta conſpicitur, quæ ad amuſſim carne eſt, & fibris rectis interſtinctā, deinde ſecundū pedij longitudinem ducta, & illius quoque interualla opplens, in quinque digitorum radicem implantatur, utrinque ad primi internodij latus uerſus interiora inſertionem tentans. Hanc ſanè carneam molem ex ſententia in muſculos proprios, quemadmodum in manu ſubdiuidere nequeo, quantumuis etiam ſibi implicatas quaſdam inſcriptiones commonſtret. Vt cunq̃ ſit, hæc non minus quā in manu ualida eſt, & primorum articularum flexionem perficit, quam primus pollicis articulus parē cum primis quatuor reliquorū digitorū flexione adipiſcitur. Vnde etiā carneæ illius molis¹ pars ad pollicem porrecta illis reſponder paribus, quæ cæteros digitos adeunt. Integrū itaq̃ erit propter obſcuras impreſſiones, & quandā cum manus muſculis imaginem, &

Quatuor mu-
sculi, & q. 1. 15
quatuor polli-
ces adhaerentes,
scilicet 19, 20, 21, 22.

nes desituuntur. Quare etiam post decimum octauum in homine^o quatuor tantum adhuc fu-
per sunt musculi, quatuor digitos in internum latus ducentes. qui similiter atque in manu, illis
tendinibus exporriguntur, qui tertium digitorum flectunt internodium. Quamuis in hoc pe-
dis musculi à manus uariant, quòd illi non à tendinum inuolueris horum modo, sed à calcis osse
exoriantur. A ligamentis nanque ossa tarsi posterioribus pedis ossibus in planta colligantibus
musculorum corpus nascitur, quod in quatuor postea graciles diductum musculos, interno
quoque lateri quatuor digitorum inseritur. Si itaque carneam hanc molem quatuor musculorum
loco habueris, omnes pedis digitorum in homine musculi, duo erunt & uiginti. Si uero unius
loco id corpus numeraueris, tantum erunt decem & nouem. Rursus prout id^o corpus, quod
pollicem & tres ipsi proximos digitos in externum latus ducere dixi, in plures dissectueris, nu-
merum quoque augebis.

DE LIGAMENTIS ILIUM OSSA SACRO

colligantibus, & coxendicis ac genu articuli, de quibus reliquis omnibus quae in
tibia & pede habentur ligamentis. Caput LXI.

Ligamenta
sacri ossis cum
ipsis adnexis.



Membrana
pubis ossis fo-
ramen occu-
pans.
Femoris ad
coxendicis os.

LIGAMENTVM ilium os sacri ossis lateri colligans, robustum est, & mem-
braneum, uniuersam commissuram ambiens. Portio tamen ipsius in me-
dio, ubi inuicem ossa committuntur, sese inserit, ac ita ualida crassaque effi-
citur, ut cartilaginei ligamenti naturam prorsus repraesentet, cuius bene-
ficio, & demum cartilaginis quoque interuentu, ilium os sacro ualidissime
nectitur. Quemadmodum igitur cartilaginis intercessu, & ligamento or-
biculatum commissuram ambiente, pubis ossa inuicem connectuntur, ita
quoque ilium os sacro coarctatur. Praeter haec sacri ossis ligamenta^a aliud ex latere connexus quin-
ti ossis sacri cum sexto quodammodo teres nascitur, atque in acutum processum coxendicis os-
sis inseritur. Quin etiam ab eodem sacri ossis latere, in ossis coxendicis appendicem, aliud^b li-
gamentum nascitur, quod unà cum praedicto ossa haec firmiter connectit, & praeterea recti in-
testini, & musculorum ipsius fulcrum existit. Postremo in pubis ossis foramine^c membrana ui-
situr, illi omnino similis, quae secundum cubiti longitudinem radium ulnae colligat. Substan-
tia enim huic ad amissum respondet, & fibris constat deorsum in latus oblique procurenti-
bus. Ligamenta femur coxendicis ossi adnecentia, duo magis praecipua censentur, unum^e
orbiculatum articulum amplectens, cuiusmodi etiam alijs articulis est commune. Caeterum ne
aliquando femoris caput luxaretur, quoties uarijs motibus femur magnam corporis molem
sustentans mouetur, ligamen hoc quod diximus, crassissimum robustissimumque euasit, nulli li-
gamento ex his quae articulos circundant, crassitie secundum. Et tanti momenti ususque id liga-
mentum Graeci esse putarunt, ut etiam totius articuli nomine illud ἰχίον appellare non dubita-
uerint. Quin etiam huic ligamento articulum ambiente, non solum priuata crassities duritiesque
accescit, uerum hoc peculiariter sibi uendicat, quod neque capitis femoris, neque acetabuli ossis cox-
endicis supercilio inseritur, aut ab illis prodit: totam enim femoris ceruicem ambit, illi nusquam
quam ad magni femoris processus radicem orbiculatum circumnatum, reliquae autem parti tantum
citra omnem connexum incutit. deinde acetabuli supercilio non adnascitur, sed paulo supra su-
percilij radicem ossi coxendicis. Atque hic prouidet Natura ab aliorum articulos ambientium liga-
mentorum fabrica reclinauit, nam si aliorum ligamentorum ritu supercilijs connatum fuisset, ne utiquam
oblongum femoris caput apte moueri permisisset. Quod sane ad amissum spectabis, quum in-
ter secandum femora inuicem adducere, & rursus abducere conaberis. Mirum enim dictum est,
quam femoris caput antroorsum extra sinum fertur, dum alterius pedis calcem, ueluti perpendi-
culi lineam, medio interioris lateris alterius pedis adhibemus: quod in illo pedum situ fieri cer-
nimus, quum in choreis notam, quam bis simplicem uocant, hocque signo, //, indicant, erecti sin-
gimus. Ad haec, praeter quam quod coxendicis ossis sinus admodum cauatus est, aliud adhuc
ligamentum orbiculatum sinus supercilio adnascitur, quod sinum adauget, & eorum ligamen-
torum naturae participat, quae cartilagineae sunt. Verum id cauitatem non solum auget, sed etiam
in causa est, cur minus ossis supercilius in uehementibus femoris motibus, quum fragile sit,
abruptatur: sua enim duritie ligamentum impetui resistit, & sua mollitie cedens, eundem exol-
uit. Porro^f aliud coxendicis articulo peculiare ligamentum teres est, & adeo durum, ut cartila-
gineus neruus merito ab alijs appellatus fuerit. Hoc ex medio capitis femoris enatum, non in
acetabuli centrum inseritur, at in humilissimam ipsius sedem, ubi adeps, non autem cartilago, si-
nui oblinitur. Haud secus quam si Natura ad superiora primas femoris luxationes futuras me-
tuisset,

o 14. 14. 15.
15. 15. 15. 15.
p 14. 14. 15.
dein v.

q 6 tab. 15.

Per pauca li-
gamenta de
lineamentis
et qui mem-
branae fini-
ab ossibus po-
tissimum car-
cumscriptis
onibus pe-
tenda et con-
fingenda ue-
nient.
a 13 tab. 15.
b 10 tab. 15.
c 14 tab. 15.
d 7 tab. 15 in
ter S. T.

e f. ca. 15.
P.

tuiſſet, quum corporis trünicus tot oneribus grauat⁹, femoris capitū tum præcipue innititur, quum baiulos tot ſæpe centenis libris oriuflos incedere, atq; ita uiciſſim uno pedi inſiſtere animaduertimus. ^h In genu uerò articulo, præter commune ligamentum omnibus obductum

*Ligamēta gē
nū articuli.*

articulis, alia quædam ualida robuſtaq; rerum Opifex fabrefecit. quando enim quinque ſunt genu articuli regiones, anterior, interior, exterior, & media, ſingulis peculiare quippiam Naturæ præpoſuit. Anteriori quidem, quæ membranæo ligamento proſus deſtituitur,

& tamen regio admodum fallax, & ſummopere laboratura eſt, ⁱ mola patellæ uel ſimul cum illani continentibus tendinibus prætenditur: quæ quum abunde articulum ſtingat, nullo hñc opus erat ligamento, neq; etiam (ut dixi) membranæo, omnes articulos ambiente. Poſteriori ſi-

militer laboraturæ, robuſtum neruoſumq; ligamentum præponitur, quod ex media poſteriori tibiæ regione originem capiens, rectâ ſurſum fertur, & biſidum ^k utrorumq; femoris capitū poſteriori ſedi, qua maxime illa dehiſcunt, implantatur. Cæterum mediæ regioni duabus nup-

per dictis digniori maioriq; egenti firmamēto, Natura ualidiſſimum & cartilagineum largitur ligamentū, quod ex tota prominētiōri inter duos tibiæ ſinus ^l parte enatum, femoris poſteriori parti, qua ipſius capita maxime inuicem diſtant, cum paulò antè dicto inferitur. Verum præter hoc ligamentum interdū adhuc mucoſum quoddam & gracile reperias, in medio genu articulo locatum, in anteriori nuper dicti regione: quod ſimiliter à tibia in femur pronatſcit. Exte-

riori regioni iniurijs magis quàm interior parenti, teres quoq; obductum eſt ligamen- ^m femoris & fibulæ tibiæq; os inuicem colligans. Huius ligamenti humilius extremum, capiti ⁿ muſculi ſubſternitur, cuius tendinem ad poſteriora inferioris fibulæ appendicis perreptatē, ad pedij os pollicis præpoſitum protendi relatum eſt. Porro interior genu regio, quæ cæteris omnibus

& minus erat motibus famulatura, & ijs quæ cruri lædendo occurrant minus obuiatur, ligamen nancifcitur, iam dicto tum gracilius, tum mollius. Quod etſi ex interiori femoris latere enaſcitur, in tibiæ tamen latus non inferatur, ſed uelut ad aliud exterius in tibiæ priora maiori ſua portione contendit. Cæterum præter hæc omnia, peculiaris huic articulo, quemadmodū ſupe-

riori libro ſcripſi, ^o cartilago inſicitur, quæ duritiā exquiſitè cartilagini nonnihil cedit, atq; cum ligamento quippiam cōmune exigit. Quantum uerò ad articuli genu ſecuritatem ea cartilago ualeat, illic quoq; diximus. nunc autem in exteriori ipſius circumſerētia, qua quodammodo ex articulo eminet membranæis ligamentis ex ipſa prodeūtib⁹, femori & tibiæ colligari, additum eſſe uoluimus. ^p Ligamen fibulam tibiæ iuxta genu articulum colligans, forte quidem eſt, ſed

*Liga. fibulæ
tibiæ offi com-
mittentia.*

ut in aliorum offium commiſſuris, ab exteriori tantum parte offium connexum circūdat. Quæ uerò tibia fibulæq; inuicem dehiſcunt, per totam offium longitudinem ^q ligamentum membra-

neum habetur, illi par ^r quod in cubito reſpoſitum eſſe cōmemorauimus. atq; id à tibiæ offe in fibulam porrigitur, fibris intertextum à tibiæ offe deorſum obliquè in fibulam excurrentibus. Quemadmodum uerò conformatione hoc tibiæ ligamentum cubiti ligamento reſpondet, ita etiam parem cum illo uſum præſtat. fibulam enim tibiæ alligat, & interſtitiij ritu anteriores tibiam occupantes muſculos à poſterioribus dirimit, illiſq; qui ipſi adnaſcuntur, exortus robur porri-

*Pedis ligamē
ta tranſuerſa.*

git. Pedis ligamentorū nonnulla prius expoſita ſunt, ^s tranſuerſa nimirum, quæ tendinibus obducuntur: quorū quædā ad offium cōmiſſuram ſimul faciunt, alia uerò duntaxat munimen- ta quædā tendinū, & ne illi ſuis ſinibus exurgant, uincula exiſtunt. Sunt uerò tranſuerſa pedis

ligamenta, ſi obiter conſiderētur, tria. ^t Primū in anteriori tibiæ ſede ad ipſius cum pede articulum conſiſtit, atq; ad tibiæ os & fibulam refertur: hoc enim offa connectit, & plurimos tendi- nes tranſmittit. Iſtud utcuq; perpendas, unū ſimpliciter eſt. ^u Secundum ab interno malleolo in calcis os inferitur, atq; offium quoque alligationi auxiliatur. ſi uerò exactè diuidatur, tres anu-

los, & ueluti tria ligamenta efformare uiſitur, quæ priuatim ad ſuos quoſque ſpectant ^v ſinus, trium tendinum nomine, ut & ipſi tres ſunt, exſculptos. quorū calci proximus ^w muſculi tendinem admittit, qui pollicis ſecundum fleſcit internodium. Sinus huic accūbens, ſecundusq;

tendini uiam præbet, tertius quatuor digitorum articulos fleſcenti. Tertius uerò ſinus unā cum ligamento in poſteriori interioris malleoli ſede reſpoſitus, à Natura illi tendini præparatus eſt, quem ^x muſculus efformat, inter pedis motores quintus. ^y Tertium porro tranſuerſum

pedis ligamentum à fibula in calcem fertur, atq; ad offium ita colligationem iuuat: qua autem duobus ſinibus obducitur (quum illi ſinus duobus offibus ſimul non ſint communes) tantum tendinibus famulatur, ^z ſeptimi & octauī muſculorum pedem mouentium. Ad hæc, in infer-

na pedis digitorum regione tranſuerſa ligamenta perinde conſiſtunt, ac in manu. Verum præter tranſuerſa ligamenta, quæ etiam prius expreſſimus, in pede alia permulta habentur. Pri-

imum ex tibiæ offe in fibulam procedens, inferius tibiæ offi fibulam colligat, membranæum ſi-

militer ac aliorum articularū ligamenta exiſtens. Deinde & aliud quoq; reliquis articularum

*Alia pedis li-
gamenta offa
inter ſe cōm-
mittentia.*

ligamentis respondet, quod uniuersum articulum tibiae cum talo amplectitur. Post hæc quatuor sunt ligamenta cartilaginosa, ex quibus nonnulla in alto conduntur, alia exterius ossa ambiunt, quæ simul omnia talum quatuor quibus firmatur ossibus connectunt. Primum externis tali partibus, quibus interno malleolo excipitur, originem obtinet, & in tibiae ossis partem, quæ talum respicit, innascitur, id os talo colligans. Secundum exterius est, interioris respondet, fibulam talo neciens. Tertium cæteris robustius, & admodum insigniter cartilagineum, ab inferiori tali sede propter ipsius ceruicis radicem, nimirum quæ calci is committitur, principium ducit, & calci inter duas quibus talo coarticulatur, commissuras innascitur. Quartum tali caput ossi nauiformi connectit. Ex tali enim ceruicis termino originem ducens, iam dicto ossi inseritur, uniuersum quæ ambit articulum. Verum præter cartilaginea hæc, membraneum aliud ligamentum omni ex parte calcis cum talo obducitur articulo, & ualidum quoque aliud à tali ceruice in tesseram imitans os implantatur. Porro ligamen calcis os huic tesseræ simili ossi committens, robustum quoque est, & cartilagineum, sed duntaxat articulum amplectitur. Quemadmodum uero in manu brachialis ossa inuicem durissimis cartilagineisq; ligamentis colligantur, ita quoque tarsi ossatum inuicem committuntur, tum etiam ossi cymbam imitanti adnectuntur. Validissimum autem & peculiare uinculum in inferiori parte tarsi ossa obtinent, quod non solum extrema uincit, imò penitus singulis insertum, ossium quoque media inuicem constringit. Pedij autem & digitorum ligamenta manus ligamentis correspondent. Sunt enim omnia membranea, his tantum exceptis quæ superiori pedij ossis interuallorum parti immittuntur, illa siquidem cartilaginea sunt, & in profundo articuli genu repositi ligamenti naturam referunt.

Hæc nulli
bi p. 17. 15
proprie
nus, sed ex
ossium dela
ncatouidi
pellino, e
figuris j. ill
cet ca. 31. et
33 lib. 1.

d. f. ca. X.

MUSCULORVM IN TIBIA ET PEDE SE-

dem obtinentium, & ligamentorum omnium quæ hactenus non rescripta sunt,
administrandi ratio, musculorumq; qui tibiam & pedem occu-
pant, numerus. Caput LXII.

Quot musculi
in posteriori
tibia sede con-
sistunt.



Quot in ante-
riori tibia se-
de.

Quot in pede.

Administrandi
vniuersæ series.

In modò omnes musculos pedis ac digitorum motibus famulantes memoræ confirmandæ causâ in suis sedibus ordine recensere, in posteriori tibia sede, primum duo occurrunt, à radice inferiorum femoris capitū ducentes originem, & suræ non mediocrem portionem efformantes, post hos sese exhibet qui totius corporis longissimum promit tendinē. Sub hoc suræ maximus, seu pedem mouentium quartus consistit, in calcem ualidissimè cum nuper commemoratis insertus. Huic succumbit qui pollicis secundum internodium flectit, deinde qui quatuor digitorum tertij internodij flexionis præcipuus autor est, omnium autem intimus habetur, qui pedem in posteriora ducens, uni ex tarsi ossibus implantatur: ad eò ut iam omnes posterioris tibiae sedis musculi septenarium constituant numerum, præter musculum in poplite latitantem. Si enim & illum posterioribus tibiam amplexatibus musculis adnumerare uisum fuerit, octo tunc in posteriori tibia sede constitues. In anteriori tibia sede unâ cum illis, qui propriè externum ipsius latus occupant, sex numero descripsimus. Primus quidem, qui pedij ossi pollicē sustinenti inseritur. Secundus, qui quatuor digitos extendit, atq; huius portio, quæ in pedij os minimo prælocatum digito inseritur, tertius erit. Aut si hanc portionē à secundo non distinxeris, iam duo duntaxat hactenus tibi in anteriori tibia sede habentur. At age, tres esse dona, ac quartū enumera, cuius ope pollex extenditur. Quintus uero, qui fibulæ exporrectus, pedisq; inferiora subiens, in os pedij pollicē sustentans inseritur. Sextū autē, qui iam dicto succubens, pedij ossi ante minimū collocato implantatur. In inferiori pedis sede ligamentū primū sese offert, lati tendinis uicē gerens: postmodū musculus secundum quatuor digitorū os flectens, deinde utrinq; ad huius latera unus, hic quidem pollicē introrsum ducens in latus, ille uero minimum extrorsum abducens, post hos in conspectum ueniunt tendines, tertia quatuor digitorū internodia flectentes: quibus exporriguntur quatuor illi musculi, quatuor digitos pollicis ad mouentes: omnium autē intimi illi consistunt, qui primos digitorū articulos flectunt. In superiori autē pedis sede illud duntaxat musculosum corpus reponitur, quod pollicē & tres illi proximos digitos in latus externū abducit. Ceterum hæc musculorū series, etiam sectionis rationē cōmonstrat, quam in eo crure conspiciaberis, in quo iam antè ubi mouentes musculos rescuisti. Per suræ itaq; longitu dinē sectio in cute & adipe & carnosa mēbrana ad calcem usq; ducetur, deinde alia ab interno pollicis latere ad calcē usq; & hinc per pedis exteriora ad paruū usq; digiti tentabitur, ad eò ut uniuers-

a 12 tab. 9.
r.
b 13 tab. 4.
c 13 tab. 7.
d 14. ta. A.
e 14. tab. 2.
f 15 tab. D.
E.
g 14. tab. 8.
h 2 ta. 2.
i 3 tab. 7.
h 4 tab. 7.
l 4 tab. 2.
m 5 ta. 9.
n 6 ta. 9.
o 6 tab. 7.
p 13 tab. 7.
q 14. ta. 9.
r 13 ta. 7.
s 14. ta. 7.
t 14. ta. 7.
u 15 ta. 7.
u 15 ta. 7.
x 6 tab. 2.

uniuersam tibiæ & pedis cutem auferre possis, ea tantum relicta quæ plantam induit. Quum primum igitur laniorum more hoc præstiteris, acutiori nouacula à calce cutem adimes, per adipem transuerfis semper ductis sectionibus. In quo opere attento animo curis connexus spectandus uenit, qui ad lucescentem perficitur^r sedem musculi secundum quatuor digitorum os flectentis, num scilicet tendo aliquis citra adipis interuentum cuti proximè adnascatur: ac deinde quum nullus erit tendo, cuiusmodi ligamentum id censere debeas, quod ego nunc primus lati tendinis in manu uices gerere dixi. Vbi hæc (adhibita sectioni quoque simia, aut si eius copia non detur, cane) hæc in pedis planta eo diligentius, quo ego hic tibi plura recensuerim paradoxa, intuitus fueris, ad tibiam te conferes, ligamento illo à musculo qui secundos quatuor digitorum articulos flectit, nondum derafo. Atq; hic omnium primum spectabis, qui ex tota excarni tibiæ ossis^r sede membraneum ualidumq; ligamentum prodit, quod pertinaciter omnibus in tibia repositis musculis obnascitur, & eorum summæ superficies unà connectit, & ueluti iunculi ulum præstat, cuius beneficio musculi in sua sede non errantes, continentur.

Mox nouacula, aut cultello à femoris inferioribus capitibus^r, duorum musculorum principia liberabis, quos primos in posteriori tibiæ sede dicebam occurrere. In horum capitum dissectione aliud nihil cauendum est, quàm ne cum externo musculo, tertij^h musculi caput ab externo femoris capite unà imprudens adimas. Illud enim capitulum opportunissime seruatur, donec primos duos à quarto eo usque diuulseris, ut iam amplius communem illorum tendinem à quarto^r dissecare non ualeas. Reflexis itaque his duobus, tertij quoque caput liberabis: quod in manu sinistra assumens, à quarto^r musculo deorsum uelles: atque id citra negotium tantisper feceris, dum ad quarti musculi internum latus peruenias. hic enim cultello acutiori à subditis ad calcem usque est dissecandus. Dein ipsius insertio tanto accuratius est animaduertenda, quanto hæc in hominibus à simijs magis uariat. Hoc itaq; à calcis osse liberato, pedem mouentium quartum, & totius suræ maximum musculum suo exortu libera, & utrinque ad ipsius latus, quæ subditis incumbit corporibus, longam sectionem ducito, quæ membraneum id ligamentum inuolucrum ue diuidat, cuius auxilio musculos inuicem externa superficie connecti diximus. Siquidem ilico atque musculum suis lateribus & capite liberaueris, promptissimum erit illum à subditis ad calcem usque detrahere. Vt uero accuratius insertionem spectes, profuerit illum proximè ab osse acutiori nouacula separare, & dein studiose expendere, num fortassis aliqua tendinis huius portio latum in pede produceret tendinem, nam & id quoque semel Galenus uidetur innuere. Tempestiuum itaque erit, à^r musculo quatuor digitorum secundum internodium flectente, ligamentum illud abraderé, quod ego tendinis lati uicem gerere protuli. Deinde sedulo à calcis osse, musculus ille liberabitur, qui paruum digitum in externum latus abducit, & statim ille^h qui pollicem in internum latus à cæteris digitis amouet, ut^r musculus quatuor digitorum secundum articulum flectens sese offerat, isq; à calcis osse liberari queat, ac postmodum ad digitorum radices duci. In tendinum uero ipsius administratione, parè modo ut in manu fieri præcepimus, cultello exiguo transuersum digitorum ligamentum secundum ipsius longitudinem diuides, ac deinde qualiter subditos tendines transmittant, atque in secundos articulos inferantur, spectabis, sectionem rursus ad tibiæ posteriora conferens. Iam enim in poplite latitans^k musculus adeo pulchrè occurrit, ut ipsius naturam non minus atque ego illam describere possim, intueri ualeas, & non oscitanter animaduertere integrum sit, num uel minimum tibiæ flexioni opitulari queat. Hæc intuitus, illum à genu articulo liberabis: & nisi articulum ad ligamentorum inspectionem seruare propositum sit, nihil prohibet à tibia femur liberare, quo comodius tibiam & pedem postmodum pertractes. Absceto igitur, aut relicto ut lubet femore, musculum secundum pollicis flectens internodiu, suo principio liberatum à subditis ad calcem usq; detrahes. Deinde & illum quoq; similiter auelles, qui tertium quatuor digitorum os flectit. Vt iam utroq; ad suos sinus deducto, transuersa ipsorum ligamenta, longa sectione diuidere, ac postmodum ipsorum x literæ instar in cubitum examinare liceat. Ille enim è uestigio obuius est, qui ex suis sinibus detractos tendines à pedis plâta deorsum reflectis: neq; ita duntaxat incubitus ille cõspicitur, imò etiamⁿ portiuicula se offert à musculi pollicem flectentis tendine, illi admixta tendini, qui tertium indicis internodiu flexurus est. Quinetiã hac administratione occurrunt^o musculi quatuor digitos pollicis adducentes, quos à calcis osse liberatos atq; ad insertionem perductos, unà cum tendinibus quibus illi porriguntur, adinere conuenit, ut^r carnea moles primos digitorum articulos flectens inspiciatur, quam ex tuo arbitratu, aut prorsus à pedij ossibus abrades, aut illis connexa fines. Iam^u musculus, qui adhuc in posteriori tibiæ sede reliquus est, quiq; pedis moribus famulatur, à fibula & tibiæ osse, & horum membraneo ligamento ad posteriorem usq; interni malleoli sedem liberabi-

*Ligamenti la-
tescentis tendi-
nis uicem sube-
antis.*

*Primi & se-
cundi mouen-
tium.*

Tertij.

Quarti.

*Lib. 2. de Ad-
mini. sectio.
Primi digitos
mouentium.
Decimus septi-
mi.
Decimioctauus.*

*Musculi in
poplite latitan-
tis.*

*Secundi & ter-
tij digitos mou-
entium.*

*Musculorum
tres digitos
pollicis adducen-
tium, & pri-
ma quinq; digi-
torum ossa fle-
centium.*

*Quinti pedem
mouentium.*

tur, ac peculiari ipsius transuerso ligamētō longa sectione diuiso, ad insertionem usq; musculus ille ducetur. Ceterum iam opportunum est, & anteriores tibie musculos aggredi, atque hic omnium primum transuersum^r ligamentum sectione per longum facta diuidere conuenit. In quo opere magna tendinum congeries sese exhibebit, quorum (ut singulos ordine intuearis) primum tendinem attolles, pedem mouentium^r sexti. Huius musculi caput aliorum musculorum modo, ab exortu liberatum, ad insertionem usque ducendum est, quod mediocri sit negotio, si utrinque musculi latera ab ipsi connatis cultello aut nouacula diuideris. Post hunc totus sese ostendit quatuor digitos extendens^r musculus, unā cum portione illa, quam nonum pedem mouentium^r recensui. Vbi hic à tibia liberatus ad insertionem ductus erit, is aggredietur^r qui pollicem extendit, quem similiter à tibia liberatum ad insertionem ducere expedit. Superfunt in tibia^r duo pedis motibus famulantes musculi, qui fibulæ exporriguntur. Horum sectio à^r ligamenti transuersi inter calcem & fibulam positi dissectione inchoabitur, & deinde tendinibus eleuatis, uniuersum musculorum corpus à fibula dirimetur, ut postmodum ipsorum insertionem liquidò uideas, ac demum^r musculos, qui superiorem pedis distem occupant, suis principijs liberatos ad insertionem perducas, atque ita uniuersæ musculorum fabricæ unā nunc mecum summam manum imponas, ac ligamentorum quæ adhuc reliqua sunt naturam spectes. Atq; horum omnium administratio proprium nihil, aut peculiare exigit. Si enim iam ligamenta ex latere ossis sacri, ubi quintum os sexto committitur, prodeuntia inspexeris, unā cum^r membrana pubis ossis foramen occupante, integrum erit ilium os à sacro, impetu abruptum, & commissuram ambiens ligamen simul cum cartilagineis ligamentis intueri. Mox ad coxendicis articulum accedens, orbiculatim illum ambiens^r ligamentum acutiori cultello transuerim diuidito, atque eius crassitiem, sed præcipue ortum & insertionem, inspicito. Si modo femur in exteriora modice duxeris, ex acetabulo ipsius caput elabetur, & teres^r ligamentum se spectandum exhibebit. Hoc transuersim dissecto, acetabulum accuratè obseruandum uenit, propter iam commemorati ligamenti insertionem, & id ligamentum quod sinum augere diximus. Priusquam uerò genu^r ligamenta administrantur, opportunum est perpendere, anteriori articuli sedi præter^r patellam, cum extendentibus tibiam tendinibus nullum ligamentum præponi. Id enim ubi constabit, exterius ligamentum à femoris capite liberatum ad fibulam deduces. Post hoc internum quoque à femoris interno capite liberatum, similiter uersus anteriora tibie distemabis. Posterioris uerò regionis ligamentum opportunè à tibia distematum, ad ipsius in femur insertionem perduces. Diuiso postmodum ambiente articulum ligamento, in latus tibiam postmodum reflecte, ac cartilagineum huius articuli ligamentum ad amissim expendito, & cartilagineis tibie ossis sinum augentes, ab articulo acutiori cultello adimito. Ligamenti, quod tibie fibulam alligat, natura, si ad commissuram id diuidatur, citra negotium conspicitur. Membrana quoque isthæc ossa, quæ inuicem distant, intercedens, sese iam citra ullam sectionem offert. Transuersa omnia modo dissecta sunt, atque iccirco superest duntaxat fibulam à tibia dirumpere, & ligamen ambo ossa colligans inquirere: dein acutiori cultello fibulam à talo, & postmodum à tibie osse talum liberare, ita enim duo sese offerunt tali ligamenta, cartilaginis specie donata. Duo autem reliqua disces, si cultello talum ab osse cymbam imitante diuideris, & à calce talum abraferis: quod difficulter, idq; nisi acuto cultello perfeceris. Ad hunc modum reliqua pedis ligamenta aggredieris, nempe ipsis secundum ossium commissuras circumsectis. Quam uerò concinnè hæc omnia à Natura sint formata, ex cuiusque ossis usu, & generali ligamentorum facultate, cuius notum esse arbitror. Quapropter neque hic, neque alias sæpius ad summi rerum Opificis encomia digressus sum, ne eadem semper aut de musculis aut ligamentis repetenti, in nimiam molem hæc excrescerent. Præcipue quum nihil facilius sit, quàm prolixè in usus enarrationem excurrere, si modo actio à me semper descripta non lateat.

ANDREAE VESALII ²⁵⁷

BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPORIS
FABRICA LIBER TERTIUS, QVO VENARVM ARTERIA-
rumq; per uniuersum corpus series describitur, & peculiares ipsi
figuræ, quibus cōueniunt Capitibus præponuntur.

QVID VENA, ET QVÆ IPSIVS SVB-

stantia & usus. Caput I.



ostendit
ss 6, 7 li
arum fi-
gura.

figura 5
figura 6
ca.

SSIVM musculorumq; historia superioribus libris
enarrata, proximum uidetur, uenarum arteriarumq;
per uniuersum corpus distributionē aggredi: siqui-
dem Galenus in primo de Administrandis sectioni-
bus libro, hunc in Anatome discenda ordinē obser-
uandum rectē præceperit. Nam alius fortasse earum
partium, quæ peritonæo & costas succingente mem-
brana & caluaria cōtinentur, descriptionem, non ue-
narum modò ac arteriarum, uerùm & neruorū quo-
que descriptionem oportere necessariò præcedere,
haud inepte arbitrat, quòd absq; earum partium
notitia, omnis de uenis, arterijs & neruis sermo tam
difficilis futurus sit, ut ego nequaquā improbaerim
hunc librum, & quartū qui neruis dedicabitur, quin

Quid tertio li-
bro docendū.

to libro, sexto ac septimo subijci, eosq; præsentem anteire, atq; id maxime, cum quis sectionum
prorsus rudis in istos libros primū incidit, & nō in nostra Epitome uel obiter sese exerce-
rit. Ne tamen longius in præsentia à Galeni & cæterorum qui ipsū præcessere dissectionis
professorum placito declinem, hunc librum uenis arterijsq; consecrabo, à uenis, quòd plures
sint, atque arterijs magna ex parte insternantur, sumpto sermonis exordio, liberaq; sententia

Quid uena.

lectori in nostris libris transponendis relicta. Vena igitur pars est instrumentaria, teres, fistu-
læq; instar cauata, & uniuerso corpori sanguinem partes enutriturum unā cum naturali spiritu
insigniter (si quis modò sit) caliginoso deferens. Hæc unica peculiari propria ue cōstat tunica,
quæ colore, crassitie & forma, membranis respondet, sed aliā ab illarum natura plurimū di-
scernat. Membrana nanque simplex ac simulare corpus censetur, & omni ex parte quomodo.

Vene corpus
in quo à mem-
brana disse-
rat.


cunque discerpatur, perpetuò membranæ nomen retinet. Venæ autem tunica, corpus est in-
strumentarium, ex similibus partibus, fibris uidelicet, cōformatum. Quemadmodum enim
membranæ musculorum tendines, ferè unico fibrarum genere intextuntur, atque hac occasio-
ne non in similibus, sed in instrumentariarum partium classē reponuntur, ita uenæ tunica
triplici fibrarum genere constituitur. Huiusmodi fibræ Græcis *ινδο* nuncupantur, & substan-
tia quidem, forma, & colore musculorum fibris respōdent, actione autem plurimū ab illis ua-
riant. Hæ enim carne musculorum substantia obsitæ, arbitrario: illæ uerò nulla carne impli-
cite, naturali motui præficiuntur, quippe ut motus è nostro arbitratu pendentes, fibrarum in
musculis auxilio perficimus, sic naturales motus uniuerso corpori subseruientes, fibris quibus-
dam obeunt, quæ organis toti corpori famulantibus intertextæ sunt. Quanquam naturales
motus non omnes, sed materiæ duntaxat alicuius attractio, retentio & expulsio, huiusmodi fi-
bris adimpleatur. Voco autem in præsentiarum uim attractricem, retentricem & expultricem,
non quæ singulis partibus ad sui nutritionem à Natura est ingenita, sed qua quædam corpo-
ris partes commune uniuerso corpori munus præstant. Etenim prorsus alia censetur attractio
cibi per stomachū in uentriculum, & sanguinis è caua uena in dextrum cordis sinum, & aëris
ex arteria uenali in sinistrū cordis sinum, & seminis in uterum, & sanguinis in uenas, & spiritus
in arterias, quàm attractio, cuius beneficio partes illæ nutrimentum sibi familiare, & quo pri-
uatim aluntur, ad sese pelliciūt. Rursus longè alia excretrix facultas est, qua uentriculus cibum
à se cōfectum in intestina propellit, & qua rursus intestina superiora eundem in inferiora pro-
trudunt, & qua cor sanguinem in pulmones ac uitalem spiritum simul cum sanguine imperiū
per corpus ruente in magnam arteriam mittit, & qua sanguinem una uenæ pars in subsequen-
tem cōtinuò deriuat, & qua uterus foetum & uesica urinam excernunt: quàm ea sit, qua nunc
dictæ partes proprii nutrimenti recrementa à se abigunt. Ad hæc, prorsus alia putatur cibi po-
tusq; in uentriculo, & foetus in utero, & urinæ in uesica, & sanguinis in uenis, & spiritus in cor-
de

Fibrarū que
naturali mo-
tui præfunt,
ab ijs que ar-
bitrario serui-
luntur disse-
rentia.

de retentio, quam ea sit cuius beneficio cor, uentriculus, uesica, uterusque familiare nutrimentum sibi seruant, & retinent. Motus igitur omnibus partibus proprijs, atque alijs non subministrantes insita partibus duntaxat ui, citra fibrarum opem omnino fiunt. Sed partes quas aut attractionem, aut retentionem, aut expulsionem partibus alijs, uel toti etiam corpori administrantem & commodam subire necessum est, ad eam functionem fibras quasdam sibi uendicant, quarum auxilio illam complent. Et quemadmodum tres specie sunt motus, ita quoque triplex fibrarum genus à Natura constructum est, rectum uidelicet, obliquum & transversum. Ac rectæ quidem fibræ attractioni conducunt, obliquæ autem retentioni, transversæ expulsion.

Fibrarum species & functiones.

Radius fibræ
rui delineatio,
in qua A trās-
uersas indicat,
B autem C C
utriusque obli-
quarū generis
differētiās, D
uero rectas.
At B tripli-
cis fibrarū ge-
neris implexū
quodammodo ex-
primit, quem
mox subiiciēda
uenæ effigies
accuratius proponet.



Venæ compositionis usus.

parti ex usu erat, intertextas esse, expendere haud grauibitur. Idem spectabit, dum bouis uesicam, aut anserum ingluuiem inflari intuebitur: quandoquidem triplex illud fibrarum genus in distenta uesica manifestò sese spectandum offeret. Contrà si membranam aliquam, ut quæ costas succingit, aut peritonæum, in manus quis assumpserit, leui negotio discet hanc simplex similareque corpus esse omni ex parte sibi par, nullisque eiusmodi fibris conformatur. Quum itaque uena (ut oratio unde discesserat reflectatur) organum sit, uniuerso corpori in sanguinis administratione utiliter subseruiens, Natura corpus ipsius membranæ ac fistulæ instar cauum constituit, ac certis quibusdam fibris, non autem ut fors ferebat intertexuit, ijs nempe quas sanguinis administrationi utiles fore cognouit. Quamobrem quum sciret uenâ necessariò sanguinem

Venæ causæ por-
tio à dextro cordis
sinu ad iugulū usque
conscendens, qua fi-
brarum in uenarū
corpore naturā do-
ctrinæ gratia astu-
diōse fiximus. Si
fortè interim rati-
onem hic passim
aberrantium rati-
onē expetis, hanc
venæ portionē in-
tegræ causæ uenæ
deinceps omni quini-
ca.



Asseclitæ & non peculiaris uenæ tunica.

Capitis fini subiiciēda confer, in illa quid
D, F, G, H, I, K, N, S, T, & a indi-
cent perpendens.

Venarum usus.

ad se admissuram, rectas illi comunicauit fibras, quibus uena sanguinem in ipsis alliceret cauitatē. Deinde quia sanguinis ad subsequenter uenæ partem tanquam per riuum propulsione opus erat, trāsueris quoque fibris eam donauit. Ne uerò statim uniuersus sanguis in proximam uenæ partem citra moram ex alia assumeretur propellereturue, obliquas etiam fibras uenæ corpori implicuit. Ex tribus itaque fibrarum generibus uenæ corpus instar albæ membranæque seu neruæ tunice conflatum est, distendi & rursus (ut contentæ materiei appositè congruat) in se collabi aptum. Præter hanc peculiarem tunica, uena aliam subinde asseclit, plerisque etiam corporis partibus communem. Quandocumque enim uenæ longo tramite aliquò ducuntur, aut ossi, aut duriori cuiuspiam corpori incumbunt, aut alicubi suspenduntur, tum membrana illis ueluti alia peculiaris tunica obtenditur. Huiusmodi tunica uenæ per uniuersum corpus induuntur, quoties extra uiscus aliquod, aut musculi corpus eminent, nec uisceri aut musculo intextuntur. Tunc enim semper ex coterminis membranis alia quædam tenuis tunica ipsis obuoluitur, cum tutioris ductus, tum ad uicinas partes firmioris nexu gratia. Cæterum uenæ corporibus quibusdam insertæ, ac in illis propagatæ, huiusmodi tunica nequaquam indigent, quòd abundè in illis corporibus firmentur, quòdque ea tunica impedimento esset, quo minùs promptè sanguis ex uenis sudaret, aut ut sanguis in uenis collectus, substantiæ alicuius uisceris uim tardius experiretur. Et hac potissimum ratione in nulla corporis parte, uenæ neque tenuiorem adipiscuntur suam peculiarem tunica, neque in plures diffunduntur lobos, quàm in iecoris substantia, quæ succum in uenis contentum in sanguinem mutatura, suisque recrementis liberatura erat. Omnes uenas ratione primaria ut sanguinem singulis corporis partibus deferant, rerum Opifex procreauit: quanquam quibusdam earum ramis, ut portæ uenæ propagi-

e figura ca. s.

nibus, ad cibi in uentriculo elaborati ad iecoris portas attractionē, ceu alijs ad excrementorum, (ut^a quæ in renes seorsum sanguinem deferunt) repurgationem abutatur, quas omnes suo loco commemorabimus. Num uerò ipse (ne sanguis frustra nullam à uenæ corpore elaborationem sentiens, per uenas defluere) quandam sanguificationis uim uenis indiderit, non adeo promptè assertum uelim, etiam si id omnibus confessum sit dissectionis proceribus. & si fortassis hæc uirtus uenis tribuitur, ea nō rubicundum parabit sanguinem, sed uenæ corporis modo album. siquidem in omni naturali corporis nostri partium cōcoctione, concoctum necessario sibi concoquentis colorem asciscit. Verum iam tempestiuum erit, ex quibus nam partibus arteria fabricetur, persequi.

QVID SIT ARTERIA, QUÆQUE

ipsius substantia & usus. Caput II.




ARTERIA uas est similiter ut uena membraneum, teres ac fistulæ modo cauum,^a quo uitalis spiritus, & tenuis flauus calidusq; sanguis per uniuersum corpus diffunduntur, quorum beneficio, ac dein arteriæ ipsius motu (qui dilatatione ac contractione fit) naturalis singularum partium calor uitalisq; spiritus refocillantur. Porro Hippocratis adhuc, & Platonis, & Aristotelis tempore, arteria nuncupabatur,^b qua inspirantes è naribus aut ore aërem in pulmones attrahimus, quæq; rursum expirantes è pulmonibus eundem educimus. Nobis uerò uocatas arterias, illi uenas appellabant: atque arterias à uenis nonnulli ea ætate distinguebant, quum has quidem non pulsantes, illas autem pulsantes dicerent. Ad hunc sanè modum Hippocrati arteria uenæ nomine donatur, cuius agitatio, quum in infantis partu uelox & magna & ualida reperitur, ualidam ac uegeto feruidoq; calore præditam in corde irascibilem uim esse testatur. Cæterum alijs arteriæ nominabantur, uenæ flauum & spirituosum, ac per corpus impetu diffusum & tenuis subtilisq; substantiæ sanguinem uniuerso corpori deducentes. Ita enim Platoni arterias uenas uocare libuit, quando in Timæo attestatur, cor simul & uenarum fontem esse, & sanguinis qui per omnia membra uehementè circumfunditur. Nam quum uasā pulsantia (inquit Galenus) nondum, ut nunc, arteriæ dicerentur, sed tantū illam sic ueteres appellarent, quæ ex ore in pulmones diuicatur, iure Plato ut distingueret, quarum uenarum cor esse sanguinem uellet, sanguinis qui per omnia membra impetu deferitur, meminit. Aristoteles autem in libris de Animalium partibus, & eorundem historia, subinde arterijs uenarum nomen elargitur. Nam ut reliqua præteream loca, is magnam arteriam cauæ uenæ comparans, in tertio historiæ de Animalibus illam minorem uenam crebrò appellat. Sed successu temporis eam quæ ex ore in pulmones per

Quid arteria

Li. 2 Morborum uulga.

In libris de Placitis.



Arteria magna quæ ex corpore promiscuitur portio, quam dissectis aperiamus fiximus, ut arteria hic cōspiceretur tunica: ac A quidem locum indicat, in quo potissimum ea occurrat tunica, quam araneæ telæ assimilamus. B autem C B interiore notant arterie tunica. Numerus autem ille 1, 2, 3 insinuat tres membranas magnæ arteriæ orificio præfectas, ac in decima sexti libri figura B, C, D notandas. Hic uero E & D duarum coronarum arteriarum originem ostendunt. Foramina autem in arteriæ trunco ad uertebra deorsum descezo conspiciuntur, earum propaginum sunt ora, quæ costis, dein septo, & alijs ad renes usque organis digeruntur. Verum hæc suo loco erunt dilucidiora. in præsentem enim figuræ arteriæ tunicas obiter adnotare uisum fuit.

Arterie corpus quale, & quæ ipsius percutiuntur tunica.

ingreditur seu cartilaginea appellatur. Vnde etiā Arabes forsitan arteriā neruum pulsatilem uocauerunt. Tunicae arteriæ similiter ut uenæ, fibris cōformantur: ac interius quidem transversis duntaxat intertextitur, exterior uerò rectis, & quibusdam mediocriter obliquis, transversis autem nullis constat. Interior arteriæ tunica, ceu cutem quandam internæ intestinorum & uentriculi superficiei modo continet, latæ continuæq; araneorum telæ manifeste

*Affectione ar-
teriarum tuni-
cae.
Arteria con-
structionis ra-
tio.*

nifesto persimilem, in grandioribus quidem arterijs conspicuam, ac à nonnullis tertiæ arteriæ tunicæ loco descriptam. Quarta uerò alia peculiariis nulla est, sed ueluti quibusdam uenarum, ita quoque arterijs alicubi membrana tenuis obharefcit & circumtenditur contegens, aut stabiliens, aut connectens ipsas proximis partibus, quemadmodum de altera uenarum tunica retulimus. Atq; hæc omnia iustissimè à summo rerum Opifice sunt extructa, qui in hoc arterias (uti in Capitis initio dicebam) formauit, ut illæ uitalem spiritum & sanguinem impetu per corpus diffusum, singulis partibus deducerent, ingenitumq; calorem recrearent. Fibras enim arteriæ corpus, eiusdem quo uenæ usus gratia sortitur, ac plurimas quidem transuersas exigit, ut ocyus ipsi ex sinistro cordis sinu immissum sanguinem & uitalem spiritum toti corpori dispenseret, neque alium in transmittendo recipiendoq; rhythmum, quam cor ipsum efficiat. Ad hoc nanque munus magnopere transuersæ conducunt, quas expulsiōi à Natura præfectas esse dudum asseruimus. Obsunt autem expulsiōi insigniter obliquæ, ut quæ materias retineant acrescerent. Vnde etiam Natura paucissimas obliquas arterijs elargitur. Quæ quum tenuiorem rarioremq; & uelociori impetu ruentem substantiā, quam uenæ, erant amplexuræ, ac dum uiuit animal perpetuò dilatandæ cōstringendæq; merito etiam durioribus & crassioribus pluribusq; tunicis conformantur.

*c. patet in
et 10 fig.
lib. 6.*

QVIS VENARVM ET ARTERIARVM numerus. Caput III.



*Quatuor ue-
næ.*

Dux arteria

*Nature ar-
tificium in ue-
narum arteri-
arumq; serie.*

NOT in uniuersum corpus uenæ, & item arteriæ deriuentur, si uniuersæ soboles uasorumq; omnes distributiones enumerandæ sint, indicare arduū prorsus est, atq; propemodum impossibile. At si uenæ arteriæq; propriam exigentes circumscriptionē, ac ueluti proprijs terminis finitæ, duntaxat numero quodam sint complectendæ, in procinctu est numerus. In natis enim absolutisq; hominibus omnes uenæ ut plurimæ quaternario numero comprehenduntur, quæ cæterarum omnium radices censentur. Atque una ex caua iecoris sede prodiens in bilis uesiculam, uentriculum, lienem, intestina, mesenterium & omentum excurrit.^a Secunda ex gibbis iecoris, aut ut quibusdam uisum est ex dextro cordis sinu originem sumens, in reliquum corpus solis duntaxat exceptis pulmonibus, innumera ramorum serie dispensatur.^b Tertia, ex dextro etiam cordis sinu nata, frequenti admodum propagine in pulmones digeritur. Verum hanc uenam hoc sibi peculiariter uendicare audies, quod arteriarum constet corpore, unde etiam arterialis uena nuncupabitur.^c Quarta ab umbilico in iecur, ut sic dicam, producit, ac ad fœtus nutritionem duntaxat animali famulatur, neque hic in uenarum numero rectè haberi potest, uixq; propria circumscriptione donatur. Ab his itaque uenis reliquæ omnes quæ in corpore occurrunt originem mutuauerunt, eisq; continuæ sunt. Arteriæ autem numero binæ censentur,^d una quæ ex sinistro cordis sinu originem capiens, in uniuersum corpus præterquam in pulmones, dispergitur.^e Altera ex eodem cordis sinu pronata, in solos pulmones distribuitur: quæ quia uenæ corpore constat, uenalis arteriæ nomen obtinuit. Porro^f duæ arteriæ ab umbilico secundum uesicæ latera descendentes, ac fœtui quodāmodo propriæ, cum magnæ arteriæ propaginibus iuxta ossis sacri regionem uniuertur, quare etiam propriarum arteriarum loco neutriquam recensendæ ueniunt. Cæterum si fœtus uenæ & arteriæ priuatim sibi aliquid uendicent, id suis locis ubi fœtus uasorum tradetur historia, fiet obuium. iam enim operæ precium est à perfectorum uenis exordium sermonis sumere, ac singularum enarrata distributione, ipsarum usum diuicationisq; rationem subiungere. Verum quoniam singulis corporis partibus arterias uenasq; deduci oportuit, nonnullæ autem partes procul ab horum uasorum initijs distant, longè optimum fuit, neque tot numero ramos ex principijs originē sumere, quot corporis sunt partes huiusmodi uasis indigentes: neq; omnino multos: sed summopere expediebat maxima organa caudicum instar unoq; principio deduci, & ab illis in proximas partes ueluti ramos propaginesq; deriuari, à quibus singulæ partes, quod sibi familiare sentiunt, in nutritionem allicerent.

*a 5 ca. fig.
ra et 12 fi.
li. 5b.
b figura 6.
caput præ-
posita. et 1
fi. li. 6. C. D.
E.
c patet in 7
et 8 fi. li. 6.
d 1 fi. ca. 15.
et 6 fi. li. 6.
1, et 8 fi. C.
D.
e 1 fi. ca. 15.
B, C.
f fi. cap. 15.
et 2 fi. li. 5.
F.
g fig. caput
12 præposita.
14. et 10 fi.
lib. 6. A.
h 2 fi. ca. 15.
et 9 fi. li. 6.
C, C.
i 2 fi. li. 5.
L. et ca. 12.
fi. 1.*

DE GLANDVLIS, VASORVM DIDVCTI- bus roboris gratia immixtis adnexisq;. Caput IIII.

PRÆSENTI Capiti figuram non duxi præponendam, quod quamplurimæ huc simul locari debuissent quinti ac sexti et septimi librorum formæ, præter aliquot etiam musculorum

sculorum tabulas, ad quas à Capitis contextu, dum alicuius glandulæ mentio incidet, oportune remitteris.



ICVT Natura uenæ & arteriæ præter proprias ipsarum tunicas, aliam subinde membranam circundedit, cuius beneficio opportunè cõterni nis partibus alligetur, tutoq; præparat: sic quoque quum minimè ignora ret unumquodq; uas inibi noxijs opportunè expositum esse, ubi in ra mos discinditur, tutæ fissionis gratia, præter eiusmodi membranas, sub stantiam quandam mediocriter mollem modicè cedentem condidit, qua nodorum in arboribus ritu, uasorū diuarcationes, sic passim reple

Cur, & quomodo uasorum di stributionibus glandulæ im muntur.

uit, hancq; ramorum scissionibus substrauit ac circundedit, ut nulla ipsarum facile findi, uel in ualida fieri possit. At quoniam per motum uiolentiorum uasorum diuarcationes iniurijs potissimum patent, & super molliac mediocriter cedente substantia opportunè uasa quiescunt, & demum huius auxilio quamuis moueantur uehementius, impercussa integræq; custodiuntur, Natura haudquaquam ut fors ferebat, singulis uasorū distributionibus huiusmodi substantiã interiecit. Quandoquidem hæc paucissimã, aut nullam propemodum diuisionibus, quæ neq; suspensæ feruntur, neque articulis qui in acutum angulum flectuntur extenduntur ue in cum bunt, cõmunicauit, quod illas uasorū partitiones ex uiolento motu nihil passuras ei perspectu esset. Verum ubi diuisiones quapiam membrana suspensæ, aut super articulos, qui in acutos mo uentur angulos longius porriguntur, eaq; plures in istiusmodi sedibus numero habentur,

Natura hanc de qua agimus substantiam non mediocri copia circundedit, uti per uniuersam portæ distributionem est cernere, quod hæc nimirum uniuersa membranis duntaxat suffulta ad uentriculum, lienem & intestina excurrit. Pari in super ratione in membranæ amplitudine thoracis intersepiantibus, & in cerebro super cerebri testes (quod inibi suspensæ ferantur uenæ) hanc substantiã procreat ex cõfectione doceberis. Sub superiori uerò pectoris ossis sine, sub auribus, ad asperæ arteriæ caput, in axillis, in cubiti flexu, in inguinibus, in poplite & alijs nonnullis corporis sedibus, propter adiacentium partium morus & numerosam uasorum di stributionem, eiusmodi substantiam diuisionibus interijci, in sermonis progressu ostendam.

Substantia hæc communi nomine Græcis *ἀσθὴν* & *ὄγκος* dicitur, Latinis glans & glandula & glandium, estq; omnium corporis partium summè imbecillis, ac fluxionibus imprimis obnoxia. Haud enim decuisset partes reliquias uiliorem corpori usum præstātes, ceteris ualidiores esse, inò deiectis uiribus præditas & recrementis excipiendis aptiores creari. Cæterum non omnis huiusmodi corporis substantia, colore, forma, nomine, duritia sibi respōdet, quædam enim mol lior, rubicundior, & quercinæ glandi forma prorsus dissimilis est, qualis ea censetur quæ prin cipio gracilium intestinorum non procul ab inferiori orificio uentriculi exporrigitur: & ea quæ in elatiori inferioris membranæ omenti regione sub uentriculo cõsistit. Hæc quia rubicundior, idq; potissimum in canibus, & mollior & undiq; sibi similis uisitur, à carne Græcis *σάρκα* & *σάρκα* nuncupatur. Quæ uerò in iugulo sub pectoris osse habetur, iam dictæ propemodum specie respōdet, & à Græcis *θύμος*, à Latinis autem cõmuni uoce glandiū appellatur. Cæterum quæ in reliquo corpore passim occurrit, & nuper dicta durior est, glandis quercinæ imagini quodammodo accedit, & peculiare nomen in quibusdam corporis sedibus obtinet. Cuius ge neris in cerebro glans pineæ nucis imaginè referēs, & forsitan in mesenterio lactes seu per id distributæ glandes censerī possunt. Verum hominis fabrica etiā alijs donat glandulis ad alios usus, quàm ad uasorū firmam distributionē procreatis: in quarum numero glans habetur, cere bri pituita ad palatum defluentē excipiens, tonsillæ glandes laryngis radicia dnata, glando sum uirilīs uesicæ ceruicis corpus, cui semen deferētia uasa inferi docebimus, quodq; uasorū di uaricationi uix quicquid auxiliatur. Cuius uerò potissimū usus gratia nuper cõmemoratæ glandes paratæ sint, suis locis abunde persequar. hic enim suffecerit glandes cõmemorare uasorum di stributioni præfectas, ex quibus nonnullæ non solum uasis præfunt, uerum etiā aliquæ mea tibus humectandis præterea idoneæ censentur. quemadmodum glandes in mesenterio reposti tæ, & quæ duodeno intestino exporrigitur, ut intestina lento humore imbuat, progenitæ à di

Glandulæ sub stantiæ nomē, ac imbecillitas.

Glandularum differentia à nomine, colore & imagine.

Ab usu

Ad finem ser cundi de Scind ne Glandulæ.

VENAE PORTAE ORTVS, IPSIVSQUE
propaginum series. Caput V.

VENAE PORTAE AB VNIVERSIS QVI-

BVS COMMITTITVR PARTIBVS LIBERAE, INTEGRA
delineatio, in ea proportione expressa, ad quam secundum praesentem fi-
guram aliquis cur, bilis uesiculam, uentriculum, lienem, omen-
tum, meenterium & intestina ex illorum magnitudi-
ne, ac insuper in suo situ depingeret.



NUDAE VENAE PORTAE DELINEATIONIS
characterum Index.

A, A etc. QVINQVE his characteribus portae uenae propagines indicantur, per iecoris
corpus diffusae, & hic ueluti iecoris formam secundum cauam ipsius sedem exprimentes.
1, 2, 3, 4, 5 Numerus iste quinque portae uenae ramos (nisi subinde etiam pauciores sint) notat, ex quibus ipsius
caudex quodammodo proxime constituitur, aut in quos is primum in iecoris substantiam digeritur.

Venae

- B Vena portæ, quæ primum à iecoris substantia libera & amplissima cernitur.
 C, C Duo ramusculi bilis uesculam in caua iecoris sede posteam adeuntes.
 D Vena ad posteriorem inferioris uentriculi orificij sedem excurrentes.
 E Hac sede uena portæ in duos maximos bipartitur truncos.
 F Truncus sinister & elatior. G Truncus dexter & humilior.
 H Vena dextram fundi uentriculi sedem perreptans, & geniculatim illi sedi ac superioris membranae omenti dextræ parti ramulos præbens.
 I Vena duodeno intestino & ieiuni principio exprompta.
 K Ramus in dextram regionem gibbi uentriculi quæ id dorsum respicit, aliquot surculis digestus.
 L Vena in dextrâ sedem inferioris omenti membranae & colum intestini quæ hæc fertur excurrentes.
 M Soboles quædâ à sinistro trunco in glandosum corpus inferiori membranae omenti innatæ, sparsæ.
 N Vena insignis sub uentriculo, ubi dorso is innititur, uersus elatius ipsius orificiû oblique conscendens: quò priusquam pertingat, utrinque unam educit propaginem insignitam, & in uentriculo
 O, O dens: quò priusquam pertingat, utrinque unam educit propaginem insignitam, & in uentriculo
 P. lum hac sede qua dorso incumbit, digestam. Puerò præsentis uenæ reflexum per dextrum orificij
 Q. uentriculi latus in anteriore uentriculi sedem: Quæ reliquæ præsentis uenæ seriè notat, quæ instar coronæ id orificium amplexatur. Vmbra qua hanc uenam aliqua ex parte ornauimus, hic ut in reliquis uenarum & nervorum arteriarumq; delineationibus uenæ partem in posteriora & in magis recondita deductam interstinguit, ab illa quæ in priori seu anteriori sede oculis subijcitur, aut oculis propinquior est.
 R Ramus uenæ superius uentriculi orificium ambientis, qui secundum elatiora uentriculi procedens, inferiori orificio surculos exhibet, soboles etiam satis frequentes in progressu ad anteriora posterioraq; uentriculi dispergens.
 S Grandis utcunque uena in inferiorem omenti membranam & colum intestinum quæ uentriculo exporrigitur, numerosa sobole procurrentes.
 T, T Sinistri trunciduaricatio, ubi is iam lienem est accessurus.
 V Venula in sinistram sedem inferioris membranae omenti distributa, cuius radicem in integra figura (quod subinde desit) duntaxat delineauimus, eius seriè hac peculiari figura quam margini adhibemus exprimentes, in qua T uenam, quæ lienis exporrigitur, cõmonstrat utrinq; aberuncatam. præsens uerò uenula V insignitur.
 X, X Vena ab illis quæ elatiora lienis petunt, in sinistram uentriculi latus dispensata.
 Y Eiusmodi etiam uena hic, qualem utrinque X indicabat, insignitur.
 Z Vena in sinistram fundi uentriculi sedem perreptans, multasq; soboles uentriculo superiori q; omenti membranae offerens.
 a, a, a His characteribus uenarum in lienis substantia distributio indicatur, adeò frequens, ut lienis imaginem facile ostendat.
 b, b, b Prima dextri portæ uenæ trunci in mesenterium series. Hæc in mesenterium digestæ uenæ quibusdam meseraicæ ac mediæ & lactæa nuncupantur.
 c Vena colo intestino quæ recto continuatur, exporrecta.
 d, d Vena sub recto prorèpens intestino indicatur, unâ cum ramulis intestino in uenæ progressu digestis.
 e, e Venularum soboles, recti intestini sinem amplexantes. Præter hanc figurâ cuius modò characterum indicem absolui, aliæ complures quinto libro dedicate, huc reponi possent, quibus illa exprimuntur organa, in quæ portæ soboles diffunduntur. Præcipue autem huc spectarent secundâ, tertiâ, quartâ, decima, duodecima, decimatertia, decimaquarta, decimaquinta. Quinetiam huc maxime facit, figura ex horum librorum Epitome sumpta, quam ad præsentis libri calcem in alia quadam in hoc subnectam, ut uenarum & arteriarum mutua series oculis obuersaretur. Quotiescunque igitur in interiori Capitis contextus margine simplex character ponetur, illum ad nudam quam huic Capiti præposuimus figuram refer. reliquos autem ad eas figuras ad quas illos spectare adjiciemus, ac proinde manifestioris doctrinæ gratia ultimam præsentis libri figuram totius libri contextu notabimus, ult. fi.



Porta ramo-
rum in iecoris
substantia se-
ries.



Porta caudi-
cis extra ie-
cur distribu-
tio.

Ad bilis ues-
iculam.

Ad uentricu-
li humidus ori-
ficium.

Porta caudi-
cis in duos
principios
truncos se-
ditio.

Ad dextram
uentriculi fun-
di sede, crispis
proximam o-
menti partem.

Ad duoden-
ti intestinum.

Li. 4. de Vsu
par.
Sinistri trun-
ci series.

IN IECORIS substantia ab omnibus^a demissioribus & quæ orbicula-
tim consistunt extremis ipsius partibus^b exiguae admodum numero saepe
uenarum propagines incipiunt, quæ uersus iecoris medium porrectæ, sen-
sim in maiores soboles, & inde in grandiores adhuc tantisper coeunt, do-
nec omnes (quæ profecto sunt quam frequentissimæ) in quinque inter dum
etiam in pauciores ramos colligantur, qui in caua iecoris regione uersus
eius medium, ad interiora tamen & posteriora, iuxta dorsum magis uniti,
unam grandem & impense amplam constituunt uenâ, quæ nobis portæ uena nuncupabitur.
Hæc ad eum modum ex iecoris caua enata, aut (si non minus uerè quam clare loqui uoles) omnes
nuper dictos ramos, soboles & propagines in iecoris substantiâ^c dispargens, oblique deorsum
uersus sinistram procedit in multos uenarum furculos, ad bilis uesiculâ, uentriculû, intestina, lie-
nem, omentum, mesenterium, hac serie digesta. Primum^d duos ualde exiguos ramulos ex supe-
riori, seu anteriori sui corporis parte (non autem latere) bilis uesiculæ ceruici distribuit, qui eam
ceruicem amplexantes, ac in furculos capillorum modo prætenues diducti, in uniuersum uesiculæ
corpus eo pacto excurrunt, quo in^e alba adhærentē ue oculi tunica, uenulas porrigi cernimus.
Post hos aliquanto inferius ab elatiori quoque & anteriori uenæ corporis sede, uersus dextrum
tamen latus magis^f alius ponitur ramus, nuper^g commemoratis insignior, qui humilior uen-
triculi orificium & uentriculi portionem huic iuxta dorsum proximam aliquot ramulis adit,
nulla prorsus sobole anteriore uentriculi sedem perreptas. At portæ uenæ caudex deorsum
magis protensus, postquam hos diffudit ramos, in duos maximos bipartitur truncos, quo-
rum elatior (quem & sinistram doctrinæ studio opportune nominabimus) propemodum u-
niuersus in uentriculum, & omentum, & quandam coli intestini^h regionem, quæ secundum
humiliorem uentriculi sedem fertur, deinde & in lienem absimitur. Alter, qui & humilior &
grandior est, ac dexter merito appellabitur, totus penè in mesenterium & intestina exhauritur.
Ab huius nanque dextro latere iuxta ipsam caudicis portæ in duos truncos distributionem,
ut cunque insignis uena uentriculo exporrigitur, quæ omenti membrana superiori suffulta, &
sub dextra uentriculi fundi sede transuersim productaⁱ, exiguas frequentesque uenulas certo or-
dine, ac quodammodo geniculatim uentriculo diuariat, qui & anteriorem & posteriorem fun-
di uentriculi regionem multa sobole aliquousque intertexunt. Hæc uena ubi^j ad mediam fundi
uentriculi sedem processit, in quosdam exiguos ramulos finitur^k illi uenæ cōiguos, quam non
multo post reliquam fundi uentriculi regionem occupare audies. Porro quemadmodum hæc
uena plurimas uenulas ex elatiori ipsius sede feriatim uentriculo offert, ita quoque innumeras
uenularum soboles per totam dextram superioris membranæ omenti regionem diffundit, illis
serè numero correspondentes, quas in uentriculi fundum spargi paulo antè dicebam. Verum
præsens uena^l interdum, neque id sanè infrequenter, à portæ uena supra quam illa in duos gran-
des truncos bipartitur, originem obtinet, imò quandoque à^m sinistro portæ trunco non semel
hanc ipsam pronasci obseruauimus. Quemadmodum uero hæc subinde in ortu uariat, ita
etiamⁿ uena quæ ipsam subsequitur, non idem semper principium exigit. nunc enim à dextro
dextri trunci latere, nunc uerò à latere dextro uenæ portæ caudicis priusquàm in duos eiusmo-
di truncos dirimitur, uena quædam originem ducit, quæ^o primum intestinorum quod duode-
num uulgo uocamus, numerosa serie implicat. Hæc enim intestinum ad mediū serè ipsius lon-
gitudinis primum contingens, deorsum ad reliquam intestini longitudinem paulo ultra ieiuni
principium exporrigitur, & superiori membrana omenti & glandoso corpore huic intestino
adnato suffulta, geniculatim intestinorum sedi, quam perreptat, ramulos dispergit, non negli-
gens interim glandosum quo sustinetur corpus. nam & illi, & omenti regioni quæ prorept,
furculos quosdam impartitur. Cuius uerò naturæ illud corpus sit, in Capite præcedente execu-
tus sum: quanquam idem rursus in quinto libro Galeni nomine, qui falso id^p inferius uentri-
culi os cōprimere ac occludere opinatur, agendum erit. Hic enim sermo reliquæ, quam portæ
uena molitur, distributioni dedicandus est. Sinister itaque portæ truncus transuersim ad in-
feriorem omenti membranâ, quæ hæc posteriori uentriculi subijciatur regioni, properat, hacque
omenti sede dein & glandoso corpori huic membranæ innato sustinetur, apteque suffulcitur
in plurimas notata dignas soboles digeritur. Non procul enim ab ea sede, quæ à portæ caudice
truncus iste discinditur, inferiorique omenti membrana implicatur, ab elatiori ipsius regione
uenam germinat, quæ non admodum frequenti ramorum serie in gibbum uentriculi, quæ
dextram dorsi sedem id spectat, diffunditur. Ab humiliori autem trunci sede, alia diducitur ue-
na, nuper dictæ quodammodo in ortu respondens, quæ deorsum in dextram inferioris omenti
membranæ regionem furculos aliquot deriuat, & quibusdam ramulis in colum intestinum,
quæ

d 12 fi. lib. 5
1, K, L, M,
N, O.
b A, A, A.

c cha. 1, 2,
3, 4, 5.

d B, C, 12
fi. lib. 5 b
20 fi. 1.
c d B, 12
geruntur A,
A, A.

f C, C, 12
fi. lib. 5 g
ad V. aut ab I
ad H fi. 20.
g 18 fi. cap.
14, 17, 18.
h D, 15 fi. lib.
5 d.

i E partitur
in F, C, G.
h 6, 8 fi. lib.
5, 12 p ad Q.

l H, 14, 15
fi. lib. 5 c
2 fig. R. C
4, 5 fi. 10, 10.
m 2 fi. lib. 5
V. 4 fi. p. p.
n 2 fi. lib. 5
ad T.
o Z.
p 2 fi. lib. 5
X, 4 fig. q.
q.
g ut o ab I
m 4 fi. lib. 5.
r ab F.

s 1. C, 12
4 fi. lib. 5 r.
12 fi. h.
t 7 fi. lib. 5, 10
K.

u 7 fi. lib. 5
L.
x 12 fi. lib. 5.
16.

y 14, 15 fi.
4, 5 fi. h.

z E.

a 4 fi. lib. 5
n, a.

b K, 4 fi. lib.
5 u. 15 fi. b.
c L, 4 fig.
lib. 5 x.

qua hac omenti membrana id continetur, præfens uena pertinet. Porro ulterius in sinistri trunci uersus lienem progressu, præter^d exiguas soboles quas priuatim glanduloso ipsum suffulcanti corpori elargiuntur, ab elatiori sua sede^e uenam promittit omnium uentriculum aduentum facile capacissimam. Hæc inferiori quoque omenti membrana continetur, & oblique sursum uersus sinistram sub uentriculo quâ dorso id innititur prorepens, mox in ascensu huic uentriculi sedi^f duos communicat ramos, utrinque singulos, in hanc uentriculi sedem multis etiam furculis dispersos. Reliquâ uenæ sursum ad^g elatius uentriculi orificium, per uentriculi posteriora exporrectum, ad dextrum orificij latus ad anteriora ipsius orificij^h emergit, & totam anteriorem sedem ambiens, secundum sinistram eius latus denuò in posteriora retorquetur, ac ut semel dicâ coronæ prorsus modo uentriculi superius orificium concinnèⁱ perreptat, in progressu rectâ deorsum in uentriculi corpus ramos geniculatim offerens, qui magnam uentriculi sedem occupant. A superiori autem sede, uena hæc ramulos etiam diffundit, sed exiguos prorsus, & in stomachi terminum, quâ is uentriculo continuatur, excurrentes. Porro inter cæteras propagines, ab hac uena coronæ ritu uentriculi elatius orificium succingente exortas^k utcunque insignis uena ab ipsa pronascitur, quâ à posteriori uentriculi regione secundum dextrum orificij latus antrosum tendit. Atque hæc propago à dextro eius uenæ latere nata, secundum superiorem uentriculi sedem, inferius uentriculi adit orificium, id frequentibus utcunque uenis amplexans, & in progressu geniculatim ramos in priorem posterioremq; uentriculi sedem spargens. Iam commemoratæ uenæ tot propaginibus in uentriculum pertinenti, alia respondet, ab humiliori sede sinistri uenæ portæ trunci prodiens, ac inferiori omenti membranæ implicita, quæ non ita longè ab initio in duos ramos plurimum ab inuicè discedentes bipartitur, ex quibus denuò quamplures furculi deorsum prorepunt, & in colli intestini partem (quæ inferioris membranæ omenti beneficio tanquam à mesenterio ad dorsum committitur) excurrentes, & nonnullis propaginibus inserti in partē inferioris membranæ omenti, quæ intestinis in cumbis, ac uelut à colo intestino pronascitur. Atque hæc quidem de hominibus me hæcenus dixisse arbitror. nam à sinistro portæ trunco ne minima quidem soboles canibus ad collium intestinum digeritur, uti etiam in ipsis colum intestinum nulla ex parte omento alligatur, adeò ut neque mirandum sit, si hac orationis serie interdum à Galeni placitis recedam, qui simiarum uenas, uti ipse etiam ad Antisthenem scribit, ex professo docens, hominum uenas non persequitur. Cæterum postquam sinister portæ truncus commemoratas eduxit propagines, ad lienem transversim accedens, in^m duos ramos secatur, qui rursus in alios partiuntur, atque hi denuò in alios tantisper dirimuntur, quousque numerosa ramorū serie inⁿ cauam simam uenæ sedem rectâ lineâ secundum totam lienis longitudinem inferiori membrana omenti perpetuò suffulti implantentur, atque^o infinita sobole uenulas oppidò quàm graciles inuicemq; implexas, per uniuersum lienis corpus digerant. Ab infimo ramo, lienis inferiora petente, priusquam sinister portæ truncus in frequentissimas soboles illas dispargatur, interdum^p tenuis uenam prodit, quæ in sinistram inferioris membranæ omenti sedem uno atque altero furculo dispensatur: idq; tunc potissimum, quando primus^q maioris in humiliorem omenti membranam pertinentis uenæ ductus angustior est, quàm ut commodè uniuersæ membranæ inibi ramos communicet. Præterea à ramo quopiam ex illis qui ad superiorem lienis regionem repunt, quum is iuxta lienem consistit, uena exoritur, quæ dextrorsum lata, atque omenti membrana superiori intertexta, in eam uentriculi sedem pertingit, quæ elatiori lienis sedi propinquior uisitur. Hæc quandoq; sed rarius, in uentriculi tunica adeò excurrit, ut non admodum procul à sinistra sede superioris orificij uentriculi distet, quod autem hæc uena illud contigerit, uidi nunquam. Neque etiam præfens uena ab elatissimo lienem aduentu ramo promittitur, sed ab illo qui setè huic proximus est. Quemadmodum uerò hæc iuxta eminentiorē lienis partem principium ducit, sic à maiusculo ramo imam lienis sedem accedente, alia exurgit uena utcunque insigni amplitudine donata. Hæc perinde atque nuper^r dicta dextrorsum retorquetur, & sinistram uentriculi fundi regionem perreptans, illi accuratè conuenit uenæ, quam ad fundi^s medium usq; dextram eius sedem amplecti retulimus. Ambæ enim ad hoc medium in exiguos desinunt ramulos, mutuoq; implicantur. Dein sinistra perinde ac dextra in sinistram fundi uentriculi sedem furculos geniculatim antrosum retrorsumq; dispergit, ac superiori membranæ omenti in sinistram ipsius partem oblongas frequentesq; soboles communicat. Cæterum canes ea quam fundi uentriculi dextram sedem adire commemorauimus, desistuntur: & illius uicem ea supplet, quæ sinistram fundi sedem ramis conferit. Atque ad hunc modum frequentissimè sinistram portæ uenæ truncum absumi spectabis, nō raro autem ad huc in hominibus ex singulis uenis concauæ lienis regionē iam inferendis, singulas uenas in uentriculum ad eum modum

partem ipsius duntaxat, quæ primùm à iecoris substantia cernitur libera. Dicitur & catudicis nomine *salpaxia*, quod etiã nomen Galenus interdũ cauæ uenæ quæ iecori est proxima, & prætereā magne arteriæ, quæ è corde pronascit̃, tribuisse uidet̃. Dein portæ uena ab alijs etiã iecoris manus nuncupat̃, quod iecur ea ad elaboratũ in uentriculo cibi attractionẽ tanq̃ manu utatur. Sunt qui lacteã appellẽt, quod succus quẽ hæc ab intestinis iecori defert, lacteus sit. Portò uenã portæ, succũ eũ quẽ è uentriculo, præcipuẽ autẽ ex intestinis ad se allicit, atq̃ in iecur defert, iecoris modo in ipso deductu concoquere, ac eidem præparare, & in rudem sanguinem mutare haud facile concessero: quantumuis grauiter id in quarto de Vsu partiũ libro Galenus asserat. Nullam enim sanguificationis uim mēbranco & coriaceo uenæ corpori assignare possum: & si quæ esset, illa profectò album pararet sanguinẽ, non secus quàm à uentriculo emutata, lacteũ colorem referunt, uti & uentriculi substantiã albam. non autem iecoris modò concreti sanguinis instar rubram esse liquidò cernimus. Atque hoc Galeni placitum non semel ab ipso repetitum altius refellerem, nisi Galenus ipse sexto de Dogmatibus Hippocratis & Platonis eam mutasset sententiam, sup̃spicius, quo acrius Aristotelem oppugnaret, oblitus. Ramum portæ, quẽ sub recto intestino decliuẽ ac mēfenterio suffultum porrigi scripsimus, nonnunquam ad fauculentũ sanguinis per anũ uenulas, sanguine interdum manantes, expurgationẽ plurimum conducere arbitror. Quandoquidem dum aut ob lienis obstructionem, aut aliud quodcunq̃ ipsius uitium, fauculentus sanguis non uniuerſus, uel nullus planẽ in lienem absumitur, uel lien eundem ad uentriculum eructare nequit, huius rami beneficio certis quibusdam interuallis, uti mulierum menstruæ purgationes solent, per anum externũ credo. Rarius enim ex uniuerſo corpore hæmorrhoidũ uitio laborantibus ad uenæ cauæ ramulos in sedem pertinentes, lutoſum eiũmodi sanguinem regurgitare uerisimile nobis uidetur, dum ueram uenæ portæ distributionem perspectam habemus. Quippe ex hac coniecturari est promptissimum, quĩ is sanguis à liene non attractus, aut ob meatuum obturationem non admissus, unde fluebat rursus regurgitet, atque sua grauitate per ramum ad intestinum rectum pertinentẽ deorsum procumbat, ibi quẽ tantisper refeructur colligatur quẽ, donec nimium turgentes uenæ oculis referatis per anum manare illum sinant. Huic meæ sententiæ magnum robur adiecit is quem hoc sanguinis defluxus per interualla laborantem refecimus. Huic enim minor, sed durior lien fuit, & uena sub recto intestino excurrẽs, pollicis quasi crassitiẽ superauit, eoq̃ modo sanguine turgēbat, quo iam parturientium animalium uenas uterum amplexantes, insigniter amplas distensasq̃ cernimus. Verũ hæc paulo latius à nobis relata sunt in epistola, quã dextrã axillarem in laterali morbo (si modò dextram aut sinistram feces, quicquam interſit) aperiendam docui, ac proinde nunc ad uenæ cauæ seriẽ est accedendum: nam portæ uenam secandi modum ad finem Quinti libri reiſciendum duxi, in quo omnium nutritionis generationis quẽ organorum administrationem unã perſequar.

Portæ uenã
sanguinem nõ
coficere.

Melanctoli-
cũ succũ per
portæ uenas
purgari.

CHARACTERVM TOTIVS VENAE CAVAE

DELINEATIONIS, QVAM SVBSEQVENS


pagina proponit, Index.

FIGVRA quam in proxima reponemus pagina, quatuor Capitibus seriatim subsequentibus communis est, proportionẽq̃ illi correspondet, quã integram arteriæ magnæ seriẽ ante duodecimum huius libri Caput, ac dein dorsalis medullæ neruorum distributionem, ante undecimum quarti libri Caput exhibebo, quæ in ea uirilũ corporis magnitudine (quemadmodum & hæc uenæ cauæ figura, & musculorum & ossium simul compactorum tabulã) depinguntur, quam huic papyro (quæ regalis uulgò dicitur) accommodam fore putauit. Verũ si cuiſpiam potest ea uisum fuerit, eiũmodi nudas uenarum, arteriarum, & neruorum icones aut ex proportionẽ, ut clariore reddantur, augere (uti in mea Epitome factum cernis) aut propter chartæ angustiam, seu potius ob typographorum sordes & auaritiã imminuere, id unum moneo & rogo prius, ne quis has figuras circumscribens, aliam hominis imaginẽ illis adiciat: quemadmodum plagiarij quidã profectò, ex quibus hanc uenarum seriẽ sedula dissectione collegissem dignisſimi, in meis Anatomictis tabulis Argentinæ impressis tentarunt. Hæc enim circumscriptio, et si multis rationibus negotiũ uitet, ob id tamen etiã respuenda est, ne omnes uenæ hac expressæ figura in una tantum corporis superficie digeri, ac anteriori tantũ parti peculiare esse uideantur: potissimum quum nemo tam rerum ignarus in his Naturæ mysterijs operam nauet, qui in

h 4 hæc

INTEGRA ET
PARTIBVS
nuda uenae

AB OMNIBVS
LIBERA AC
cauae delineatio.



hac proportionem non cernat quam totius corporis superficiei sedem singula uenae perreptent. Quintiam ex quinti, sexti & septimi librorum figuris facile constabit, cuiusmodi illae debeant esse effigies, quae cum uenis etiam partes quae illis implicantur oculis subiiciunt.

A, A, A Tres isti characteres propaginem notant à uena caua ubi iecori adnascitur, in iecoris gibbum passim perquam numerosa ramorum serie sinistrorsum distributam. Alteram autem propaginem in dextram iecoris sedem similiter diffusam characteribus non insigniuimus, uti etiam nullas uenae cauae soboles, quae pariter utrinque habentur, & priuatim nihil in altero latere sibi uendicant, ne fortassis characterum copia delineationem obscuraremus. Vnde etiam dextrum latus potius quam sinistrum characteribus liberum conspicitur.

a Huiusmodi etiam gracilior soboles à caua iecori sub grandibus illis propaginibus **A** indicatis digeritur.

B Vena cauae sedes inter iecoris gibbum & septum transuersum consistens.

C Sinistra propago duarum, quas caua septo offert, & à quibus etiam furculi in cordis inuolucrum pertingunt.

D Cauae uenae orificium in dextrum cordis sinum pertinens. Optarim hic sedulo expendere, uniuersamque cauae delineationem accuratè contemplareris, consideraturus an ne uerius hoc orificium cauae uenae principium ueniat statuendum, an ea cauae pars ubi **A** & **a** in ipso caudice scriptum cernis, & ipsa uena secundum iecoris posteriora deorsum prorepat, cuius etiam gratia in dextrum latus incuruatur, tantum scilicet, quantum iecoris sedes, cui cauae caudex committitur, ad dextrum latus à uertebrae medio declinat.

E Vena coronae modo cordis basin amplectens, ac deorsum per cordis substantiae exteriora ad ipsius usque mucronem furculos à se deriuas, & sequentia seu coronalis nuncupata. Haec & si ab anteriori sede orificij uenae cauae hic oriri uideatur, perpetuo tamen quum simplex sit, à posteriori sede eius orificij pronascitur, uti in septima sexti libri figura ad **G** est cernere.

F, F Vena coniugis expers, quae à cauae dextro latere prodicens, à cliui secundum dextrum uertebrae latus ad secundam ferè lumborum uertebrae descendit.

G, G Characteres isti hic atque illic ad uenae pari carentis latera repositi, uenae illius propagines insinuant: eas nimirum quae costarum offeruntur interuallis, ac postmodum in dorsalem medullam, & in musculos uertebrae ipsiusque costis instratos, ac etiam membranas thoracis amplitudinem intersepientes, furculos promunt.

H Cauae sub pectoris ossis elatiori sede iuxta iugulum bipartito, quam lanij boues & porcos iugum laturi petunt.

I Vena primae thoracis costae innixa, atque ad alam transuersam perducta, brachijque axillarem postquam aliquot propagines diffudit constituens.

K Exilis uena in sui lateris aliquot superiorum costarum succingentè membranā soboles deriuas.

L Vena sub pectoris ossis sinistro latere ad abdominis usque superiora descendens, ramosque uenarum costarum cartilaginum interuallis, ac demum thoracem intersepienti sui lateris membranæ, ac etiam musculis pectori instratis, & abdominis cuti ramos exhibens. Praecipuum autem ramum sub recto abdominis musculo dispergit, qui supra umbilicum in aliquot finiens furculos, alterius

M. uenae ab imo sursum ascendens, ac **Γ** notandae terminos respicit, eam nimirum sede, ubi **M** ascripsimus.

N. Vena per foramina transuersis processibus uertebrae ceruicis insculpta, ad caluariam propeans, ac dorsali medullae geniculatim ramos offerens, ut & in musculos quoque inibi ceruicis uertebrae adnatos, soboles dispensat. Qua uero ratione haec uena in duram cerebri membranam exhauriatur, etiam si hanc hic quoque delineare conatus sim, in peculiari de cerebri uasis figura decimoquarto Capiti praeposenda non minus discas, quam reliquarum caluariam petentium uenarum seriem.

O Vena musculis humiliorem ceruicis, & superiorem thoracis sedem iuxta uertebrae occupantibus, multiplici utcumque sobole exporrecta.

P Vena ad musculos pectori instratos, & huius regionis cutem, & ipsam demum mamillam excurrentem.

Q Vena

- Q** Vena in posteriora thoracis proficiscens, ac in cauiam scapulae sedem uicinosq; musculos deriuata. Huic proxima sunt uenulae in glandium axillae excurrentes, quarum hic una inter **P** & **R** expressa est.
- R** Propago secundum thoracis latera deorsum ducta, & potissimum distributa in musculum, quo posterior axillae cavitatis sedes constituitur, brachiumq; in posteriora deorsum uellitur.
- S** Interior iugularis, quae graciles furculos asperae arteriae lateri & hac deductis neruis spargit, quod uero ipsius praeter aliquot propagines reliquum est, in caluariam proropat, & uarie ut in cerebri uasorum descriptione prosequar, discinditur.
- T** Exterior seu superficialis iugularis. Verum iugularias uenas (quae Graecis *αγγειδια* uocantur) nonnulli appellant, quae statim in thoracis amplitudine sub summa pectoris ossis sede bipartita qua producuntur. Alij non totas illas, seu integros eius diuisionis truncos iugularias uenas nuncupari uolunt, sed id demum quod ex ijs iam supra clauiculas ceruici intextu cernitur. In Arabum interpretibus iugularias ita fere appellatas legimus: Guidex, Guades, & corrupta Graecorum uoce grandes, sphaeragittidas, iuueniles, penfiles, organicas, subeticas, uertiginosas, apopleticas, uenas somni. Atque ita tam interiores quam exteriores appellantur, & has quidem patentes, illas uero immerfas & occultas nuncupant. Porro exterioris iugularis seriem, ut plurimum mihi apparuit, hic delineatam habes, ut scilicet simplex per colli latus proropat, furculos tantum aliquot in conterminas sedes diffundens.
- V** Exterioris uenae iugularis iuxta fauces in duos ramos distributio.
- X** Exterioris iugularis ramus oris interiora subit, ac uarie in laryngem & hyoidis ossis musculos, linguam, palatum, narium amplitudinem, ac demum in caluariam tribus propaginibus, ac etiam aliquot furculis in oculos digestus.
- Y** Exterior ramus diuisionis externae iugularis iuxta fauces factae, qui numerosa uenarum serie in faciem musculos & cutem, deinde ad tempora & post aures uniuersamq; capitis cutem digeritur.
- Z.** Ac **Z** quidem portionem huius rami **Y** notati insinuat, quae in faciem exporrigitur. **9** uero, **9. a. *** frontis uenam indicat. **a.** portionem secundum tempora sursum repentem. **9 *** eam notat, quae post aures & ad occipitis cutem fertur. Caeterum reliqua uenarum hic in capite series ad cerebri uasa spectat: quam ob id characteribus non insigniui, quod haec peculiaris figura decimoquarto Capiti praeposenda explicabitur. Quanquam interim si quis hanc cauae uenae effigiem characteribus occupare uoluerit, adeum modum quo nos illam sinximus, quae huius libri adhibebitur calci, uenas simul cum arterijs ostensura: primum characterem apponere licebit dextero lateri, ut is dextrum seu primum mihi sic appellandum durae cerebri membranae sinum hic quasi instar semicirculi porrectum indicaret. Secundus uero character sinistro, seu secundo eius membranae sinui inscriberetur, qui in sinistro latere semicirculi quoque modo fertur. Tertius autem character tertio durae membranae sinui adhiberetur, qui illic incipit, ubi primus & secundus sinus seu duo illi semicirculi inuicem congregiuntur, & ubi ab ipsis alius semicirculus quodammodo sursum exporrigitur, cuius posterior pars occipitio propinquior adumbrata cernitur, anterior autem quae frontem adit lucida. Quartus autem durae membranae sinus, quem ex anteriori sede trium dictorum sinuum concursus pronasci, atque recta antrosum duci suo loco audies, hic non est delineatus. In figura tamen huius libri calci insuta, **y** insignitur. Praeterea tribus illis characteribus quartus succederet, qui in primi durae membranae sinui radice positus, ingressum indicaret uenae **N** notatae: deinde ingressum rami interioris iugularis etiam insinuaret, qui per foramen sexti neruorum cerebri paris caluariam subit. Quinto characteri internae iugularis ramus per proprium foramen in latera durae cerebri membranae excurrentes insigniretur. Sextus ramum exterioris iugularis notaret, qui proprio foramine ad radicem posterioremque sedem processus mamillaris temporum ossis exsculpto, caluariam subit. Ad haec praeter alios characteres etiam unus illis uenulis inscribi posset, quae sub frontis uena **9** insignita hic umbratae feruntur, ut scilicet uenae etiam indicarentur, quae per caluariam sedem cui olfactus organa incubunt, & per foramen secundi neruorum cerebri paris gratia caelatu, in caluariam repunt. Atq; haec omnia sane adnotauissem, nisi illa in grandiori figura decimoquarto Capitis fuisse proposuissens, quanquam etiam cerebri uasorum seriem absque arterijs minime liceret aggredi, quandoquidem

dem an illos duræ mēbranæ sinu nō uenæ modō, sed & arteriæ exhauriantur, ipsiq; sinu non minus arteriæ quā uenæ fungantur munere. Verū interim non improbauerim & hanc uenæ ca uæ delineationē, uti iam monui, characteribus quibusdam à studiosis insigniri, iam in cerebri uasorum serie ex huius libri decimoquarto Capite, & ex septimo etiam libro eruditis: aut, ut antē dixi, exemplum fumentibus, ab ea figura quæ ad huius libri calcem insuitur, ac nuper commemorata seriatim literis t, t. u, u. x, x. f. e. n. u, exprimit.

- a, a Vtrūque a uenam humerariam indicat, uerū superior a ipsius exortu ab externa iugulari T notata, radix significatur, inferius autem a humeraria sedem notat, quæ iam humeraria ex alto in brachij superficiē cutemq; emerget. Huius uenæ nomina paulo post absoluta manus characterum narratione, propter Arabum interpretum uoces subijciam.
- b Humeraria propago ab ipsius elatiori sede non procul ab exortu in posteriores ceruicem occupantium musculos, ipsamq; huius regionis cutem sparsa.
- c Humeraria etiam propago, in gibbam scapulæ sedem frequenter utcumq; sobole excurrens.
- d, d Venæ ab humeraria, priusquam ipsa penitus sub summo humero contorquetur, pronata, ac in summi humeri sedis cutem & superficiem musculi brachium attollentis, interdum quoque & ad mamillam digestæ.
- e, e, e Tenues uenulæ ab humeraria in externæ brachij sedis cutem, anterioremq; regionem musculi cubiti flexientium prioris propagata.
- f Humeraria iuxta externum humeri tuberculum in tres ramos partitio, qui nunc inuicem amplitudine æquales, nunc inæquales uisuntur.
- g Primus humerariae tripartitionis ramus in altum immergens, ac sub musculorum ab externo humeri tubere pronatorum capitibus aliquousq; excurrens.
- h Secundus dictæ nuper tripartitionis ramus, qui sub cute deorsum obliquè ad mediam sedem flexus cubiti deductus, cum axillaris uenæ ramo t notando coit, ac cum illo uenam communem constituit, cui æ ascriptum est.
- i Tertius humerariae tripartitionis ramus, per radium in externam cubiti regionem obliquè contendens, ac uenulas passim in proximam ipsi cutem dispergens, inter quas ferè præcipua k insignitur, quam ad exteriorē cubiti articuli sedis cutem ad posteriorem quodammodo digerit. Quando præsens ramus in eum modum obliquè repens, ad brachialis usque radicem è regione ap pendicis ulnæ pertingit (nimirum ubi hic l spectatur) axillaris uenæ propaginis x notanda soboles ipsi commiscetur, ac una ab hac axillaris sobole & humerariae ramo uena confurgit, brachialis & postbrachialis sedem sub paruo digito, ipsūq; adeo paruum digitum & quodammodo anularem, uaria ramulorum serie accedens.
- m Axillaris uena, cuius nomina paulo post recensentur.
- n Axillaris uenæ ramus, in capita derivatus musculorum cubiti extendentium.
- o Ramus nuper dictis musculis & posteriori brachij sedis cuti exporrectus.
- p Insignis propago obliquè deorsum sub humero uersus exterius humeri tuberculum ducta, quæ multis hinc principium ducentibus ramos exhibēs, aliquousq; in externam cubiti sedem cum quarto brachium petentium neruo fertur.
- q, r Axillaris uenæ in duos truncos distributio, quorum alter binis q insignitis in alto semper totoq; ipsius ductu occultitur, ac prorsus pari modo cum manus arteria digeritur, quam in totius magnæ arteriæ figura duodecimo Capiti præponenda licebit intueri. Alter uerò axillaris tricus (cui r inscribitur, & quæ tota orationis serie nobis axillaris uocabitur) passim sub cute excurrit, ac in uarias soboles dispensatur. Cæterum hæc axillaris uenæ distributionē interdum etiam altius fieri quàm hic delineauimus, obseruabis: unde etiam tanto minus Galeni descriptionibus eam conuenire animaduertes.
- s Vena ab axillari in anterioris brachij sedis cutem, & nonnihil quoque in posterioris sedis cutem digesta.
- t Anterior axillaris uenæ ramus, eius diuisionis quæ hic iuxta interioris humeri tuberculi cutem est conspicua. Præsens ramus t insignitus, obliquè ad mediam cubiti articuli flexus sedem sub cute fertur, ac cum humeraria ramo h notato coiens, communem efformat uenam æ indicatam.

u Axillaris

- 11 *Axillaris iuxta interioris humeri tuberculum bipartitionis posterior uena, quæ plures easdemq; uarias à se soboles diffundit.*
- x, x *Posterioris uenæ u notata ramus, qui sub ulna deorsum ad brachiale porrigitur, & passim in conterminam ipsi cutem digestus sobolem offert humerariæ ramo brachiale iuxta minimum digiti tum conscendenti.*
- y *Vena in posterioris articuli cubiti sedis cutem excurrent.*
- x, x *Notatur multiplex uenarum series, in interioris cubiti sedis cutem diffusa, & dein in interioris summæ manus sedis cutem excurrent. Verum superius x uenam notat ab axillaris uenæ ramo t insignito principium ducentem. Inferius autem x indicat propagines, quas axillaris uenæ ramus x & x insignitus internæ cubiti regioni offert.*
- ¶ *Venularum Veneris monticulum implicantium cum ramo d notando coitus, est nanque ramus is propago illarum uenarum, quæ externam manus summæ sedem inter pollicem & indicem perreptant.*
- a *Vena communis ab axillaris ramo r & humerariæ ramo h conflata, quæ per internam cubiti sedem deorsum oblique radium conscendens exportigitur, ac tandem radium supergressa in exteriorem cubiti sedem propter inferiorem ipsius regionem excurrit, ramulos quosdam in progressu ad proximam ipsi cutem dispergens.*
- β *Communis uenæ iuxta radij humiliorē partē, quæ brachiale respicit, diuisio, γ aut Y aut γ. Anon absimilis: cuius quidem alterum crus γ insignitum, externam summæ manus sedem pollicis ac indici subiectam, ipsūq; pollicem & indicem accedit, & ramulum d indicatum in internam manus sedem digerit. Alterum autem crus ε insignitum, uersus medium & anularem potissimum absumitur. Ramis externam summæ manus sedem aduentibus uaria à nostris medicis imponuntur nomina, quæ quum inter se admodum pugnent, & passim sint obuia, aliquid de ipsis iam dicendum arbitror: hūc charactērem indicem lubentiū barbaris nominibus occupaturus, quā orationis quæ has uenas describam seriem. Græci igitur & Latiniore medici in uniuersa manu paucas uenas proprijs nominibus appellarunt. Venam nanque per brachij interiora aliamq; excurrentem in utroque brachio, quia axillam seu alam perreptat, axillarem uocauerunt: quemadmodum & cubiti interiorem, quod scilicet per cubiti interiora potissimum exportigatur. Verum priuatim dextræ manus axillarem iccorariam uocauerunt, quod in iccoris affectibus illam diuidere soleant. Sinistræ autem manus axillaris lienaria ipsi dicitur, quod in lienis morbis hanc plerumque aperiant. Sic rursus humeralis a insignita, simpliciter suum nomen obtinuit, quod per humerum in manum feratur: etiam cubiti exterior nuncupatur, quoniam cubiti exterioris latus perreptat. Hippocrates in libris de Articulis hanc uidetur crassam uenam nuncupasse. Quia uero capitis morbis hæc mederi creditur, etiam capitis uena est dicta. Ramos uero h & t notatos & uenam communem, quam a notauimus constituentes, medias uenas nuncupauerunt, quod scilicet ad flexus cubiti medium ducerentur, aut quod inter cubiti exteriorem uenam & interiorem essent mediæ. Ab obliquo autem ipsorum ductu obliquas quoque illas uocauerunt. Communem (quæ a insignitur) nuncupauerunt, quæ ab illis ramis h & t notatis confurgit, atque interiori & exteriori cubiti uenis communis est. Præter hæc nomina uix alia apud illos reperias. At si Arabum libros uerses, nominum acerui passim occurrent eidem uenæ uix unquam accommodatorum. Quo autem aliquid certius de his quoq; depromam, studiorum nomine qui me his nominibus in Anatome remorari solent, non grauabor Auicennæ interpretis nomina hic recensere, quæ Fen prima libri primi doctrina quinta Capite quarto leguntur. In quo Capite Auicenna ex proposito manus uenas describit, earum seriem à Galeni libro tertio de Administrandis sectionibus, aut potius ab Oribasio petens. Auicenna igitur, aut ipsius interpres, Spatularem uocat humerariæ partem à iugulari externa ad eam usque sedem ductam, quæ humeraria brachij cutem primum subit, quæ pars duobus a in nostra delineatione complectitur. Quæ autem humeralis brachio exportigitur, illam Cephalicam quasi capitis uenam nuncupat. Hæc inter inferius a & f continetur. Tertium humerariæ ramum, quem i insigniuimus, Funem brachij appellat. Axillaris ipsi Afellaris dicitur. Communis uero a notata, Nigra: ubi autem hæc oblique ad radium contendit, Basilica ipsi uocatur. Alterius*

terius communis uenæ cruris, illius nimirum diuisionis quam γ aut Υ assimilauimus, sub anulari & indice porrectus, Syelen Auietnæ appellatur. Verum aliâs subinde apud Arabes & barbaros illam Syelem uocari obseruabis, quæ iuxta brachiale ab humerariæ ramo i notato, & axillaris uenæ propagine x insignita constituitur, & I notatur, cui eadem quæ axillari medicorum uulgo nomina imponit, hanc quoq; Saluatellam & Salubrem uocans. Quamquam rursus communis uenæ ramum γ notatum uersus pollicis & indicis regionem exporrectum, alij saluatellam uocent, huic eadem quæ humerariæ nomina largientes. Ad hæc, axillaris medicis p̄otissimum Basilica, interdum & Nigra, aliquando & Funis brachij nuncupatur. Humexaria etiam ocularis & auris, quod scilicet earū partium inflammationibus medeatur. Nisi forte horum nominum impositores adeo stulti fuerint, ut cum Aristotele & illis qui hodie uenas à me rectè antea pictas turpiter in lucem suo nomine emisserunt, arbitrati sint humariæ ortum sub aure primum esse. Cæterum communis uena Media, Mediana & Corporalis uulgo dicitur.

§ VENA E caue portio, qua inferioribus corporis partibus nutrimentum administratur.

¶ Vena in pinguem membranamq; sinistri renis tunicam, conterminasq; sedes excurrrens.

θ Grandis uena ad dextrum renem exporrecta.

ι Grandis uena sinistram renem petens, hæc, uti & dextra, quod serosum sanguinem ad renes deferat, serosusq; humor quodammodo ab ipsa emulgetur, Emulgens uulgo nuncupatur.

κ Propago à uena in dextrum renem deducta, in pinguem renis dextri tunicam excurrrens.

λλ Seminalis uena sinistra. μμ Seminalis uena dextra. Hæc uenæ in progressu peritonæo cui ad dorsum firmantur, hærentq; furculos communicant, & ramulos membranis testem uasq; seminaria ambientibus diffundunt.

ν Seminalium uenarum sedes, quæ hæc primum implicari, ac uaricum modo conuolui incipiunt.

ξ Venæ geniculatim à caua in dorsalem medullam, quæ lumborum uertebriis continetur, ac demum ad ipsas lumborum uertebrias, ipsisq; accumbentes musculos & peritonæum digestæ.

ο Venæ caue supra osis sacri initiū in duos trūcos distributio, Δ aut inuerso γ aut V nō dissimilis.

ϖ Ramus utriusq; amplius, transuersim in peritonæum & lumborum carnes, abdominisq; musculos distributus.

φ Ramuli aliquot in superiora osis sacri foramina missi.

ρρ Sinistri trunci magnæ illius super os sacrum bipartitionis in duos ramos distributio, quorum interior ρ notatur, exterior σ.

ττ Interioris rami, quem ρ notauimus, exterior propago, in musculos exteriorē ilium osis sedem occupantes, & in clunium cutem conterminasq; partes frequenti ramorū serie transuersim digesta.

υ Interioris rami ρ insigniti interior propago, atq; eius propaginis rami humilioribus sacri osis foraminibus distributi. χ uero & ψ reliquas interioris huius propaginis soboles, uti hac parua tabella eas delineare datum est, exprimunt. Porriguntur autem illæ ad ani musculos, uesicæ fundum, & ceruicem: mulieribus etiam ad humiliorem fundi uteri sedem, ipsumq; adeo uteri collum.

ω Vena ab exteriori ramo, quem σ indicatum conspicias, deprompta, atq; cum reliquo interioris rami ρ notati coiens, quæ id pubis osis foramen perreptat.

ε Hæc sedes uena pubis osis foramen permeans, præter alios ipsius furculos uenulam in coxendicis acetabulum porrigit, hicq; in istius regionis musculos disseminatur.

ζ Vnus ex ramis uenæ pubis osis foramen transeuntis notatur, qui cutem ad internam femoris sedem inibi subit.

χ Congressus dictæ nuper uenæ, cum ramo magnæ in crus distributæ uenæ perficitur, quem ζ notabimus.

Γ Vena ab elatiori sede exterioris magnæ illius trunci rami, quæ is peritonæum perforat, principium ducens, quæ peritonæo et abdominis musculis cutiq; ramos offert, inter cæteros autem præcipuus sub recto abdominis musculo sursum conscendit, & supra umbilici regionem in aliquot diffusus furculos, eas respicit soboles, quæ huc à uena sub pectoris osse deducta pertingunt, ea uide licet sede cui M ascriptum cernis.

Δ Propago uenæ in crus tendentis, quæ transuersim ad genitalia conterminasq; sedes in furculos exhauritur.

- ⊙ Prima magnæ crus petentis uenæ propago per interiorem femoris tibiæq; sedem sub cutē deorsum ad summum usq; pedem perreptans.
- Λ Propaginis ⊙ insignitæ ramus, femoris interiora ad inguina accedens.
- ≡ Dictæ propaginis ramus ad anterioris femoris regionis cutem uersus exteriora digestus.
- Π Dictæ propaginis ramus, primo tibiam mouentium musculo oblatus.
- Σ Dictæ propaginis soboles, quas in anteriorem genu sedem & posteriorem quoq; dispersat.
- Φ Hac sede propago ⊙ indicata per sedem tibiæ interiorē, sub cutē in uarios multiplicesq; ramos diffinditur, hioq; opportunē dum sanguinem mittimus aperitur.
- Υ Hac ad anteriorem interioris malleoli sedem nuper dicta propago ducitur, atq; uti cernere est in pedis superiora exhauritur.
- Ω Ramus a grandi uena crus petenti in anteriorem coxendicis articuli regionem exporrectus, eiusq; sedis musculus & cuti soboles utrunq; frequentes deriuans.
- 1 Ramus septimo nonoq; tibiam mouentibus musculis & cuti femoris iuxta externam ipsius sedem ramos deducens.
 - 2 Grandis uena in quintum femur mouentium musculum digesta.
- 3,4 His duabus propaginibus inuicē cōiuntibus uena cōstituitur, quæ inter musculos posteriorem femoris sedē occupantes excidens, sursum in femoris cutē ramos porrigit, quos 5 insigniui. Verū
5. maiori ipsius parte 6 notata sub cutē per poplitem genū ue flexū fertur, & in suræ cutē numero
7. sa serie inibi digeritur, ubi 7 ascriptum spectas. Porro in delineatione, obscurus ille ramulus,
8. qui 8 respicit, deorsum magis deberet ferri: neq; sat scio qua uel mea uel sculptoris negligentia, is illic desinit. Verū mediocris est negotij illum uersus 8 notam, calamo deorsum protrahere, quum in dextro crure illum non neglexerim.
- 9 Magnæ crus petentis uenæ in duos ramos distributio, quæ hæc inter duo inferiora femoris ossis capita continetur.
- 10 Interior dictæ diuisionis ramus, ad posteriores suram tibiæ ue uentrem constituentes musculos et
11. ad cutem internæ sedis tibiæ suræq; digestus, inibiq; 11 insignitus.
- 12 Dicti iam rami quem 10 notauimus portio, secundum interioris malleoli posteriorem sedem ad internum pedis latum exporrecta.
- 13 Exterior ampliorq; ramus diuisionis 9 insignitæ, qui mox in alias duas impares propagines digeritur.
- 14 Dictæ modò diuisionis exterior propago.
- 15 Exterioris dictæ modò propaginis portio externum perreptans malleolum.
- 16 Interior illius diuisionis propago, quæ inter tibiæ & fibulæ medium quæ hæc ossa inuicem debiscunt deorsum fertur, inter musculos uidelicet posteriori tibiæ ossis & fibulæ sedis adnatos, & ligamentum quod hæc ossa secundum tibiæ longitudinem mutuò colligat.
- 17 Diuisio interioris propaginis 16 insigniti, quæ ad medium longitudinis tibiæ perficitur. Atq; hæc alterum ramum inter calcem & tibiæ os ad pedis inferiora mittit, alterum uerò inter fibulam & calcem.
- 18 Soboles iam ultimo commemorati rami, quæ inter tibiæ os & fibulam per membraneum eorum ossium ligamentum in pedis superiora digeritur, alijsq; uenis hæc proreptantibus commiscetur. Atq; ita quatuor fere uenarum radices ad pedis superiora surculos porrigunt, nimirum 12, 8, 18, 15 insignitæ.
- 19 Venarum ad digitos series indicatur. Præter hanc cauæ uenæ delineationē, & plerasq; quinti sexti et septimi librorū figuras, huc imprimis spectat quæ ad horū librorū Epitomē parauimus, & huius libri calciuarias ob causas uti commodissime fieri potuit insuendam duximus. Quotiescunq; igitur in quatuor subsequentium capitum interiori margine simplex character occurret, illum ad nudam cauæ delineationem refer, quam siue sexti Capituli libri tertij figuram, siue figuram sexto tertij libri Capituli præpositam alibi in margine uocemus, nihil interesse arbitror.

QUONAM PACTO VENAE CAVAE SOBO

les in iecoris substantia, portæ uenæ propaginibus committantur, quæ ratione uenæ caua à iecore prodeat, aut in ipsū ramos diffundat. Caput VI.

Quoties alicubi in interioribus marginibus figuram sexti Capitis libri tertij scribimus, nudam uenæ cauae delineationem indicamus, ne semper addendum sit, figura sexto Capiti præposita.



ROLI XE admodum de uenæ cauae exortu agendum esse, si quis autem cōtrouerfiam in medium adferendam arbitraretur, cum pleraque Galeni loca, ipsius operibus passim interiecta, tum maximè sextus de Hippocratis et Platonis dogmatibus liber attestantur, quæ uniuerfium huic questioni, ex quo nam uiscere uenis origo ducatur, dedicauit. Si enim ex proposito eadem disceptatio mihi aggredienda foret, neutiūquam Galeni argumenta ofcitanter præterire liceret, quin singula seorsim essent accuratissimo studio examinanda, & quæ uera, & quæ falsa ducerem, enarranda. Haudquaquam enim adeo Galeni uerbis acquiescendum est, ut omnia quæ illic in Aristotelem congerit, uera in dubitataque esse ducamus. Vti iam in sermonis progressu, qui ueram uenæ cauae seriem enarraturus est, cuius reddetur obuium. Quippe relicta de uenæ cauae ortu (de quo non immerito Herophilus ille Anaromicorum coriphæus ambigebat) contentione, ipsius distributionem aggrediar, quam quidem à corde auspicar, si modò à maxima amplissimaque uenæ cauae sede hanc auspicandam opinarer. Nam contra Galeni placitum, in Aristotelicæ sententiæ robur, uelimus nolimus, nobis quantumuis etiā ringentibus, fatendum erit, uenæ cauae orificium quod ad dextrum cordis sinū pertinet amplius esse, quā uenæ cauae corporis amplitudinē, quācūque etiā ex parte hāc metiendam duxeris. Deinde subsequens Caput commentum Galeni fallum esse docet, quo cauam, quā iecoris gibbo committitur, amplissimam esse astruit, quodq; illam statim ab exortu in duos truncos arteriæ magnæ modo findi, ac unum superiora petere, alterum uerò deorsum explicari, & postmodum ex illis truncis eum qui deorsum secundum lumborum uertebras fertur, grandiorē esse tradit. Vnde etiā ilico in Galenum propria ipsius iacula, quæ ex fontium fluuiorumque ductibus & arborum radicibus tanta industria et callidè texuit, repellēda ueniunt. Eodem modo Galeni dogma prorsus est respiciendū, quo uenam cauam ex corde prodire inficiatur, quod illic non similiter, ut magna arteria, enascatur, hoc est, quod mox ab ortu in duos truncos nō diuidatur, sed rectā secundum cordis latus ducatur. Primum enim, ut falsum & dissectionis professori indignissimum est, Galeni axiomā, quo uenam ē iecoris gibbo pronatam in duos truncos, perinde ac magnam arteriam, pariter affirmat: ita etiā non sua demonstratiua methodo concludit, hac occasione cauam à corde non oriri, quod rectā secundum cordis latus porrigatur. Nam si quis arteriæ ortum attentè examinauerit, animaduertet profectò (quod & Galenus nō ignorabat) illam ē cordis basis medio tanquam ex ipsius centro enasci, ac proinde si arteriæ pars aliqua deorsum ducenda fuerit, ab ortu statim arteriā necessariò diuidi oportuisse. Venam autē quæ ex cordis basis latere (utpote uas mollius quā arteria) secundū Aristotelis sententiā enascetur, nō oportuit in duos truncos statim ab ipso ortu discindi, quum circa diuisionem peropportunè sursum deorsumque reperire possit, illaque diuisio in cassum fieret, præterquam quod prorsus esset inartificiosa. Nam si hinc prodians uena, arteriæ modo bifurcetur, primum ipsius origo & caudex aliquoufque in dextram thoracis sedem omnino proreperet, ac inde primum diuideretur, cuius diuisionis trunci denuò sinistrorsum deberēt duci, si modò uersus corporis mediū (ut nūc fit) cauae caudex porrigi debuisset. Accedit huc Galeni argumentū, nūc nō grauius ab ipso resumptū: Si cor uenarum esset principiū, omnes uenas necessariò oportuisse ad cor ptingere, uti sanè ad iecur pertingunt, quasi uerò



HAC figura finiti cauae seriem, quam necessariò moliretur, si in duos truncos ad cordis dextrum latus discinderetur. Quod autem hoc Galeni argumentum toties ab ipso repetitum, et optima demonstratio nis loco habitum, accuratius obserues, cōfer præsentem figuram cum aliquo sexti libri et postissimum cum quinta, & etiā cum totius cauae figura, ut animaduertas quā illa circa diuisionē obliquari oportuerit, ut ex dextro dorsi latere ad ipsius medium ptingeretur.

arterialis uena ad iecur non minus, quā portæ uena ad cor, accederet. Aut si forte Galeni sententiā suffragari contenderimus, arteriā uenam ob id ad iecur nō pertinere, quod arteriæ confet corpore, concedamus rursus oportet uenalem arteriam uenæ corpore efformari, atq; ab illa sinistri cordis sinus sede principium petere, à qua caua ē dextro cordis sinu nascitur. Adde & hāc nō secus ab origine in dextrā pulmonis sedem et in sinistram duci, quā caua sursum ac deorsum à corde ducitur: ac dein uenam arterialem aliquādiu unum caudicē ab ortu fer

uare, ac postea in duos truncos diuidi, perinde sanè ac magna arteria, quæ similiter ac uena illa arterialis è cordis basili medio, nasci, suo loco docebit. Præterea irrefutabilis illa (ut Galenus inquit) demonstratio, quam in Aristotelem de animalibus dextro cordis sinu destitutis contexit, minime efficax est: quandoquidè illis animalibus caua uena unico cordis sinui eum in modum tunc conmittitur, ut in alijs dextro sinui, quum & his animalibus sanguis à iecore ad cor artiarum saltem nomine (etiam si non pulmonum occasione) diffundatur. Et quis obsecro eò uenit stupiditatis, ut Aristotelem cauam uenam eiusmodi animalibus ex dextro uentriculo, quem non habent, exoriri uoluisse cum Galeno dicat, & non cognoscat Aristotelem aliud orationis genus de animalibus pulmone destitutis, quàm de illis quæ hoc non priuantur, institutum fuisse? Ad hæc, quis perfunctoriè in dissectionibus uersatus ambigit, argumentum quod à membranulis uenæ cauæ orificio præfectis ducitur, per uenalis arteriæ membranulas dilui posse? Neque satis scio quid de autum uenæ cauæ distributione Galenus comminiscatur, quum nihil peculiare in uenæ cauæ serie in illis obseruem, nisi quod iecur duabus fibris seu lobis ipsis priuatim constituitur, à quibus si caua principium ducit, profectò atque ad totius medicinæ principis placita, nimis uilipendere, ac seriatim ipsius quæ adhuc reliqua sunt argumenta refellere uidear, & non potius tanquam pro aris & focis unà cum alijs medicis, qui manus sectioni nunquam adhibent, pugnare, ac probabilia saltem asserendo defendere, à iecore seriem uenæ cauæ iam aspiciam, quod ab hoc sanguinem in cauam deriuari, aut saltem ex portæ propaginibus in cauæ soboles assumi non negem. Ortum uerò cauæ hinc esse non ita annuo. Neque quicquam à me de ipsius origine asserum uolo, quicquid etiam casu mihi inter scribendum exciderit, ne hircosis quibusdam medicis calumniandi ansam ipse suggeram, qui non nisi huius generis nugas morantur, & interim ossium ac musculorum cognitionem & uasorum reliquam seriem tanquam ad se nihil pertinentem rejiciunt: & si forte hic quicquam texere in me possent, mirè suis pestilentibus odijs nostraducerent, probe & tacite ad innumera loca conuiuentes, in quibus Galeni lapsus Anatomicos hæcenus ostendi: & fortè in posterum illos silentio uel ob hoc non sum præteriturus, ut eiusmodi syncophantis & uililigatoribus inuidiæ, & in illis quæ propter inscitiam auersantur exercendi argumentum præbeam. Verum ideo de cauæ principio ex iecore nihil absolutius subiiciam, quod iecur mihi potius è uenis quæ ipsi intextuntur, quàm uenas ab ipso, uel etiam in prima fetus conformatione, originem ducere colligatur. Aliud enim nihil in quinto libro iecur esse audies, quàm uenularum infinitam sobolem, cui concretus sanguis (qui propria iecoris est substantia) obnascitur, quum interim uenæ cauæ os ad cor pertinens, simile prorsus sit magnæ arteriæ, & uenalis arteriæ arterialisquæ uenæ orificijs: quæ à corde enasci nemo sanæ mentis inficiari potest, si modo diuersæ quasi substantiæ corpus (ut ligamentum ab ossè) ex alio pronasci affirmare audeamus. Cæterum quemadmodum (ne fortè rursus aliò excurrat oratio, cui, ne prolixior fiam, rationes nullas ex sententia addo) ab extremis iecoris partibus orbiculatim ex ipsius concaua sede exiguas uenularum propagines paulatim ad iecoris medium uersus posteriora contentes inuicem coire, maioresquæ uenas constituere diximus, et deinde ex maioribus illis rursus grandiores tantisper effici, quousque omnes illæ soboles in uenæ portæ caudicem finiunt: pari etiam ratione ad concauæ uenæ generationem (ut ita modò loquar) ex summis orbicularibusque iecoris finibus, in gibba ipsius sede, innumeræ uenularum propagines exoriuntur, quæ sensim uersus medium posterioris sedis iecoris prorepentes, in insigniores uenas coeunt: atque hæc rursus in ampliiores eousque colliguntur, donec tandem in elatiori iecoris parte, qua dextram uertebrae sedem respicit, in unam congregiantur uenam, quæ ab insigni amplitudine Græcis *ὁρμήν, μεσολήν* interdum, & *εὐλεχίαν* (quemadmodum & portæ uena) deinde & *ἡπαρική*: in Arabum autem interpretibus uocatur hanabub, uena uentrem habens: Latinis uerò caua, magna & iecoraria, rariùs autem caudicis uena nuncupatur. Vnde uerò nonnulli hanc Galeno communem uocari scriperint, non satis assequor, quamuis existimem hos illa delusos uena, quam eo nomine in cubito peritiores medici uocant. Vti etiam dextri

Venæ caudicis distributionis descriptionem à iecore incipientem.

Cauæ in iecore series.

Cauæ uenæ nomina.

17 fl. lib.
K. L. M.
m. 9 fl. lib.
E. F.

n. 7 fl. lib.
C. C. C.
ita inuicem
conferes
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.


q. B. 1.

r. a.


dextri cubiti axillarem, Hippocrates iecorariam, non minus quam ipsam cauam quæ cordi proxima est, appellauit. Porro uenæ cauæ rami per iecoris corpus exporrecti, portæ ramis incumbunt, & utriusque uenæ ramulorum extrema osculis inter se conniunt, ut cauæ propagines optimè ciliis sanguinem iecoris beneficio in portæ ramis elaboratum, ac bile flaua faculentos sanguine repurgatum, transfundant, & postmodum uniuerso corpori ad partium nutritionem deducant. Venarum itaque cauam constituentium, atque è iecore educatarum coitus, non in medio gibbi iecoris perficitur, ut Anatomicorum uulgus ridiculè arbitrat: sed, ut iam prius admonui, in ea parte iecoris quæ dorsi seu spinæ dextro lateri proxima est. adeo sanè ut nihil prorsus substantiæ iecoris toti posteriori uenæ cauæ parti, quæ dorsum spectat, obduci cernatur. Neque rur-

ca. s. B.
stuitur
A, C,
cha. 1.
3, 4, 5.

ter A in
ignitur.



uene portuicula insinuat. ceteri characteres aliò quam ad præsens Caput referuntur.



ginem notat. B uero cy B propaginem indicans, quæ per dextram iecoris sedem
stergitur. Cauæ & C paruas soboles insinuat, quæ iecori etià à cauâ præter
duas maximas propagines, diffunduntur. Nihil enim interesse uelim, an propa
gines hæc cy soboles à iecore enatas cauam constituere dicam, an à cauâ iec
coris substantiam diffusas. Ceterum D cauæ uenæ sedes notatur, quæ hæc se
ptum permeat, ipsiq; ramos deponit.

PRÆSENS fi
gura iecoris gibbi posteriori
ipsius sedem monstrat. cc A
quidem cy A indicans elatio
rem gibbi regionem septo trans
uerso uersus anteriora conuer
nam. B uero cy B regionem hu
miliorem. C cauæ uenæ pars no
tatur, quæ hæc septum permeat,
ipsiq; ramos exporrigit. D ad B
usq; sedem indicat, quæ cauæ iecoris
substantia adnascitur. H portæ

H AEC figura uenæ cauæ
portionem oculis subiicit, poste
riori iecoris sedi exporrectam.
Hanc longa sectione secundum
posteriorem uenæ sedem ducta
dissecuit, ac dein descendit, ut pro
paginum foramina, quæ caui
tecur diffundit, aut quæ cauam
constituunt, in conspectum ueni
rent. A è utriusque cy pro
paginis quæ à cauâ in sinistram
iecoris sedem disseminantur, ori
ficiunt, cy ipsam denique pro

ya.

de duas insignes uenas pullulare, numerosa serie in iecoris substantiam diffusas. Præter eas uenas quas cauâ, simulatque deorsum à corde descendens, iecoris substantiæ adnascitur, iecori offert, in reliquo ipsius per uisceris posteriora descensu (qui sanè breuissimus est) paruos etiam spectabis ramulos ab anteriori cauæ sede etiam in iecoris substantiam excurrentes, et in omnibus hominibus numero neutiquam pares. Atque hæc omnia sedulo hominem secanti, adeo sunt obuia, ut nullus nunc uenæ cauæ seriem spectans, non multò magis probauerit hanc, quod ad seriem, non autem sanguinis ductum attinet, oportere à corde primùm describi, ac demum ipsius ad superiora inferioraq; ductum esse enarrandum. Sed quum concedam, sanguinem qui in cauâ passim continetur, à iecore confici, uenæ cauæ ramorum distributionem à iecore quodammodo auspicatus sum, ac deinceps eam uenæ partem primùm describam, quæ supra iecur consistit, non eam quæ ad partes iecori subditas porrigitur: longè omnibus de cauæ ortu postpositis altercationibus. Quamquam interim sedulo studiosos adhortor, ut nullis autorum suffragijs fidem dantes, ipsi non modò hominis iecur, uerùm & simiarum & canum, quibus alia iecoris forma accidit, aliaq; ramorum à cauâ in iecur series, accurate secant, ac uenæ cauæ iuxta iecur & cor progressum examinent, dummodo inuiti quoque Anatomicos parte delectentur. Quo autem id fieri debeat artificio, partim in calce quinti libri, partim & in sextilibri sine docebitur.

quæ supra iecur consistit, distributionis series.

Caput VII.



*Cauæ partem
septum trans-
uersum, illa que
sub iecore posi-
ta, non arcti-
orem esse.*

AVDQVAQVAM Galeno & reliquæ Anatomicorū turbæ illius pla-
cita sectanti satis fuit, falsum uenæ cauæ ortum à iecore comminisci, ac ut
ab Aristotelis placito uerius declinare uiderentur, fingere, uenam cauam
mox à suo iecoris gibbo progressu in duos truncos arteriæ magnæ mo-
do bipartiri, unumq; ad superiora corporis, alterum uerò ad inferiora du-
ci: quinimo ut etiam probaret sanguinem in corde non generari, adijcere
nō ueritus est, truncum qui superiora petit multò strictiorē esse, minusq;
amplum illo qui deorsum porrigitur. Sed iam asseruimus, cauam in eiusmodi truncos non di-
uidi: & etiā ueritati neuitquā cōsonum est, cauæ uenæ partem quæ inter iecur^d dextramq; cor-
dis aurem conspicitur, angustiorē illa uideri, quæ sub iecore lumborum uertebriis explicatur,
quod nō perfunctoriē inter disseccandum obseruari uelim: quo minus aliquis, qui mihi fecan-
ti nō astiterit, aut ipse sectionem studiosè non fuerit aggressus, hæc me confingere arbitretur.
Nam si quis obiter sectioni studium impendat, & iecur aut cor, aut aliud mēbrum inter secan-
dum mouens, plus sanguinis in uenæ partem uertebriis lumborum exporrectam, quàm in illā
quæ supra iecur habetur propulerit, is sanè Galeni sententiæ subscribet. at si uicissim ex hac ue-
næ parte in illā sanguinē compressum sursum duxerit, leui opera Galeno non amplius assente
tur. Præterea, ubi hæc sectione indagauerit, necessum est Galeni rationem pressius expendere,
qua conficit ascendente uenæ partē multò oportere minorē esse descendente, quòd hæc plures
quàm illa partes enutriat. Nam si hæc Galeni ratio uera est, etiā citra sectionē ipsius commentū
nulli nō innotescet, quandoquidē ascendens pars plus sanguinis contra Galeni dogma, quàm
inferior quæ lumborum uertebriis exporrigitur, requirit. Primum enim neq; bilis uesicula, neq;
pancreas, neq; intestina, neq; omentum, neq; mesenterium, neq; lien ramulum aliquem à ca-
ua assumunt, hæc q; sub iecore collocantur. Verum soli renes, altera uesica, testes et crura, & in-
ferior abdominis pars ab ea quæ descendit cauæ parte sanguinem adipiscuntur. Ab ascende-
nte uero septum transuersum et uniuersus thorax alitur. nam & thoracis pars iecori proxima, ad
secundam usq; lumborum uertebram pertinet, à uena coniugis experti nutrimentum obti-
nere audies. deinde manus, collum & caput uniuersum, ut taceam nūc sanguinis copiam in ce-
rebrum tot uenis scaturientem, et eam quæ in cor defertur, non solum cordis & pulmonis om-
nium maximi uisceris nomine, uerum & omnium arteriarum quas sanguine ad cor delato im-
pleri credimus, & arteriæ demum, si cum descendente cauę portione comparentur, quanto mi-
nus quàm illa sanguinis continent: Sed quorsum spectat eiusmodi rationes, ut Galeni placitū
subuertatur, colligere, quum sectio iam admonitis studiosis abundē non hoc solum infirmit,
sed & alia quæ in Galenilibris de Hippocratis & Platonis decretis passim leguntur, quamplu-
rima, à medicis propter secandi imperitiam, & nimiam quam autoribus damus fidem, tanquā
Apollinis oracula, libenter concessa. Cæterum ego in præsentia relictis Galeni placitis, partē
cauæ ascendente lubens persequer, quò oratio uera duntaxat enarrans minus excresceret,
& Galeni nomine non interrupta, longè redderetur faciliior. Verum ea ipsius est autoritas, &
nostra in illum obseruantia, ut nisi ipse interdum quando illius sententię non acquiesco, admo-
nerem, nullus non me falsissima proponere sibi persuaderet: quum interim collatis inuicem ad
hominis sectionem locis, in promptu sit, an perperam ab illo declinem. quod si alibi accidit, pro
secto nunc in uenæ cauæ serie mihi quantum uis inuito continget: quam prius aliquousq; uerē
persequar, ac postmodū ubi à Galeni dogmatibus sermo dissenferit adijciam. Vena itaq; cauā
neruosam septi transuersi partem in dextro ipsius latere peculiari foramine^e permeat, unā etiam
cordis^f inuolucrum perforans, quod insigni amplitudine tum alibi septo continuatur, & con-
nascitur, tum potissimum ubi caua septum transiit, ac septo^g duas non uulgares offert propagi-
nes, per uniuersam septi sedem multiplici fohole excurrentes, & ramulos quoq; cordis inuolu-
cro, quā id septo committitur, diffundentes. Quum primū uerò caua septum^h superauit, mo-
dicè uersus sinistrum cordisq;ⁱ basis dextrum latus procedens, sinistro ipsius latere^j adaperi-
tur, atq; in dextrum cordis sinum pertinet. Non quidem ut Anatomicorum sæx scribit, aliqua
propagine aut ramo quopiam, uerum duntaxat foramine quodam seu scissione eadē ampla, ut
cauæ uenæ amplitudo ipsi neuitquam conferenda sit. Anteriori cauæ uenæ parti hīc^k dextra
cordis auricula connascitur. A posteriori uerò cauæ ad cor connexus sede^l, insignis uena
promitur (non autem, ut Galenus libro de Venarum sectione docet, exigua) quæ secundum
cordis

*Cauæ per sep-
tum transuersum
ac ipsius in sep-
tum rami.
Cauæ in cor-
dis dextrum si-
num adaperi-
tio.*

*Cordis basin
cingens uena.*

*a respondet
B, f.
b si lib.
B.*

c F, f.

d B.

*e 7 misse
ta. f. propo-
a.*

*f 3 si lib.
C, D. E, F.
G. 4 fig. B.
B.*

*g C altera
notatur.
b si lib. a.
D.*

*i 4 si lib. a.
C, D.
k D. et
si lib. 6 C, D.*

*l si lib. 6 B.
m E. et
si lib. 6 G. et
6 si D.*

cordis posteriora & sinistrum latus ita porrigitur, ut cordis basim coronæ modo succingat, ac ab inferiori ipsius sede ramos deorsum ad cordis usque mucronem dispergat. quorum præcipui sunt, qui cordis substantiam illic petunt, ubi hæc est crassissima. Vnde etiam frequentiores uenas sinistro cordis lateri, & ubi sinuum ipsius septum consistit, nobis occurrunt. Hæc uena interdum gemina uisitur, grandiori quidem à posteriori sede orificij cauæ initium ducente, minori uero ab anteriori sede. Verum longè sæpius unica tantum obseruatur, etiam si Galenus alibi hanc perpetuò geminam esse scripserit. Vena caua à cordis basi sursum ascensura gracilior fit, & cordis inuolucrum perforat, & uersus corporis medium sensim ducta magnæ arteriæ innititur, non autem retrorsum ducta uertebrarum corporibus insidet, quæ à stomacho occupantur, cui rursus aspera incumbit arteria, & huic non infima magnæ arteriæ propago cui ultimo caua inseritur: adeò sanè ut quum caua tantum à uertebris distet, mirabili artificio illis uena fuerit offerenda, quæ ipsis costis quæ sanguinem subministraret. Quum enim septum transversum impedimento sit, quo minus caua ubi sub iecore exporrigitur, ac renibus soboles dispensat, uertebris costisque propagines tribuere queat, & deinde quum cordis basis adeò à uertebris eleuetur, & uasa in pulmones diffusa caua à uertebris ita subleuent, ut etiam hinc ad ipsas caua nullos deriuare queat ramos, rerum Opifex à caua magnam eduxit propaginem, postquam hæc cordis inuolucrum transcendit, atque pulmonis dextræ partis cum sinistra connexum (qui uasorum pulmonis interuentu perficitur) superauit, ipsaq; dorso propinquius quàm antea accedit. Hæc propago seu uena à dextro caua latere pronata, deorsum ad quartæ propemodum thoracis uertebræ corpus contorquetur, & decliuus secundum dextrum uertebrarum latus porrecta suo fine unà cum magna arteria, sub septo transverso ad aliquot lumborum uertebras pertingit. Hæc uena, cauæ uicem toto progressu gerit, quos ipsius caudex uertebras ita atque in lumborum regione nequiuit contingere, ac geniculatim ramos ad uertebras ipsas quæ adeò dorsi partes offerre. Porro caua hanc sine coniuge & pari uenam à se tam grandem deprompsit, ut arteriæ magnæ ritu utrinque ad costarum interualla, ut nunc dicam, ramos germinare posset, quos quidem à lateribus non diffudit, sed ex media regione posterioris ipsius sedis, quæ uertebris innititur. Quia uero coniuge priuatur, neque in altero latere parem afficit à caua propaginem, & ὅτι ὅτι Græci, nos uenam absque coniuge, & paris expertem nominamus. Oritur autem potius à dextro caua latere, quàm à sinistro, quòd secundum dextram dorsi sedem explicari debuit, sinistra nimirum sede, & media quodammodo à magna arteria dignissimo organo occupandis. Ab anteriori etiam caua sede non enascitur, ne frustra tunc longiori ductu quàm nunc uersus dextrum reflecti, ita quæ spinam accedere deberet. A posteriori quoque principium sumere nequiuit, quòd hæc sedes alijs incumbat organis, quòdque hinc uenam coniugis expertem dextrorsum magis deduci, quàm nunc, oportuisset. Ab hac uena utrinque geniculatim pullulant propagines, singulæ ad unum nouem costarum inferiorum interuallum perreptantes, quæ in uerarum quidam costarum interuallis ad eam usque sedem contendunt, ubi hæc in cartilaginem degenerant: in spuriarum uero costarum interuallis, etiam in anteriora magis abdominis, quàm interualla pertinent, propagines hæc pertingunt, abdominis musculis etiam implicite. In ipso autem per costarum interualla progressu ramulos diffundunt, qui in musculos illi thoracis sedis quam ipsæ perreptant incumbentes, disperguntur. Præterea ab hac sine pari uena ad singulas secundum quas deducitur uertebras soboles quædam pertinent, quæ in uertebrarum corpora, & dorsalem medullam, & in musculos his sedibus accumbentes excurrunt. Præterea membranis thoracem intersepientibus, qua illæ dorso continentur, ab hac uena surculi etiam offeruntur. Deinde non obaudiendum est, ab huius uenæ lateribus, quam primum ab ortu uertebras contingit, subinde ramum quoque educi, eumque in tenues propagines diuisum, etiam sui lateris superiores costas adire, atque inibi in membranam costas succingentem numerosis, sed gracilibus surculis distribui. atque hi non seriatim ac rectà secundum costarum ductum feruntur, quemadmodum rami inferioribus costis digesti, uerum errabundo ductu excurrunt. Atque id adeò frequenter in hominibus (quòd his scilicet multò breuior thorax, quàm quadrupedibus, à natura datus sit) usu uenit, ut eodè anno in publica sectione in uiro & item muliere omnes thoracis costas enutriti, interdum Patavij uiderimus. Et Bononiæ etiam (ut priuatas sileam sectiones) quum primò illic dissectioni præessem, atq; de uenæ sectione in laterali morbo satis pertinaciter contenderetur, una eademq; demonstratione tria nobis obrigerunt hominū cadauera, quibus omnes thoracis costas huius uenæ propaginibus enutriti, nemo ex tanto eruditorū uiroꝝ cœtu inficiari potuit. Atq; ut id subinde obseruatur, ita sane interdum hanc sine pari uenam, quum ad nonam ferè thoracis pertingit uertebram, in duos

Li. 7. de Ad. mi. dissectione.

Qui uenam coniugis expertem à caua educi oportuisset.

Varia uena paricarentis series.

DA
bus his figu-
ris geminā
uena pari
carentis se-
ries expres-
simus, quae
ab illa uari-
ant, quā in-
tegra uena
cauae desine-
re indicar-
uit. Notat
autē hic *A*
uena sinis-
tri truncum.
B ipsius ra-
mum, qui in
sinistram du-
ctus, in plu-
res digeri-
tur propa-
gines. Cui
rō in infe-
riori figu-
ra, insinuat
cauae uenae
caudicis por-
tionem.



truncos diuidi cernes, quorum unus quidem dextri lateris costarum radicibus, alter autē sinistri exporrigitur, suiq; lateris costis, quā pro-
rept, ramos offert. Interdum uerō à sinistro uene pari carentis latere
in eadem propemodum regione, grandem uenam pronāsci obserua-
bis, illi prorsus similem quā à portā uena inferiorem omenti mem-
branam adeuntium facillē maxīma est. Hæc enim ubi primum trans-
uerſim vertebræ illius cui exporrigitur corpus transcendit, in duos
ramos diffunditur, quorum alter sursum, alter deorsum secūdum co-
starum radices fertur, ac suarum costarum interuallis ramos deriuat.
Non secus sanē quā si Natura aliquando maluisset, unum grādem
ramum à dextro latere hīc ad sinistram porrigi, quā super singulas
vertebras unum tenuē gracilemq; ramulum ferri. Adēo ut mihi etiā
persuasum sit (quamuis id nunquam uiderim) interdum à sinistro
cauæ caudicis latere, ubi iugulum contingit, uenam depromi, quæ se-
cūdum sinistram uertebrarū latas decliuſ ducta, sinistris costis ramos
offerat, illa quam sine pari uenā nuncupamus dextas costas dūtaxat
alente. Atq; huiusmodi uenæ ortum nō tantū à iugulo primum pos-
se fieri, sed paulō inferius, etiā agnus attestatur, in quo tale aliquid se-
mel obseruaui. Verum eiusmodi non nisi rarissimē occurrentes uena-
rum series, Anatomes studioſo non aliter expendendas putauerim,
quā si interdum sextum in manu digitum, aliud ue monstruosum
se spectandum offerret. Adēo ut si quādo in publicis sectionibus hæc
obseruo, ea tanquā non essent, tacite præteream, ne artis candidati in
omnibus corporibus hæc obseruari arbitrentur. Idq; tanto, nō in se-
ctionibus solum, sed modō in absoluti hominis historia persequen-

*Que hæc-
nus scrip-
ta. Galeni placi-
tis parum con-
ueniant.
Li. 7 de Ad-
mi. sectio.*

*Lib. 6 de Pla-
cit. lib. de Se-
cti. uena. lib. 7
de Admi. c. 2
Commentario
rum in Hippo-
cr. de Vitiis
rati. in morbis
acutis.*

da, faciendum duxi studiosius, quanto pertinacius ipsos monstruosa illa admirari, experientia
non semel didici: quū interim ipsis dolendū magis esset, tale ad integrā sectionem corpus obti-
gisse, quod ab hominū canone plurimū uariet, nisi fortē etiā crebro absolutorū & non monstru-
osorū hominū sectionibus astitissent, Galeni præcepta ad finē libri primi de Administrandis se-
ctionibus nobis datū nunquā negligētes. Porro iam sermoni adiciendū est, mihi hætenus in
homine nihil esse prætermisum: uis sanē arbitrabitur, qui Galeni placita sedulō euoluens, pri-
mū à me quintam pulmonis fibrā seu lobū requireret, quo cauā in interuallo inter septum &
cordis inuolucrum ex Galeni sententia suffulciretur. Quippe quum hunc lobum Galenus
in simijs reperisset, immeritō oscitantē alios dissectionis proceres arguit, quasi illum ignoras-
sent: uti sanē & Galenum is lateret, si hominum cadauera potius quā simiarū secare aggressus
fuiſſet. Quum enim in homine nullū sit interuallum ductus uenæ cauæ à septo in cordis in-
uolucrum, sed uti superius docui, hæc duo simul connata unā semelq; perforentur, nullus sanē
pulmonis lobus hic cōsistere potest, qui in illo interuallo uenā sustineret, nisi fortē hunc (quod
summē est absōnum) in cordis inuolucrum reponi quis sectionum imperitus arbitrareretur. In
caudatis uerō simijs, et magis adhuc in canibus, amplum occurrit interuallū, inter septum tras-
uerſum & inuolucrum cordis mucronē, ac hīc inter membranas thoracē intersepientes inane vacu-
um ue est spaciū, per quod cauā prorept, sibi substratum habēs pulmonis lobū, quo mirabi-
li Naturæ opificio is cauā caudæ tanquam manu apprehenditur et suffulcitur. Proinde quan-
do Galeni descriptionem canibus, nostram autem hominibus conferes, utramque ueram esse
fatebere. Verū Galeni sententia nusquam non à cauā priusquam cor pertingat, uenas in mē-
branas thoracem intercipientes, deduci ac distribui docens, ueritatē parciat, quum hæc membra-
næ uenas assumant, partim ab illis ramis quos à iugulo ad has ferri audies, partim à uena si-
ne pari. Cauā autem quum ad cor fertur, intersepientes thoracis cavitatem membranas ne cō-
tingit quidem, tantum abest ut ramulos ipsis ita tenues ut in illas digeri debeant, offerat. Præ-
rea alius Galenum in libro de Venarum sectione, probē affectus mirabitur, qui priusquam ca-
uæ supra cor progressum attingerem, à cauā statim atque in cor pertingit uenam arterialem in
pulmones porrigi non ascripserim, quum interim illud Galeni sit dogma. Quod quā uerita-
ti consentiat, ipsa ualorum continuitas arguit: quippe quum nihil ab alio pronāsci uerē dica-
mus, nisi id ei sit contiguum, aut saltem attiguum, arterialem uenam à cauā principium duce-
re neutiquā quis asseret. præterquam enim quod arterialis uena sextuplo crassiori constat cor-
pore quā cauā, illa hanc non contingit, sed non mediocri cordis substantiæ portio inter ca-
uæ orificij elatiorem sedem & dextram orificij arterialis uenæ, intercedit. Dein arterialis uenæ
orificium

*Licet hīc
6 libri. 4.
5. 6. fi. 10.
timam hū
ius libri. 10.
diare.*

*e L. 1. fi. 10.
6 M. N. Q.
fi. 1. ca. 15.*

*f 6 fi. li. 6. 1.
8 fi. C. D.*

*g 1 fi. ca. 15.
B. C.*

orificium non minus in cordis dextrum sinum quàm orificium cauae orbiculatim liberumq̃
 pertingit, nihilq̃ minus apparet quàm soboles aliqua à caua ad arterialem producta. Vnde e-
 tiam hæc, quia propriam obtinet circumscriptionem, non minus priuatim quàm caua uenit
 pertractanda. Huc accedit Galeni de uenæ pari carentis principio, sibi non constans sententia,
 Primum enim in commentario decimo secundilibrī in Hippocratem de Viciis ratione mor-
 borum acutorum, sibi ipsi ter pugnat. nam in initio sermonis de uenæ cauae per thoracem di-
 stributione uniuerſim inquit, uenam octo inferiores costas enutrientem à caua pronasci antea
 quàm ad cor pertingat. mox subiicit, in quibusdam animalibus supra cor hanc à caua depro-
 mi: in homine autem ex ea cauae sede eandem emergere docet, quæ hæc dextram cordis aurem
 contingit. Rursus sui oblitus aliquanto inferiùs subnectit, hominis infernas costas à uena enu-
 triri, quæ sub corde à caua exorditur. Huic sententiæ propemodum conformis est, quæ in se-
 xto libro de Hippocratis & Platonis dogmatibus legitur, quum scribit, cordis inuolucrum
 simul cum omnibus membranis, quæ tum thoracis cauitatem interſeipiunt, tum quæ pul-
 monem ambiūt, alimentum ex caua priusquàm ad cor deferatur ſumere. Quando enim inquit,
 καὶ οὕτως πάλαι λέγουσι τὴν πρὸς τὴν αὐτὴν, aliud nihil ipsum intelligere arbitror, quàm membranam costas
 succingentem, quæ maxima ex parte uena sine pari enutritur. Non enim intelligit opinor mē-
 branam pulmonum subſtantia proxime obnatam, quum hæc ne ſurculum quidē à caua mu-
 tuetur. In libro autem de Venarum ſectione, uenā sine pari à dextra auris ſede ad ſiniſtras tho-
 racis partes proficiſci, atq̃ ad quintam thoracis uertebam perferri in quibusdam animalibus
 atteſtatur. In ſiniſtris autem, paulo ſupra aurem in dextris partibus hanc poni docet, plurā que
 hic quàm in libro de Viciis ratione, coſtarum interualla præſenti uena enutriti ſatetur. Ean-
 dem ſententiam in ſeptimo de Adminiſtrandis ſectionibus complectitur, niſi quod hic ipſam
 à uena quæ iuxta dextrum cordis ſinum conſiſtit, pronasci ſimpliciter tradit: quum illic ad ſini-
 ſtras thoracis partes illam proficiſci, malè adiecerit. Quinetiam alio ſeptimi eius libri loco hæc
 E ſine pari uenam ex dextro cordis ſinum non ſecus ac coronalem pronasci docet: quamuis id in
 ſiniſis haud euenit. At non eſt quòd prolixius alia huius ordinis loca ex libro de Fœtus forma-
 tione & aliunde in medium adferam, quum ex modò propoſitis, Galeni de uenæ pari carentis
 ortu progreſſu que ſententia utrunque conſtet. quæ quàm ueritati conſentiat, ex noſtra enar-
 ratione uerum eius uenæ ſeriem proſequentem, petere licet. In homine enim non minus quàm
 in ſiniſis, & canibus, & ſuibus, & bobus, & quotquot uidi quadrupedibus à caua pro-
 cedit, poſtquam hæc cordis inuolucrum ſuperauit, ac eò uſque pertingit, ubi nullus amplius
 pulmonum apparet connexus, qui uasorum interuentu perficitur. Et ſi quis ſectioni fidem de-
 rogans, rationem huius uenæ exortus petierit, illam ſanè adinueniet ex noſtro ſermone, qui
 Naturæ artiſticiū in illius uenæ propagatione ſuperius enarrauit. Haudquaquam enim hæc
 pari carentis uenā à cauae caudice ſub corde enaſci potuit, tum quòd nimium periculoſè ſuſpen-
 ſa fuiſſet, propter ingens interuallum ab ea uenæ cauae ſede ad uertebas uſque conſpicuum:
 tum etiam, quòd ſi illinc uenā pari carentis exoriretur, tota doſi pars ſub corde & ea ſede qua
 eius uenæ principium nunc exporrigitur conſiſtens, uenis indiga relinqueretur: aut Naturæ
 denuò aliam uenam illinc, unde nunc illa enaſcitur, producere debuifſet, illis uertebriſ alimen-
 tum ſubminiſtraturam. E regione autem dextræ auriculæ pronasci nullo prorfus modo qui-
 uir, quòd uafa pulmonem adeuntia, uenalis ſcilicet arteria, & arterialis uena, & aſpera quo-
 que arteria, illam ad doſum ferri prohibuiſſent, niſi ipſa aliquòd uſque prius aut deoſum aut
 ſurſum prorepens, aptam deſcenſus ſui ſedem callidè inueniſſet. Præterea ſi è regione dextræ
 cordis auriculæ uenā paris expers diſfunderetur, ipſa etiam cordis inuolucrum peculiari fora-
 mine ſecus atque nunc permearet, unde etiam uel hinc aſſatim docet, quàm procul à corde
 principium ducat. Neque eſt quòd ad huius ſententiæ robur, hominis doſi quā id cor ſpe-
 ctat obliquitatē adferam: quæ quū multo maior in homine, quàm quadrupedibus aut auibus
 ſit, facilè liceret conſficere, ſine pari uenā hominī etiam altius, quàm illis animalibus à caua opor-
 tere enaſci, quòd his & ſuccinctior ductus è regione dextræ auris ad doſum quàm illi uiſitur:
 tunc proſectò inter ſecandū non ſolum iucundū eſt expendere, ſed etiam promptum. Quamob-
 rem uerò Galenus ita uariè & de hominis uenā pari carente, ipſiq̃ nunquā uiſa, magis perperā
 adhuc quàm de ſiniſtariū uenā ſenſerit, in ea Epistoſa utcūq̃ perſtrinxī, quā dextrī cubiti axillare
 in laterali morbo (ſi modò quid interſit cuius lateris uenā diuidas) ſecādā docui. Galenus e-
 nim aliquam rationē alicundē cōminuſci ſtudiuit, quā Hippocratis ſententiā probabiliorē red-
 deret, quā ſi ſanguinē non mittendum docet, quum dolor inferiori ac ſub ſeptum peti. Quafi
 uerò Hippocrates arbitratus fuiſſet, à uenā ſine cōiuge per phlebotomiā nihil educi poſſe, aut
 eā remotius ab axillari diſtare, quàm ut hæc aut alia que uis, illius gratia aperiri poſſet. quum
 interim

Galeni de ue-
 na ſine pari
 ortu ſententiā.

Vnde uenam
 pari carentem
 enaſci oportet
 tueri.

ſi. li. c.
 B.

ſi. li. c.
 B.

interim in pulmonum, cordis, iecoris, uentriculi, lienis & renum affectibus, uenam in cubito nō Hippocrates solum, sed omnis medicorum chorus fecit. Ceterum quoniam Epistola nuper commemorata, hæc prolixius cum aliquot alijs paradoxis persequitur, cauæ uenæ distributionem deinceps non interrupta sermonis serie aggrediar. ne mihi præter ueræ hominis historię narrationem in hoc negocium augeam, ut ubi à Galeno dissentiendum est ascribam, ipsiusq; sententiam uerbis aliquot refellam: & ne propter meam in eum pietatem, etiā prolixè mihi uenia petenda sit, quo rabularum animos leniam, quos miras excitaturos noui tragicædiæ, si semel atque iterum Galenum purgare, & frivolis quibusdam ratiunculis ab errore uindicare poterunt, parum solliciti, quod tot innumeris locis ipsius placita à ueritate dissona certò (quantumuis interim inuitus) ostendam. Hactenus enim non semel expertus sum, quàm eius modi homines apud dissectionum imperitos gloriari soleant, quum rationem aliquam excogitassent, qua Galenus excusari, aut ut ipsi loquuntur, cum ostensa à me parte concordari possit. Quàm turpiter uerò se tum postea in publicis sectionibus dederint, quum suos Achilles mihi proponerent, ipsi probè norunt. Vena igitur caua, postquam sine pari uenam à se diduxit, ad iugulum recta sub pectoris ossè descendit, membranis thoracem interficientibus elegantè suffulta, molleq; & glandosum corpus hic in iugulo passim adstratum obtinēs, quod Græci *σφυγὴ*, Latini uerò communi glandularum nomine glandium uocant. Est autem glandium id in elatissima thoracis sede exstructum, ut ab omni noxa frequentissimas uasorum distributiones hic supensas, immunes seruet. Vena enim caua inibi primùm in duos insignes truncos discinditur; à quibus omnes uenæ cauæ partis ad elatiora corporis porrectæ soboles pendent. A sinistro namq; trunco, quemadmodum & à dextro, grandis uena promittitur, quæ primæ thoracis costæ innixa postquam aliquot à se dispersit ramos, sub clauicula in axillam^o properat. Ab huius etenim radice exilis uena enascitur, deorsum per costarum radices ad tertiam usque costam exporrecta, & exiguas soboles tribus superioribus costarum interuallis, aliquando duntaxat duobus, deriuans. Præfens uena non semper ab eius quæ axillam petit radice pronascitur, uerum nōnunquam à caua priusquam in duos illos grandes truncos bipartiat, principium ducit. Quinetiam interdum hanc penitus abesse obseruaturus es, aut araneæ filorum modo prætenuem, quum breuiora illarum costarum interualla ab ipsis incumbente uena quæ axillam petit, aliquando autem à uenæ pari carentis propaginibus (idq; potissimum in dextro latere) satis nutrimenti assumant. Ab anteriori sede illius, magna in iugulo bipartitionis, duæ prodeunt uenæ, quæ introrsum ductæ, ad elatiorem pectoris ossis sedem contendunt, & sub pectoris ossè deorsum perreptantes numerosas à se diffundunt soboles. Sinistra (quod & de dextra subauditum uelim) secundum læuam pectoris ossis latem, ubi costarum cartilagine ipsi coarctantur, declinans ad abdominis superiora tendit, in progressu ad sex superiorum septem costarum interualla singulas propagines distribuens, quæ ad terminum ossis costarum ubi uenæ coniuge carentis ramos cessare diximus, finiunt. Quemadmodum uerò à ramis uenæ pari carentis, propagines extra thoracis amplitudinem ad musculos costis instratos excidere relatum est, sic quoque à uenis ad cartilaginum interualla disseminatis, ramuli notatu digni in musculos pectori incumbentes, ipsasq; ad eò mamillas propagantur, si modò ad has à uenis pectoris ossis exporrectis, furculi deriuentur. Porro quod ex uenis sub pectoris ossè deductis reliquum adhuc est, ad latus mucronatæ cartilaginis deorsum in carnosam rectorum abdominis musculorum partem distribuitur. Venæ enim è thoracis amplitudine prolapsæ, sub rectis musculis ad mediam usq; abdominis sedem feruntur, ramulos quosdam in proximas partes utrinque transmittentes. Quorum præcipuus ad abdominis cutem subit, atque oblique secundum costarum cartilaginum terminos propagatus, in gracillimas et capillorum modo subtiles uenulas exhauritur. Ceterum insigniores uenarum rami, sub rectis musculis exporrecti, in plures furculos supra umbilici sedem cessant, qui rectorum abdominis musculorum substantiæ implexi, illarum uenarum terminos finesq; spectant, quas in sermonis progressu, ab imo propter genitalia fursum sub rectis musculis cōscendere audies, quum earum usus quem in menstrui sanguinis ad lactis generationem, & sanguinis item ex mamillarum sedibus ad uterum foetus nutriendi gratia reuulsionem, ipsas præbere credimus, explicabitur. Harum uenarum sub pectoris ossè reptantium originem ex anteriori mediaq; in iugulo bifurcationis sede, ut plurimum fieri animaduertes, interdum uerò eas ab axillarium uenarum radicibus, postquam illæ nōnihil à iugulo medio in latera recesserint, enatas obseruauimus: quæ admodum aliquando alteram ipsarum, & præsertim sinistram ab axillari, alteram uerò ab ipsa bifurcatione pronatæ uidimus: quemadmodum etiā nō infrequenter occurrit ab anteriori uenæ cauæ sede, ubi in duos insignes truncos partitur, unicam pronascenti, quæ fursum ad pectoris os ducta,

Quam ob rem
non semper ser-
moni addendū,
ubi à Gale-
ni placitis de-
clinet.
Cauæ ad iugu-
lum incessus.

Cauæ caudi-
cis in iugulo
bipartitio.

Venæ axillar-
tem constitu-
entis ortus.
Venæ superio-
ra costarum
interualla pe-
tens.

Venæ sub pe-
ctoris ossè de-
orsum repten-
tes.

lab. E. ad
m. 2. fil. lib.
F.

N. H.

O. L.

put. E. sub
m. 1. fig. u.
lib. 6. o.
q. K.

R. H.

5 Altera L.
insignitur.
deus utraq;
2. fi. li. 6. B.
C.

T. G. G.

u. 1. fi. lib. 1.
K. 6. multa.
a. ubi etiam
rectum mus-
culum f. in-
signitur spe-
ciabius.

X. M.

Y. R.

Z. ab. 1.

ducta, in duas diffinditur uenas, ac unam dextro pectoris ossis lateri, alteram sinistro exporrigit. Ab his quoque uenis secundum pectoris os deducendis, membranæ thoracis cavitatem interdiuidentes primos mutuatur furculos, ac subinde etiam à caua ubi nunc dictas promit uenas, ^a graciles quasdam propagines sibi uendicant, secundum totam membranarum longitudinem cum nervis septi transuersi exporreclas. Quinetiam, ut et ahte monui, à uena paricarente in membranas thoracis cavitatem intersepientes furculi accedunt, uenis quæ adhærentem oculi tunicam implicant, quàm similimi. Ab his uenis etiam soboles in cordis inuolucrum, ubi membranæ thoracem intersepientes hoc continent, pertinent. Cæterum uena axillam accedens priusquam è thorace procidit, non ita procul ab ipsius initio ex elatiori sede uenam utcumque amplam promit, quæ sursum oblique in posteriora tendens, ad transuersos uertebrarum ceruicis processus deducitur, & per ^h foramina illis priuati exculpta sursum conscendens in musculos uertebris proximè adnatos, soboles spargit. At præter illas, certo ordine & ueluti geniculatim singulas soboles unicuique foramini neruorum exortibus in ceruicis uertebris inciso deriuat, dorsali quæ medullæ ipsi quæ adeo uertebris alimentum suppeditat. Quod uerò eius uenæ reliquum est, in caluariam contendit, peculiari sibi cum ^h sua coniuge arteria foramen obtinens, quod ad posteriorem occipitis ossis capituli sedem excavatum antea dixi. Vbi uerò uena in caluariæ amplitudinem pertingit, in secundum seu sinistram duræ cerebri membranæ sinum, uti postea auditurus es diffusus, exhauritur. Præter hanc uenam, alia adhuc ab illa quæ in axillam contendit, priusquam è thoracis cavitæte labitur, ex ipsius posteriori regione principium ducit, quæ in musculos, humilioribus ceruicis & thoracis elatioribus uertebris adnatos, ac capitis dorsis & thoracis motibus famulantes, dispensatur. Simulatq; uerò axillam petens uena inter primam thoracis costam & clauiculam ex thoracis cavitæte progreditur, musculumq; perforat qui secundi paris dorsum mouentium alter est, non semel ^{cam} promit uenam quæ humeralem postea uocabimus, & ilico atq; declius ducta glandulas in axilla ad firmam uasorum distributionem à Natura procreatas contingit, quas nunc dicam à se emittit propagines. Primum utrinque singulas promit uenas, ad thoracis quidem anteriora ^u unam, ad posteriora autem alteram. Quæ antrorsum exporrigitur, in musculos à pectoris ossis & costis ad brachij os & scapulam pertingentes diffunditur, & pectoris cutem simul & mamillas frequentiam admodum ramorum serie in mulieribus adit. Vena autem retrorsum proficiscens in musculos cauam scapulæ sedem occupantes, uicinasq; sedes multiplici etiam sobole digeritur. Cæterum nonnunquam à priori & quæ pectus accedit uena, interdum uerò ab ipso qui in axilla consistit ^u trunco alia grandis utcumq; uena exoritur, quæ deorsum secundum thoracis latum exporrecla, potissimum absumitur in musculum, cuius beneficio brachij decliue dorso ad mouemus. Præter hos ramos maior uena quæ in axilla habetur, exiguos ablegat furculos glædulis & mēbranis, quæ in sibi uasorum distributionibus eorundem colligationibus præfunt. Qua autem serie axillaris uenæ reliquum in totam manum excurrat, peculiari Capite mox atque cæteras ascendentes uenæ cauæ propaginis soboles absoluero, expediā. Proinde ad iugulum rursus sermone conuerso, cæteros truncorum magnæ illius in iugulo diuisionis ramos aggrediamur. Vena itaq; cauā ad eum quem dixi modum priusquam pectoris ossis summum transcendat, in duos truncos diducitur, ac statim à diuisione nuper commemorata uena, quæ axillam petit, principium obtinet: quod autem alterius diuisionis illius trunci adhuc superest, à media primæ thoracis uertebræ corpore sede, cui prius innitebatur, modicè recedens, sursum extra thoracem protenditur, & simulatq; clauiculam pectoris ossis summum superauit, in duos impares ramos scinditur. Interior namque exteriori magis quàm pericardium bitrantur gracilior est, & secundum asperæ arteriæ latus ascendens, nonnullas uenulas in speciem capillorum exiles asperæ arteriæ conterminisq; membranis communicat. Hæc interior censetur iugularis, quæ cum sui lateris soporali arteria uersus cerebrum fertur, ac in ascensu graciles ramulos membranulis sexti neruorum cerebri paris in collo & in faucibus etiam septimi paris neruos colligantibus digerit, uniuerso ductu soporariæ arteriæ ad caluariæ usque basim commissa. quæ cum peruenit, in duos inæquales amplitudine ramos diffinditur, ac amplior oblique retrorsum, secundum caluariæ basim ductus, caluariam simul cum quodam soporalis arteriæ ramo ingreditur, foramine utens sexti neruorum cerebri paris gratia exculpto. Qua uerò serie in caluariæ cavitæte præfens ramus digeratur, in cerebri uasorum descriptione assatim persequar: modò autem lat erit, ad caluariæ usque amplitudinem uenas, quæ eò pertingunt, sermone deducere. Ab ampliori hoc iugularis internæ ramo, quum uti diximus in posteriora secundum caluariæ basim is contendit, ^k propago diducitur,

Aliquot rami
à uena axillæ
petente sparsi
per osquælibet
clauicula subeant.

Cauæ per col-
lum caputq; se-
rics.

Interior iugu-
laris.

i 2, 3 fig. ca. 12 li. c. k fig. ca. 14 &

transfunditur. ¹Portio interiora oris subiēs, in primis suis scissionibus glandulas exigit, quæ in faucibus sunt inferiores, quasq; tertium glandularum genus in sexto libro recensimus. His glandulis quæ uasorū hīc præ sunt distributionibus, ab interiori externę iugularis portione ramuli dispensant, mox notatu digni in laryngē & glandulas ipsi proximē adnatas, et mūsculos ossis referentis, & lingule, & uniuersim ad omnes fauciu sedes, furculi deriuantur, quorū insignis sub lingua secundū ipsius longitudinē prorepat, in multiplices & errabūda serie prorepentes ramulos scissus. Quinetiā ab hac iugularis portione præter grandē ramū qui in caluariam per foramē subit, ad posteriōrē mamillaris processu sedē cælatus, ramī etiā in palatū & tunicā nariū amplitudini obductā digeruntur, à quibus postmodū nō negligendę soboles caluariam petunt. Vna enim per foramē, quod secundo cerebri neruorū pari inculpit, caluariā accedēs, in durā membranā aliquot furculis excurrit, quemadmodū & altera soboles duræ membranæ offertur, caluariā ingrediens per grandius foramen illorū quæ in octauo capitis osse odorū gratia exculpunt. Hæ soboles quū caluariā ingrediuntur, furculos quosdā oculo elargiuntur, in frontis cutem interdum disseminatos. Exterior externæ iugularis portio per capitis exteriora passim repens, perinde atq; interior, cuius seriē iam absoluiimus, mox glandulas suis distributionibus præfectas obtinet, quæ inibi reponunt, ubi inferior maxilla superiori articulatur. Præter portio inter has glandulas bipartitur, et uno ramo in buccas, nariū alas, & ad frontē uariē exporrigit; altero autē tēpora & aurīū sedem adit. Hic enim ramus rursus in duos præcipuos furculos diuisus, unū in sui lateris tempus admodū errabundo & inuoluto ductu digerendum offert; alterū uerō post aures & ad occipitis cutē diffundit. Verū exterioris iugularis soboles in facie ac capitis cutē digestæ, hoc sibi priuatim uendicant, quod dextrī lateris uenæ, sinistri lateris uenis permisceant, ac inuicē coeant, idq; potissimū in facie & uertice, & imprimis adhuc in fronte: adē ut frontis uena plerūq; ab utrarūq; iugulariū propaginibus per internos oculorū angulos sursum deductis confletur. Ad hæc, per exigua uerticis ossiū foramina et futuras gracillimæ uenulæ in caluariā procidunt, nō aliter atq; rursus ex caluariā in cutē alias emergere tum dicā, quando cerebri uasorū seriē priuatim persequemur. Quippe hæc opportunē tantisper dū in caluariā arterias quoq; sermone perduxerimus, asseruabitur, quod uaria cerebri uenarum arteriarūq; sit cōmixtio: quā incognita adhuc arteriarū ad caluariā diuicatione, arduū foret percipere. Quamquam interim cuius integrum sit, Caput à præsentī septimum, cerebri uasis dedicandum, aut hīc, aut ipsius quo id reponam loco aggregi.

VENÆ AXILLARIS ET HVME

rarie per manum series. Caput VIII.

VENAS duas à caua in manum propagari, prius relatum est: unam quidem, antequam caua thoracis amplitudinē superet; alteram uerō ab externa iugulari, ubi ea clauiculam pectorisq; summum aliquantisper superauit. Hęc quod sub summo humero ipsaq; adeo clauicula in externā brachij sedem procedat, humeraria & cubiti exterior dicitur. illa autē quod per axillā internamq; brachij sedem prorepat, axillaris interiorq; cubiti uena nuncupatur. Et quāuis utraq; uena in plurimos pullulet ramos, cū in superficie sub cute, tum altius inter mūsculos propter ossa deductos, attamen axillaris quanto humeraria grandior ampliorq; uisitur, tanto etiam in frequentiores numerosioresq; soboles dispergitur. Humeraria namq; ab externo latere exterioris iugularis longē minori, quā uulgus arbitratur, intervallo, & interdum à communi cum axillari trunco, quā is primam thoracis costam superat, principium ducens, atq; illos quos præcedente Capite recensuimus ramos dispergens, ad posteriorem clauiculæ sedem contorquetur, ac sub summo humero prorepens, inter internū latus mūsculi brachium attollentis, et ualidum tendinem mūsculi brachium ad pectus ducentis in brachium procedit. Dein carnea membrana sub cute suffulcitur, deorsumq; porrecta etiam ante sectionē in omnibus euadit cōspicua, nisi fortē graciliores omnino uenas homo obtineat, obesiōr ue sit. Porrigitur itaq; recto tramite deorsum per anteriorem (uersus exteriora tamē magis) brachij regionem, secundū exterius latus mūsculi cubitum flectentium anterioris. In deorsum uerō ad cubiti usq; articulum graciles duntaxat ramos utrinq; in cutem sibi proximam, anterioremq; mūsculi cubitum flectentium prioris sedem dispensat, qui partim rectā, partim obliquē & tranuersim in cutē ita prorepunt, ut interdum uersus internam brachij sedem ad axillaris uenæ soboles in cutem digestas pertinere, cum illisq; coire uideantur. Quando humeraria cubiti attingit articulum, iuxta exterius humeri tuberculum in tres diducitur uenas amplius

Et uene series
iuxta cubiti articulum.

amplitudine interdum æquales, nonnunquam uerò unā cæteris ampliori. ° Prima (quam frequentissimè, ac potissimè in hominibus deesse reperies) penitiùs obliqua deorsum ad medium flexus cubiti articuli defertur, atque sub ^p musculorum secundos tertiosque digitorum articulos flectentium, hincq̃ ab humero & ulna originem fumentium capitibus in aliquot ramos digesta cessat, non autem uti Galenus scribit, alicui axillaris uenæ ramo (quemadmodum ea quam nunc persequar) commiscetur. Vt enim Galenum axillaris uenæ portionem sub musculis reconditam minus rectè descripsisse obseruabis, ita etiam primæ huius humerariæ propaginis (si quando hæc unquam cernitur) seriem non est assequutus. Vti sanè admodum continnè uereq̃ eas descripsit uenas, quæ citra sectionem in nudato, ut in uenæ sectione fit, brachio plurimùm & frequenter illi occurrerunt. ° Secundus itaq̃ humerariæ ramus, quem cum alijs duobus paulo suprà cubiti articulum deriuat, cæteris plerumque crassius existit, & obliquus quoque sub cute ad cubiti cum humero articuli flexus medium descendit, ac cum axillaris uenæ ramo, quem postmodum commemorabo, coit, unaq̃ ex ambobus ramis, humerariæ nimirum & axillaris uena conflatur. ° Tertius humerariæ ramus, musculū qui radio iuxta brachiale insertus, radij in supinū motus autor est, conscendit: & paulatim deorsum prorepēs, obliquus per radium iuxta medium ipsius longitudinis in externam cubiti regionem perfertur, quam ubi attingit, ut in reliquo super commemoratum nuper musculum ductū, furculos quosdam in proximam sibi cutem depromit, quorum non infimus esse solet, qui ab ipso educitur, quā humeraria in tres illos ramos iuxta externum humeri tuberculum diffinditur: Cæterum tertius hic ramus sensim obliquè uersus ulnæ appendicem, brachialisque radicem prorepens, tandem alteri cuiuspiam inibi commiscetur uenæ, hæcque adauctus externam brachialis sedem conscendit, & in aliquot furculos errabundo ductu sparso diffectus, regionē intercurrit, quæ ante paruum digitum & anularem habetur, externa etiam illorum digitorum sede soboles quasdam sibi uendicante. Cuius uerò uenæ propago illa demū sit, quam tertio humerariæ ramo uniri iam scripsimus, subiungam, ubi primum aliquot axillaris uenæ propagines absoluerō, quippe ab axillaris ramo sub cute per totam ulnæ longitudinem exportrecto, illius propaginis initium pendet. Axillaris itaque, quum primum axillam superat, brachiumque subingreditur, inter musculos brachij os amplexantes delitescit, præcipuè uerò inter anteriorem sedem primi seu interioris cubitum extendentis, & posteriorem sedem tendentis musculi, quo brachium pectori admouetur, & dein iuxta cubitum flectentium musculorum posteriorem. Hæc primum capitibus musculorum, quorum ope cubitus extenditur propaginem offert, illis uenulis e regione educam, quæ ab axillari in glandulas hic repositas digeruntur. Post hanc, sed demilius, ex posteriori ipsius sede uenam hñdem musculis dispensat, à qua mediocris etiam magnitudinis soboles in externæ brachij sedis cutem disseminantur. Ab externo latere axillaris uenæ, alia notatu dignæ amplitudinis propago diffunditur, obliquè deorsum sub humero ad externum usque ipsius tuberculum descendens, ac sub musculis cubitum extendentibus occultata, musculorumq̃ capitibus ab externo humeri tubere pronascentibus, ramulos quosdam exhibens, ac demum aliquousq̃ in externam cubiti sedem prorepens, simul cum neruo quem brachium petentium opportunè quartum enumerabo. Has propagines axillaris adhuc in alto latitans edit, ipsaq̃ in duos truncos diffinditur, quos sanè accuratissimè examinatos uelim, non tantum Galeni nomine, quem hæc axillaris diuisio latuit, sed eorum quoq̃ qui se operæ precium aliquod in Anatome arbitrantur præstitisse, dum sectionem semel atque iterum aggressi, simul cum axillari uena humerariam porrigi, se animaduertisse scribunt, oscitanter humerariam (quæ etiam uel ante sectionem notissima esse debuit) unā cum carnea membrana à brachio auferentes, & postmodum alteram axillaris uenæ partem (quam modò persequar) humerariæ loco describentes. Axillaris itaq̃ hominis uena non procul ab ipsius thoracis cauitate in axillam egressu, in duos quodammodo pares diffinditur truncos, quorum alter interiùs atq̃ in profundo toto ductu submergitur, ac arteriæ in manum exportrectæ perpetuò attentus, eadem ferè cum ea distributionis serie digeritur, simul etiā neruo brachium adeuntium tertio concomitatus. Inter duos enim cubitum flectentes musculos deorsum ad mediam sedem flexus articuli cubiti porrigitur, illis musculis, & dein membranis quibus nerui induuntur ramulos spargens. Quando autem cubiti articulum superauit, atq̃ inter musculos digitorum flexus autores in alto reconditus ferri incipit, in duos dirimitur ramos, qui modicè ab inuicem recedentes, ac musculos quos perreptant furculis implicantes, unā cum tendinibus internā summæ manus sedē petunt, qui per ligamentū in internam brachialis regione anuli modo conspicuum porriguntur. Rami inibi in alias soboles partiti sub tendine feruntur, qui latescens uolæ cuti sub nascitur, atque hinc ita in internam digitorum

Li. de Venarum sectione.
Li. 3 de Adm. sectione.

Axillaris in brachio constituta series.

Præcipua axillaris in duos truncos diffinitio.

o g.
p 5 mus. ta.
o. 6 ta. 2, m.
r auq. au.
r.
s h.
t h.
u t.
x a.
y i.
a 6 mus. ta.
A. 12 ta. 6.
b h. h.
c superius.
h.
d x. x.
t l.
f m.
g 1, 12 mus. ta. 2.
h 3 ta. 2.
l 3 ta. 2.
m 11 ta. 2.
n n.
o inter p. 2.
R.
q p.
r 2 fi. ca. 3.
li. 1 p.
s 9 mus. ta. 2.
T. 3.
t ciu. 12 ta. 2.
Y. 2, 3, 4, 5.
u 2, 3 fi. ca. 3.
li. 1 p.
x in q. 2.
y q. 4. 2.
ti. 12 fi. 3.
z fi. ca. 3.
N.
a 2 fi. ca. 3.
li. 1 p.
b 6 mus. ta. 2.
inter o. 2.
r. r.
c Pet. 12 ta. 2.
ar. 12 ta. 2.
d 4 mus. ta. 2.
e 4 ta. 2.
do mus. ta. 2.
n.

rum sedem digeruntur, ut binæ soboles pollicis, & totidem indici, & una medio offerantur, à ramo qui secundum radiū per cubitū porrigitur. Ab illo autem qui ulnæ exporrigitur, binæ soboles anulari, & minimo, & una medio exhibentur, ab illoq; ramo furculus¹ musculos adit, qui externam uolæ sedem occupant, atq; ita ab altero ramo furculus in² musculos penitus pertinent, qui primo pollicis ossi conuascuntur. In hunc igitur modum axillaris truncus sub cutē nusquam prodit, totusq; in altis & delitescētib; sedibus absorbetur.³ Alter truncus sensim ex alto ad interne brachij sedis cutem emergit, uersus humeri⁴ interioris tuberculum properans, ac ante sectionem sub media cubiti longitudinis sede non minus quā humeralis supra cubitum conspicua. Vbi autem anteriori tuberculo humeri incumbit, ad elatiorem eius tuberculi sedem paulo elatius quā cubiti cum humero articulus consistit, in⁵ duas magnitudine propemodum æquales partitur uenas, quarum anterior cuti substrata (quemadmodum & omnes præsentis trunci soboles) obliquē deorsum ad mediam cubiti articuli flexus sedem repit, ac cum⁶ secundo humerariæ ramo ad humiliorem mediamq; flexus illius sedem coit, unaq; inibi ex ambabus confurgit uena, quam communem, quia ex axillari & humeraria constituitur, meritò appellamus. uulgus tamen medianam uocat, etiam si Græci & Latinorum præcipui⁷ ramos qui hanc communem efformant, medias & obliquas nuncupauerint.⁸ Posterior autem uena huius axillaris iuxta interioris humeri tuberculum bipartitionis, frequentes ramos deriuat inferioris cubiti sedis cuti & interioris itidem exteriorisq; sedis humiliorum, ac secundum ulnā sitarū regionū cuti inter præcipuos ramos huc excurrētes,⁹ unus secundū ulnæ inferiorē sedem, ad exteriora tamē magis declinans, uersus brachiale porrigitur. Huius rami soboles cū humerariæ¹⁰ ramo huc contendenti coeēs, simul cū illo, uti prius diximus, digeritur. Interdū autē illo humerarij ramo deficiēte, ea axillaris uenæ propago abundē eius rami uices in extrema manū gerit. Præter hunc ramum posterioris illius axillaris trunci uenæ primariū,¹¹ alius ex illa cutē adit, quæ posterior cubiti articuli sedes induitur, atq; is ramus in externā cubiti sedem nō admodū procul perreptat. Verū alij etiā¹² rami ab hac posteriori uena in internæ cubiti sedis cutē digeruntur, qui uario & admodū incerto implexu permiscetur et coeūt, furculos ab insigniori illo ramo quē ulnæ exporrigi dicebā assumentes, aliosq; rursus ipsi furculos impartientes. His furculis & propaginibus in eum modū per cubiti interiora reptantibus,¹³ alia frequentissimē accedit non contemnenda, quā axillaris uenæ¹⁴ ramus communē uenā cum humerarij ramo efformans, ab humiliori sede & ex medio ductū emittit. Hæc interdū rectā ad brachiale contēdit, interdū uerò errabundo ductu perfertur, alijsq; huius sedis propaginibus cōmiscetur, quæ ad obgraciles sunt uarię inuicē implicantur, ut interna cubiti regio nō minus frequēter quā tibie uenter seu sura uariis molestetur. Propagines hæc nequiquam ad brachiale terminantur, sed partim obliquē, partim rectā, partim uerò transuersim, & modò inuicem commixtæ, modò rursus diremptæ, totam summæ manus internam cutem perreptant, ipsi cuti passim connatæ, ac inter cutem carneamque membranam consistentes. Porro harum propaginum quæ pollicis radicem, seu Veneris, aut ut alijs uisum est, Martis collem accedunt, priuati¹⁵ tim id sibi uendicant, quod ipsi¹⁶ ramus ab illis uenis¹⁷ permiscetur, quas à communi uena in externam pollicis regionem diffundi iam dicturus sum.¹⁸ Communis enim uena illico atque¹⁹ duabus illis axillaris & humerariæ propaginibus conflatur, obliquē deorsum ducitur, ad elatiorem cubiti sedem paulatim contendens, quousque radiū paulo ultra ipsius longitudinis medium hinc inde transcendat: neque id eodem semper modo, ramos diffundens, & interdum aliunde ab interna cubiti sede alios assumens, ac tandem in externam cubiti sedem peruenit, perpetuò cuti substrata. Vbi itaque hanc sedem euicit, priusquam mediam radij appendicis sedem accedit,²⁰ supra radiū aliquanto ante illius cum brachiali articulum, in²¹ duos ramos communis uena diffunditur. Atque hanc sectionem alij Græcorum γ (non autem ρ) alij uerò Y & Λ etiā referre scripserunt.²² Alter istius sectionis ramus, qui elatior est,²³ porciunculam ad internam brachialis sedem uersus pollicis radicem dispensat, quæ dictis nuper hanc sedem perreptantibus furculis²⁴ commiscetur. Quod uerò elatioris rami reliquum est, exterius inter pollicem & indicem sursum ascendit: atq; hinc in uarias soboles inuicem aliquando unitas, aliquando autem rursus seiunctas dispergitur.²⁵ Alter ramus qui inferius γ aut Y caput constituit, indicis, & medij, & aliquousque anularis sedem petens, in uarias quoque soboles exhauritur. Quippe hæc uenarum in summæ manus cutem series adeo uaria est, pugnantque, ut hanc explicare prorsus arduum sit, præsertim quum inter quamplurimos homines uix duos æquali correspondenti que uenarum in ramos propagine inuenias, adde eiusdem hominis dextram sinistra rarò admodum congruere. Operæ precium itaq; fuerit, uenarum in manum propagines non hinc, sed ex sectio-

Axillaris uenæ portionis cutem subueniens series.

Communis uenæ constitutio.

Communis uenæ series.

Variæ extremitatis manus cutem implicantium uenarum esse series.

Venarum se-
riem crebro
uariate.

ne & ante confectionem in brachijs uinculo interceptis, quom uenam diuidimus condiscere, atq; ad amissum expendere, quam in uenarum sectionibus nostri, si dijs placet, & sculapij hallu-
cinentur, qui grauitur num humeraria, aut communis, aut axillaris in eadem manu diuidenda
sit, ridicule contendentes, humerariam sese aperire existimant, quoties uenam inter pollicem &
indicem aperiunt: & axillarem, si uenam inter anulare & minimum, aut ut alijs arridet, inter me-
dium & anularem incidunt. Ad hæc, quis non conspicit ipsos in cubito quamcunq; uenam ar-
bitrentur referendam, propemodum nullam præter axillaris uenæ^m ramum ad communem
uenam exporrectum incidere: Cæterum ut in extremæ manus cute etiam in eodem homine ue-
narum distributio uariatur, pari quoq; ratione & in cubito subinde uenarum propagines diuer-
sas uidere est. Interdum enimⁿ duarum mediarum ad communis uenæ generationem concur-
sus non in cubito fit flexu, sed multo humilior, nõ procul à medio longitudinis cubiti. Aliquan-
do humerariæ ramus communem accedens occulitur, axillaris ramo uisum non fugiente. Non
nunquam rursus contraria est ratio. Contingit etiam nõ semel, axillaris ramum, qui ad commu-
nem fertur, humerariæ ramo longè aut graciliorem aut ampliorem esse, & interdum hunc aut il-
lum geminum uideri. Quandoq; (& id non infrequenter)^o tertius humerariæ ramus exter-
nam cubiti sedem accedens, omnino deest, ipsius uicem tunc suppleantibus ramulis, qui à^o com-
muni uena in cutem excurrunt, ac subinde etiam ab axillaris ramo, qui toti ulnæ longitudini
exporrigitur.

VENÆ CAUÆ PORTIONIS AD PAR-
tes infra septum transuersum locatas distributæ series. Cap. IX.



Ad sinistram
renis inuolutum
cuius uena.


Ad dextram
renis inuolutum.

Ad renes ue-
nas.

Sinistram semi-
nalis uenæ se-
ries.

REQUENTES sanè & insignes admodum propagines etiam à cauæ
portione sub iecore lumborum uertebreis exporrectæ pullulant, quæ in
hunc se habent modum. Simulatq; caua secundum posteriorem iecoris se-
dem deorsum propens, nõ amplius iecori cõnascitur, nõ nihil obliqua
ex dextris quodammodo corporis partibus intorsum, ad mediũ uideli-
cet dorsi fertur, ilico^o ramum nõ admodum grandè ex sinistro latere pro-
mès, qui potissimũ numero sa uenularũ serie in pingue mēbranamq; sini-
stri renis tunica digeritur, quæ à peritonæo pronata, renẽ inuestit, eundemq; dorso alligatũ con-
tinet. Hic ramus infrequenter ex dextro cauæ caudicis latere, uenã coniugẽ adipiscitur. Quan-
doquidem^o uena dextri renis pingue tunica cõterminatq; peritonæi sedes accedens, nõ à cauæ
caudice principũ ducit, sed ab elatori regione^o eius uenæ qua dextro reni peritonæi sanguis de-
portatur. Aliquando interim uena frequenti sobole in sinistro renis tunica diffeminata, ab ea
quæ in sinistram renem proficiscitur, originẽ sumit, ea quæ dextri renis tunicæ offertur, à cauæ
dextro latere pronata. Cæterum caua ab utroq; latere^o amplissimã propaginem, ubi iam mediæ
uertebrearum sedi innititur, in renes distribuit, dextrã quidem propaginẽ dextro reni, sinistram
autem sinistro deriuans. Atq; ut situs renũ uariũ est, ita quoq; harum propaginũ exortus è di-
recto sibi neutiquã correspondet, quom enim dexter ren (uti plerunq; accidit) sinistro elatius lo-
cetur, dextri lateris propago altius quàm sinistro renis principũ ducit. Si uerò sinister ren dex-
tro superior sit (quod etiam crebrius quàm dissectionum professores tradunt, euenit) propago
quoq; in ipsum à caua transuersim quodammodo repens, elatius quàm dextra propago prin-
cipium ducit. Quamobrẽ uerò harum propaginum ortus nunq; è directo inuicẽ opponatur,
in quinto libro, qui renũ functiones pertractabit, cõmemorabitur. Præfens enim sermo cauæ
ramorũ distributioni potissimum est dedicandus. Venæ itaq; ad utrumq; renẽ protensæ, gran-
des admodũ sunt, ac quamprimũ concauã renũ sedẽ contingunt, hominibus in^o duos ramos
partiunt, ac dein in renũ substantiã mirabili quodã artificio hætenus nemini Anatomicorũ co-
gnito digerunt. quod nam uerò id sit, in quinto libro perstringã. Cæterum priuatim ab humi-
liori sede^o uenę eius quæ sinistru renẽ petit, iuxta ductus ipsius ferẽ mediũ^o, uena pronascit in
uiris ad sinistru testem tota excurrẽs, præterq; quod graciles^o exiguosq; surculos in peritonæũ,
quã porrigitur, ac in mēbranas tunicas ue sinistru testẽ & seminaria ipsius uasã ambientes pro-
ducit. Hæc enim uena peritonæo, quã id lumborũ^o carnibus in sterniã adnata, deorsum super
pubis os fertur: quod quũ superauit, atq; ex magni peritonæi amplitudine elabitur, in^o uarios
anfractus gyrosq; conuoluitur, quorũ basis superiori testis sedi cõnata, ramulos in tunica testis
substantiã proximẽ continentẽ digerit, & alijs frequentioribus ramis in testis substantiã passim
diffeminatur. quemadmodũ quintus liber, ubi generationis organa persequar, diffusius doce-
bit. Vena hæc sinistru testem accedens, aliquando propaginem à cauæ caudice sub uenæ ad si-
nistrum

nistrum renem exporrectæ principio enatum
asciscit: quæ nõ procul ab exortu sinistrorū
declius proprepēs, cum illa coit, unaq; femina-
lis uena ex ambabus confluit. Vena autem
dextrum accedēs testem, non à uena in dex-
trum renem protensa originem sumit, at à ue-
næ caudice aliquanto inferius, quàm uenæ re-
nibus exporrectæ principium ducunt. Huius
feminalis uenæ exortus, non ut reliquarū fere
propaginum in cauæ consistit latere, uerum
ex ipsius eminentiori seu anteriori sede, uersus
dextrum latus nonnihil hæc feminalis uena ex-
tuberanti ac ueluti rotunda origine enascitur.
Præsentī uenæ ramulum quoque ex ea quæ in
dextrum renem procurrat accessisse, ac simul
cum ea coiuisse, Galenus sibi semel obseruatū
testatur. Ego quoque totam dextrī testis uenā
à uena quæ reni offertur pronatam semel uidi.
Quod uerò hæc uena dextrum testem ea se-
rie adeat, qua sinistram sinistro testi porrigi dicebam, uel me tacente, cuius obuium esse sat scio.



Quoniam in nuda inte-
gratæ caue uenæ figu-
ra feminali uenarum
originem ita atq; fre-
quentius secābus oc-
currit, expressimus:
præter figura quādā
differentiā, quæ hic de-
scribitur pingere uisū
est. Nō itaq; A,
A, d, q, h, i, n, d, u, f, g
et n, idem quod in nuda
caue figura. B uerò
rami à caue caudice
ad sinistri lateris femi-
nalem uenā porrecti,
ac cum ipsa coeuntem.
C ramuli significat à
uena pronatam, quæ
dextro reni offertur,
atq; is ramus dextre
feminali uenæ commi-
scetur.

Lib. de Vena
rum sectione.

Mulieris se-
minatum ue-
narum series.

Cauæ rami
lumborum uer-
tebris carna-
busq; oblatis.

Quæ caua ar-
teriae magnæ
supra sacri
ossis inuicem
subiungatur, ip-
siusq; hinc se-
ries.

In mulieribus alia harum uenarum est distributio. Quamuis enim illis par cum uirorum uenis
sit exortus, ipsæ tamen magna ex peritonæi amplitudine haud elabuntur, neque ad pubis
ossa pertingunt. Verum ad mulierum testes pinguibus membranis sustulæ porrigun-
tur, non uniuersæ in seminaria uasā degenerantes, aut totæ in testes exhaustæ. Nam prius-
quam ad testes deueniunt, utriusque lateris uena bipartitur, ac una portio uenæ uirorum
testi implicitæ modo, seminarium uas efficitur. Altera uerò in membranas quoque pingues
intertexta, in uteri latera digeritur, elatiorem ipsius fundi sedem potissimum implicans. Præ-
ter feminales uenas caua ubi lumborum uertebis ipsi que magnæ arteriæ colligatur, ab ip-
sius inferiori sede quæ uertebas spectat, uenas geniculatim diffundit, per foramina neruis
in musculis uertebis adnatis, à quibus rursus aliæ soboles in abdominis musculis orbicu-
latim ad abdominis usque latera descendentes, & illis quas perperant sedibus alimentū sup-
peditantes. Quum primum uerò caua ad sacri ossis usque summum descendit, atque iam
magnæ arteriæ (quæ ipsi prius ad sinistram subijciebatur) tanquam digniori organo cedit, ac
quo minus arteria ossis sacri duritia in dorsi motibus molestaretur, caua ipsi arteriæ se subster-
nit, in duos aequales partitur truncos, quorum hic dextro cruri, ille sinistro (ubi eas quas mo-
do dicam deprimere soboles) offeruntur. Sinister enim truncus (quod & de dextro etiā si
non dicatur, per reliquam cauæ seriem intelliges) statim in ipsa partitione, aut potius ubi caua
in duos truncos supra os sacrum diuiditur, ab exteriori ipsius latere uenam promit maiorem
ipsas quas ad lumborum uertebas & abdominis musculos, & alios ibidem dorso connexos dif-
feminari diximus. Vena hæc interdum ante cauæ supra os sacrum partitionē principium du-
cens, transuersim lumborum carnibus infertur, ipsis & peritonæo abdominisq; muscu-
lis ramulos dispergens, & in canibus multo quàm in hominibus manifestior. Posteaquam
sinister truncus hanc deriuauit uenam, oblique deorsum uersus exteriora fertur, figuram cum
dextri lateris trunco A literæ aut Y in hunc modum inuersi non absimilem constituens,
& aliquot furculos superioribus sacri ossis foraminibus offerens. Deinde mox in progres-
su in duos impares ramos finditur, interior nanque gracilior est exteriore; ac mox duas edit
propagines, quarum alteram interiorē, alteram exteriorem manifestioris doctrinæ gra-
tia, dum Anatomen ostendo, appellare consueui. Exterior itaque propago tota quodammo-
do inter sacrum & coxendicis os, quæ maximus neruorum crus petentium ducitur, in exte-
riora transuersim fertur, & numerosa ramorum serie in omnes musculos ab ilium ossis externa
sede pronatos, femorisq; motibus famulantes dispensatur, ramulos etiam deorsum in muscu-
los diffundens, qui ab inferiori coxendicis ossis sede principium ducunt, atq; ita articuli coxen-
dicis ossis cum femore posterior sedes, et clunium cutis hac exteriori propagine uenas mutuan-
tur. Interior autem propago ab interiori ipsius latere exiguas soboles sacri ossis quoq; fora-
minibus dispēsat, & alias his maiores in recti intestini musculos, cutemq; orbiculari sedis mu-
sculo obnatam digerit, quæ feculentum sanguinem per anum expurgant, si quando is per ue-

nam cauam huc decumbat, eodemq; colligatur. Deinceps hæc interior propago notatu dignū
 diffundit ramū, qui in uiris dextrum uescicæ latus amplectitur, & in plures scissus furculos, ue-
 sicæ ceruicem seu penem adit, in eumq; numerosè digeritur, ea semper serie ut ceruici crassiores
 amplioresq; furculi, quàm uescicæ fundo exporrigantur. In mulieribus uerò^b præfens ramus
 ab interna ductus propagine pingui membrana suffulcitur, ac quibusdam furculis uescicam
 quidem adit, uerū frequentioribus inferiorem fundi uteri sedem intercurrit, ramulos quoq;
 spectabiles in uteri ceruicem dispergens, per quos uirginibus & nonnullis mulieribus, quæ pri-
 mis mensibus utero gerūt, menstruæ purgationes colari dissectionum professoribus uisum est:
 quanquam & in reliquis mulieribus ab harum propaginum oris non minimum eius sanguinis
 profluere adhuc existimem. Arabum nonnulli quinque numero uenulas in medium longitudi-
 nis uteri ceruicis diffundi alstruunt, & dextrarum uenarum ora cum sinistrarum oris conniue-
 re committiq; ac ab illis puellarum hymen constitui docent, uenarum huc pertinentium copiā
 (ut in Arabum interpretū libris legitur) centonem nuncupantes. Quod uerò^c interioris rami
 sinistri trunci eius supra os sacrum factæ diuisionis adhuc reliquū est, ad pubis os contendit, &
 ab externo ramo trunci uenæ cauæ sobolem assumit, quæ cum eo interioris rami reliquo con-
 gressa, unam cum ipso^d uenam efformat, quæ primum peritonæum, ac dein^e decimum femur
 mouentium perforat musculum, & ossis pubis^f foramen permeās in crus emergitur, ° propriū
 finem in elatori eius foraminis sede sibi uendicans, quo simul cum sua coniuge^g arteria ac item
 neruo fertur, ac foraminis eius^h membranā, & ° nonum femoris motus autorem musculum
 transiens, illis quos perreptat musculis ramos porrigit. Quando autē in crus pertendit, in mu-
 sculos à pubis ossē principium ducentes digeritur, in elatiorem uidelicetⁱ secundi tibiā mo-
 uentis musculi sedem, qui à pubis ossium commissura nascitur. Humilior enim eius musculi
 pars à maiori crus petenti uenā^j ramos sibi asciscit. Dein ab hac pubis ossis foramen transeun-
 te uenā, rami in^k quinti femur mouentis musculi partem à pubis ossē pronatā, ac postmodū
 in^l octauum femur mouentem musculum & penis etiam^m musculos digeruntur, à quibusⁿ fur-
 culi nimis quàm exiles in femoris internæ sedis cutem in inguinum regione prodeunt. Præter
 ramos autem illis musculis & cuti exporrectos^o, unus etiam articulum coxendicis accedit, pro-
 prio^p sinu coxendicis ossis acetabulum priuatim subiens. Et utique multifariam hæc crus
 petens uenā digeritur, rariū medium longitudinis femoris superat, sed interdum præcipuus
 ipsius ramus quinto femur mouenti musculo dispensatus, propagini^q commiscetur, quæ huc
 pertinet à maiori uenā in crus ducta. Exterior uenæ cauæ trunci ramus, quum oblique crus
 accedit, priusquam peritonæum perforat, ab elatori ipsius sede^r uenam mediocri magnitudi-
 ne expromit, quæ sursum ad abdominis anteriora per peritonæum ducta, ipsi ramulos quos-
 dam utrobique communicat. Vbi hæc ad istum modum peritonæo connexa ad rectum abdo-
 minis musculum^s descendit, peritonæum perforans in internam posteriorem uē recti abdo-
 minis musculi sedem inferitur, & utrinque uarias soboles in transversum abdominis muscu-
 lum, & ipsi incumbentes obliquos reliquasq; proximas sedes distribuit, recto tramite sursum
 sub recto musculo protensus. ° Vbi uerò ad abdominis medium paulo supra umbilici re-
 gionem prorepsit, ipsius extremum in plures furculos disseminatur, qui ramulos spectant,
 quos à uenā sub pectoris ossē^t ab elatori thoracis sede delata, diffundi commemorauimus.
 Huius uenæ interuentu mamillis cum utero communionem esse credimus, eius quippe be-
 neficio ex mamillarum uenis in uterum quum fetus enutritur, sanguinis retractionem: quum
 autem mulier lactat, ex uteri uenis in mamillarum uenas menstrui sanguinis reuulsionem perfici,
 medicis pariter concessum est omnibus. Venam enim deorsum ex alto procurrētem, ramos
 mamillarum corpori diffundere, nemo non scribit: etiam si id nō adeò obiter concessum esse ue-
 limus. Vena uerò ab imo sursum ascendens, ° non ita procul ab uteri uenis originem ducit.
 Deinde^u alteram uenam in ortu quasi coniugem fortitur, ad pudendum excurrentem. ° Exte-
 rior enim uenæ cauæ sinistri trunci ramus, quando supra coxendicis os in femur proci-
 dens, pe-
 ritonæum transit, ab interiori ipsius regione aliam promit uenam, quæ ad pubis ossium^v mediū
 quā inuicem cartilaginis interuentu hæc uniuntur accedens, uiris in penis^w inuolucrū & scor-
 tum, mulieribus autem in pudendi colliculos, & in^x coriaceas carunculas (quas *ruqulu* uocāt)
 uicinasq; sedes numerosa ramorum serie digeritur. Porro uenā sub recto abdominis musculo
 sursum exporrecta nullam parem adipiscitur, quæ in uterum (uti medicorum uulgus arbitra-
 tur) descendat: sed ut prius monebam, illa ab ijs quæ in uterum digeruntur non ita multum di-
 stat. Quandoquidem ipsius principium ab exteriori ramo sinistri trunci uenæ cauæ pender, il-
 lis ab interioris eius trunci rami interna propagine originem ducentibus, atq; in uteri ceruicem
 ipsiusq; fundi humiliorem sedem diffusis.

*Vena è qui-
bus uirginibus
menstruæ pur-
gationes ma-
nare credun-
tur.*

*Vena per pu-
bis ossis fora-
men femur pe-
tens.*

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER III.
VENAE CAVAE SOBOLES IN CRVS DI

gestae. Caput X.



PRAETER cauae propaginem, secundum posteriorem coxendicis ossis sedem in femur aliquouſque propagatam, ad crus duae descendunt uenae, una quidem angustior, quam per pubis ossis foramen ad quosdam interioriorem femoris sedem amplexantes musculos perrepentem, supra femoris medium cessare, superiori Capite narrauimus. Altera uero maior, ceterarumq; uenarum in crus sinistrum (quod & de dextro intelliges) excurrentium caudex ab externo ramo sinistri trunci uenae cauae supra os sacrum partitionis pendet. Praesens uena simulatq; e peritonæo elabitur, elatiorem coxendicis ossis sedem ad internū latus sedis, qua sextus & septimus femur mouentium musculi descendunt, in inguina labitur, ac anteriorem (uersus interiora tamen magis) femoris regionem subit, & nullo occultata musculo sinui insidet, qui in inguine efficitur a longo graciliq; musculo tibiam mouentium primo, unā cum octauo femoris motuum autore. Vena itaque huic sinui seu cavitati incumbens, in plures ramos descenditur, atque quo iniurijs minus redderetur obnoxia, primis suis distributionibus Natura frequentes glandulas (uti in axillis fit) hic circumposuit, quae firmam stabilemq; uenae propagationem redderent, & quem diximus sinum cum uena simul, & arteria nervoq; hac descendentes opplerent, propugnaculumq; quoddā his uasis efficerentur. Prima huius uenae crus petentis propago insignis est, ac ab interiori uenae latere principium ducens, ad anteriorem femoris cutem properat, atque in internam femoris sedem deorsum per genu quoque interiora, & hinc rursus per internam tibiae regionem uersus malleolum anteriorem sub cute exporrigitur. & deinde in pedis superiora descendens, uariē inibi digeritur, alijs huc pertinentibus uenarum furculis commixta. Hanc propaginem ita quidem sub cruris cute carnea suffultam membrana deorsum prorepere obseruauimus, uerū quā interiori exporrigitur malleolo, uniuersim non eundem seruat ductum. Quandoquidem interdum ab interna tibiae sede secundum anteriorem malleoli regionem ad pedis superiora excurrit, aliquando uerō (sed rariū) sub malleolo contorquetur, illac pedis superiora conscendens. Deinde in ramorum ad pedis digitos & suprapedion serie, plurimum uariat. Aliquando enim alijs quibusdam ramis hic commixta, ad minimum digitum ipsiq; proximum praeciue deducitur, aliquando uersus pollicem & indicem excurrit. Breuiter in eodem homine, uix parem unquam reperiās huius propaginis ramorum in utrisque pedibus feriem. Rami quoque quos in descensu profert, rarissimē inuicem aut numero, aut amplitudine correspondent, siquidem inordinate ad cutem permeant. ut plurimum autem in superiorem internae femoris regionis cutem, non procul a suo ortu, utrobique unam emittit sobolem, ac interior quidem femoris interiora & inguina, ipsumq; quasi perinæum seu interfemineum accedit, quod sedes est inter anum & testes, aut muliebre pudendum consistens. Exterior autem soboles, quae & crassior est, femoris anteriora & exteriora sub cute perrepentem, similiter ac interior in furculos digeritur. Quum grandis haec propago ad medium femoris longitudinis quasi deuenit, notatu dignos ramos hic etiam in cutem dispergit, & inter ceteros unum gracili longoque musculo porrigit, quem tibiae mouentium primum recensuimus. Ceterum quando ad genu articulum uelut ad posteriora orbiculatim ea propago nonnihil conuoluitur, duas quoque emittit soboles mutuo quidem mole pares, sed exiguas. Vna in anterioris genu sedis cutem secundum patellā dispergitur: altera interioris genu sedis uersus genu flexum, cutem accedit. Haec posterior soboles aliquando penitus deesse, aliquando impense gracilis reperitur: tunc scilicet cum propria genu flexus cutē accedens uena, solito amplior uisitur. Ad interioris sedis tibiae cutem a magna hac propagine, & antrorsum & retrorsum ramuli diffunduntur, qui impari numero parbi, rursus cum proximis uenis uariē coeunt, inuicemq; rursus dirimuntur. Super elatiorem uero pedis regionem, uena haec quemadmodum commemorauimus, diuersimodē spargitur. Atque haec propaginis per internam cruris cutem deducta est distributio. Praeter hanc maxima in crus subiens uena e regione nuper dictae propaginis, uenam promittit, quae extrorsum ducta in anteriore articuli coxendicis cutem, & eius sedis musculos quoque distribuit. Postquā uero maxima uena has edidit propagines, penitus inter musculos femoris os amplexantes immergitur, & insignem ramum septimo & nono tibiae mouentibus musculis communicat, a quo etiā tenues furculi in cutem deriuantur. Deinceps aliam magis in profundum distribuit uenam, nuper commemorata ampliorem, quae per quintum femur mouentem musculum digeritur, ramosq; in octauum tibiae motuum autorem musculum dispenſat. Ab

Quot uenae
rum radices se
mut petant.

Maloris fe
moris uenae se
rics.

k 4 hac

hac etiam plures uenarum soboles in uniuersos propemodum femoris os ambientes musculos propagantur: inter cæteras autē præcipua finem eius^k uenæ, quam per pubis ossis foramen, in femur delabi dictum est, ad se^l assumit, eoq; adaucta, deorsum magis ad genu usque quodammodo inter musculos occultata descendit. Cæterum maxima uena sensim ad femoris os uersus posteriora contorta, ramulos oppidò quàm exiles^m grandioribus femur petentibus neruis offert, qui in membranas neruis obductas digeruntur. Deinⁿ aliam emittit propaginem, quæ in posteriorem femoris cutem excurrens, furculos etiam sursum cutem subeuntes deriuat. Huic propagini frequenter à^o ramo quem in maximum corporis musculum dispensari diximus, soboles quædam accedit, quæ unà cum ipsa commiscetur, & uena ex duabus confluens, sicuti relatum est, cutem adit. Crebrius tamen^p duæ à grandi uena enascuntur propagines, una humilior altera. Hæ in progressu inuicem unitæ eam constituunt uenam, quæ hîc in cutem promittitur, ac ubi^q ramulos sursum in posteriorem femoris cutem germinauit, recto tramite deorsum per mediam flexus genu sedem seu poplitem ad suræ cutem descendit, ipsi^r numerosam ramulorum seriem porrigens, quæ sibi in omnibus minime correspondet. Verum ramulorum alij rectâ, alij obliquè, alij transversim in cutem excurrunt, & denuò nonnulli inuicè coeuntes permiscuntur ac uniuntur, & denique cum^s uenæ ramulis subinde coeunt, quam per cruris interiora decliuem sub cute ferri diximus. Atque, ut semel dicam, huiusmodi hîc uenarum implexus digestioq; conspicitur, ut cutem suræ uaricum affectu crebrius (perinde ac temporum & internæ cubiti sedis cutem) implicari non mirum sit. Præsens uena per genu flexus, cutem in suram descendens, aliquando ad calcem usque prorepens inibi^t cessat, aliquando alijs ramulis per tibiam exteriora huc pertinentibus cõmiscetur, & secundum^u exteriorè malleolũ porrecta, pedis superiora adit, nonnunquã uerò & inferiora, nullibi interim in altum à cute demersa. Cæterum grandis uena femoris ossi quemadmodum scripsimus accumbens, adeò ipsi aduoluitur, ut iuxta genu articulum^y mediam inter duo humiliora femoris capita sedem occupet. Hîc in duos impares ramos deducta^h interiorẽ (qui^z exteriori multo gravior est) ad suræ musculos, præcipuè uerò ad pedem mouentiuⁱ primum & secundum, deorsum mittit, furculis quibusdam horum superficiem implicans, & subinde etiã furculos in progressu ad internæ tibie sedis cutem^l dispergens. Quum uerò interior hîc ramus ad tibiam humiliorem usque appendicem^l perrepsit, atque in dictam nuper cutem furculos diffudit, sub interiori malleolo reflexus, internum pedis latus ad pollicem usque accedit, inibi in cutem ut plurimum absumptus. Rarius nanque inter calcem & tibiam os unà cum tendinibus hac pedis inferiora subeuntibus, ramus ille ad pedis digitos proficiscitur. Exterior ramus magnæ illius in poplite latantis partitionis non procul ab exortu in binas rursus diducitur propagines, quarum^p maior eademq; interior penitus inter^q musculos posteriorem tibie sedem occupantes immergitur. Primum nanque inter capita primi secundiq; pedem mouentium musculorum rectâ descendit, ac dein inter quartum & quintum pedis motores, & deinde inter musculos digitorum flexus opifices hinc à tibia pronatos fertur, interdum etiam^t ligamentum cõtingens, quod fibulam tibie ossi secundum tibie longitudinem colligat. In hoc descensu interior hæc propago illis quos perrepat musculis ramulos offert, à quibus nulli, aut profectò longè paucissimi in cutem subeunt, iuxta medium ferè longitudinis tibie præsens interiorq; propago in duos^s partitur ramos, quorum interior tali cum tibia articulo^t ramulum offert, ac totus quodammodo unà cum tendinibus à posteriori tibie sede ad pedis inferiora reflexus inter calcem & tibiam os pedis inferiora subit, & sub^u musculo secundos quatuor digitorum articulos flectente propagatus, duos furculos pollicis & item indicis, medio autè digito unicum præbet, itaq; absumitur. Quanquam frequentissimè hîc^x interioris illius propaginis ramus (quemadmodum & neruus pedis inferiora subiens) in omnes digitos digeritur, nullo ramo inter fibulam & calcem huc pedem^y accedente. Verum alter ramus qui eius diuisionis exterior est, quam paulo antè ad medium longitudinis tibie fieri dicebã, fibulæ exporrigitur: & quum ad infimam tibie sedem pertingit, atque ligamento membraneo, quod tota tibie longitudine fibulam tibie ossi committit, proximus est, sobolem à se dispergit, quæ ligamentum perforans, unà cum tendinibus per tibiam anteriora pedis superiora adeuntibus in pedem fertur, ac^z musculis pedis digitos in exteriora abducuntibus furculos offert, quibusdam etiam ramulis in cutem sparso. Quod autem alterius rami illius reliquum est, cum septimi & octauis pedem mouentium^a musculorum tendinibus in pedis humiliora proficiscitur, atque in minimos digitos dispesatur: nisi fortè interior ramus inter tibiam os calcemq; pedis inferiora petens, omnibus digitis furculos exhibeat. Varia enim hîc (si alicubi profectò) uenarum series occurrit, nam crebrò (quod etiam diligenter in sanguinis è uulncribus fluxu obseruandũ est) conspicies^b interiorẽ illam propaginem, quam

in po


in posteriori tibiæ sede inter musculos altè recondi dicebam, ilico atq; posteriore tibiæ sedem contingit, ¹ sobolem inter tibiæ os & fibulam per membrancum ligamentum porrigere, quæ secundum tibiæ longitudinem anteriori eius ligamenti regioni attensa, ad pedis superiora fertur. Verum tunc propago illa quæ in posteriori tibiæ sede deorsum properat, ad medium tibiæ non amplius ² insigni diuisione dissecta, sed sola pedis inferiora, omnesq; digitos adeunte. Interdum rursus inter musculos, anteriorem tibiæ sedem occupantes ³ alia soboles reconditur, ab ea propagine quam nondum persecutus sum originem ducens. ⁴ Reliqua enim adhuc est exterior propago, ⁵ exterioris rami magnæ in poplite diuisionis, quæ ad superiorem fibulæ appendicem fertur: & quum ⁶ a propagine quam tibiæ posteriorem sedem occupare dictum est, in anteriores tibiæ musculos nulla soboles per membrancum ligamentum ducitur, ab hac exteriori propagine ramus inter septimum & sextum pedem mouentium musculos prorepat, frequenti sobole digestus, in musculos anteriorem tibiæ ossis sedem occupantes. Aliàs uerò hæc exterior propago in exterioris tibiæ sedis cutem potissimum frequentibus furculis dispergitur: & præcipuo ipsius furculo nunc antrorsum, nunc retrorsum ad interiorem malleolum reflexo, pedis superiora accedit, & potissimum externum pedis latus perrepat, alijsq; huc pertinentibus uenis commiscetur, nusquam in altum mergens. Quum itaq; differens uariâq; adeò uenarum tibiæ & pedis cutem implicantium sit series, suaserim eam non secus quàm in manu facient dum præcepi, in uariorum hominum cruribus uinculo interceptis, aut calenti aquæ immerfis contemplari, modò eam sobolem in superficie excurrentem, uenarum secundarum gratia expendendam duxeris. Ego enim parum superficialiæ pedis uenas morari soleo, quum iuxta genu ipse eas exercitij nomine non semel aperuerim: quodq; omnes pedis uenæ ab ¹ eodem trunco, qui scilicet per inguina crus subit, principium ducant, & arbitror Græcos uix alias secuisse, quàm ² quæ internum genu regionem perrepat, & in obesis mulierculis uel ob continuâ cruris ligationem later, & dein ³ quæ malleolos ambiunt. Adeò ut etiam nostræ ætatis medicos mirer, qui cum alicubi legerint quatuor uenas ad pedis superiora pertingere (ui & ego ⁴ uel sub cute enarraui) quatuor pedi adscribunt uenas, quas magno supercilio in sanguinis missione distinguunt, interim ignorantes ipsarum progressum & exortum, ac longè grauiori periculo in pedis superiori sede cum neruorum, tum tendinum occasione, uenas secari, quàm eam quæ sub genu, atque ad malleolos cõstitit. ut modò elegantem promptumq; sanguinis fluxum silentio præteream. Venarum autem quas illi statuunt, primâ Saphenam, & matricis uenam, & uirginalem nuncupant, atq; illam ad internum malleolum reponunt. Secundam exteriori malleolo ascribunt, illam Schiaticam nuncupantes. Quæ pollicis exporrigitur, illis hominibus Popletica dicitur, hancq; tertiam numerant. Quartam renalem constituunt, eam iuxta minimum digitum diuidentes. Quod uerò ad totius uenæ causæ administrationem spectat, sedulò in sequentibus libris persequar, ubi earum partium quas interreptant sectionem edocebo. Fiet autem id in fine quinti & sexti & septimi librorum accuratissime. Nam & in septimo communem uenarum, arteriarum & neruorum in manus ac crura pertinentiũ sectionis rationem instituemus.

Venarum cutem implicantium series quomodo descendit.

Ad finem tractationis uenarum, in libro de Sectione uenarum & arteriarum. Venarum pedis cutem subiciunt nomen.

DE VMBILICI VENA.

Caput XI.



NVD Umbilici uenæ delineatio, eius nimirum partis quæ in natis obuia est, atq; hic A uenæ sedem notat quæ umbilicum spectat, B uerò sedem qua hæc iecori inseritur, C & D uerò ipsius in iecoris substantia seriem ruditer exprimit. Vnde etiam quinti libri figuræ huc maxime spectantes ueniunt examinandæ, trigesima uidelicet, quæ quatuor tabellis factus inuolucra cum ipso foetu proponit. Dein secunda eius libri figuræ, quæ umbilici portionem ex sectionis serie relictam ostendit: ac in super umbilici uenæ, & arteriarum, & urinarj meatus, qui foetus urinæ peculiariter educit. Præter alias eiusdem libri figuræ, quæ umbilici uenæ in iecur insertionem oculis subiiciunt, nimirum duodecima, & uigesima.



Qui umbilic-
uena ex arte
rue confu-
gunt.

Umbilici ue-
nae ductus.

Arteriarum du-
ctus.

Umbilici ue-
nae arteria-
rum usus.

IN QUINTO libro organa foetui peculiariter persequitur, illum^a tri-
bus tunicis seu inuolucris in utero inuolui contineri^b audies, quorum ex-
timum Græci *χωλα*, Latini uero secundinam & secundas, interdum &
loculos, uti & ipsum uterum, appellat. In hoc quum infans utero geritur,
uenarum articularum^c in uteri fundum pertinentium fines terminantur,
ac uelut in nouas uenas articularum^c cessant, quæ numerosissima ramorum
serie in extimum illud inuolucrum digeruntur. Venæ hæc ac arteriæ ex infi-
nita propemodum ramorum serie sensim in pauciores colliguntur, ac mutuo coeunt, uenæ
quidem uenis, arteriæ autem arterijs semper unitæ. Ex his ramis rursus inuicem coeuntibus gran-
diores paucioresq; tantisper cōstituuntur, donec tandem omnes uenæ in duas finiāt uenas, &
arteriæ item in totidem arterias. Venæ ac arteriæ ad hunc modum ex secundina collectæ, reli-
quas duas foetum inuoluentes tunicas penetrant, quæ etiam a uenis ramulos per illarum mem-
braneum corpus excurrentes mutuantur. Quum uero uenæ ad umbilicum usque prorpsere,
mox in^d unam coeunt uenam: imò subinde etiam una tantum uisitur uena, simulatque à secun-
dina abscedit. Hæc umbilicum ingressa peritonæo adnectitur, & sursum conscendens patulæ
iecoris scissuræ^e inferitur, quæ dextrum mucronatæ cartilaginis latus, in anteriori iccoris sede
hominibus habetur, & foraminis cuiusdam aut meatus modo hanc umbilici assumit uenam,
eamq; per iccoris substantiam^f uersus cauam iccoris sedem deducit, non procul à portæ uenæ
caudicis exortu. Atque id sedulo inter secundum uenit expendendum, ne si obiter primum ue-
næ in iccur ingressum spectes, illam inter gibbum cauumq; iccoris medium inferi existimes, &
non accurate id iccoris foramen in homine (cui id priuatim obgigit) expendas. Nonnullis ani-
malibus, ut catulis, unus aliquando & alter ramus in mesenterij^g centrum, ab hac^h uena prius
quam iccur contingit, porrigitur. Quod propter quædam Galeni loca in libro de Foetus for-
matione, ubi is iccur ante cor, ex huius uenæ ductu formari astruit, non segniter animaduerti
uelim. Arteriæ autem umbilico insertæ deorsum adⁱ uesicæ fundi latera porrectæ, ramis ma-
gnæ arteriæ post præcipuam supra os sacrum arteriæ diuisionem continuantur. Arteriæ enim
umbilicum ingredientibus, illis magnæ arteriæ propagibus uniuntur, quas per pubis ossium
foramina in crus descendere docebimus. Umbilici uenæ beneficio foetus enutritur, & arteri-
arum munere ipsius insitus calor reficitur. Cæterum quando infans nascitur, hæc uasa simul
cum^k meatu quo ex uesicæ^l inter intimum & secundum foetus inuolucrum, illius urina effertur,
ab obstetricibus iuxta uentrem^m præcinduntur, bruta autem animalia dentibus abrumpunt
inuolucra foetus plerumque deglutitiæ. Quod horum uasorum in corpore adhuc reliquum est,
temporis successu exarefcit, membraneumq; prorsus redditum, instar funis suam cauitatem
deperdit. Quæ autem sectionis ratione hæc non modo in foetuum, sed & senum anatome ob-
serues, in quinto libro ubi nutritionis generationisq; organorum sectionem persequar, proli-
xè audies. Ne uero uenâ in absolutis hominibus à nobis prætermittam quis arbitraretur, hic
umbilici uenæ quemadmodum in illis apparet, meminisse uolui. Ab umbilico igitur ad iccur
uena exporrigitur, quæ iccori, quemadmodum diximus, inferitur. Atque hæc omnia in ali-
quandiu natis arida ac ueluti neruea, multoq; adipe obducta uisuntur, in foetibus uero ab alijs
uenis nihil uariant. Nunc itaq; tempestiuū eritⁿ magnæ arteriæ distributionē aggredi. Venæ
enim arterialis sermonē tantisper intermittam, donec simul^o arteriæ uenalem pertractare, inte-
grum erit, quippe operæ præcium est, sermonem utriusq; cōmunem instituire.


TOTIVS MAGNÆ ARTERIÆ DELINEATIO- NIS, QVAM SEQVENS PAGINA PROPONIT, characterum Index.

ARTERIÆ magnæ ex sinistro cordis sinu exortus, quam Aristoteles *ἀσπρὴν*
uocauit, eo quod neruosam ipsius partem, uel in mortuis conspici posse diceret, instar uaginæ
fortassis quam Macedones *ἀσπρὴν* uocant. Verum Aristoteles hanc cum caua comparans,
ipsam minorem uenam nuncupauit. Alij Græcorum uocant eam *αἰσπρὴν*, alij simpliciter *αἰσπρὴν*,
alij *αἰσπρὴν*, nos magnam dicimus arteriam. Nonnulli rursus uenam uocauerunt, quo san-
guis impetu per corpus diffusus ducitur. Quidam Arabum interpretes audacem uenam, alij
neruum pulsatilem uocant. Verum eorum uoces temporum iniuria omnes corruptæ leguntur,
quemadmodum apud Haly interpretem, qui habet, eam Aristoteli *αἰσπρὴν* uocari. Quam-
uis interim in hæbraicis Arabum interpretibus, omnia ferè partium nomina ex Græcis ita cor-
rupta legantur, ut nostræ ætatis medici ea sonant.

B, B Duæ

INTEGRA TOTA
ARTERIAE AB
tibus liberæ delineatio, duobus
bus communis.

TIVS MAGNAE
OMNIBVS PAR
proxime sequentibus Capiti.



- B, B** Duæ arteriæ cordis basin coronæ modo succingentes.
C Magnæ arteriæ caudicis in duos truncos bipartitio.
D Arteria oblique ad primam sinistri lateris costam contendens.
E Ramus quatuor superiorum sinistri lateris costarum interualli soboles deriuans.
F Ramus per transversos cervicis uertebrarum processus ad caluariam usque prorepens, & geniculatim dorsali medullæ uicinisq; musculis soboles offerens. ubi uerò is in sinistram duræ cerebri membrana sinum exhauritur, illum abscidimus. Præsenti enim tabula nullum eius membranae sinum expressimus, sed tantum arteriarum, quas Galenus reticularem plexum suis boum cerebris delusus formare arbitratur, seriem mox explicandam. Verum si horum sinuum delineationem expetis, præter figuram decimi quarti Capitis & plerasq; septimi libri, non mediocriter huc facit figura huius libri calci insuta.
G Sub sinistro pectoris ossis latere ad umbilici usque sedem excurrrens ramus, à quo surculi digeruntur in uerarum costarum cartilaginum interualla, & hinc in musculos pectori instratos. insuper in sinistram, qua thoracis amplitudo intercipitur membranâ, & abdominis musculos.
H Ramus posteriores teruicem occupantium musculos accedens.
I Arteria ad cauam scapulae regionem ac in eius sedis musculos prorepens.
K Ramulus ad humeri cum scapula articulum & summi humeri inferiora propagatus, nusquam interim ad cutem excidens.
L Propago in musculos anteriorem thoracis sedem integentes sparsa.
M Propago secundum thoracis latera deorsum procidens, ac musculo brachium deorsum trahenti intertexta. Inter **L** & **M** ramulus unus occurrit, eorum qui in glandulas alæ cavitatem opulentes disseminantur.
N Arteria simul cum interiori axillaris uenæ trunco in manum excurrrens, ac primi illi surculi sub **N** mox conspicui, in musculos humerum amplexantes propagantur.
O Arteria secundum posteriorem humeri sedem unâ cum quarto in brachium pertinente neruo, aliâ quousque in externam cubiti sedem reuolutus, ac undique in alio interim latitans.
P, P Hi ramuli articulo cubiti cum humero sunt peculiare.
Q Axillaris arteriæ ramus radio exporrectus.
R Surculus ab arteriæ ramo **Q** insignito uersus manus exteriora inter primum pollicis os & post brachialis os, quo index suffulcitur, deductus.
S Ramus ulnæ exporrectus, ac in internam quoque manus extremæ sedem digestus.
 * Ramulus musculis claviculis, qui externum latus postbrachialis ossis occupant, quo minimus digitus sustinetur.
T Arteriarum in extrema manu series.
V Amplior ascendens arteriæ trunci portio, quæ rectâ ad iugulum cõtendens, in duos impares ramos dirimitur.
X Sinister diuisionis in iugulo factæ ramus, qui & gracilior est, sinistriq; lateris soporalem constituit.
Y, Z Duobus his characteribus dexter ramus, qui sinistro longè amplior est, insignitur. Verum **Y** priuatim propagationem indicat, quæ in dextro latere prorsus in easdem soboles digeritur, in quas arteriam **D** insignitam in sinistro latere disseminari conspicias. Cæterum **Z** dextram soporalem notat, quam uti & sinistram Arabum interpretes apoplecticâ, & somni, & letargicam, & subeteni, & decolationis uenam appellant, quæ nomina plerisque iugularibus uenis accommodare antea retulimus.
a Sinistræ soporalis arteriæ in faucium regionibus in duos ramos distributio. ac **b** quidem externum, **c** uerò & **d** internum indicât: quanquam duo posteriores hi characteres priuatim ali quid indicent.
c Arteriarum propagatio ad laryngem, fauces & linguam.
d Soporale arteriæ pars caluariâ petens, atque iuxta basin caluariæ in duos distributa ramos, quorum alter, qui sinistram duræ membranae sinum subit, hic quæ in caluariam mergitur, abrumcatus est. quod præsentis figura eius membranae sinus non duxerim delineandos, eos postmodum cum integra cerebri uasorum serie ad frontem decimi quarti Capitis, peculiari figura exhibiturus.

turus. ex qua etiam alterius rami soporalis arteriæ caluariam ingredientis, distributionem petes, & si uisum fuerit huic delineationi ex illa characteres adijcies. qui ferè essent L, q, r, s, u, x, æ, ß, γ, δ: quos hic explicarem, nisi satius omnino foret studiosum a cerebri uasorum serie tantisper abstinere, donec ego illam decimo quarto Capite persequar.

b Soporalis arteriæ ramus, capitis exteriora implicans.

c Dicti modo & b insigniti rami propago, penitus inter faciei musculos excurrentes.

f Rami b insigniti sub auris radice distributio, cuius anterior ramus g notatus, secundum tempus, h. na fertur: posterior uerò, cui b inscripti, secundum auris posteriora sub cute pariter atque ille spargitur.

i TRVNCS magnæ arteriæ, deorsum ad dorsi uertebras explicatus.

k, h Propagines utrinque ad octo inferiorum costarum interualla protensæ, & dorsali quoque medullæ ac musculus dorso & thoraci adnatis ramulos offerentes.

l Septi transversæ arteriæ.

Vcritus ne characterum copia integram magnæ arteriæ delineationem alioquin hic satis obscuram penitus corrumpet, priuata hac effigie modò utendum duxi, quæ superius ubi septo transversæ arteriæ l indicatæ offeruntur, ueluti ex magnæ arteriæ caudice dissecta est: inferius uerò ad seminalium arteriarum, quas i & n indicabimus, exitum. In præsentī itaque figura iam enarrandis propaginibus duas radices pinxi, quum integra arteriæ delineatio unicam (ut frequenter etiam occurrit) tantum habeat. In m. dicet igitur m utriusque, aut unius duntaxat radicis exitum, n dextrum ramum, o surculum in humiliorem omenti



p. membranam hic exporreclum. p propaginem in dextram uentriculi sedem, qua dorsum spectat, q. atque inferius orificium educit, excurrentem. q ramum duodeno intestino & icituni initio exporreclum. r propaginem ad dextram fundi uentriculi sedem deductam, uentriculoq; & superiori s. t. membranæ omenti ramulos exhibentem. s bilis uesiculæ arteriolas. t arteriam icori distribuunt. u. x. tam. Cæterum u insignitur sinister ramus, qui potissimum lienem adit. x propago secundum posterioriorem uentriculi sedem, ad ipsius usque elatius orificium progrediens. y eius propaginis ramus. z. muli in uentriculum quâ dorso innititur deriuati. z ramus orificium uentriculi superius, coronæ modo cingens. æ ramus secundum elatiorem uentriculi sedem inferius illius orificium accedens. ß grandis in demistiorem omenti membranam excurrentis propago, quæ etiam colo intestino multis furculis implicatur. γ furculus in humiliorem omenti membranam hic ad sinistram latum excurrentis. a & a arteriæ lienis cauum subeuntes. e arteria sinistram fundi uentriculi sedem petens, ac uentriculo ipsiq; superiori membranæ omenti soboles deriuans. f ramuli ab alijs lienem accedentibus arterijs, in læuum uentriculi latus deprompti.

g. In integra delineatione, & ea quâ hic indici adhibuimus, aliud ? occurrit, quo insignitur arteria in superiorē ac propemodum uniuersam mesenterij sedem propagata, & suis propaginibus in icium intestinum & ilium & coli partem à iecore ad dextrum renem conspicuam sparsa.

h Dextrum renem accedens arteria. θ Arteria quæ in sinistram renem exporrigitur.

i, i Dextri lateris seminalis arteria. κ, κ Sinistri testis seminalis arteria.

λ Arteria humiliorem mesenterij sedem subiens, ac potissimum in colon intestinum, quâ id à lienis regione ad rectum pertinet, ac dein in rectum intestinum discinditur.

μ, μ Propagines notantur, quæ geniculatim lumborum uertebras accedunt, & in peritoneum & musculos uertebris adnatis distribuuntur. Propago autem ad humilium μ consistens cæteris grandior est, atque ad abdominis usque latera frequenti sobole excurrit.

ν, ν Magnæ arteriæ ad os sacrum in duos trunco distributio. Vtrum isti characteres etiam surculos notant, ab humiliori arteriæ regione in ossis sacri foramina deriuatos.

ξ Interior ramus sinistri trunci iam dictæ diuisionis.

o Interioris rami exterior propago in musculos excurrentis, qui externam ilium ossis sedem & coxendicis articulum integunt.


- ¶ Interioris rami & notati interior propago in ossis sacri humiliorem sedem, uescam & uescicam ceruicem, ipsumq; penem: in mulieribus uero, in inferiorem uteri fundi regionem, & pariter in il lius ceruicem surculos diffundens.
- ¶ Hic etiam arterias appinximus, quarum sinistra ab umbilico hic inter & s ad interiorem prius commemoratum ramum perinde pertinet, ac si uersus umbilicum ab ipso deriuaretur.
- ¶ Interioris rami & insigniti reliquum, quod ab externo ramo trunci diuisionis quæ supra os sacrum sit, portionem asciscens, per pubis ossis foramen in crurum delabatur, inibi in musculos pubis os occupantes digestum, & suo termino cum alia arteria, quæ in quintum femur mouentem musculum præcipue digeritur, ac ↓ mox signabitur, coit, ea sede quæ ascriptum cernis.
- ¶ Propago exterioris rami sursum ad rectum abdominis sui lateris musculum conscendens, atque præcipua ipsius sobole umbilici regionē petens, reliquos autem surculos transuersum in humiliorē abdominis sedem dispensans.
- ¶ Surculus transuersus secundum pubis os ad pudenda prorepens.
- ¶ Sedes exterioris rami, quæ is modò in crurum delabatur, ac in uniuersum crurum disseminari incipit.
- × Ramus maioris cruris petentis arteriæ in musculos propagatus, qui anteriorem femoris sedem sibi uendicant.
- ↓ Ramus ad quintum femur mouentem musculum, & eos qui internam femoris sedem occupant digestus, unoq; ipsius surculo cum illius arteriæ coiens sine, quam per pubis ossis foramen procideret diximus, ac ω insigniuimus.
- Γ Ramus in musculos posteriorem femoris sedem obtinentes deriuatus.
- Δ Δ Ramuli genu articuli peculiare. Hicq; grandis arteria in poplite reconditur.
- Θ Grandis cruris arteria posteriorem tibiæ sedem petens.
- Ξ Ramus fibulæ amplexatibus musculis, præcipue autem septimo et octauo pedē mouētū oblatum.
- Σ Arteria inter calcem & interiorem malleolum pedis inferiora subiens.
- Π Arteria ad pedis humiliora accedens, inter calcem & exteriorē malleolū nonnunquā reflexa.
- Φ Ramuli tibiæ cum calcis articulo proprii.
- Ψ Propago pedis elatiora accedens.
- Ω Arteriarum in pedis humiliori sede distributio. Subsequentibus modò duobus Capitibus non solum hæc cuius indicem absoluius, figura conuenit, sed etiam huc attinet præter crebras quinti libri & sexti & septimi figuras, ea quam huius libri finis subiungam. cuius characteribus perinde atque hæcenus fecimus, in interiori margine utemur.

VNDE ARTERIA MAGNA PRINCIPIMUM DUCAT, & in quos ramos ipsius ascendens pars digeratur.

Caput XII.

QUANDO in interiori margine alicubi, præterquam in duobus proximis Capitibus scribitur fig. cap. 12. ea subaudienda est, qua integram arteriæ magnæ imaginem, antea præfens Caput proposuimus.

Non prolixā de arteriæ magnæ ortu esse disceptationem.



Arterias neq; à cerebro neq; extremis corporis partibus nasci.

LONGE minor inter medicorum ac philosophorū procures de^a grandis arteriæ, quàm de uenarum neruorumq; principijs est dissensio. Hippocrates namq; Plato, Aristoteles ac Galenus pariter cor arteriarum fontem ac originem (uti sanè est) statuunt. Quippe erronea prorsus est Pelopis Galeni præceptoris sententia, arterias docens simul & uenas cum neruis è cerebro nasci: non minus sanè quàm à ueritate simul abhorret eius auctoris placitum, qui spurium tractatulum de uenis, Hippocratis libro de Natura humana interiecit. Quandoquidem, ut cetera taceam, cerebrum uitalis spiritus & sanguinis feruidi ac impetu per corpus ruentis, quemadmodum cor, non est principium, ac arteria nulli: i quàm^b ubi è corde pronascitur, amplior occurrit. Dein hæc quoque illorū dogma improbant, qui arterias ab extremis summisq; corporis partibus nō secus passim oriri arbitrantur, quàm si quis ab extremis arborū uirgulis illarum iniquū recenseret. Verum etiam non philosophiæ modò, sed & medicinæ principes cor arteriarū fontem statuerint, nihilominus tamen de cordis sinu, à quo arteria pronasceretur, nonnihil inter se dissentiant, quum hi quidem

a Tota figura huius cap. præposita.

b A, et si. li. 6. A.

quidem ex cordis medio sinu, illi autem ex sinistro, arteriam oriri contendunt. Cæterum hæc dissenso de cordis uentriculis sinibus ue potius, quam de arteriarum origine est. ac proinde nos tantum duos cordis uentriculos enumeraturi, postposita omni controuersia ex elatiori sede¹ de² sinistri sinus cordis, propter ipsius basis centrum, magnā arteriā³ originem ducere attestabimur, ubi tertius uentriculū⁴ (post dextrā uidelicet membranā arteriæ uenalis orificio præfectā) Aristoteles enumerauit, etsi alia Galeni in libro de Dissectione uenarum sit sententia, nisi forte perperā Dexterioris pro Sinisterioris inibi in Galeni libro legatur. Magna igitur arteria in hoc oru⁵ orbicularis est, achic ipsius amplissima sedes & durior & cartilaginosis cōstitit.

Ipsa autem arteria simulatque enascitur,⁶ duos graciles promit surculos, qui coronæ prorsus modo cordis basim unā cum coronali uena amplectentes, cordi secundum ipsius longitudinem⁷ ramulos transfundunt, quorum plures amplioresq; inibi se offerunt, ubi cordis substantia crassior uisitur. est autē id potissimum in ea cordis sede, ubi sinistrum ipsius sinum continet, & quā seprum utrique sinibus cōmune porrigitur. Coronaliū arteriarum ortus post membranas consistit, quas resumptionem spiritus sanguinisq; ex ipsa arteria in sinistrum cordis sinum prohibere, in sexto libro ostendam. Verū & si coronaliū arteriarum par quodammodo sit amplitudo, ea tamen amplior longiorq; cernitur, quæ ex dextro magnæ arteriæ orificij latere originem ducit, una namq; hinc à tergo dextræ membranæ pronascitur, altera autē à posteriori eius orificij sede principii sibi uendicat, à tergo posterioris membranæ à sinistree interioris membranæ tergo nulla pronascēte. Postq; uerò magna arteria coronales deprōpsit, à cordis basis centro sursum quodāmodo⁸ sub uenæ arterialis caudice conscendit, ac cordis inuolucrum⁹ perforās bipartitō scinditur, ac¹⁰ unam ipsius partē, quæ grandior est, deorsum ad quintā thoracis uertebra¹¹, & deinde per reliquā dorsi sedem detorquet, in omnes quæ cordi subsunt¹² regiones ramos exhibituram. At minor pars supra cor repositis sedibus distribuenda sursum properat, ac statim in progressu asperæ arteriæ¹³ innitens, ac uenæ cauæ inter membranas thoracem intersepientes substrata, ex sinistro ipsius latere¹⁴ ramum distribuit oblique sursum ad primam sinistri lateris costam exporrectum, qui quidem quā pulmoni accumbit atque sinistræ thoracem intersepienti membranæ alligatur, nullas deriuat propagines: uerū simulatq; primam thoracis attingit costam, ab humiliori ipsius sede¹⁵ propaginem deorsum diffundit, quæ costarum radicibus atensa, in tria quatuor superiorum costarum sinistri lateris interualla singulas soboles spargit: à quibus rursus furculi in dorsalem medullam, & musculos thoracis uerte-

brisq; hic in stratos excurrunt. Cæterum ab elatiori sede¹⁶ eius oblique ad primam costam conscendentis rami, alia enascitur propago nuper commemorata multo amplior, quæ ad septimæ ceruicis uertebræ latus oblique repens, in huius lateris transversus processus foramen se inserit, ac deinde per transversorum reliquarum uertebraarum processuū¹⁷ foramina conscendens, perinde atque hæc¹⁸ excurrens uena digeritur. Nam in progressu dorsali medullæ surculos deriuat ea subingredientes foramina, quæ neruis emittendis rerum Opifex exculpit. Deinde & musculis ceruicem hic occupantibus ab illa propagine ramuli quoque sparguntur. Quod uerò eius reliquum est, simul cum comite uena per¹⁹ foramen in posteriori sede sinistri capituli occi-

pitis ossis inculptum, caluariam subit, atque in²⁰ sinistrum duræ cerebri membranæ sinum exhauritur. Præter hanc propaginem uertebris exporrectam,²¹ arteria quam oblique ad primam sinistri lateris costam contendere diximus,²² alia ab anteriori ipsius sede pullulat propago, obliquiori ductu pariter superiora anteriora²³ que petens. Hæc etenim pectoris ossis summum accedens, ac sinistræ thoracem intersepientis membranæ adhærens, decliuis perfertur secundum pectoris ossis sinistrum latus, quā ipsi costarū coarctantur cartilagines. Hæc propago in eisdem omnino ramos digeritur, in quos²⁴ uenam hæc repentem dispensari retulimus, præterquam quod nullæ soboles à præsentī propagine cutē accedant, nisi forsitan obscurissimæ in mamillæ²⁵ corpus pertingant. Quā enim hæc arteriæ propago pectoris ossi exporrigitur, uerarum costarum cartilaginum interuallis ramos offert, à quibus alij ramuli in musculos assurgunt cartilaginibus incumbentes. Deinde & ab hac propagine in sui lateris membranam quæ thoracis amplitudinem intersepit, & in²⁶ glandium in iugulo repositum, furculi mittuntur. Quod autem ipsius²⁷ reliquum est, secundum sinistrum mucronatæ cartilaginis latus thoracis cauitatem ingreditur, & recto hic abdominis musculo subnatum, ad umbilici quodāmodo regionem procedit, in progressu utrinq; ad partes abdominis ramulos offerens, & iuxta umbilicum in plures dissectum soboles²⁸ alterius arteriæ terminos respicit, quam huc ab imo sursum contendere docebimus. Vbi²⁹ arteria oblique ad primam protensa costam, hæcenus cōmemoratas edidit propagines, sinistram aditura axillam, &³⁰ musculum perforatura dorsi motorum secundi paris³¹ sinistrū, ab ipsius elatiori parte priusquam³² thorace penitus labitur, notatu etiā dignæ ma-

Arteria oris
tus sedes.

Coronales ar
teria.

Caudicis arte
rie bipartitie.

Ascendentis
partis series,
ac primum at
teric ad sini
stri lateris pri
mam costā ob
lique tendens
tis.

*Siniftra axil
laru pectus
portionis se
ries.*

gnitudinis^h ramum deriuat, qui in posteriores ceruicem occupantes musculos ad occipitiū^b usque discinditur, nullibi interim cutem subiens. At quem primū illa arteria thoracis cauitatem, & primam costam euicit, iamq; uicinor axillae redditur, ex posteriori ipsius sedeⁱ ramum utcumque insignem spargit in cauiam scapulae regionem, & eius sedis musculos absumendum. Post hunc ex superiori ipsius regione^k aliam, sed non adeo crassam, depromit sobolem, quae ad humeri cum scapula articulum iuxta summum humerum & scapulae gibbum in ramulos digeritur, quorū unus cum^l humerali uena ubi adhuc in alto reconditur aliquouſq; prorepat. Huic soboli^m alius succedit ramus, nonnihil demissius ab axillam petente arteria enatus, ac in musculos anteriori thoracis sedi instratos numerosa propaginum sobole digestus. Dehincⁿ ramuli in glandes axillae cauitatem opplentes ab hac arteria admodum rari sparguntur. Quinetiam priusquam tota arteria in manū absumenda feratur,^o propago quaedam thoracis lateri exporrigitur, potissimum in^p musculum excurrēs, cuius beneficio brachium quodammodo decliue dorso adigitur.^q Quod praesentis arteriae iam superest, axillari uena con comitatum, ac in brachium procedens penitus occultitur, & primū^r graciles ramos internae musculorum humerum amplexantium sedi, & membranarum nervos continentibus distribuit. Insuper deorsum sensim adhuc prorepens, & continuū^s interiori axillaris trunco attensa, aliam emittit propaginē, quae secundū^t posteriorem humeri sedem, quā ipsi cubitum extendentes musculi adnascuntur, oblique prorepat ad externum humeri tuberculum contendens. Haec enim propago unā cum^u uena quam hac duci retulimus, & dein cum^x quarto brachium petente neruo ad externam cubiti sedem pertingit, & sub musculorum capitibus aliquouſq; deductus cessat, qui hic ab humeri externo tuberculo principiū ducunt, & partim radij, partim autem brachialis, partim uerō digitorum motibus famulatur. Vbi autem sinistrae manus^y arteria has soboles digerit, inter^z duos cubitum flectentes musculos recondita, ipsisq; ramulos praebens, ad medium cubiti articuli flexus prorepat, hic utrinque^{aa} ramulum ipsi articulo exhibens, & musculi cubitum flectentis posterioris^{ab} insertioni innitens, hicq; subinde pulsum euidentem edens. Hinc arteria inter^{ac} musculum secundos quatuor digitorū articulos flectentem, & illū qui tertio eorundem digitorum articulos flectit, mergitur, ac ubi nonnihil per cubiti internā sedem prorepat, bipartitū scissus^{ad} unum ramum radio, alterū ulnae exporrigit. Qui secundū radiū fertur, cuiusq; pulsum indies in aegris exploramus, nō procul à brachialis radice^{ae} sobolem deriuat, quae sub^{af} tendinibus pollicem extendentibus ad summā manus externam sedem procurrit in^{ag} musculos digesta, qui inter primū pollicis os & postbrachialis os indicem sustinens collocantur. Quando ramus radio exporrectus illam emittit sobolem, unā cum tendinibus digitos flectentibus^{ah} transuersum brachialis ligamentum transfreditur, & sub^{ai} dilatēte in summā manu tendine, similiter ac^{aj} uena huc pertinens, & neruus quoque illi attensus in tres ramos discinditur, quorum unus in duas diremptas propagines internam pollicis regionem accedit. Secundus uerō duplici ramo internā indicis sedem implicat. Tercius autem inditius internū latus interioris medij digiti sedis conscendit. Ramus arteriae qui ulnae exporrigitur, similiter per transuersum brachialis ligamentum manus uolam subit,^{ak} & duos ramulos minimo digito & totidem anulari, unum autem medio offert, sed interim nullam sobolem in externam summā manus sedem dispēsat, quamuis interim^{al} unam^{am} illis musculis porrigit, qui externum latus postbrachialis ossis occupant, quo minimus digitus suffulcitur. Rami ulnae exporrecti motum haud manifestū percipimus, nisi homo admodū gracilis ac macilentus, aut magno pulsu praeditus fuerit. Quippe Natura ut omnes propemodum arterias, hunc quoq; ramum retinet, tendinibus magis quā is qui radio exporrigitur, occultatum, atque ita nusquam earum portionem Natura in cutem conspicuē emittit, quemadmodum soboles à uenis passim & frequenter perferri prius commemoratum est. Merito igitur nullam in extremis manibus à foris aliam à nuper dicta, quam pollicis ac indicis ascripsimus reperies arteriam, quia ne musculus quidem unus inibi cōstitit. At interna regio quoniam pluribus est septa musculis, ideo multas quoque arterias sibi uendicat. Ad hunc sanē modum^{an} primus arteriae magnae partis superiorae^{ao} petentis ramus diuaticatur, qui ad primā sinistri lateris costam contendit.^{ap} Maior autē ampliorq; ascendens arteriae partis portio asperae arteriae^{aq} innitens, rectā sursum ad^{ar} glandium in iugulo repositū properat. id enim arteriae huic similiter ac uenae lectuli modo subternitur, ac ipsius beneficio ramorum scissio iniurijs innoxie ferendis promptior efficitur. Quum uerō in hunc modum arteria sursum tendit, priusquā elatiore pectoris ossis sedem superat, adhuc in thoracis amplitudine in^{as} duos impares ramos finditur.^{at} Sinister, qui gracilior est (amplius tamen & ipse) nonnihil oblique in laeuū deflexus, sursum cum^{au} interiori iugulari secundū aspectū arterig sinistru latus per ceruicem exporrigitur, ipsaq; soporalis eius lateris arteria censetur. At

*Arteria ra
mus, cuius pul
sum ante bra
chiale explo
ramus.*

*Naturam ar
terias reconde
re.*

*Series maio
ris portionis
arteriae
que sub iugulo
corporis pe
nit.*
*Siniftra sopo
ralis.*

b H.

i l.

k K.

l fig. cap. 6

a, d.

m L.

n inter Let

M.

o M.

p 10 muscu.

q N.

r fi. ca. 6 m.

s paulo sub

N.

t fi. ca. 6

q.

u O.

x 2 fi. cap.

y 2 fi. per Y

z 2 fi. ca. 6 p.

aa 2 3 fi. ca.

ab lib. 4. o.

ac N.

ad 6 muscu.

ae 2. r.

af 8 muscu. tai

ag muscu

ah r.

ai 6 ta. z.

aj 5 ta. o.

ak Q.

al h. S.

am i R.

an k 2 muscu.

ao ta. u. q. r.

ap 12 ta. f. o.

aq 8 ta. Y.

ar m 4 muscu.

as ta. d.

at n 2 muscu. ta.

au 1 muscu. 2 n.

av o 2 q. fi. ca.

aw 6.

ax p fi. cap. 12

ay lib. 4. cha.

az 44.

ba q S.

bb r Spectan

bc tur haec uia

bd ta T.

be s *

bf t 4 muscu.

bg 2.

bh u D.

bi x V.

bj y 6 fi. lib. 6

bk R super Y.

bl x 2 fi. li. 6

bm F.

bn a 6 fi. lib. 6

bo in x c. S.

bp b X.

bq c fi. ca. 6 d.

br aut specta

bs potius uli

bt mam fi. bu

bu rus li. hac in

bv sede.

At dexter ramus sinistro crassior, similiter sursum tendit: & simulatq; primam thoracis costam contingit, ex dextro ipsius latere^a arteriā promit in eisdem prorsus soboles discissam, quas à^a ramo, qui sinistrae manui offertur, pullulare scripsimus: ad superiorū uidelicet costarū intervalla, ad transuersos ceruicis uertebrae processus, ad pectoris os, ad posteriores in collo locatos musculos: & ut rem in pauca contraham, in eisdem omnino ramos digeritur, in quos sinistrae manus arteriam definere commemorauimus. Quod uerò maioris dextriq; rami adhuc superest, crassitie illi congruit^b ramo, quem secundum asperæ arteriæ sinistrum latus prope pau-
lo ante diximus, atque is hæc porrigitur, ita ut ille dexter, secundum asperæ arteriæ dextrum la-
tus sursum conscendit, ac huius lateris soporalem cōstituit arteriam, quæ uti & sinistra
nuncupatur. Quum autem sinistri lateris soporalis arteria (perinde ac dextri etiam) ad fauces
usque^c pertingit, in duos disscinditur ramos, quorū grādiōr idemq; interior fauces subit, ac
mox laryngi & linguæ^d propagines deriuans, ad caluariæ basim^e properat: priusquam uerò in
caluariam mergitur, in duos impares deducitur ramos. Maior per^f peculiare foramen nulla
concomitans uena, caluariam inibi ingreditur, ubi^g glandula cerebri pituitā excipiens in quo-
dam ossis cuneum referentis^h sinu ponitur. Hic ramus mox in ipso ingressu utrinque singulas
emittit propagines, acⁱ unam per^j proprium foramen ad narium amplitudinē dispensat, quæ
suo extremo inter nasi cartilagine, adeoq; ad nasi usque extremū ita cum aliquot faciei arterio-
lis deperditur, ut tacite etiam ipsius motum inibi percipiamus. Altera propago in latus sini-
strum duræ cerebri membranæ^k multipliciter disscinditur, ipsum autem arteriæ corpus duas
illas diffundens propagines bipartitur, & caluariæ basi suffultum, itaq; diuisum in anteriora
nonnihil tantisper repit, donec denuò ipsum colligatur. Subinde uerò huc usque nō diuisa, ne
que collecta rursus, sed simplex prorsus fertur. Vtuncq; autē sit, siue simplex huc pertingat, siue
prius in duas partes diuisa hîc se rursus colligat, inibi^l insignem utuncq; ramum per^m secundu-
m neruorum cerebri parisⁿ foramen ad oculum & anteriorem temporalis musculi sedem distri-
buit. Quod uerò ipsius^o reliquū est, duræ cerebri membranā^p perforat, ac^q partim in tenuem
cerebri membranā^r partim ad sinistrū cerebri uentriculū conscendit, plexū inibi faciens quem
secundinis seu extimo foetus inuolucro tum comparabimus, quando cerebri uasorum seriem
secundo ab hoc Capite persequemur. Vbi etiam paulo diffusius quæ iam postremo loco cōme-
morauī repetam. Alter ramus arteriæ partis, uti dicebam, ad caluariam ductæ, cum^s coniuge
uena in posteriora secundum caluariæ basim fertur, & ramulum^t musculis ceruicis uerte-
brarum anteriorem sedem occupantibus, iuxta primæ secundæq; uertebrae interuallum
offert, ac dein caluariam ingreditur: & commune foramen cum^u sexto cerebri neruorum pari
nactus, simul cum uena in^v sinistrum seu secundum duræ cerebri membranæ sinum exhaurit.
Porro sinistrae soporalis ad fauces^w diuisionis^x exterior graciliorq; ramus, genis seu buccis^y
ramulum offert, penitus latitantem. Insuper in duas propagines sectus, unam sinistro tem-
pori, alteram secundum sinistrae auris posteriorem sedem digerit, pullum etiam edentes sensi-
bilem. Atq; in hunc sanē modum ascendens arteriæ pars in ramos finitur.

Dextrū tras-
chium petens
arteria.

Dextera sopo-
ralis.

Soporalis ad
caluariam ser-
ries.

AMPLIORIS DESCENDENTISQVE MA- gnæ arteriæ trunci in suos ramos series. Caput XIII.



RVNCVS magnæ arteriæ deorsum ad thoracis uertebra^a explicatus, ab infima ipsius sede qua uertebri incumbit, non autem lateribus, utrin-
que^b propagines in octo inferiora thoracis intervalla deriuat, quæ simili-
ter ac^c uenæ cōiuge carentis rami secundum inter-
ualli ductum ad costarum usque cartilagine in ue-
ris costis prorrepunt, spuriarum uerò costarum in-
terualla excedūt, in abdominis latera magis quā
iptæ costæ pertinentes. Ab his propaginibus ramuli in dorsalem me-
dullam per^d foramina neruorum graui in uertebri sculpta, ac dein ad
musculos uertebri thoracis adnatos sparguntur, pari omnino serie
qua uenam cōiugis expertem disseminari superius proditum est. Ipse
autem arteriæ truncus uertebrae corporū sinistrae sedi quodammodo
innotens, deorsum^e septo transuerso quā id undecimæ thora-
cis uertebrae corpus respicit, extra thoracis amplitudinē labitur, ac mox
utrobique septo transuerso^f unam offert propaginem, quæ in plures secta furculos, in humilio-
rem septi iuxta uertebrae sedem præcipue deperditur, soboles sursum ad septi elatiora adeoq;
et^g f^h 7 muscula. qm. a. gⁱ b^j



HAC si-
gura portione
arteriæ a ter-
go finimus,
ut aliquo pa-
cto series pro-
poneretur, qua
hæc ramos co-
stæ interuallu-
lis ex postero
ri ipsius sede di-
gerit.

Ad inferiora
costarū inter-
ualla arteriæ.

Ad septum
transuersum
arteriæ.

1 3 ipsum

*Arteriae magna rami omni-
mum, iecur,
bilis uesicula,
uentriculum,
lienem, duode-
nū et coli par-
tem acceden-
tes.*

ipsum cordis^h in uolucrum quā id septo adnascitur spargens. Post commemoratas propa-
gines magna arteria, ex elatiori sui corporis sede, unum promittit truncum, ramos in uentriculum,
iecur, bilis uesiculam, lienem, omentum, & duodenum intestinum, & colon quoque ubi ven-
triculo id exporrigitur, ad hunc modum offerentem. Praefens truncus simulatqⁱ prodijt, ela-
tiori sede inferioris membranæ omenti suffulcitur, ac in duos magnitudine propemodum æ-
quales ramos diremptus, hūcⁱ qui gracilior paulo est dextrorsum, illum uerò qui modicè am-
plior uisitur sinistrorsum mittit. Dexter ramus uenæ portæ in^o glandoso corpore, quod sub
uentriculi posteriori sede huic omenti membranæ intertextum cernitur, adnexus, sursum ad
iecoris cauum contendit, in medio ductu ex humiliori ipsius sede^o furculum inferiori omen-
ti membranæ, ipsiq^q adeò colo intestino hīc deriuans. Post hunc ab elatiori parte^o sobolem
uentriculo exporrigit, quæ in posteriore ipsius sedem qua is dorsum spectat, pauculis ramu-
lis digeritur. Ex humiliori rursus sede, dexter arteriæ ramus ad iecoris cauum tendens, duas de-
nuò profert soboles. Vnum cum uenæ portæ ramo intestino diffundit, quod duodenum ap-
pellamus, secundum cuius mediam longitudinem & aliquousque ad ieiuni intestini initium ca-
soboles porrigitur. Altera nuper commemorata paulo amplior, ad dextram fundi uentriculi
sedem retorquetur, & superiori omenti membranæ innexa, ex elatiori sede in anteriora & po-
steriora fundi uentriculi ramulos frequenti sobole spargit, perinde ac ab inferiori sua sede alias
in omenti superiorem membranam ducit. Atque hæc arteriæ cum portæ uenæ ramo hæc ex-
porrecto ad medium fundi uentriculi cessat. Quod uerò dextræ arteriæ rami adhuc superest,
postquam ab eminentioriⁱ duos insigniter exiles furculos bilis uesiculæ transmisit, in^o ramu-
los aliquot sectum ad iecoris cauum terminatur, non admodum altè in iecoris substantiam dif-
feminatum. Sinister ramus ab arteriæ caudice prodians, quemⁱ dextro modicè crassiorem
esse dicebamus, inferiori quoque omenti membranæ ipsiusq^q glandoso corpori committitur,
coniungens se uenæ portæ ramo, in tot quot ille soboles digerendus. Mox enim præfens arte-
riæ ramus ab eminentiori sede^o propaginem uentriculo qua dorso innititur offert, quæ pri-
mum^o sobolem unam utrinque in mediam uentriculi sedem eius quæ dorso incumbit regio-
nis exporrigit, deinde sursum ascendens, uenæ portæ^o modo superius uentriculi orificium co-
ronæ instar appositissimè^o cingit, ramulos uentriculi corpori & graciles furculos stomachi
termino, quo is uentriculo continuatur, distribuens. Inter reliquos autem ramos^o unus secun-
dum uentriculi superiora dextrorsum exporrectus, uentriculi humilius adit orificium, furcu-
los quoque in progressu anteriori & posteriori sedibus uentriculi depromens. Sinister arte-
riæ ramus lienem potissimum accedens, ab humiliori ipsius sedeⁱ propaginem in inferiorem
omenti membranam diffundit, quæ paulo post exortum in duos ramos inuicem ualde didu-
ctos discinditur, numerosam arteriarum sobolem deorsum in nunc dictam omenti membra-
nam & colon intestinum propagantes. Hæc edita propagine, sinifer arteriæ ramus fini-
strorsum magis ducitur, & uenæ ipsi attentæ ritu in duas diffunditur arterias: & hæc rursus in
alias tantisper dirimuntur, donec^o frequenti ramorum serie lienis cauo secundum rectam line-
am implātentur. Priusquam uerò omnes arteriæ in lienem cessent, ab humiliore parte eius quæ
demissiorem lienis sedem adit, plerunqueⁱ ramulus inferiori membranæ omenti offertur.
Deinceps ab illa arteria, quæ infimæ lienis arteriæ proxima est, priusquam hæc in lienem de-
perditur, propago pullulat, quæ superiori membrana omenti suffulta, dextrorsum ad uentri-
culi fundum contorquetur, sinistramq^q uentriculi fundi sedem perreptans, geniculatim ramu-
los anteriori & posteriori sedibus, ac dein superiori membranæ omenti soboles spargit. Item
ab alijs lienem adeuntibus arterijsⁱ ramuli enascuntur, qui sinistram uentriculi latus illo pror-
sus modo adeunt, quo à uenis lienem petentibus propagines eodem pertinere, superius com-
memoratum est. Cæterum à magnæ arteriæ corpore, paulo inferius quàm^o truncus cuius
iam seriem absoluius, principium ducit, ab elatiori quoq^q corporis parte^o alia promittit ar-
teria, quæ in superiorē mesenterij sedē in plurimas soboles diffusa, uenæ portæ modo excurrit
in ieiunum, & ilium & coli intestini partē, quæ à iecoris cauo ad dextrum renem usq^q pertinet.
Post hanc inferius paululum ab utroque magnæ arteriæ latere, ampla educitur arteria in sui
lateris renem, quæ admodum & uena, transuersim prorpens. Hæc arteriæ in renes integræ ab-
sumuntur, uixq^q uenarum modo ramulos notatu dignos in^o pinguem renem tunicam disse-
minant. Insuper ab arteria sinistrū renem accedente, ac demissiū plerunq^q, quàm ea quæ sini-
stro reni offertur, principium fumente, feminalis arteria nō enascitur, sed frequentissimè (ut &
dextri testisⁱ arteria) ab arteriæ magnæ corpore originem ducit. Aliquantulo enim humilius
quàm dextræ feminalis uenæ^o initium à caua exurgit, ab anteriori arteriæ magnæ sede femina-
lium arteriarum^o exortus pendet, quæ ipso ortu inuicem sunt conterminæ: ac dextra quidem
cauæ

*Præcipuae
mesenterij ac-
cedens arte-
ria.*

*Renum arte-
ria.*

*Seminales ar-
teriae.*

b₁ fi. 15. 6.
C, D, E, F, G.
i. Specta si-
mulum m.
tegra deli-
neatione fi-
guram illius
indici infer-
tam m.
h 3 et 4. fi.
lib. 5. 8. unde
etiam huius
arteriæ se-
riem petes
uene portæ
ramis ex-
porrectam.
l. n.
m u.
n 34. filib.
5. n. u.
o. o.
p. p.
q. q.
r. r.
32 fig. lib. 5.
Rad T. au-
14. 15. filib.
sc. uerum si
hec in que-
to libro spe-
ciare uisum
est, recurri-
to ad margi-
nem portæ
descriptio-
nis, uidebitur
minus in no-
tando sim.
t. f.
u. t.
y. n.
x. u.
z. r.
a. y.
b. 14. 15. fi.
li. d.
c. z.
d. a.
e. u.
f. a.
g. u.
h. d. d.
i. y.
k. u.
l. f.
m. m.
n. in inte-
gra arteriam
delineatio.
dein cōiuncta
3. 4. 6. 7. 8.
aliquotq^q se-
quentes lib.
5. figuræ.
o. x. f.
p. 22, 23. filib.
5. m. n.
q. 20. filib. 5.
T. V.
r. m. n.
s. 21.
t. 22, 23. filib.
5. u.
u. eandem
fig. a.

cauæ uenæ corpus² transcendens, dextræ feminali uenæ attenditur, quousq; pubis os superâs, ac ex magna peritonæi cavitæ excidēs, ipsi uenæ permisceatur, atq; cum illa anfractus gyrosq; efformet, quorum basis humilior³ uel sedes superiori testis regioni implantatur, ac testis lubstian-
 tiæ & hanc proximè inuoluenti tunicæ ramos præbet. Ad hunc quoq; modum sinistra femina-
 lis arteria sinistrae concreditur uenæ, & in mulieribus quoq; arteriarum series⁴ earundem uenarum distributioni penitus congruit. Vt scilicet⁵ media arteriarum pars in testes adeat, femina-
 liaq; uasa constituat, altera autem fundum uteri implicet. Enarratis hæcenus propaginibus,
 alia succedit, inferius quàm feminales arteriæ, ab anteriori etiam magnæ arteriæ sede principiū
 ducens, & in humiliorem mesenterij sedem distributa. Quandoquidem hæc in colum intesti-
 num, quâ à liene ad rectum usq; intestinum prorepat, ac dein in ipsum quoq; rectum imprimis
 digeritur. A posteriori autem seu inferiori magnæ arteriæ sede, qua hæc uertebriis committitur,
 geniculatim⁶ ramuli utrinq; ad singulas lumborum uertebrias promuntur, qui in dorsalem me-
 dullam & musculos uertebriis hîc adnatos excurrunt. Atque huiusmodi ramuli inuicem ferè
 amplitudinis distinetur specie conueniunt, si modò⁷ unicam utrobique propaginē exceperis, que
 quum cæteris insignior multoq; crassior sit, ac iuxta sacri ossis summum præcipue prodeat, nō
 solum musculos uertebriis attētos accedit, uerum transuersim per peritonæum abdominisq;
 musculos ad latera usq; abdominis exporrigitur. Hæcenus magna arteria in lumborum regio-
 ne uenæ cauæ sinistro lateri succubuit, quum uerò sacri ossis principium attingit, uenamq; con-
 scendens, in⁸ duos grandes truncos instat Y ad hunc modum X inuersi bipartitur. Fit uerò si-
 tus huius permutatio propter arteriæ dignitatem. Quum enim hæc dignior nobiliorq; censea-
 tur, non immeritò ipsam magis quàm uenam recondi, occultari, & in alto corporis ferri, ac de-
 mum iniurijs ferendis pertinacem effici, sagax rerū Opifex uoluit. Ne uerò hîc ab excarniosis
 sacri initio in dorsi motibus arteria promptè lædatur, superpositâ prius arteriam inibi uena su-
 perior⁹ esse, illamq; hanc conscendere uoluit, ut uena instar sub sterniculi cuiusdam arteriæ sub-
 deretur. Cæterum priusquam uenæ cum arterijs in crus delabantur, quum iam sacrum os uasa
 superarūt, uenæ arterijs superiores uehuntur: arteriæq; quoniā digniores sunt, sub uenis recon-
 duntur. Rami uerò qui à magnæ arteriæ supra sacri ossis initū diuisione prodeunt, uenarum ra-
 mis exactissime correspondent. Si¹⁰ exiguos fortè furculos secluseris, qui ab humiliori arteriæ se-
 de, quâ hæc primū bipartitò scinditur deorsum ducti, ac ossē sacro suffulti, ipsius¹¹ foramina
 subeunt, hæc dorsalem medullā posterioremq; sacri ossis sedem petentes. Atq; hæc interdū adeo
 insignes occurrerūt, ut sectionū rudes has uenas esse arbitrarerē, quæ in recti intestini finē, seu
 anum desinentes, sæculentū sanguinem nonnunquā expurgarent. Sinister itaq; quemadmo-
 dum & dexter huius supra os sacri factæ diuisionis tricus, nō procul à diuisione in duos gran-
 des partitur ramos, quorū¹² interior¹³ exteriori gracilior est: ac illico duas à se diffundit propagi-
 nes, quāru¹⁴ unam rursus interiorē¹⁵, alterā uerò exteriorē doctrinæ studio nō inceptè appella-
 bis. Exterior simul cum¹⁶ uena inter sacrum os & ilium os, quâ hæc inuicem dehiscunt, in exteriora
 transuersim exporrigitur, & frequenti utcunq; sobole musculos ilium os amplexantes, ipsūmq;
 adeo coxendicis articulū implicat. Anterior autē in uiris uesicę fundo, & cervici ipsius seu peni,
 & paucas admodū etiam podici soboles dispenfat. In mulieribus uerò, quibus hæc¹⁷ propago
 grandior uisitur, in humiliorem fundi uteri regionem numerosa serie distribuitur. Neq; is uteri
 duntaxat initū calorē refocillat, sed & foetus quoq; quando is utero geritur. Dein hæc propa-
 go præter uterū, etiā muliebrē uesicā, & uteri cervicē ramulis quibuldā intertextit. Quod inter-
 rioris rami qui binas nunc explicatas eduxit propagines¹⁸ reliquū est, deorsum repit, sui lateris
 arteriam, quæ in umbilicū fertur, admittēs. Arteriæ etenim ab umbilico secundum fundi uesi-
 cæ latera deorsum ductæ, ac in natis hominibus coriæcæ inanesq; reddite, in sui lateris ramum
 inferuntur, ipsi uel continuātur, quem modò ab interiori illo ramo reliquū esse deorsumq; ferri
 dicebā. Is nanq; nō minus quàm uena ipsi attenfa pubis ossis¹⁹ foramen petit. Priusquā uerò id
 transit, propaginē assumit ab externo trunci ramo, ubi is iam in crus est prolapsurus. Præsens
 itaq; ramus ea propagine adauctus, per pubis ossis foramen ducitur, & in musculos foramen id
 occupantes, & illos qui à pubis ossē principiū sumunt dispergitur, perinde ac²⁰ uena pubis ossis
 foramen transiens. Ac quemadmodū hæc iuxta mediū longitudinis femoris extremo quodam
 ipsius furculo alteri uenæ in²¹ quintū femur mouentiū musculum dispenfatæ cōmiscetur, ita sa-
 nè & præsens arteriæ ramus suo fine cum alia²² coit²³ arteria, quam illi musculo à maxima crus pe-
 tente arteria distribui non ita multo pōst subiiciam. Exterior nanq; ramus sinistri trunci eius²⁴ di-
 uisionis, quam supra os sacrum fieri dicebā, per inguina in læuum crus²⁵ descendit: anteaquàm
 uerò peritonæum permeat, propaginem sursum peritonæo exporrigit, quæ ad rectum abdo-
 minis sui lateris musculum accedens, furculos in conterminas sedes transuersim utrinq; digerit.

Ad humiliorē
mesenterij se-
dem arteria.

Ad lumborū
uertebrias &
carnes.

Arteria ma-
gnæ supra sa-
crum os diu-
sio, arteriæq;
super cauam
ascensus.


Truncorum
diuisionis su-
pra os sacrum
factæ series.

Arteria pu-
bis ossis for-
amen transiens.

Arteria in
crure series.

ipse autem sursum ad umbilici usque regionem properans, in ramulos diffunditur, qui arteriae eodem à pectoris regionibus tendentis ramulos spectant, ac mamillarum cum utero cōmunionem (si modò arteriarum beneficio aliqua sic) præbent. Quum uerò grandis arteria in crus descendens peritonæum superauit, ramulum ad pubis ossiū commissuram mittit, qui exiguus est, neq; ut eò tendēs uena in multas soboles dispergitur, quarū ne una quidē cutē subit, nisi fortē exilis quæpiam in penis inuolucrū diffundatur. In crure autē, arteria modò uenæ subiecta, ipsa q; uena ueluti propugnaculo munita, ramū in anteriores femoris os amplexantes musculos digerit, qui etiam si in frequētes scinditur soboles, nullam tamen cuti exporrigit. Deinde à grandi arteria alius educitur ramus, in quintum femur mouentē musculum, & eos qui internam femoris sedem occupant musculos, ad genu usq; quodammodo in propagines sparsam, & quædam ipsius sobole illius arteriæ extremo commixtam unitamq; quam per pubis ossis foramen in crus pertingere scripsimus. Cæterum ipsa grandis arteria sensim deorsum prorrepens, secundum femoris os ita conuoluitur, ut ab anteriori inguinum sede inter duo inferiora femoris capita in poplite consistat, nusquā non uena grandiori quæ crus accedit concomitata. In hoc per femoris posteriora descensu, arteria propaginem educit, quæ in musculos posteriorem femoris sedem occupantes excurrit, & aliquousq; cum illis uenarum propaginibus deducitur, quas uenam efformare docui, quæ per genu flexū seu posteriorem ipsius sedem in surcū cutem sparsa fole pertingit, arteriæ interim nulla propagine ad cutē emergēte. At grandis arteria in ipso poplite, uti diximus, recōdita, utriusq; propaginē emittit in alto quoq; occultatam, & in genu articuli latus penitus digestam. Vbi uerò arteria tibiā subire incipit, ab externo ipsius latere ramum diffundit, qui fibulæ exporrectus inter septimum & octauum pedis motus auctorū musculos reconditur, atq; in reliquos qui anteriorem tibiæ sedem sibi uendicant, soboles ultra medium longitudinis tibiæ digerit, ipse autem arteriæ truncus inter capita duorum primorū pedem mouentium musculorū repens, inter quartū pedis motuū opificem musculum, et duos quorum beneficio ultimi digitorū flectuntur articuli, ac quintū pedē mouentium occultatur, neq; multum à ligamento membraneo fibulam tibiæ ossi secundum totam fibulæ longitudinē colliganti distat, & sub medio longitudinis tibiæ in duos dirimitur, quorum interior inter calcem & tibiæ os pedis inferiora subit, unā cum musculorum tendinibus humiliora pedis hāc petentibus. In descensu interior ille ramus furculum tali cum tibiā articulo offert. In pedis uerò planta inter musculum secundos quatuor digitorum articulos flectentem, & tendines qui tertios articulos flectunt repositus, in duas primū partitur soboles, quarum una duplici ramo inferiorem pollicis adit sedem; altera uerò in progressu in duos furculos digesta, unum ad indicem deriuat, in duos tamen prius deriuatum ramulos; alterum uerò furculum interno lateri inferioris medij digiti sedis, indiuisum offert. Exterior ramus illius quæ ad medium longitudinis tibiæ fit diuisionis, inter fibulam & calcem pedis inferiora accedit, unā cum tendinibus septimi & octauī pedem mouentium musculorum, atque hic in duos minimos digitos & externum latus medij digiti disseminatur; in ipso autem ad pedis inferiora progressu, tali cum tibiā articulo propaginem præbet, & aliam hac longē grandiore digerit, sub interiori malleolo ad principium illorum musculorum qui pollicem & tres digitos ipsi proximos in externum latus abducūt. Hæc propago in superiori pedis sedemotum etiam edit tactu sensibilem. Verum ut uenarum pedem subeuntium seriem uariari suo loco relatum est, ita sanē & arteriæ distributio inibi discrepat: quippe interdum, neq; id infrequentē obseruabis omnibus digitis furculos offerri, ab illo ramo quem pedis inferiora inter calcem & tibiā petere diximus, illo qui fibulæ exporrigitur plantam non accedente, at tunc ab arteria in posteriori tibiæ sede recondita, grandis ramus per membraneum ligamentum tibiæ ossi fibulam, quā hæc ossa inuicem dehiscunt colligans, in anteriorem tibiæ sedem pertinet; atque inter eius sedis musculos occultatus, unā cum eorundem tendinibus per transuersum ligamentum in anteriore tibiæ sede conspicuum, in superiorem pedis regionem deriuatur, musculis illis qui digitos in externum latus abducūt, quodammodo reconditus. Atq; hic ramus interdum ligamentū id membraneum transit, mox sub genu articulo, ubi tibiæ os à fibula primū dehiscere incipit, interdum uerò iuxta inferiorem tibiæ sedem, prout nimirum ramus quem arteria tibiā subiens, uersus octauum & septimum pedem mouentes musculos digerit, aut demissius fertur, aut elatius in ramos dissectus cessat, aut etiam prorsus deest. utrumq; enim accidere reperi, quum summo studio non arteriarum solum, sed & uenarum neruorumq; seriem primū discere, ac subinde tum priuatim, tum publice ostendere, ac demum hīc uerius quā elegantius describere sum conatus.

DECIMIQUARTI CAPITIS FIGVRA



DECIMIQUARTI CAPITIS FIGVRÆ
eiusdemq̃ characterum Index.

PRÆSENTI figura nuda uasorum cerebri delineatio proponitur, à uenis arterijsq̃ incœpta, priusquàm ille penitus in caluariã merguntur. Cæterum si forte hæc tabula singula cerebri uasa nō ad amissum ostendat, cā nihilominus quō res alioquin difficilea minori negotio oculis subiiciatur, ac à studiosis in dissectionibus prœptius obseruetur, nō mediocriter acōmodaturā mihi persuadeo. Ne autem ramorū frequentia pleraq̃ obscurarentur, unius duntaxat lateris uasorum seriem (nisi quandoque res secus exigat) delineatam conficiis, haud præteriens omnes propemodum septimi libri figuras hac quoq̃ spectare, ac ab interiori margine ad illas lectorem ablegandum, perinde atq̃ ad figuram huius libri calci insuendam.

- | | |
|--|-----------------------------|
| <i>A</i> Interior iugularis, quā iam caluariæ proxima est. | <i>B</i> Soporalis arteria. |
| <i>D</i> Prima caluariam petens uena. | <i>C</i> Secunda uena. |
| <i>E</i> Quarta uena. | <i>F</i> Tertia uena. |
| <i>K</i> Prima caluariam ingrediens arteria. | <i>G</i> Quinta uena. |
| <i>I</i> Secunda arteria. | <i>H</i> Sexta uena. |
| <i>L</i> Tertia arteria. | |
| <i>M</i> Dexter seu primus duræ cerebri membranæ sinus. | |
| <i>N</i> Sinister duræ cerebri membranæ sinus, quem secundum nuncupamus. | |
| <i>O</i> Primi & secundi sinuum congressus. | |
| <i>P, P</i> Tertius duræ membranæ sinus. | |
| <i>Q</i> Tertij sinus finis osseo commissus septo, quo osæctus organorum sedes interdiuiduntur. | |
| <i>R</i> Quartus duræ membranæ sinus. | |
| <i>S, S</i> Ductus à dextro sinu pullulantes, ac in duræ tenuisq̃ membranarum sedes, quæ illis proximæ sunt, excurrentes. | |
| <i>T, T</i> Ductus ex tertij sinus latere in tenuē diffusū membranā, quos solū abtrūcatos depingere licuit. | |
| <i>V, V</i> Ramuli ab infimo tertij sinus angulo in eam duræ membranæ partem deriuati, quæ dextram cerebri partem à sinistra sciungit. | |
| <i>X, X</i> Tertij sinus surculi cum illis commissi uasculis, quæ per uerticem caluariam subingrediuntur. | |
| <i>Y, Y</i> Exiguæ | |

- Y, Y** Exigua propagines ab elatissimo quarti sinus angulo, in duræ membranæ sedem aliquousq; excurrentes, quæ dextram cerebri partem à sinistra hic supra cerebellum interdiuidit.
- a, a** Ductus à dextro quarti sinus angulo deprompti, qui in duram cerebri membranā, quæ cerebello hic incumbit, ac dein in tenuem & cerebelli & cerebri membranam diffunduntur.
- b** Ductus à quarto pendens sinus, ac secundum totam longitudinem, humilioremq; sedem eius duræ membranæ partis propagatus, quæ dextram cerebri partem à sinistra dirimit.
- c, c, c** Surculi sursum à commemorato iam ductu in dictam quoq; duræ membranæ partem deriuati.
- d, e** A quarto sinu propagati ductus, qui uenarum prorsus modo tenui membrana suffulti, secundum cerebri longitudinem supra callosum cerebri corpus ducuntur. Ac unus quidem qui d insignitur, parti dextræ cerebri attenditur. Alter uero e notatus, sinistra parti exporrigitur.
- f** Ductus à quarti sinus humiliori sede in tenuem cerebelli membranam propagatus.
- g** Ductus f notati propago per cerebri anfractus gyrosq; in humillimam dextri cerebri uentriculi sedem pertingens, ac cum hac ascendente arteria, quam y notabimus, coiens.
- h** Ductus f notati propago retrorsum repens, ac multifariam in tenuem cerebelli membranam dissectus.
- i** Præcipua quarti sinus propago, sub cerebri corpore fornix cameraeue modo extracto, ad interiorem usq; sedem tertij uentriculi cerebri procurrans.
- k** Propaginis i notata in duas partes dissectio, in qua l partem indicat dextro exporrectam cerebri uentriculo, m uero eam quæ sinistrum adit, hicq; abtruncata cernitur.
- n** Tertiæ caluariam ingredientis nenæ furculus, ad auditus organum exporrectus.
- o, o, o** Series sinus duræ membranæ, in quem tertia uena exhauritur, cui perpetuo sinus attenditur, in quem tertiæ arteriæ ramus r notandus absumitur.
- p, p** Propagines eorū quos iam ultimo cōmemorauimus sinuum, in tenuem cerebri membranā sparse.
- q** Diuisio tertiæ & maximæ caluariam ingredientis arteriæ, simulatque in caluariæ amplitudinem mergitur.
- r** Ramulus tertiæ arteriæ, qui in duræ membranæ sinum absumitur, atq; secundum cerebri latera excurrit, o, o, o notata.
- s** Ramulus per proprium foramen in narium amplitudinem digestus, & quod am surculo t insignitur, to nass extremum accedens.
- u, u** Duo grandes rami eius diuisionis, cut q inscribitur.
- x** Propago ex grandium illorum ramorum, quos u & u notauimus, coitu per secundi paris neruorum cerebri foramen ad oculos potissimum excidens.
- a** Propago crassior dicti modo congressus, quæ duram cerebri membranam perforat, ac mox in duos ramos bipartitur β & γ, insignitos.
- β** Ramus propaginis a notatæ, in tenuem cerebri membranam frequenti sobole hic dispersus.
- γ** Ramus propaginis a insignitæ, dextrum accedens cerebri uentriculum, & plexum efformans.
- δ** qui extimo fœtus inuolutro confertur, quiq; hic δ notatus conspicitur.

Sex uenæ caluariam ex altero latere ingredienties.




DVM superius uenæ ramos caluariæ basim ingredientes recenserem, utrinque sex eos obseruari relatum est. Arteriarum uero seriem persequens, utrobique etiam tres arteriarum propagines caluariam subeuntes enumerauit. Ac^a prima quidem illius enarrationis uena, propago ea censebatur, quæ per transuersos ceruicis uertebrarum processus conscendens, caluariam petebat. Secunda ac tertia internæ iugularis uenæ^b rami erant, uenæ qui cæteris caluariæ immixtis uenarum propaginibus crassior ampliorq; uisitur; ac per^c grande foramen, quod etiam^d sexto cerebri neruorū pariparatum est, caluariam ingreditur, prius^e propaginem in anteriorem uertebrarum sedem uersus primam et secundam ceruicis uertebra diffundens. ^f Alter^h peculiari foramine iuxta tertij quartiq; parium cerebri neruorum inciso utens, caluariam citra arteriæ consortium subit. ⁱ Quartam uero uenam externæ iugularis sobolem esse scripsi, quæ^j priuato foramine caluariam petit, ^m ubi imitans futura postremæ parti temporis commissuræ iungitur. ⁿ Quinta demum illa est, quam per^o foramen^p secundo cerebri neruorum pari in caluariam porrigi dicebam. ^q Sexta autem & ultima caluariam subintrat per foramen in octauo capitis osse excisum, quod corum

a D. fi. cap.
16 N. ult.
fi. f.
b ulti. fi. u.
c educiti.
c C.
d 2, 3 fi. ca.
12 li. 1. c.
e 14 fi. li. 7.
N.
f. o.
g F.
h 2, 3 fi. ca.
12 li. 1. R.
iuxta Q.
i 14. fi. li. 7.
l. K.
l. E. ulti. fi.
j. o.
l 2, 3 fi. ca.
12 li. 1. g.
m 4, 5 fi. ca.
6 li. 1. c.
n G. ult. fi.
alter ramus
mu.
o 1, 2 fi. ca.
12 li. 1. G.
p 14. fi. li. 7.
G.
q ulti. fi.
alter ramus
mu.

rum¹² foraminum quæ odoris gratia cæleri putamus, maximè anticum & grandius quoque cernitur.¹¹ Prima arteria quum magnæ arteriæ seriem persequeretur, illa occurrit, quæ unâ cum prima caluariam subeunte uena, per transversos ceruicis uertebrarum processus sursum attolitur, atque simul per idem foramen cum iam dicta uena in caluariam mergitur. Cæterum secunda & tertia, rami soporalis arteriæ censebantur.¹⁰ Vnus, quem uenæ coniunctum per foramen nervi sexti parisi cerebri caluariam ingredi, atque⁹ propaginem ad anteriorem ceruicis uertebrarum sedem deriuare dictum est.⁸ Alter uerò, qui commemorato nuperramo amplior apparet, absque uena comite per⁷ proprium sibi foramen caluariam petit. Atque huiusmodi ferè arteriarum uenarum, quæ in altero tantum latere caluariam subeuntium est numerus, qua autem ratione & serie inuicem committantur & coeant, rursus quæ dirimantur, ac uariè in cerebri membranas excurrant, hîc enitar persequi, id ante omnia monens, nullam prorsus uenam aut arteriam in cerebri⁶ substantiam ad eum modum intexi, quo pulmonibus, lienî, iecori, & plerisque etiam musculis eiusmodi uasa implicari nouimus. Nam uasa cerebri membranas duntaxat contenta, passim cerebro accumbunt, uix quæ ullibi ipsius substantiæ adnascuntur, quemadmodum in sermonis progressu audietur diffusius.⁵ Dura igitur cerebri membrana ubi quadam ipsius⁴ portione inter dextram et sinistram cerebri partem consistit, ac deinde ubi inter cerebrum & cerebellum implicatur, penitusque uelut septum quoddam subintrat, si quis quosdam exigit uenarum modo oblongos, & uenis caluariam petentibus capaciores: sed interim uenarum modo neutiquam teretes existunt. Verùm horum sinuum cavitates secundum ipsorum ductus longitudinè insinuata, trianguli speciem exprimit: non quidem cuiusuis, sed quibus costis longitudine paribus, & instar quartæ partis circuli incuruatis constat. Neque rursum trianguli costarum obliquitas seu incuruatio, in omnibus sinibus eadem existit, nam hæc (uti postea audietur) es latius) alicubi trianguli imaginem refert, cuius una costa extrorsum obliquatur, reliquis duabus introrsum flexis: alicubi uerò trianguli formæ cavitates hæc accedit, cuius tres costæ æqualiter introrsum obliquantur. Præsentis sinus non solum uenarum usum, sed & arteriarum quoque præstant, quanquam id à Galeno cæteris quæ dissectionum professoribus haud animaduersum fuerit, quum illi hos sinus uenarum munere tantum fungi arbitrentur: neque sinus eos arteriarum ritu pulsare è uiuorum sectione, aut uulneratorum inspectione obseruauerint. Quinetiam ipsis non uidetur perfectum fuisse, in istos sinus & uenas & arterias pariter exhausti, suam quæ amplexantur & continent materiam infundere: uenas quidem sanguinem crassorem, arterias uerò uitalem spiritum simul cum sanguine impetu per corpus diffusum. Præter istos sinus, in duræ membranæ implicationibus sinuatos, hæc³ alios quam plurimos obtinet: ex quibus (quemadmodum & nuper commemoratis) frequentes ductus in tenuem cerebri membranam, ac cum hac quoque in cerebri uentriculos excurrunt, qui omnes exactè teretes uenis similiter, cavitates exigunt, non tamen uniuersi parem animanti usum præbent, quum nonnulli uenarum pariter arteriarumque munere fungantur, alij uenarum duntaxat, alij arteriarum. Atque hæc ambo, cerebri membranæ inter reliquas corporis partes peculiariora, rara, & priuata fortiiuntur, eandem nimirum cavitatē ductum uel arteriæ & uenæ pariter munus obire, & interim ipsos in membranarum corporibus ductus seu sinus neque uenam, neque arteriam propriè censeferi posse, uerum proprias quasdam implicationes, actales omnino sicut las sinus uel, quales quis formaret, quando stylos crassiori cuiuspiam corio secundum ipsius crassitiem in longum, quasi uenarum sinus, extructurus impingeret. Quapropter horum sinuum, aut fistularum, aut cavitatum, aut uenarum, aut arteriarum si mauis seriem enarratu, ro, uariè nunchac, nunc illa uoce, prout negotio accommodum uidebitur, uti, quid prohibebit? In uno itaque latere (par enim utriusque est ratio) sex caluariam subingredi diximus uenas, & tres arterias. ac² prima uena simul cum¹ prima arteria, quæ per transversos ceruicis uertebrarum ducuntur processus, deinde¹ secunda uena, &² secunda arteria omnes simul in unius duræ cerebri membranæ³ sinus initium confluunt, qui ad earum quas modo retulimus uenarum & arteriarum in caluariam ingressum⁴ incipit: ad latus nimirum maximi in occipitis offe foraminis, quo dorsali medullæ uia præbetur: deinde & ad eminentiorem foraminis sedem, quod sexti parisi neruorum cerebri gratia insculpitur. Sinus hic occipitis offi semper attensus, secundum⁵ cerebelli descriptionem ex⁶ prioribus uersus exteriora oblique retrorsum sursum quæ descendit, & ilico in progressu⁷ quartam assumit uenam, quam ab externa

Tres arteriæ ex altero latere caluariam subeuntes.

Cerebri substantiæ uenas non innasci, sed ipsius membranas implicari, ipsasque uenas rursus modo cavitatis.



UTRQUE triangulus nam superior quam inferior tribus costis quartæ circuli partis modo curuatis constat 1, 2, 3 insignitis. Verum superior duo latera 1, 2 introrsum obliquata gerit, tertium autem 3 insignitum extrorsum. Inferior triangulus tria latera 1, 2, 3 notata introrsum curuata exhibet.

Duræ cerebri membranæ sinuum usus. Lib. 9 de Adm. sectio.

Quismodi cerebri membranarum sint sinus.

Vena et arteria in primum duræ membranæ sinum exhausta, ipsi sinus sunt.

externa iugulari proprio foramine caluariam ingredi recensimus. Præfens sinus hinc rursus retrorsum modicè que sursum instar quartæ circuli partis protenditur, quousque elastissimam cerebelli partem occipitis ossi contiguam attingit. Ibidem enim dextri lateris sinus cum sinistro coit, atque ex ambobus una communis cavitates efficitur. Iste amborum sinuum congressus occipitis ossi, quemadmodum & sinus ipsi contiguus est, non quidem ad amissum subelastissima parte eius futuræ quam Δ assimilamus, verum multo humilior, & propemodum in media regione consistit, quæ inter postremam foraminis, quo dorsalis medulla ducitur sedem, & dictæ modò futuræ uerticem habetur. Ex mutuo hoc amborum sinuum congressu, alij duo exoriuntur sinus longitudine & cavitatis forma inuicem uariantes, quippe unus longior est, & caluariæ semper quemadmodum prædicti duo contiguus, secundum capitis longitudinem antrosum procedit. Ex eminentissima enim sede congressus dextri sinus & sinistri principium ducens, sub elastissima futuræ Δ imitantis parte, & sub ea quæ secundum capitis longitudinem fertur, & deinde sub frontis ossis medio ille sinus protenditur usque ad ossis septum ab octauo capitis ossis in caluariæ amplitudinem deducto. Quemadmodum uerò dexter & sinister sinus (nisi maius illum primum, hunc uerò secundum nuncupare) inter cerebrum & cerebellum quæ hæc ossi proxima sunt, in dura cerebri membrana feruntur: ita quoque tertius sinus, quem priorem ex duorum primorum mutuo congressu enatum recensui, in ea duræ membranæ consistit sede, quæ dextram cerebri partem à sinistra dirimens, secundum totius capitis longitudinem neque eminentissima, & caluariæ semper contermina. Alter uerò sinus ex communi duorum primorum sinuum congressu pronatus, & qui opportunè quartus constituitur, dissectionum profectores, quantum coniector, latuit. Porrigitur autem ab anteriori sede communis primi secundi quæ sinuum congressus recto tramite uersus priora cerebri, nusquam deorsum neque sursum uergens. Consistit enim in dura cerebri membrana, ubi secundum cerebelli longitudinem id & cerebrum ad eas usque cerebri sedes intercedit, quæ testium & clunium imagini assimilamus. Quartus itaque sinus suo ductu cerebelli longitudinem, & duræ cerebri membranæ inter cerebellum & cerebrum implicationem haud excedit, dextræ & sinistræ cerebri partibus & cerebello æquè attiguus: ac proinde id sibi priuatum uendicat, quod sit breuissimus, & nusquam caluariæ contiguus. Præterea ipsius cavitates correspondet triangulo trium æqualium costarum, quæ omnes ex æquo introsum curuantur. Infimam enim costam imprimè extuberantior, ac (ut sic dicam) teres in cerebelli longitudine promiens portio: duas uerò superiores costas incuruant dextra sinistra quæ cerebri partes, hic non in acutum, sed in obtusum angulum cessantes. Cæterum tres priores sinus duas costas introsum, tertiam extorsum obliquatas gerunt. Horum enim sinuum costæ ossi attentæ extorsum curuantur, quandoquidem his

Cuiusmodi
quatuor sinuum
sine cavitates.

TRIANGULI species, cavitati quartus sinus correspondens.



TRIANGULVS cavitati respondens primi, secundi, & tertij duræ membranæ sinuum.



Propagines
a sinu
enatae.

Propagines
a tertio.

duræ membranæ sinibus, & reliquis ipsius uasis seu ductibus, qui passim per alias membranæ sedes excurrunt, Natura caluariam inculpsit, sinus quosdam efformans secundum semicirculi cauum in cilos, qui duræ membranæ sinus ea parte qua caluariam spectant, conuexos gibbosque excipiunt, ac admittunt. atque demum in causa sunt, quo minus membranæ sinus à caluariâ comprimantur, ipsorum uemoris qui artieriarum modo sit impediatur. Verum reliquæ duræ trium primorum sinuum costæ introsum curuantur, in primo quidem sinu & secundo à cerebello & cerebro, in tertio autem sinu à dextra & sinistra cerebri partibus. Hæ enim perinde ac cerebellum quæ ipsis sinus accumbunt, obtusos & ueluti in quartam circuli partem extuberantes angulos efficiunt. Hacenus itaque quatuor in dura cerebri membrana sinus enumerati sunt, in quos primæ & secundæ & quartæ exhauriuntur uenæ, & primæ secundæ quæ arteriæ. Quas uerò propagines, sinus hi deinceps in duram cerebri membranam & tenuem, ac demum ad cerebri uentriculos diffundant, subsequens modò sermo enarrabit. A primo & secundo duræ membranæ sinibus, in uniuersam eius membranæ partem, qua cerebellum operitur, uarij furculi deriuantur instar uenarum sinuati & sparsi. Ab his deinde furculis, & ipsis dextro inquam sinistroque sinibus, extra duram cerebri membranam ductus plurimi uenarum corpore donati propagantur, in tenuem quæ cerebellum ambit membranam, & eam quæ cerebrum quæ id cerebello innititur, implicat excurrentes. Porro à tertio sinu permulti idemque ampli ductus utrinque ex lateribus propagantur, non quidem ulterius in duram cerebri membranam, uerum in tenuem, quæ hæc dextram sinistramque cerebri partes secundum elasticiorem cerebri sedem amplexatur & continet. Præfens ductus, quemadmodum & alij paulo ante

antè commemorati, simulatq; tenuem membranam contingunt, numerosa admodum serie uarijs anfractibus per eam excurrunt dispergunturq;. Quauero id fiat ratione, quisq; ductuum sit numerus (quia multiplex is uisitur, raroq; eandem retinet seriem) hic non enitar prolixius commemorare, quum id etiam ex cerebri anfractuuum instar tenuium intestinorum inuolutorum forma numeroq; pendeat. Præter hos ductus à tertio sinu numerosa profectio serie, in tenuem membranam dispersos, ° graciles aliquot furculi ex demissiori cavitatis tertij sinus sede, in eam duræ membranæ partem decliues propagantur, quæ dextram cerebri partem à sinistra interdiuidit. Deinde ex elastissima tertij sinus sede, ° tenues admodum portiunculæ illis committuntur uenis, quæ ex uerticis cute in caluariam per ° exigua ipsius insculpta foramina prociidunt. Verum quartus duræ membranæ sinus frequentes etiam educit propagines, pari quodammodo serie perpetuè pullulantes. Quum primùm enim hic sinus ad eas cerebri ° particulas, quas clunibus & testibus comparamus, pertingit, atq; iam ° ramulos quosdam exiles ex elastissima ipsius sede in eam quoq; duræ membranæ partem, quæ dextram sedem cerebri à sinistra differrinat, ac dein ex lateribus in eam duræ membranæ sedem quæ cerebelli integit, in progressu obtrulit, ex superiori ipsius regione ° propaginem educit cavitatis uenis simillimam, & quæ in humilissima dictæ iam duræ membranæ partis sedem secundum capitis longitudinem usque ad ° septum sinuum olfactus organorum perfertur, & in itinere ° furculos ex elatori sua sede sursum in eandem duræ membranæ partem diffundit. Præter hanc notatu dignam propaginem, quartus sinus ex eadem sede qua illam deprompsit, utrinque secundum dextram & sinistram cerebri partem, ° unum edit ductum uenarum corpori simillimum, qui ° calloso cerebri nobis uocando corpori proximè secundum capitis longitudinem propagatus, tenuiq; membrana suffultus, in progressu tenui membranæ ramulos aliquot communicat: ac dexter quidem ductus dextræ cerebri parti, sinister uero sinistræ exporrigitur. Quemadmodum uero quartus sinus, ad utramq; cerebri partem nuper dictas deprompsit soboles, sic quoq; ab infima ipsius sede propter ipsius iuxta cerebri testes terminum, ° propagines distribuit in tenuem membranam quæ cerebellum amplectitur. Atq; earum propaginum nonnullæ retrorsum tensæ, superiorem cerebelli sedem perambulant. Nonnullæ uero per humiles cerebri anfractus, qui iuxta cerebri testes consistunt, etiam ad anteriores cerebri uentriculos repunt, plexui quem illic haberi docebimus cōmiscendæ. Cæterum præter has quarti sinus propagines ductus uenæ, is ° aliā insignem & amplam educit propaginem, quæ ex ipsius ad cerebri testes extremo recto tramite antroorsum uersus cerebri uentriculos excurrit, ° plexum efformatura quem à secundarum seu extimi foetus inuoluti forma, Græci *χορδοίς* nuncupant. Hæc namq; propago simulatq; è quarto sinu prodeit, aut ubi ipse sinus in hanc propaginem degenerat, illa præter proprium ipsius corpus à tenui membrana processus quosdam seu membranulas exigit, quæ ipsi obuolutæ tūtō illius ramos atq; implexus colligant, ac suspensos aptè suffulciunt. Simplex namq; & absque coniuge ex quarto sinu enascitur, testium medio supertensa: quod ubi attingit, uelut in ° multis discinditur furculos, qui unius retis instar inuicem dirimuntur & cōeunt. Hæc propago ° glandulam cerebri testibus innixam, quæ à nucis pinæ seu turbinis forma *κωνοειδής* & *κωνόειρος* Græcis uocatur, transcendit, ac sub ° ea cerebri particula prorepat, quæ à cameræ aut testudinis speciei *κωνοειδής* Græcis nuncupatur. Quum uero propago, sub illa cerebri prorepens particula, ad anteriorem usq; communis dextri & sinistri uentriculorum cerebri cavitatis, anteriorem uel tertij cerebri uentriculi sedem ° pertingit, bipartitò scinditur, ° unam partem dextro offerens uentriculo, ° alteram sinistro. Cæterum quo nam modo partes hæc retis semper forma quasi contextæ, & membranulis ipsis adnatis contentæ, ° arterijs eodem pertinentibus commisceantur, opportunè subiungā, ubi arterias sermone in illos quoq; uentriculos deduxero. At arbitrabitur fortassis quispiam, in hac duræ membranæ sinuum enarratione aliquid à me prætermisissum, quod mentio nulla adhuc illius regionis incidit, quam procul dubio à torculari *λινωτή* Græci uocauere. Hanc sanè non præterissem, si modo certò quæ nam pars ita appellata fuerit, mihi constitisset. quippe aliquam sinuum sedem ita nuncupatam fuisse non ambigo: sed apud Gale num non constat, an ° communem primi secundiq; duræ membranæ sinuum congressum, à quo & tertius & quartus prodeunt, ita primùm Græci appellauerint: nūm uero quarti duræ membranæ sinus ° terminum cerebri testes respicientem, atque in uentriculos exporrectum, uideretur namque Galenus modò huic, modò illi parti torcularis nomen accommodare: uti sanè utramque torcular dici nihil obstat. Concurfus enim ille in quartum & tertium sinum, sanguinem tanquam uinum è torculari promit. perinde ac terminus quarti sinus in omnes quæ emittit propagines sanguinem dispensat: adeò per me licebit, quamuis sinuum sedem torcular appellare, ac in illis regionem constituere in qua Arabes sanguinem extra uenas consistere

Propagines
à quarto.

Processus à
quarto sinu ce
rebri perēs uē
triculos.

Quid e
torcul.

m puta

*Tertia calua-
ria petentis ue-
nae series.*

*Quinta ac
sexta uenarū
series.*

*Tertia arte-
riae series.*


*Plexus in pri-
oribus cerebri
uentriculis co-
stitutus.*

*Quis Galeni
reticularis sit
plexus.*

putarunt, modò sinuum ac cerebri uasorum seriem non perturbet: quorum quia iam primæ, secundæ & quartæ uenarum, & item duarum primarum arteriarum distributionem exequutus sum, modò proximum est, tertiæ uenæ & arteriæ diuicationem subnectere. Tertia igitur uenæ, quæ minor est internæ iugularis portio, simulatq; ramulum per foramen ipsi & neruulo cuidam quinti paris commune ad auditus organū transmissit, caluariam ingreditur, ac duram contingens cerebri membranam, in sinum uenæ prorsus modo cauatum & prorepentem celsat, qui nullam arteriæ sobolem in suis ipsius cavitatem admittit, sed passim alium sinum sibi commitemascit, in quem arteriæ ramum exhauriri mox dicam. Præfens sinus in quem tertia absumitur uenæ, uarias soboles in totâ duræ membranæ sedem cerebri basi substratam diffundit, à quibus denuò ductus aliquot in tenuem cerebri membranam (ut à quatuor illis grãdioribus duræ membranæ sinibus) deducuntur. Inter cæteras autem huius sinus propagines per duram membranam excurrentes, una secundum cerebri latum sursum ad uerticem usq; cõdendit, uenæ modo in multam sobolem deriuata. Ad hanc quoq; speciem quinta uenæ per foramen secundi neruorum cerebri paris ingressa, dein & sexta per maius octauū ossis capitis foramē, quā illi olfactus organa incumbunt, caluariam petens, in proximam sibi duræ membranæ sedem exhauriuntur. Harum utrarumq; & tertiæ uenarum sinibus (quia illi caluariæ perpetuò attenduntur) caluaria aptis cavitatibus cedit, quas ipsi elegantissimè insculptos primo libro recensimus. Tertia arteria peculiari transuersoq; foramine in caluariā ingressa, in duos graciles & totidem crassos dirimitur ramos. Vnus gracilium, qui exterior est, tertiæ uenæ mox attenditur, & in duræ membranæ sinum exhauritur, illi undiq; attentum & commissum, in quem tertiam uenā absumi diximus. Alter gracilium ramus, qui interior humiliorq; uisitur, per proprium & sibi duntaxat exculptum foramen rectā ductus, in narium amplitudinem procurrat, atq; in plures dissectus ramulos, unū nasi extremo offert. Verum duo grandes rami in dextro latere (quod nisi aliud subiunxero, de sinistro quoq; intelligendum est) nihil inuicē deducti, & adhuc caluariæ instrati antrorsum prorepunt, & mox in unum denuò cõeunt, & statim à congressu in duos impares ramos diuiduntur. Minor commune cum secundo neruorum pari foramē sibi uendicans, tandem cum uisorio neruo ad oculos prorepit, atq; internæ temporaliū musculorum sedi furculos cõmunicat. Grandior autem ramus sursum conscendens, duram perforat membranā ad latius glandulæ cerebri pituitæ excipiētis. Quum primum uerò in duræ cerebri membranæ amplitudinē contendit, in duos denuò ramos partitur, ac horum unus multiplici sobole in tenuem membranā hīc cerebro obductam spargitur: alter uerò tenuis membranæ portiuncula concomitatus, in uarios furculos inuicē complicatos diffunditur, quem ab extimi fractus tantisper ascendit, dum in humilimam dextri uentriculi sedem pertingat. Hinc in posteriora primum sursum ad postremam usq; eius uentriculi sedem fertur, in ascensu portiunculā propaginis cuiusdam assumens, quæ à quarto duræ membranæ sinu cerebri anfractibus inibi offertur. Quum uerò hīc arteriæ ramus retis quasi modo implexus, posteriorem dextri uentriculi cerebri sedem superauit, secundum eius uentriculi ductum in anteriora porrigitur, donec ipsi altera parte eius propaginis miscatur, quam sub cerebri corpore fornix aut cameræ modo extructo, à quarto duræ membranæ sinu huc pertingere dictum est. Ab hac itaq; arteria, & dextra eius propaginis parte plexus ille in dextro cerebri uentriculo constituitur, quem ab extimi fractus inuolucris forma nuncupari scimus, id nomen etiam subinde tenui membranæ cerebri accommodantes. In sinistro cerebri uentriculo plexus ille constituitur, à sinistra sporariæ ramo, & eodē tendente altera parte eius propaginis, quam ad cerebri uentriculos à quarto sinu pertinere, superius scriptum reliquimus. De reticulari uerò Galeni plexu nihil hīc mentionem duxi, quod iam cerebri uasorum seriem mihi perspectam esse haud dubitem, atq; ideo minus modò aliquid confingendum est, quod nouimus Galenum boum cerebri dissectione deducere, non hominis cerebrum, uti neq; ipsius uasā, sed boum recensuisse. Si enim tertiæ caluariæ petentis arteriæ seriem in homine examinaueris, illam, uti ego nunc enarraui, comperies: interdum tamen unicū obseruabis esse ramum, duos illos, quos aliquosq; protensos inuicem coire dixi. Cæterum si bouis arteriam indagaueris, duramq; cerebri membranā iuxta glandis pituitæ cerebri excipientis latera diuiseris, aliquid Galeni reticulari plexui simile comperies, neque amplius hæc mea paradoxa admiraberis, quum ea homini, ut Galeni descriptio aliqua ex parte boui, cõueniat. Verum hæc ad septimum spectant librum, qui principis animæ sedi consecrandus, horum uasorum dissecandi rationem lucidissimè persequetur.

7 K. eductum ab H & i re-
pentibus sub A, A. 230 fi.
lib. 5 F. K. Q. 4 Examina-
bis hīc 16 figuram libri 7.

CAPITIS. FIGURA.



eiusdemq; characterum Index.


A Sedes, qua arterialis uena ex cordis dextro sinu originem ducit.

C Exterior uenæ arterialis tunica, peculiari respondens uenarum tunica.

F. triplici sobole dextris pulmonum sedibus distributum. F uero dextrum indicat truncum. G

SECONDA REGIMLOVI

CAPITIS FIGVRA.



eiusdemq; characterum Index.

m 2 H Venalis

H Vēnalis arteriæ à corde pronascens initium. Huius uasis orificij membranæ quia in corde non
sistunt, hic simul cum uase, ut in arteriali uena, exprimi nequierunt.

I Indicatur crassities simplicis arteriæ uenalis tunicæ.

K, L Prima uenalis arteriæ diuisio, simul cum ipsius ortu facta.

M, M etc. Series uenalis arteriæ per pulmonum substantiam innumeris propaginitibus facta.

V as in arte-
riarum uena-
rumq; sermone
adhuc reliqua.



ELIQUA adhuc in uenarum arteriarumq; sermone sunt duo uasa, quæ
singula duabus uocibus à dissectionum proceribus explicantur: ac unū
quidem uenam arterialem, alterum uerò arteriā uenalem appellant, no-
men nimirum ab usu, & appendicem à corporea substantia indentes.
Vena itaq; arteriosa uas dicitur, ex elatiori sede dextri cordis uentriculi in
pulmones numerosissima ramorum serie digestum, sanguinemque in eo
cordis uentriculo elaboratum pulmonibus subministrans. Atq; hoc uas
non uenæ, sed arteriæ constat corpore: unde etiam quia sanguinem uenarum modo deferet,
uenæ nomen obtinuit. quod uerò arteriarum tunicis conformetur appendix iste, arteriosa illi
adijcitur. Porro alterum uas à sinistro latere basis sinistri cordis uentriculi egressum, sparsa etiā
sobole in pulmones discinditur, ac aërem ex pulmonibus in sinistrum cordis uentriculum
deferendo potissimum famulatur, & interim uenarum corpore constituitur. Vnde quia aëris
deductui subministrat, spiritaleq; organum est, arteria appellatur, à substantia autem & confor-
matione uenalis dicitur. Atq; ita secundum corpoream substantiam, uas quod ex dextro cor-
dis sinu pronascitur, arteria est: quod autem ex sinistro, uena. Contra usus ratione, uas ex sini-
stro sinu prodiens, arteria censetur: ex dextro autem, uena. Cæterum quæ uenarū arteriarumq;
corporea sit substantia, duobus primis huius libri Capitibus perstrinxī. Quamobrē uerò hæc
uasa & ortu & usu ac substantiæ conformationē à uena arteriaq; discrepent, deinde cuiusmodi
membranæ ipsorum orificijs præficiantur, in sexto libro qui uitalis animæ partibus dedicabi-
tur, exequar. Nobis uerò præsentī libro finem imponentibus, nemini mirum uideri debet,
prolixum Caput hīc nō subnecti, quod uenas citra arteriæ consortium in corpus diffusas, item
arterias citra uenæ consortium recenseret. Quandoquidem si quis earum desideret (uti sanē de-
bent omnes) enumerationem, ilico hanc ex uenarum & arteriarum tabulis, cū has mutuō con-
feret, spectabit. Integræ enim magnæ arteriæ delineationi, nuda uenæ cauæ effigies proportio-
ne respondet, ambasq; in eandem circumferentiā digestimus. Cæterum quo minus hac in par-
te meam operam quis requirat, ad præsentis Capituli adeo que totius libri finem, meæ Epi-
tomes tabulam impono, qua uenas & item arterias meo Marte sum conatus exprimere. Hæc
enim quum & arterias simul cum uenis completatur, etiam lucidissime commonstrat, quæ nā
uena citra arteriæ consortium, & quæ rursus arteria absq; uena coniuge per corpus digerantur.
Verū quum uenæ cauæ ramorum seriem in præsentis libri contextu prosequeretur, non
semel sanē ad uenæ sectionis tractationem sermo lubens prorupisset, modò uenam huic illi ue-
parti uiciniorē, modò remotiorē, eamq; aut grandem aut exilem, & secundum rectitudinē
undecunq; hæc petatur, fibrarumq; consensum huic aut illi parti correspondentē, enarraturus:
& non uulgariter admoniturus, sanguinem ē secta uena fluentem, in totius uenæ corpore com-
plecti: ideoq; non partium uenis accumbentium situm, sed uenarum ductum atq; distributio-
nem in illa quæ omnibus in ore est, rectitudine animaduertendam: itaq; de uenæ sectione agen-
dum, atq; de utero quopiam, qui hinc inde uarios processus educeret, & interim unicus conti-
nuusq; esset. At semper quantumuis inuitis sermonē cohibui, quum ex uenę distributionis enar-
ratione, adeoq; ex uenarum effigie cuius (qui modò tres euacuationis species, & præsentis, aut
eminētis affectus naturam minimē ignoret) futurum sit longē facillimum, dignoscere quæ nā
uena huic illi ue membro propinquior sit, quæq; amplior aut gracilior: deinde quæ leui aut dif-
ficili opera diuidi possit: postremo, quæ fibras & rectitudinem cum laborantis membri uenis
participet.

VENARVM ET ITEM ARTERIARVM OMNIVM INTEGRA ABSOLVTA QVE
DELINEATIO, IN HOC POTISSIMUM PARATA, VT IN CONSPICVO ESSET, QVAENAM VENAE CVM
arterijs portigantur, & que abq; arteriarum consortio per corpus repant, ac rursus cuiusmodi arterias Natura coniugibus venis desluerit.

CHARACTERVM OMNIVM IN HAC FIGV
racum suis partibus occurrentium Index.

IN praesenti figura primarii musculi Latiorum occurrunt characteres, orga
na praeter venas arteriasq; obvia notantes. Significatur itaque,

A. A. A. Septum transversum.
B. Cordis involuti portio, iuxta asseruata, ubi id seipo continuatur.
C. Cor sua sede repositum.
D. D. D. D. Quatuor pulmonis lobes, lobis ut.
E. Afferens arteria.
F. F. Gibbi icoris magnae portio.
G. G. Cavum icoris.
H. V. Scula excipiente hili aequa parata. Si interius ex characterum serie aliqui
omittantur, non ideo aliquid praesentis figura expressum, nos innotati praeterisse
arbitraberis, quoniam ex Epigramas nostrae tabulae huc duntaxat tantum assumpse
rimus, quantum venarum arteriarumq; digestionis ordinu
da sufficere duximus.

O. Dexteri vasis anterior scdes.
P. Sinistri vasis.
Q. Vitis usque simul cum umbilico et vasis umbilico ascriptis,
reliquisq; partibus, quae huiusmodi characterum explicatione
indolentibus.
T. Vene cauae caudicis sedes, inter septum transversum & cor
consistens.
V. X. V. sferum coramurum ritu cordis basim antientium scdes,
atque adeo cordis basim.

Y. Cordis micro.
Z. P. anti ab arterijs usque coronalibus deorsum per cordis
superficiem diffusi.

a. Haec parte cauae caudicis in dextrum cordis sinum desiste
re.

b. Dextra cordis arteria.

c. Sinistra aortica cordis micro.

d. Vene arterialis caudex. V. enula aeternae arteriae initium quia
in sinistro cordis laere, ut hic cauae consistunt in dextro con
sistunt.

e. Sinistra aortica cordis micro.

f. Superioris portis magna arteriae trunci portio, sinistri bra
chio passim obliata.

g. Dextra cordis arteria.

h. Dextra cordis arteria.

i. Dextra cordis arteria.

k. Dextra cordis arteria.

l. Dextra cordis arteria.

m. Dextra cordis arteria.

n. Dextra cordis arteria.

o. Dextra cordis arteria.


p. Dextra cordis arteria.

q. Dextra cordis arteria.

r. Dextra cordis arteria.

s. Dextra cordis arteria.

t. Dextra cordis arteria.



b. A. illa ramus cui anteriori interiori & basili sedem inueniunt diffusus.

c. R. eius qui cum brachij nervum ad cubi usque exteriori conueniens.

d. A. illa ramus in duos trunci partiti.

ff. Truncus in alio latens, & arteria undiq; cōminutus, & per cubi flexu in cubiti tendit.

g. Dextra trunci ramus radio exporretus, & furculor pollicis, index & medio exhibens.

g. Arteriae dextrae ramum conuoluitis suboleas arteriam manus sedem inter indicem ac pol
licem accedens.

i. Reuoluit illius trunci ramus ulnae exporretus, & paruo d. g. io, anulari & medio subo
lae deponens.

k. Sicut excurrunt axillaris trunci intra cubiti articulum diffusio.

l. A. illa ramus communem conueniens.

m. Communis uena.

n. Communis uena.

o. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

p. A. illa ramus ulnae exporretus, usque in eadem diffusio, & s
uo exteriori cum quodam humerale ramo coeans, ubi a. p. ossum.

q. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

r. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

s. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

t. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

u. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

v. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

w. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

x. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

y. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

z. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

aa. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

bb. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

cc. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

dd. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

ee. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.


ff. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

gg. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

hh. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

ii. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

jj. Sicutulus communis internum manus aduent sedem, & hic deys con
uoluit ramula.

[illegible]

CHARTA PARVAS ALIQVOT FIGVRAS COM
PLECTENS, QVÆ FIGVRÆ AD COMMONSTRANDAM VE
narum arteriarumq; simul commissarum seriem paratæ, ac in pagina m 3, aut numero 313 inscripta obuiæ,
ueniunt agglutinande.

PRIMA.

TERTIA.

SEXTA.

VT figuras hæc
chartæ impressas commo
de suis sedibus gluiues,
illæq; ualidiores reddan
tur, primùm præsent
chartæ membranam sub
glutinabis, singulasq; fi
guras à superfua papy
ro rescabis. PRI
MA, quæ uenæ pa
ri carentis distributio
nem proponit, magna fi
gura tergo illi uenis cõ
mittenda, ubi caue cau
dex eam uenam promit
ac o in utrisque figuris
scriptis spectatur. SE
CVNDA, ubi à
redundanti papyro cir
cuncisa erit, duas partes
constituet, quarum super
rior uenam arteriam quæ
dextri lateris exprimit,
sub pectoris osse superio
rem abdominis sedem pe
tentes. Huius itaq; par
tis q ad magnæ figuræ
q figitur, et * ad res
mum qui ad dextrum la
tus 2 et m in magna
figura occurrit. Cæte
rum humilior pars uenæ
arteriamq; exprimens,
quæ inferiorem abdomi
nis sedem implicat, illic
est iungenda, ubi earum
radices iuxta l in dex
tro latere spectantur.


TERTIA
cæteris dignior, uenæ
portæ distributionem si
mul cū arterijs illam con
comitantibus, magna quæ
inferioris membrana o
menti portione et liene
pariter exprimens, ad ca
uam icoris sedem maiori
figuræ necleuit, ubi o
p, s, et contermini ali
quot characteres in utris
que figuris spectantur.

QVARTA
portionem gibbæ sedis ie
coris proponens, nō inu
oluitur uelut ex puncto il
lic glutinabitur, ubi A
inter s et F maioris
figuræ consistit.

QVINTA
præter testes ipsorumq;
inuoluta, et urinarios
meatus, uenas arteriasq;
feminales ostendens, illic
est committenda, ubi n in
ambabus figuris obuium
est, aut ubi uena feminalis arteriæ primùm iungitur, meatusq; urinarij illis subijciuntur.

SEXTA primùm sub
SEPTIMA uenit glutinanda. Septima enim uesicæ et penis anteriorem sedem proponit, unâ cum ua
sis quæ umbilico asserimus. Sexta autem humilior penis superficiem in hoc expressimus, ut nota figura ex ambabus illis confurgens, characterē q
super quinta figuræ q necle quæat, ac postmodum penis in ster S implicari.

OCTAVA figura mulieris uesicam et umbilici uas, uenariorumq; meatum portionem continens, maiori non est committenda, sed illi fi
gura quæ in chartæ tergo ubi maior impressa est, utrum ipsius, uenas et arterias feminariasq; uasa commonstrat. Iungitur itaq; octaua ad paruum
illam figuram ubi n occurrit, uenæq; feminalis arteriæ committitur, nexu uero fiet urinarijs tantum meatus, proportionē a uesicæ situ sumpta.



SECUNDA.

QVARTA.

SEPTIMA.



QVINTA.

OCTAVA



ANDREAE VESALII

315

BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPO-

RIS FABRICA LIBER QVARTVS, NERVIS PROPRIJS,

ac peculiares ipsi figuras in Caputū quibus conue-
niunt fronte exhibens.

QVIBVS CORPORIS PARTIBVS NER

ui nomen tribuatur, ac quis propriè nervus uocetur, & demum quid is sit,
una cum ipsius differentia & usu. Caput I.



ERTIO libro uenarum, sanguinem à iecore in uni-
uersum corpus deferentium, & arteriarum quæ uita-
lem spiritum simul cum sanguine impetu diffuso à cor-
de corporis partibus subministrant, distributionis se-
riem complexus sum, nunc uerò proximum est, neruo-
rum à cerebro animalem spiritum membris, qui illo
ad ipsorum munia indigent, deducendum propagatio-
nem persequi, à generali neruorum differentia sum-
pto sermonis exordio. Dissectionis enim proceres
triplicem neruorum differentiam (uti & antea alicubi
monuimus) statuunt, quandoquidem ligamenti ossa
mutuo colligantibus, et non minimam musculorū por-
tionem constituentibus, nerui nomen, perinde ac uul-
gus, accommodant. Dein tendines, & uniuersas mu-

*Ligamenta,
tendines et pro-
cessus cerebri
dorsalisq; mer-
dulle, neruos
generatim ue-
cari.*

*Organū nre-
ui nomine pri-
uatim nuncu-
pauimus.*

a. fi. ca. 1. l. 1.

*b. fi. ca. 2. l. 1.
lib. 2. f. 1.
passim in
musculorū
tabulis.
c. passim in
1. 2. fi. ca. 2.
et 2. 3. fi. ca.
p. 1. 1.*

*a. fi. lib. 5.
h. ad dis-
sectionem.*

*e. eiusd. fi. 3.
fig.
seu. fig. 1.*

sculorum enervationes, sub neruorum nomine, uulgi quoque ritu, complectuntur. Tertium
autem neruorum genus enumerant, quod nos in præsentī aggrediendum duximus. organa
uidelicet longa, teretia, nullamq; intus cauitatem, quæ sensu dignosci queat, in sui medio forti-
& caluariam uel dorsi ueribras elabentia, ac demum animalem spiritum à cerebro anima-
lis facultatis fomite ad corporis partes deferentia. Atque hæc organa dissectionum professores
nerui nomine citra appendicem præcipue dignantur. Quod à Græcis ad nos demanauit, qui à
functione seu munere unicum instrumentum duobus nominibus nuncuparunt, *νεῦρον* id est *νεῦρον*,
& *τρίφυλον* appellantes, quod uidelicet musculi neruorum potissimum ope & nutare & ten-
dere ualeant, quippe quod nulla corporis particula neque motum arbitrium, & qui è nostra
pendet uoluntate, neque sensum sine neruo nanciscatur, ac quod neruo præciso, aut laqueis in-
tercepto, aut aliòquin corrupto compresso uel immobilis confestim insensibilisq; pars euadat,
omnibus concessum est Anatomes professoribus. Quod autem cerebrum neruorum, sicut
& dorsalis medullæ, origo ac principium sit, quodque nerui partim ex cerebro, partim à
dorsali medulla oriantur, minime omnibus notum exploratumq; fuit. Alij enim cor neruorum
posuerunt principium, nonnulli duram quæ cerebrum inuestit membranam, nullus interim ie-
cur, aut aliud eius generis uiscus. Verum Hippocrates, & quū iam senio conficeretur Erasistra-
tus, Lycus, Andreas, Marinus, Herophilus, & Galenus dissectionis procerum facile prima-
rius, ceteriq; Anatomicorum præcipui, ex his quæ in corporum refectione conspiciuntur, ue-
rissimè asserunt, cerebrum neruorum esse initium: & præterea neruos ab illo spiritum anima-
lem assumere, atque ad eas partes quæ illo aut ad sensum aliquem, aut motum arbitrium in-
digent, deriuare, est quoque fatendum. A corde enim neruos (ut Aristoteli potissimum, &
alij nō paucis uisum est) nequitiam principium ducere, uel hinc liquidò colligitur, quod in cor-
poris dissectione nullus neruus ab illo pronasci uideatur. Quandoquidem nullus omnino ner-
uulus cordi committitur, præter unum impensè gracilem, ac uix tandem post multas sectiones
à me inuentum, quem sinister sexti paris neruorum cerebri neruus distribuere suo loco docebi-
tur. Quæ enim neruus ille secundum cordis latius decliuus fertur, atque sinistra pul-
monis parti, ac item cordis inuolucro ramulos prætenues offert, neruumq; recurrentem
sinistram constituit, à seneruulum deducit, qui illic cordis inuolucrum penetrat, ubi sinistra ar-
terialis uenæ sedi adnascitur. Neruulus hic arteriali uenæ adnatus, in cordis basim fertur, inibi
absumptus, ubi sinistra posteriorq; arterialis uenæ sedes consistit. Quum itaq; huiusmodi ner-
uulus

*Nerui or-
tus à cerebro.*

Nō à corde.

m A uulus

uulus perinde cordi à sexto cerebri neruorum pari exhibeatur, quemadmodum reliquis uisceribus uniuersis offerri docebimus: ac deinde quum cordis neruulus maximè gracilis sit, promptè colligitur, cor ne sinistro quidem sexti paris neruorum cerebri neruo principium dare, tantum abest, quòd cæterorum neruorum origo neruulus ille iudicari possit. Præterea fibræ quas cordis substantiæ intertextas nouimus, non magis nerui sunt, quàm aliorum organorum, puta uentriculi, intestinorum, uenarum ac arteriarum fibræ. Ad hæc, fibræ in cordis sinibus uentriculis uel conspicuæ excarnesque, quia duntaxat membranarum processus sunt, in neruorum numero etiã minimè ueniunt reponendæ. Nam fibræ in dextro cordis uentriculo se offerentes, trium membranarum processus censentur, uenæ cauæ orificio præfectorum. Fibræ autem in sinistro cordis uentriculo apparentes, processuli sunt duarum membranarum, quas arteriæ uenalis orificium sibi peculiare uendicat. Præterea eiusmodi fibræ nō magis nerui existunt, quàm omnium generatim membranarum partes, quas quidem nerui nomine uulgi more donari nihil prohibet, si modò id ad ligamenta, tendines, membranas & neruos, de quibus iam sermonem instituiamus, deducitur. Verum quum eiusmodi cordis fibræ neuti quàm in eorum neruorum classẽ referendæ sint, qui animalem spiritum tanquam riuiuli quidam ad corporis partes perferunt, annuendum quoque est, fibrarum illarum gratia in corde neruos recognoscere haud posse, potissimum quando ab illis membranarum processibus extra cordis substantiam nihil prorsus aliò educatur. Cæterum qui ex dura crassa uel cerebri membrana neruorum originem pendere affirmarunt (in quorum choro ad extremum usque senium fuit Erasistratus) exteriorem nerui partem duntaxat conspexere à dura cerebri membrana enatam. Vniuersiusque enim nerui natura triplici constat substantia, nimirum media quadam & intimæ arborum medullæ quàm similima, quæ haud dubiè à cerebro initium ducit, constipatæ & coagulatae indurataeque cerebri substantiæ omnino respondens. exterioribus duabus, una eademque intimæ substantiæ propinquiori, quàm à tenui membrana cerebri altera, quàm à dura oriri compertum habemus. Dura enim crassa uel cerebri membrana operiendi potissimum occasione facta censetur: mollis autem, ut eodem etiã fungeretur munere, sed magis tamen ut omnia quæ cerebro continentur uascula & receptacula, arterias scilicet & uenas tuto colligaret. Quemadmodum itaque cerebrum his induitur, sic quoque processus à cerebro propagati (ipsi nimirum nerui) illis integuntur, atque ita per corporis partes prorepunt. Adeo sanè uel nemo suis oculis fidem non derogans, inficiari possit, neruorum principium à cerebro pendere: ac proinde etiã uix ambigere licet, num neruis à cerebro, an uerò à corde animalis spiritus, quem partibus deducunt, infuset. Quandoquidem nonnulli (ut inter cæteros Chrysippus) etiã si cerebrum neruorum darent esse principium, non tamen id neruis sensus motusque arbitrij principium statuebant. Quos profecto uia sectio plus satis redarguit, in qua omnia à corde ad cerebrum pertinentia colliduntur, aut laqueis interceptiuntur, aut etiã præsecantur. Hæc nanque si debite administraretur, uti in publicis sectionibus non semel à me tentatum est, edocebit sanè quantum cordis munere, hoc est uitali spiritu, cerebrum indigeat: non minus scilicet quàm cor illum quem inspiramus aërem, & iecoris sanguinem ad sua officia exigit. Deinde ea sectio ostendit cor neruis nō magis animale spiritum porrigere, quàm uitalem spiritum cordi à iecore deduci cognoscimus. Verum quia huiusmodi disceptatio ad cordis cerebrique historiam potius quàm ad neruorum naturam spectat, hac modò postposita, neruorum propriè dictorum differentias aggrediemur. Quemadmodum igitur cerebri & ex ipso pronascentis medullæ dorsalis substantia, omni ex parte non eandem seruat duritiem, neque formam: ita quoque nerui ab his originem sumentes, inuicem substantia non correspondent, sed duritiæ ac mollitiæ plurimum uariant. Atque id accidit aut occasione substantiæ sui, à quo nerui prodeunt, principij. Huius enim gratia uisforij nerui, perinde ac linguæ insigniter molles censentur: qui autem à dorsali medulla, ubi hæc in sacro ossẽ consistit, originem sortiuntur, durissimi sunt. Deinde aut propter longiorem uel succinctiorem progressum, nerui aut molliores aut duriores comperiuntur, uisus nanque, gustus, & auditus nerui molles sunt, quòd breuissimo prorepant intervallo. Gratia itineris uerò, uia quæ anfractuosa occasione tertij neruorum cerebri paris ramus uitis, aut cucurbitæ capreoli instar inuolutus durior euadit. Præterea nerui per durum aut molle, aut siccum corpus transitus, eius uel corporis contactus, illum molliorem uel duriorẽ efficit. Visforius etenim neruus breuissimo ductu per foramen in ossẽ caelatum fertur, quemadmodum & præcipua quoque tertij neruorum cerebri paris portio, quæ idcirco ex ossium contactu minimũ induratur. At quinti neruorum paris surculus, qui cæcum illud tortuosum quæ foramen perreptat, & unus tertij paris neruorum cerebri ramulus ab ocu-

Neruos non
dura cerebri
membrana ori-
ri.
Quibus parti-
bus neruus
constet.

Tenuis neruus
si uisus, crassa
u. p. constituitur.

Neruorum
differentia, à
mollitiæ & du-
ritiæ, quarum
gratia multæ
oriuntur ner-
uorum differen-
tiæ.

87 fi. lib. 6
sub K, K,
M. 9 fig.
G, G sub B,
F.

h 1 fig. lib. 7
A, A, B, B.
2 fi. H, H.

i 17 fi. cap.
14 lib. 7
A.

k 2 fig. lib. 7
E, E, 3 fi. O,
O.

Illis simul
omnia pul-
chre ostendit
ult. fig. 3
lib. in collo.

m i, 2 fi. ca.
2 G.

n caridẽm
fi. M.

o 1 fi. ca. 18
ab F ad G.

p 1, 2 fi. ca.
2 G, M, d.

q 2 fig. cap.
2 R.

r 1, 3 fi. cap.
12. lib. 1. E.

s 1, 2 fi. cap.
2 M.

t 1, 2 fi. cap.
2 C.

u 2 fi. ca. 12
lib. 1. b.

x 2 fig. cap.
2 O.

eiuf. fig. v
T. pronu-
m.

2. fi. cap. 2.
2. den ab
M. Y.
2. fi. cap. 2.
2. den a.

Specie
nam 2. fi.
cap. 11.
14. 15. fi. li.
5. Y. T.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

2. fi. cap.

ab oculorum sede ad genas, ac⁷ alius item ad humilium labrum procidentes, quia longo itinere peros incedunt, ossis contactus beneficio magis quam ipsorum principia indurefcunt. Pari quoque causa ob itineris longitudinem, & durarum membranarum contactum, omnes prope modum nervi musculis exporrecti duriores fieri conspiciuntur, quam ubi primum à principio prodeunt. Cuiusmodi omnia mirabili industria à rerum Opifice sunt excogitata. Sensus namque organum nervo indiget molli: nervo quidem, quia sensus est instrumentum, quodque ad suum munus obeundum multo animali spiritu indigeat: molli autem, quoniam affici & disponi quodammodo oporteat, & pati aliquid ab extrinsecus occurrente sensibili. Est enim ad patiendum quidem aptius molle, ad agendum vero & ad robur (quo nervus in longo ductu indiget) durum. Propterea igitur sensus organa mollibus, ceteræ partes quas moveri necessum est durioribus nervis donantur. Vnde etiam sensus instrumenta, quæ motu aguntur arbitratario, ut oculus & lingua, duplex nervorum genus sibi uendicant, unum quidem sensui, alterum vero motui præfectum. Merito itaque nervorum ex cerebro & dorsali medulla processus, non eandem exortus sedem nascuntur, neque idem ductus meatusque mollibus ac duris nervis exculpuntur. Illi enim ex mollibus & anterioribus cerebri basis sedibus, hi vero ex posterioribus ipsarum dorsali medulla principium ducunt. Rursus illi quidem recti, hi autem tortuose longoque itinere prorepunt. Cæterum Naturæ triplex fuit in nervosi generis distributione scopus. Primus gratia sensus in sensorij organis: Secundus occasione motus ad partes, quas moveri operæ precium fuit: Tertius autem in cæteris partibus uniuersis ad tristantium dignotionem, nisi forte cuiuspiam magis usus sit, & tertium hunc scopum, quia ad sensum pertinet, eundem cum primo constituere. Sensus igitur nomine, oculis, linguæ, auribus maximi offeruntur nervi, uti etiam⁸ internæ extrinsecæque manus sedi, & elatiori officio uentriculi, quæ uelut propria præcipuaque tactus, sicut oculi uisus, & lingua gustus, organa non ineptè censerentur. Per manus enim magis exacta, quam per aliam partem, quamuis plures sentiant, est tactus ipsius dignotio. In ore autem uentriculi sensus est penuriæ eorum quibus animal nutriendum est, quem famem nuncupamus. In omnibus enim ijs tanquam sensus instrumentis, maximi inferuntur nervi. Motus vero causa nervi ad musculos arbitrarj motus instrumenta dispensantur. Qui propterea quod corporis partibus, mouendis extructi sunt, grandes nervos admittunt, aut saltem circumtenso habent. At quoniam ex necessitate tactus sensus omni adest nervo, propter hoc musculos & sensus organa uirtus amplior, quam egebant ad tactilium dignotionem, subsecuta est. Reliquis autem partibus tactus sensu tantum indigentibus ex proportionem nervi offeruntur. Visceribus enim, ut⁹ pulmonis, iecori, lieni, quia in alto latitant, graciles tantum nervorum surculi offeruntur. In cutem vero, quod prima extrinsecus occurrentibus, obuiam eat, complures soboles passim digeruntur. Porro nervorum originis species, non eadem undique uisitur. Aliqui enim, & præcipue molliores, continuo neque quasi in plures surculos deducto corpore exoriuntur, proceduntque, in quorum numero uisorijs nervi, & secundum quoque cerebri nervorum pars habentur. Alij tanquam plures funiculi inuicem connexi ex cerebro prodeunt, quales sunt tertij & quartj et quintj paris nervi. Alij etiam in ipso ortu surculos hos ueluti funiculos inuicem distantes, ac singulos propria tenuis membranæ portionè circumdatos habent: qui quæ caluariam egrediuntur, omnes surculi inuicem commissi unica membrana induuntur. atque id potissimum in pluribus dorsalis medullæ nervis obseruatur, ut & in sexto pari, & septimo nervorum cerebri. Vnde etiam in multorum nervorum distributionis in ramos enarratione, nihil interesse uidetur, siue prædictorum funiculorum frequentiam solui dicas, anq̃uorum nervum in ramos ad diuersas partes exporrectos discindi. At nescio qua fronte quidam Anatomicorum principes asserere ausi fuerint, ex huiusmodi surculis seu funiculis, alios quidem motui, alios autem sensui seruire: haud secus sanè, quam si quosdam nervorum surculos tactus sensu Natura destituisset. Atque huiusmodi surculorum finiumque imaginem formamue discas, si inter edendum alicuius animalis ex axilla, aut inguine dissecta caro mensæ apponatur, atque in illa nervi aliquam portiunculam uena & arteria præterunq̃ue concomitantem spectaueris. Cernes enim nervi extremum alicui chordæ crassiori respondere, quæ ex pluribus torta funiculis, transuersim obtusiori cultro diuisa sit. Cæterum à nervorum cavitatibus nullam ausim petere differentiam, quum ne uisorijs quidem nervum unquam cauum perforatumque uiderim. etiamsi nervos non minus quam uenas & arterias, uasa uocari, haud dubitem, soli que uisorijs nervi à dissectionum professoribus forati dicantur. Ab ipsa autem serie hunc in modum differentiam sumere licet, quod alij integri in aliquam partem absumantur, ut uisorijs nervi in oculos: alij in plures dirempti surculos, quosdam musculis offerunt, quosdam cu-

Cur alij rer-
ui alij molli-
res, aut durior
res reddantur

Naturæ in
nervis digerē-
dis scopus.

Differentia
ab originis
forma.

Nervum om-
nem tactus sen-
su prædictum.

Differentia à
nervorum cavi-
tate.

A serie.

ti,


ti, quosdam ossibus, quosdam sensus organo. "Vt tertium nervorum par," quod quum lin-
guæ quodammodo sit proprium, etiam musculis quibusdam ut inter cæteros^b temporali mo-
tus gratia,^a & cuti sensus nomine, ad labra nimirum, & dentibus quoque dirigitur. Alij rursus
incommixti, neque cum alijs nervis coeûtes uniti ueruntur: ut secundum cerebri par nulli
nervio commiscetur, & uerè congregitur, licet ipsi^c minor tertij paris radix in progressu atten-
datur. Alij uerò inter se commiscuntur, ut primi paris nervus dexter sinistro^d permiscetur. Alij
alijs commiscuntur, ut^e qui brachium adeunt nervi, simulatq; è uertebreis profilierunt, non se-
cus uniuntur, quàm pictores galerorum funiculos delineare solent. Verum quum hæc in priua-
tis nervorū descriptionibus abundè sim persequuturus, iam tempestiuū fuerit singulorum ner-
uorum seriem oratione complecti. ac primū paria quæ à cerebro exoriuntur, deinceps quæ dor-
salis medulla educit recensere. siquidem nullus nervus neq; à cerebro, neque à dorsali medulla
inconiugatus prodit, sed perpetuo alter ad dextram, alter ad sinistram eadem prorsus distribu-
tionis serie, situm obtinet.

*Nervos con-
iugatos ena-
scit*

m. 2 fig. ca.
2. M.
n. c. u. f. fi. X.
o. c. u. f. fi. R.
p. 4. m. u. c. u.
ta. r.
q. 2. fi. ca. 2.
T. V. X.
r. 1. 2. fi. ca.
2. K.
s. 1. 2. fi. ca.
2. L.
t. 1. fig. cap.
2. H.
u. V. de hoc
in 2. 3. fi. ca.
u. et ult. fi.
huius libri.

PRIOR DVARVM FIGVRA NOVE M SVB-


SEQUENTIBVS CAPITIBVS COMMVNIM, QVA TO-
tius cerebri & cerebelli à membranis ipsa involuentibus liberorum basis exprimitur, ut nervo-
rum cerebri exortus opportunè oculis subijceretur. Hic enim simul cum primis ner-
uorum exortibus tota ea dorsalis medulla pars delineata est, quæ ab
eius medullæ principio ad eam usque sedem pertinet, quæ hæc
in primam cervicis uertebream labitur, ac ubi dor-
salis medulla primum uerè
nuncupatur.



DVARVM' FIGV-

RARVM QVÆ NOVE
modò subsequentibus Capitis
communes censentur, altera, quæ
dextrum latus proponit integri ce-
rebric ac cerebelli, et dicta in prio-
ri figura dorsalis medullæ partis,
dura interim tenuiq; hæc omnia
inuestitibus membranis, nusquam
apparentibus. Ad hæc præsens fi-
gura nudam septem cerebri ner-
uorum partiū seriem in dextro tan-
tum latere commonstrat, quan-
quam & ubi necessum fuit, neruo-
rum quorundam seriem etiam in si-
nistro latere hic delineauerimus.
Figure huius proportio in ea de-
picta est magnitudine, in qua cor-
pus circumscriberes, cuius uesica
in infima præsentis figure sede
consisteret, & cuius thorax &
abdomen ex anteriori parte con-
spicerentur, facies uerò uersus si-
nistrum humerum conuersa pror-
sus ex dextro latere spe-
ctaretur.

CHARA.



CHARACTERVM DVARVM NOVM SVB

SEQUENTIBVS CAPITIBVS COMMVNIVM FIGV

rarum Index.

CHARACTERES hoc Indice exprimendi, partim utrisque figuris communes sunt, partim uerò nunc huic, nunc illi peculiare. quemadmodum his notis 1, 2, quas characteribus subiiciemus, significabitur.

- A, A*_{1,2} Cerebrum notatur. *B, B*_{1,2} Cerebellum.
- C*_{1,2} Processus ac ueluti substantiæ cerebri tubera, quæ mamillares processus uulgo nuncupantur. Ego in altero tantum latere prioris figuræ characterem adhibui, quod parem utriusque lateris rationem esse nemo ambigat.
- D*₁ Dorsalis medullæ principium ex cerebri pendens basi.
- E*_{1,2} Dorsalis medullæ pars iam caluariæ amplitudinem egressura, & in utrisque figuris inibi ab truncata, ubi hæc elatissimam subit uertebam.
- F*_{1,2} Olfactus organo subseruientes processus neruis similes, at caluariæ amplitudinem qua cerebrum continetur, notatu digna portione non egredientes.
- G*_{1,2} Visorij nerui, seu primum cerebri neruorum par. Cæterum in prima figura sinistri nerui principium *G* insignitur, in altera autem dextri nerui in oculorum sede ductus.
- H*₁ Visoriorum neruorum coitus.
- I*_{1,2} Oculi tunica, in quam uisorius neruus expanditur & degenerat.
- K*_{1,2} Secundum neruorum cerebri par.
- L*_{1,2} Tertij neruorum paris minor & gracilior duriorq; radix.
- M*_{1,2} Tertij paris maior crassiorue radix.
- N*₂ Minoris radices propago ad superiorem maxillam procidens.
- P*₂ Propago minoris tertij paris radices in narium degenerans tunicam, quæ humiliori *P* priuatim indicatur.
- Q*₂ Minoris radices propago in temporalem musculum digesta.
- R*₂ Maioris tertij paris radices ramus capreoli uitis instar conuolutus, qui in temporalem inseritur musculum, ac duos à quinto neruorum pari *a* signando, ramos *b* & *c* notandos admittens, in masseterem seu mansorium musculum, & buccarum musculos, & cæterum quoque diffunditur.
- S*₂ Maioris tertij paris radices ramus superiorum molarium dentium gingiuis, ipsiq; adeo dentibus soboles seriatim distribuens.
- T*₂ Maioris radices tertij paris propago in maxillæ inferioris os prorepens.
- V*₂ Propaginis *T* insignitæ ramus inferiori labro multiplici sobole oblatus.
- X, X*₂ Surculi *a* propagine *T* notata ordinatim in dentium inferiorum radices diffusi.
- Y, Y*₂ Maxima maioris tertij paris radices portio in tunicam linguæ soluta.
- Z*_{1,2} Quartum neruorum cerebri par. Verum humilius *Z* in secunda figura palati tunicæ exprimit.
- a*_{1,2} Quintum neruorum par auditui dicatum. *Φ* autem in utraque figura priuatim huius paris portionem indicat, in concauitatem temporis ossis delatam.
- b*_{1,2} Ramulus quinti paris ex ipsius anteriori parte enatus.
- c*_{1,2} Quinti paris ramulus per cæcum repens foramen, ac tandem, ut & ramulus *b* insignitus, cum tertij paris propagine capreoli modo intorta, ac cum ramo *R* in secunda figura notato, coiens.
- d*_{1,2} Neruus non procul à quinti paris principio enatus, qui ab alijs Anatomes professoribus præteritus, in musculos maxillam inferiorem mouentes exporrigitur.
- e*_{1,2} Sextum neruorum cerebri par, cuius utrorumque neruorum series in secunda figura indicatur. est autem sinister neruus, qui umbrosus sub quinto pari quodammodo ducitur. Dexter autem magis candicat, & ipsi aliquot subsequentes characteres priuatim (quum utriusque lateris nerui eadem sit ratio) adhibitos cernis.
- f*₂ Sexti paris ramus musculos posteriorem ceruicis sedem occupantes accedens.
- g*₂ Sexti paris ramuli in quosdam laryngis musculos hic in descensu transierim propagati.
- h*₂ Sexti paris ramus costarum dextri lateris radicibus exporrectus.
- i, i*₂ Portiuncule intercostalium neruorum, sexti paris ramum hæc descendente adaugentes.

k, k 2 Rami

- h. k. 2 Rami neruorum sexti paris in musculorum de prompti capita, quæ a superiori pectoris ossis se-
de, & clauiculis principium ducentia sursum feruntur.
- l. 2 Dextri nerui sexti paris ramuli, recurrentem dextri lateris neruum efficientes.
- m. 2 Dexter neruus recurrens, seu reuersiuus.
- n. 2 Soboles dextri recurrentis nerui, laryngis dispensatæ musculis.
- o. 2 Sinistri sexti paris nerui soboles, recurrentem sinistri lateris neruum constituentes.
- p. 2 Sinister neruus recurrens, qui perinde ac dexter, uocis neruus uulgò nuncupatur.
- q. 2 Sexti paris ramuli in pulmonum tunicam excurrentes.
- r. 2 Ramuli sexti paris, membraneo cordis inuolucro impliciti. Ab illis uerò sinistri nerui surcu-
lis, qui ijs quos r. indicauimus correspondent, cordis neruulus principium ducit.
- f. 2 Sexti paris neruorum portio, quæ stomacho committitur, & series quoque qua uterque neruus
bipartitò scinditur. ac dexter sinistram superioris uentriculi oris sedem adit, sinister uerò eius
orificij dextræ parti implicatur.
- t. 2 Series sexti paris neruorum, in superius uentriculi orificium & proximas uentriculi sedes
disseminata.
- u. 2 Ramus sexti paris neruorū dextram orificij uentriculi sedem adeuntium: qui secundum elatio-
rem uentriculi regionē ductus, tandem in iecoris cauum absimitur, ubi x. ascriptum cōspicies.
- y. 2 Prima propago rami neruorum sexti paris, qui dextri lateris costarū radicibus exporrigitur.
- z. 2 Ramulus primæ illius propaginis y. notatæ, qui in dextram sedem inferioris omenti membra-
næ, & colon intestinum hic digeritur.
- aa. 2 Soboles primæ illius propaginis duodenum accedens intestinum, & ieiuni initium.
- β. 2 Soboles dextram fundi uentriculi sedem perreptans, ac frequentes surculos uentriculo & supe-
riori omenti membranæ dispergens. Vbi uerò * ponitur, præsentis propaginis in iecur & bilis
uesiculam series in conspectum uenit.
- γ. 2 Propago dextrum accedens renem.
- δ. 2 Propago in dextram mesenterij regionem, & huius sedis intestina frequenti ramulorum serie
diffusa.
- ε. 2 Neruorum series dextrum uesicæ regionem implicans.
- ζ. 2 Prima propago nerui sexti paris, sinistri lateris costarum radicibus exporrecti.
- θ. i. 2 Duæ notantur soboles propaginis ζ. insignitæ, quæ inferiori membranæ omenti, & colo intestino
quæ sub uentriculo repit, offeruntur.
- ii. 2 Series neruorum, qui lienem inferuntur.
- ι. 2 Hac cruce ramum propaginis ζ. notatæ insigniui, qui sinistram fundi uentriculi sedem perre-
ptat, uentriculo & superiori membranæ omenti surculos deriuans.
- κ. 2 Propago in sinistram mesenterij & eius sedis intestina excurrentes.
- λ. 2 Sinistram renem accedens propago.
- μ. 2 Series ramulorum sinistram uesicæ latus admodum obscure implicantium.
- ν. i. 2 Septimum cerebri neruorum par: atq; in secunda figura utriusq; lateris neruus quoq; delineatus
est, ac v. insignitus.
- ξ. 2 Septimi paris propago musculis dispensata, a stylum imitante temporum ossis processu princi-
pium ducentibus.
- ο. 2 Septimi paris cum sexto coitus.
- ω. 2 Septimi paris series, compluribus linguae ac ossis u. imaginem referentis, & laryngis musculis
inter texta.
12. 3 Numeri characteres in priori figura ad dorsalis medullæ principium conspicui, tria indicant
foramina, quorum duo lateralia i. & 3. insignita illa demū sunt, per quæ arteriarum soporalium
rami ad dextrum et sinistram cerebri accedunt uentriculos. Medium uerò foramen 2. indicatum,
illud est quo pituita ex tertio cerebri uentriculo ad peluim ducitur, quæ pituitam excipit, ac
dein instar infundibuli super glandem transmittit, quæ huic cerebri regioni subijcitur. Verū
hæc ad septimum librum imprimis spectant, ad cuius figuras ex interiori subsequenti nouem
Capitum margine remittēris: quemadmodum & sexti paris occasione, ad quinti & sexti librò
rum figuras.

QUOT NERVORVM PARIAM CERE

bro & dorsalis medullae parte adhuc in caluaria consistente, originem sumant. Cap. II.

SI quando in interiori margine scripsimus fig. cap. 2. lib. 4. duas, aut illarum alteram indicauimus, quas praesenti capiti ad primi capitis finem praepositas cernis.

Qui cerebri
sedes & par-
tes in 7 lib. di-
stinguuntur.



Qui uenericu-
li seu sinus ce-
rebr.

Vnde neruo-
rum cerebri ini-
tium.
Dorsalis ini-
tium.

Quos cerebri
neruorum par-
tia.

LIBRO septimo quum cerebri pertractabitur constructio, duplex id esse docebimus, unum anterius superiusque quod cerebrum dicitur, uniuersam propemodum implens caluariam, alterum posterius ac humilius, & cerebellum nobis appellatum, ipsoque cerebro etiam decuplo minus. Deinde anterius tota superiori ipsius sede geminum esse, dextrum uidelicet & sinistram asseremus. Inferiori autem parte, quae caluarie innititur basi, unicum indiuisumque esse, & dorsalem medullam ab hac, non autem (ut Anatomicorum praecipui scribunt) a cerebello enasci, & cerebellum potius dorsali medullae inniti & tenuis membranae, parum uero ipsius substantiae interuentu, medullae uniri, quam dorsalis principium esse ostendimus. Adhuc, addetur praeter alios quosdam cerebri sinus meatibusque, duos cerebri existere uentriculos, unum quidem dextrum, alterum uero sinistram, qui ambo in unam communem coeunt cavitatem sinumque, qui tertius in cerebro uentriculus recensetur, qui meatu quodam ad sinum inter cerebellum & dorsalem medullam ubi inuicem comitantur conspicuum, & tam cerebello quam dorsali medullae communem, pertingit. Ceterum neruae propagines ex caluaria procurrentes, aut ab ipso anterioris cerebri enascuntur basi, aut a dorsali medulla priusquam uertebrae sinus ingrediatur, non autem a cerebello. Ut uero eam dorsalis medullae partem, quae a cerebri basi sub cerebello ad foramen usque, quo est caluaria labitur, procidit, dorsalis medullae principium nuncupare liceat, mihi concessum uelim: cum quid illo intelligam principio, satis iam explicuerim, ac item in septimo libro diffusius id sim enarraturus. Per me enim licebit illi principio, seu parti cerebri, quod uis nomen indere: modo non ignores, qui illa a cerebello distinguenda ueniat. Porro nerui omnes a cerebro, illoque dorsalis medullae initio pronati, quia geniculatim in caluarie amplitudine, qua cerebrum continetur, origine ducunt, Latinis neruorum paria, seu coniugia, Graecis autem *νεύρια* nuncupantur. quae Marini, ac demum Galeni etiam suffragijs septenae enumerantur. quauis si accurate singula expendimus, plura etiam censi possint. Neque enim hic olfactus organa nerui appellantur, quod dictum nuper caluarie amplitudinem non excidant. Item par, quod nobis exaliorum Anatomicorum sententia tertium constituetur, uerius duplex quam unicum enumeraretur. Dein iuxta quinti paria radicem aliud omnibus incognitum dissectionum studiosis par enasci, diligens sectio me docuit. Verum a ueteri neruorum cerebri enumeratione haudquaquam recessurus, ordine septem paria septenis capitibus explicare contendam: prius tamen quaedam de olfactus organis subnexurus, quum non uulgares etiam dissectionis professores illis primum neruorum coniugium ascribant, illa uel ita nuncupent.

DE OLFACTVS ORGANO

nonnulla. Cap. III.




Multiplices
olfactus or-
gano senten-
tia.

MARIA profecto de odoratus organo nostrae tempestatis, medicis pariter ac philosophis est sententia, magnaque inter ipsos, ex Anatomies imperitia, dissensio oboritur. Quosdam namque reperias odoratus organum in illa cauitate constitutere, quam in frontis osse ad superciliorum regionem inter duas eius ossis squamas conspici, in primo libro recensuimus. qui si duos etiam insignes sinus, quos in ossis cuneum imitantis medio tanquam antra inter ipsius squamas subinde obseruamus, adinuenissent, ac substantiam illam quodammodo medullarem in illis cauernis repositam, summoque studio hic expendendam, obseruassent, proculdubio & inibi quoque in osse cuneum referente olfactus organum collocassent. Alij uero quosdam cerebri anfractuuum reuolutionumque apices, ac ad frontis ossis sedem uersus superciliorum medium protuberantia cerebri tubercula, olfactus organa statuunt, & tubercula illa quod promineant, carnisque quasi modo rubeant, mamillares cerebri processus uocant, utrinque unum (ui etiam est) enumerantes. Alij rursus ex aliquot Galeni locis, praecipue autem octauo de Parium usu, simpliciter anteriores cerebri uentriculos olfactus organa esse astruunt, perinde ac si anteriores uentriculi praesentis duntaxat sensus essent principia. Alij quidem duos anteriores cerebri enumerant uentriculos: uerum deinde alios duos coniungunt, quos

quos olfactus organa esse afferunt. Cæterum quàm probè hi sentiant, ex dissectione discas licebit, dextri sinistriq; cerebri uentriculorum constructionem formamue priùs inspiciens, quam meherculè multò aliam esse in septimo libro intelliges, quàm hæcenus dissectionum perititã diderunt. Quandoquidem uentriculi in posteriori sede neutiquam lati conspiciuntur, & in priora procedentes paulatim in angustum coguntur, inibiq; olfactus organa educunt. neque etiam ad olfactus organorum sedem pituitam excernunt, multoq; minus ipsa olfactus organa in stri uentriculi secundum cerebri longitudinem superius ampli existunt; anteriori sede nequaquam angustiores reddit, imò potius magis quàm in ipso medio latefcentes. In posteriori autem parte ampli quoque uisuntur: at hinc cornu modo per cerebri substantiam deorsum descendentes, atque antrorsum porrecti, tamisper angustantur, donec ad eam usque cerebri per-

Anteriori ce
rebrì uentricu
loru ductus.

Lib. 8. de V.
supra.



HUIUSMODI scilicet dextri
sinistriq; uentriculorum ductus uisuri: ac
A. B. superiorem uentriculi indicant
sedem, A. quidem anteriorem, B. uerò pos
terioriorem. C. regionem notat, quæ decli
uis antrorsum ducitur ad D, quod uentricu
li extremum terminumq; indicat. At hæc in cerebrum exprimentibus
septimi libri tabulis sunt. h. g. e. uidentiores, potissimum autem in quar
ta, C. quatuor illam seriatim subsequens. Quod uero in hac figura
uentriculi ex latere è directo conspicimus, neminem latere arbitror.

tingant sedem, quæ glandulæ pituitam ce
rebrì excipietis regioni incumbit, ac sub quã
grandiores soporalis arteriæ rami duram ce
rebrì membranam perforant, in cerebriq; ue
triculos conscendere incipiunt. Illi namq; ar
teriarum rami in hos uentriculorũ angustos
conscendunt terminos, quos modò ad cere
bri basim definire dicebam. Atq; eiusmodi
dextri & sinistri uentriculorum cerebri du

ctus uisuntur. A. sede uerò ubi uentriculorum angustos terminos definire dicebam, olfactus
organa, aut saltem cerebri processus animale spiritum præcipuo olfactus instrumento defe
rentes, ac ipsi etiam uisorij nerui etiam scuntur. Hinc enim utriusq; à cerebro alba mollisq; pro
dit substantia, quæ in progressu etiam cerebro tenuis membranæ interuentu colligatur, quo
usq; ad sinus octauu capitis ossis pertingat, qui olfactus organis priuatim parantur. Ad po
steriorem enim horum sinuum sedem albicantes cerebri processus, à cerebro abscedunt,
neque amplius tenui membranæ connati, in suum singuli porrigitur sinum: & adhuc an
trorsum magis protensi ad sinuum finem, seu anteriorem ipsorum sedem desinunt, sini
bus suffulti, ac cerebro interini proximè accumbentes. Nam etsi cerebro in sinuum regio
ne non amplius adnascantur, nihilominus ipsi perpetuò attenduntur, illiq; sunt contermi
ni. Hi processus cerebri ductu, colore, formaq; neruis correspondent. quamuis interim longè
neruis ipsis molliores sint, pauloq; (quod ad teretem spectat formam) latiores, quàm profundiores.
Verum quia hi reliquorum neruorum ritu extra caluarie, ut neque etiam extra magnam
duræ membranæ amplitudinem, non procidunt, nerui nomine eos Herophilus haud dignatus
est: ut neque etiam Marinus, neque Galenus. licet Anatomicorum nonnulli hos in neruo
rum habuerint numero, ipsos primum neruorum par recētes. Porro in horum processu
natura non negligenter considerandum est, quo nam pacto illi duræ membranæ suis sinibus
adnascantur, & quæ foramina hinc à dura membrana, & ossium sinibus quibus præsentis innitū
tur processus, ad nuper commemoratas frontis ossis & cuneiformis cavitates pertingāt. Ac de
mum expendendum quoque uenit, quod nam uerum sit olfactus organum, similitudine qua
dam sumpta ab auditus instrumento, dissectionum ac philosophiæ professoribus nimis per
functorie cognito. Verum de auditus instrumento, & olfactus quoq; & aliorum sensuum, in
septimo libro abunde pertractabimus. Modò autē sat fuisse uidetur, processus illos cerebri cō
memorasse, quos aliqui etiam mamillares et papillares nuncupasse colliguntur: qui sectionem
paulo diligentius aggressi, illa cerebri tubera mamillarum imagine prominentia, nihil ad ol
factus organi constructionem auxiliari cognouerunt. Cæterum quando huiusmodi proces
sum naturam examinabis, atque illos longè grandiores in cane item & oue quàm in homi
ne adinuenies, etiam sedulo perquirendum est, quàm anatomicè Galenus per illos cerebri pro
cessus pituitam ad nares ab ipsis anterioribus cerebri uentriculis deduci scripserit, haud ani
maduertens eos processus non perforatos esse, & ipsos uentriculos in peluim definire, quæ
cerebri pituitam excipiens, eam infundibili modo ad glandem deducit, hic in cerebri basi
repositam. quamuis de pituitæ ductibus suo dicemus loco. Nunc enim neruorum duntaxat
series opportunè pertractabitur.

Processuum
qui aut olfa
ctus organa
sunt, aut ii
præcipuè
ministrant
eas.

Lib. 8. de V.
supra.

Primi paris
ortus.



Primi paris
neruorum in-
gressus.

In oculum in-
gressus, & in
tunicam quam
reti compara-
mus dilatio.

Num uisori
sint perforati.

INIBI unde² processus albos, et neruorum modo progredientes, à cere-
bri basi initium sumere scripsimus, utrinq^b unus exoritur neruus, om-
nium corporis neruorum facile mollissimus, & circumferentia cæteris
(dummodo illi ex uarijs non permisceantur neruis) crassior. In crure nã
que, & item in brachio^c neruos quidem hoc primo pari crassiores repe-
rias, sed qui ex pluribus conflentur neruis inuicem coeuntibus. Vterq^c
primi paris neruus sub cerebri basi quã^d sinui innititur, cui glandula in-
strosor^esum, sinistro autem dextrorsum protenso. In progressu moxq^e ab ipso ortu ambo inuicẽ
coeunt, atq^e in eum permiscetur modum, ut dextrum à sinistro nulla prorsus ratione queas
discernere. ad eò sane, ut uana penitus sit quæstio, num dexter neruus in hoc congressu dextrã
obteneat sedem, an uerò sinisterorsum continuo ductu feratur. Quandoquidem ille neruo-
rum coalitus non aliud est, quàm commune corpus à quo utrique nerui dicerentur prona-
fci, modò istius corporis ex cerebri substantia origo non indagaretur, atq^e illic initia neruorum
diffusa apparerẽt. Nerui à congressu è caluaria ducendi inuicem mox dirimuntur, & per^f fo-
ramina ipsorum nomine insculpta, in oculorũ sedes extra caluarię cavitatem procidunt. Quip-
pe &^h integri in oculos absumuntur, non quidem accuratè in posterioris oculi sedis centrum
implantati, sed neruus dextrum petens oculum ad dextrum magis latus posterioris eius sedis
implantatur: qui uerò sinistro oculo proprius est, ad latus sinistrum centri posterioris sedis o-
culi ingreditur, ac (quemadmodum & dextri oculi neruus) quãdo oculum subijt, in latam de-
generat expanditur ueⁱ tunicam uitreo humori proximam, & mediam oculi sedem duntaxat
ambientem, & dilatata cerebri substantiæ admodum similem: ac proinde mollem, nihilq^e mi-
nus quàm membraneam: unde etiam Anatomicorum nonnulli hanc tunicam, quæ à retis qua-
dam imagine^{de uisibilibus} dicitur, Tunicam appellare haudquaquã dignati sunt. Quòd ue-
rò hæc tunica (aut quomodocunque ipsam appellare uisum sit) præcipuum uisus organum à
multis habeatur, in oculi constructionis enarratione persequar. In præsentia enim neruos hos
aut oculos prolixius aggredi omnino præter institutum foret. quum suffecerit dixisse, uisorios
neruos illum quem recensuimus ductum citra omnem ramorum propagationem obseruare.
hoc enim (quemadmodum & dextri nerui cum sinistro mox ab exortu coitum) peculiare ra-
rumq^e uisorijs nerui sibi uendicant. Quinetiam inter reliquos corporis neruos, hi duntaxat me-
atu qui sensu dijudicari possit, perforati dicuntur: quapropter Græcis (præcipue autem He-
rophilo & Eudemo, *πρόσι τῷ ὄφθαλμῳ*) nuncupabantur. Cæterum ego eiusmodi meatum mihi aliquã
do occurrisse neutiquam queo asserere, quantumuis etiam canum adhuc uiuentium & alio-
rum grandium animalium uisorios neruos, uel hac solùm occasione aggressus sim, et hominis
cuius caput adhuc à decollatione calebat, uixq^e quarta horæ parte quum neruos intuerer ab-
truncatum fuerat, ipsos non oscitanter spectauerim, ac calente aqua sedulò fouerim. At-
que ut eiusmodi meatus toto neruorum progressu me penitus latuit, ita sanè in mutuo ner-
uorum coitu is neutiquam se obtulit. utcunque tamen hunc inibi oportebat esse insignem,
si modò nerui ob hoc ex Galeni sententia congrederentur, quo minus simplicia nobis ge-
mina perperam uiderentur. Porro ijs qui de congressu hoc meatu que acriter citra partium
inspectionem indies altercantur, non grauabor duo quæ in congressu animaduerti, hinc adijce-
re, quòd & hinc suarum nugarum argumenta petant. Patauit itaque adolescens suspendio ne-
catus publicæ sectioni adhibitus fuit, cui ante annum dexter oculus à carnifice erutus fuerat:
deinde mulier, eodem supplicio affecta, cui dexter quoque oculus ab ineunte ætate emarcue-
rat, sinistro interim integerrimo. Mulieri dexter uisorius neruus toto progressu longè te-
nuior sinistro uisebatur, non solum in ea sede qua iam oculo inferebatur, uerùm in exortu
quoque & in dextra sede congressus neruorum. ac præterquam quòd dexter tenuis erat, du-
rior quoque & rubicundior cernebatur, uti sanè & in adolescente: sed dexter non admo-
dum neque crassitie, neque mollitiæ adhuc sinistro cedebat. His ille accessit, cuius neruos
uisorios in illo congressu inuicem non connasci, neq^e sese contingere uidimus. sed dexter non-
nihil ea sede qua caluariam egressurus fuerat, sinisterorsum reflectebatur: quasi non coalitus
occasione nerui congrederentur, uerùm ut commodè per suum foramen è caluaria proci-
derent, potissimũ quum etiam hoc ductu ingredientes in oculi posterioris sedis medium nõ infe-
rantur.

rantur. Hunc ductum sinister nervus etiam referebat, non tamen ita quin notatu digno intervallo dexter à sinistro dehisceret. Quàm sedulo autem ac sollicitè eius vii familiares interrogauerimus, num illi omnia gemina perpetuò oculis obuersarentur, neminè Naturæ operum cognitione flagrantem ambigere sat scio. at nihil aliud resciscere licuit, quàm ipsum de visu nunquam conquestum fuisse, visuq; præstanti semper ualuisse, familiaresq; de visorum duplicatione nihil unquam intellexisse. Quòd uero Cassius, et alij nonnulli, quum causam rimantur, quamobrem dextra cerebri sede uulnerata, aut alioquin læsa, corporis sinistra pars neruorum resolutione infestetur, integra parte dextra, neruos omnes in ortu decussatim ferri: seu neruos à dextra cerebri & dorsalis medulle sede pronatos, in sinistram corporis regionem distribui, & contra asserant, apud me elegantissimum, & inter somniandum ab illis problematum interrogatoribus excogitatum signum habetur. quum^h secundi paris neruorum ac deinⁱ tertij & quartij parium, dextri exortus à sinistris aliquot digitorum amplitudine inuicem distent, ut modò de alijs neruis nihil dicam: idq; pariter sileam qui visorios porcorum neruos subinde nō continuos, sed perinde ac crurū neruos, quasi è multis funiculis conflatos spectarim, ne in aliam quampiam prolixiorē dissectionem sermo defleat, præcipuè cum illis dissectionum professoribus, qui dextrum cerebrum penitus à sinistro direptum posteris tradiderunt.



PRÆ
fenti figuræ ner
uorum quos hic
describimus du
ctus exprimi
tur. ac A cere
bri portuuncu
lam indicat.

DE SECVNDO PARI NERVORVM

cerebri. Caput V.



ONIVGII² secundi exortus, nequaquam ex infima mediâq; quodam modo (quod ad latera spectat) basis cerebri sede, ut visorios pendet. Dein præsentis coniugij nerui plurimum visorios crassitie cedunt, quamuis interim duritia eos superent, usq; ab illis multum uariant. Paulò posterius enim quàm visorios, ex cerebri basis lateribus principium ducunt, quòd hæc cerebri regio nonnihil durior illa sit, à qua visorios origo sumitur. Atq; id merito accidit, siquidem secundi paris neruos musculis inferēdos, duriores ipsi visorios esse oportuit. Prorept enim neruus dexter (quòd et de sinistro, nisi peculiariter sermoni quid addatur, in neruorum serie semper subaudiendum est) sub cerebri basis latere ad³ foramen in oculorum sedis radice sibi cum alijs aliquot uasis commune. Quamprimum autem è caluariæ excidit amplitudine, in ramos dissectus septem⁴ musculis oculo proprijs ramulos offert, illorum motibus præfectus.

DE TERTIO PARI NERVORVM

cerebri. Caput VI.



TERTIVM par duplici radice utrinq; principium sumit, una quidē crassiori, cui opportunè tertij paris nomen accommodaueris, altera autem lōge tenuiori & duriori, et neq; in ipso exortu, neq; etiam in progressu, crassiori radice commissa. Huius enim initium nō modico in posteriora intervallo, ab illius exortu distat: adeò sanè, ut uerius graciliorem hanc radicem peculiare par, quàm tertij paris portionem, quis esse assereret. At quū omnes Anatomicorum proceres hanc tertio pari ascripserint, nihil sanè obstitit emanitertioris doctrinæ studio, & me etiam cum tertio pari tenuem illam posterioremq; radicē aggredi: prius tamen studiosos admonentem, in libro de Neruorum sectione (quem Galeni libri uix fragmentum censuerim) parum rectè tertium par secūdo mollius esse, tradi. Exoritur itaq; gracilior hæc tertij paris radix à latere basis cerebri, ubi dorsalis medulla ab ipsa⁵ initū du cere auspiciatur. Hinc recto tramite sub cerebri basi antrorsum progrediens, duram cerebri mēbranam perforat, & secundo neruorum pari attensa cum ipso per commune foramen in oculi sedem procidit, ilico in quatuor dissecta propagines. quarum prima sursum in adipe oculorum musculis obducto excurrens, per⁶ peculiare foramen ad frontis cutem & musculosam huius sedis substantiam digeritur, frontis cutis & palpebræ superioris motibus præfecta. Secunda propago deorsum ducta, mox in⁷ foramen sibi priuatim exculptum fertur, quousq; in anteriorem superioris maxillæ sedem prolatur, ac multiplici serie dispensetur in⁸ musculos superiores labrum et nasi alam extrorsum in suo latere mouentes, ac demum in ipsum labrum & incisiorum dentium gingiuas. Tertia propago⁹ foramine etiam priuato utens, post¹⁰ carūculam in interiori angulo oculi conspicuam, narium adit amplitudinem; inibi in narium dege

Duplex utrinque
que tertij paris
radix.

Tenuioris radicis
ortus & series.

*Crassioris ra-
dicis origo &
distributionis
series.*

nerans tunicā, & ramulum exporrigens^p tenui & membraneo musculo introrsum nasi alam contrahenti.^q Quarta propago iam dictis crassitie non inferior, per^r foramen seu scissuram potius, quæ inter primum maxillæ superioris os, & cuneum imitans in extimo latere sedis oculi conspicitur, ad internam sedem^s temporalis musculi tendit, tota in eum musculum absumenda.^t Crassior tertij paris radix à latere basis cerebri, anteriùs tamen, et penitiùs seu iuxta dextri & sinistri medium magis quàm enarrata modò radix, principiū sumens, rectā deorsum rendit,^u foramē, quod ipsi & quarto nervorum pari huic radici proximo cæatur, perlabens. Hæc statim ab egressu^v propaginem diffundit, quæ uitis, aut cucurbitæ capreoli instar inuoluitur, duriorq; paulatim efficitur, ac^w binos tandem quinti paris nervorum cerebri ramulos (quorum seriem postea recensabo) in consortium admittēs, ipsisq; unitus in temporalem musculum inseritur, ac in^x illum quoq; qui à iugali ossē enatus priuatim^y manforius nobis dicitur, ramulos porrigit, deinde et^z musculis buccas mouentibus, ipsiq; demum faciei cuti in buccis etiam furculos offert. Postquam uerò crassior tertij paris radix propaginem hanc capreoli modò intortam exprompsit, nonnihil deorsum magis descendens, furculum deriuat, qui antrosum ductus gingiuarum molarium dentium, ipsisq; adeò dentibus seriatim soboles distribuit. Dein priusquam maior hæc tertij paris radix declius ducta linguam contingat,^a ramum posteriori ex parte germinat utcunq; insignem, qui^b musculo in ore delitescenti & maxillam inferiorem attollenti insertus, inferioris maxillæ^c foramen adit, hic ubi is musculus ipsi inseritur conspicuum. Ramus ille in foramen delapsus tantisper antrosum fertur, quousque suilateris dentium inferioris maxillæ radicibus^d singulas soboles offerat, quorum beneficio dentes inter cætera hominis ossa, euidentius tristantium occursum sentire credimus. Neque uerò ramus hic uniuersus in dentes absumitur, imò non minima ipsius^e portio per^f foramen in anteriori maxillæ sede insculptum excidit, dextræ sedi inferioris labri cōplures furculos deriuās. At^g maior portio crassioris tertij paris nervorum radicis, quando linguae basi committitur, cū alterius lateris nervo linguae tunicam efformat, aptum saporibus dignoscēdis instrumentum. Deinde & exiguos quoq; furculos penitiùs in linguae substantiam dispensat. Horum enim & tunicæ linguae producendorum gratia, tertium par potissimum à rerum Opifice creatum arbitramur, atq; ut^h primum par uisus, quintum uerò auditus, sic hoc tertium gustus censetur instrumentum, gustatoriusq; nervus merito nuncupatur.

DE QVARTO PARI NERVORVM cerebri. Caput VII.



HOCⁱ par tertio pari nonnihil gracilius duriusq; est, exoritur enim à dorsalibus medullæ^j principio posterius paulò quàm tertium par, sed antrosum modicè tensum posteriori tertij paris sedi committitur, atq; unā cum illo per^k commune ipsis foramen ex capitis amplitudine, seu cerebri sede, ad palatum elabitur: quò simulatq; peruenit, in furculos quosdam partitiū, in palati^l tunicam degenerat: quæ quum linguae tunica aliquantulo sit durior, iure etiam quartum par posterius tertio pari originem ducit, ac proinde etiam palati sensu hebetiori quàm linguae^m tunica donatur.

QVINTI NERVORVM CEREBRI Pa- ris series. Caput VIII.



QVINTVMⁿ par nōnihil quarto crassius, ac ueluti pluribus enatū furculis inuicem mox ab ortu connexis principiū ducit, ex media propemodū dorsalis medullæ sede^o, eius partis quæ à medullæ exortu usq; ad eam regionē pertinet, quā hæc caluaria in uertebras labitur. Hoc quintum par uniuersum per^p foramē fertur impenle tortuosum, & priuatim ipsi incisum, quo usq; in cavitatem pertingat, auditus organo preparatam: ubi quintum par uariè discinditur, & propagines quasdam membranæ modo dilatatas huius cavitatis sedibus offert, auditus organi non infimam partem constituens. Præter has uerò propagines duos educit neruulos, qui seorsum per proprium foramen elabuntur, unus quidem per^q transuersum ducitur foramen, quod etiam admittit^r uenulam in auditus organum excurrentem. Hic neruulus non procul ab egressu tertij paris^s ramo commiscetur, instar uitis capreoli inuoluto. Alter uerò neruulus per^t foramen repit impenle arctum, & insigniter quoque tortuosum, & immisam ipsi setam aut plumbeum filum non admittens, ob idq; etiam

Anato.

Anatomicis cæcum appellatum. Nervulus iste transuersim supra¹ musculum ducitur, qui à iugali osse pronatus, inferiorē maxillā mouet: ubi uerò ad anterius usq[ue] eius musculi latus antrosum prorepit,² dicto tertij paris ramo commiscetur, in genarum cutem & musculos buccæ motuum autores digerendus. Atque illi demum duo sunt ramuli, quos tertij paris ramo capreoli ritu inflexo commisceri superius dicebam. Porro quemadmodum³ iuxta tertij paris præcipuam radicem, alia quædam radix enascitur tertio pari ascripta, simili etiam ratione iuxta quintum neruorum par interius paululum⁴ alia exoritur radix, quinti paris radici multo gracilior, sed quodammodo durior. Hæc sursum uersus priora sub cerebri basialiquandiu protensa, duram cerebri membranam perforat, ac per⁵ proprium foramen sub secundi paris foramine exculptum, è caluaria procidens in⁶ temporalem musculum, illumq[ue] digeritur quin ore delitescens, inferioris maxillæ ad superiora motus autor censetur. Hanc radicem cum sua coniuge liceret peculiaris coniugij loco censere. Quo minus tamen aliorum Anatomicorum (qui has radices prorsus ignorarunt) numerum perturbem, hos neruulos quinto pari ascribam, ad eum uidelicet modum, quo minorem tenuioremq[ue] tertij paris radicem tertio pari superius adnumeratam reliqui. In temporalem itaque musculum⁷ quinque neruorum pertinent propagines, prima quidem à graciliori tertij paris radice, secunda à maiori radice, tertia autem & quarta à quinti paris primario educitur neruo. quinta autem is demum neruus est, quem iam quinto pari connumerabam. Neque sanè frustra, atque ut fors fert, tot neruorum soboles temporali musculo Natura exporrexerit. Sciebat enim hunc musculum pro sua mole omnium corporis musculorum ualidissimam functionem obicurum. Item quum haud ignoraret, quam molles illi essent nerui quos à cerebro eduxit, summa mehercule prouidentia illos rarum licuit ex ossium contactu, itinerisq[ue] longitudine uoluit indurescere. Nulli enim non obuium est, quàm callidè furculum instar capreoli inuolutum duriores effecit. quòd is solus ossi minimo spacio contiguus sit: alios autem non inuoluit, quòd longo intervallo ossibus attendantur, ipsorumq[ue] nonnulli per tortuosos & inuolutos ossium meatus etiā porrigantur;

Nervus iuxta quinti paris radicem primarium ducit.

Quot neruorum propagines temporali musculo offerantur.

DE SEXTO PARI NERVORVM CEREBRI.

Caput IX.



ELIQUORVM parium, quæ in caluariæ amplitudine principium ducunt, nullum æquè sparsam ramorum edit sobolem, neque in tam multas easdemq[ue] uarias inseritur partes, atque⁸ sextum cerebri neruorum coniugium, quod paulò inferius quinto pariali quodam distinctis ac à seinuitè direptis furculis initium sumit, qui mutuo mox ab initio commissi, unum efformant neruum, qui per⁹ foramen caluariam egreditur, quod arteriæ soporalis¹⁰ minorem ramum, & grandiore internæ iugularis uenæ ramum, simul admittit. Neruus hic non procul ab egressu in musculos posteriorem cerebri uicis sedem occupantes¹¹ ramum diffundit, numerosa utcunq[ue] serie in soboles digestum: quarum præcipuæ¹² musculo exporriguntur, scapulam mouentium secundo. Ipse autem sexti paris truncus, soporalis arteriæ ac¹³ septimo pari coheret, & simul cum ipsis membranæ interuentu connexus, ad laryngis usque latera protenditur, inibi portionem à septimo pari¹⁴ assumens, illaq[ue] se augens. Deinde sextum par quum hanc assciuit portionem, laryngis musculis¹⁵ ramulos transuersim exhibet. Sunt autem illi musculi¹⁶ duo scutum imitanti laryngis cartilagini duntaxat proprii, qui ex stomacho gulæ uè posteriori sede pronati, eius cartilaginis lateribus inferuntur. deinde¹⁷ duo tertiæ cartilaginis basim occupantes, &¹⁸ duo ex illis qui primam cartilaginem secundæ committunt. Hinc uerò sextum par soporali arteria & interna iugulari¹⁹ cõcomitatum, ad thoracis usque elatiorem descendit sedem, ac mox²⁰ in signem utcunq[ue] propaginem ad primæ thoracis uertebrae latus, seu potius ad anteriorem primæ thoracis costæ radicis sedē deriuat, quæ sub membrana costas succingente, secundum costarum radices prorepens, à²¹ neruis in costarum interualla à dorsali medulla exporrectis, furculos quosdam assumit. Quum uerò hæc propago eiusmodi adaucta furculis, septum transuersum prætergressa²² est, in cibi potusq[ue] organa, uti postea dicemus, dispensatur. Præter hanc propaginem sexti paris neruus iuxta superiorem thoracis sedem²³ ramulos²⁴ musculo offert, à pectoris osse & clauicula ad mamillarem capitis processum deducto, & capitis motibus subseruiens. Deinde &²⁵ musculo qui os²⁶ referens hinc à pectore accedit. Præterea &²⁷ illi qui hinc ad infimam primæ cartilaginis laryngis sedem perfertur. Huiusmodi sanè utrorumq[ue] sexti paris neruorum priusquam thoracis cavitatem subeant, series uisitur, quæ autem adhuc enarranda superest, mox atq[ue] hinc figuram contextui interiecerò, describetur.

QVAMVIS nuda septem nervorum cerebri parii delineatio ad finem primi Capitis posita, omnem sexti parii seriem ostendat, atque ita pariter nervos recurrentes (qui Græcis ἐκασθενεῖς uocantur) exprimit, non abs re me factum arbitror, si peculiarem eorum tabulam una cum arteriæ magnæ & asperæ partibus, quâ tum scilicet ad ipsorum seriei attinet ostensionem, hic contextui Capitis interijciam, quum horum nervorum adeo frequens medicis sit mentio, & inuitus pariter eo summum Naturæ miraculum nulli non sit longè iucundissimus.

A Arteriæ magnæ ex sinistro cordis uentriculo exortus, ubi hæc duas coronales arterias promit.

B Arteriæ magnæ truncus deorsum ad spinam reflexus.

C *Arteriæ magnæ ramus obliquè sursum ad primam sinistri la-
teris costam tendens, ac in sinistram postea manum excurrens.*

D Arteriæ magnæ portio iugulum petens.

E Arteria transversa in dextram manum procedens. Quas
uero hæc & illa quam D insigniuimus soboles diffundant, ex
nuda arteriæ magnæ figura, decimo Capiti tertij libri subiun
cta, petas licebit.

F, F Soporalis dextri lateris arteria.

G₂G Sinistra soporalis arteria. H Asperæ arteriæ caudex.

I₃K Duo asperæ arteriæ trunci, in quos hæc primum ad pulmo-
nes finditur.

L Larynx, cuius musculorum, ut & linguae & ossis *v* referentis figuras, ex tabulis secundi libri dudum didicisti.

M Glandula laryngis radici utrinq; ad latus connata.

N Dexter sexti nervorum cerebri paris caudex.


○ *Sinister sexti paris caudex.*

P Dextri nerui ramuli ad arteriam quæ dextræ exporrigitur axilla, reuoluti, & in unum coëun-
tes neruum, qui interdum unico constat ramulo.

Q, Q *Dexter nervus recurrens.*

R Sinistri sexti paris caudicis surculi, qui ad arteriæ magnæ truncum uersus spinam detortum reflectuntur.

S, S Sinister nervus recurrens, qui etiam nonnunquam unico incipit furculo. Reliquæ sexti paris nervorum propagines in nuda cerebri nervorum tabula spectandæ sunt.



Dexter ne
mus recurrēs.

Quum itaq; dexter sexti paris nervus thoracis cavitatem ingressus est, atq; inter arterias & uenas in iugulo repit, ab interiori ipsius latere^a modo tres,^b modo duos inuicem mox succedentes diffundit ramulos^c reuersuū dextri lateris nervum cōstituentes. Ramuli enim isti ad^d arteriam quæ in dextrā alam exporrigitur, ueluti ad trochleā rotulam reuoluit, simul cōiunt, nervumq; unum efformant, ad dextrum asperæ arteriæ latus sursum excurrentem. Quum primum enim ex illis ramulis (quorum loco interdum simplex uisitur) unus cōstatuatur nervus, qui dextrum asperæ arteriæ latus petit, & membranæ interuentu ipsi adnexus ad dextrum ulque laryngis latus properat^e glandulæ in cumbens, quæ alijs glandulis neque colore, neque substantia respondens laryngis radici hinc in dextro latere (ubi in sinistro altera) adnascitur. Illico autem atque nervus laryngem contingit, in plures paritur soboles, in sui lateris musculos digerendas. Qui uerò illi sint, posteaquam sinistram recurrentem nervum sermone ad sinistram laryngis latus deduxero, subiungam. Sinister itaque sexti paris nervus iam in thoracis cavitatem ingressus,^f arteriæ in sinistram manum propagatæ ramulos, qui sursum reflectentur, exporrigere nequit, quòd ea obliquè sursum, non autem dextræ arteriæ modo, transuersem, in alam contendat. Haudquaquam enim æquè ruit ad obliquum atq; transuersum, chordæ aliquis reflexus perficitur, imò hæc si ad obliquum baculum reuoluitur, sensim sursum conscendit,

Sinister re-
CUTPENS

a P. et 2 fig.
gu. l.
b 6 fig. lib.
6 b.
c Q₂ Q₃
fig. m.
d E. fi. cap.
12 lib. 3 Y
e M.
f C. fi. ca. u.
lib. 3 D.

dit, eandem reflexus sedem nunquam seruans: ac proinde sinister neruus tantisper uersus cor
dis basim descendit, quousque extra cordis inuolucrum arteriæ magnæ contingat⁸ truncum,
qui deorsum ad spinam explicatur. Atque hic mox⁹ tres, aut etiam¹⁰ pauciores à neruo educun
tur furculi, qui ad arteriæ truncum, quâ is ad spinam deflectitur reuoluti, inuicem ununtur,
sinistramq¹¹ recurrentem neruium constituunt. qui sursum properans, membranæ beneficio
asperæ arteriæ sinistro lateri attenditur: ac cùm primùm laryngem contingit, non minus
quàm dexter neruus in ramos deriuatur, qui omnes in sui lateris musculos deorsum capitâ
habentes cessant. Sunt autem hi, si utriusque lateris musculos iunxeris, quatuor, secundæ
cartilagini tertiam necentes, quorum beneficio tertia cartilago retrorsum atque in latera du
citur, & laryngis¹² lingula adaperitur. Præterea¹³ duo tertiam cartilaginem primæ iungentes,
qui laryngis rimulam, seu lingulam claudunt, ac soli propemodum tunc expirationi obstant,
quum egerentes uis spiritum retinemus, ac interim quantum possumus, cæteris musculis expi
rationem molimur. His præter alios nonnullos accedunt linguæ¹⁴ musculi, ab ossis¹⁵ v referen
tis medio ut linguam moueant pronati. Quum enim præsentis musculi inferiûs sua sortiunt
tur capita, atq¹⁶ deorsum necessariò mouendû corpus attracturi erât, necessum quoq¹⁷ esse credi
mus, ut animalis spiritus ab inferioribus partibus sursum quodâmodo ipsis duceretur. Quod
quanta industria immensus corporis nostri Opifex in horum neruorû conuolutione molitus
fuerit, & si ex ipsa dissectione, & succinctâ hac neruorum distributionis narratione, & illa quâ
antea exhibuimus tabula dignoscere possis: nihilo minus Galenum, qui hos neruorum in se
xus omnium primùm ab ipso inuentos meritò gloriatur, adeundum horror. Qui in septimo
de Partium usu, ueros Deo celebrat hymnos, magisq¹⁸ attentam requirit mentem, quàm si
Eleusinia & Samothracia, uel aliam quancûq¹⁹ cele
brationē diuinâ, æquis auribus astans, intentusq²⁰
ijs quæ sunt dicuntur quæ à sacerdotibus, audias.
Iure enim Galenus sibi persuadet, celebrationē inibi
traditam his nulla parte inferiorem esse, neque
minus ostendere incredibilem sapientiam & proui
dentiam uirtutemque omnium conditoris Dei.

Porro sexti paris nerui postquam reuersiuos ex
promplere, ac iam cordis basim spectant, ramulos
notatu dignæ crassitudinis²¹ in pulmoni tunicam
& membraneum cordis inuolucrum dispergunt.
Item à ramulis sinistram cordis inuolucrum im
plicantibus, atque à sinistro sexti paris neruo de
promptis, furculus quidam cordis inuolucrum
inibi permeat, ubi id sinistro lateri²² arterialis uenæ
unitur. Atque hic furculus oppidò quàm tenuis,
& non nisi accuratissimè sectionem administrantibus obuius, ipsi arteriali uenæ adnascitur,
et ad sinistrum ipsius latus uersus posteriora tamen magis exporrectus, in cordis basim fertur,
inibi mox in soboles capillorum modo gracillimas consumptus, ac cordis basim superficiem uix
proprius. Qua autem ratione illum nimis quàm tenuem neruulum adinuenias, ad sexti libri
calcem sedulò exequar, ibidem cordis ipsiq²³ subministrantium organorum sectionem pertra
ctaturus. Cæterum quod ex neruis sexti paris²⁴ reliquum est, deorsum ad stomachum defer
tur: ac dexter quidem dextro ipsius attenditur lateri, sinister autem sinistro. Mox uerò atque
hinerui stomacho membranæ interuentu laxè adnectuntur, singuli in binos partiuntur ra
mos, adeò oblique secundum stomachum conuolutos, ut dextri nerui rami sinistram ipsius se
dem in progressu obtineant, sinistri autem rami dextram sedem amplexentur. Atque ita qua
tuor præsentis rami septum transuersum unâ cum²⁵ stomacho permeant, nullos prorsus in
transgressu septo furculos offerentes. Verùm sparsa admodum serie superius uentriculi os
ambiunt, contextuntq²⁶ ramos in priora & posteriora corporis uentriculi spargentes. Ab ijs
ramis qui dextrum huius orificij latus implicant, propago utcumque insignis depromi
tur, quæ per uentriculi superiora secundum ipsius latitudinem inferius uentriculi orificium ac
cedit, in progressu anteriori posterioriq²⁷ uentriculi sedibus soboles quasdam diffundens.
Quum uerò illa propago inferius orificium superauit, uenæ portæ instrata in iccoris cauum
properat, ibidem in iccoris membranâ tunicam²⁸ ueabsolumenda. Dextri nerui sexti paris
ramus, quem ante recurrentium neruorum principia costarum radicibus sub tunica costas
succingente exporrigi, aliorumq²⁹ neruorum per costarum interualla excurrentium³⁰ cōgressu

in 4 augeri



QVONIAM
Galenus in horum neruo
rum descriptione, quemad
modum Cy nonnunquam a
libi, mentionem facit instru
menti glossticomi, nos lecto
ri non incommodaturos du
ximus, si hunc character
rem E, in quo id instru
mentū obiter exprimitur,
hic interijceremus: una cū
E, quo instrumentum deli
neatur brachij, sed potissi
mum femoris luxationibus
resistendis idoneum. Li
cet hæc alio libro æ argu
mento tractanda pu
teamus.

Reuersiui
nerui cur su
di.

Reliqua sex
ti paris in tho
racis amplexu
dine series.

Sexti paris
series in nutri
tionis organa.

augeri docuimus, simulatq; septum tranſuerſum unā cum grādi arteria prætergreſſus eſt, propagines diffundere incipit, ac primam quidem inferiori membranæ omenti offert tranſuerſim iecoris cauum adeuntem. Propago hæc in ipſo ductu inferiori membranæ omenti ramum exhibet, qui deorſum tenſus, atque in furculos diſſectus, tum ipſi membranæ omenti in dextra parte implicatur, tum etiam colo in teſtino, ubi id huic membranæ tanquam ad meſenterium committitur. Deinde alius ramus ab illa propagine duodeno in teſtino, & ieiuni initio deducitur adeo gracilis, ut interdum conſpici nequeat. Poſt hunc longē craſſior ſuperiori membranæ omenti depromitur, qui dextram ſedem fundi uentriculi perreptans, multas ſoboles uentriculo & ipſi omento communicat. Quod autem primæ illius propaginis adhuc ſuperereſt, iecoris cauo & bilis ueſiculæ furculos præbet. Secundam uerò propaginem ſexti paris ramus dextrilateris coſtarum radicibus attenſus, in dextrum renem & pinguem membranam ipſi obductam digerit. Tertiā porro dictis iam grandiorē diffundit ad dextram meſenterij ſedem, & in in teſtina meſenterio hic connata ſpargendam. Quod autem eius rami reliquum eſt, ſubinde in ueſicam, & mulieribus in uteri fundum dextra ex parte ceſſat. Veſica enim & uterus quoque ſuos neruos à dorſali medulla in ſacro offe deducta mutantur. Ad eundem ferè modum ſiniſtri ſexti paris nerui ramus coſtarum exporrecus radicibus digeritur. Propaginem enim inferiori membranæ omenti largitur tranſuerſim in lienis cauum porrectā, quæ in progreſſu anteaquam lienem contingit, duos diffundit furculos in humiliorē omenti membranā, & eolum in teſtino quā uentriculo hic adtenetur, diſperſos. Deinde aliam ſobolem emittit illis furculis craſſiorē, quæ ſiniſtram fundi uentriculi ſedem perreptans, uentriculo ipſi ſuperiori membranæ omenti (qua etiam ſoboles ipſa ſuſſulciunt) per multa germina deriuat. Mox quoque a propaginibus lienis cauo ſe inferentibus, exiles ramuli ſiniſtrum uentriculi latus accedunt, illis concommitati uenis ac arterijs, quas à lienem petentibus uas huc reſecti, antea diximus. Secundam propaginem ramus ille ſiniſtris exporrecus coſtis, meſenterio & ſui lateris in teſtino offert, & poſt hanc tertiam ſiniſtro reni exhibet, ac demum ipſius reliquo ſiniſtram ueſicæ ac fundi uteri ſedem interdum amplectitur. A propaginibus in meſenterium ſparſis, interdum cum ſeminalibus uenis & arterijs furculos ad teſtes uſq; deductos animaduerti, atq; hæc ſexti paris neruorum cerebri eſt ſeries.

DE SEPTIMO PARI NERVORVM cerebri. Caput X.



NERVORVM cerebri³ ſeptimum ac ultimum par, uti cæteris paribus durius eſt, ſic quoque ex duriori enaſcitur principio. incipit enim aliquot inuicem diſtantibus furculis, à dorſali medulla, ubi modò caluariam eſt egreſſura. Hinc in anteriora modicè tenſum, & ipſius furculis in unum coeuntibus, per foramen procidit, ſibi priuatim exculptum. Simulatque uerò ſeptimum id par caluariam ſuperauit, ſexto cohaeret pari, & propagines aliquot diſpenſat¹ muſculis qui à proceſſibus ſtylum imitantibus principium ducunt. ex quorum numero eſt alter tertij paris muſculorum oſſis uerferenti peculiarium, iſq; qui inferiorem maxillam deorſum trahit, & alius linguæ proprius. Septimum par hinc ad linguæ uſque radicem deſcendens, in plures diducitur ſoboles, quæ in linguæ muſculos, & oſſis uerferentis, & in omnes laryngis muſculos ſuperiùs non connumeratos implicantur, eorumque muſculorum motibus præſunt. Verùm præter illas ſoboles, ſeptimum par non minimam ipſius portionem ſexto pari neruorum cerebri ad linguæ radicem inibi offert, ſextum par illa portione adaugens.

PRIMA

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER IIII.
PRIMA TRIVM FIGVRARVM QVÆ
SVB SEQVENTIBVS CAPITIBVS
communes habentur.

331

P R A E S E N S figura duabus modò consequenti-
bus tabulis, quæ nervorum à dorsali medulla prodeuntium nu-
dam seriem ostendunt, potissimum subseruit. Hac namque so-
la dorsalis medulla, quam uulgo nucham dicimus, ab ea sede
quæ est cerebri basi principium sumit, ad extremum ipsius us-
que finem, ex humiliori sacri ossis sede procidentem deli-
neatur.

A Dorsalis medullæ initium est cerebri basi pronatum.

B Hac sede dorsalis medulla non amplius simplex deorsum du-
citur, uerùm imaginem refert multorum funiculorum, qui si-
mul commissi recta tenduntur.

3, 4, 5, 6, 7 His characteribus nervorum radices notantur, à dor-
sali medulla priusquam è caluatia labatur prodeuntium. Sunt
autem radices hæ eorum cerebri parium, quæ singulis chara-
cteribus indicantur.

D, 7 A B ad D in sinistro latere, & ad 7 in dextro latere dor-
sali medullæ pars cervicis uertebri contenta, et septem quo-
que eius partis parium radices insigniuntur.

E, 19 A D ad E in sinistro latere, & à 7 ad 19 in dextro, dor-
sali medullæ pars ostenditur, thoracis uertebri complexa.
Deinde eius quoque partis duodecim parium radices indi-
cantur.

F, 14 Ab E ad F in sinistro latere, & à 19 ad 23 in dextro us-
que dorsalis medullæ pars notatur, lumborum occupans uerte-
bras, à qua quinq; parium radices principium ducunt.

G, 30 Ab F ad G in sinistro latere, & à 24 ad 30, in dextro dor-
sali medullæ pars indicatur, senis sacri ossis ossibus conten-
ta, & sex parium eius partis radices, adeo ut 7, & 19, &
24, & 30 sua serie dorsalis medullæ nervorum triginta pa-
ria proponantur.


H Dorsalis medullæ extremum in coniugatum ab ossis sacri fine procidens.



TRIGINTA


TRIGINTA PARI
 QVAE A DORSALI ME
 contenta originem ducunt, nuda delineatio
 nae cauae & magnae arteriae delineationes
 Capitibus communium figura

VM NERVORVM
 DVLLA DORSI OSSIBV
 ea proportione expressa, qua superius u
 exhibuimus. Hæc trium subsequentib
 rum secunda numeratur.



TERTIA TRIVM FIGVRARVM SVBSEQUENTI
BVS CAPITIBVS COMMVNIVM, QVÆ OSSIVM DORSI

cōtextum posteriori facie ita commonstrat, atq; modò præcedens eundem anteriori facie oculis
subijcit. Dein uniuersa dorsalis medullæ nervorum series hac figura depingitur, quæ superiori
figura minus oculis subiaceret, et cui characteres nō satis cōmodè illic ascribi pōtueret. Caterū
in utriusq; figuris dorsalem medullam adhuc in dorso ossibus repositā finximus, ut nervo-
rum parium numerus & egressus in procinctu ocyus esset, quodq; iam dor-
salis medullæ ossibus liberæ effigiem proposuimus.



CHARACTERVM DVARVM QVIBVS DORSALIS MEDVLLAE NERVORVM SERIES EXPRIMITUR figurarum Index.

QVONIAM praesens characterum index duabus figuris habetur communis, & nonnulli characteres utrisq; communes, alij peculiare sunt, non inopportune has notas 1, 2 pro characterum ratione illis subscribam, et licet numeri characteres in figuris sint obuij, illis subiungendis notis parum obscuritatis accessurum arbitror.

A_{1,2} Dorsalis medullae sedes, qua primum uertebras ingreditur.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 Septem cervicis uertebræ. His quoq; characteribus dorsalis medullae nervorum paria designantur, quæ ad elatiorem sedem eius cui numerus inscribitur uertebræ spectant.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1 Duodecim thoracis uertebræ.

20, 21, 22, 23, 24, 1 Quinque lumborum uertebræ.

25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 Sex sacri ossis ossa, os autem quod coccyx dicitur, hic non appropinquamus, quia spinalem medullam non continet, nullusq; nervus ab ipso elabitur. B 2 Prima cervicis uertebræ.

C 2 Prima thoracis uertebræ, atq; ita à B ad C septem cervicis notantur uertebræ.

D 2 Prima lumborum uertebræ, à C uero ad D duodecim thoracis uertebræ indicantur.

E 2 Principium ossis sacri, unde etiam à D ad F quinque lumborum uertebræ in conspectum ueniunt.

F 2 Primi paris nervorum dorsalis medullae iam in uertebris positæ posterior propago.

G_{1,2} Posterioris primi paris propaginis series, notatur autem præcipue ramus ipsius transuersum primæ uertebræ processum accedens, inibi in musculos aliquot digerendus, quos in Capitulo contextus serie explicabimus, ne forte nervorum dorsalis medullae characterum explicatio aliquin proluxa, in immensum excresecat. H₁ Anterior primi paris propago.

I 2 Secundi paris posterior propago, atq; hoc etiā characterē eius propaginis minor ramus insignit.

K 2 Posterioris secundi paris propaginis crassior ramus.

L 2 Commixtio coitus uerticij paris rami, S in prima figura notandi, cum secundi paris ramo K iam indicato.

M, M_{1,2} Crassioris secundi partis series ad uerticis & occipitij cutem.

N₁ Anterior secundi partis propago.

3, 1 Tertium par. O_{1,2} Posterior tertij paris ramus retrorsum ad spinā secundæ cervicis uertebræ reflexus, ac inter musculos uertebris hac sede adnatos latitans. Quando uero spinā cōtingit, extrorsum fertur per mutuum congressum dextri lateris musculorum cervicis posteriora occupantium cum musculis sinistri lateris, atq; hinc rursus oblique in latera ducitur. Hunc sanè ductum omnium parium à tertio hoc, ad uigesimum quartum usq; posteriores rami imitantur.

P₁ Anterior tertij partis ramus, qui in quatuor dirimitur propagines, ac Q in priori figura primam indicat musculus cervicem flectentibus insertam. R in utraq; secundam propaginem, quæ cum quarti partis propagine Y notanda cōgreditur. S in priori tertiam, quæ posterioris secundi partis propaginis grandiori ramo K notato inibi commiscetur, ubi L in secunda figura scripsimus. T in utrisq; quartam anterioris tertij partis rami insinuat propaginem musculis insertā, qui transuersis uertebrarum committuntur processibus.

4, 1 Quartum par. Veritus ne characterum copia præsentis nervorum tabulas neutiquam profecto casu partas, nec alijs plagio suffuratas obliteraret, quarti partis characteres in sinistrum latus reieci, ut dextrum latus aliquin pluribus oneratum characteribus, hac saltem sede liberum esset, ipsiq; quinti partis & subsequenti parium indices opportuni accōmodarentur.

V_{1,2} Posterior quarti partis ramus.

X_{1,2} Anterior quarti partis ramus in ternas diremptus propagines. Y in priori figura indicatur, prima propago, tertij partis propaginē R insignitam admittens, a in eadē secunda propago in musculos dispēsata, transuersos uertebrarum processus occupantes. b similiter in priori tertia propago, quinti partis portionem e notandam, ad septi transuersi nervi constitutionem accedens.

5, 1 Quintum par. c_{1,2} Quinti partis posterior ramus.

d_{1,2} Quinti partis anterior ramus, ab ipsius interno latere ramulum musculis cervicem flectentibus exporrigenens, qui inter d & characterem s est conspicuus.

e₁ Propago anterioris quinti partis rami, maximam constituens portionem septi transuersi nervi.

f_{1,2} Anteriori

f_{1,2} Anterioris quinti paris rami propago, quæ inter musculos occultata ad summum perreptat humerum. Characteres illi in secunda hoc modo τ , τ conspicui, huius propaginis soboles notant, musculis scapulam attollentibus oblatis.

g_{1,2} Propaginis f notatæ ramus in cutem exporrectus, quæ summum integit humerum, & musculum quo brachium attollitur.

h_{1,2} Propaginis f notatæ ramus musculi brachium attollentis parti insertus, quæ à clavicula & summo humero, quæ is clavicula articulatur, principium ducit.

i_{1,2} Propaginis quam f insigniuimus ramus, brachii attollentis musculi parti insertus, quæ à scapula spina exorditur: soboles autem rami i notati quæ in brachij cutem exporrigitur, cum brachij nervorum notis π & π in utraque figura indicabitur.

o₁ Sextum par.

k₂ Posterior sexti paris ramus.

l_m Nescio qua incuria l & m in prima figura omiserim, num scilicet in apponendis characteribus eos præterierim, quum in sinistro latere fortassis illos adhibitos arbitrarer: an uero appositos sculptor non expenderit. Vtunque sit, ad sinistrum latus e, tuo Marte adscribes, l ut sexti paris anteriorem indices ramum. m uero accommodabitur illi surculo, quem à sexto pari uersus n, hoc est septi neruum, deduci conspicis. Atque id figura hic inserta monitus, multo præstiteris facilius, quam ego, delineationem forte uitiaturus, & nihil interim promoturus, iam sculpta ac prælo subiicienda tabula l & m cæteris characteribus adijcere possem.



n_{1,2} Septi transuersi nerui ex tribus furculis b, c & m conflatus. Quod uero utriusque lateris nerui & in priori figura & in posteriori obliquo ductu incedat, hinc fit, quod intersepientes thoracem membranae propter cordis inuolucrum quod inibi amplexantur, hac sede extuberant.

o_{0,1} Septi transuersi nerui in septum series.

p₂ Sexti paris ramus caui scapula sedem petens, & uarijs oblatus musculis.

q_{1,2} Anterioris sexti paris rami cum proximorum parium ramis implexus, portioq; brachii accedens.

r₁ Septimum par.

r₂ Posterior septimi paris ramus, similiter atque alij huius sedis rami sparsus.

f₁ Congressus septimi paris cum proximis paribus, qui neruos in brachium deducit.

t_{1,2} Propagines sunt septimi paris, seu potius nerui brachium petentis tertij, ac τ notandi, quæ in huius sedis musculos scapulam & brachium mouentes accedunt.

8₁ Octauum par, seu parium dorsalis medulla in thoracis uertebis repositæ primum.

u₂ Posterior octauum paris ramus.

x_{1,2} Octauum paris congressus cum septimo pari, à quo in brachium aliqui exporriguntur nerui.

y₁ Octauum paris propago secundum superiorem primæ thoracis costæ sedem ad pectoris usque summum prorepens.

æ_{1,2} Surculi octauum paris, seu potius quarti brachium aduentis nerui, qui in huius sedis musculos diffunduntur.

9₁ Nonum par.

ß₂ Posterior noni paris ramus.

α₁ Ne y uicinum ipsi y offenderet, anteriorem noni paris ramum α insigniuimus, hic quoque notantes eius rami propaginem primæ costæ exporrectam.

ζ₁ Propaginis α insignitæ surculi, in musculos thoraci hic instratos protensi. Verum huiusmodi surculi in subsequentibus paribus exprimentur dilucidius.

10_{1,2} 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1 Paria neruorum à nono pari ad uiginti usque notantur, quibus eadem penè propaginum, & potissimum ad costarum interualla est series.

α_{1,2} Surculi intercostalium neruorum sexti paris neruorum cerebri ramum augentes, qui sub tunica costas succingente costarum radicibus exporrigitur.

β_{1,2} In dextro prioris figure latere rami notatur, ab intercostalibus neruis in musculos uaria serie excurrentes, qui thoraci inferuntur. Verum in sinistro latere paulo expressius eiusmodi ramos insigniui. Nam i & i ramos indicant in elatiorem partem exporrectos musculi brachium

κ₁ pectori adducentis, cuius fibrae deorsum oblique, ut & præsentis rami, porriguntur. κ uero & λ rami indicantur in humiliorem eius musculi sedem excurrentes, ac oblique sursum reflexi. Por

μ₁ ro λ & λ rami ostenduntur, oblique descendenti abdominis musculo exporrecti. μ & μ rami insinuantur in musculum propagati, cuius ope brachium uersus dorsum humiliora ducitur. At

o eiusmodi

cuiusmodi uarij spectatuz iucundissimi ramulorum ductus & inflexus ex ipsa potius sectione, quam hinc ubi omnes delineari nequeunt, obseruandi ueniunt.

- V 1 In dextro latere v ponitur, indicaturum nerui sobolem papillæ largitam.
- 0.9 1 Ramuli à decimo octauo pari & decimonono, principii accedentes musculi femur mouētū sexti.
- 7.7 1 Primus neruus brachium accedēs, qui in externæ brachij sedis cutē digeritur. Verū in uerq; figura ꝑ secundum brachium subingrediens neruus erit, ꝑ tertius, ꝑ quartus, ꝑ quintus, ꝑ sextus.
- 9 1.2 Secundum brachium petens neruus, quem Galeno plus satis tribuens, graciliorem quam oportuit expressi, secus quam in figura huius libri calci insuta.
- 9.9 1 Secundi nerui propagines, quæ capitibus anterioris cubiti flexentium musculi digeruntur.
- 7 1.2 Tertius brachium accedens neruus. Quod uerò secundus & tertius neruus paulo magis quam natura se habent in brachij exteriora delineati sint, in hoc factum putato, ut nerui inuicē in pictura magis quam natura distantes, omnia ad amussim oculis subijciant.
- U 1 Tertij nerui propago in cutem excidens, inter musculum pectori brachium adducentem, & cum qui brachium sursum ducit.
- Φ 1 Tertij nerui ramulus capiti oblatus, musculi cubiti flexentium posterioris.
- Χ 1 Tertij nerui propago, in cutem anterioris brachij sedis diffusa.
- Ψ 1 Hic congressus tertij nerui portionis cum secundo notatur. uerū iam sæpius obseruauimus tertium neruum à secundo augeri, uti in figura etiam pinxi, quæ huius libri calci adhibetur.
- ω 1 Secundus neruus post congressum ipsius portionis cum tertio neruo deorsum prorepens.
- Γ 1 Secundi nerui surculus capiti exporrectus oblongi, & radium in prouum ducentis musculi.
- Δ 1 Nerui secundi ramus secundum radium ad brachiale usq; properans, ac externam primi pollicis internodij sedem sub cute inibi ascendens, ubi humilium Δ reponitur.
- Θ 1 Nerui secundi ramus, iam dicto ac Δ insignito crassior: qui mox in duas propagines, Λ nimirū & Ξ diuiditur.
- Λ 1 Rami quem Θ insigniui elatior propago, sub cute secundum internum latus repens musculi oblongi, & radium in prouum ducentis.
- Ξ 1 Rami Θ insigniti inferior propago.
- Π, Σ 1 Inferior illius propaginis Ξ notatæ duo præcipui rami, secundum internam cubiti sedem ad uolam usq; frequenter exporrecti, quemadmodum & in dextra delineatum est manu.
- Φ 1.2 Quartus brachium subiens neruus. Huius nerui propagines etiam si accuratè in utraque delineatæ sint figura, posteriori tamen duntaxat characteres adhibiturus sum, ne prior figura plus satis hic obfussetur.
- Υ 2 Quarti nerui propagines musculis interdum extendentibus diffuse.
- Ω 2 Quarti nerui ramus in cutem posterioris brachij & cubiti articuli sedis exporrectus.
- 32.2 Quarti nerui propago cutem accedens humiliori sedi externi lateris brachij obductam.
- 33.2 Quarti nerui soboles in exterioris cubiti regionis cutem ad brachiale usq; protensa.
- 34.2 Diuisio quarti nerui, quæ iam externo humeri tuberculo insidet.
- 35.2 Elatior dictæ modo diuisionis ramus.
- 36.2 Elatioris rami 35 notati, in exteriorem pollicis, indicis & medij sedem propaginum series.
- 37.2 Demissior ramus diuisionis 34 indicatæ, qui ulnæ exporrigitur.
- 38.2 Propagines commonstrantur demissioris rami 27 insigniti, quæ musculis inferuntur, ab externo humeri tuberculo initium ducentibus.
- 39, 40, 41. 2 His notis propagines notatur demissioris illius rami qui ulnæ exporrigitur, quas offert triū musculorum initijs, ab externa ulnæ regione secundum ipsius longitudinem pronatis.
- 42.2 Rami illius ulnæ exporrecti, ac 37 insigniti finis, ac surculi, quos articulo brachialis cum cubito præbet.
- * 1.2 Quintus brachium ingrediens neruus.
- 43.1 Tertij & quinti brachii accedentiu neruorū series, in musculos internæ cubiti sedē occupantes.
- 44.1 Tertij nerui ramus radio exporrectus, ac postmodum in internam sedem pollicis, indicis & medij digestus.
- 45.1 Quinti nerui ramus ulnæ attensus, & propagines deriuans internæ sedi minimi digiti, & annularis, & medij.

Rami illius qui ulnæ attenditur, ac 45 insignitur, propago externæ sedi minimi digiti, & an-

- 46.1 laris, & medij oblata.
- 47.2 Sextus in brachium pertinens nervus.
- 47.1 Sexti nervi finis, non procul à brachialis cum cubito connexu desinens.
- 3, 48.1 Surculi passim à sexto nervo in cutem, cui is exporrigitur, excurrentes.
- 20, 21, 22, 23, 24.1 Quinq; paria nervorum è lumborum uertebreis egredientium.
- 3, 49.1 A uigesimo pari principium ducens ramus, cum feminali arteria ad testem exporrectus.
- 50.1 Series nervorum per abdominis musculos.
- 51.1 Rami à nervis qui abdominis musculis offeruntur, in musculum excurrentes, quo brachium uer-
- sus dorsum humiliora ducitur.
- 2, 52.2 Posteriores rami nervorum è lumborum uertebreis procedentium. Porro ramuli qui in priori fi-
- gura hos characteres 20, 21, 22, spectant, illi sunt qui ramum augent sexti paris nervorum cere-
- bri costarum radicibus exporrectum, ac etiam ramuli sunt digesti in principium sexti femur mò-
- uentium musculi. Ramuli autem 23 & 24 spectantes, illi sunt qui musculis hanc dorsum partem fle-
- ctentibus offeruntur.
- 5, 26, 27, 28, 29, 30. 1 Sex sacri ossis nervorum paria. Ramuli illi qui numero proximi sunt, illi cen-
sentur, qui uiscera & uteri quoq; ceruicibus implicantur, aniq; musculos pariter accedunt.
- 53.1 Primi paris ossis sacri, seu uigesimi quinti paris propago, internæ ilium ossis sedi, ipsiq; adeò
abdominis musculis hinc ab ilium osse prodeuntibus exporrecta.
- 54.2 Viginti quinti paris propago, gibbum ossis ilium accedens, & musculis inibi cluniumq; cuti ra-
mos offerens. Huc & à subsequenter paribus ramuli pertinent.
- 55.2 Ramus est propaginis 54 insignitæ, qui hic musculis offertur.
- 6, 1, 2 Dorsalis medullæ terminus absq; coniuge, indivisusq; procidens.
- 57.1 Primus femur subiens nervus.
- 58.1 Primi femoris cruris uel nervi ramus cutem accedens.
- 59.1 Primi cruris nervi portio musculis implicita.
- 60.1 Secundus in crus prorepens nervus.
- 61.1 Secundi cruris nervi ramus, secundum internam femoris & tibiæ sedem ad summum usq; pedem
sub cute prorepens.
- 62.1 Rami 61 insigniti, in pedis summum distributio.
- 63.1 Rami 61 insigniti, notatu dignæ soboles cuti anteriorem genu sedem ambiens digestæ.
- 64.1 Secundi cruris petentis nervi portio, femoris profundiora subintrans.
- 65.1 Portionis illius quam 64 notauimus ramus facili primarius, ac quinto femur moueri insertus
musculo.
- 66.1 Tertius in femur pertinens nervus.
- 67.1 Tertij cruris petentis nervi soboles, in musculos digestæ, pubis ossis foramen occupantes.
- 68.1 Tertij femoris nervi ramus in cutem exporrectus.
- 69.1 Tertij femoris nervi portio in alto permanens, & musculis implicita.
- 70.1 Præcipua modò dictæ portionis soboles musculo distributa tibiam mouentium secundo.
- 71.1, 2 Quartus, idemq; crassissimus in femur procedentium nervus.
- 72.1, 2 Quarti nervi propago in posterioris femoris sedis cutem magna ex parte diffusa.
- 73.1 Quarti nervi soboles in musculorum capitibus de promptæ, quorum origo à coxendicis ossis appen-
dice pendet.
- 74.1 Quarti nervi ramus, primum quarti tibiam mouentis musculi portioni à femoris osse principium
ducenti oblatus, ac mox in cutem excurrent, quæ inferiori sedi obducitur, posterioris regionis
femoris & genu articuli.
- 75.1 Rami quarti cruris petentis nervi, qui capitibus offeruntur musculorū, ab inferioribus femoris ca-
pitibus principium ducentium.
- 76.1 Quarti nervi in duos crassitie impares ramos diuiso, quam inter humiliora femoris molitur
capita.
- 77.1 Gracilior ac exterior dictæ modò diuisionis truncus.

- 78.78.1 Exterioris trunci propago, cutem subiens externae tibiae sedi obductam.
 79.1 Exterioris trunci propago cuti subtenfa, anteriorem tibiae sedem ambiens.
 80.1 Interior crassiorq; truncus magnae quarti nervi diuisionis.
 81.81.1 Interioris trunci propago cuti tibiam posteriùs integenti substrata.
 82.1 Propago exterioris trunci, interiori trunco commixta.
 83.1 Interioris trunci in pedis humiliori sede distributio.
 84.1 Portio rami 78 notati, pedis superiora accedens.
 85.1 Portio interioris trunci, quae cuti exporrigitur anteriori sedi articuli obductae, quo talus tibiae articulatur.
 86.1 Interioris trunci ramus, pedis superiora accedens, sed interim in alto latitans. Qua autem ratione interioris exteriorisq; truncorum series subinde uariet, in ipso decimiseptimi Capitis contextu sum explicaturus. Præter figuras, quarum modò indices expressi, subsequentibus Capitibus mirè ea confert, quae præsentis libro colophonem additurus sum. Quamuis enim illa non ad hunc librum, sed ad Epitome sit parata, quia tamen postremam & fortè etiam uerorem ipsam delineauit, non ab re me facit duxi, eius notas aliquando in margine subsequentium Capitum ponere.

DE DORSALI MEDULLA ET NERVO-
rum ab ipsa prodeuntium numero. Caput XI.

Dorsalis me-
dulla ab ossi-
medulla diffe-
rentia.



Dorsalem me-
dullam proce-
dendi neces-
sitas.

Dorsalis qui
nutritur.

Ossibus.

Membranis
inuolutis.

DORSALIS medulla neruorum modo substantiae cerebri à qua originē ^{41. figura} sumit correspondens, quanto magis à cerebro recedit protenditurq; tanto (neruorum etiam ritu) compactior duriorq; efficitur. Variat enim plurimum ab aliorum ossium medulla impenfè humida, propemodumq; fluxili, siquidem hanc, & præcipuè ipsius substantiam molliorem pinguedini, uel ad ipsi affimiles licet in ossium sinibus nutriendi humectandiq; gratia asseruato. Quapropter ex hac nullum prorsus neruum neq; durum neque mollem exoriri reperies. Quinetiam præfens medulla nec cerebri, aut dorsalis medullae in uolucris obtegatur, nec præterea ipsi adeò dignae notatæ arteriae ac uenae obtenduntur. Quapropter etiam nulla ratione cerebro & dorsali medullae similis est, neq; ulla illi cum sensus organis aut musculis communio existit. Quum interim dorsalis medulla non paruam cum musculis communionem sibi uendicit. Quippe si rerum Opifex hanc non produxisset, duorum alterum sublequeretur, aut enim omnes corporis partes capite inferiores, ac à neruis sextiparis neruorum cerebri propagines nullas admittentes, motu destituerentur arbitrario, tristantiumque sensu priuarentur: aut neruum in singulas partes à cerebro deriuari necessum esset. Verum si motu carerent, tunc homo non amplius animat, sed lapideae luteaeue cor- responderet statuae. A cerebro autem in singulas partes exiguum & grandem neruum porrigere, artificis esset neruorum securitatem nihili pendens. Nam non solum gracilem neruum, ut qui rumpi confringi que possit, longo progressu deduci non erat tutum, uerum ne aliud quoddam ualidorum etiam organorum, & minus adhuc uenam aut arteriam. Hæc enim ut dorsalis medulla à propria origine grandes amplexq; enascentes instar caudicis in progressu uariè disscinduntur, & quum corporis partibus appropinquant, furculos singulis partibus offerunt, qui materiam ipsis à principio oblatam communicent. Vnde etiam satius fuit dorsalem medullam uelut fluuium aliquem, ex fonte nimirum cerebro effluentem, per eam sedem qua transit geniculatim neruos tanquam sensus & motus arbitriarij uestigios germinare, uti modò rerum Opifex probè est molinus. Cæterum quando dorsalis medulla instat alterius cerebri omnibus propemodum partibus sub capite positis censetur, hanc quoq; oportebat similiter ac cerebrum^a duro & ferendis iniurijs pertinaci munimēto, ac uelut propugnaculo cingi. Cuiusmodi uerò id sit, in primo libro, dum dorsi uertebrarum structurā prolequerer, abundè dictum est. Præterea duræ etiam membranæ dorsalem medullam amplexantur, ijs omnino specie respondentibus, quibus cerebrum obuoluitur, etiam si distantia inuicem non congruant. Crassam enim seu duram cerebri membranā à tenui in caluaria distare, gratia distentionis contractionisq; uasorum tenuis membranæ, & ipsius adeò cerebri, in septimo libro declarabitur. In uertebrarum autem sinibus, ubi membranæ dorsalem medullam ambiunt, dura tenuem contingit. Atque hoc uno inuicem membranæ pugnant; ac eo præterea, quod tertium quoddam inuo-

cf. fig. cap.
lib. 3. B. fig.
ca. 6. B. I.
f. fig. ca. 1.
A.
d. fig. cap.
1.4. lib. 1.
c. in prioribus
lib. 1. u.

inuolucrum egregie ualidum neruumque duabus illis quæ dorsali obducuntur membranis, extrinsecus circumducatur. Neque profectò incassum hæc molitur Natura: quippe quum dorsalis medulla quædam cum cerebro obtineat communia, quædam peculiaria: in communibus quidem communis est fabrica, in peculiaribus autem propria ac differens. Sunt porro communia, substantiam corporis similem habere, & neruorum esse principium. Peculiaria uerò, moueri quidem cerebrum, ac pulsare naturali quodam motu, non secus atque cor: & cerebrum inter immobilis esse comprehendendi, non moueri uerò dorsalem medullam uertebreis quæ mouentur inclusam. Merito itaque ipsi pariratione, duæ membranæ, duræ nimirum & tenuis, circumuoluntur: una quidem præcipue, ut colliget simul uasa quæ in eis excurrunt, & totam eorum substantiam utcunque mollem constringat: alia, ut inuolucrum efficiatur, & à circumdatis ossibus muniatur, ipsa quæ etiam ossa & cerebrum & dorsalem medullam ambiat, uelut propugnaculum quoddam & murus, sufficiens citra noxam excipere impetum eorum quæ aut secare, aut frangere, aut aliter nocere possunt. Cæterum quoniam cerebrum tenuisq; membranæ uasa pulsant crassam membranâ, tanto intervallo à tenui membrana in caluaria priuatim distat, quantum ipsi dum dilatantur, suscipiendis sat sit. Quoniam uerò dorsalis medulla non pulsata, neque distenditur, utræque membranæ simul coeunt coalescuntq; ne minimum quidem mutuo distat. Porro quod nullus qui sensu dignosci queat, motus capitis ossibus adsit, in uertebreis uerò motus sit uariis, dorsali medullæ tertium id inuoluerum, cuius paulo antè meminimus, obductum uisitur. Nam nobis dorsum inclinantibus, ob id quæ etiam dorsali medulla nec cessari flexa tensa quæ, hæc promptè nullo eiusmodi inuolucro succincta frangeretur. At dorsalem medullam unicam (uti & cerebri sedes, à qua principium ducit, unica simplex quæ est) iussit à Natura factam esse, neminem latere arbitror, quum homini duo dorsa procreari fuisset planè ridiculum, atque ad plurimas actiones ineptum, quod quæ dorsalis medulla ualidior per uertebreas simplex, quàm gemina prorepat. Quàm uerò sit Galeni ratio uana, quæ cerebellum simplex esse docet, ut unica fieret dorsalis medulla, in septimo libro explicabimus. Quanquā sane & hoc loco hominis medulla dorsalis ueniat expendenda, si quidem per totam ceruicem & ad thoracis usque medium aliquando & inferius non nihil, simplex ac indiuisa mollis quæ adhuc deorsum fertur, neruos duntaxat geniculatim à se diffundens. Quum uerò thoracis mediū perrepsit, ut duris ac motui potissimum seruientibus propagandis neruis idonea redderet, non simplex amplius, sed in innumeras secta soboles descendit, non aliter profectò quàm si frequentes multas quæ tenuissimas chordulas simul recta tensas membranæ cuiuspiam illigares, ac deinde per singula foramina per quæ nerui prosiliunt, unam atq; alteram chordulam exmutuo illo connexu tantisper distribueres, quousque unica tantum superesset chordula, dorsalis medullæ fini respondens. Ad cum nanque modum dorsalis medulla in neruos absumitur, qui per foramina in uertebreis exsculpta elabuntur. Quanto autem artificio hæc concinnata sint, partim in primo libro exequutus sum, partim uerò in sequentibus Capitibus recensere conabor. Cæterum nerui, quos dorsalis medulla per uertebreas ducta, ac paulatim in progressu gracilescens distribuit, refectionis professoribus sexaginta, & interdum quinquaginta octo enumerantur, modo triginta, modo uiginti nouè complexi paribus. A dorsalis enim medullæ sedes septem ceruicis contenta uertebreis, septena exiliunt paria. A medullæ autem sede per thoracis uertebreas, duodena dependent paria: à quinque autem lumborum uertebreis, quinque ab osse sacro sena. quamuis interim quinque inferiora ossis sacri neruorum paria, si quando id sex efformetur ossibus, quodammodo gemina dici possint, quum nerui utrinque antrosum & retrorsum ducantur ab una radice uix enati. Dorsalis uerò medullæ terminus ex osse sacro procidens, neruus non censetur, neque in ramulos qui neruorum nomen merentur cessat: quanquam aliquando illum iam ex sacro osse decidentem in tres impenit breues surculos diffundi uiderim, tunc sacro osse quinque solum ossibus conformato. In canibus autem & alijs animalibus, pro dorsi ossium numero neruorum dorsalis medullæ parium frequentia quoque differt. Vt nihil de Galeni libris de Partium usu sententia dicam, quando os sacrum quatuor tantum ossibus formari arbitratus est, nullum quæ aliud os illis subijci scriptum reliquit. Ex illa enim sententia colligere promptissimum est, quàm aliorum Anatomicorum placitis, dum illos libros nobis tradidit, anxie institerit, quàm quæ inuicem consona nobis scripta reliquerit.

Quæ dorsalis
cum cerebro
habet communia,
quæque
sibi peculiarina.

Dorsalis enim
medulla

Li. 8. de Vsu
partium.

Vt dorsalis
uelut e multis
funiculis con
tingitur.

Quot mem
bræ dorsalis
medullæ
quantur.

SEPTEM NERVORVM PARIVM E CER

uicis uertebrae profluentium series. Caput XII.



Quoniam
Natura pri-
mo parauerit
pari.

Secundi pa-
ris (gressus et
series).

MODO haecenus^a memoriae non exciderit primae ceruicis uertebrae cum occipitis osse, & secundae item uertebrae cum prima superius traditae articulationis species, merito in praesentia Naturae providentiam sedulo admiraberis, quae primo ceruicis pari, & secundo, non ceterorum ceruicis aut thoracis neruorum ritu, sed peculiari quodam, duarum primarum uertebrae articulationibus impedita, ut in insculperit, ac duos utriusque paris, quemadmodum & in sacro osse utrinque machinata sit exortus: unum quidem anteriori corporis sedi, alterum uero posteriori exporrigens. Quippe ut * posteriori primi paris propagini concinne uia praepararetur, Natura in primae uertebrae eminentiori sede ad radicem posterioremque regionem ipsius cum capite articulationis sinum caelauit, atque hic etiam occipitis ossi sinum insculpens foramen effecit primae ceruicis uertebrae, ipsiusque occipitis ossi commune. Ne si fortasse integrum foramen tenui illi uertebrae (uti in canibus, quibus gravior est uertebra, euenit) insculpisset, ipsa quum alioquin magno indigeat robore, multis perforationibus inuolida redderetur. Quinetiam quo foramen id arctius esse possit, Natura posteriorem primi paris exortum gracilem effecit, eumque in musculos duntaxat distribuit, qui a prima ceruicis uertebra in occipitis os inferuntur, & eos qui ab occipitis osse in transversos eius uertebrae processum implantantur: aut, ut clarius dicam, in quarti & quinti musculorum caput mouentium parium musculos, praesens propago spargitur, ac dextra quidem propago in dextrilateris deperditur musculos, sinistra autem in sinistri: quod etiam tota neruorum serie semper, nisi aliud addidero, subaudi uelim. Ceterum ab hoc posteriori primi paris exortu seu propagine furculus etiam deducitur in principium^e musculi a transuerso primae ceruicis uertebrae, & aliquot subsequens uertebrae principium fumentis ac scapulam fursum attrahentis.^b Altera primi paris propago non semper conspicua, nimis quam gracilis est, atque ab anteriori dorsalis medullae regione enata, excidit inter primam ceruicis uertebrae & occipitis os, iuxta latus^c teretis ligamenti secundae uertebrae processum (quem denti assimilamus) occipitis colligantis. Haec propago uti gracillima est, ita etiam mox in^d musculos absumitur, qui anteriori uertebrae sedi obnati, dorsum mouentium primum par recedunt. Secundum neruorum par, quando prorsus ex lateribus subsequens parium modo pronasci nequiuisset, utpote ab articulatione duarum superiorum uertebrae offendendum, aut quod si foramen inibi uertebrae esset insinuat, articulationis robur omnino infirmaretur, Natura uertebrae noxam fugiens, secundum par ut frequentius, binis exortibus seu propaginibus exoriri operae precium putauit, ac^e posteriore propaginem, quae^f anteriori longe est crassior (quantquam & ipsa gracilis uisitur) per latera posterioris secundae uertebrae processum, quem spinam uocamus, eduxit, ibidem opportunissimum tutissimumque^g iter (uti in primo docuimus libro) machinata. Praesens propago quum utriusque primi paris propaginibus crassior sit, in plures quoque diuiditur ramos. Simulatque enim prodit, in duos crassitie impares^h discinditur, acⁱ crassior a prioribus quodammodo ad posteriora fursum transuersim tendit, ex spinam nimirum secundae uertebrae lateribus, uersus spinam medium, ubi mutui est utriusque lateris musculorum posteriore ceruicis regionem occupantium congressus. Ramus iste tertij paris^j sobole huc exporrecta^k coarctatus, ac ex dictorum iam musculorum medio in exteriora prolapsus, contrario penitus ductu ex posterioribus fursum in priora ad caput contendit, atque inibi in uniuersam capitis cutem tam quae circa aures, quam quae post aures ad uerticis usque summum habetur, furculos spargit. Huius rami progressus accuratè propter subsequens parium seriem uenit perpendendus. Ab illis enim paribus rami a uertebrae lateribus ad ipsarum spinas pertingunt, & hinc recta extrorsum per mutuum musculorum utriusque lateris congressum, & rursus hinc a spinarum seu posteriorum processuum apicibus, dorsumque medio antrosum seu uersus corporis latera ascendant, & in musculos digeruntur a spinarum apicibus principium ducentes, uti subsequens neruorum series ordine doctura est. Ceterum posterioris secundi paris propaginis minor^l ramus in proximorum musculorum principia diuicatur, sunt autem illi tertij & sexti paris^m musculi, eorum quos capitis motibus praesse diximus. Anterior secundi paris propago admodum gracilis, ab anteriori dorsalis medullae sede originem mutuatur, atqueⁿ inter secundam & primam elabitur uertebrae ad latus radicis, eius secundae uertebrae processum, quem denti comparamus. Digeritur autem haec propago mox in^o musculos anteriori ceruicis uertebrae sedi adnatos, qui primum par musculorum dorsum motus autorum constituunt. Tertium

a Hanc si o-
pus erit,
figuris ca-
15 li. i. repa-
rabis.

* 3 fig. F.
b 3, 11 fig. ca.
15 li. a. V.
c 1 fig. ciujd.
cap. H.

d 14. musc.
14. G. F.
e 14. tabula
H. 1.

f 2, 3 fig. G.
g 13 muscul.
14. Q.
h 2 fig. H.

i 1 fig. ca. 30 li.
21.
k 8 muscul.
A. B.

l 1 fig. I.
m 2 fig. N.

n 10, 11 fig.
ca. 15 li. r.
o 1 fig. q. r.
p 6 fig. p.
q 1 fig. K.
r 3 fig. S.
s 3 fig. L.

t 3 fig. M.
u 1 fig. N.
v 3 fig. N.
w 1 fig. N.
x 14 muscul.
tabu. A. B.
K. L.
y N.

z 11 fig. cap.
15 li. m. ad
latus r.
a 8 ta. A. B.
b 2 fig. cha. s.

neruorum à dorsali medulla prodeuntium par ex^e communi foramine secundæ ceruicis uertebræ & terciæ procidit, mox ab egressu in duos discissum ramos.^a Posterior retrorsum flectitur, ac inter musculos ceruicæ extēdentes, qui dorsum mouentiu septimus & octauus enumeratur, ac deinde inter caput mouentium secundum par occultatus, ad secundæ uertebræ spinam contendit, atque hinc ex mutuo muscutorum posteriorem ceruicis sedem occupantium concursu in posteriora excidens ad ceruicis properat latera,^b musculo suffultus, qui ex carne constitutus membrana buccarum motus opifex censetur.^c Anterior autē tertij paris ramus, in quatuor spargitur propagines, ac prima musculos dorsum mouentium primum ac secundum implicat.^d Secunda propago declius ducta, quartum adit neruorum par, cuidam ipsius surculo commiscenda, in dictos nuper musculos absumpto.^e Tertia autē sursum contendit, ac posterioris secundi paris propaginis ramo in uerticis cutem excurrenti congruitur, unā cum illo (uti prius dictum est) dispergenda.^f Quarta autē tertij paris anterioris rami propago in musculos digeritur, qui transuersis uertebrarum processibus connati, ceruicem in latera mouent & eum pariter qui à transuersis uertebrarum ceruicis processibus principium ducens, scapulam sursum uellit.^g Quartum ceruicis neruorum par ē communi terciæ & quartæ uertebrarum foramine excidens, tertio pari similiter in duos partitur ramos.^h Posterior aliorum qui retrorsum ad spinam inter musculos occultati reflectuntur modo, uersus terciæ ceruicis uertebræ spinam contendit, in progressu illis quibus intertextitur musculus, surculos diffundens. Quādo autē spinam contingit, per mutuum elabitur congressum, muscutorum posteriorem ceruicis regionem occupantium, atque hinc in latū membraneūq; digeritur musculus buccarū motus auctorē præcipuū.ⁱ Anterior autē quarti paris ramus, ternas educit propagines, ac unā promit, cui tertij paris propago commiscetur, quæq; in musculos deperditur stomacho substratos, ac ceruicem flectentes.^j Secundam uerò propaginem in musculos distribuit uertebrarum lateribus adnatos: cuiusmodi sunt quorum beneficio ceruix in latera ducitur, ac is qui à transuersis colli uertebrarum processibus principium ducens, scapulam sursum allicit.^k Tertia propago duabus nuper dictis gracilior, declius fertur, cum quinti paris sobole congressura, ac simul cum illa et sexti paris propagine septi transuersi nerui constitutura.^l Quinto pari, quod prædictis quatuor succedit, quinta uertebra cum quarta uiam præbet: ipsum uerò similiter atque quartum in duos discinditur ramos, ac posteriorem ad spinarum apices retorquet, eodem prorsus modo digerendum, quo posteriorem quarti paris ramum digerī diximus. At prior anterior uel quinti paris ramus, primum sobolem spargit musculis ceruicem flectentibus, dein grandiorē depromit, qui deorsum repens ramulos utriusq; uicini paris, quarti nimirum & sexti excipit, & illis adauctus, neruum septi transuersi efformat, qui præcipua quinti paris constat propagine, & exigua sobole quarti paris, & item exigua sobole sexti. Interdum uerò & septimi paris surculus septi transuersi neruo accedit, at tunc quarti paris soboles ipsi nulla offertur. Atque hæc sanè regio admodum industrie septo transuerso neruos elargitur. Variat enim id à cæteris musculis non figura solum, uerum & functione. Orbicularis enim formæ (uti in secundo recensui mus libro) iussit, & situ obliquo donatur. Mox caput ipsius à quo fibræ dependent, non ut quispiā arbitraretur, ex pectoris ossē, aut costarū cartilaginibus, aut uertebrarum corporibus educitur, sed in media totius septi regione, quæ neruosa est, id consistere nobis persuasum habemus. Ac proinde neruos fibris illis motum largituros, eò prorere ab alto operæ precium fuit, ut in uniuersam ipsius sedem suam uim ex æquo diffunderent. Si uerò Natura neruos septi partibus, quæ pectoris ossi, costis & uertebris connascuntur, inseruisset, septi finis in ipsius medio haberetur: quū neruos in muscutorum initia potius quàm fines exporrigi, Anatomices professoribus axioma sit. Atque hac ratione septum duntaxat neruōs à ceruicis uertebris mutuat, longo enim progressu eos ducere, quum possent ex proximis sedibus emitti, Opificis esset ignorantis, quid magis in fabrica conduceret. Hac igitur occasione septo sublimes transmittuntur nerui, uniuersum thoracem perreptantes. Ne uerò in progressu periclitarentur, eos intersepientibus thoracem membranis adnexit, unum neruum singulis membranis exterius firmans. Neq; profecto minorem cōditoris industriam arguit, id quod adhuc anterioris quinti paris neruorum ceruicis est reliquum, atq; in musculū præcipue inferitur, cuius auxilio brachiu attollimus. Hic enim quia ingens graueq; membrū impenitē sursum attollere debebat, fortu ualidoq; in digebat neruo, quem Natura ipsi securissimè à commemorata quinti paris portio neduxit. Natura enim ab hac portione ramulos quosdam porrigit musculis scapulam attollentibus, primum ab externo huius portionis latere neruū deriuat, qui foras emergens, atq; in multas scissis soboles cutem implicat, qua attollens brachium musculus integitur. Deinde reliqua portio in profundo recondita, simul atque scapulæ ceruici appropinquat, in duos ma-

Tertij paris
series.

Quarti paris
series.

Quinti paris
series.

Septi transuersi
nerui
constitutio.

Reliquum
anterioris rami
quinti paris.

gnitudine impares partitur ramos. ° Anterior, qui & gracilior est, sub summi humeri cum clauicula^a connexu porrigitur, & musculi brachium attollentis parti soboles spargit, quæ à summo humero & clauicula inibi principium ducit. Atque hic ramus cuti nullum exporrigit surculum, nisi interdum extremè gracilem, aliquouſque^q humeraria uena concomitatum. ° Posterior uerò eius quinti paris portionis, quam in profundo reconditâ dediuem ferri diximus, ramus qui anteriori crassior est, postquâ gracilem exprompsit ramulum^m musculo hinc à scapula sursum ad os^v referens proficiscenti, insidet^r foramini instar semicirculi in scapulæ elatiori costâ exculpto. In hoc foramine posterior hic ramus uena quoque & tenui anterâ concomitatus, mox propaginem diffundit^r musculo sinum occupanti, quem inter scapulæ spinam & elatiorem ipsius costam haberi scripsimus. Insuper in musculi brachium attollentis sedem digeritur, à scapulæ spina & summo humero pronatam. Verùm hic ramus in præsentem musculum non totus exhauritur, sed^r furculo quopiam cutem brachij externæ sedi obduciam adit, quem secundum exterius latus^r insertionis ramus ille ab alto transmittit, quam musculus is brachium attollens in humerum molitur. Eadem sanè industria & à succedentibus neruorum paribus seu neruis in brachium progredientibus ad musculos scapulam mouentes, ° nerui transmittuntur, qui omnes intimis musculorū sedibus potissimum inferuntur. Cæterum nunc tempestiuū est, sexti & septimi parii seriē sermoni subiicere. ° Sextū par sub quinta uertebra excidens, eadē cū cæteris paribus serie ad ceruicis musculos^b posteriorē ramū dispensat, tū eos qui ceruicis & capitis præfunt motibus, tū illorū capita^c qui respirationis opifites ex ceruice thoracē accedūt, quanq̃ & hi potissimum ipsorum neruos à septimo pari & octauo quoq̃ seu primo thoracis pari mutuuntur. ° Anterior autem sexti paris portio, postquam^d neruum exprompsit, qui quinti paris portioni ad neruum septi transuersi constitutum permiscetur, cum contiguis paribus, septimo nimirum & octauo^e coit, & uariè rursus diffcinditur, neruos unā cum proximis partibus efformatura, qui in manum contendunt. Priuatim uerò præter cætera ceruicis paria, sextum par^f portionem notatu dignam deorsum ad scapulæ cauum transmittit, & rami quoque tum ab hoc, tum & à cæteris coniugijs ad musculos digeruntur, qui scapulam sursum ducunt. Validis enim & magnam molem attollentibus musculus uarias quoque ac frequētes neruorum propagines inferi, quā maximè rationi est consonum. ° Septimi etiā paris ex communi sextæ et septimæ ceruicis uertebrearum foramine prolabentis, magnus cum duabus proximis coniugationibus sexta uidelicet & septima^g congressus perficitur, atque huius potissima portio in manum fertur. Ab hoc enim pari & quinto & sexto ceruicis, & primo & secundo thoracis uertebrearum omnes manus nerui propagantur. Qua autem serie illi digerantur, peculiari Capite persequar, modò interim adhuc addens, septimum par interdum ramulum septi transuersi neruo offerre, & perpetuū ramum in posteriora ad spinam ducere, qui præter cætera propagines in musculos posteriori ceruicis sedi intratos digestas, aliquot etiam offert^h lato membraneoq̃ musculo, qui buccas mouet, atq̃ ex carnea membrana constituitur. In hunc enim musculum à quinti paris neruorum cerebriⁱ propagine per^j cæcum foramen excidente, ac dein ab omnibus paribus uertebrearum ceruicis (si primum excipias) soboles pertingūt, uniuersè secundum musculi fibrarum ductum exporrectè, ac proinde etiam ad uenas & ligamenta multifariam (ut ductum illum feruent^k) reflexe, ac cuti etiam communicatæ.

SERIES DVODECIM PARIVM NERVO-
rum dorsalis medullæ, thoracis complexæ uertebreis. Cap. XIII.

Primi paris
thoracis, seu
dorsalis me-
dullæ neruo-
rum oclau-
is series.



PRIMUM thoracis neruorum^a par, inter septimam ceruicis uertebrearum et thoracis primam, quinq̃ humiliorum ceruicis parium modo exiliens, superioribus dorsalis medullæ neruorum paribus comparatum, opportunè octauum nuncupabitur. Hoc itaque simul atque excidit, in duos impares diductum ramos, ° posteriorem, qui & gracilior est, retrorsum ad spinam inter musculos uertebreis hîc adnatos reconditū detorquet, à quo in progressu furculos accipit radix^b musculi à prima thoracis costâ in trās uersos ceruicis uertebrearum processus inserti, ac ceruicem in latus (uersus anteriora tamen magis) inclinantis. Dein & qui ceruicis capitis^c que in posteriora motibus præficiuntur musculi, ab hoc ramo octauī paris furculos adipiscuntur. Quod autem eius rami septimæ ceruicis uertebreæ spinam contingit, extrorsum ducitur: & rursus transuersim à spina abscedens, propagines offert humiliori sedi eius^d musculi qui scapulam mouentium secundus ac maior enumeratur. Insuper & ° musculo scapulæ basi inserto, scapulamq̃ ad dorsum trahenti, ac denum illi

02, 3 fig. b.
p. ult. f. i. b.
10. ad. a.
q. fi. ca. 6. h.
3 d. d.
7. 2. 3. f. i. b.
55. mus. f. i. b.
R. S.
1. 1. 3. f. i. cap.
21. lib. 1. d.
11. 12. tab. 1. d.
H.

x. 2. 3. f. i. m.
7. 10. mus. f. i. b.
tab. inter p.
c. d.

2. 3. fig. b. h.
n. n.
4. 2. fig. ch. d.
6.

3. fig. h.
c. u. tab. p.
2. fig. l.
e. 2. f. i. m. ad.

e. ad. consti-
tutione n.
f. 2. 3. f. i. q.

3. fig. p.

h. 2. fig. ch. a.
7.

i. 2. f. i. f. aut.
potius spe-
ci. f. i. ca. 1. d.
aut. ult. fig.

k. 3. fig. r.

l. 3. mus. tab.
r.

m. 1. 2. f. i. ca.
2. c.

n. 2. fig. ca.
12. lib. 1. b.

d. 2. fig. ch. d.
8.

b. 3. f. i. m.

e. 8. mus. f. i. d.
c. 4. 1. d. b.

d. 9. mus. f. i. d.
r. a.

c. 10. 1. d.

illi quem hominis thoracē mouentiū tertium recēsumus. At anterior octauī paris ramus, posterior longe insignior, septimi, sed magis adhuc interdū noni paris nō minimā portionē cum ipso congređientem^o fuscipit, totusq; uariē uicinis paribus commixtus, si^o unicam ipsius dempleris propaginem, in manus fertur. Ex demissiori nanq; ipsius sede ubi iam proximis paribus se commiscuit, propaginem antrosum emittit, quæ secundum primæ thoracis costæ ductum ad pectoris ossis usq; summum perlata, in progressu furculos dispensat thoracis musculo à clauicula in primam inserto costam. Præterea huius propaginis terminus in illos digeritur musculos, qui à pectoris ossis summo principiū ducentes, sursum exporriguntur, tum ad mamillarem capitis processum, tum ad os u^o imaginī comparatū, & ad laryngis cartilaginem scuto non absumilem, quanquam interim & his musculis à sexto pari neruorum cerebri^o foboles offerantur, ut & à primo intercostali neruo, quem mox noni paris^o propaginē esse dicam. Quæ autem octauī paris in manum sit series, cum reliqua manus neruorum explicatione persequar, id & hoc loco subiungens, à octauo pari, seu potius quarto manum petente neruo, quum is alam accedit ex posteriori ipsius regione etiam^o ramos pullulare, in cauam scapulæ regionem digestos. Nonum par inter primam & secundam thoracis uertebras originem ducens, octauū quoque paris ritu^o ramum in posteriora ablegat, simili quodammodo ratione atque posterior octauī paris ramus digerendum. Deinde non minimam sui partem octauo porrigens, uti suo dicam loco, in manum fertur. reliquam uerò ipsius portionem primo costarum intervallo offert, quæ secundum primæ costæ ductum ad pectus usque fertur in progressu, ut & reliqui costarum intervalis exporrecti nerui, foboles diffundens in musculos thoraci incumbentes. Porro^o decimum, undecimum, duodecimum, & reliqua ad primum usque lumborum, uti uigessimū par, subsequētia, eadem quodammodo serie digeruntur. Quippe omnia mox atque ē uertebrarum lateribus exilire, bipartitō scinduntur, ac minor graciliorq; ramus retrorsum ad uertebrarum spinas detorqueatur, inter musculos uertebris adnatos latitans. Sunt uerò illi, quos dorſi & thoracis motibus hīc præesse retulimus. Videlicet humani thoracis motorū^o quartus, in canibus uerò & simijs sextus: deinde dorsum mouentium sexti paris^o alter, mox et^o alter octauī paris, & circa superiores thoracis uertebras alter^o primi, & secūdi paris caput mouentium, & alter tertij paris, & alter quoq; quartij paris musculorum dorsum priuatim mouentium. In hos enim musculos thoracis neruorum posteriores rami sparguntur: ueruntamē in illos tantum non absumuntur, ac quum iam spinarum attingere apices, extrorsum properāt, inter mutuum dextri sinistriq; lateris musculorum congressum procidentes, atque in musculos postmodum digesti, qui ab illarum quas contingunt spinarum apicibus principium mutantur: ē quorum classe (præter aliquot nuper commemoratos, præcipuē autem alterum primī paris musculorū caput mouentium) sunt, musculus scapulam ad dorsum trahens, totiūq; scapulæ basi insertus: & humilior pars eius musculi, quem secundum scapulā mouentiū enumeramus, ac monachorū cucullis cōserimus, qui hac parte scapulā deorsum uellit, mox humani thoracis motus opificum^o quintus, & is etiam qui brachium deorsum dorſo adducit. Et præterquam quòd à posterioribus horum parium ramis furculi in musculos digerātur, etiam aliquot in cutem dorſo infratam contendunt, at minus frequentes quàm nerui in manus, aut pectoris, aut colli cutem pertingentes. Cæterum anteriores præsentium parium rami^o furculos offerunt sexti paris neruorum cerebri^o ramo sub tunica costas succingente costarum radicibus exporrectio, illisq; furculis adaucto. Dein præſentes rami costarū exporriguntur intervalis, uena item quæ arteria concommitati, & proprio^o sinu costarum interiori inferioriq; sedī insculpto uecti, secundum costarum ductum in anteriora properant. Rami enim ueris exporrecti costis, ad pectoris usque os pertingunt: rami autem secundum spurias delati costas, haud unā cum illis cessant, uerū in abdominis usq; anteriora super peritonæum repunt. Ab his ramis in progressu^o sparsa admodum propaginum series in musculos thoraci adstratos diffunditur, ē quorum numero^o secundus est thoracem mouentium, & qui brachium pectori admouet, & qui scapulam pectori adducit, & qui brachium deorsum uellit, & oblique descendens abdominis musculus. In hos enim musculos propagines ab intercostalibus neruis offeruntur, singule tanta industria ad costas, & uenas, ac arterias, & ligamenta reflexæ, ut ad amissim musculorum quibus porriguntur, fibrarum incessus retineant. Atque ut his musculis thoraci infratis ab intercostalibus neruis propagines exhibentur, sic à neruis spurias costas superantibus, foboles quoq; abdominis musculis communicantur, fibrarum etiam illorū quibus attenduntur musculorum obseruantes. Porro à propaginibus musculos implicantibus, neruuli etiam thoracis cuti offeruntur, non quidem certa neq; nunquam aberrante serie, sed sparsim, eoq; prorsus modo quo errantes uasorum rami, *αρογνολή* Græcis nuncupati, digeruntur. Vtuncq; uerò uaria, neq; sibi constans

Noni paris series.

Reliquorum parium ē thoracis uertebris proſiliens tium series.

*Nervi papil-
larum petentes*

fit eiusmodi neruorum cutem petentium series, Natura tamen uerita, ne tenero adhuc infanti
lac familiare illius alimentum, à matre exigenti papilla nonnunquam atrocius denegaretur, exa-
ctum papillis sensum impartiri uoluit, quo tenerorū infantuli labrorum mollisq; linguæ conta-
ctus, papillam uoluptate afficeret, qua homines illecti, hanc promptius sugendam contrectan-
damq; offerant. Ac proinde à neruis ferè qui quartum costarum perreptant interuallum, pro-
pagines diffunduntur in musculum, cuius beneficio brachium pectori adducimus: atq; ab illis
propagibus furculi in papillam pertingūt, simili¹⁴ qua penis efformatur substantia constan-
tem. Cæterum ut præfentes furculi duodecimo neruorum pari quodammodo peculiare cen-
sendi sunt, ita sanè decimo octauo & decimonono paribus id priuatim ascribendum uenit,
quod furculos offerant principio¹⁵ sexti femur mouentium musculi, quod hinc uertebRARUM
lateribus pronasci iam multo antè commemorauimus.


12 fig. 7.

14 3 fig. tabu-
le cap. 49
lib. 2 E. E.

15 ad laus
character
78. 19.
7 8 muscul.
tab. 6.

NERVORVM IN VNIVERSAM

manum series. Caput XIII.



PRÆSENTI figura plexum, de quo in Ca-
pitis contextu mox in initio agetur, & qui supra primam
thoracis costam anteriori in facie consistit, nudum expri-
mere ita conatus sum, quemadmodum in postrema Ana-
tome is mihi Patavij occurrit. Vt uero delineatio esset
conspicior, omnes ramos à quinto, sexto, septimo, octauo
& nono paribus aliò quàm in brachium deductos, resectos
finxi, quemadmodum etiam à cadauere ex quo hanc tabel-

lam desumpsi, eos absceueram. Non est tamen, cur quis in omnibus hominibus huiusmodi prorsus
plexum se obseruaturum arbitretur, quum is mihi admodum uariis inter secundum occurrerit.

Characteres autem quibus hæc figura insignitur, ita se habent.

5, 6, 7. Radices sunt parium neruos constituentium, qui brachium subeunt, illic resectæ, quæ à uertebris
8, 9. iam procidère. Nervi uero brachij illic sunt abtruncati, ubi iam in brachium prolabuntur.

A Portio est quinti paris, à qua tandè neruus deducitur, qui brachij subeuntij primus numeratur.

B Secundus neruus. C Tertius neruus.

D Quartus neruus, qui hic ex posteriori sede prodit congressus quinti paris & sexti, portionemq;
assumit ex posteriori sede congressus septimi paris, ac deinde sub octauo paris noni congressu
prorepens, etiam ramum E insignitum ab illo progressu ita atque hic expressimus assumit. A
quibus uero commixtionibus congressibus uereliqui nerui prodeant, etiam absque characterum
opera notum est, modo illis quæ brachium petunt, unum adhibeam characterem.

F Quintus brachium petens neruus.

G Sextus brachium petens neruus. Verum ut hunc plexum adhuc accuratius observes, non pigeat
figuram intueri, quam huius quarti libri calci insuendam duximus.

A quibus
partibus ner-
ui in brachium
ducantur.



Implexus ner-
uorum brachi-
um adiectum.

D brachium à quinto, sexto, septimo ceruicis neruorum¹⁶ paribus, ac dein
à primo secundoq; thoracis seu totius dorsalis medullæ uertebreis conten-
tæ octauo & nono¹⁷ paribus¹⁸ sex nerui digeruntur, quorum seriem profe-
quar mox atq; Naturæ operum studiosos admonuero, ut accuratè neruo-
rum in brachium porrigendorum originem contemplantur: ita enim ner-
ui brachium adituri, statim ab ortu ad uertebRARUM latera permiscuntur
coeuntq;, & rursus inuicem dirimuntur, ac denuò congregiuntur: ac po-
stremo separantur, ut neitiquam dicere queas, quis nam brachij neruus ab hoc illo uependeat
pari. At uerius quodammodo sex præcipuos neruos ab illa commixtione neruorumq; conge-
rie ac cõtextu reticulari principium ducere astrues, atq; hic implexus tam elegans est, ut ab illius
effigie chordulas Cardinalium galeris appensas, artifices primùm miscere committereq; didice-
rint. Quod autem Natura artificio hoc peculiari & incredibili spectatuq; iucundissimo utatur,
quo neruos longissimo progressu deducendos, duriores ac iniurijs ferendis pertinaciores red-
dat, neminem ambigere existimo, potissimum si¹⁹ implexum neruorum crus petentium prius
spectauerit, neque nimium interim Galeno in primo Affectorum locorum libro acquirerit.

Cæte-
ulti.

16 2 fig. cha.
5, 6, 7.

17 2 fig. cha.

8, 9.

18 2, 3 fig. 10.

19 2, 3 fig. 10.

16 circa obli-
sacri regio-
nem in 2 fig.
et huius li.

Cæterum¹ primus brachium subiens nervus, eius quintiparis nervorum cervicis² rami³ so-
boles est, qui in⁴ musculi brachium attollentis sedem à scapulæ spina pronatam digeritur,
Atque hæc soboles tantum in externæ brachij regionis cutem paulo sub medio longitudinis
brachij diffunditur, inibi⁵ cessat. Quippe inferiorem huius regionis cutem⁶ alia exilis pro-
pago implicat, quæ prædictæ nuper sobolis modo ex alto emergens ab eo editur nervo, qui
nervorum brachij⁷ quartus erit. Atque hæc propago non solum dictæ iam cuti furculos of-
fert, sed & illi cuti soboles deriuat, quæ sedem externam posteriorem⁸ cubiti ad humerum
articuli amplexatur. Præsentēs nervi, ut & omnes quoque cutem accedentes, membrana sus-
fulciuntur, quam cum multis alijs dissectionum professoribus carnosam uocare libuit, atque
inter hanc & cutem prorumpunt in homine multo adipe etiam immerſi, membranam⁹ illam
cuti perſtinaciter committentes, ac pilorum modo interim graciles. Deinde non eandem per-
petuò in situ, numero & crassitie retinent seriem, sicut in maioribus uasis: neque parem nume-
rum, neque situm, neque magnitudinem accuratè obseruari, iam antea relatum est. Porro cæ-
teri quinque nervi per axillam brachium subeunt, atque in plures ramos quàm primus spargun-
tur, singuli maiores crassiores¹⁰ ue spectantur.¹¹ Secundus itaque brachium petens nervus, ab im-
plexu quem nervos brachium subituros ad uerberarum latera efformare dixi, principium du-
cit, atq; ita nemo hunc nervum alicui pari uerè ascribet, quod non uno, sed pluribus nervorum
paribus textus ille consituitur. Cæterum præſens nervus brachium sub¹² musculo cubitum fle-
cientium anteriori ingreditur. Vbi enim duo illius musculi capita inuicè sunt coitura, nervus
ille primùm in brachium fertur, quo etiam loco¹³ musculus brachium pectori adducens inser-
tionem secundùm humeri longitudinè molitur, ut etiam¹⁴ musculus brachium attollens trans-
uersim inibi humero implantatur, præter insertionem quam hac propemodum regione¹⁵ mus-
culus tentat, qui ab humiliori scapulæ costa pronatus brachiū in posteriora allicit, ac demum
eius quoque¹⁶ musculi, cuius beneficio deorsum uersus dorsi humiliora brachium agitur, inser-
tio secantibus inibi occurrit. Secundus igitur brachium petens nervus, priori cubitum fleſcen-
tium subditur musculo, & sub¹⁷ interiori eius capite quod à scapulæ processu anchoræ speciem
referente originem ducit, occultatus, utriusque eius musculi capitibus¹⁸ furculum offert, ac decli-
uis prorèpsens sub posteriori nuper commemorati musculi sede reconditur. Quas uerò propa-
gines dein diffundat, ubi & tertium nervum huc sermone deduxero, subiiciam. Tertius ner-
uus secundo humilior, ex illo quoque prodit complexu retiue, quod iam prius à nervorum ra-
dicibus brachium aduentibus confici diximus. Nervus iste quum alam percipiat,¹⁹ ramum
promit²⁰ inter musculum brachium pectori adducentem, & illum quo brachium attollitur,
cuti exporrectum, quæ illorum musculorum obducitur lateribus, quæ illi se mutuò contin-
gunt. Simulatq; uerò tertius nervus humero appropinquit, mox etiam cubitum fleſcentium
anteriori musculo cooperitur, atque simul cum secundo nervo deorsum properans²¹ ramu-
lum capiti præbet²² musculi cubitum fleſcentium posterioris, quod etiam interdum & à se-
cundo nervo propagine quadam donatur. Cæterum Galenus asserit, à tertio præpositi no-
bis numeri nervo, postquam is ramulum hunc in caput musculi cubitum fleſcentium poste-
rioris diduxit,²³ tantam propaginem diffundi, illamq; secundo nervo cōmisceri, quanta secun-
di nerui portio est, hæc sub anteriori cubitum fleſcentium musculo prorèpsens. Deinde sub-
dit, se semel obseruisse, à tertio nervo ad secundum nullam communicari propaginem. Nos
sanè aliquoties utrunque animaduertimus, sed multo sæpius & perpetuò quasi in homine,
à secundo nervo²⁴ propaginem notatu dignæ crassitudinis ad tertium nervum depromptam
spectauimus, qua tertius nervus crassior ualidiorq; reddebatur. Vt cunq; uerò sit, siue ter-
tius secundo propaginem impartiat, siue à secundo (quod uerius duco) ad tertium propa-
go pertineat, siue etiam nullus secundi cum tertio congressus fiat,²⁵ secundus nervus perpe-
tuò deorsum ad anteriorem articuli cubiti sedem contendit, musculo cubitum fleſcentium an-
teriori tectus, & in progressu ab externo ipsius latere²⁶ ramulum spargens in caput²⁷ musculi ab
humeri osse principium ducentis, & radio ad brachialis radicem inserti, radiumq; in pronom
mouentis. Quum primùm uerò secundus nervus ad anteriorem usque cubiti articuli sedem
cubitiue flexum pertingit, secundum externum latus²⁸ tendinis musculi cubitum fleſcentium
anterioris ad carneam²⁹ ducitur membranam, in cutem dissipandus, mox enim atque ab alto
emerſit, in duos crassitie impares secatur ramos, quorum³⁰ unus qui gracilior ac superior est,
aliquousque cum humeralis uenæ³¹ ramo secundum radium ad mediam usque cubiti longitu-
dinem exporrecto, ac dein uersus ulnæ appendicem tendenti deducitur, uniuerſam cutem radio
incumbentem prætenuibus furculis intertexens, quorum³² præcipuus inferiorem radij appen-
dicem superans, ad secundum usque pollicis pertingit internodium hîc, uti & toto progressu,
inter

Primus ner-
uus.

Nervos cu-
tem subeunt:
non eandem
per propo-
nes
reſeriem.

Secundi ner-
ui ingressus.

Tertius ner-
vus.

Secundi cum
tertio cōgres-
sus.

Li. 3. de Ado-
mi disſect.

Reliquæ ſec-
di ſeries.

inter carneam membranam & cutem repens, sobolesq; tenuissimas diffundens. Huic furculo pollicis exporrecto interdum ramuli accedunt, permiscunturq; ab ijs secundi nervi propagines, quas modò internæ summæ manus cutem adire scribam. ^k Humilior enim crassiorq; ramus eius secundi nervi diuisionis, quæ iuxta cubiti flexum perficitur, statim in duas quoque dirimitur propagines, sub ^l media prorepentes uena ab humerali ad communis uenæ constitutio nem proficiscente. ^m Vna harum propaginum quam elatiorem appellare nihil prohibet, postquam dictæ iam uenæ succumbens, ad ⁿ uenæ communis usque originem obliquo ductu accessit, relicta uena cuti subtenitur, & in descensu elatius ad radij sedem nonnihil oblique con scendens, secundum internum latus ^o musculi oblongi & radio proprij ad brachialis usque ra dicem perfertur. ^p Altera propago, quam memoriæ doctrinæq; gratia in scholis humiliorem nuncupo, magis oblique quam medium cubiti flexus aut uenæ communis origo consistat, de orsum fertur, ac tandem uenæ maioris cubiti sedis cuti potissimum oblate attensa, ad brachiale usque ^q prorepat, in multos exiles furculos in progressu absumpta. Nam priusquam longo du ctu in cubiti regionem feratur, in duos præcipuos partitur ramos, quorum ^r unus quodammo do radij regioni exporrigitur, ^s alter uerò ulnæ, ac uterque crebrò brachiale superat, ramulos in cutem internæ summæ manus sedi dispargens. Dein ab illis ramulis qui Veneris monticulum conscendunt, interdum soboles in externam manus sedem excurrunt, nervulis ^t commiscendæ cutem primi pollicis internodij externæ regioni obductam implicantibus, atque in hunc mo dum secundus absumitur nervus. Tertius autem nervus simulatque secundi nervi ^u propagi ne adaugetur, frequenter ^x ramulum in cutem dispensat, anteriori cubiti sedi hic obnam. Hinc uti ab initio in alto repositus, cubiti flexum accedit, æquali propemodū intervallo in pro gressu à secundo distans, ac interiorem sedem sibi uendicans. Tertius enim nervus nō adamul sum per mediam cubiti flexus sedem in cubitum delabitur: uerum anteriori sedi insidet ^y tuber culi interioris humeri, ac super internum latus quodammodo uehitur infertionis ^z musculi cu bitum flectentium posterioris. Quum uerò hanc transcendit infertionem, in multas ^a dirimi tur propagines, seriatim tunc recensendas, ubi ^b quintum nervum ad cubitum usque sermone serie deduxero, qui unā cum tertio in musculos digeritur, sedem cubiti interiorem occupantes. ^c Quartus nervus à reticulari illo nervorum iuxta uertebrarum latera implexu principium quo que ducens, omnium nervorum qui in brachiū porriguntur longè crassissimus est, & similiter atq; tertius occultatus cum ipso in brachium properat, ^d axillari uenæ & magnæ manus arteriæ attensus, moxq; ^e insignes utcunque soboles ^f musculis distribuens, quorum ministerio cubi tum extendimus. Priusquam uerò præfens nervus ad medium usque longitudinis brachij per tingat, oblique retrorsum ^g ad humeri os contorquetur, hoc & musculos cubitum extendentes intercedens. Verum anteaq; penitus reflectatur, ab interno ipsius latere ^h propaginem emittit, quæ ⁱ inter musculos cubitum extendentes & posteriorem cubitum flectentium in internam brachij sedem procidit, uniuerſa in huius sedis cutem absumenda, furculosq; partim sursum partim deorsum multiplici serie sparsura. Porro ipse quarti nervi truncus, ad eum modum se cundum humeri posteriora reflexus, sensim ad externā brachij sedem properat, ac ab externo latere ^k propaginem edit, quæ ^l inter exteriorem cubitum extendentium musculum & caput oblongi musculi radium in pronum dūcentis ex alto emergens, in cutem dispensatur externæ brachij & cubiti articuli sedi obductam. Quum primum autem quartus nervus in alto semper latitans, ^m exterius humeri contingit tuberculum, posteriori ipsius sedi innititur, in qua huius nervi nomine ⁿ sinum à Natura priuatim exculptum diximus, quò nervus musculis occulta tus, atque hic in frequentem sobolem spargendus, turò ueheretur. Mox enim atque nervus ille in cubitum ducitur, ^o ramum promit, qui ex alto emergens, errabundo ductu sub cute ad bra chiale usque prorepat, frequentes furculos in progressu educens, à quibus cutis externam cu biti sedem obtegens intertextitur. Deinde quartus nervus in duos ^p discinditur truncos, in profundo, ut & ipsorum radix, reconditos. Horum ^q alter altero elatior est, ac radio exporrigi tur: ^r alter autem qui humilior consistit, secundum ulnam deorsum fertur. Elatior penitiùs in ter superius latus musculi bifido tendine brachiale extendentis, & exterius inferius ue latus mu sculi longi radium in pronum ducentis ad brachiale contendit, in progressu graciles ramulos utrisq; quibus attenditur occultaturq; musculis cōmunicans. Vbi uerò elatior hic ramus bra chiale accedit, per ^s transuersum properat ligamentum, in externa radij sede bifido tendine bra chiale extendenti obductum. Caterum mox atque præfens quarti nervi ramus externam bra chialis sedem ^t cōtingit, in duas dirimitur propagines, quarum altera duplici furculo externæ pollicis regioni offertur, altera uerò in duas secta soboles, unam indici porrigit in ipsius exter nam sedem duplici quoque furculo absumendam, alteram autem medio largitur digito, eam simpli

*Tertij nervi
ad cubit usque
flexum i
gressus.*

*Quarti ner
ui brachium
ingressus, ip
siusq; series.*

h. a. f. o. u. l. b.
1 fig. ca. 6. u. l. b.
3 h.
m. 2 fig. d. i.
n. f. i. ca. 6. u. l. b.
3 n.
o. i. m. u. l. b. a. b.
d.
p. 2 fig. m.
q. Quasi se
cundum me
q. u. l. f. i. l. a. 3
r. 2 p. n.
s. 2 fig. 3.
t. Quædam
du uene ad
cha. q. fig.
ca. 6. u. l. 3.
u. l. f. i. l. a. 3.
x. 2 fig. u.
y. 1 f. i. ca. 2.
lib. 1. S.
z. 8 m. u. l. b. a. b.
bul. n.
a. 2 fig. cha.
4. 3. u. l. f. i. o.
b. u. l. i. f. i. g.
a. d. n.
c. 2. 3 fig. 9.
u. l. f. i. e.
d. u. l. f. i. l. b. a.
z. u. l. f. i. b. a.
c. 3 fig. x.
f. u. m. u. l. b. a.
o. a. c. 7 f. i.
g. a. d. x. f. i.
g. a. 23 lib. a.
b. 3 f. i. a. u. l. b.
ti. fig. f.
i. l. i. n. t. e. r. p. e.
N. 7 m. u. l. b. a. b.
tab.
1. 3 fig. cha.
3. 2. u. l. f. i. g.
i. l. i. n. t. e. r. p. e.
x. 9 m. u. l. b. a.
m. 2 f. i. ca. 2.
lib. 1. P.
n. e. i. d. f. i. v.
o. 3 fig. cha.
3. 1. u. l. f. i. b.
p. 2 fig. cha.
3. 2. u. l. f. i. b.
q. 3 fig. cha.
3. 3. u. l. f. i. b.
h.
r. 3 fig. cha.
3. 7. u. l. f. i. g.
b. l.
s. i. n. t. e. r. p. e.
x. 9 ta. m. u. l. b. a.
f. u. l.
t. 2. 2 m. u. l. b. a.
ta. cha. 3.

u. 3 fig. cha.
36.

simplicem indiuisamq; interno lateri exterioris sedis eius digiti applicans. * Demissior ramus
 quarti nerui iam cubitum ingredientis in duos ramos⁷ sectionis, qui ulnæ exporrigitur ilico
 frequenter educit soboles, ac primam donat capiti⁸ musculi indicem, medium & anularem
 extendentis, secundam capiti⁹ musculi cuius auxilio minimus extēditur digitus, tertiam autem
 offert¹⁰ musculo brachiale simplicitendine extendēti. In ipso autem secundum ulnam processu
 præfens ramus¹¹ tribus musculorum principijs ab ulna originē ducentibus¹² propagines exhi
 bet, ac eorum quidem principiorum primus musculus est, qui radium in pronum ducentium
 breuior uisitur: mox ille qui triplicem diffundit tendinem, ac unum brachialis ossi primum pol
 lici os sustinenti innectit, secundum primo pollicis ossi, tertium secundo pollicis ossi & ter
 tio. Dein musculus, qui tribus pollicis ossibus insertus, pollicem extendendo uersus indicem
 ducit. Mox musculus, cuius beneficio index, ac interdum quoque medius à pollice extrorsum
 obliquè aguntur. Horum nanque musculorum principijs seriatim ab ulna pronascentibus, à
 præfenti quarti nerui ramo soboles offeruntur, accuratè hibrarum eorum musculorum ductum
 obseruantes, qui obliquè ab ulna uersus radium pertinet. Quod uerò huius rami¹³ reliquū est,
 ad brachialis radicem cessat, aliquot furculis brachialis cum cubito articulū implicans, ad hunc
 sanè modum quartus neruus in ramos spargitur. Porro¹⁴ quintus neruus à cōmemorato iam
 sæpius nobis plexu inferius quàm quatuor hæcenus descripti, principiū nanciscitur, ac quarto
 attensus per axillam in brachium fertur, nullas omnino soboles cuiquam brachij parti distri
 buens. Nam indiuisus inter musculos cubitum extendentiū interiorem, & cubitum flectentiū
 posteriorem secundum internā brachij sedem occultatus tantisper porrigitur, dum¹⁵ internum
 humeri contingat tuberculum, ad cuius posteriorem reflectitur sedem, hic priuatim exigens
 sinum, quo aptè in cubitū uehitur. Quemadmodum enim tertius neruus anteriorem humeri
 tuberculi sedē occupare dictus est, ita sanè & quintus hīc neruus in posteriori sede eius tubercu
 li consistit, pariq; quodammodo serie cum tertio digeritur. A duobus nanq; præsentibus ner
 uis¹⁶ propagines omnibus offeruntur musculis internam cubiti sedem occupantibus, qui & ab
 interiori tuberculo humeri, & ab ipsa ulna radioq; principium mutantur. Ac à tertio quidem
 neruo potissimum soboles sparguntur in¹⁷ musculum secundos quatuor digitorum articulos
 flectentem, & illum qui tertios eorundem digitorum flectit articulos, mox¹⁸ illum qui tertij
 pollicis ossis flexus est autor, deinde propago quoque à tertio neruo¹⁹ illi porrigitur musculo,
 qui ab interno humeri prodicens tuberculo, ac postbrachialis ossi in dicē sustinenti insertus, bra
 chialis flexus opifex habetur. Verum is musculus etiā à quinto neruo furculum subinde ascen
 dit, ut & omnes ab interno humeri tuberculo pronati, ex quorum classe præter nuper comme
 moratum²⁰ is censetur, qui tēdine lato summæ manus internæ cuti subnascitur, dein²¹ qui quar
 to brachialis ossi insertus brachiale flectit, mox²² qui radium in supinum ducentium superior
 describitur. Porro quintus & tertius nerui etiam si sparsam hanc propaginum deriuent seriem,
 penitus hic non absumuntur, uerū utrorumque singuli adhuc supersunt rami, insignes sanè,
 & in plures furculos diffundendi. Ac tertij quidem nerui²³ ramus inter musculum quatuor di
 gitorum secundos flectentem articulos, & illum qui tertium pollicis os flectit, radio exporrigi
 tur, unā cum²⁴ uena ac arteria hæc deductis ad brachiale properans, &²⁵ transuersum permeans
 ligamentum in brachialis interna sede tendinibus obductum. Iste tertij nerui ramus furculos,
 sed nimis quàm obscuros, quibusdā musculis exhibere dicitur: qui in extrema manu repositi,
 digitorum motibus quoque præfunt, cuiusmodi²⁶ is est quo pollex ab indice maximè abduci
 tur, dein²⁷ quo pollex indici proximè adigitur, &²⁸ duo pollicis primū flectentes internodiū, &
 tres secundi ipsius internodij flexus opifices, mox²⁹ qui in dicem ac medium pollicis adducunt,
 ac³⁰ duo qui indicis primum flectunt articulum, ac interior denique primum medij digiti os
 flectentium. Verū his musculis, ut &³¹ illi qui radium in supinum ducentium inferior est, ner
 uipotius attenduntur, quàm inferantur, aut etiam superficietenus adnascantur. Ipse tamen
 tertij nerui ramus in uola tres notatu dignas & insignes quoque emittit propagines, quarum
 prima pollicis internam accedit sedem, in duos prius dissecta furculos: secunda etiā binis fur
 culis internæ indicis sedi implicatur, tertia uerò simplex interno tantum lateri interioris medij
 digiti sedis exporrigitur. Porro quinti nerui³² ramus ulnæ attensus inter musculum secundos
 quatuor digitorum articulos flectentem, & illum qui eorundem digitorum tertios articulos
 flectit, ad brachiale ducitur, uena etiam & arteria cōcomitatus, quæ ulnæ exporriguntur, atq;
 ad uolam per transuersum brachialis ligamentū tendunt. Hic ramus simulatque ligamentum
 id superauit, unam propaginē in duos diuisam furculos minimi digiti internæ sedi cōmunicat,
 ac unam similiter in duos furculos diremptam internæ sedi anularis digiti offert, mox unam

Quintus nerui
 in brachium in
 gressus, ipsius
 que series cum
 tertio.

quoque medio digito communicat, quæ indiuisa externo applâatur lateri, internæ medij digiti sedis. Nisi forte uti non infrequenter accidit, à tertio neruo duæ soboles indici offerantur. Præter has quinti nerui propagines nullas in extremæ manus musculos spargi animaduerto, in^h illos dico qui anularem & minimum ad pollicem ducunt, qui primum os minimi & anularis flectunt, cum externo musculo primum medij digiti os flectentium, & illo qui minimum à cæteris digitis in latum remouet. Nam, uti prius monui, his musculis nerui potius attenduntur, quàm adnascuntur. Porro quinti nerui præfens ramus ad hunc modum nõ totus absumitur, uerum nõ perfunctoriè expendendam promit^h propaginem, paulo inferiùs quàm mediũ ulnæ longitudinis consistit. quum enim ramus hic ulnæ medium emensus est, ab externo ipsius lateris propaginem illam deducit^h inter musculum brachiale flectentium inferiorem, & inferiorem brachiale extendentium. Propago hinc ex profundo elabens secundum ulnam in externam sedem cubiti porrigitur, & quum externam brachialis sedem contingit, in externam regionem illorum digitorũ ramulos spargit, in quam^m quartus neruus nullas soboles promptit. Diuiditur itaq; ea quinti nerui propago in tres ramos, quorum primus duplici furculo externam minimi digiti sedem adit, secundus duplici quoque furculo externæ anularis sedi exporrigitur, tertius autem indiuisus externo implicatur lateri exterioris medij digiti regionis. Quoniam uerò quintus neruus, hanc externæ manus sedi exporrectam diffundit propaginem, subinde uidimus quintum neruum tot atque dixi furculos in internam manus sedem non digerere. Haud semel enim obseruauit, à tertio neruo etiam externũ latum interioris sedis medij digiti, & internum latum anularis furculos assumere, quinto tunc duas tantũ propagines internæ minimi digiti sedi & unam anularis interiori sedi porrigente. Atque dictam sanè neruorum in extremam manum seriem non iniucundè in te ipso obseruabis, modò ad amussim neruos pollice alterius manus, aut cubiti innixu, ad os ita compresseris, ut animalis spiritus transitũ compressione cohibeas, ac pars cui nerui inferuntur stupefeat. Fit uerò id iuxta cubiti articulum nõ multis interiectum uelutibus, aut (ut in obesis mulieribus) multa adipe inuestitum cõmodissimè. nam si pollice quartum neruum aliquandiu compresseris, senties externam pollicis & indicis sedem & internum quoque latum exterioris sedis medij stupefcere. Quod autem quartum neruum compressurus ui pollicem inter posteriorem ulnæ processum externum humeri tuberculum impingere oporteat, neminẽ latet, qui modò surda aure quarti nerui seriem non obaudiuerit. Si uerò pollicem ad superiorem interioris tuberculi humeri sedem quintum neruum compressurus, ui ad moueris, mox interna externaq; sedes minimi digiti & anularis & inferior medij stuporem experientur. At si maiori conatu anteriorem interioris humeri tuberculi sedem compresseris, atque ita tertium neruum obstruxeris, ilico interna sedes pollicis & indicis & pars medij stupore laborabunt. Quum uerò hæc exploras, perpende pariter, quàm leue sit nonnunquam motum integro adhuc sensu perire, & sensum quoq; motu adhuc integro aboleri. Nam ut cæteros taceam neruos (& ne à reconditis magis exempla petam) da uulnere aut alio affectu quartum neruum, quã is secundum humeri posteriora reflectitur, aut etiam quã à reticulari plexu ad uertebra- rum latera consistenti exorditur, præscindi, aut aliàs ex humoris affluxu eiusq; generis malo quopiam ita uiciari, ut animalis spiritus cum ipso non deducatur, & quintus neruus interim illæsus (uti factu est facillimum) ac integer sit, non ne minimi digiti & anularis extensio perdetur: illorum sensu integro: Nam quintus neruus sensum suppedians illæsus est, at propter quarti uicium musculorum digitos extendentium munus intercidit. Quid si casu quintus neruus, integro interim quarto, cõtusus, aut alio qui oblæsus fuerit: non ne paruus digitus & anularis stupefcet, ipsorum interim motu haud corruptor: Atque ut hæc de quarto neruo & quinto exempli gratia proposui, ita sanè illi quem neruorum series & musculorum natura non fugiunt, expendere confingereq; promptissimum est, qui sensus illæso motu aliquando aboleatur: aliquando autem seruato sensu, motus corrumpatur. Neque necessum est eò deflekti, quod maior uis animalis ad motũ, quàm ad sensum requiratur: & multo magis irridenda est Anatomi- corum principis ratio, qua is confingit quosdam neruorum furculos motui tantum, alios autem sensui præesse. quasi uerò quis neruorum furculus sensu tactus destitueretur. Cæterum quum hæc aliò spectent, sexti nerui (qui adhuc enarrandus superest) seriem quoque perstrin- gemus. Istius principium ab infima retis iam sæpius dicti sede enascitur, & in coniugatus per axillam in brachium properat, nullibi in alto reconditus, sed cuti internæ brachij sedis substratus, ad internum humeri accedit tuberculum, in progressu terminis eius quam perrepat cutis partibus^o frequentem depromens sobolem. Ad interius uerò humeri tuberculum, in plures partitur ramos uenæ axillaris^p propaginibus partim incumbentes, partim quoque substratos. Hi deorsum numerosa propaginum serie secundum ulnam digeruntur, inter cutem & car-

Qui citra se-
cl onem neruo-
rum in manus
series experiri
possit.

Sensum ser-
uato motu pe-
riri, & cõtra.

Lib. 1. de Affe-
ctorum locorũ
cognitione.
Sexti nerui
in brachio in-
gressus ac se-
ries.

h Ex nuper
scriptis pe-
tuntur tabu-
lis.
i 3 tab. r.
h 3 fig. clid.
46. ult. fig.
p.
l 9 mus. ta.
inter 2 & 3
A.

m 3 fig. o e
ducebat
cha. 36.

n 2, 3 fig. n.
ti. fig. q.

o fig. 2 ch
48, 49.
p. fi. ca. 6
34, x.

Confer in
ter se ner-
uos in 2, 3
figuras, sed
magis in ul-
tima.

& carneam membranam deducti, & priusquam brachiale contingāt cessantes, perpetuoq; se-
cundum inferiorem cubiti regionem seu ulnam exporrecti.^a Præiens nervus crassitie secun-
do respondet, ubi is cubitum accedit. Quintus autem nervus tertio congruit, uti etiam secun-
dus, qui priusquam sui portionem tertio offert, crassus uisitur. Atque hi sexto fere quintuplo
crassiores sunt: omnium autem plenissimus est, quem quatuor enumeravi: quemadmodum
summè etiam gracilis occurrit, qui primus recensabatur;

Nervorum
crassities.

QUINQVE PARIVM NERVORVM

è lumborum uertebreis præduntium series.

Caput XV.

12 fi et ult.
fig. cha. 20.
1, 22, 23,
24.
3 fig. cha.
52, 52.
12 tabula
mus. a.
13 ta. r.
14 ta. T.



10 tab. o.
2 fig. cha.
10, 50. dein
51.
8 mus. ta.
52.
2 fig. cha.
49, 49.
2 fig. cap.
2 h.
h ad latus
10, 20, 21.
22 fig. 2.

DORSALIS medulla lumborum uertebreis complexæ^a nervi, in hoc
thoracis uertebrearum nervis magna ex parte conueniunt, quod à singu-
lis^b rami retrorsum ducantur in musculos uertebreis adnatos sparsi. Coni-
mittitur autem hic uertebreis^c musculus humani thoracis motorum quar-
tus, dein dorsum mouentium^d undecimus, ac demum^e qui huic subter-
nitur decimustertius. Atque his musculis propagines à posterioribus ra-
mis offeruntur, quum illi adhuc reconditi ad uertebrearum spinas ducun-
tur. Quando autem rami ex mutuo utriusque lateris musculorum connexu, atque ab ipsis spi-
narum apicibus procidunt, ad latera denuò excurrunt, cuti & musculo præcipue intexti, cuius
ope brachium uersus dorsum humiliora agimus.^f Anteriores autem horum parium rami in ab-
dominis musculos, ac illum qui brachium uersus dorsum humiliora detrahit, ipsamq; adeo cu-
tem disseminantur, ut & in^g musculum dorsum motus autorum nonum, & eum qui femur mo-
uentium sextus mihi numeratur. Dein à uigesimo primo pari, seu secundo lumborum, unà
cum feminaria sui lateris arteria perquam^h exiguus furculus ad testem ducitur, si modò à sexti
paris nervorum cerebriⁱ ramis costarum radicibus exporrectis, atque in intestina propagatis
nullæ soboles ad testes pertingant. nam & ab illis ramis interdum furculos testibus exporrigi
animaduertimus. Quinetiam ab anterioribus ramis trium primorum parium ex lumborum
uertebreis profluentium^k furculi etiam diffunduntur, qui nuper dictos sexti paris ramos costa-
rum radicibus exporrectis accedunt, illosq; adaugent. A tribus uerò humilioribus è lumbo-
rum uertebreis elabentium paribus, non minimi crus accedunt: qua autem serie in illo digeran-
tur, secundo ab hoc Capite exequar.

NERVORVM È SACRÒ OSSE PRO-

fluentium series. Caput XVI.

Speñatur
ec fig. ca.
18 ubi.



2 fi et ult.
cha. 25.

3 fig. cha.
54.
9 muscul.
tab. 17.

2 fig. cha.
55.
8 tabu. a.
Confer se-
cundum figu-
ram tertie.

QUAM concinnè Galeni ossis sacri descriptiones inuicem, ac demum^a ho-
minis ossi congruant, primo explicuimus libro, ad dentes quoque inter sex
hominis sacri ossis ossa anteriori & posteriori sede bina exculpi foramina;
adeò sanè ut hominis nervorum series à canum & caudatarum simiarum
serie plurimū discrepet. Ac^b primum quidem par tam in hominibus quàm
quadrupedibus inter os sacri ossis primum, & infimam lumborum uerte-
bram ea prorsus ratione qua nervorū paria è lumborū uertebreis egredien-
tia procidit, ac mox ab egressu ramum in posteriora non secus atque superiora paria diffundit,
qui etiam similiter atq; posteriores illorum parium rami, digeritur. Priuatim uerò à posteriori
regione primi paris sacri ossis^c propago utcunq; insignis in musculos spargitur, ab ilium osse
principium ducentes, potissimum autem in^d primum femur mouentium. Dein eius propagi-
nis soboles non penitendæ in cutem clunibus obductam deriuantur. Anterioris uerò prælen-
tis paris portio, nervis in crus deducendis permiscetur. Non enim tota in crus absimitur, quū
ab illa^e ramus secundum internam ilium ossis sedem exporrigatur, furculos offerens ab domi-
nis musculis & illi pariter^f musculo, quem ab interna ilium ossis sede pronatum femur mouen-
tium septimum recensui.^g Cæterum quinq; humiliora paria peculiari procidunt ratione. nam
priusquam ex ipso osse elabantur, gemina ab utroque latere sunt, & unus nervus utrobique à
singulis paribus in anteriora procidit, & unus item utrobique retrorsum: atque hæc series in ho-
minibus uisitur. In simijs uerò & canibus secus quàm in cuniculis, uti tria tantum in illis sacri
ossis nervorum sunt paria, sic etiam duo solùm inferiora antè postèriusq; excidunt. Dein
reliqua paria (quæ in canibus & caudatis simijs cernuntur numerosa) ab ossis coccygis lateri-

p z bus

bus in eum modum prodeunt, quo ex thoracis & lumborum uertebis nervi egrediuntur, quum interim ab hominis osse coccyge, ne unus quidem exiliat nervus. Adeo sanè ut minimè mirandum sit, si ego à Galeni sententia in libro de Ossibus, & in horum nervorum paribus recensendis procul declinem, quum is suis sectionibus fidens simiarum potius quàm hominum nervos prosequatur: secus ferè atque in libris de Vsu partium, quos ex aliorum sententia multis locis illum cōscripsisse nulli non constat, qui sedulo ipsius loca, ac demum simiar sectionem hominis sectioni confert. Quinque igitur sacri ossis inferiora paria nervos in posteriora excidentes ad musculos potissimum digerunt, qui ilium ossis & sacri ossis posteriorè occupant sedem, ex quorum classe in dextro latere est musculus dorsum mouentium^h undecimus, ac deinⁱ decimus tertius, præter membraneum initium^k musculi brachium ad dorsum humiliora agentis, & quartum humani thoracis motorum. Item^l quatuor primi femur mouentium, ac cutis denique clunibus obducta, quæ ipsa quoque propaginibus aliquot ab illis nervis donatur. Anteriores uerò nervi uariè magis digeruntur, siquidem tres superiores, primi parisi modo in crus (uti subsequenti narrabo Capite) properant. Duo autem humiliores nervi, qui sexti septimiq; parium propagines sunt, in ani musculos digeruntur. ad hæc, in utriusque ceruicem frequenti sobole, uti etiam in uirorum uescicæ ceruicem penem uel, pertinent. Nam uescicæ ac utriusque item fundus plerumque^m nervulos ab illis mutuatur ramis, qui à sexto pari nervorum cerebri costarum radicibus sub tunica costas succingente exporriguntur. Terminus uerò dorsalis medullæ ex sexto sacri ossis osse procidens, nervi ritu mihi haudquaquæ digeri uisus est, etiam si à quibusdam hunc nervum coniuge carentem uocari nō ignorem. In homine tamen, cuius sacrum os quinque tantum efformari uidebatur ossibus, medullæ dorsalis terminus ab osse procidens unum utrinque diffundebat surculum, hac ratione sexti parisi sacri ossis uices supplens.

NERVORVM FEMVR, TIBIAM ET
pedem aduentium distributionis ratio. Caput XVII.

Quatuor nervi
nos crur per
series.



R V R I iuxta femoris initium à dorsum medullæ lumborum uertebis & osse sacro complexæ nervorum paribus, quatuor nervi offeruntur, à reticulari quodammodo plexu perinde procidentes, atq; præcipuos brachium petentes nervos pronasci iam antea relatum est: quamquam magis uariis in ceruice, quàm hîc ad lumbos sacrumq; os implexus uisitur. His nervis non eadem obtrigit crassities, multoq; minus par series & ductus, qui enim primus ac tertius recensentur, graciles sunt. Secundus autem duo-

Primi nervi
series.

bus illis crassior lubinde reperitur, licet interea tenuis quoque sit. quartus uerò illorum trium unâ complexorum crassitiem uincit. Primus à suprema parte implexus nervorum in crus per tinentium originem ducit, ubi scilicet tertij lumborum paris (quod ordine uigessimū secundum est) anterior ramus uigesimo tertio pari commiscetur. Nervus hic lumborum incumbens^c carinibus, ac peritonæo substratus, in femur procidet secūdum exterius latus tendinis^d sexti femur mouentium musculi, qui unâ cum septimo femoris motuum autore musculo hæc supra coxendicis os ad^e minorè femoris processum contendit. Simulatq; uerò nervus ille femur contingit, ramum depromit cuti paulo minus quàm ad genu usque exporrectū, quæ anteriori femoris sedi uersus externū ipsius latus obducitur. Porro^f maior præsentis nervi portio in alto latitās, aliquot propagines deriuat^g primo tibiā mouenti musculo, qui ab antica sede appendicis ilium ossis principiū ducit, dein & septimo tibiā mouenti musculo, qui à maioris femoris processu radice nascitur, mox quoq; in^h manū tibiæ motuū autorē, atq; cum illis duobus musculis primi huius nervi grādiōr portio declinūs ducta, elatiūs quàm genu cōsistat articulo terminatur.

Secundi nervi
series.

Secundus nervus suum principiū inferiūs quàm primus adipiscitur, è regione uidelicet uigessimū secundū parisi nervorū dorsalis medullæ, seu è regione articulationis tertie lumborum uertebrae cum quarta. Hic nervus peritonæi etiā posteriori regioni subtransfus, simul cumⁱ uena & arteria per inguina femur petentibus in crus porrigitur, ac mox ab interno ipsius latere^j ramum deriuat, uenæ ad pedes usq; pollicem^k attensum, quam ab inguine per internā femoris sedem, ac per genu articulū internamq; tibiæ regionem sub cute ad summū usq; pedem protendi commemorauimus. Atq; ut illa uena uarias soboles in progressu ad cutem illi cōterminā diffundit, ita sanè & hic secundi crus petentis nervi ramus anteriori uenæ illius sedi toto ductu cōtiguus, soboles passim in cutem spargit: inter quas^l illa est præcipua, quam anteriori genu regioni offert, in eius sedis cutem frequenti ramorum serie disseminatam. Neque sanè oscitanter obaudiendum est, præsentem ramum anteriori uenæ parti exporrigi, ut in eius uenæ sectione, quam mox sub genu aut iuxta anteriorem malleolum molimur, scalpellum retrorsum atq; in postero


ra impingamus, ne is casu antrosum actus nervum praefectet. Cæterum^q grandior secundi ner-
ui portio simul cum uena ac arteria reconditur, & in musculos anteriorem femoris sedem occu-
pantes quoq; digeritur, præcipue autem in^t quintum femur mouentium, & in^t octauū tibiam
mouentium, cum quo etiam secundum internum latus^t noni tibiam mouentium musculi deor-
sum fertur supra genu articuli, non minus quam primus nervus cessans, & in progressu mem-
branulis uasa colligantibus exiguas porrigens soboles.^q Tertius nervus secundo succedit, illic
enatus, ubi quarta lumborum uerebra quinte articulatur, hic peritonæo quoq; succumbens,
& musculo femur mouentium septimo uectus, ad pubis ossis^t foramen contendit, hæc in femur
prorepens. Verum priusquam foramen id superat,^q nono & decimo femur mouentibus mu-
sculis ramulos porrigit: mox uerò & illis musculis, qui à pubis offe pronati penis peculiare
censentur. At ubi paulo demissius prorepit, duorum neruorū, quos iam descripsimus, ritu,^q ra-
mum emittit cuti oblatum, quæ in internam femoris sedem iuxta inguina occupat. Dein eius ner-
ui^t reliquum ramum offert^q secundo tibiam mouenti musculo, ac dein^t quinti femur mouentis
musculi portioni à pubis offe pronatæ ramum deriuat, supraq; medium longitudinis femoris
terminatur.^q Quartus cruris nervus tertio quidem ortu subsequitur, at sextuplo etiam crassior
est, atq; ex uiginti quinque ac trium succedentium parium anterioribus ramis potissimum con-
stituitur: non solum omnium neruorum crassissimus; uerum etiam quum hinc à dorsalis
medullæ termino principium obtineat, durissimus, pariterq; ualidissimus. Hic nervus perito-
næo quoq; subditus inter sacri ossis latus & ilium os, quæ hæc ossa inuicem dehiscunt, tanquā
per^t sinum ipsi peculiari paratum ducitur, & mox^q ramum ex posteriori ipsius sede deriuat,
qui aliquoties sub^t primo femoris motorum latitans, tandem ad cutem procidit, soboles distri-
buturus cuti inferiori clunium sedi obtensæ, & illi pariter cuti quæ posteriorem femoris sedem
ultra medium longitudinis femoris integit. Cutis enim supra genu in posteriori femoris sede
reposita, ab^t alia quarti nerui propagine ramulos obtinere mox docebitur. Postquā uerò quar-
tus nervus hunc ad cutem deprompsit ramum,^q alias utrunq; grandes distribuit soboles in mu-
sculorum^t capita digerendas, quæ à coxendicis ossis appendice principium ducunt, quorum
tria tibie motibus famulantur, ac tertium, quartum & quintum tibiam mouentes constituunt
musculos. Quartum uerò caput femoris motibus peculiare censetur, quintumq; femur mouen-
tem efformat musculum. Quartus nervus hinc inter musculos posteriorem femoris sedem si-
bi uendicantes reconditus, deorsum fertur, ac paulo sub medio longitudinis femoris^t ramum
educit in quarti tibiam mouentis musculi^t partem à femoris offe, ac si peculiaris esset muscu-
lus, enatam. Ab hoc ramo propagines in cutem excurrunt humiliori sedi posterioris femo-
ris regionis iuxta genu obducit. Simulatque quartus nervus inferiorum femoris capitum
radicem spectat,^q utrinque unam edit propaginem, in^t capita musculorum disseminandam,
qui ab inferioribus femoris capitibus enati, tres primi pedis motores enumerantur. Quando
autem quartus nervus in^t sinu consistit, quem duo inferiora femoris capita mutuo dirempta ef-
ficiunt, in^t duos crassitie inæquales truncos partitur, à quibus uniuersæ propemodum tibie &
pedi item nerui offeruntur. Nullus enim in tibiam nervus procidit à quarto nō ductus, præ-
ter^t ramū secundi crus petentis nerui interiori femoris & tibie & pedis quoq; sedi exporrectū.
Neq; sanè quenquam mirari uelim, quòd quartum nervum non secus quam si unicus esset, nō
autem (ut Galenus docet) geminus, secundum totam femoris longitudinem sermone deduxe-
rim: quū uniuersus in homine unicā obtineat circumscriptionē, & si quis ipsius qua inuestitur
membra unguibus dirempta hunc uelut in duos neruos dirimere proposuerit (quod leui etiā
sit negotio, si manū ab ea^t sede, qua prope femoris inferiora capita bipartitō scinditur, sursum
ad mediam usq; femoris longitudinem duxeris) etiam licebit in quamplurimos neruos ipsū
hac ratione diuidere: quum is aliud nihil sit, quam plures nerui instar plurium rectorum funi-
culorum protensis, & membranis circumdati. Ac proinde ea ratione qua quis quartum nervum
geminum esse contendet, ego illum decem & octo neruis cōflari astruam, quum aliquando tot
ipsius portiuncule seu funiculi mihi illos studiose numerāti occurrerint. Quotcunq; uerò quar-
tus nervus constet partibus, in poplite, uti prius dicebam, in duos impares dirimitur truncos.
^q Exterior, qui & gracilior est, ad fibulæ cum tibie offe iuxta genu articulum prorepit, inibi mu-
sculis offerendus. Priusquā autem penitus inter musculos truncus ille reconditur, propaginem
diffundit externæ cuti tibie propriam, ac per exteriorē malleolum pedis externum latus adeun-
tem, atq; in progressu frequentes soboles spargentem. Ipse autem exterior truncus postquā nu-
per commemoratam^t edidit propaginem, inter^t septimum & octauum pedem mouentes mu-
sculos primum occultatur, etiam sexto pedem mouentium musculo attentus. Atq; inibi rursus
mox in progressu^t ramum educit, qui errabūdo ductus in cutem dispensatur, anteriori tibie re-

Tertij nerui
series.Quartij nerui
series.Qui quartus
nervus uelut
pluribus funi-
culis constare
uideatur.
Lib. de Ad-
mi. dissect.

gioni obtensam. Quod uerò exterioris huius trunci reliquum est, ad hunc modum inter musculos anteriorem tibiae sedem sibi uendicantes prorepens, illisq; musculis ramulos offerens, si *fig. muscul. tab. 7.* gamento incumbit, fibulam tibiae ossi secundum totam tibiae longitudinem colliganti, ac unà tandem cum tendinibus digitos extendentibus sub^o transuerso huius regionis ligamēto in pedis superiora ducitur, & penitiùs sub tendinibus latitans, digitorum superiori sedi ramos exporrigit. Antequam tamen transuersum id ligamentum subit, ramulum deriuat cuti intertex^{h 2 fig. cha. 85.} tum, qua ipsum ligamentum integitur. At præter eum ramulum^{i 2 fig. cha. 85.} magnam sui portionem sub medio longitudinis tibiae per membraneū transmittit ligamentum, fibulam tibiae ossi colligās, atq; hæc portio^{h 2 fig. cha. 85. ult. fi. 7.} interiori trunco quarti nerui permiscetur, quem pedis inferiora accedere mox dicam. Interior itaq; quarti nerui truncus, qui exteriori multo grandior est, inter capita primi ac secundi pedem mouentium musculorum in tibiam subiens, mox^{l 2 fig. cha. 85. ult. fi. 7.} ramum diffundit multipli ci sobole in cutem digestum, quæ posteriori tibiae sedi ad calcem usq; obducitur. Quanquam interim ramus ille non uniuersus in cutem absorbetur, uerū ipsius etiam portio^{q. quasi cū x.} inter quartum pedem mouentium musculum, & primum quoq; & secundum tantisper fertur, quousq; tres illi musculi uniantur, nam & hinc quoq; portio illa cutem adit. Ipse uerò interior truncus in posteriorem tibiae sedem penitiùs prorepens, fertur inter quartum pedem mouentiū musculum, & quintum pedem mouentium, duosq; qui à tibia procedentes digitorum flexui præfunt. Hæc itaq; deorsum tendens, exterioris trunci^{m Serialm. Specta post. riorē tibiae sedem u. 12, 13, 14, 15} propaginem assumit, huc per membraneum ligamentum transmissam. Quum uerò hoc interioris trunci reliquum ad tibiae usq; humiliora contēdit, unà cum huius sedis tendinibus per^{mus. tabularum. n 2 fig. cha. 85.} transuersum ligamentum inter calcem & anteriorem malleolum pedis inferiora petit, musculis inibi repositis distribuendū, ac singulorum digitorū inferiori sedi duos furculos oblatum. Quot autem hic reponantur^{o 2 mus. tabularum. p Specta pedes 14, 15} musculi, in secūdo libro dilucidè commemorauimus. Quando hinc collocari dicebatur, qui quatuor digitorū secundos flectit articulos, & qui quatuor digitos pollicis adducunt, & qui primos quinque digitorum flectunt articulos, & qui pollicem maxime ab indice abducit, & musculus minimū digiti a ceteris remouens. Verū uti in manu quoq; dictum est, nerui his musculis potius attenduntur, quàm innascantur, aut inserantur. Porro præter hanc quarti nerui seriem, etiam subinde^{q. Hæc serie spectatur uti fig. r ult. fig. a w.} inuenies exteriorem truncum priusquā pedem contingat cessare, multoq; minus per membraneum ligamentum fibulam tibiae ossi colligans, sui portionem interiori offerre. Imò ab interiori trunco, quum posteriori sedi eius ligamenti exporrigitur, ramum educi animaduertes, qui ligamentum id perforās deorsum fertur, inter musculos in anteriori tibiē sedepositos, ac hinc per transuersum ligamentum in tibiae anteriori sede conspicuum prorepens, superiori digitorū sedi ramulos communicat. Qua autem administrandi ratione hanc seriem obserues, ad finem septimi libri reueniēdo: ubi non hanc modò persequar, uerū omnem uenarum, arteriarum, ac neruorum sectionem, quæ ad manus crurāq; potissimū spectant. nam eorum uasorum quæ uisceribus sunt propria, sectionem in trium subsequentium librorum calce priuatim perstringam: quando earum partium, quibus uasa illa committuntur, administrandi rationem pertractabo: præsentī libro iam colophonem, neruorum non ineleganti delineatione hinc insuta, addens.



NERVORVM DELINEATIO, QVAE SEPTEM PARIVM NERVORVM QVI A CEREBRO ET DORSALIS MEDULLAE INITIO PRONASCVNTVR, ORTVS PRONIT, ET DISTRIBUTIONEM SERIEMq; OMNIUM QVAE A DORSALI MEDULLA IN DORSO COMPLEXA ORIGINEM DUCUNT, PULCHERRIME REFERT, VTI HUIUS FIGURAE CHARACTERVM INDEX DOCEBIT.



PRAESENTI figura cerebrum una cum cerebello et nervis exoribus tum in modum delineatus, quasi à eadem originem in ipsius basilica constitueret, ut apparet: si quis cretulis caput in posteriora quam maxime flecteret, singulorum nervorumq; oculos adituros. Vt vero characterum Index hinc chorae pulchre adhiberi possit, figuram ac si altero caveret brachio ac crure delineamus, praecipue quum eadem utriusq; sit ratio.

A, B, C Cerebri ex altero latere basis notatur, ac **A** indicat partem ipsam ad nervorum summum promineam, nonnullisq; manillarem processum nuncupatam. **B** vero cerebri partem infusam, amplius calvariae sinum subnotam, qui ad lateris finem confertur, quo quatuor cerebri primariam exceptionem resonatur. **C** autem maxime posticam cerebri solum notat.

D, D Cerebellum.

E Sinister cerebri processus, organo olfactus subminiistrans.

F Nervus inferioris coxae.

G Nervus inferioris coxae.

H Tunicæ, in quam inferioris nervus excluditur, digne auct.

I Secundum nervorum cerebri partem.

K, K Minor radix tertii nervi.

L Cerebri radix tertii nervi.

M Quartum partem.

N Quarta pars gracillior radice.

O Quinta pars insignior radice.

P Medulla, in quam quatuor pars in audis organo praecipue excluditur.

Q, R Maioris quintae partis indicis propages, quorum haec per ea cum claudunt foramen, illa vero per alius sit proprium.

S Sextum nervorum partem.

T Septimum nervorum cerebri partem, atq; horum nervorum propages hic non delineari, potuerit, ut elegantissime proponuntur secunda figura huius libri secundo Capiti preposita.

V Dorsalis medulla ex cerebri basis medio initium.

O Dorsalis medulla fides qua educantur egrediantur.

U, V Nervi characteres septem cervicis, duodecim thoracis, quinque lumborum, et sex sacri ossi indicat veritates, atq; adeo tria genera nervorum a dorsali medulla profluentium partis quorum singula quum docti accuratissime et simplicissime in hoc tabella memorata delineatae expresse. Vt enim quia hic locus erigunt characterum declarationem admittit, non omnia nervorum soboles litteris insignimus sum.

P Sicuti transierit sinister nervus, quem citra aliam characterum operam ex quatuor, quinti et sexti partium propages efformari consuevit, prout enim est delineationem intelligere, si prius de scriptis nervorum series hoc indicat accomoderetur.

Q Nervus a quatuor partibus huiusmodi inauditis, et dein

x, x Propages nervorum ex lumborum nervis exilientium, quae ab dominis et huius sedis musculis et cui ossifacantur.

y Nervus rectus frequenter patens, hicq; rectus.

z Propages sextum femur moventium aditum.

a Primus femur patens nervus.

b Primi nervi propago cui obliqua.

c Primi nervi propago alius inter musculos ad sumptis.

d Secundus femur patens nervus.

e Secundus nervi soboles per internam femoris et tibie sedem ad pedis usq; superiora sub cute excurrentes.

f Secundus nervi soboles musculis anteriorem femoris sedem occupantibus deprimenda.

g Tertius femoris nervus.

h Tertii propago, internam femoris cutem implicant.

i Tertii propago musculis aditum.

j Quartus femoris nervus, cuius exortus aequatq; trium superiorum est consuevis.

k Series anteriorum propagium inferiorum partium et sacro ossi prodeunt unum.

l Dorsalis medulla extremum.

m Quarta femur patens nervi propages ad ea prae musculorum a corradicis ossis appendice prodeuntium sibi aequat.

n Quarta nervi soboles in posteriore femoris cutem ad medium usq; longitudinis femoris excurrentes.

o Propago praecipue in quatuor, in tunc moventium musculum, ac dein reliquam posteriorem femoris cutem iuxta grana digesta.

p Soboles in musculis ad inferiorem femoris et tibie praecurrentes.

q Quarta nervi in duas truncas diffunditur, ac quidem minorem, et utro inferiorem notat.

r Minoris trunci propago, externa tibie cutem ad parvi digiti usq; extremum diffusa.


s Propago fibulae inter musculos reposita.

t Ramulus anteriorem tibie cutem implens.

u Quarta nervi truncus venus interna cutem huc ad pollicem usq; diffusa.

v Quarta nervi truncus venus, posteriori tibie sedem occupans.

dore ad digitum usq
 ferriore excurrit.
 Precipua grandiori
 runcio: eo inter r.
 b. a. os & callem pect
 infiora patens, sive
 g. l. os digiti fur. u. d. s
 offitas.



LIBRI QVARTI
 FINIS.
 P 4


- V Tersi nervi propago ad posteriorē musculum cubiti spectant.
 X Secundi nervi porio tertium accedens.
 Y Ramus secundi capae aditus longioris radium in pronum mouem
 te musculi.
 Z Secundi distributio in duos imparis ramos.
 a Minor ramus secundam radium cui ad pollicē usq. exporrecus.
 b Cressi or ramus mox in duas propages diuisus, quarum series in
 confusio off.
 c Tersi nervi soboles in musculis internam cubiti sedem occupan
 tes digesse.
 d Tersi ramus radio exporrecus, ac dein pollicē & indicē & medio
 foreulo offertur.
 e, e Quatuor brachij nervus atq. inferius e ramus notus musculis cu
 biū extendentibus depromptos.
 f Quater ramus internam brachij causam adiens.
 g Quater ramus externam & posteriorem brachij accedens cutem.
 h, b Quater ramus cui externae cubiti digessus.
 i Quater precipua distributio ad ingressum cubiti.
 k, h Quater ramus radio exporrecus & externae sedē pollicis, indicis
 & medij soboles offertur.
 l, l Quater ramus ulnae exporrecus, & musculis ad externae ipsius so
 de initium ducentibus ramulis exhibens, ac ante brachiale cessans.
 m Quatuor brachij nervus.
 n Quater nervi series in musculis ad interno brachij ofis tubere pro
 nato.
 o, o Quater nervi ramus ulnae exporrecus, & internae sedē parvi digiti
 & anularis, aliquando & medij ramulosos differtens.
 p Distincto rami soboles in externam manus sedem restat, ac ex
 ternae parvi digiti sedē & anularis & medij foreulos differtens.
 q, q Status brachij nervus, ipsiusq. sub cute tantū ducit series. Quia
 nerō brachij nervorum se exortus, principiorum que plexus, ob q
 uos promptae dignoscitur.
 r, r, r Nervi sunt intercostales, illic praecisi, quā cum costis entor
 sum reflectuntur.
 s, s Rami in posteriore delati, hic etiam undiq. obuij.
 t, t Huiusmodi serie nervi musculos aduent thoracis ofibus infusos.
 u, u Propages musculares, scilicet paria nervorum certō ramiū co
 starum radialis exporrecus augentes.

ANDREAE VESALII

BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPO-

RIS FABRICA LIBER QUINTVS, ORGANIS NVTRI-
tioni quæ cibo potuque fit, & dein propter partium connexum, ac viciniam instrumentis
generationi famulantibus dedicatus, & omnes sibi peculiares figuras seriatim simulq; mox in
initio ostendens, quo minus eadem figuræ pleriq; Capitibus
passim præponendæ ueniant.

PRIMA QVINTI LIBRI FIGVRA.



PRIMAE FIGVRAE EIVSDEMQUE CHARACTERVM INDEX.

PRÆSENTI figura tanta humani corporis portio delineatur, quanta ad pe-
ritonæi sedes ostendendas sufficit: exprimitur itaq; hac figura anterior peritonæi sedes, sectio-
nis serie ab octo abdominis musculis libera, nullaq; ex parte dissecta.

A, A, B, C, D His characteribus peritonæi insignitur, quodāmodoq; hac figura terminatur.

E, E Linea à mucronata pectoris ossis cartilagine ad pubis usq; ossium commissuram procedens, cui
oblique descendendum & ascendendum, & transversum procedendum abdominis musculorum
nervose tenuitates pertinacissimè connascuntur.

F Umbilicus, quem inter dissecandum etiā ademptis abdominis musculis, gratia opportune umbi-
lici uasorum demonstrationis, reseruare solemus.

G Seminaria sinistri lateris uasa suis membranis, quas à peritoneo mutantur, adhuc obuoluta.

H Seminaria dextri lateris uasa.

I Vena ac arteria, quæ potissimum inferiori sedi rectorum abdominis musculorum exporrigun-
tur, quorum & hic quoq; propendet portio.

K Vena & arteria, quæ sub osse pectoris exporrectæ, in anteriorem abdominis sedem prolaba-
tur, præcipuè rectoris abdominis oblatæ musculis, ac superiorè abdominis sedem uniuersam quoq;
implicat: quemadmodū illæ quas I insigniuimus, humiliorè & pubis ossibus uiciniorè implicat.


L Venarum

L Venarum soboles in peritonæi latera excurrentium, ac ab illis uenis deductarū, quæ aut à con-
iuge carente uena, aut geniculatim à caua pronascuntur, quæ ipsius caudex lumborum uertebri
colligatur.

M Transuersi abdominis muscoli portio à peritonæo diuulsa, retrorsumq; flexa.

N Ilium ossis sedes hic nuda conspicitur, cui obliqui transuersiq; abdominis committuntur muscoli.
Verum quum præsentī figurā, uti etiam subsequētib; omnib; ea duntaxat organa explicare
uisum sit, quæ hoc pertractabuntur libro, non est quod illas quoq; indicem partes, quæ figuris ob
hoc adduntur, ut describendæ partis sedes in conspectu promptior esset: cuiusmodi in hac figurā
est, thoracis inferior sedes ab abdominis musculis libera, & femorū initia cute duntaxat denudata.

SECUNDA QVINTI LIBRI FIGVRA.



SECUNDAR FIGVRAR, EIVSDEM QVE CHARACTERVM INDEX.

H A E C figura primam sectionis serie subsequitur. hic namque peritonæum recta linea
à pectoris ossis mucronata cartilagine ad pubis usque os ita diuisum est, ut umbilici uasorum nul-
lum uitiauerim: dein transuersa sectione à sinistro ilio ad dextrum ducta, quatuor peritonæi an-
guli ab anteriori corporis sede in posteriora reflexi conspiciuntur. Præterea umbilici quoque
una pars cū ipsius uasis, quæ peritonæo prius connectebantur, oculis subiacet. Ad hæc præsens
figura iecoris portione, & uentriculi sedem, ac omenti intestinis obducti sitū indicat, quem omen-
tum obtinet, quum manibus ipsum uersus pubis os inter dissecandum trahitur, si quando sursum
uersus sinistrum latus (uti plerunq; accidit, ac sequenti figurā occurret) retrahitū adiuuenitur.

A, B, C, D Quatuor peritonæi partes dissectæ, atq; in posteriora reflexæ, adeo ut interna antero-
ris

ris peritonæi sedis regio hic ex sectionis serie in conspectum uenerit.

E Umbilicus à peritonæo liberatus.

F Vena ab umbilico in iecur porrecta.

G Vena umbilici in iecoris rimâ ingressus.

H, H Portio iecoris ex gibba ipsius sede apparens.

I Præcipuum ligamentum iecur septo transuerso cōnectentium, quod uersus dextrum latus mucronata cartilaginis consistit. Scurum enim id ad sinistrum I latus conspicuum, mucronata est per foris ossis cartilago.

K Dextra arteria ab umbilico secundum dextrum uesticæ fundi latus ad magnâ prorepens arteriâ.

L Sinistri lateris arteria ab umbilico secundum uesticæ sinistrâ sedē, ad magnâ exporrecta arteriâ.

M Meatus, quo à uesticæ fundo fœtus urina in secundam fœtum inuoluentem tunicam expurgatur.

N Vescicæ fundus.

O Peritonæi ad uesticæ fundum nexus.

P Ventriculi anterior pars, quæ neq; iecore, neq; omento obtegatur. Hæc sedes ob hoc amplior apparet, quod uentriculus quem hic depinximus impenitus inflatus fuerat: quemadmodum & huius cadaueris uesticæ paulo quoq; elatius solito, supra pubis ossa elatiori sua parte efferebatur.

Q, Q, Q, Q Omentum.


R Vena & arteria simul cum neruo dextræ sedi inferioris partis uentriculi exporrectæ.

S Sinistri lateris uasa, quæ sinistram fundi uentriculi sedem amplexantur.

T Hæc sede dextri lateris uasa sinistris committuntur, ac proinde etiam R, T & S futuram indicat, cuius Aristoteles tertio Historiæ de animalibus libro, ut & quarto de Animalium partibus meminit, quum à medio uentre omentum oriri dependereq; asserit.

X, X Vena & arteria utriq; propagines superiori omenti membranæ exporrectæ, adipeq; cinctæ.

TERTIA QVINTI LIBRI FIGVRA.



TERTIA figura secundam administrationis ordine subsequitur, ac humiliorem omenti membranam a superiori diuulsam laceratamq; gerit, ac superior quidem super thoracis anteriora & uentriculum quoque extensa est. Dein uentriculus etiam uersum ad pectus ex sua se de tractus uisitur, ut humilioris omenti membranae natura in conspectum peropportune ueniret: quam eousq; intestinis adhuc obducta cernis, quousq; omentum subinde sursum sinistrorsumq; collectum dissecantibus occurrit. Praeterea in praesenti figura intestinorum situs inturbatus iacet, uti & lien quoq; cuius pars hic etiam oculis subijcitur.

K, L. **M, N** & **O** eadem hic atq; in secunda figura notantur. nam **K** indicat umbilici arteriam dextram, **L** uero sinistram. **M** meatum, quo fetus urina in secundum ipsius inuolucrum excernitur, quiq; hic, ut & arteria, abtruncatus conspicitur. Caeterum **N** uesicam notat: **O** autem peritonaei cum anteriori uesicae sede connexum. Atq; in hac figura peritonaei angulos, qui secunda figura **A, B, C** & **D** insigniti erant, rescuimus.

a, a Superioris membranae omenti, quam & alam superiorem nonnulli appellant, posterior sedes, quae inferiorem membranam integro adhuc omento spectat.

b, b Extuberans haec sedes uentriculus est, superiori membrana omenti tectus.

c, c Omenti humilior membrana, quae nonnullis humilior ala nuncupatur. Caeterum extuberans pars, cui duo superiora **c** & **c** inscribuntur, eolum est intestinum, quod uentriculi exporrigitur fundo, ac inferiori membrana omenti, uice mesenterij utitur.

d Hic lien etsi omento obducitur, protuberans sese ostendit, ad quod etiam pellucida omenti inuat substantia.

Inferior omenti membrana hic modo quae uentriculo subijcitur, quam pluribus notanda erat characteribus: uerum quod minus illam characterum copia obliterarem, eos in subsequenti figura ponendos duxi. praecipue quum leui opera lector eosdem characteres utrisq; figuris inibi adhibere possit, ubi ambae idem exprimunt.

QVARTA QVINTI LIBRI
FIGURA.



HAC figura omentum suis quibus adnascitur, aut potius a quibus initium ducit, membris liberum, & nulla interim parte diuulsum delineatur, integraq; ipsius constructio & praecipue uenarum, arteriarum & neruorum per ipsum series, & glandulosa corpora ipsi innata com-
 monstrantur. Quam concinne uero omentum sacculo, aut peræ, aut minoribus piscatorum reti-
 bus assimilatur, hac quoq; figura discitur.

e.e Omenti circulus, seu orificium, quo initium ducit.

f.f.f Omenti superioris membranæ anterior facies.

g.g Inferioris omenti membranæ anterior facies. at hæc nõ integræ ut superioris membranæ anterior facies hic conspicitur, quum inferioris membranæ sedes tantum in conspectu sit, quæ uentriculo substernitur, atq; ad colon usq; intestinum, quæ id uentriculo exporrigitur, pertinet. Reliqua enim inferioris membranæ pars superiori membrana occultitur.

b.i.k Tribus his characteribus ad sinistram lateris inferioris membranæ omenti positis, omenti constructio insignitur. Nam h omenti partem notat membranæ, uenis arterijsq; & adipe quoq; carentem. uero uasa indicat, h autem adeps uasis attensus adnatus ue exprimitur. Atq; ut hos characteres hac omni parte reposui, ita etiã quauis ipsius sede eas potuisse collocari, nemo ambigit.

l Venæ portæ caudæ quæ ex iecore prodians inferiori membranæ omenti continetur ac suffulcitur.

m Arteria iecoris cauum & bilis uesiculam petens, neruoq; concomitata qui a dextri lateris sexti neruorum cerebri partis nerui ramo, dextri lateris costarum radicibus exporrecto depromitur, ac iecoris cauum bilisq; uesiculam adit.

n Principium uenæ inferioris uentriculi orificij posteriorem sedem potissimum accedentis, & arteriam habentis coniugem.

o.o Arteria & uena & neruus secundum superioris omenti membranæ principium, dextræ fundi uentriculi sedi exporrecti.

p.p Illorũ uasorum quæ dextræ fundi uentriculi sedi exporriguntur surculi, corpus uentriculi implicantes.

q.q Distorum iam uasorum quæ fundi uentriculi dextræ sedi exporriguntur propagines, in superiorem omenti membranam sparsæ.

r Venæ arteriaq; duodeno intestino & ieiuni intestini principio exporrectæ, neruulumq; socium frequenter admittentes.

s Portæ uenæ in duos truncos bipartitio. quod uero uenas r & o indicatas hic clatius quàm in nuda portæ uenæ figura tertij libri quinto capiti dedicata, delineauerimus, in hoc factum putato, quod earum uenarum ortus in hunc modum subinde uariet.

t Dexter seu grandior uenæ portæ truncus, in mesenterium adeoq; intestina excurrens.

u Venæ in posteriorem uentriculi sedem citra arteriæ consortium excurrens.

x Venæ cum arteria et neruo in dextram inferioris membranæ omenti sedem sparsa, ac colon quodque intestinum hac parte accedens.

y Venæ simul cum arteria in uentriculi posteriora excurrens, & tandem coronæ ritu superius uentriculi orificium amplectens, uerum huius uenæ arteriaq; tanta duntaxat delineatur portio, quanta inferiori membrana omenti sustinetur.

æ Hic nonnihil grandior mesenterij arteria se offert, etiam si minimo interuallo inferiori membrana omenti suffulciatur.

ß Truncus est arteriæ, q inferiori omni membranæ intertextus, uentriculo, iecori, bilis uesiculæ, colo quæ id uentriculo exporrigit, ac dein lieni ramos depromit, neruosq; has partes adiectes comitat.

γ Venæ simul cū arteria et neruo mediam potissimum sedem subiens inferioris membranæ omni, & ramos quoq; offerens colo intestino quæ ad uentriculi prorepat fundum.


δ Venæ coniugis arteriæ expers, quæ sinistrae sedi inferioris omenti membranæ pauculas soboles, ut & ipsa gracilis est, diffundit.

ε Venarum, arteriarum & neruorum in lienem series.

ζ Venæ pariter cum arteria neruoq; uentriculi fundi sinistrae sedi exporrectæ.

η.η Glandulosum corpus inferiori membranæ omenti innatum, quod uulgo uocant Brisauolo, Dulcem morsum seu bolum, Buccam saporitam, Rodol.

θ Glandulosi corporis portio, quod duodeno intestino subnascitur.




SEXTAE FIGVRAE INDEX.

*I*N sexta quinti libri figura sectionis serie tertiam subsequente, iecur uentriculus & intestina proprias seruant sedes, omento interim qua à uentriculo enascebatur, coloq; intestino continuum erat, prorsus resecto, ne forte id relictum alicuius organi sedem oblitteraret. Præterea, ut singula opportunius oculis subijcerentur, costarum aliquot fines (uti inter pingendum factum est) effregimus, ipsas una cum peritonæo septoq; transuerso illis connato in posteriora reflectentes.


Vesica autem hic respondet tertiæ ac secundæ figurarum uesicæ. Cæterum quia præsentis figuræ characteres magna ex parte cum duabus nunc succedentibus communes sunt, non abs re erit ante illius indicum explicationem, quid his designetur, sermoni adijcere.

HAC figura tenuium intestinorum ductum duntaxat delineauimus, aliqua etiam uentriculi et coli intestini simul cum cæco afferuata portione, ut facile præsens figura iam subsequenti adaptetur. Quod autem coli intestini initium paulo magis quam par sit, ab ipsis tenuibus intestinis abductum uideatur, in hoc factū arbitrator, ut sola gracilia in conspectum accurate uenirent, potissimum quum coli intestini circum tenuia situm ingressumq; sexta figura pulchrè proponat.



OCTAVA QVINTI LIBRI FIGVRA.

PRAESENTI figura cæci intestini et coli et recti imago ductusq; commonstratur, una cum ilei intestini extremo, et musculis recto intestino proprijs.



CHARACTERVM SEXTAE, SEPTIMAE ET OCTAVAE
figurarum Index.

SUBSEQUENS modo characterum Index sextae, septimae et octauae figuris communis est, si quis uero interim character harum alicui peculiaris sit, illum pro figurae numero aut 6 aut 7 aut 8 insignietur sum: characteres autem, quibus huiusmodi nulla subiungitur notula, tribus figuris communes censebis.

- A* 6 Mucronata pecloris ossis cartilago.
- B, B* 6 Peritonæum una cum disruptis costis, illisq; adnato septo retrorsum atq; in latera flexum.
- C* 6 Primarium ligamentum, quo iecur humanum septo colligatur.
- D, D* 6 Iecoris gibbi magna sedes.
- E* 6 Portiuncula uenæ ab umbilico iecori insertæ.
- F, F* 6 Ventriculi anterior sedes.
- G* 6 Lienis sinistrum latius, seu ipsius pars in corporis anteriora uergens.
- H* 7 Ventriculi portio, quæ inferius uentri t. uli cõstituit orificium, seu intestinorum principium quod hic chordula ligatum funximus.

I, K 7 Pars intestinorum ab *I* ad *K* protensa, uulgato nomine nunc duodenum intestinum, nunc intestinum duodenum digitorum longitudine, mihi uocatur.

L 7 Ieiuni intestini initium, graciliumque intestinorum sedes, ubi primum in anfractus conuolut atque antroorsum assurgere incipiunt.

M 7, 8 Ilei intestini terminus, et gracilium intestinorum finis. uerum quoniam nam sede ieiuni intestini terminus, aut ilei intestini principium sit ponendum, augurari nequeo, quum toto ductu qui ab *L* in septima figura in eadem octaua ad *M* usque pertinet, nullibi discrimen commensuret, quo ieiunum ab ileo liceret intersingere.

N Extuberans crassorum intestinorum initium.

O Hoc intestinum mihi caecum nuncupatur, non admodum contententi an quis eo nomine aliam crassorum intestinorum partem donari uelit: modo is non adeo nominum sit studiosus, ut illorum occasione ea in intestinorum fabrica spectare negligat, quae in partium aliarum constructione sedulo inquirimus.

N, P, Q, R, S, T, 6, 8 Colum intestinum his characteribus insignitur, uerum singuli priuatim aliquid notant. *N* enim ad *P* usque coli intestini ductum notat, a dextri renis sede ad iecoris usque cauum pertinentem. *A* P uero ad *Q* coli ductus notatur, secundum uentriculi fundum a iecoris cauo ad lienis usque regionem protensus. *A* Q autem ad *R* ductus coli insinatur, a lienis regione ad pubis os, secundum sinistrum ile procedens. Caeterum ab *R* ad *S* (quod in 8 priuatim uisitur) coli indicatur ascensus anfractusque, quem sursum ad umbilici usque regionem molitur. At *S* ad *T* usque progressum notat, dicti nunc ascensus ad recti intestini initium.

V, V 6, 8 Depressa coli intestini sedes.

X, X 6, 8 Coli intestini utrinque extuberantes semiglobuli, quos cellulas uulgo uocat.

Y 6, 8 Recti intestini initium. Quicquid uero sub *Y* consistit, rectum est intestinum.

Z 7 Portio meatus bilem in intestina perferentis.

a 8 Musculus recti intestini finem orbiculatim amplectens, faciumque excretioni praefectus.

b, c 8 Duo musculi rectum intestinum post facium excretionem sursum alacriter contrahentes.

d 8 Hac sede rectum intestinum uirorum peni et mulierum uteri ceruici interuentu musculosae substantiae connascitur.

e, f 6 Duae arteriae foetui peculiares.

g 6 Hoc characterе uesicae fundus indicatur, uti et meatus quo foetus urina expellitur, quemque hic ut et nuper commemoratas arterias abtruncatum finimus.

NONA QVINTI LIBRI FIGVRA. CVIVS VTI ET EIVSDEM CHARACTERVM INDICEM hic lateri adhibuimus.

HAC figura recti intestini et coli quoque quae id recto continuatur, partem expressimus, intestinorum tunicas commemoraturam.


b Prima intestinorum tunica, quae et intima est, ac solis transversis circularibus ue confirmatur fibris.

i, i Secunda intestinorum tunica, quae transversis quoque efformatur fibris. attamen rectis quoque eo donatur pluribus, quo recto intestino uicinior est.

k, k Mesenterij est portio, quae rectum intestinum osi sacro committit, ac tertiam ipsi exporrigit tunicam.

L, L Tertia intestinorum tunica, a mesenterij pronata membranis.





DECIMAE FIGVRAE EIVSDEM QVE CHARACTERUM Index.

*V*T præsens figura mesenterij situm quàm appositissimè oculis subijceret, gracilia intestina undecunq; ad latera sursum deorsumq; inuicem manibus diducta continet, ac proinde mesenterij cōmonstrat centrum, et rationem qua mesenterium intestinis uasa porrigit, intestinaq; dorso connectit. Ad hæc, eius quoque mesenterij partem ostendit, quæ coli finem & rectum quoq; intestinū dorso alligat. Succedit uerò hæc figura sectionis serie illi quam sextam locauimus.

B, C, D Portiones peritonæi, aperto iam abdomine in latera extrorsum flexæ.

E, E Tenuia intestina.

F Cæcum intestinum.

G, G Colon intestinum.

H Recti intestini initium.

I Vesica, cui peritonæum ea potissimum sede connascitur, ubi alteram ipsi offert tunicam.

K Mesenterij centrum, eaq; dorsī pars qua id à peritonæi membranis initium ducit, quæ magnam arteriam & cauam uenam hic uertebrearum corporibus adnectunt.

L, L Corpus glandulosum, mox in ipsa uasorum distributione positum, quæ mesenterij centro inseruntur.

M, M Glandulae uasorum distributionibus interiectae, quae uasa in ipso per mesenterium ad intestina moluntur progressu.

VNDECIMA QVINTI LIBRI

FIGVRA.



VNDECIMAE FIGVRAE EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

- H I C* duntaxat ipsum delineatur mesenterium e corpore exemptum, omnibusque partibus ipsi connatis liberum, praeterquam ab inferioris membranae omenti portione, qua colon dorso inibi colligatur, ubi secundum inferiorem uentriculi sedem id procedit.
- K* Character *K*, ut et in decima figura, mesenterij indicat centrum.
- L, L* Hi quoque characteres similiter atque in decima glandulosum corpus notant, totius mesenterij maximum.
- M, M* Glandulae notantur illis interpositae uasorum dissectionibus, quae iam intestinis appropinquant.
- N, O* His characteribus mesenterij circumscribitur pars tenuia intestina dorso alligans.
- P* *P* ad *Q* usque mesenterij indicat portionem, colon intestinum dorso affirmantem, qua id a dextri renis sedec ad cauum usque iecoris protenditur.
- Q* *Q* ad *R* usque inferioris omenti membranae partem notat, quae colon tota illa sede dorso committit, qua id secundum uentriculi exporrigitur fundum.
- R* *R* ad *S* usque mesenterij insinuat portionem colo intestino tota ea sede propriam, qua id a lienis regione ad rectum usque intestinum pertinet.
- S, T* Quod *S* et *T* intercluditur, mesenterij pars est rectum intestinum dorso neclens.
- V* Hac sede mesenterij naturam exprimere conati sumus, quandoquidem unam mesenterij membranam ab altera unguibus diuulsam pinximus: ut *X* nimirum una sit, altera uero *Y* inscribitur. Atque in harum membranarum medio mesenterij uasa excurrunt, et ipsius adeps, ut et glandulae etiam continentur, quemadmodum quoque in uigesima quarta huius libri figura est cernere.

DVODECIMA QVINTI LIBRI FIGVRA QVAE

IAM PRAEPOSITIS INTEGRIS FIGVRIS SECTIO-

nis serie succedit. Habet enim dissectū peritonæum, et omentum quoq; in hac ablatū est, et hic costas aliquot etiā effregimus, quō iecoris cauū opportunius delineari posset. Hic namq; conspiciatur uniuersum iecoris cauū, ipsiusq; iecoris forma. Dein uētriculi quoq; apparēt orificia. Intestina autē perinde ac uentriculū in sinistrū latus deprestimus, ut in cōspectu esset mesenterij pars, ac uenæ portæ in ipsum series: dein bilis meatus in intestinū infertio, et si quæ sint reliquæ characteribus seriatim adnotabimus, mox atq; quid decima tertia ostendat figura, expresserimus.



DECIMATERTIA QVINTI LIBRI FIGVRA.

NVDAM BILIS VESICVLÆ EIVSDEMQUE

meatum delineationem exprimens.



P R A E S E N S characterum Index duodecimæ & decimatertie figuris ideo habetur communis, quod cauam iecoris sedem plerisque characteribus quibus decimatertia occupatur insigniri licuisset, nisi characterum copia delineationem fuisset uitiatum. Quum itaque character occurreret duodecimæ figuræ peculiaris, illi i subiungemus, illis qui decimatertie priuatim inscribuntur 2 adiecturi. Si uero quis utrisque figuris simul communis erit, illi 1 & 2 addetur.

H, H₁ Peritonæi unâ cum costis euersti portio.

I, K₁ Cauum iecoris.

L₁ Portiuncula gibbi sedis iecoris. **M₁** Iecoris sectio, cuius ortu alæ uena primum inseritur.

N₁ Rimæ ac impressiones & tubercula in iecoris cauo iuxta uenæ portæ exortum conspicua. **N** uero superius, seu sinistrum, seu ipso **T** uicinius, sedem indicat, quæ ab umbilico procedens uena iecoris cauo, ubi portæ caudex prodit, inseritur. **Ab M** enim ad **N** usque foramen notatur, quod libere quodammodo umbilici transmittit uenam ad sedem **N** insignitam. (colligās.

O₁ Ligamentum sinistram iecoris partem (quæ in angulum quodammodo acutum desinit) septo transuerso hic **Φ₁** Sinus iecori hic incisus, ac stomacho cedens, ubi is superiori uentriculi orificio continuatur.

P, Q₁ Venterculus.

R₁ Ventriculi superius orificium, seu stomachi finis, unâ cum uenis, arterijs, & neruis id orificium amplexantibus.

S_{1,2} Humilius uentriculi orificium, ipsiusque duodeni intestini initium, quod in duodecima figura secus atque secundum naturam se habet, ad interiora refleximus, ut in conspectum ueniret bilis uesiculæ meatus in ipsum insertus, ac mox c notandus.

T₁ Nerus a neruis elatus uentriculi orificium implicantibuseductus, iecorisque cauo insertus.

V₂ Bilis uesicula. Hæc in utrisque præsentibus figuris est conspicua. uerum priuatim illam duntaxat in decimatertia characterē notauimus, ac proinde primum decimatertie, ac dein duodecimæ mentem hic & in subsequētibz aliquot characteribus accommoda.

X, X₂ Meatus bilis uesiculæ per iecoris corpus exporrecti, inter portæ uenæ et cauæ ite uenæ ramos.

Y₂ Venæ portæ propago in iecoris substantiam diffusa.

Z₂ Venæ cauæ propago in iecoris substantiam digesta. **V**olui enim hic exprimere uasorum in iecoris substantia situm, qui scilicet portæ uenæ rami propaginibus cauæ subijciuntur, et quoniam pacto in horum medio bilis uesiculæ meatus excurrant.

a₂ Concurfus meatuum bilis uesiculæ, qui in iecoris corpus digeruntur.

b₂ Uesiculæ bilis ceruix, cui meatus ex iecore ductus ac a notatus inseritur, communisque efficitur.

c_{1,2} Bilis uesiculæ meatus in duodenum intestinum insertus, ac **S** ad **d** usque in decimatertia figuræ a duodenum indicat intestinum, quod humiliori sede apertum finximus, ne meatus illius c notati insertio lateret.

c₂ Arteria in iecoris cauum & bilis uesiculam digesta.

f₂ Nerviulus iecori & bilis uesiculæ communis, & a sexti paris neruorum cerebri propagine depromptus, quæ dextri lateris costarum exporrigitur radicibus.

g₂ Tenues portæ uenæ propagines, in bilis uesiculam excurrentes.

h₁ Portæ uenæ caudex.

(stinet.

i, i₁ Glandulosum corpus, quod duodeno intestino adnascitur, uasque ipsi exporrecta opportune sub **k, l, m, 1** Mesenterium. Verum singuli characteres priuatim quid indicant, **k** enim uenæ portæ dextri seu grandioris trunci distributionem in mesenterium notat. **l** uero, glandulosum corpus in mesenterio primis uasorum distributionibus præfectum. **m** autem, mesenterij insinuat partem, cui colon intestinum tota illa sede committitur, quæ a dextri renis sede ad iecoris usque cauum pertinet. Hic namque colum intestinum a mesenterio diuulsum est, quo mesenterij centrum aptius delinearetur.

n₁ Venæ quæ sub posteriori recti intestini sede deorsum protenditur, ipsiusque recto intestino uenas

o₁ Uesicæ fundi superior pars etiam hic est conspicua.

(porrigit.

p₁ Quod hic extuberat dexter est ren, sua pingui membrana adhuc obiectus.

q₁ Meatus urinarius, a dextro rene urinam in uesicam deducens.


r₁ Venæ ac arteria seminales dextri lateris.

s₁ Vas semen a dextro teste uersus ceruicis uesicæ initium perferens.

DECIMAQVARTA QVIN

TI LIBRI FIGVRA, AN

teriolem integri uentriculi & stomachi
faciem exprimens, una cum uentis, ar
terijs & neruis uentri
culo infertis.



DECIMAQVINTA QVIN

TI LIBRI FIGVRA, IN-

tegru uentriculi & stomachi postero
rem exhibens faciem.



CHARACTERVM DECIMAEQVARTAE ET DECI
mae quintae figurarum Index.

CHARACTERES hoc Indice explicandi partim utriq; figuræ communes
sunt, partim nunc huic, nunc illi peculiare: ac proinde communes 1 & 2 indicabimus. peculiari
bus uero decimæ quintæ figuræ characteribus, hæc 1 subijcietur, decimæ sextæ autem hæc 2.
A 1, 2 Stomachi pars in fauces orisq; adeo amplitudinem pertinens, hic à faucibus præsecta cernitur.
A, B 1, 2 Ab A ad B usque ductus stomachi notatur, recta per mediam uertebrae crucis &
quatuor superiorum thoracis sedem descendens.

A'B


- B, C_{1,2} A B ad C usq; ductus stomachi in dextrum latus super quintam & aliquot sequentes thoracis uer-tebras modicè declinans.
- C, D_{1,2} A C ad D usq; stomachi ductus insignitur ex dextra sede uersus sinistram, supra magnam cõscendens arteriã, & per septum transuersum in uentriculi superius orificiũ G notandũ pertinẽs.
- E, E₁ Duæ tonsillæ, quæ non procul à stomachi sede in oris cavitatem pertingente distant.
- F, F_{1,2} Glandulosum corpus stomacho frequẽter adnatũ, qua quintæ thoracis uer-tebræ corpori insidet.
- G_{1,2} Superius uentriculi orificium. H_{1,2} Inferius uentriculi orificium.
- I_{1,2} Superior uentriculi pars. K, K_{1,2} Ventriculi demissior pars, seu fundus.
- L, L₁ Anterior uentriculi sedes.
- M, N, O₂ Posterior sedes uentriculi. Verũ singuli characteres aliquid priuatim indicant. O enim impressionem notat quam uentriculus ea sede exigit, qua uer-tebris innititur. M quidem prominentiorem sinistri lateris partem, N uero partem dextri lateris prominentiorem.
- P_{1,2} Duodenum intestinum, quod hic ad ieiuni intestini principium resectum finximus.
- Q₂ Bilis uesiculæ meatus, in duodenum intestinum insertionem tentans.
- R₂ Hic character in interna dicti nuper intestini sede uisitur, insertionem meatus illius notans, quem modò Q insigniui.
- S₂ Glandulosum corpus duodeno intestino subnatum, uasq; illi intestino exporrecta suffulciens.
- T_{1,2} Dextri nerui sexti paris neruorum cerebri propago, ad stomachũ exporrecta, multipliciq; serie in ipsius orificium elatius distributa. V_{1,2} Sinister neruus.
- X₂ Sinistri nerui propago, secundum elatiorem uentriculi sedem ad iecur usq; excurrens, hicq; quæ Y iecori proxima est, Y insignita.
- a₂ Prima (uti doctrinæ studio nuncupare eam solemus) uentriculi uena & arteria.
- b₂ Secunda uentriculum accedens uena, quæ coniuge caret arteria.
- c_{1,2} Tertia uentriculi uena cum coniuge arteria & neruo quoq; secundum dextram uentriculi fundi regionem exporrecta. (tu amplectens.
- d_{1,2} Quarta uentriculi uena coniugem obtinens arteriam, & elatius uentriculi orificium coronæ rici
- e₁ Rami iam dictæ uenæ & arteriæ, qui secundum uentriculi elatiorem sedem ad inferius usque ipsius orificium contendunt.
- f_{1,2} Quinta uena simul cum coniuge arteria & neruo, sinistram sedem fundi uentriculi perreptans.
- g, g_{1,2} Aliæ uenæ ac arteriæ, ab illis pronatæ uasis quæ lieni inseruntur.

DECIMASEXTA QVINTI LIBRI FIGVRA.

H A C figura uentriculum à stomacho ac intestinis liberauimus, ac dein inuertimus, ut interior uentriculi sedes seu superficies cibos & potus amplectens, in conspectum ueniret.

b Circulare uentriculi tuber ea sede conspicuum, ubi stomachus uentriculo continuatur, aut ubi elatius ipsius consistit orificium.

t Tuber orbiculatum quoq; in humiliori orificio uentriculi apparens.




DECIMASEPTIMA QVINTI LIBRI FIGVRA.

P R A E S E N S figura uentriculi tunicarum seriem numerumq; et naturam, quantum pictura assequi potuimus, docet.

k Tertia uentriculi tunica, à peritoneo pronata, atq; hic à uentriculo magna ex parte diuulsa.

l Secunda uentriculi tunica, minus quam tertia à uentriculo diuulsa.


m Prima intimaq; uentriculi tunica, hac in parte à duabus exterioribus tunicis libera.



DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER V.
DECIMAOCTAVA QVINTI LIBRI
FIGVRA.

369

P R A E S E N S figur. iecoris gib-
bam posterioremq; sedem unâ cum caua uenae
caudicis portione exprimit.




- A, A** Iecoris gibbi superior pars.
B, B Iecoris gibbi posteriorisq; sedis infima regio.
C Caue uenae sedes, qua septum permeat, ipsiq;
foboles exporrigit.
D, E Hoc intervallo sedes notatur, qua caue cau-
dex posteriori iecoris sedi innascitur.
F Portio praecipui iecur septo alligantis uinculi.
G Ligamentum iecoris partem in sinistra maxime ex porrectam septo connectens.
H Venae portae portio.
I Sinus quo iecur stomacho cedit, qua sinistro uentriculi orificio continuatur.

DECIMANONA QVINTI LIBRI FIGVRA, QVAE
LIENEM OMNI EX FACIE COMMONSTRAT, CV.

ius situm & ex proportionem magnitudinem, uigesima quae mox subiicitur figura literis
O, O, P explicabit: praesens uero quatuor quodammodo peculiaribus constans
effigiebus, seu tabulis, in hunc habet modum.

PRIMA. SECUNDA. TERTIA. QVARTA.



QVATVOR DECIMANONAE FIGVRAE TABELLARVM
earundemq; characterum Index.

P R I M A lienem anteriori facie exprimit, unâ cum omenti portione, seu inferioris superio-

- A** risq; omenti membranarum partibus. **A** namq; lienis sinistrum indicat latus, dextrum autem
B, B, ac media ipsius sedes omento integuntur. **B, B** & **B** enim inferioris omenti membranae portio-
C, C, nem indicant, lienis uasa deducentem. C uero & **C** superioris omenti membranae portione signi-
ficant, qua ad uentriculum uasa perferuntur, ab illis uasis pronata quae in lienem iamiam inscruen-
da ueniunt.

- Secunda effigie decimae nonae quinti libri figurae lienis caua regio exprimitur, ab omnibus quae
D, E, illi committuntur partibus libera. ac hic **D** notat superiorem lienis sedem, **E** inferiorem, **F** sini-
F, G, stram, **G** dextram. **H** uero & **H** lineam indicant in caua lienis regione conspicuam, cui lienis
H, uasa inseruntur.

Tertia effigies lienis gibbum commonstrat.

- Quarta lienis quoque cauam sedem delineatâ continet. At huic duas indidi sectiones, ut lienis
I, K, substantia conformatioque oculis subijcerentur. Atque hic **I** & **K** sectiones modo di-
ctas indicant.

r VIGE-



VIGESIMAE FIGVRAE EIVSDEMQUE CHARACTERUM INDEX.

P R A E S E N S figura sectionis serie duodecimae succedit. ab hac enim omnia intestina exeuimus, relicta duntaxat uentriculi portione superioris orificij uentriculi sedem commonstrante. atq; ita hac figura pleraq; indicat, quae nunc opportunius cum characterum indicibus seriatiim insinuabuntur.

- A, A* Septi transversi portio peritoneo succincta, atq; una cum costis aliquot sursum reflexa.
B, B Cava iecoris sedes.
C Iecoris ligamentum, quo ipsius sinistra pars septo alligatur.
D Vena per umbilicum iecori exposita portio, ubi et sinus ille indicatur primum hanc admit-
 tens uenam, quae per priuatum ipsi in iecore humano incisum foramen ad iecoris usque sedem per-
 reptat, ubi hic *G* non procul à *K* adhibitum conspicis, ubiq; uena hac in iecoris substantiam pri-
 mum uere digeritur.
E Hac sede iecur sinui obtinet, quo cedit stomacho per septum transversum ad elatius uentriculi
 orificium contendenti.
F Supertus uentriculi orificium, uentriculiq; portio.
G, G Lineae impressiones uel tuberaq; in iecoris cauo ubi partem uenam promit conspicua.
H Bilis uesicula.

- I Portæ uenæ caudex hic abscissus. Verū I quōq; duas indicat uenulas bilis uesiculæ exporrectas.
 K Iecoris neruus ab illis propagatus, qui elatiori uentriculi implicatur orificio.
 L Arteria iecori & bilis uesiculæ communis.
 M Neruus à sexti neruorum cerebri paris propagine initium ducens, quæ dextri lateris costarum exporrigitur radicibus. atq; hic neruus iecori pariter & bilis uesiculæ communis censetur.
 N Bilis uesiculæ meatus hic abtruncatus uisitur, qui ad intestina pertinet.
 O, O Lienis anterior cauæq; regio. P Lienis linea, cui uasa ipsius implantantur.
 Q Vena caua. R Magna arteria.
 S Radices artieriarum in uentriculum, iecur, lienem, omentum, mesenterium, ipsaq; demum intestina excurrentium.
 T Dexter ren, pingui sua obductus tunica.
 V Sinister ren, similiter pingui ipsius inuolutus tunica.
 X Vena in sinistri renis pinguem diffusa tunicam.
 Y Vena dextri renis pinguem tunicam accedens.
 a Vena arteriaq; dextro reni serosum sanguinem deducens.
 b Vena arteriaq; in sinistram protensa renem, emulgentesq; uulgo non secus appellatæ, quàm illæ quæ dextro reni sunt propriæ.
 c, c Meatus ex dextro rene urinam in uesicam deferens.
 d Meatus quo sinistri renis urina in uesicam ducitur.
 e Seminalis uena sinistram accedens testem. f Seminalis uena, dextri testis.
 g, g Surculi à seminalibus uenis qua peritonæo committuntur, in ipsoq; adeo uersus testes progressu, ad peritonæum deriuati.
 h Seminalis arteria dextrum testem petens.
 i Arteria seminalis quæ sinistro testi est propria.
 k Arteria in humiliore mesenterij sedem ad colon intestinum et rectum excurrentis radix.
 l Arteriæ magnæ super cauam uenam ascensus, ac ipsius magnæ arteriæ & cauæ supra osis sacri initium in duos truncos diuisa.
 m, m Præcipuæ uenæ ac arteriæ earum quæ geniculatim à magnis uasis lumborum carnibus ipsiq; peritonæo offeruntur.
 n Arteriæ magnæ soboles sacri osis foramina accedentes.
 o Recti intestini pars à colo libera, atq; ut inter disseccandum sit, uinculo intercepta.
 p Vesica urinæ receptaculum.
 q Semen à teste ad penem deferentis uasis portio, qua secundum pubis os deorsum ad uesicæ ceruicis initium retorquetur.
 r Cutis quæ penem inuestiebat. s Scortum.
 t Carnosæ membranæ pars, quæ haud secus atq; scortum, utrunq; ambebat testem.
 u Tunica à peritonæo inibi pronata, ubi seminarijs uasis iter præbet. estq; hæc exterior testis tunica, earum quas testibus singulis proprias peculiareq; numeramus.
 x Denudati penis portio.

VIGESIMAPRIMA QVINTI LIBRI FIGVRA

QVÆ TRES PROPRIAS CONTINET TABEL.

las sectionis serie inuicem subsequentes, ac appositissime renū sinus meatuumq;
 urinariorum principia ostendentes.

PRIMA.

SECUNDA.

TERTIA.



P R I M A tabella sectionem secundum renis longitudinem per gibbum ipsius inductam habet adeo profundam, ut in secundum renis pertingat sinum, interim nulla renis substantiae abla-
 2. B. ta portione. Significet igitur. a dextri renis anteriorem partem, B. uero posteriorem, γ & γ ori-
 3. 3. ficia sunt ramorum primi sinus renis, seu ipsius membrani corporis, quae inuicē illi rami coeunt. Hic
 4. 4. enim rami necessario per sectionem in mutuo coitu diuiduntur. A, A primi sinus corpus, seu mem-
 braneum corpus in quod uena & arteria renis terminantur.


6 Foraminulum hoc urinarij meatus est initium.

7 Urinarij meatus pars. Super membraneum hoc corpus A & A insignitur, secundus renis consi-
 stit sinus, cuius interius & corpori illi membraneo proximum latus in hac sectione tantum appa-
 ret. Eius enim partes quae in exteriora ad utrumq; septi ex renis substantia conformati latus pro-
 3. 3. ducuntur, ipsunq; sinum uelut bipartitum efficiunt, nisi specillo in circuitu sub 2 hic & deducto
 intueri nequis. Septum namq; illud praesenti sectione in duas partes, anteriorem scilicet & poste-
 riorem diuisum cernitur, ac 4 quidem partem ipsius notat anteriorem, 5 uero posteriorem.

Secundae effigiei omnia cum nuper commemorata sunt communia, nisi quod uniuersa propemodū
 renis substantia septum illud constituens, cultello orbiculatim adempta sit, neque aliter sanē sep-
 ti illius figuram ob oculos ponere licuit. Conspicitur hic itaq; secundus renis sinus uniuersus, at
 non quemadmodum est bipartitus, eo quod septum abstulerim sinum hunc in exteriori ipsius late-
 re dirimentem. a igitur & B & γ & δ eadem hic quae in prima tabella notant. Circulus autem
 8. 8. inter a & B ductus, secundum renis indicat sinum. 9 uero anteriorem partem primi sinus, seu mem-
 9. 9. branei corporis, quae haec in ramos discinditur. 10 corporis membranei posteriorem partem indi-
 10. 10. cat. adeo ut 11 & 12 simul membraneum notent corpus, seu primū renis sinum: 13 autem urinarij mea-
 tus insignitur origo.

Tertia tabella primi sinus seu membranei corporis ra-
 mos omnes insinuat, renis enim substantia, quae summis eius sinus ramis adnascitur, penitus derasa
 est. Atq; haec citra characterum operam sunt obuia.


VIGESIMASECVNDA QVINTI LIBRI FIGVRA.



- P R A E S E N S** figura sectionis serie uigesima succedit. in hac namque costarum aliquot fines effracti, & extrorsum sursumque retorti occurrunt, ut iecoris gibbum ita hic spectare tur, ut ipsius cauum in uigesima figura in conspicuo erat. Renes hic etiam pingui illorum tunica denudati sese offerunt. In hac figura uenarum arteriarumque seminalium exortus ductusque etiam ostendēte, priuatim à caua uenae caudice ramulum pronasci effinximus, qui sinistra seminali cō miscetur uenae. Præterea peritonæum quā uasis seminarijs iter præbet, inā cum tunica à peritō neo pronata, testemque sui lateris uasa seminaria amplectente, dissectum est, & cum seminarijs uasis testes cum suis musculis obuij sunt. Insuper pubis ossa inuicē ita dirempta atque adeo re flexa uidentur, ut inuicē insigniter debiscant, & uesticā, & glandosum corpus uesticæ ceruici pro priū, unā cū ipsius musculo & penis corporib. eorundemque progressu oculis subiiciātur. Quod au tē à dextro femore cutē prorsus & à sinistro aliqua ex parte ademinus, neminē ambigere reor.
- a, a Peritonæi pars cum septi transuersi portione, & effractis costis sursum extrorsumque reflexa.
- b, b Iecoris gibbum. c, c Caua iecoris sedes.
- d Præcipuum iecoris ligamentum, ad dextrum latus mucronatæ cartilaginis consistens, & hic à iecoris anteriori sede magnā ex parte diuulsum.
- e Ligamentum iecoris partem in sinistram protensam septo committens.
- f Venæ portæ portio, unā cum arteria & neruis iecur petentibus, et bilis uesticulæ meatu intesti na petente, hic uinculo est intercepta, & dein præsecta.
- g Venæ caue caudex. h Arteriæ magnæ truncus deorsum spinæ exporrectus.
- i Principium uenæ pinguem sinistri renis tunicam adiuuans.
- k Radices arteriarum in intestina excurrentium, & uentriculo, iecori, bilis uesticulæ, lieni, et ip si demum omento ramos offerentium.
- l Initium uenæ dextri renis pingue inuolucrum petentis.
- m Venæ ac arteria dextrum accedentes renem.
- n Venæ ac item arteria sinistro reni serosum sanguinem deducentes.
- o, o Dextri renis pingue inuolucrum, ab anteriori sede renis liberatum.
- p, p Sinistri renis pingue inuolucrum, ab anteriori etiam sede sui renis diuulsum, et peritonæo unde principium ducit, adhuc connexum.
- q, q Et dexter & sinister meatus, quo urina ē renibus in uesticam fertur, q insignitus est.
- t Seminalis uena dextrum testem accedens testem.
- u Principium seminalis uenæ dextrum testem adiuuans, quod instar rotundi tuberi prominet.
- x Seminalis uena sinistro testis exporrecta.
- y Venula à uenæ caue caudice pronata, ac uenæ seminali sinistra commixta unita ue. Quamuis enim hæc uenula rariū occurrat, tamen quum in alijs figuris sinistra uena absque hac delineat ur, illaq; hic nihil obscuret, ipsam exprimere uisum est.
- z Seminalium arteriarum origo.
- β Surculi, quos uenæ seminariæ peritonæo inibi depromunt, quā ipsi connexæ deorsum ad pubis ossa contendunt.
- γ Dextræ seminalis uenæ, & item arteriæ, per peritonæum supra pubis ossis coxendicisq; regio nem descensus, ac ascensus pariter semen à teste deferentis uasis, quod n, i & n mox notabitur.
- δ Venæ seminalis & arteriæ commixtio, & corporis quod uaricum imagini conferam, initium.
- ε Varicosi corporis in testem insertio. ζ Testis intimo ipsius inuolucro obteclus.
- η Principium semen à teste deferentis uasis.
- ι Sedes quā deferens semen uas sursum secundum testis humillimam sedem reflectitur, & à teste ipsi non amplius connatum, abscedere incipit.
- κ Hic semen deferens uas nullam amplius conuolutionum ostendit speciem, at sursum instar nerui teres porrigitur.
- ν Vescicæ urinæ receptaculum.
- ξ Glandulosum corpus uesticæ ceruicis initio adnatum, & semen deferentium uasorum insertio nem excipiens.

- 3 Circularis uesicae ceruicem ambiens musculus.
 9. T. Duo penem constituentia corpora, quorum sinistrum à suo principio quod à sinistro pubis osse ducitur, liberatum est: dextrum autem corpus suo principio adhuc pubis dextro ossi firmatur. Præterea hic S nostri figura in cōspicuo est, quā penis flaccidus lāgidusq; cū uesica effingit.
 V. Venarum & arteriarum neruorumq; penem aduentium series, tam apte ac in huiusmodi figuris id moliri datur expressa.
 Φ. X. Primum exterius ue testis peculiare inuolucrum à peritonæo inibi pronatū, ubi Φ ascripsimus, ubi uerò X locatur, ea eius inuolucris sedes notatur, quā hæc infimæ testis parti connascitur.
 † Testis musculus iam dicto inuolucro innatus.
 ω Musculus femur mouentium septimus hic se spectandum offert, quā super coxendicis os deorsum ducitur.
 * Recti intestini portio, quæ in corpore dum intestina reliqua auferuntur, relinqui consuevit. Super pra hanc recti intestini portionem eleganter quoque uenæ cauæ & arteriæ magnæ distributio circa ossis sacri regionem uisitur.

VIGESIMATERTIA QVINTI LIBRI
FIGVRA.



VIGESIMATERTIAE FIGVRAE, IPSIVSQVE PARTIVM
& characterum Index.

VIGESIMA tertia figura multas peculiareffigies, tabellâs ue, simul cum illa quæ mox præcessit, ac ordine uigesimæ secunda fuit, potissimum ad uirilium organorum generationis inspectionem facit, & ambas quum primum characteribus insignirentur, decimotertio huius libri Capiti præponendas ducebam. unde etiam in utrisq; eadem prorsus est characterum ratio. Verum quod iam satius fore arbitrer omnes præsentis libri figuras hic seriatim col

loca

locari, priuatim indicem huic uigefinatertia figuræ dedicabo, characteres quæ huic & uigefinatertia figuræ communes sunt, denuo non grauate explicaturus. Porro in hac uigefinatertia figuræ duæ sunt præcipuæ effigies, quarum unam non inopportune dextram, alteram uero sinistram appellabimus. ac in utrisque quidem effigiebus renes, uesicæ & seminaria organa cum uenæ cauæ et arteriæ portionibus exacta è corpore finximus. Atque hæc quidem in dextra anteriori facie, in sinistra autem posteriore delineantur. & in dextra adhuc priuatim uesicam, & ipsius ceruicem seu meatum semini urinæque communem aperuimus, quum hæc in sinistra adhuc sint integra: quem admodum in characterum explanatione dicturus sum diffusius, simulatque effigies expressero, quæ sinistrum latus & inferiorem præsentis uigefinatertia figuræ sedem occupant, ac maiusculis Latinorum literis in hunc modum notantur.

- A, B.** Duabus his tabellis dextrum testem anteriori facie, at magis secundum sinistrum latus ostendentibus, idem exprimitur. uerum superior *A* insignita ab inferiori *B* indicata in hoc differt, quod ipsa semen deferentis uasis situm inturbatum ostendat: quum interim inferior *B* notata deferentis semen uasis partem, quæ secundum testis anteriora sursum fertur, neque amplius testi adnascitur, ex sua sede sinistrorsum habeat reflexam, detrusam uel, ut in insertio applicatioque uenæ & arteriæ seminalium ad testem in conspectum ueniret. At hæc characterum utriusque effigiebus *A* & *B* insignitis communium opera reddentur dilucidiora.
- C** Vena & arteria seminales illic abtruncatæ, ubi iam ex magna peritonæi amplitudine excident, inuicem implicantur, commiscunturque, ac corpus quod uaricosum mihi appellabitur efformare incipiunt, seu huius uaricosi corporis quod pyramidi æsimilabitur conus.
- D** Basis uaricosi corporis, seu sedes quæ uenæ & arteriæ seminalis testi inseruntur, & ramulos in testis intimum inuolucrum & testis substantiam spargunt.
- E.** Vasis semen à teste deferentis initium.
- F** Reflexus uasis semen deferentis secundum testis humiliorem sedem.
- G** Sursum conscendens deferentis semen uasis portio, & ipsius regio in qua amplius testi connasci desinit.
- H** Præsens effigies deferentis semen uasis portionem ostendit, quæ testis intimo connata erat in uolucro: & foraminula illa asperitatibus cernuntur, quæ in eius uasis sede post sectionem conspiciuntur, quæ in uolucro illi connascebatur.
- I** Hæc effigie eadem uasis semen deferentis portio, quæ et mox præcedenti delineatur. uerum hæc sedem eius portionis ostendit, quæ gibba est, testisque in uolucro non connascitur.
- L** Testis à quo semen deferens uas abscellum est, ipseque adhuc testis cum intimo ipsius in uolucro et uaricoso corpore remansit.
- M** Hæc eadem cum effigie *L* notata indicat. uerum ut illa anteriorem testis faciem exprimebat, ita hæc posteriorem: & duæ subsequentes notæ utrique sunt communes.
- N** Prima uenæ & arteriæ seminalium commixtio, seu uaricosi corporis conus.
- O** Varicosi corporis basis, & in testis substantiam ipsiusque intimum inuolucrum insertio.
- P** Testis suo intimo adhuc obductus in uolucro, sed à uaricoso liberatus corpore, & superiorem ipsius regionem ostendens, in qua uaricosum illud corpus inseritur. Apparent namque hic foramina ramulorum uaricosi corporis, qui (uti dicebam) testi implantantur.
- Q** In hac effigie intimam testis tunicam inuolucrum uel nouacula diffecit, & ex altero latere à testis substantia eius inuolucrum partem *R* notatam diremi, in posterioraque reflexi, ut ductus in conspectum uenirent, qui à ramis inuolucrum intertextibus in testis substantiam pertinent.
- S.** teram uero huius inuolucrum partem *S* insignitam, testis adhuc connatam reliquit.
- T** Hic testis per medium diffectus iacet, uasorum per ipsius substantiam diffusorum, ac *V* & *V* naturam distributionisque seriem commonstrans. Qui uero modo subsequuntur characteres, duabus grandioribus & magis præcipuis uigefinatertia figuræ effigiebus proprii habentur.
- 1** Hæc numeri nota indicatur anterior renis regio.
- 2** Posterior renis regio.
- 3** Superior renis regio.
- 4** Inferior renis regio.
- 5** Externum renis latus.
- 6** Internum renis latus: in quo **6, 7, & 8** sinum eius lateris indicant. uerum **6** priuatim notat eius sinus tuber. **7** autem & **8** sinus eius angulos impressionesque.
- g** Venæ cauæ caudex, inibi abscissus, quæ deorsum tendens iecur superauit.

- h Arteriæ magnæ truncus inibi resectus, ubi primum sub septo transverso in peritonei amplitudinem fertur.
- k Radices arteriarum quæ mesenterio & inferiori membrana omenti digeruntur.
- l Venæ pinguem dextri renis tunicam petentis principium.
- m Venæ & arteria dextro reni serosum sanguinem deducentes.
- n Venæ & arteria sinistro reni in serosi sanguinis ductu famulantes.
- o Venæ in pinguem sinistri renis tunicam excurrentis origo.
- q. q Meatus urinæ in renibus in uesticæ amplitudinem deportantes.
- r Meatus urinæ uesticæ deducendum in uesticam insertio, ac in dextra quidem effigie orificia indicantur, quæ hi meatus in uesticam pertinent, & membranei processus quodq; bis orificijs præfecti, in sinistra autem effigie sedes indicatur, quæ illi meatus primum uesticæ appllantantur.
- t Seminalis uena dextra.
- u Tuberculum, seu protuberans seminalis uenæ dextri lateris principium.
- x Venæ seminalis sinistrum petens testem.
- a Seminalium arteriarum ex magnæ arteriæ caudice initia.
- ß Surculorum radices quos uenæ seminales peritonæo offerunt, quæ illi secundum lumborum regionem committuntur.
- δ Venæ arteriæq; seminalium coitus commixtio, & uaricosi corporis initium.
- ε Venæ & arteriæ seminalium ad testem insertio, seu uaricosi corporis basis.
- ζ Testis intimo ipsius inuolucro adhuc obiectus.
- η Principium uasis semen à teste deferentis.
- θ Descensus uasis semen deferentis secundum posteriorem testis regionem.
- ι Locus quo deferens semen uas rursus secundum testis humiliora sursum fertur, neq; amplius testis conuascitur, uti faciebat ab η per θ ad ι.
- κ Sedes deferentis semen uasis, ubi primum nerui modo citra omnem reuolutionem spiram uersum properat.
- λ Hac sede semen deferens uas ad posteriorem regionem uenæ ac arteriæ seminalium reflexum, in peritonæi amplitudinem contendit.
- μ Dextri semen deferentis uasis cum sinistro coitus, propter uesticæ cervicis initium.
- ν Vescica, quæ in dextra effigie priuatim ad aperta est, ipsius demonstrans cavitatem.
- ξ Glandulosum corpus uasorum semen deferentium insertionem excipiens, ac in dextra effigie longa sectione ad meatus usq; urinary amplitudinem dissectum.
- ο Amplitudo cavitatisq; cervicis uesticæ, in quam uasa semen deferentia insertionem moliuntur.
- ρ Musculus uesticæ cervicem ambiens, ac urinæ excretioni præfectus.
- σ & τ Duo penem potissimum constituentia organa.
- υ Venæ ac item arteriæ penem cervicemq; uesticæ accedentes.
- φ Sedes notatur meatus urinæ seminiq; communis, quæ reliquo ipsius ductu amplior in penis glan de uisitur.

VIGESIMAE QVARTAE FIGVRAE, EIVSDEM QVE
characterum Index.

FIGVRA sequentem paginam occupante muliebris corporis truncus humistratus ex primitur, cuius peritonæum unâ cum abdominis musculis adaptum est, ac in latera (uti inter secundum sit) reflexum. Deinde intestina omnia à mesenterio præsecuimus, recto intestino adhuc in corpore relicto, simul cum integro mesenterio, cuius membranas hic aliqua ex parte inuicem diremimus, ut mesenterij natura oculis subiceretur. Verum præsens figura in hoc potissimum delineata est, ut uteri & uesticæ positum ita ostenderet, quemadmodum in hac muliere utero nobis nulla ex parte moto, is occurrit. Nulla enim hic ab utero diuisa est membrana, sed omnia integra ita hic uisuntur, quemadmodum in mediocriter obesis mulieribus iam amotis intestinis secanti obuiam ueniunt. Mulieres namque adeo pingues sunt, ut longo etiam morbo enecatæ & macilentissimæ, nullam uasorum seriem (nisi membranis mutuo diremptis) ostendant.



- A, B, C, D Peritonæi anterioris sedis interior superficies.
E, E Mesenterij pars tenuia intestina dorso connectens.
F, F Altera mesenterij membrana notatur, ab altera quam G & G in signiui diuisa. Vtraq; au-
G, G. tem membrana uasorum per mesenterium seriem, et glandularum uasorum distributionibus in-
terpositarum naturam indicat.
H, H Hac mesenterij parte colon intestinum, quæ recto erat proximum, committebatur.
I Hac mesenterij parte, coli intestini initium, seu ipsius cum tenuibus intestinis continuas, de in-
cæcum quoq; intestinum consistebant.
K Rectum intestinum inibi præsectum ubi colon desinit, quæ sedes est è regione connexus sacri of-
sis cum infima lumborum uerthebra.
L Anterior uteri fundi sedes, à qua nihil prorsus auulsus cernitur.
M Dexter mulieris testis.
N Mulieris sinister testis, atq; huius anterior pars hic tota oculis subijcitur, quum interim dextri
testis modica uideatur portio: idq; ideo accidit, quod dextrum testem ita delineauerimus, quem
admodum uterque testis membrana tegitur seminaria mulieris uasa deducente, atque à perito-
neo nata: sinistrum uerò testem illa membrana deteximus, quòd solius manus, nullo adhibito cul-
tro, sit beneficio. Hæc namque membrana anteriori testis sedi nulla ex parte adnascitur, sed
incumbit solum.
O, O Membrana à peritonæi dextra sede pronata, & testem dextrum una cum huius lateris semi-
nalibus uasis, ac illis quæ uteri elatiorem sedem implicant uasis, dorso committens, uterumq; pa-
riter continens, & deniq; cum alterius lateris membrana secundam uteri tunicam constituens.
P Hæc in nuper dicta membrana carnes excurrunt fibræ, dextrum uteri constituentes musculi.

His

A praesentis figurae dextra mamilla cutem abstulimus, ut quam fieri posset proximè mamillari natura hic oculis subijceretur. Deinde uenter, & cum intestinis mesenterium et lienem resecuimus, recto interim intestino non secus quam in mox praecedente figura relicto. Ad haec, uterum suo extimo quod peritoneum ipsi porrigit inuolucro quodammodo spoliauimus, omnes membranas quam licuit accuratissime passim, ideo amputantes, ut seminis materiam testibus deferentia & rursus semen ab his utero deducunt uasa in conspectum uenirent. Vesicam uero deorsum in sinistram latus refleximus, una meatum à dextro rene ipsi urinam deferentem abrumpentes, ut urinam uesicae deferentium meatuum insertio appareret, ipsa quoque uesica uteri inspectionem non occuparet. Postremo pubis ossium portionem ab hac figura exsecuimus, quo uteri ceruix ac uesicae etiam collum apposite uiderentur.

- A, A* Venae ad mamillas subinde excurrentes ab illis quae cuti summo humero obductae offeruntur.
B Venae ab illis pronatae quae per axillam in manum porriguntur.
C Praecipuum mamillae corpus.
D, D Glandulae ac adeps undecumque corpori illi glandoso ac C insignito adstratae.
E, F G, H Peritonaei anterioris sedis interior superficies, est enim hic anterior peritonaei regio, ad latus, & sursum deorsumque flexa.
I, K Venarum ac item arteriarum sub pectoris osse deorsum à iugulo prorepentium portiones.
L Iecoris gibba sedes.
M Iecoris cauum hic quoque aliqua ex parte conspicuum.
N Venae ab umbilico iecur petentis portiuncula.
O Venae portae caudex hic simul cum uasis ipsi attensis praefectus.
P Venae caua.
Q Arteria magna.
R Arteriarum uentriculi, iecur, lienem, omentum ac intestina petentium radices.
S Principium uenae pinguem sinistri renis tunicam implicantis.
T Venae ac arteriae dextro reni serosum humorem deducunt.
V Venae ac arteriae sinistro reni serosum humorem deferentes.
X Principium uenae pinguem dextri renis tunicam adcurrentis.
Y Dextri renis anterior sedes.
Z Sinistri renis anterior facies.
a, a Meatus à dextro rene urinam in uescicam deducens, & ad humilium a effractus. portio autem humilium a meatus reliqua, ac uesicae adhuc continua, b insignitur.
c, c Meatus urinam à sinistro rene in uescicam deferens.
d, d Dextra seminalis uena, cuius initium clatius d indicat.
e Seminalis uena sinistram petens testem.
f Seminalium arteriarum ortus.
g Seminalis arteria dextra.
h Seminalis arteria sinistra.
i, k, l Anterior uteri fundi pars. ac i dextrum fundi obtusum indicat angulum, k autem sinistram, l uero regionem uteri ubi ipsius fundi consistit orificium, ipsiusque ceruix inchoatur.
m Rectum intestinum. quo minus utrumque figurae latus inibi ubi par utrinque est ratio onerem, unduntaxat lateri iam characteres opportune adhibebo.
n Venae ac arteriae seminalis portio, uteri fundi superiorem accedens sedem.
o Venae ac item arteriae seminalis portiones testem adcurrentes, et inuicem coeunt, corpusque instar pyramidis constituentes. ac p huius corporis basim notat, testis commissam.
q A nuper dicto corpore eiusmodi uascula in membranas excurrunt, testem peritonaeo committentes.
r Testis anterior facies.
s Vasis semen à teste in uterum deferentis initium.
t, t Vasis semen deferentis reflexus, quos id circum testis latera conficit.

u Vasis

- u Vasis semen deferentis ad uterum progressus.
 x, x Uteri ceruix.
 y Vasa inferiorem uteri fundi sedem ac uteri ceruicem implicantia.
 * Vena uesticam ab illis uasis accedens, quæ uteri ceruicem intextunt, atque hic etiam chara-
 cter urinariorum meatuum insertionem notat.
 α, β Vescicæ fundi posterior sedes.
 γ Vescicæ ceruicis musculus.
 δ Hac sede uesticæ ceruix uteri ceruici implantatur.
 ε Cuticulares ceruicis uteri orificij carunculæ, atq; hic uteri colles & ceruicis ipsius orificium,
 citra characterum operam neminem latent.
 } Arteriæ humillimam mesenterij partem accedentis radix.
 * Vasa ab illis quæ crus ad eunt uenis ac arterijs sursum ad abdominis musculos ascenduntia.

VIGESIMASEXTA QVINTI LIBRI
 FIGVRA.




VIGESIMÆ SEXTÆ FIGVRAE EIVSDEM QVE CHA-
 racterum Index.

- P R A E S E N S figura uterum unâ cum illum peritonæo alligantibus membranis à cor-
 pore exsectum commonstrat. atque ipsius ceruix adeò hic sursum est conuoluta euer-
 saq; ut fun-
 di uteri orificium in conspectu sit. Vescicæ uerò fundum & ceruicem quoq; aperuimus, ut uesticæ
 cavitates meatuumq; urinariorum insertio in propatulo essent.
 A Uteri fundi anterior facies, nulla membrana prorsus detecta.
 B, B Uteri ceruix.
 C Fundi uteri paræ glandis modo in superiorem uteri ceruicis sedem protuberans.
 D Orificium fundi uteri.
 E, E Membrana uterum peritonæo connectens, ipsiusq; uasa continens.
 F Sinister uteri testis.
 G Vena & arteria seminalis.
 H Portio uenæ ac arteriæ seminalium, uteri fundi superiorem sedem accedens.
 I Portio arteriæ & uenæ seminalium testem accedens.
 K Vasa semen à teste in uterum deducens.
 L Vescicæ cavitates.
 M Urinariorum meatuum insertio.
 N Urinariorum meatuum frustula hic propendunt.

PRÆSENS figura uterum à corpore exectum ea magnitudine refert, qua postremo Patauij dissecta mulieris uterus nobis occurrit. atq; ut uteri circumscriptionem hic expressimus, ita etiam ipsius fundum per mediū dissectuimus, ut illius sinus in conspectum ueniret, una cum ambarum uteri tunicarū in non prægnantibus substantiæ crassitie.

- A, A, B, B* Vteri fundi sinus.
C, D Linea quodāmodo instar suturæ, qua scortum donatur, in uteri fundi sinum leuiter protuberans.
E, E Interioris ac propriæ fundi uteri tunicæ crassities.
F, F Interioris fundi uteri portio, ex elatio ri uteri sede deorsum in fundi sinū protuberans.
G, G Fundi uteri orificium.
H, H Secundum exteriusq; fundi uteri inuolucrum, à peritonæo pronatum.
I, I et c. Membranarum à peritonæo pronatarum, & uterum continentium portionem utrinq; hic asseruauimus.
K Vteri ceruicis substantia hic quoque conspicitur, quod sectio qua uteri fundum diuisimus, inibi incipiebatur.
L Vesicæ ceruicis pars, uteri ceruici inserta, ac urinam in illam proiciens. Vteri colles, & si quid hic spectādum sit reliqui, etiam nullis apposis characterebus, nulli non patent.

8 VIGE.



VIGESIMAOCTAVA QVINTI LIBRI FIGVRA.


HÆC figura canum non prægnantē exprimit uterum, quem propter uterum descriptiones hic humano utero adijcere uisum est, uti magis adhuc uaccinum, quem modò subiungemus.

- A* Vena & arteria seminalis.
B, B Venæ et arteriæ seminaliū portiones, uteri superiori sedi uasa porrigētes.
C Testis, ac uas semen à teste deferens.
D, D Membranae uterum peritonæo committentes, & secundum ipsius inuolucrum efformantes.
E Vena ac arteria uteri ceruicem & humiliorem fundi partem implicantes.
F Dextra fundi uteri pars, secunda ipsius tunica adhuc uniuersim obducta.
G Sinistra fundi uteri pars, quam media ex parte, exteriore ipsius liberaui-
H mus inuolucro. *G* enim exterius, *H* uerò interius notant.
I Sinistri lateris uas semen deferens, hic à teste liberatum, ac in ipsius sede ser-
 uatum.
K Regio, qua fundi uteri orificium consistit.
L Uteri ceruix etiam sinistra ex parte exteriori inuolucro detecta.
M Portio ceruicis uesicæ.
N Cutis ad pudendum adhuc reliqua.

VIGESIMANONA QVINTI
LIBRI FIGVRA.

PRÆSENTI figura uaccini uteri fundum, & ipsius ceruicis portionem ita delineauit, ut magna fundi ceruicisq; sedes exteriori inuolucro sit detecta, interiorq; tunica oculis subijciatur.

- A* Testis sinister.
B Vas semen deferens à teste in uterum.
C Sedes orificij fundi uteri.
D Sedes ubi uterus geminus sit, adhuc tamen utraq; parte simul exte-
 riori uteri inuolucro obiecta.
E Hac sede prorsus duæ uteri partes inuicem, arictum cornuum mo-
 do dirimuntur.
F, F Externum uteri inuolucrum his sedibus adhuc seruatum.
G Interius uteri inuolucrum innumeris ac uermium implexu non absi-
 milibus uasis intextum.
H Membranae hic adhuc uisitur portio, uterum sinistra in sede perito-
 næo committentis.



TRIGESIMA QVINTI LIBRI FIGVRA,

QVATVOR PECVLIARIBVS COMPLEXA TABVLIS.

PRIMA. SECUNDA. TERTIA. QVARTA.



TRIGE-

PRIMA tabula uterum masculino foetu turgidum, in anteriori ipsius sede una longa & altera transversa sectione diuisus, uteri fundi tunicarum partes in latera, atque adeo ab exitu foetus inuolucro diducentes.

A, B, C, D. Interna superficies uteri, quæ ante sectionem foetus inuolucris obducebatur.

E, E Exterior uteri superficies, atque elatius **E** uteri apicem seu angulum dextrum notat, sursum dextrorsumq; magis quam sinister, quod hic masculus utero geratur, ex porrectum.

F Primum extimum ue foetus inuolucrum.

G, G Secundum foetus inuolucrum hic quoq; magna ex parte uisitur.

H Uteri cervicis pars, cui in altero latere uenam & arteriam adnatam reliquimus, quæ in humilioris uteri fundi sedem potissimum dispensatur.

I Dexter uteri testis hic quoq; ut ipsius in grauidis situs uideretur, adhuc relictus.

SECUNDA tabula foetus inuolucra illacera ex utero decepta commonstrat.

K Extimum foetus inuolucrum.

L, L Secundum foetus inuolucrum: quod quum pellucidum membranæ modo sit, in ipso complexu cum tertio inuolucro foetum nonnihil conspici sinit.

TERCIA tabula extimum foetus inuolucrum, & secundum longa sectione diuisus, ac utraq; a tertio inuolucro seducta, hic una cum tertio inuolucro adhuc integro expressimus.

M, M Tertium intimum ue foetus inuolucrum: quod quia egregie pellucidum est, foetum nonnihil eo situ ostendit, quo is in ipso iacet.

N, N Venarum articularumq; series ex primo foetus inuolucro umbilicum petens.

O, P, O, P Secundum foetus inuolucrum: atque **O** & **O** internam ipsius indicat superficiem, **P** uero & **P** externam.

Q, R Primum foetus inuolucrum: atque **Q** externam notat superficiem, **R** autem internam. Vasorum autem per tertium & secundum inuolucrum series, etiam citra notarum opem promptè dignoscitur.

QUARTA tabula foetum omnibus suis tunicis liberum, itaq; iacentem exprimit, quemadmodum in utero magna Naturæ providentia secus quam Anatomicorum uulgus arbitrat, in omni media figura locatur. Falsissimum nanque est, quod ita conglobatus, aut (ut sic dicam) sphericus iaceat, ut genibus faciem contingat, itaq; in extrema prorsus figura reperiatur. imò si hunc uerum ipsius situm obseruaueris, nullius prorsus articuli motum magis inuenies medium minus ue laboriosum, atq; is est quem modo singuli obtinēt articuli. Cæterum in hac figura

M, M, N, O, P, O, P, Q, Q ac **R** idē notāt quod tertia tabula: nisi quod **M** & **M** internam superficiem insinuant tertij seu intimi inuolucris, **S** autem hic priuatim indicatur uasorum umbilici progressus, qui inter umbilicum & uasorum cum tertio inuolucro connexum habetur, quiq; longo ducitur intervallo, nodis aliquot interdum, aut, ut uerius dicam, uaricosis tuberculis donatus, è quorum numero obstetrices ridiculè futuram adhuc proliū copiam præsagiant, etiam quum hunc progressum (uti interdum fit) collo obductum cernunt: addentes illam quam suscipiunt prolem, suspendio necandam. Eiusmodi namq; permulta, si unquam alibi mulieres, quum parturientibus adstant, & non nisi magnis precibus nos admittunt in medium, & potissimum apud Italas bene peritas, effutunt.

HOMINEM NECESSARIO CORRUPTIONI

obnoxium mortalem esse: quo autem diutius uiuere augereturq; instrumentis ipsum eguisse multifariam nutritionis famulantibus, ac demum quæ instrumenta nutritioni circa cibos potusq; uersanti priuatim sint extructa. Caput I.

Generationis
nostræ princi-
pia.



Corruptela
homini con-
nata necessi-
tas.
Nutritionis
necessitas.

Instrumento
tripliciter nu-
tritioni subser-
uiendum ne-
cessitas.

VANDO QUIDEM corporis humani generatio-
nis primordia, & eorum quibus id constituitur mate-
ria, hominem fieri immortalem prohibuerunt, rerum
autor Deus, ut ille quàm diutissimè uiuat, neq; aliquā-
do species ipsius deficiat, sed semper immortalis perse-
ueret, sollicitè machinatus est. Sanguis enim mēstruus
semenq; genitale generationis nostræ sunt principia:
ille ceu materia quædam apta concinnatq;, & femini
ad quiduis sequax; hoc opificis rationem obtinens.
Constat autem horum utrumq; ex ijdem genere ele-
mentis, aqua, terra, igni, & aëre, quamuis interim mu-
tuo temperamenti mensura uariant. siquidem in semī-
ne plus est igneæ substantiæ atq; aëreæ, in sanguine a-
queæ terreæq;. quanquam præpolleat in hoc quoq;

& calidum trigidum, & humidum siccum. Eoq; fit, ut non siccus instar pili, aut ossis, sed humidus
merito dicatur. At semen sanguine quidem siccus est, ceterum ipsum etiam humidum fluxileq;
sentitur. Atq; ita nobis utrinque ex humida substantia genituræ origo succedit. quam tamen
humidam seruari non licebat, si modò ex ea uenæ, arteriæ, nerui, membranae, ligamenta, carti-
lagines, ossa, & id genus alia fieri debebant. Ergo mox in generationis initio coniunctum
copiosius oportuit elementum, quod siccandi facultate polleret: est uero id natura quidem ma-
ximè ignis, sed tamen & terra. Verum huius plus misceri principijs nō oportebat, si modò hæc
humida erant futura. Ignis igitur in utroq; principio tantum admixtum est, quantum non tor-
rens abundè siccet. Ab hoc itaq; primum cogitur, paulumq; conrescit quod in utero concep-
tum est: mox siccus redditum, ueluti lineamenta quædam & rudimenta cuiusque membri
adipiscitur. Vterius uero etiam siccescens, non lineamenta rudimenta uel solum, sed & cuiusq;
memברי exactam speciem exprimit. Iam uero in lucem editum, magnitudine proficit, & siccus
ualentiusq; tantisper efficitur, donec ad summum pertingat incrementum. Tum uero & incre-
mentum omne sistitur, ossibus nimirum ipsis per siccitatem non ultra sequacibus, & uasa san-
guinis ac spiritus amplissima sunt: cuncta denique membra non solum robusta euadunt, sed
etiam uires suas summas obtinent. Subsequenti autem tempore, omnibus iam partibus supra
iustum siccescitibus, non solum cuiusque officium minus probè administratur, sed etiam cor-
pus ipsum macilentius graciliusq; quàm erat antea, redditur: ac proinde ultra siccitū, non ma-
cilentius modò, sed & rugosum euadit. Siccitatis itaq; excessus homini, ut omni genito corpo-
ri, corruptelæ interitusq; connata est necessitas. Cui altera accedit, quæ etiam in animalibus præ-
cipue obseruatur, totius nimirum substantiæ fluore, ab insito calore excitatus. Quum igitur to-
ta hominis moles in perpetuo fluore sit, quumq; nisi altera similis substantia in defluxæ locum
accederet, uniuersa ilico euaporata dissiparetur, summus rerum Opifex non homini duntaxat
cæterisq; animalibus, uerum etiam stirpibus insitas quasdam uires deficiēs ac desideratum sem-
per appetentes, ab initio statim indidit. Non enim sugere, uelci, bibere, aut respirare à quoquā
discimus usquam, sed statim à principio facultates in nobis habemus, quæ hæc omnia citra do-
centem perficiant: & cibo quicquid siccioris substantiæ effluxit restituiamus, potione quicquid
humidius, atq; ita ad pristinam commensurationē ambo reducimus. Sic uero & aëreæ igneæq;
substantiæ modum, respiratu arteriarumq; pulsū tuemur. Cæterum quum id quod singulis
partibus defluit, tale natura sit, qualis ipsa est particula, nihil autem eorum quæ bibuntur edun-
tur uel, aut inspirantur, eiufmodi prorsus occurrat, necessum fuit animanti, ea primum assumere,
dein emutare & concoquere, ac quàm maximè licet, corpori alendo restituendoq; similia ef-
ficere, ac demum recrementa quæ necessariò has emutationes subsequuntur expellere. Atque
hac potissimum occasione Natura nutritionis instrumenta in corpore triplicia instituit: quæ-
dam prima ratione ad id quod assumitur concipiendum elaborandumq;, & in totum corpus
deferendum, alia secunda, quæ excrementorum sunt receptacula. Reliquas partes ratione ter-
tia, quæ horum excretionibus mittendis, & ne intempestiue profluant cohibendis, suoq; tem-
pore

pore expellendis subseruiant. Porro partes aëri assumendo, conficiendo, deferendo, ipsius que recrementis ex cōcoctione succedentibus expellendis, à Natura conditas, sequens liber persequetur, cordi omnibusque respirationis organis dedicandus. Præfens uero cibi ac potus instrumentis, & demum generationi subministrantibus organis propter sedis uiciniam nexum que consecrabitur. Ex ore itaque per stomachum cibus & potus in uentriculum, uelut in communem quandam officinam seu promptuarium assumitur, quod omnia quæ amplectitur cogit, confundit, & concoquit, concoctum in intestina protrudit, ex quibus quod cocti illius succi melius est, sanguinisque efficiendo conueniens, unà cum humidiori huius concoctionis recremento uenæ portæ rami exugunt, id iecoris cauo deferentes. Recrementum uero siccus ac suctioni ineptum, intestina postmodum depellunt, & hominis arbitratu laxante se orbiculari podicis musculo, ac abdominis musculis, simul accedente etiam septi transversi officio compressis, excernunt. Ipsum autem iecur postquam id nutrimentum admisit, ei extremum adijcit ornamentum ad sanguinis perfecti generationem necessariū, duplici (quod in omni sit concoctione) recremento id expurgans: flaua scilicet bile, seu recremento tenuiori & leuiori: deinde atro bilioso succo ceu lutofo, terrestri & crassiori. Illud quidem in bilis uesiculae meatus transmissum, in ipsam uesiculam refluit, à qua rursus in intestina excretum cum durioribus siccibus egeritur. At hoc, uti arbitramur, per portæ uenæ ramos ad lienis nutritionem transmittitur: quicquid uero is conficere ac in familiare nutrimentum sibi adaptare nequit, id in uentriculum eructat, postmodum cum intestinorum excrementis subducendum. Ergo qui in iecore ad hominis nutritionem præparatur succus, illa duo recrementa deponens, & eam iecoris substantiæ insiti caloris beneficio concoctionem acquirens, ruber iam ac purus ex arctissimis maximeque frequentibus uenæ portæ ramis per iecoris substantiam diffusis, ad gibbam iecoris partem in cauæ uenæ propagines similiter innumeras angustissimasque conscendit, tenui adhuc aquosoque recremento, quod ex intestinis cum optima succi in uentriculo confecti portione exugebatur, conconmitatus, atque eius aquosi recrementi tanquam uehiculari cuiusdam auxilio arctissimas uias minori opera perreptans. Quum uero sanguis eos superauit angustos, renes recrementum hoc ad se sedulo alliciunt, illoque sanguinem purgant, id per urinarios meatus in uesicam huius conceptaculum depellentes, à qua rursus opportuno tempore relaxato uesicæ ceruicis musculo, excrementum illud seu urina è corpore redditur. Sanguis autem per uenam cauiam copiosissimam ramorum serie propagatam, ad omnes corporis partes deducitur, & quod in ipso singulis partibus familiare ac idoneum est, illæ sibi attrahunt, assimilant, & apponunt: duplexque quod in illa concoctione confurgit recrementum, à se per proprios ductus excludunt. Ista quidem obiter de cibi potusque instrumentis dicta sufficiant. Quanta uero sapientia hæc rerum Opifex creauerit, eo ordine persequar, quo ipsa nutritioni famulari commemoratum est. A peritongo autem opportunè sermonis statuatur initium, quod id horum organorum commune sit inuolucrum.

DE PERITONÆO. Caput II.

PERITONÆO ostendendo plerumque conducunt figuræ, & potissimum prima, id integrum, anteriore externaque facie proponens. Secunda autem anteriorem ipsius partem interiori sede ostendit. Posteriores uero illæ figuræ imprimis intus referunt, quæ ex ipso plura organa gerunt dissecta, ut ex integrioribus figuris posteriores.



ATINI peritonæi (quod abdominis membranam aliqui nuncupant) Peritonæi no uocem à Græcis mutuauerunt, illis namque quod circuntendatur περιτρίβαινο, min. περιτρίβαινο, περιτρίβαινο appellatur. Neque ita absolute tantum, uerum à nonnullis hæc tota appellatio inditur, περιτρίβαινο ὕμνω, nomine uidelicet à substantia ipsius ducto. à nonnullis hæc περιτρίβαινο χιτῶν, sunt etiam qui περιτρίβαινο σκίπτωμα ipsum pariratione appellent, ab usu scilicet quo inuolucrum modo omnibus propemodum quæ hoc quinto libro prosequemur, organis obducitur. Arabes communi membranarum nomine ziphac & zimphac & chamel peculiariter id nominant. Verum in illorum interpretum libris, & apud nostræ ætatis manuales medicos, quum de abdomine luendo, & aqua in ijs qui hydropse laborant educenda, & rami cum curationibus pertractant, nomina occurrunt myriades: panniculus rotundus, albertiren, albertiron. Deinde absque articulo al, quem suis nominibus Arabes secundum loci exigentiam non mutato nominis significato præponunt, Beriteron, Berbetinen, eiusque generis

*Peritonæum
in similitudinem
partium nume-
ro.*

*Peritonæi ma-
gnitudo et fi-
gura.*

*Connexio or-
gani.*

Forma.

*Ipsum super-
ficies cuius-
modi.*

*Processus a
peritonæo e-
nati.*

*Peritonæi nō
undiq; pariter
crassum.*

*Quibus parti-
bus peritonæi
peruium sit.*

*Vasa et ner-
ui quibus peri-
tonæum impli-
catur.*

permulta. Peritonæum itaq; ex simplicium & primorum corporum, quæ similia etiam nun-
cupare solemus, numero censetur. Membrana enim tenuis substantie est, nullis omnino fibris:
seus ac uenarum arteriarumq; tunica, aut tenues ac membrane^s musculorum enervationes
intertexta, estq; inter cæteras corporis simplices membranas amplissima & maxima. Carnosa
namq; nobis uocatur mebrana, & si amplior ipso peritonæo sit, ac uniuerso corpori cutis modo
obducatur, tamen accuratè simplex non est, quū quibuscūq; carnæis donetur fibris, & musculosa
in ipso collo & fronte efficiatur. Porro peritonæū uniuersam¹ cavitatē, quæ sub septo transuer-
so, ad os usq; coccygis, totius corporis faciliē capacissima habetur, succingit, ac omnibus quæ illa
continent² organis obtenditur, eaq; conceptaculi ritu amplectitur: uentriculū scilicet, intestina,
omentū, mesenterium, iecur, lienē, renes, utramq; uesicā, uterum, & uasa demū quæcūq; inter se-
ptum transuersum & crura sitū habent. Atq; hæc quidē peritonæū interna ipsius sede cōtinet,
externa uerò undecunq; musculis cōnascitur. Ex ligamētis enim, quæ lumborū uertebras cōne-
ctunt, & quæ sacrum os illi ossibus cōmittunt, peritonæū utrinq; principiū ducit, mebrana³ late-
modo ab illis enascens. Mox ab utroq; latere ascendens, lumborū musculis, & ijs qui internā
ossis illiū sedem occupātes, femorū præsumt motibus, obducitur: & fibris quibus inuicē muscu-
los cōmitti uidemus, illis adhærescit. At ubi musculos, qui ternario numero utrinq; cōplectun-
tur, peritonæū superauit, internæ⁴ transuersorū ab dominis musculorū, & uniuersæ⁵ inferiori
septi transuersi sedi subtenet, pertinaçissimē ipsis, potissimum uerò neruosis illorū tenuitatibus
connatū, & quodāmodo propriæ musculorū membranæ uicē gerens. Refert itaq; peritonæū
oblongum oui instar uræ, seu sphaeræ aliquā, cuius longitudo pertinet à septo transuerso ad hu-
millimā amplitudinis sedem, quā⁶ sacrum os cum ossibus ipsius lateribus commissis latera. &
quemadmodū utres ex tergoribus parati, exterius hirti asperiq; intus plani ac leues admodum
esse solēt: ita quoq; peritonæū externa parte, ut aptius musculis undiquaq; hæreat, asperū fibro-
sumq; ad eum prorsus modū uisit, quo membranas mutuò cōnatas, inæquales esse dicimus. In-
terna autē peritonæi sedes, uiscera quæ cōplectitur spectās, impenitē leuis & terfa, ac ueluti aquo
humore oblita, secātib; occurrit, adipis interdū copiā sibi (ut in suis quasi perpetuò) adna-
tam obtinens. Verum hunc nō omni ex parte æquē copiosum reperiēs. Anterior namq; supe-
rior uel internæ huius peritonæi sedis⁷ regio qua uentriculū contingit, ac dein posterior quoq;
regio ad lumbos & sacrum os pertinet, copiosior abundat adipe, q̃ sedis eius internæ⁸ latera,
parsq; umbilico contermina. Præterea interna hæc peritonæi sedes portiones quasdā seu pro-
cessus ijs quæ cōtinet organis porrigit, illisq; processibus ea organa inuicē colligat, et sibi quoq;
adnectit, ac singulis præter peculiare ipsorū tunicas (si modò quas habeant) aliud etiā inuolu-
crum obducit. Atq; hinc etiā fit, ut ijs organis quæ duas peculiare fortuntur tunicas, quemad-
modum uentriculus & intestina, ternæ attribuantur: quæ autem unicā duntaxat peculiare tu-
nicam exigunt, e quorum numero sunt uterus & utraq; uesica, binas obtineant. Verum orga-
na nulla peculiari donata tunica, ut iecur & lien, eā quæ ipsis obducitur à peritonæo adipiscun-
tur. Quoniam pacto autem, quibusq; ex locis hosce processus in eiusmodi tunica degenētes,
peritonæū educat, & quo modo illi inuicem crassitie differāt, in cuiusq; organi enarratione op-
portunius quā hīc recensetur. Quemadmodū uerò interna peritonæi sedes ab externa uar-
iat, sic neq; omni ex parte peritonæū sibi crassitie & robore correspondet. Quā enim ex uerte-
brarū ligamenti pronascitur, crassissimū est: deinde quā lumborū incumbit musculis, crassum
quoq; cernit. Anteriori uerò parte, quæ à mucronata pectoris ossis cartilagine ad pubē usq; per-
tinet, peritonæū tenuius graciliusq; & inuoluitur reperitur, q̃ in lateribus & lumborū regione.
Ad hæc uiris peritonæū crassius ualidiusq; est iuxta mucronatā cartilaginē, quā iuxta pubis
sedem: in mulieribus uerò ad pubem crassius ualidiusq; neq; his, uti uiris, peritonæū hīc ad in-
guina utrobq; feminarijs uasis⁹ uia præbent. Est enim peritonæū peculiariter in uiris in bifor-
raminibus, ut ita dicam, peruium, & tunicam utriq; testis priuatim offert, quo is & ipsius femina-
ria uasa tuto obuoluuntur, ac dein in uiris pariter atq; in mulieribus, peritonæū quā septo sub-
ducitur, tria cum septo quoque communia exigit foramina: primum quo uenam cauiam, se-
cundum quo stomachum cum ipsi coherentibus neruis, tertium quo magnam arteriam uena
coniuge experti, & aliquot sexti paris neruorum cerebri ramis concommitatam deducit. Præter-
ea¹⁰ umbilici quoque uasorum gratia, & in mulieribus finis uteri¹¹ ceruicis, in uiro autem¹² cer-
uicis uesicæ, in utrisque uerò¹³ podicis nomine, peritonæum perforatur, ac demum¹⁴ multis
uenis, arterijs & neruis cras petentibus, deinde¹⁵ illis quæ maxima portione in rectos abdo-
minis musculos sursum tendunt, & alijs nonnullis quæ dorfi & abdominis musculis, & cu-
ti à uasis lumborum uertebris incumbentibus, peritonæum iter præbet, ab iisdem uasis furcu-
los sibi assumens. Quā enim septo subductum est, septi uasis ad nutritionem uitur, in la-
teribus

afi. ca. ill.
3 inferta, et
fi. ca. 2.
b. in abdo-
mine 3. 4.
5. 6. musculi.
tab. 1.
c. 3 musculi.
tab. 1.
d. 3 tab. A.
e. 7 tab. A.
f. 7 tab. A.
g. 7 tab. A.
h. 7 tab. A.
i. 7 tab. A.
j. 7 tab. A.
k. 7 tab. A.
l. 7 tab. A.
m. 7 tab. A.
n. 7 tab. A.
o. 7 tab. A.
p. 7 tab. A.
q. 7 tab. A.
r. 7 tab. A.
s. 7 tab. A.
t. 7 tab. A.
u. 7 tab. A.
v. 7 tab. A.
w. 7 tab. A.
x. 7 tab. A.
y. 7 tab. A.
z. 7 tab. A.
aa. 7 tab. A.
ab. 7 tab. A.
ac. 7 tab. A.
ad. 7 tab. A.
ae. 7 tab. A.
af. 7 tab. A.
ag. 7 tab. A.
ah. 7 tab. A.
ai. 7 tab. A.
aj. 7 tab. A.
ak. 7 tab. A.
al. 7 tab. A.
am. 7 tab. A.
an. 7 tab. A.
ao. 7 tab. A.
ap. 7 tab. A.
aq. 7 tab. A.
ar. 7 tab. A.
as. 7 tab. A.
at. 7 tab. A.
au. 7 tab. A.
av. 7 tab. A.
aw. 7 tab. A.
ax. 7 tab. A.
ay. 7 tab. A.
az. 7 tab. A.
ba. 7 tab. A.
bb. 7 tab. A.
bc. 7 tab. A.
bd. 7 tab. A.
be. 7 tab. A.
bf. 7 tab. A.
bg. 7 tab. A.
bh. 7 tab. A.
bi. 7 tab. A.
bj. 7 tab. A.
bk. 7 tab. A.
bl. 7 tab. A.
bm. 7 tab. A.
bn. 7 tab. A.
bo. 7 tab. A.
bp. 7 tab. A.
bq. 7 tab. A.
br. 7 tab. A.
bs. 7 tab. A.
bt. 7 tab. A.
bu. 7 tab. A.
bv. 7 tab. A.
bw. 7 tab. A.
bx. 7 tab. A.
by. 7 tab. A.
bz. 7 tab. A.
ca. 7 tab. A.
cb. 7 tab. A.
cc. 7 tab. A.
cd. 7 tab. A.
ce. 7 tab. A.
cf. 7 tab. A.
cg. 7 tab. A.
ch. 7 tab. A.
ci. 7 tab. A.
cj. 7 tab. A.
ck. 7 tab. A.
cl. 7 tab. A.
cm. 7 tab. A.
cn. 7 tab. A.
co. 7 tab. A.
cp. 7 tab. A.
cq. 7 tab. A.
cr. 7 tab. A.
cs. 7 tab. A.
ct. 7 tab. A.
cu. 7 tab. A.
cv. 7 tab. A.
cw. 7 tab. A.
cx. 7 tab. A.
cy. 7 tab. A.
cz. 7 tab. A.
da. 7 tab. A.
db. 7 tab. A.
dc. 7 tab. A.
dd. 7 tab. A.
de. 7 tab. A.
df. 7 tab. A.
dg. 7 tab. A.
dh. 7 tab. A.
di. 7 tab. A.
dj. 7 tab. A.
dk. 7 tab. A.
dl. 7 tab. A.
dm. 7 tab. A.
dn. 7 tab. A.
do. 7 tab. A.
dp. 7 tab. A.
dq. 7 tab. A.
dr. 7 tab. A.
ds. 7 tab. A.
dt. 7 tab. A.
du. 7 tab. A.
dv. 7 tab. A.
dw. 7 tab. A.
dx. 7 tab. A.
dy. 7 tab. A.
dz. 7 tab. A.
ea. 7 tab. A.
eb. 7 tab. A.
ec. 7 tab. A.
ed. 7 tab. A.
ee. 7 tab. A.
ef. 7 tab. A.
eg. 7 tab. A.
eh. 7 tab. A.
ei. 7 tab. A.
ej. 7 tab. A.
ek. 7 tab. A.
el. 7 tab. A.
em. 7 tab. A.
en. 7 tab. A.
eo. 7 tab. A.
ep. 7 tab. A.
eq. 7 tab. A.
er. 7 tab. A.
es. 7 tab. A.
et. 7 tab. A.
eu. 7 tab. A.
ev. 7 tab. A.
ew. 7 tab. A.
ex. 7 tab. A.
ey. 7 tab. A.
ez. 7 tab. A.
fa. 7 tab. A.
fb. 7 tab. A.
fc. 7 tab. A.
fd. 7 tab. A.
fe. 7 tab. A.
ff. 7 tab. A.
fg. 7 tab. A.
fh. 7 tab. A.
fi. 7 tab. A.
fj. 7 tab. A.
fk. 7 tab. A.
fl. 7 tab. A.
fm. 7 tab. A.
fn. 7 tab. A.
fo. 7 tab. A.
fp. 7 tab. A.
fq. 7 tab. A.
fr. 7 tab. A.
fs. 7 tab. A.
ft. 7 tab. A.
fu. 7 tab. A.
fv. 7 tab. A.
fw. 7 tab. A.
fx. 7 tab. A.
fy. 7 tab. A.
fz. 7 tab. A.
ga. 7 tab. A.
gb. 7 tab. A.
gc. 7 tab. A.
gd. 7 tab. A.
ge. 7 tab. A.
gf. 7 tab. A.
gg. 7 tab. A.
gh. 7 tab. A.
gi. 7 tab. A.
gj. 7 tab. A.
gk. 7 tab. A.
gl. 7 tab. A.
gm. 7 tab. A.
gn. 7 tab. A.
go. 7 tab. A.
gp. 7 tab. A.
gq. 7 tab. A.
gr. 7 tab. A.
gs. 7 tab. A.
gt. 7 tab. A.
gu. 7 tab. A.
gv. 7 tab. A.
gw. 7 tab. A.
gx. 7 tab. A.
gy. 7 tab. A.
gz. 7 tab. A.
ha. 7 tab. A.
hb. 7 tab. A.
hc. 7 tab. A.
hd. 7 tab. A.
he. 7 tab. A.
hf. 7 tab. A.
hg. 7 tab. A.
hh. 7 tab. A.
hi. 7 tab. A.
hj. 7 tab. A.
hk. 7 tab. A.
hl. 7 tab. A.
hm. 7 tab. A.
hn. 7 tab. A.
ho. 7 tab. A.
hp. 7 tab. A.
hq. 7 tab. A.
hr. 7 tab. A.
hs. 7 tab. A.
ht. 7 tab. A.
hu. 7 tab. A.
hv. 7 tab. A.
hw. 7 tab. A.
hx. 7 tab. A.
hy. 7 tab. A.
hz. 7 tab. A.
ia. 7 tab. A.
ib. 7 tab. A.
ic. 7 tab. A.
id. 7 tab. A.
ie. 7 tab. A.
if. 7 tab. A.
ig. 7 tab. A.
ih. 7 tab. A.
ii. 7 tab. A.
ij. 7 tab. A.
ik. 7 tab. A.
il. 7 tab. A.
im. 7 tab. A.
in. 7 tab. A.
io. 7 tab. A.
ip. 7 tab. A.
iq. 7 tab. A.
ir. 7 tab. A.
is. 7 tab. A.
it. 7 tab. A.
iu. 7 tab. A.
iv. 7 tab. A.
iw. 7 tab. A.
ix. 7 tab. A.
iy. 7 tab. A.
iz. 7 tab. A.
ja. 7 tab. A.
jb. 7 tab. A.
jc. 7 tab. A.
jd. 7 tab. A.
je. 7 tab. A.
jf. 7 tab. A.
jg. 7 tab. A.
jh. 7 tab. A.
ji. 7 tab. A.
jj. 7 tab. A.
jk. 7 tab. A.
jl. 7 tab. A.
jm. 7 tab. A.
jn. 7 tab. A.
jo. 7 tab. A.
jp. 7 tab. A.
jq. 7 tab. A.
jr. 7 tab. A.
js. 7 tab. A.
jt. 7 tab. A.
ju. 7 tab. A.
jv. 7 tab. A.
jw. 7 tab. A.
jx. 7 tab. A.
jy. 7 tab. A.
jz. 7 tab. A.
ka. 7 tab. A.
kb. 7 tab. A.
kc. 7 tab. A.
kd. 7 tab. A.
ke. 7 tab. A.
kf. 7 tab. A.
kg. 7 tab. A.
kh. 7 tab. A.
ki. 7 tab. A.
kj. 7 tab. A.
kk. 7 tab. A.
kl. 7 tab. A.
km. 7 tab. A.
kn. 7 tab. A.
ko. 7 tab. A.
kp. 7 tab. A.
kq. 7 tab. A.
kr. 7 tab. A.
ks. 7 tab. A.
kt. 7 tab. A.
ku. 7 tab. A.
kv. 7 tab. A.
kw. 7 tab. A.
kx. 7 tab. A.
ky. 7 tab. A.
kz. 7 tab. A.
la. 7 tab. A.
lb. 7 tab. A.
lc. 7 tab. A.
ld. 7 tab. A.
le. 7 tab. A.
lf. 7 tab. A.
lg. 7 tab. A.
lh. 7 tab. A.
li. 7 tab. A.
lj. 7 tab. A.
lk. 7 tab. A.
ll. 7 tab. A.
lm. 7 tab. A.
ln. 7 tab. A.
lo. 7 tab. A.
lp. 7 tab. A.
lq. 7 tab. A.
lr. 7 tab. A.
ls. 7 tab. A.
lt. 7 tab. A.
lu. 7 tab. A.
lv. 7 tab. A.
lw. 7 tab. A.
lx. 7 tab. A.
ly. 7 tab. A.
lz. 7 tab. A.
ma. 7 tab. A.
mb. 7 tab. A.
mc. 7 tab. A.
md. 7 tab. A.
me. 7 tab. A.
mf. 7 tab. A.
mg. 7 tab. A.
mh. 7 tab. A.
mi. 7 tab. A.
mj. 7 tab. A.
mk. 7 tab. A.
ml. 7 tab. A.
mm. 7 tab. A.
mn. 7 tab. A.
mo. 7 tab. A.
mp. 7 tab. A.
mq. 7 tab. A.
mr. 7 tab. A.
ms. 7 tab. A.
mt. 7 tab. A.
mu. 7 tab. A.
mv. 7 tab. A.
mw. 7 tab. A.
mx. 7 tab. A.
my. 7 tab. A.
mz. 7 tab. A.
na. 7 tab. A.
nb. 7 tab. A.
nc. 7 tab. A.
nd. 7 tab. A.
ne. 7 tab. A.
nf. 7 tab. A.
ng. 7 tab. A.
nh. 7 tab. A.
ni. 7 tab. A.
nj. 7 tab. A.
nk. 7 tab. A.
nl. 7 tab. A.
nm. 7 tab. A.
nn. 7 tab. A.
no. 7 tab. A.
np. 7 tab. A.
nq. 7 tab. A.
nr. 7 tab. A.
ns. 7 tab. A.
nt. 7 tab. A.
nu. 7 tab. A.
nv. 7 tab. A.
nw. 7 tab. A.
nx. 7 tab. A.
ny. 7 tab. A.
nz. 7 tab. A.
oa. 7 tab. A.
ob. 7 tab. A.
oc. 7 tab. A.
od. 7 tab. A.
oe. 7 tab. A.
of. 7 tab. A.
og. 7 tab. A.
oh. 7 tab. A.
oi. 7 tab. A.
oj. 7 tab. A.
ok. 7 tab. A.
ol. 7 tab. A.
om. 7 tab. A.
on. 7 tab. A.
oo. 7 tab. A.
op. 7 tab. A.
oq. 7 tab. A.
or. 7 tab. A.
os. 7 tab. A.
ot. 7 tab. A.
ou. 7 tab. A.
ov. 7 tab. A.
ow. 7 tab. A.
ox. 7 tab. A.
oy. 7 tab. A.
oz. 7 tab. A.
pa. 7 tab. A.
pb. 7 tab. A.
pc. 7 tab. A.
pd. 7 tab. A.
pe. 7 tab. A.
pf. 7 tab. A.
pg. 7 tab. A.
ph. 7 tab. A.
pi. 7 tab. A.
pj. 7 tab. A.
pk. 7 tab. A.
pl. 7 tab. A.
pm. 7 tab. A.
pn. 7 tab. A.
po. 7 tab. A.
pp. 7 tab. A.
pq. 7 tab. A.
pr. 7 tab. A.
ps. 7 tab. A.
pt. 7 tab. A.
pu. 7 tab. A.
pv. 7 tab. A.
pw. 7 tab. A.
px. 7 tab. A.
py. 7 tab. A.
pz. 7 tab. A.
qa. 7 tab. A.
qb. 7 tab. A.
qc. 7 tab. A.
qd. 7 tab. A.
qe. 7 tab. A.
qf. 7 tab. A.
qg. 7 tab. A.
qh. 7 tab. A.
qi. 7 tab. A.
qj. 7 tab. A.
qk. 7 tab. A.
ql. 7 tab. A.
qm. 7 tab. A.
qn. 7 tab. A.
qo. 7 tab. A.
qp. 7 tab. A.
qq. 7 tab. A.
qr. 7 tab. A.
qs. 7 tab. A.
qt. 7 tab. A.
qu. 7 tab. A.
qv. 7 tab. A.
qw. 7 tab. A.
qx. 7 tab. A.
qy. 7 tab. A.
qz. 7 tab. A.
ra. 7 tab. A.
rb. 7 tab. A.
rc. 7 tab. A.
rd. 7 tab. A.
re. 7 tab. A.
rf. 7 tab. A.
rg. 7 tab. A.
rh. 7 tab. A.
ri. 7 tab. A.
rj. 7 tab. A.
rk. 7 tab. A.
rl. 7 tab. A.
rm. 7 tab. A.
rn. 7 tab. A.
ro. 7 tab. A.
rp. 7 tab. A.
rq. 7 tab. A.
rr. 7 tab. A.
rs. 7 tab. A.
rt. 7 tab. A.
ru. 7 tab. A.
rv. 7 tab. A.
rw. 7 tab. A.
rx. 7 tab. A.
ry. 7 tab. A.
rz. 7 tab. A.
sa. 7 tab. A.
sb. 7 tab. A.
sc. 7 tab. A.
sd. 7 tab. A.
se. 7 tab. A.
sf. 7 tab. A.
sg. 7 tab. A.
sh. 7 tab. A.
si. 7 tab. A.
sj. 7 tab. A.
sk. 7 tab. A.
sl. 7 tab. A.
sm. 7 tab. A.
sn. 7 tab. A.
so. 7 tab. A.
sp. 7 tab. A.
sq. 7 tab. A.
sr. 7 tab. A.
ss. 7 tab. A.
st. 7 tab. A.
su. 7 tab. A.
sv. 7 tab. A.
sw. 7 tab. A.
sx. 7 tab. A.
sy. 7 tab. A.
sz. 7 tab. A.
ta. 7 tab. A.
tb. 7 tab. A.
tc. 7 tab. A.
td. 7 tab. A.
te. 7 tab. A.
tf. 7 tab. A.
tg. 7 tab. A.
th. 7 tab. A.
ti. 7 tab. A.
tj. 7 tab. A.
tk. 7 tab. A.
tl. 7 tab. A.
tm. 7 tab. A.
tn. 7 tab. A.
to. 7 tab. A.
tp. 7 tab. A.
tq. 7 tab. A.
tr. 7 tab. A.
ts. 7 tab. A.
tt. 7 tab. A.
tu. 7 tab. A.
tv. 7 tab. A.
tw. 7 tab. A.
tx. 7 tab. A.
ty. 7 tab. A.
tz. 7 tab. A.
ua. 7 tab. A.
ub. 7 tab. A.
uc. 7 tab. A.
ud. 7 tab. A.
ue. 7 tab. A.
uf. 7 tab. A.
ug. 7 tab. A.
uh. 7 tab. A.
ui. 7 tab. A.
uj. 7 tab. A.
uk. 7 tab. A.
ul. 7 tab. A.
um. 7 tab. A.
un. 7 tab. A.
uo. 7 tab. A.
up. 7 tab. A.
uq. 7 tab. A.
ur. 7 tab. A.
us. 7 tab. A.
ut. 7 tab. A.
uu. 7 tab. A.
uv. 7 tab. A.
uw. 7 tab. A.
ux. 7 tab. A.
uy. 7 tab. A.
uz. 7 tab. A.
va. 7 tab. A.
vb. 7 tab. A.
vc. 7 tab. A.
vd. 7 tab. A.
ve. 7 tab. A.
vf. 7 tab. A.
vg. 7 tab. A.
vh. 7 tab. A.
vi. 7 tab. A.
vj. 7 tab. A.
vk. 7 tab. A.
vl. 7 tab. A.
vm. 7 tab. A.
vn. 7 tab. A.
vo. 7 tab. A.
vp. 7 tab. A.
vq. 7 tab. A.
vr. 7 tab. A.
vs. 7 tab. A.
vt. 7 tab. A.
vu. 7 tab. A.
vv. 7 tab. A.
vw. 7 tab. A.
vx. 7 tab. A.
vy. 7 tab. A.
vz. 7 tab. A.
wa. 7 tab. A.
wb. 7 tab. A.
wc. 7 tab. A.
wd. 7 tab. A.
we. 7 tab. A.
wf. 7 tab. A.
wg. 7 tab. A.
wh. 7 tab. A.
wi. 7 tab. A.
wj. 7 tab. A.
wk. 7 tab. A.
wl. 7 tab. A.
wm. 7 tab. A.
wn. 7 tab. A.
wo. 7 tab. A.
wp. 7 tab. A.
wq. 7 tab. A.
wr. 7 tab. A.
ws. 7 tab. A.
wt. 7 tab. A.
wu. 7 tab. A.
wv. 7 tab. A.
ww. 7 tab. A.
wx. 7 tab. A.
wy. 7 tab. A.
wz. 7 tab. A.
xa. 7 tab. A.
xb. 7 tab. A.
xc. 7 tab. A.
xd. 7 tab. A.
xe. 7 tab. A.
xf. 7 tab. A.
xg. 7 tab. A.
xh. 7 tab. A.
xi. 7 tab. A.
xj. 7 tab. A.
xk. 7 tab. A.
xl. 7 tab. A.
xm. 7 tab. A.
xn. 7 tab. A.
xo. 7 tab. A.
xp. 7 tab. A.
xq. 7 tab. A.
xr. 7 tab. A.
xs. 7 tab. A.
xt. 7 tab. A.
xu. 7 tab. A.
xv. 7 tab. A.
xw. 7 tab. A.
xx. 7 tab. A.
xy. 7 tab. A.
xz. 7 tab. A.
ya. 7 tab. A.
yb. 7 tab. A.
yc. 7 tab. A.
yd. 7 tab. A.
ye. 7 tab. A.
yf. 7 tab. A.
yg. 7 tab. A.
yh. 7 tab. A.
yi. 7 tab. A.
yj. 7 tab. A.
yk. 7 tab. A.
yl. 7 tab. A.
ym. 7 tab. A.
yn. 7 tab. A.
yo. 7 tab. A.
yp. 7 tab. A.
yq. 7 tab. A.
yr. 7 tab. A.
ys. 7 tab. A.
yt. 7 tab. A.
yu. 7 tab. A.
yv. 7 tab. A.
yw. 7 tab. A.
yx. 7 tab. A.
yy. 7 tab. A.
yz. 7 tab. A.
za. 7 tab. A.
zb. 7 tab. A.
zc. 7 tab. A.
zd. 7 tab. A.
ze. 7 tab. A.
zf. 7 tab. A.
zg. 7 tab. A.
zh. 7 tab. A.
zi. 7 tab. A.
zj. 7 tab. A.
zk. 7 tab. A.
zl. 7 tab. A.
zm. 7 tab. A.
zn. 7 tab. A.
zo. 7 tab. A.
zp. 7 tab. A.
zq. 7 tab. A.
zr. 7 tab. A.
zs. 7 tab. A.
zt. 7 tab. A.
zu. 7 tab. A.
zv. 7 tab. A.
zw. 7 tab. A.
zx. 7 tab. A.
zy. 7 tab. A.
zz. 7 tab. A.

teribus autem ab ijs ramis qui in lumborum regione geniculatim à magna uena & arteria porriguntur, plurimas soboles quoque peritonæum mutuatur. In anteriori uerò regione, elatius quidem qua mucronatam spectat cartilagineam, à uasis sub pectoris osse ad rectos abdominis musculos excurrentibus peritonæum soboles exigit: in humiliori autem regione ad pubis ossa consistente propagines alciſcit ab illis uasis, quæ sursum sub rectis exporriguntur musculus. Cæterum quod peritonæo medici tactus sensum adimant, ridendum potius quàm refellendum est, quum unà cum illis quæ transmittit organis, frequentibus quoque nervis uiam offerat, à quibus surculos etiam adipiscitur, idque ab ijs potissimum qui abdominis exporriguntur musculis. Porro peritonæi usus complures enumerari solent, primus quidem, ut ea omnia quæ diximus contegat: ex quibus quum pleraque tendi remitti que debeant, peritonæum quo aptius fieri id possit, nerueum & membraneum merito factum cernitur, ualidum quidem, ut opportunè contineret: sed tenue, quo minùs pondere molestum esset. Secundus, quo omnia quæ amplectitur ab extrinsecus ambientibus musculis interſtinguit, ne quando tenuium intestinorum aliqua in media ipsorum spacia incidant, & dum musculos premunt, aut ab illis premuntur, arctant aut arctantur, dolore afficiunt aut afficiuntur, intestina motum eorum impendant, ac recrementa intestinis complexa difficillimè deorsum transmittantur: id quod nunc neutiquam accidit. Verum hæc intestina inter media musculorum abdominis spacia, dum integri adhuc essent transuerſi, minimè interciderent, & si Galenus id præcipue innuit, quando quidem hi uelut alterum peritonæum ijs quibus id obducitur inuolucrum conſtituunt, omni ex parte ab alijs abdominis musculis hæc organa interſtingunt, neque ex situ etiam inter lumborum musculos & transuerſos fortassis inuolui intestina potuiſſent. Sunt autem illi lumborum musculi dorsum mouentium nonus, & femoris motus autorum sextus. Tertium peritonæi usum Galenus cum cæteris Anatomes professoribus recenset, quo id siccialimenti superflua septi transuerſi accedente opera propellit: quasi uerò idem officium quod abdominis musculos unà cum septo ad faciùm excretionem subire suo loco cōmemorauimus, peritonæum præſtet, & arbitrariorum motu quo se contrahat distendatque præditum sit, ac non transuerſorum abdominis musculorum, & septi quibus connascitur motum necessariò sequatur. Dein ac si peritonæum magis quàm cutis, aut abdominis adeps, ipsumque adeo omentum illi usui subseruiat. Miror membranam costas succingentem, quæ peritonæo substantia usu & conformatione penitus correſponderet, in thoracem arctantium organorum numero habitam non fuiſſe, quum illa non minus thoraci comprimèdo, quàm hoc facibus efficiendis auxiliari deberet. His quartus peritonæi usus succedit, omnibus quæ peritonæum ambiunt, & potissimum abdominis musculis cōmunis, quo is ceu inuolucrum exactè circumdatum, ſtingat omnia, ne leui occasione laxior uentriculus, aut intestina etiam flatibus infestentur. At postremus præcipuusque peritonæi usus est, quo omnia quibus circumdatū est, ab eo cōtinentur, & uelut à pelle quadam singula seorsum tecta, tuò colligantur, suisque sedibus fixa hærent.

Peritonæi
usus.Lib. 4. de V.
su parte.

DE STOMACHO ET VENTRICULO.

Capit. III.

Stomachum perinde ac uentriculum præcipue ostendunt decima quarta & decima quinta figura, quibus in uentriculo commonſtrando ſuccedit decima sexta, quæ hunc inuerſum refert, & decima septima ipsius tunicas uti fieri licuit ſemel exprimit. Dein uentriculum ſua ſede repositum proponit ſecunda figura ſimul cum ſexta. Sua ſede autem nonnihil motum refert duodecima. Poſtremo ipſius elatius oriſicium non ineleganter in uigefima figura ſpectatur, quod Græcorum nonnulli *λεγάδιον*, ut & Latini ſcriptores plerique cor & præcordium, permulti etiam (ut Galenus) stomachum appellant. Arabum interpretes *Alſud*, *Alphatd*, *Fued*, *Alſaud*, *Fubed*. Inferius uerò *Polux*, *Haſoher*.



VENTRICVLVS, qui promptuarij modo efculenta poculentaque ſuſcipere, eaque primo labore (ſine quo hæc inuilia & homini ad nihil cōmoda eſſent) concoquere ac mutare debuit, non ſtatim poſt os collocatus eſt, quanquam is ſitus ad cibi dentibus attriti aſſumptionem fuiſſet aptior. Thoracem nanque & illo contenta uiſcera rerum Opifex uentriculo prælocauit, ut is in demilioſioribus ſedibus excrementorum haberet eſſluxus, illaque (ut in ædificijs architecti ab oculis & naribus dominorum ea quæ proſtuentia necellariò tecti eſſent aliquid habitura, auertunt) præcū ſenſibus, qui in capite ſe-

Ventriculus
ſub thorace loco-
catus.

*Vic cibum po-
sumq; uentricu-
lo deferens no-
mine.
Initium.*

*Substantia et
forma ac tuni-
ca.*

Incessus.

*Lib. 5 de Ad.
m. f. d. lo.
Stomachum
non eode cum
arteria ma-
gna uel fora-
mine septi.*

*Lib. 4. de V.
su parte.*

dem exigunt, deducerentur. Thoracem uerò aërem per os & narium foramina attracturum, ac rursus eundem emissurum, ut uocis respirationisq; autor efficeretur, elatius collocari de-
cuit. Porro ne nemiū uentriculus ab ore remoueretur, quumq; longus ab ipso ad recremento-
rum expulsionis locum ductus sit, Natura illum quàm potuit proximè ori subiunxit. Sub tho-
racem enim & septo transuerso inter iecur & lienem medius statim^b ponitur, uiamq; ab ore ci-
bos ad se deferentē obtrinet, quæ ab usu *diuorq; q;* nuncupatur, & etiam illis communi nomine
quo omnem angustum ductum, seu collum isthmū modo alicui ampliori uentri præpositū uo-
cant, *stomach;* dicitur: qua uoce nos Celsum & Ciceronem imitati potius utemur, quàm gula
alijs (uti & meri & uescet) non infrequenti dictione. Hæc nanque uia linguam ad radicem eius
hærens excipit, ac utraque parte^c tonsillas attingens, à palati extremo principium fortitur, ac
agitatione motibusq; linguæ depulsum, & quasi detrusum cibum suscipiens, illum deorsum,
pellit partibus ipsius quæ sunt infra id quod deuoratur dilatatis, quæ uerò supra contractis.
Nervosa enim membrana uel, ut facile dilatetur, prompteq; rursus cōcidat, effecta est: & fibris
suo muneri famulantibus intertextitur, ac reliquorum denique corporis ductuum modo teres
& intus accuratè læuis lubricaq; cernitur.^d Duabus etenim proprijs cōstat tunicis, substantia,
duritie, crassitie, & fibrarum specie uariantibus. Harum interior quidem nervosior, durior, &
paulo tenuior, ac totius oris palatq; tunice continua est, & rectis fibris manuū in star ciborum
attractioni subseruientibus donatur. Exterior uerò crassior, mollior, propemodumq; muscu-
lorum natura participans carnosior uisitur, unde etiam cibi conficiendi uim plerique ipsi ascri-
bunt: dein transuersis duntaxat circularibus uel abundat fibris, quæ ciborum interiores tunice
fibræ beneficio attractorū scilicet, magisq; subitam in uentriculum propulsionē efficiant:
& si quando uomentibus uentriculus quippiā protrudit, ad eius educationē summopere etiam
auxiliantur. Duabus his solum fibrarum differentijs stomachus indiguit, ut rectæ quidem at-
traherent, transuersæ autem arcantes pellerēt. Nam si obliquæ accessissent, cibis in stomacho
longiori mora hæreret: quod nō solum homini inuili, sed & importunum ac molestum esset,
quando stomachus cibo plenus, ita prolixius distēderetur, asperæq; arteriæ ac pulmonibus &
magnæ itidem arteriæ, dum ea dilatantur, diutius obstaculo esset. Natura enim stomachū tuū,
& illa quæ modò comprehendī organa minūs molestatūr, per ceruicem thoracemq; ad uen-
triculum porrigens,^e exactè supra mediā ceruicis uertebrarum & quatuor primarum thora-
cis sedem, in neutram partem inclinantem asperæq; arteriæ subtrahit^f deducit. Ad principiū
uerò quintæ thoracis uertebræ^g stomachus ut ampliori magnæ arteriæ trunco secundum dor-
si uertebras inferiora corporis petenti cedat, nō nihil in dextrum latus à media uertebrarum re-
gione abscedit, arteriæ illi proximæ ad nonā usque thoracis uertebram repens:^h quò simul atq;
pertingit, ab eius uertebræ eleuatus corpore arteriam elatius (ne illa fortè à deuorato cibo com-
primatur) ascendit, neruolam septi transuersi partem uersus sinistrum latusⁱ penetrans. Non
equidem ut cum Hippocrate Galenus censuit, arteriæ hīc ad inferiora corporis prolabantis
foramine utens, uerū peculiari, quod ipsi neruisq; cum illo descenditibus (dum septum de-
scriberetur) præparatum esse diximus. Neque uerò administratio tantum, sed & ratio quoque
id commonstrabit, dummodo^j superius uentriculi orificium ad amussim pendere non gra-
ueris. Hoc namq; uentriculi mediæ sedi quod ad^k priora^l posterioraq; spectat, neque inferius
quàm ipsius elatior^m pars habetur, inferi debuit: quod certe accideret, si communi arteriæ fora-
mini stomachus in septo ueretur, atque (ut Galenus reliquosq; Anatomicorū chorus asserit)
ad duodecimam usque thoracis uertebram stomachus arteriæ iunctus uertebris neciteretur, ac
iuxta primam denuum lumborū uertebram, aut paulò infra, arteriam conscendere, & à dextris
in sinistrum prorepere inciperet. Quandoquidem arteriæ per septum transitus, qui supra un-
decimam thoracis uertebram, uel Galeni suffragio, consistit, sub posteriori uentriculi sede in
medio ipsius elatioris partis & diuissioris occurrit, non autem ubi elatissima ipsius est regio.
Deinde si ad duodecimā usque thoracis uertebram, secundum arteriæ latus stomachus descen-
deret ex thorace, & sub septo primū arteriam à dorso eleuatus conscenderet, sursumq; denuò
ad uentriculi superius orificium necessariò conuolueretur, pluresq; quàm nunc habeat, anfra-
ctus, eosq; acutis præditos angulis adipisceretur. Ad nonā itaq; thoracis uertebræ initium sto-
machus uertebrarum corporibus interuentu membranularū ex ligamenti uertebrarum origi-
nem ducentium cōmittitur, atque ab illis membranulis tertiam tunicam nullis omnino fibris
interstinctam, & uelut secundæ ipsius inuolucrum possidet. Quod uerò iuxta quintam thora-
cis uertebram ad dextra potius arteriæ quàm ad sinistra stomachus explicetur, in causa ipsa est
arteria, non adeò tyranni ritu (quamuis multò sit dignior) dorsi mediā sedem occupans, sed
quum à sinistro cordis sinu ortum ducat, & per reliquum ipsius ductum uersus sinistrum ca-
uæ

a 7 muscul.
tab. a.
b 6 fig. F. E.
inter D, D.
c 7 G.

c 6 musc. ta.
F. 14. fig. E.
E.

d Harū de-
lineationē
pete ex si-
militudine
9 aut 17 fig-
urarum.

e 7 musc. ta.
E super B
ac sub F.
f 12, 14. fig.
ab A ad B.
g eius. fi. B
uersus C, ut
cederet i. fi.
ca. 12. lib. 3.
h 15 a. 4. fig.
Cuerius D.
G.

i 7 muscul.
tab. r.
h 7 muscul.
tab. q.

l 12 fig. B.
20 F.
m 14 fig. L.
L.

n 15 fig. M.
O. N.

o 14. 15. fi. I.
p ad regio-
nem O 15. fi.
non ad G
aut I.

q Specta to-
tam 10 fig.
lib. 6. ac O.
P. 6 fig.

12 fi. b. ad
 8. uæ uenæ^a subiiciatur, sinistrorum maiore sui parte necessario uergens, ac proinde aliquan-
 tulum stomacho cedens, communicatorem, ac uelut focium sedis uertebrarum admittit, adeo
 ut stomachus & minus obliquetur, & firmiorem adhuc sedem quam in sinistro latere repe-
 rire posset, obtineat. Porro stomachus non dextram septi perforat sedem, recta^q in uentricu-
 lum ex dextro dorso latere porrigitur, sed arteriæ superuectus^a obtuso^q obliquatus angulo
 15 fig. R.
 D. uerf. G. sinistram petit, ne stomachus uentriculum adeundo iecur uniuersam dextram sedem inferio-
 ris regionis septi occupans, perforare cogatur, sed eam septi partem adinueniat, qua minor
 iecoris pars ipsi faciliem aditum præbitura consistit.¹ Talis sanè est tenuior totius iecoris por-
 tio sinistrae septi sedi hic subtenfa, cui in posteriori regione quâ stomachus septum permeat,
 22 fig. ad 4.
 R. 20 fi. ad
 E. F. F. "sinus instar semicirculi insculpitur, stomacho (cuius anteriorem sedem inibi amplectitur)
 18 fig. I. proportionem congruens. Neque est ut quispiam alijs credat dissectionis professoribus, qui
 septum, id^q potissimum quod diximus foramen, ne cibus è uentriculo superiora repetat ob-
 staculo esse arbitrantur, quum idem quoque tunc in uentriculum cibi descensum potius pro-
 hiberet. Quemadmodum & mera quoque est fabula, qua angustiores stomachum hic quâ
 uentriculo continuatur, quam in ceruice esse contendunt, atra bile in uentriculi superius os
 à liene eructata eum colligi constringi^q falsò existimantes. Cæterum obliquus ille ductus quo
 stomachus arteriæ consensuens in sinistrum fertur,^a neruis etiam commodus est, quos pau-
 14, 15 fig.
 T. V. lo post uentriculo inferi audies. Neque profectò sufficit Naturæ, stomacho in eum modum
 obliquo ad uelocem ciborum transitum eas quas innuebam tribuisse fibras. uerum ut ipsius
 concauitas semper humecta ac uelut uncta esset, glandulas adiunxit,⁷ alias quidem ad fauces,
 stomacho & laryngi communes, quæ saluam humorem^q illis organis ne exiccentur, præpa-
 14 fig. R.
 E. E. rantes, Latinis tonsillæ appellantur.² In medio itidem propemodum stomachi ductu, quâs
 14, 15 fig.
 F. F. asperæ arteriæ in * duos truncos ad pulmones diuise subiicitur, binas alias sæpe stomacho
 * fi. cap. 6 non apponit modo, sed & in posteriori ipsius sede & ad latera adnectit,³ illis planè respo-
 lib. 4. infer tes, quas uiscæ ceruicis initio in uiris Natura circumdedit. & quemadmodum has urinæ se-
 te K. I. minis^q genitalis meatum irrigare humectare^q suo loco commemorabimus, sic etiam glan-
 22, 23 fi. dula stomacho adnate illius amplitudinem irrorant, ac ne ob siccitatem difficilius in uen-
 gura f. triculum cibus prolabatur, saluam quodam humore imbuunt. Cæterum si quid de stomacho
 adhuc dicendum supersit, in uentriculi descriptione id persequemur. Ventriculum qui in-
 ter reliquos corporis uentres sinus^a ue non minimam cavitatem obtinet, unde etiam *γαστήρ* &
λολία Græcis, ut nobis uenter & uentriculus potissimum dicitur, mox sub thorace colloca-
 tus, iam obiter diximus. Nunc uerò exquisitè ipsius situm, formam, quantitatem, substantiâ,
 tunicas, uenas, arterias, neruos, ac demum ipsius uires, quæ^q ad eas auxilij quicquam præ-
 stant organa recensebimus. Galenus itaque uentriculum in medio corporis collocatum asse-
 rit, quod plerique dissectionum professores ab ipso mutati non simpliciter enunciant, uerum
 hunc secundum omnes positionis differentias ad amissimam mediam sedem instar communis
 omnium partium officinæ adeptum asserunt, perfunctoriè admodum in hominis proportionem
 6 fig. A. metienda uersati. Sedes enim^b mucronatæ cartilagini proxima, aut ut Galenus alibi etiam
 astruit, umbilicus, haudquaquam erecti corporis medium est, uerum elatissima pubis ossium
 regio. At si crura simul cum ceruice illi negligenter, solo uidelicet corporis trunco (quem thora-
 cem Aristoteles uocat) intellecto, fortasse regio mucronatæ cartilagini subiecta in corporis me-
 dio cõsisteret, uti umbilicus ferè in homine medius est, cui circulus obducitur, qui & manuum
 & pedum & uerticis summum æqualibus ferè interuallis complectitur. Neque etiam æqualis
 uentriculi portio dextrum & sinistrum occupat, neque uentriculus in posteriora adeò atque
 12 fig. R.
 20 fig. F. in priora corporis exporrigitur, quamuis fortè^c elatius ipsius orificium id sibi non immeritò
 uendicare posset. Statim enim ac stomachus septum in sinistra neruosa ipsius parus sede pene-
 trar, continuū cum uentriculo corpus^d efficitur, quod in sinistro latere amplè septi sedem con-
 tingens, totam regionē inter iecur & lienem uacuum complectitur. In dextro autem latere uen-
 triculum nusquam septum attingit, sed iecoris duntaxat concauo subtenfus, tota ipsius parte su-
 periori, & dextro item latere à iecore occultatur, tantum^q à dextra septi sede passim abscedit,
 quanta iecoris est crassities, quum interim magnam septi sedem (uti modò dicebam) sinistro
 suo latere contingat. Neque id sanè admodum lien impedit, qui non ita uentriculi sinistro late-
 ri attenditur, adeo^q in corporis anteriora, ut medicorum uulgus arbitratur, pertingit, sed po-
 tius in posteriora humiliora^q (tamen & ad latus non nihil) substernitur. Dein profectò non
 solum in sinistrum ad septum usque scilicet, quàm in dextrum, utpote sub iecoris tantum cauo
 uentriculus magis pertinet: uerum ipsius forma in homine (nulla enim nunc mihi cum Gale-
 no, neque canum, neque fimarum est consideratio) talis cernitur, ut maxima ipsius quoque
 portio

Glandule sto-
 macho crebro
 adnate.

Ventriculi bi-
 foris.

Lib. 4. de V.
 su part.
 Ventriculi si-
 tus.

Ventriculi
forma.

portio in sinistro collocetur, haud secus quam si inibi maiorem qua aptè cōtineri possit sedem adinuenisset, idē illius functionibus uideretur accommodum. Ventriculus enim forma perquam uariis est: at si quis illum obiter examinet, rotundus, & à dextro in sinistrum oblongus, aut secundum latitudinem quodammodo teres primum occurrit: rotundus quidem, quod rotunda omnia sint capacissima, & interim minimum noxijs exposita: oblongus uerò, quod id sedes qua continetur, & deinde bina ipsius orificia, alterum quo cibos admittit, alterū quo iam confectos in intestina protrudit, exigere uideatur. Cæterum si deinceps uentriculi forma accuratius expendatur, in sinistro latere multò amplior rotundiorq; & ad inferiora prominulus cernitur, ac dein hinc uersus dextra uergens, paulatim in angustū cogitur, & superiori quidem sui parte descendere, inferiori autē ascendere conspicitur, adeò ut in dextro latere multò quam in sinistro gracilior euadat. Sic quoque superiori sua sede, quæ ab uno orificio ad alterum pertinet, strictior angustiorq; est, inferiori latior ampliorq;. Anteriori parte æqualiter undiq; gibbus occurrit, nulla ex parte deformatus. Posteriori sede duos quodammodo gibbos commonstrat, unum sinistram, eundemq; magnum, proceriusq; extuberantem: alterum dextram, minorem, ac depressum magis. Atque hos gibbos sinus quidam impressio uel parat, secundum corporis longitudinem posteriori uentriculi sedi impressa. Quæ enim uentriculi dorsi uertebrae, ipsiq; exporrectos uenæ cauæ & arteriæ magnæ descendentes truncos respiciunt, ac sedi quam fortitur sese utcunque adaptat, posterior ipsius regio introrsum quasi ad eius amplitudinem nonnihil imprimitur: quamuis uentriculus è corpore auulsus inflatusq; eiusmodi sinum non ostendat, & perinde totus inibi gibbus atque anteriori regione occurrat. Porro ad uentriculi quoque formam duo ipsius faciunt orificia, è quibus unum quo cibis & potus assumi dicebatur, in elatissima sinistra uentriculi partis sede ob hoc consistit, quod stomachus inibi septum commodè perforans, illic primum uentriculo connasci, communè uel cum ipso corpus fieri potuit. Et quanquam superius uentriculi os in sinistra eius parte haberi dicimus, propinquius tamen mediæ ipsius sedi quam sinistro lateri accedit: quod tanto apparet manifestius, quanto uentriculus turgidior occurrit. Alterum uentriculi orificium cibos in cremorem emittatos ad intestina transmittēs (unde etiam *πύλωρος* Græcis, nobis autē ianitor & inferius os appellatur) in dextra eius sede consistit, nō quidem, ut totus Anatomicorū chorus arbitratur, in dextræ sedis inferiori regione, sed in elatissima, dextroq; uentriculi lateri proxima. Non enim sat erat mutuo è directoq; hæc orificia inuicem (ne ocysus cibis adhuc immutatus è uentriculo laberetur) nō opponi: uerum inferius à superiori remotius abduci oportuit, & ex elatiori quoque uentriculi sede explantari, quo minus sua grauitate cibis uentriculum præterfugeret: sed tunc primum quum confectus, & in cremorem exquisitè mutatus est, uentriculi potius excernendi robore, quam suo pondere, in intestina propelleretur. Atque horum intestinorum principium, uentriculi orificium constituit, explantatq; quare etiam primum intestinorum, quod duodecim digitorum est longitudine, exortum plerique nominarunt. Neque profecto iniuria alterum hoc orificium dextram uentriculi sedem occupat, quum hæc mediæ cauæ iecoris sedi contermina sit, in quam iecur suarum uenarum beneficio, ex intestinis ipsoq; adeò uentriculo quicquid succulentū ab illo cōfectum est, arripit ac depascitur. quod eo iecur præstat facilius, quo partes confectum à uentriculo cremorem primum excipientes illi uicinijs allocantur. Præterea uentriculi orificia non situ duntaxat inuicem variant, sed inferius quoque superiori arctius est, quod rudes, non tritas, duras, magnasq; moles homo subinde deuoret, ad quarum ingressum amplam uentriculi uiam esse oportuit. Infrà è contrario, rariùs magnū, durum, non conuersum in succum crudumq; transit: quanq; sanè nō adeò angustū sit inferius uentriculi os, ut solum cremorem transmittere queat, quando quidē non pauci quamplurima fructuum ossa impense etiam magna, crebrò deuorata innoxie excernunt, & Galenus à quodam anulum aureum qui ore tenebatur, imprudenter deglutitum, eundemq; promptè excretum narrat. Neq; orificij huius amplitudinem se ignorasse callidus ille Hispanus docuit, qui superiori anno Clitanæ cuiusdam Bacchidi quadraginta uniones, ex illis quas hic nobiles maronæ collo gestat, unā cum aurea cruce quinque gemmis instructissima, & fide pariter qua hæc continebantur, suffratus est. Illa nanque quum huic noctem se daturam nisi prius numeratis quinquaginta aureis negaret, atque is tandem annuisset, ipsa à patricio Veneto patto suo, ut comptior oratorq; & magis placida esset, elegantissimum uxoris suæ monile (quod hic non minima dotis solet esse portio) obtinuit, ac id in lecto adhuc collo appensum, ne fortè subduceretur, seruauit. Huic monili Hispanus quo meretriculæ uices reponeret, inhians, eamq; quam potuit salacissime, ut suauius tandem obdormiret, exereuit, ac postmodum soluto monili singulos uniones, & crucem, ac postmodū fidem (ne quid suo furto obstarat) deuorauit. Constat igitur in se

rius

Duo uentriculi
orificia.

Orificiorum
non par am-
plius.

Lib. de Na-
turalibus fa-
cultatibus.

e 14, 15 fig.
G, H.

f 14 figura
L, L.

g 15 figura
M.
h 15 fig. N.
i 15 fig. O.
h 22 fig. g, h.
25 fig. P, Q.

i 14, 15 fig.
r, G.

m 14, 15 fig.
H, 12 fig. S.

n 14, 15 fig.
P, 7 fig. ab
1 ad K.

rius quoque uentriculi orificium etiam si superiori angustius sit, amplum tamen esse, & interdum grandiora quoque transmittere. Cæterum Galenus & omnes eius asseclæ¹ glandosam carnem inferiori orificio priuatim tribuunt, hanc ad eius orificij constrictionem auxiliari, ac in quibusdam animalibus manifestiorem esse affirmantes. Istam sanè in canibus primum, qui illa donantur maxima, & quum carnis colorem obtineat, manifestiore, deinde in homine exa- mines uelim. Eam siquidem hanc esse arbitror, quæ duodeno intestino adnascitur, qua portæ ue- næ² ramus illi subtenditur. Verum hæc nō in hoc ut intestinum illud, aut inferius uentriculi orificiū claudat arctetur, procreata est, sed ut uasa illi intestino exposita suffulciat, ac parem cum glandio³ iuguli &⁴ mesenterij, &⁵ humilioris membranæ omenti usum præstet. Deinde si quæ constringendi uis huic glandoso corpori indita esset, ipsum necessariò orificium aut intestinum ambiret, & fibrarum natura participaret, aut transuersarum musculi uesicæ ceruicis modo, aut obliquoarum uesicæ & uteri corporis modo. Quinetiam multum abest, ut intesti- num illo glandio orbiculatim circunducatur, quum ad intestini longitudinem recta duntaxat linea id adnascatur. Quanquam nō desint, qui solis libris edocti, suoq; arbitrato Naturæ operā fingentes, glandosum id corpus musculum esse scribāt, eo inferius uentriculi orificium orbicu- latim amplecti nugaciter affirmātes, atque hinc etiam corpus id *πύλαγγος* ianitorēq; appellan- tes. Porro (quod nullo animaduertisse plurimū admiror)⁶ non solum in inferiori uentriculi orificio, sed & in superiori substantia uentriculi crassior spissiorq; est, ac orificia uelut in interio- ra extuberantiorem instar circuli partem exigunt, uentriculi substantiæ penitus respōdentem: quæ quidem inter dissecandum integro adhuc uentriculo tactu percipitur, aperto autem inuer- soq; in conspectum uenit, ac manifeste uentriculi initium stomachi ue finem & duodeni in- testini originem commōstrat. Videtur enim tunc stomachus, idq; intestinum ex ipso uentricu- lo quodammodo enasci, aliæq; omnino quàm uentriculus ipse, partes esse, quum tamen exte- rius nihil tale appareat, neque ulla crassior uentriculi portio emineat. Atque hæc crassior uen- triculi portio in hoc potissimum facta est, ut ora ipsius robustiora densioraq; quàm reliquum eius corpus euadant, ne forte à transeuntium impetu diuellantur, rumpanturq; & dein fortal- sis, ut quū ora cōstringuntur huius extuberantiōis particulæ introrsum cōniuentis occasio- ne citius arctentur occludanturq;. Et sanè quemadmodum⁷ exterior uentriculi superficies læ- uis & plana undique est, sic & magis adhuc⁸ interior ipsius concauitas: si modò duo, quæ iam diximus, tubera circulatim prominentia exceperis. Venterculus enim inibi nihil præter rugas quasdam si uehementer constrictus reperiatur, ostendit, intestinorū &⁹ uesicæ cavitati respon- dens, quamuis interim obfusum & quasi nubeculis intente rubentibus interstinctū colorem exprimat, quum tamen exterius omnino penè albicet. Cæterum ut in obeforum intestinis, ita quoque interdum adipem fundo uentriculi inius adnatum, atque hunc copiosum quandoq; inuenies. Quod uerò plerique dissectionis professores internam uentriculi sedem cellulis qui- busdam asperitatibusq; abundare scripserint, uanissimum putato, ac ipsos ruminantiū anima- lium omnes delusos, idq; quum bouum pingua deuorarent exta effinxisse arbitrator. Quan- titas itidem uentriculi uaria admodum est, nam si uesicæ modo infletur, haudquaquàm mira- beris tantam ciborum uim uiniq; copiam uno tempore posse absumi. Neque in homine æquē semper est turgidus, sed quum pro sua natura se habet, cōstrictioraq; uiuitur, quamlibet exi- guum multum ue sit quod continet, totum id undique complectitur, nullam uacuum sedem relinquens. ac proinde pro assumptorum se habet ratione, ut & multa (ne perpetuò edere co- gatur homo) assumere amplectiq; possit: & rursus si modica offerantur, ea undiq; amplexetur ac concoquat. Huic actioni ipsius congruit substantia nimirum membrana, quæ commodē usu exigente ampliari dilatariq; queat: & rursus quum opus est, colligi ac constringi.¹⁰ Constat enim uenterculus duabus latis tenuibusq; tunicis seu plexibus sibi inuicem iunctis, perinde ac stomachus, sed nonnihil dissimilibus. Quandoquidem interna uentriculi similiter, atq; interna stomachi, neruosa membranaq; est, & totius stomachi, oris & labrorum, uti sanè & intestino- rum interiori tunica continua, duritie tamen ab oris stomachiq; tunica modicè differt. quod duriores asperioresq; cibos, priusquam in uentriculū decendant, ore conficiamus: à quibus oris amplitudo contunderetur & raderetur, nisi dura densaq; eiusmodi tunica euasisset, atque idcir- co tunica ori, & stomacho, & uentriculo communis, sensim ad uentriculi fundum accedens, mollior efficitur. Fibris hæc duplicibus intertexta est, quo etiam ab interna stomachi uariat. Interior enim tunica pars uentriculi cavitatem respiciens, rectis ijsdemq; plurimis donatur fi- bris. Attrahat nanque uenterculus cibos & potus per stomachum oportet, huiusmodi fibris ceu manibus alliciens: quæ quum contrahuntur, stomachum uentriculumq; breuiant, adeò ut inter deglutiendum¹¹ larynx descendente stomachi initio, sursum conscendat, quòd mutus stomachi

Glandulosa ea
ro non procul
ab inferiori or-
ificio distans.

Protuberans
uentriculi in
orificijs sub-
stantia.

Ventriculi su-
perficies.

Ventriculi
quantitas.

Ventriculi sub-
stantia quibus
formetur rumi-
cis.

stomachi & laryngis sit connexus, & interior utriusque tunica cōtinua cernatur. At secundum
 fibrarum huius interioris uentriculi tunicae genus obliquo est, in externa tunica sede, qua
 secunda illam amplectitur, situm. Quemadmodum enim cibi potusque attractio, eorumdem ne-
 cessario praecedit retentionem, ita rectas fibras interius obliquis Natura coordinauit. Deinde
 ut retentionem, ciborum iam confectorum succedit expulsio, ita quoque secunda exterior uen-
 triculi tunica transuersas fibras obliquis exteriores merito nanciscitur, nonnullis interim obli-
 quis fibris etiam implicita. Exterior enim tunica, quae interiore crassior & mollior minusque
 compacta est, transuersis fibris abundat, secundae stomachi tunicae respondens, nisi quod illa
 paulo minus quam haec carnosior sit, & aliquot etiam obliquis intertextitur fibris. Cur autem uen-
 triculum, aut hanc exteriorē ipsius tunicae adeo impense carnosam secundum uentriculi fundū
 humiliorem uel ipsius sedem esse plerique scribant, non satis assequor. Videntur enim suis som-
 nijs confisi, fundum uentriculi insigniter carneū statuere, quum interim uentriculus illic neque
 carnosior, neque crassior sit, quam ad elatiorē ipsius sedē: imò si uerum fateri licet, superior uen-
 triculi pars carnosior est inferiori fundo uel: ut nunc taceā neuorū superioris sedis frequentia,
 tunicarū eius sedis crassitiem insigniter adaugentem. Ceterum duabus his uentriculi tunicis
 tertia accedit, instar operimenti & propugnaculi cuiusdam tunicae exteriori circumdata, & à
 peritonæo, quā id septi partem stomacho iter praebentem integrit, pronata. Huic enim peri-
 tonæi portio primū elatiori uentriculi orificio, deinde uniuerso ipsius corpori ad duodeni
 usque intestini originem obducitur. atque haec à peritonæo procedens tunica, omnium quas id
 reliquis organis exporrigit, facile crassissima cernitur, ac ut postea dicturus sum, superiori
 membranæ omenti principium praebet. Haec tunica primum omnes uentriculum petentes ue-
 nas, arterias & neruos excipit firmatque. Ac istae quidē uenae omnes à sola portae uena originē
 petunt, nulla enim uel quantumuis exilis à caua uentriculo substrata (quanquam id Galeni
 sit dogma) uentriculum adit. Arteriae autem uniuersae ab illis ortum ducunt, quae à magna
 arteria in humiliore omenti membranā primū digeruntur, ac in id & iecur & bilis uesiculam,
 & lienem, & in uentriculum denique ipsum deriuantur. Ac prima quidem uentriculi uena à por-
 tae uena priusquam in duos grandes ipsius truncos discindatur, principium habet, ad inferius
 uentriculi orificium conterminatque ipsi ad posteriorem eius sedem loca excurrentis. Arteria au-
 tem huic uenae coniunx, propago eius arteriae censetur, quae secundum portae ductum iecoris
 cauum adit. Secunda uena coniugem undecunque habens arteriam toti dimidia inferiori
 uentriculi parti subiectitur, superiori membrana omenti suffulta, à qua & anterior & posterior
 fundi uentriculi dextra sedes surculos mutuatur. praesens uena frequenter ortum ducit ex dex-
 tra uenae portae regione, quā in duos grandiores ipsius truncos finditur. Arteria uero ab
 illa pronascitur, quam in iecur deriuari diximus. Tertia uentriculi uena impense gracilis est,
 comite arteria carens, & à uenae portae graciliori sinistro uel truncō enata, in posteriorem uen-
 triculi sedem (qua dextrum ipsius gibbum inibi prominet) pauca ramulorum serie dispergitur.
 Quarta uena ab eodem quo nuper dicta trunco prodiens, toto progressu arteriam sibi coniu-
 gem asciscit, omniumque uentriculum ascendentium uenarum, ut & arteria articularum, facile
 praecipua, atque in numerosiores ramos diuisa. Procedit enim sursum ad medium posterioris
 sedis uentriculi, ac primū utrinque ramum spargit in plures surculos per posteriorem uen-
 triculi sedem diuaticum. Dehinc sursum ad dextrum superioris uentriculi oris latus sensim con-
 scendit, illudque coronae modo amplectens, ramulos complures deorsum in uentriculi corpus
 digerit, paucos, eosdemque graciles in stomachi sinem, quo is uentriculo committitur, sursum of-
 ferens. Ab hac uena dextrum oris uentriculi latus ambiente propago editur, secundum elatio-
 rem uentriculi sedem ad ipsius usque humilium orificium pertingens, ac in progressu deorsum
 quoque soboles diffundens. Porro arteria praesentis uenae coniunx ab ea depromitur, quae
 per inferiorem omenti membranā in lienem contendit. Quinta uena comite arteria non
 priuata, sinistram uentriculi fundi sedem ambit, & superiori membrana omenti suffulta ramos
 elatiori sua sede in uentriculi anteriora posterioraque emittit. Huius principium dependet ab am-
 pliiori uenae portae ramo, lienis infimae sedi inferendo: & arteria, uenam eam concomitans, ab
 arteriae ramo pululat, lienem hic accedente. Sexta uentriculi uena, ea demū esset, quae sola Ana-
 tomicis in ore uersatur, quanquam à liene in superius uentriculi orificium perferri omnes astru-
 unt. Ego uero ut uerum fatear, non unicam, sed plures, easque non semper pari numero ab illis
 quae lienis exporriguntur uenas pronasci, praeter quintam antea enumeratā obseruo, sinistri uen-
 triculi lateris sedem lienis proximam accedentes: inter quas ea solet esse praecipua, quae à maiori
 uenae portae ramo altiori lienis parti inserto, principium ducere consueuit, à qua minus quam
 raro surculi pilorum modo graciles, quasi ad superius uentriculi orificium pertingunt. His ue-

*Exterio-
rem
uentriculi tu-
nicam in fun-
do impense nō
esse carno-
sam.*

*Ventriculum
petentes uenae
ac arteriae.
Lib. 6. de Ad-
mi. sectio.*

*a. Sectidum
K. K. 14019
fig.
b. 14. 15 fig.
iuxta G.
c. 17 fig. h. h.
d. 7 muscul.
tab. 7.*

*e. 2 figu. Q.
Q. 2. 3 fig.
a. d. d.
f. fig. cap. 3.
lib. 3.
g. 22 fig. g.
h. fig. undec.
fi. ca. 12. li.
inferiam.
hic uero 4.
fig. h.
i. fi. ca. 5. li. 3.
D. fig. 154.
uerfus H.
h. fi. cap. ca.
lib. 3. p.
l. fi. ca. 5. li.
H. 2. fig. R.
14. 15 fig. e.
m. fig. ca. u.
lib. 3. r.
n. fi. ca. 5. li.
K. 15 fig. b.
o. fi. ca. 5. li.
N. 14. 15 fig.
gu. d.*

*p. 14 figu.
uerfus H.
q. fi. cap. 3.
lib. 3. x.
r. fi. ca. 5. li.
3. Z. 14. 1.
fi. f. 1. fi. S.
5. fi. ca. 10. li.
30.*

*t. fi. ca. 5. li.
3. X. 5. 14.
15 fig. 8.*

nis

nis finistram uentriculi latus aduentibus comites perpetuò iunguntur arteriæ. Commune omnium uentriculi uenarum officium est, ut & alimentum ipsi adlerant, & succulentioris ab illo confecti tremoris ad iecoris cauum non aliter ac intestinorum uenæ deducant. Proprium uerò earum quas sexto loco enumeaui uenarum, & potissimum quintæ munus cum alijs dissectionum professoribus esse (at timidè interim) annuam, ut si quid in uentriculum lien cruet, illæ eius sint uehiculum, idq; in uentriculum fundant. Cæterum frequentes uentriculariæ arteriæ innatum ipsius calorem recreant, & succulenti etiam aliquid ex uentriculo sugere uidentur. Præter has uenas & arterias uentriculo nullum aliud uas implantatur, & si sorte meatuum bilem deducientium aliquis in uentriculi fundum pertineat, id sanè fit quàm rarissimè: & mihi semel hæcenus duntaxat eius generis meatulus occurrit in biliosissimo homine, quem ex longis pontificijs nauibus sectioni adhibuimus. Porro nerui uentriculi in hunc habent modum, præcipuè sexti neruorum cerebri paris portiones: postquam recurrentes diffuderunt neruos, ramulosq; cordis in uolucro & pulmonibus communicauere, deorsum ad stomachum properant, dextra quidem ad dextrum latus, sinistra autem ad sinistrum. Simulatq; uerò aliquantisper neruicū stomacho descenderunt, fibrarum duntaxat interuentu illi commissi, uterque neruus bipartitò scinditur, & dexter quidem suis ramis obliquè in finistram fertur, sinister autem in dextrum, atque ita ambo nerui stomachum concomitati septum transversum permeant, nullam interim (ut dissectionis rudibus uisum fuit) septo sobolem offerentes. Vbi autem quatuor duorum neruorum rami¹ elatius uentriculi orificium contingunt, multiplici propagatione serie id amplexantur, furculos notari digno interuallo rectà deorsum promentes. A sinistro sexti paris neruo dextram uentriculi oris regionem implicante, insignis utrinque ramus secundum elatiorè uentriculi sedem ad ipsius usque inferius orificium deducitur, qui & si in progressu aliquot diffundat propaggines, uentriculq; inferius orificium furculis quibusdam implicet, nō tamen inibi absunt, sed in iecoris cauum² proripit. Cæterum humiliores uentriculi partem³ alij duo accedunt nerui, à sexti neruorū cerebri paris⁴ propaginibus, secundum costarum radices deorsum deductis principium obtinentes, ac illarum arteriarum coniuges, quæ superiorum membrana omenti suffultæ, in uentriculi tandem digeruntur. Quinetiam interdum sinistro uentriculi lateri⁵ quædam neruorum offeruntur soboles, à neruis pronatæ, qui cum arterijs lienem accedunt. Inter hos tam uarios neruorum quos uentriculus exigit furculos, nulli profectò tantam Naturæ ostendit providentiam, atque superiori ipsius orificio⁶ inserti, non enim duntaxat id ut noxam à bilioso eius uic generis humore aliquo induciam sentiat, adeò frequentibus scateat neruis, sed ut per illos ueluti riuos & ductus, animalis uis ipsi imprimis dispensaretur, ac cibi potusq; indigentiam uentriculus sentiret, ad sumendaq; cibaria excitaretur. Cum enim totius corporis particulæ, plantarum modo quatuor donentur facultatibus nutritioni seruientibus, neque illis eorum quæ defunt sensus sit inditus, atque omnes propemodum à caua ramis nutrimentum alliciant: aliæ autem ex caua per iecur distributis propaginibus, hæc iterum ex ijs quæ per iecoris portas feruntur uenis, & hæc rursus ex intestinis & uentriculo: quumq; adhuc nulla iam super sit pars, ex quo uentriculus aliquid asumere possit, necessum erat, ut foris ingesto cibo repleretur, atque in hoc à plantis differimus. Hæc nanque & si uim propriæ qualitatis attracticem, & attractorum retentricem, ac rursus superfluum excretricem, atque ante has omnes alteratricem perinde ac homo habeant, sensu tamen eorum quæ defunt priuantur. Neque etiam per os plantas nutriri oportebat, promptuarium copiosi nutrimenti submissum habentes terram, cui complantatæ coniunctæq; copia eorum quibus enutriti debent nunquam destituuntur. Verum humana substantia, præterquam quod longè à terra seiungitur, à qualitate quoque terrea plurimum discrepat, motuq; arbitrario ex loco in locum subinde permutari debuit, adeò ut impossibile fuerit homini plantæ ritu ex terra humorem fugere. Oportuit itaque secundum propriam eius naturam, herbis, fructibus, seminibus, aliorumq; animalium carnibus hominem ali, eaq; illo adferri tempore, quo uentriculus sentit indigentiam, at quum nulla pars ex se ipsa innatum sensum possideat, in uentriculum, uti prius dicebamus, eiusmodi uim à sensitiuo principio insuere oportuit. Et huius sanè gratia⁷ sexti neruorum cerebri paris præcipue soboles uentriculi os, conterminasq; ipsi partes potissimum implicant & intexunt, atque ij demum illi nerui sunt, quibus obliquum stomachi ductum conferre prius reuli. Molles enim quum sint, & graciles, si longa uia recto tramite tenderentur, & uentriculum cibis recipiendis destinatum à se suspensum haberent, ab eius mole perpetuò tensi, leui occasione rumperentur, nisi eiusmodi implexibus & tortuosis ductibus Natura illis sedulo prospexisset. Porro uentriculus, ut iam ipsius uires aggrediar, octo habet facultates, ac quatuor quidem omnibus uniuersi corporis partibus, quæ nutriuntur, communes: quatuor

Venerit uen-
triculo munus

Arteriarum

Vescula bi-
lis meatus in
uentriculum.Ventriculi
nerui.Neruorum
uentriculi
usus.Ventriculi to-
tus nutritus.

t autem

u. 2. fi. cap. 2.
lib. 4. f. 14.
15 fig. T. V.
x. 2. fig. ca. 2.
lib. 4. m. p.p. 14. 15 fig.
G.x. 2. fi. cap. 2.
lib. 4. m. ad x.
15 fig. X.a. 15. fi. X. 20
fig. K.b. 2. fi. cap. 2.
lib. 4. p. 1.
2. fig. ca. 2.lib. 4. b.
d. 14. 15 fig.

c. f.

r. 15. fi. 8. 8.
f. 2. fig. ca. 2.
lib. 4. 1.p. 14. 15 fi.
T. V.b. 1. 2. fi. ca.
2. lib. 4. c.

autem sibi peculiare, quibus uniuerso corpori uenterculus famulatur. Verum hæc nimium obiter perpendunt, integros libros hac quaestione, An uenterculus suo quem iecori conficit succo, aut sanguine seorsum, an simul ambobus cnutriatur, commaculantes. Quandoquidem beneficio illarum facultatum, quas uenterculus cum reliquis partibus communes adipiscitur, proprium sibi nutrimentum ex uenis allicit, retinet, elaborat, & si quid superfluum ipsi fuerit, a se abigit. At munij, quibus toti corpori uenterculus famulatur, quarumque gratia plerisque Rex corporis uocatur, is esculenta quidem poculentaque rectis fibris per stomachum ex ore assumit, mox obliquis fibris assumptum retinet, totumque tantisper amplectitur, donec id ingenuita sibi altrice facultate, in succum cremoremque colore substantiae suae similem reddat. ac demum quod confecit intestinis exhibiturus, inferius orificium suum laxat, transuersisque fibris quod amplexabatur deorsum protrudit. Cæterum uim ipsius alteratricem, unde quaque eum circumdantia organa, ac uelut lebetem ingentes foci solent, excalefacientia, non parum adiuuant, totam enim superiorem eius sedem uersus anteriora & dextrum ipsius latus, & in posteriori sua sede dextrum gibbum, iecur complectitur. elatior uero pars ipsius ad superioris sui orificij posteriorem sedem consistens, & sinistrum eius latus uniuersum, septo ambitur, excepta solum ea regione quam lien ad sinistrum uentriculi latus humiliori posteriorique parte occupat. In posteriori autem sede uenterculus inferiorem omenti membranam, & quæ in illam excurrunt uasa proximè subtensa obtinet. Dein sub hac septi transuersi pars, & uena caua, & magna arteria truncus præter dorsum, ipsiusque musculos consistunt. Porro uniuersæ inferiori uentriculi sedi omentum ipsi partim attenditur, partimque connascitur. præterea & huic sedi sub omento colum intestinum elatius, tenuia uero intestina demissius, adtenduntur. At alij anteriorem uentriculi sedem omento integri somniant, quum tamen elatior omenti membrana recta duntaxat linea inferiori ipsius parti secundum anteriorem adnascatur, nulla interim omenti parte uentriculi anteriori sedi obducta. Vacat itaque magna anterioris uentriculi sedis regio, neque iecore, neque septo transuerso, neque omento, neque liene obducta, sed omenti uice aliud uenterculus hic obtinet subdidit, in calefaciendo huic non absimile. Præter peritonæum enim & octo abdominis musculos uena ab umbilico iecori deducitur, qua fetus nutrimentum accipit, quæque post partum exanguis inutilisque efficitur. Huic uenæ quæ peritonæo nexa uentriculo insertitur, in circuitu adeps multus non tamen omnibus æquè copiosus adnascitur, qui ut & uenterculus suo in concoquendo munere alacrius laboret, aliquid auxilij præbet. Impensius enim conducit iecur, lien, & quæ posteriori uentriculi sedi subtenduntur uenæ ac arteriæ, ut & ipsum quoque seipsum indefesso suo motu uenterculum minime negligit. Quinetiam cordis septo incumbens calor, ad perfectiorem uentriculi functionem non inutilis censendus est.

Qui uentriculi munij subseruiant partes ipsi accumbentes, atque ita illius ad alias partes conatus.

Nulla omenti partem anteriorem uentriculi sedi obducit.

Hæc petes
e. 2, 26, 12,
20 figure,
ut quæ uen
triculi suu
narrare.
mus colligere prom
ptum sunt.

i. 2 figura
dem G.

DE OMENTO. CAPVT IIII.

OMENTI delineationem imprimis proponit quarta figura, ac secunda, & tertia, uti in illarum figurarum indice commemoratum est. hoc Arabum interpretibus & nostra ætatis chirurgis dicitur Zirbus, sine appendice: aut cum appendice, Zirbus adipinus, Tirbus, Chypeus, Ventrif mappa. & ut Græcis, Εσλα, Epiplex.

Omenti sermo
nem nunc insti
tuendum.



Omentifcus.

PROXIMUM nunc erat intestinorum, ut quæ confectum à uentriculo suc cum excipiant, enarratione subiungi. sed quia illis omentum incumbit, & uelut innatat (unde & à Græcis ἐπιπλοὺν & ἐπινθῶν dicitur) & dissectantibus prius quam intestina occurrat, ac demum non minus quam intestina uentriculo continuum magna ex parte est, non admodum inopportune id hoc loco aggrediemur. Omentum itaque in peritonæi amplitudine positum, mox anteriori illius sedi subijcitur, & super intestina extensum, eiusque fundum exporrigitur: atque ab his etiam sedibus omentum originem ducere, non multo post audies. quare etiam in dissectionibus perpetuò illis sedibus attentum proximè reperitur. At non ita omnibus obductum intestinis ad pubis usque os (ut in canibus promodum semper) in homine reperitur. Nam ipsius, quæ intestinis obuolui debeat, portio, raro ultra umbilicum descendere conspicitur, sed maxima sui parte sinistrorsum lienem uersus retrahi & conuolui. Quod quum in hominibus laqueo suffocatis primum obseruari, ex cōcussu moruque corporis hoc euenisse arbitrabar: sed postea id ipsum in aqua suffocatis, & capite truncatis, item laterali morbo, aut phrenitide, eiusque generis affectu alio quopiam mortuis, & in his etiam quibus

a In 2 fig.
Q. Q. Q.
mox in ac
sub A, B, C,
D.
b Confer a
figura sex
te, & sedu
lò spectat a
fig. & 4.
c Quemad
modum c, c,
3 fig.

quibus uiuentibus thorax abdomenq; aperiebatur, animaduerti: atque, ut semel dicam, in sano quod ad omentū attinet homine, ad pubis usq; os id descendere raro cōperi. Quin etiā quum idem obseruasset in dissectionibus obeundis uir diligens IOANNES DRYANDER, medicinae mathematicesq; professor, quid de Hippocratis aphorismo sentirem, in quo ille mulieres præter naturam obefas concipere negat, quia os uteri illis omento comprimitur, prolixè & eruditè literis à me percunctatus est, ac præter cætera quæ de ramicum differentiis symptomatibusq; mecum egit, sibi omentum ad scortum deuolui, & inibi ramicem (quem ab omenti descensu, Græci *ὑπογαστήριον* appellāt) haud posse fieri arbitrabatur. Verū retractus ille omenti sinistrorsum sursumq; fundi uteri os omento comprimi, & ad scortum deuolui posse omentum non impedit. Nam si dissecans humiliorem omenti partem sursum reuolutam leuiter deorsum traxeris, citra aliquam omnino diuulsiōē in omnibus hominibus facili ad pubis usq; os intestinis ipsum obtendi posse deprehendes, eiusq; finem^d inter posteriorem uesicæ sedem, & uteri anteriorem leui occasione colligi, ibidemq; uteri cervicem (si omentū præpingue sit) utrunque comprimere doceberis, dummodo in muliere id inter uesicam & uterum, ut in sua sede poneretur, extenderis. Quanquam eiusmodi compressum uix tantum esse autem, ut ingressum uirilīs feminis in uteri fundi^e orificiū inhiheret, nisi penis breuitas hīc simul obesset, ac procul ab uteri fundi orificio semen redderet, cuius dein ad fundum ingressum concidens compressaq; cervicis uteri ante fundi orificiū sedes remoraretur, quæ simul obeso comprimeretur omento, ac parum scilicet à pene distenta, semen sibi adhærens seruaret. Similiter etiam omentum ad scortum decumbere, in ramicum sectionibus interdū animaduerti, quum in ijs quibus intestina in magnam peritonæi amplitudinem detruderentur, & cum seminarijs uasis ipsa amplectens tunica præcinderetur, portionem omenti quæ in scortum deciderat, auferri uiderim. Neq; istud solum manu tales affectus curantibus interdum accidit, uerū etiam intestini portuicula ab imprudentibus artificibus amputata, præsentem ægro mortem parat. Præterea in latomi cuiusdam, quem ex casu ab alto mortuum Patauī dissecuimus, ramicis uitiū, id quoq; luculentissimè ostēdit. Huic namq; dexter testis cum seminarijs uasis, quum à ramicæ semel curaretur abscisus^f fuerat, & rursus in sinistro latere idem affectus inualerat, quem ex intestinorū & omenti in scortū descensu cōtigisse, dissecando comperi, adeo ut is certam mihi coniecturam faceret, ad pubis usque os, ipsumq; scortum etiam omentum deuolui posse, licet id sursum in latus sinistrum dissecantibus plerunq; retractum obseruetur. Magnum enim (nollem nanque cum Galeno maximum dicere) inter animantia hoc homines sortiantur, ut & inde nonnulli *ὑπογαστήριον*, quasi dicas omenti gestores appellentur. Porro omenti^g figura proximè marsupij, aut sacculi, aut peræ imagini conuenit: ac in primis au cupum peris, quæ orbiculatum habet orificiū, posteriori sua parte elatius quàm anteriori ascendens. Huiusmodi namq; pera omenti figuræ ad amussim cōgrueret, si uno constaret corio, aut ex lana texeretur, ac undequaq; inconlutilis, & unum duntaxat corpus esset, cuiusmodi profectō est omentum, quod substantia est membrana nullis fibris implicata, simplexq; sed multis abundans uenis, arterijs, neruis, & aliqua sui regione glandosum sibi innatum habens corpus, & multum quoq; adipem. Vnde uerò hæc omnia ortum ducant, intelliges promptissimè, si talem peram qualem antea proposui, animo cōceperis. in qua unam partem anteriorem superioremq; alteram posteriorem inferioremq; appelles. Ad eum nanque modum unam omenti partem^h superiorem anteriorem^{ue} membranā, & alteram rursusⁱ inferiorem seu posteriorem dicimus, etiam si omentum re uera duntaxat^k unica (atq; id potissimū in canibus) sit membrana, anteriorq; pars posteriori, ut in dicta nuper pera, incumbat, & cōtinua sit, & omentum quoque sacculi modo cauitatem quæ repleti posset, constituat. Inferioris itaq; membranæ omenti origo à peritoneo pendet ea sede qua^l primū sub septo magna arteria descendit, ac primū uenam cauam ibidē contingit. Peritonæum enim quā à uertebRARUM ligamenti principium ducit, ac utrinque tanquam à uertebRARUM corporibus abscedit, membranulas magnæ arteriæ & uenæ cauæ offert, quibus illæ dorso affirmantur. Ab his membranīs iuxta eam septi^m partem, quæ undecimæ thoracis uertebRæ corpus respicit, aliæ propagines membranæ exurgunt, omento originem præbentes, illudq; dorso hīc alligantes. Inferior hæc omenti membrana dextrorsum ad iecoris cauum deo portæ uena prodit, perfertur: ac iecoris portioni aliās alij aliquādo adnascitur, ut & alicui septi transuersi sedis spurij costis hīc obductæ, ac id rarius accidit, neque ex eiusdem costæ id semper trans regione. Præfens omenti membrana à iecoris cauo ad dextrum uentriculi latus, cui etiam connascitur, procedit, & ad duodeni intestini exortum, cui propemodum ad ieiunum usque intestinum etiam subnascitur, hincⁿ orbiculatim semper ad infimam uentriculi partem cōscendit: quam simulatque attingit, ac ex dextro uentriculi latere uersus anteriora repit, ea

Omenti *fig.
guta.*

Omenti *sub.
stantie breuis
enumeratio.*

Omenti *ortus
ac dein nexus.*

omenti pars quam superiorem ipsius membranā dicimus, à ventriculo exoritur. Tertia enim uentriculi tunica à peritonæo pronata, secundum totius uentriculi latitudinem^o recta linea, & ut Aristoteles dicebat, futura modo ex humili sede uentriculi uersus anteriora superiorē omenti membranā ex se deducit. Superior hæc membrana ex dextris uersus sinistra secundum uentriculi fundum procedens, caue lienis sedi recta linea * implantatur, quod etiam inferioris omenti membranæ sinistra pars protendit, ambæq; superior uidelicet & inferior membranæ lienis cauo simul commissæ innascuntur. ita sanè, ut cōmemoratus iam omenti ductus, orbicularem efficiat circulum à dorsi medio ad iecoris portas, & hinc secundum uentriculi fundum ad lienis cauum, & inde ad dorsi medium procedentem. Totum igitur semicirculum inferiorem à lienis cauo per dorsum ad uentriculi usque dextrum latus pertinentem, inferiori omenti membranæ attribuimus. superiori uerò membranæ (quam cum multis Anatomicis solum nouisse uidetur Aristoteles) eam circuli partem ascribimus, quæ à uentriculi dextro latere per ipsius fundum ad cauam lienis sedem ducitur. Porro inferior membrana toti posteriori uentriculi sedi^o subtenfa, decliuus, ac uersus anteriora fertur, atque ad humilissimam uentriculi sedem secundum corporis latitudinem omenti membranam superiorem contingit. hinc ambæ mutuo sibi incumbentes, deorsum super intestina subq; peritonæo ducuntur, & si in hoc super intestina ductu membranæ non implicentur, ea anteriori parte ac in lateribus obtegunt, & ad pubis usque os humiliori suo extremo pertingunt. Si uerò intestinorum sedem duntaxat operiant, quæ supra umbilicum consistit, atque quod frequenter euenit in sinistro latus cōtractæ iaceant, illæ sese uisui offerunt reuolutæ admodum, & uelut in spiras collectæ. Membranæ hæc nullis nexibus intestinis connascuntur, præter inferiorem membranam, quæ in hominibus colo intestino pertinacissimè continuatur per totam eius intestini^o sedem, quæ secundum uentriculi fundum prorepat. Neque id segniter in homine obseruandum uenit, quum inferior omenti membrana mesenterij loco ipsi colo intestino sit, qua id uentriculo exporrigitur. Colum enim toto illo ductu nullam exigit mesenterij partem, secus multo quàm in canibus & simijs, quibus omentum uix colo connascitur, atque ut prius relatum est habet. In homine uerò inferior omenti membrana mesenterij uicem gerit: imò si omnem fidem libris (uti professio in dissectione decet) derogans, accuratè singula examinaueris, membranæ inferioris omenti portionem intestinis exporrectam quodammodo ex tertia coli intestini tunica pronasci fateberis. Atq; id eo te expendere uelim diligentius, quo id minus à Galeno, qui simijs nimium tribuit, animaduersum est: uti sanè Herophilo & Aristoteli id uidetur fuisse perspectissimum, qui omenti partem colon dorso colligantem, omenti loco non habuere, sed eam tantum partem quæ à uentriculi fundo & colo intestino enascitur, intestinisq; obducitur. Quanquam satis fore arbitror, si eam quoque omenti partē quæ uentriculo subrenditur, columq; continet, omento attribuamus, quum ea omenti reliquæ portioni cōtinuetur, & eosdem usus cum inferiori canum omēti membrana suppeditet: quamuis interim ex abundanti hominis colo mesenterij uice sit. Cæterum ad hæc, superior omenti membrana in homine inferiori membranæ ad coli regionem connata reperitur, quæ id uentriculo exporrigitur. adeò ut quispiam nonnullis nexibus superiorem omenti membranam colo quoque intestino secundum uentriculi fundum connecti, haud absurde dicere possit. Quod autem Galenus omentum modicis, & iisdem laxis nexibus, idq; ad dextrum duntaxat latus colo intestino committi prodiderit, in causa fuisse simiæ mediam inter canes & homines naturam sortitæ. Omentum nanque canibus nulla ex parte colo alicui uel alteri intestino adnascitur. Simijs autem medio se habet modo, licet illæ adhuc ad canis constructionem potius quàm hominis accedat. Venæ omento implicatæ solius uenæ portæ sunt soboles. nulla nanque à caua in omentum, uel ubi id principium sub uentriculo ducit (& si aliter Galenus senserit) pertinet. Venas enim inferiori membranæ omenti dispensatas, si ad amussim singulas examinaueris, ab eo portæ^o trunco dispergi inuenies, cuius præcipua portio in lienem exhauritur, quemq; doctrinæ studio graciliorem & sinistrū portæ truncum suprā uocauimus. Primum itaq; omentum portæ^o caudicem ex iecore proficiscentem excipit, sibi iam commemorandas in ipso ductu propagines assumens. Ac inferior quidem omenti membrana^o tres uenarum radices admittit, ex humiliori sede eius portæ trunci, qui ad lienem fertur, depromptas. Vna notata satis dignæ magnitudinis in dextram potissimum eius membranæ partem multiplici serie dispergitur, quibusdam furculis in colon quoque pertingēs. Secunda iam commemorata amplior aliquantulum post originem in duos mutuo multum abscedētes ramos diducitur, à quibus postmodum in mediam inferioris membranæ omenti sedem, uersus sinistrum tamen magis, frequentes admodum soboles diffunduntur, quæ homini in colum intestinū ca^o serie pertinent, qua uenas mesenterio intertextas alijs intestinis deriuari nouimus, ac proinde etiam frequentior

Omenti cum
colo nexus.

Venæ omenti
implicantes.
Lib. 6. de Ad
min. dissect.

017 fig. 1.
h. 4.
p secundum
R. T. S. 2. fig.
* inuere
tab. 19 fig.

q vi cerne
re est in 3. fi.

r. 6. 8. 10. 11.
ad Q.

si. ca. s. li.
F. 4. si. ad
nistrum la
tus f.
t. si. ca. s. li.
B. 4. si. h.
u. si. ca. s. li.
L. S. V. fig.
4. x. 4.

xio, 11 fig.

quentior multo ramorum series in hac membranæ parte colum dorso alligante uisitur, quam in reliqua eius parte, quæ à colo deorsum ducta, intestinis obtenditur. Deinde etiam radices hæ hominis omento insigniores obtingunt, quàm canis, quod illi nulla uenula omentum accedens colo committatur. Tertia radix, non semper apparens, in sinistram humilioris membranæ partem aliquouq; perinde ac in ipsum colum quoque, deducitur. Poitò superior omenti membrana uenas mutuatur à duabus ad inferiorem uentriculi sedem in ipsa membrana exporrectis. Ab his enim innumeræ soboles deorsum in eam omenti membranam excurrunt, non quidem recto prorsus tramite, sed obliquo quodammodo & errabundo, uti retium funiculos implicari cernimus. Ac proinde etiam omentū Græcis γαστριμύδιον & σπυλιόν, ut & uulgò rete & reticulum dicitur. Quanquam fortè non à uario uasorum ductu, omentum ita fuerit appellatum, sed quod ab ijs quibus committitur partibus liberatum, & deinde distentum, rete piscatorium uni accommodatum baculo referat. ^b Arteriæ omenti ab illis pendēt, quæ uentriculo, lienī, iecori, & bilis uesiculæ distribuuntur, has nanque omnes non secus ac uenas omentum tutò deducit, ac ab illis suarum peculiariū uenarū coniuges adeò numerosas adipiscitur, ut quàm paucissimi uenarū furculi, citra arteriæ cōsortium, ipsum perrepent. Item præter cōmemoratas modò arterias, inferior omenti membrana aliquouq; grandiorē in intestina porrectā deducit arteriam. Sic ^a neruis quoque illis omentum intertextitur, qui à sexti paris cerebri neruorum portionibus secundum costarum radices exporrectis iecori, lienī & uentriculo implantantur. Cæterum ^c adeps quo omentum abundat, in obesis præpinguibusq; hominibus plurimus, in macilentis modicus, in extremè siccatis & marasmo mortuis, etiam aliquis reperitur: isq; perpetuò uenis & arterijs omenti attensus, ad uasorum quidem latera duntaxat medio cris est, superius uerò ac inferius quoque, quibus multus accedit: adeò ut illis etiā uasa alioquin gracilia pinguedine prorsus occultentur. At in ^d intermedijs uasorum spacijs, nullus adeps affertur, ut nec in alijs membranīs quibus adeps innasci consueuit, unde etiam promptius colligitur, hunc ab exudante ē uenis sanguine & membranarū frigore in crassato, mutantisq; corporis (membranæ nimirum) colorem mutuantē progigni. Præter adipem qui ambabus omenti membranīs communis est, inferior ipsius membrana posteriori uentriculi sedi substrata, priuatim ^e glandosum quoddam corpus impense magnum exigit: quod quia in canibus rubet, simplicisq; carnis speciem quodammodo exprimit, Græcis λευκίμυξ & μαίμυξ appellatur. In homine autem hoc corpus magis album quàm rubrum cernitur, uenæ portæ, articularum & neruorum ramis inibi attensus, ut illorum diuaticatio inferiori membrana omenti duntaxat suffulta, reddatur securior, utq; uentriculo etiā instar substerniculi ac puluinaris subijciatur. Huiusmodi planè ^f corpus substantiaq; est, quæ duodeno intestino subtenditur, quæq; hæc uenus falsò uentriculi humilioris orificium (ne quid inconcoctum efflueret) occludere credita est. Atque is profectò præcipuus maximusq; omenti usus mihi censetur, ut securè ramos portæ in lienem, uentriculum & duodenum intestinum, ac coli non infimam partem exporrectos suffulciat, ac ipsi implexos deducat, neque uerò hos duntaxat, uerū etiam ut arterias quoque & neruos illis quas modò dicebam partibus inferendos sustentet ac tueatur, & demum usui potissimum respondeat, in utero quidem ^g secundarum, in capitis autem amplitudine ^h tenuis qua cerebrum inuoluitur membranæ. Deinde quod haudquaquam minimum est, omentum dorso uentriculum colligat, & rursus iecur lienemq; uentriculo unā cum uasorum neruorumq; interuentu connectit: ut iam taceam quantum homini firmando colo officium separatim subministraret. ex accidente uerò uelut quoddam intestinorum inuolucrum tegumentumq; efficitur, respondet. membranæ nanque est, ut fortius uenas, arterias, neruosq; ipsi implexos colliget, meliusq; intestinorum calorem reflectat, ac promptè cum intestinis subsidere extendiq; queat. Tenue autem, & potissimum qua intestinis innititur, ne pondere grauet. Vnde etiā Bruxellen si nostro idiomate plumæ nomen meretur. Quod uerò omentum sanguine & spiritu frequenter tibus illis uenis arterijsq; asseruato, intestinorum & uentriculi qua parte ipsi attenditur, fouendo calori accommodum sit, etiam si non dicatur, manifestum esse arbitror. Cæterum num adeps insita ac peculiari natura calefaciēdo prosit, an tantum penicilli carnis ue aut membranæ potius ritu iuuat, non æquè ab omnibus conceditur, alijs quidem frigidum adipem, alijs uerò calidum pronunciantibus.

DE INTESTINIS. CAPVT V.

Intestinorum imaginem potissimum sexta figura & septima & octaua & nona exprimere conati sumus. quanquam hic etiam faciat tertia figura simul cum decima & duodecima.

Quæ hic inter
si notum nomi
ne complectan
tur.



Intestina cõti
nuum quidem ef
se corpus, sed
plurilitatis
numero uar
ijsq. nomi
bus, diuersas
ob causas, do
nari.

Breuis intesti
norum histor
enumeratio.

Intestinorum
a uentriculo ex
ortus, et gra
dis ductus seu
fusus.

Gracilis inter
stini in uia di
uisio.
Primum.

INTESTINORVM constructionem ipsorum officio & usui cõuenire
tum demum opportunè narrabo, simulatq. eorum situm, formã, substan
tiam, connexum, quæq. ipsi implantantur uenas, arterias & neruos, ac si
quid aliud ad eorum fabricæ enarrationē reliquum erit explicuero. Intesti
norum igitur, quæ Græcis *γαστήρ* dicuntur nomina, nō omnia in præsentī
complectimur uiscera, uel quæ costas succingēte membrana & peritonæo
amplectuntur organa: aut etiam uel stomachum & uentriculum, ijs quæ

nunc intestina uocabuntur, non ascribam. Quandoquidem ductum ab inferiori orificio uen
triculi ad podicem usque pertinentem, qui uulnas Italicas ut plurimum quatuordecim & dimi
diam longitudine æquat, peculiariter nūc intestinorū nomine comprehendam. Quæ etsi con
tinuum idemq. sine corpus, quum tamen in uarios & multiplices & figura differētes anfractus

spirasq. circunducantur, neque omni ex parte eandem situm, substantiã, & formã naturam for
tiantur, ac denique alia alijs hominis parti contigua efficiantur, neq. præcipuis omnium eorum
usus par uideatur esse, ac si plura intestina essent, dissectionū peritis hæc enumeratū, primum
in crassiora & graciliora ipsa diuidentibus, atq. ex his rursus singulis ternariū numerū, ut sex

sint uniuersa cõstitutuentibus, ad eum quasi modum, quo idem cõtinuumq. perpetuū iter plura
uarias ob causas nomina sortiri cõstat. Quemadmodū Lutetiæ à diui Iacobi porta ad eam usq.
quæ Martini dicitur, iter, etiã si rectum sit, neq. per uarios giros procedat, nihilominus tamen
flexies (si recte memini) nomen euariat. Primum à diuo Iacobo, inde à paruo pōnte, mox à tem
plo Virginis, & nō multo post ab eius ponte, inde ab cenopolio quodam, & postremū ab æde
Martini appellationem mutans. Idem multo magis in fluminibus nō regis, & quæ per mul
tos giros procedunt uisjs fieri cernimus. Cæterum utcunq. intestina inter se uariant, omnia ta
men inter uentriculum, & quæ excrementa egerimus sedem collocantur, forma tereti donata,
sed nō omni ex parte æquè capaci & orbiculata. Substantiam habēt membraneam, uerū un
dique non pariter aut crassam, aut tenuem: deinde duas peculiare tunicas orbicularibus, &
alicubi etiam rectis fibris intertextas fortiuntur, tertiã ad has tunicam à peritonæo obtinentia.

Venarum præterea, & arteriarū, & neruorum furculos suscipiunt, sed non ubique similiter nu
merosos, quemadmodū nunc persequi enitar, ab ipso intestinorū exortu sumpto initio. Ex hu
miliori orificio uentriculi, quod in elatiori sua sede & dextro ipsius lateri proxima cõstitit, prin
cipium intestinorū exoritur, illiue orificio continuatur, quod simulatq. uentriculo prodit, in
posteriora retortū, sub sede uentriculi posteriore secundum dorsi dextrū latus rectā deorsum

proficiscitur, in nullos omnino anfractus reuolutum. Quū primū uerò ad inferiorē usq. uen
triculi sedem intestinū istud sic occultatū, rectaq. descendens pertingit, sub colo intestino (quod
paulo post hæc porrigi audies) latitans, statim ex dextra sede in sinistru retorquetur, ac uelut ex
alto sursum antrorsum ue affurgēs, in frequētes innumerosq. giros & anfractus reuoluitur, ac
nullis omnino intestinis obrectū, sedem uniuersam quæ sub uentriculo ad pubis usq. ossa, & ad
ilia utrinq. habetur, occupat, ea demum excepta, qua huic intestino colum instar orbis ad late
ra circumduci, postea dicā. Horum sanè anfractuū seu reuolutionū nullus omnino neq. nume
rus, neq. idem penitus ordo habetur, neq. illæ magis dextrā quàm sinistram uentris sedē implent,
præter quàm quod ad dextrū ilium seu ile, ubi sedem longē maiorem supra ilium os ad pubem
usq. opplent in sinistro latere, coli intestini anfractu quopiam eam sedem sibi priuatim uendi
cante. Vt cunq. uerò multiplices, uarijsq. huius intestini conspiciantur anfractus, perpetuò ta
men è directo mediæ sedis dextri illi formam, ipsiusq. amplitudinem, & pleraq. alia (uti post
subiungā) euariat, eandemq. crassitiem amplitudinemq. ab orificio uentriculi inferiori ad hanc
usque sedem obseruat, nisi aliquādo huius intestini pars sub uentriculi fundo ad dorsum pro
ximè affirmata, inter diffecandum capaciior, ampliorq. reliquo intestini ductu (quemadmodū
subinde fit) occurrat, atque huiusmodi gracilis intestini ductus uisus, quod ter nomen, ac si
tria essent intestina, uariat. Primum quidem constituitur tota ea intestini pars, quæ uentriculo
substrata, ab inferiori ipsius orificio rectā quodammodo eousq. descendit, ubi intestinū in an
fractus orbesq. primum cõuolui incipit, ac de huius intestini nomine aniles admodum conten
tiones apud illos reperies, qui partis refectione neglecta, futiliter de uoce altercantur. Sunt qui
totam hanc partem quæ duodenum digitorū longitudinem in uiro ut plurimum æquat, non
intestinum, sed *exortum* & exortum, seu processum, seu ut eorum uertunt nonnulli appendicem
uocandum cõtendant. Alij etiam si ipsius principium è uentriculo nascatur, intestinum tamen
esse, ipsiusq. orificium *exortum*, reliquum uerò ipsius ductum, intestinū uocari affirmant, inte
gros commentarios nugaci disceptatione implentes, parte interim quam in controuerſiam uo
cant, prorsus ignorata. Vocetur itaq. nobis uulgate nomine tanquā succinctiori, duodenum,

Helius or
6 libri figu
ris sunt ob
uad.
b 7 fig. 1 ab
B, ad 8 fig. a.

c 8 fig.
d 7 fig.

e 14, 15 fig.
Hic 6 fig. a.
f 7 figura
ex h.

g 7 fig. ab 1
ad K. 14, 15
fig. p.
h 7 fig. K, L,
i 6, 8 fig. p.
uerſus Q.
h 7 fig. ab L
ad M conti
nuo ductū.
l 6, 8 fig. N
p, Q, R, S,
T.
m ab R, S
ad T.
nad 7, 8 fig.
gura M.
o Efficit uox
ta L et K 7
figure.

p 7 fig. ab
1 ad K.

97 fig. K.

7. 8 fig. N
committitur M.7 fi. ab L
ad 33.

35 fi. c. in d.

Pete havi
ajitruo-
ne ex 9 fi.

7. 8 fi. M.

9. 17 fig.

9 fi. k. h. fi.

tur in L.

nbens i.

vide inte-

riorū ne-

im ad me-

nterū 10

figura.

Ad 4. 4. fi.

fi. ca. 5. li.

31.

fig. ca. 12

mul 4. fi.

gure r.

fi. ca. 5. li.

3. 12 fi. k.

in fi. cap.

12 lib. 37.

fi. cap. 12

lib. 3. a.

Vt cerne-

est in 10.

12 fig.

fi. ca. 1. li.

4. 4. a.

4. 4. a.

figu. C.

12 fi. i. i.

aut intestinum longitudinem duodecim digitorum æquans, siquidem id Græcis, & imprimis Herophilo *διωδεκάδωλον* appellabatur. Secundum intestinum illic incipit, ubi iam commemoratū in anfractus gyros ue prinū conuoluitur: & *νσλω*, seu ieiunum appellat, quod inter dissecandum reliquis intestinis inanius & magis uacūū reperiatur. Huius nomen alij explicare conantes, tanquam nihil unquam in se contineat, ac per ipsū à uentriculo confectus cremor nunquam transeat, aut momento tantū in eo hæreret, scribere uidentur. Tertium intestinum ileon, seu uoluulus Latinis, ut & Græcis *ἰλεον*, à frequentibus fortassis quibus inuoluitur anfractibus dicitur: ac etiam loco in quo ad abdominis latera continetur, nomen indidit. Hoc in crassi intestini principium definit, ubi uerò principium suum obtineat, nō satis mihi constat. Equidem ignoro quantam gracilis intestini portionem ieiunū nomine, grauit̃ de nominibus litigantes, comprehendī uelint: neq̃ sanē à ieiunū intestini initio, ad ilei usq̃ finem manifestum aliquod indicium obseruo, quo ieiunū finem ac ilei initium internoscere queam. Vbi enim duodenum crassum intestinum in ieiunum finire, ieiunumq̃ intestinum incipere credimus, copiosiores uenæ ac arteriæ, quā propter ilei ad crassiora intestina terminum, uisuntur: uerū media media sese habent modo. Deinde ieiunū initium rubicundius est, ilei finis magis albicans. Ad hæc, inter secundum ieiunū initium fortē magis inane ilei termino offenditur, ac in medio ductu, uti & antea dixi, omnia sunt media. Quapropter quis ieiunū habendus sit finis, aut quod ilei principium, non statuo: id intrepidē affirmans, nihil minus ieiunum ab ileo quā inanitione, ut ceteri dissectionis profectores obseruari asserunt, dirimi posse, neque profectō minus duodenum, quā id quod ieiunum uocant, inane reperiatur: & maiores (ut dicam postea) ob causas. Ac tales gracilis intestini ter nomen emutantis, ductus situsq̃ sunt. Forma autem undecunq̃ constat simili, ad amussim uidelicet tereti, & omni ex parte æquē ampla, nisi interdum (ut prius quoque innuebam) quā dorso proximē committitur, ieiunum quē incipit, ac ad inflectionem uasis bilem ad intestina deferentis, amplius obseruetur. Substantia quoque toti intestino gracili eadem est, membrana scilicet, modice quē admodum carnea. Constat enim tunicis duabus, quarum interna durior membranaq̃ est, uerū interiori uentriculi tunica mollior: externa tenuior, magisq̃ carnea: utraq̃ tamē, tam exterior inquam quā interior tenuis est, & transuersis orbicularibus ue fibris tantum intertextitur: nisi fortassis externa, idq̃ potissimum ad ilei in crassiora intestina terminum, rectas quoque aliquot nanciscatur fibras, quē tamē sunt quā paucissimæ. Duodeni intestini pars elatior, utpote quæ uentriculo uicinior est, tunicas suas crassiores obtinet, cum uentriculi tunicis aliquid sibi commune adhuc uendicantes. Tertia præter ducit. Hæc namque unā cum uasis ad cauam intestinorum sedem pertingentes dilatantur, tertio quē inuolucro intestina induunt. Caua autem intestinorum pars Anatomicis doctrinæ gratia nuncupatur, quā uasa primū attingunt, seu quæ intestina respicit, gibba uerò huic contraria. Ac duodeno quidem intestino tertiam tunicam ea omenti pars exporrigit, cuius beneficio intestinum id dorso colligatur. Ieiunum uerò ac ileum tertiam tunicam à mesenterio, quod ea dorso firmat, accipiunt. Sic duodenum quoque & ieiunū initium uenarum arteriarum quæ habent peculiare, secundum ipsorum longitudinem rectā deorsum ductas, multosq̃ furculos in progressu illis diffundentes. Ac uena quidem à portæ uena priusquam mesenterio inferatur, principium obtinet: arteria autem, ab ea quæ iccori offertur. Ieiunum ac ileum frequentes uenas arterias quæ suas nanciscuntur ab illis quæ mesenterio à portæ uena, & ab arteriæ radice supra renum arterias à magna originem ducente exporriguntur. paucienim ramī in graciliora intestina ab arteriæ propagine diffunduntur, quæ à magna arteria post seminalium arteriarum ortum originem sumit. Neq̃ etiam uasa, quemadmodum in duodeno, secundum ieiunū & ilei longitudinem sub ipsis deducuntur, sed uelut ex mesenterij cetro ex alto sursum tendunt, rectaq̃ antrosum in intestina pertingunt, in quæ numerosa sobole arboris radicum modo, in cauam præcipuē ipsorum partem implantantur, oculis suis in internam intestinorum sedem hiantia. Ileum & ieiunum neruos quoq̃ exigunt deriuatos à ramis sexti neruorū cerebri paris, qui costarū radicibus exporriguntur. duæ enim ab illis propagines utrinq̃ singulæ, ad mesenterij, & dehinc ad intestina frequēti utcūq̃ sobole discindunt. Duodenū uerò neruos si quos habet, ab illis exigit, qui inferius uentriculi orificiū, & dextrā fundi sedem adeunt. Dein duodenū priuatim id sibi uendicat, quod meatus bilē flauū ad intestina deferens, illi implantetur. Idem intestinum in hominibus, & adhuc magis in canibus glandosum illud corpus, cuius antea uentriculum describendo memini, peculiariter substratū possidet, ad suffulciēda uasa ei intestino propria, ac quarūdā corporis glandularū modo amplitudinē eius lento humore irrigandā. Quancūq̃ nō duodenū solum, sed et reliqua intestina omnia lento quo-

Secundum.

Tertium.

Vbi ieiunū in
estini finis et
ilei initium debe
at constitu.Gracilis inte-
stini forma.

Substantia.

Caua intesti-
norum pars,
quæ Anatomici
eis dicatur.Gracilium in-
testinorum uen-
æ et arteriæ.

Nerui.

Intestinorum
glandes.

*Crassiorum in
estimatorum hu-
storia.*

*Cæcum inte-
stinum cuius
modi.*

*Crassi intesti-
ni ductus fir-
tusq.*

dam & lubrico humore interna sede imbuantur, atque ut Rhazes non ineptè dicebat, sic stilium ualorum more inuitrentur instanneatur ue. At quum huiusmodi pleraque crassis etiam intestinis sint communia, illa quoque recensenda nunc ueniunt. Ileum intestinum sub dextri renis regione à quodam crasso intestino multis modis ipso gracili intestino amplior^u excipitur, non quidem ac si quis diceret exactè in crassi eius intestini initium, sed in ipsius propter initium latus sinistrum. Hoc enim crassioris intestini initium instar globi cuiusdam præmagni extuberat, in sinistro suo latere duo obtinens orificia, ° unum quidem ileo intestino continuum, & magis ab initio distans: ° alterum uerò humilior, & ipsi initio propinquius. Huic continuum est in hominibus intestinum, quod *τυφλόν*, seu cæcum ueteribus dissectionum professoribus uocatum esse certissimò noui, non ignarus interim, quid hodie plerique de cæco intestino commententur: decepti profectò, quod inter crassiora intestina id à Galeno alicubi recensetur, neq; aliter quàm amplius quispiam saccus, ac ueluti alter quidam esset uentriculus, ab ipso cæterisq; qui illum subsequuti sunt Anatomicis describatur. quum tamen in homine ° id quod cæcum appellandum duco, cæteris omnibus intestinis sit breuius, atque arctissima omnium intestinorum parte multo angustius strictiusq; & crassiori lumbrico in orbes conuolutum potius quàm intestino simile: adeo ut cæcum uix intestinorum appendicis loco, ac proinde minus longè in crassiorum intestinorum numero habendum esse uideatur. Atque hinc fit, ut Æsculapij nostri, scilicet quando hanc gracilem portiunculam in homine cæci intestini loco me commonstrare uident, Galeni descriptione nobis obstrepere, ac alij quidem ex saccosis illis cæcisq; Rabinis contendant, ° amplum illud coli intestini initium saccum, aut ut ipsi loquuntur, orbem & monoculum esse: alij uerò afferant, cæcum intestinum ob secūdi imperitiam à nobis minimè obseruari. Neq; uerò in cathedra hæc boasse contenti sunt, quum non desint qui de cæco intestino paradoxa conscribere, integrosq; libros, ut de duodeno intestino, commaculantes, magnum operæ precium se fecisse gloriètur, si nō unum cum ueteribus Græcis in cæco orificium esse, sed duo sibi proxima esse in mediū adferant. Quæ si uiderint, aut imaginati rectè fuerint, ea demum sunt ° quæ in coli initio extuberanti uisuntur, ac unū quidem foramē ilei intestini terminus est, alterum uerò eius quod cæcum esse dico initium. Neq; est profectò cur minus credamus, gracilem illam intestini portiunculam mesenterio nō annexam, sed sibi ipsi in orbes cōuolutam, & fibrarum beneficio hærentem, in homine cæcum esse intestinum: quantum uis eam amplitudinem usumq; Galenus ipsi tribuat, quæ huic minimè adesse uisuntur, suas potius caudatas simias hac appendice desuturas, quàm homines describens: quos tamen ueteres illi aggredientes, appendicem hunc intestini cæci nomine procul dubio donabant. Deinde Galeni descriptio cani fortassis accommodari hîc posset, cui cæcum intestinum multo quàm homini cōtigit amplius, neque in illo, ut in homine, inane propemodum reperitur. Quin etiam ueras glires & sciuros cæcum hoc intestinum adeo amplum nactos scimus, ut amplitudini ipsorum uentriculi facile respondeat, fixibusq; turgidū in sectione obseruetur: atq; hinc constat gracilem hunc appendicem in homine cæcum esse, quum uidelicet ductū ac sitū & forma pariter (licet nō amplitudine) illorū animalū cæco intestino his congruat, unumq; (unde etiā cæcum primò dictū est) nanciscatur orificiū. Insuper summus profectò Naturæ admirator Galenus, si hominis intestina unquā ita ut canū intuitus fuisset, hunc appendicē, & extuberās illud in homine coli initium, ileiq; cum ipso unitatē, & coli formā, longè secus descripsisset. quippe si aliud homo cæcū nācisceret, eum appendicē minimè præterisset Galenus, quanq; ortu nō nihil in homine & cane uariet, nā etiā si utriq; in dextro ileo collocet, hominis tamē cæcū ex sinistra magis coli initij sede q; dextra, ut in canibus, ut & Galenus attestatur, principiū ducit. Porro si cū nōnullis, qui secūti mihi astiterunt, in homine quidem ad eū usum quem Galenus ei tribuit, appendicē hunc à Natura primū formari dicerem, & ob nimiam hominum ingluuiē ex ileo intestino à uentriculo confectum succum absq; eo ut is totus cæcum subiret protrudi, atq; hinc appendicē in nobis tanq; inutile & marcidū, aliter fortè q; in temperatis Galeni hominibus, pendere affirmarē, ad nugacem illam tergiuerlationē deueniendū foret, qua alios tum fuisse homines fateremur, præcipuē quum amplum hoc coli intestini initium in homine cæci intestini usum abundē suppleat, & nō tæduntaxat gratia cæcum in homine haberi uideatur. In dextro itaq; ileo ad humiliores re-
nis dextri sedem extuberans illud ° amplum & rotundum coli principium habetur, quod hinc sensim rectā ad iecur sursum ° contendit, iecoris que caue parti nō nihil substernitur, ac ° bi-
lis uesiculam in homine contingit, cuius etiam contactu flauo colore hîc intestinum quandoq;
tingitur, ° inde ex dextro latere secundū inferiorem uentriculi sedem in sinistrū fertur, uentri-
culi fundo attensum: haud tamen, ut alijs uisum est, eum conscendens: aut ut uulgò dicitur, uen-
triculi fundo superequitās. Quum primum uerò ad sinistrū uentriculi latus pertingit, super de-
miffiorem

17, 8. fig. M.
in N.

o 7, 8. fig. M.
p 7, 8. fig. O.

q 6, 7, 8. fig.
O, 10. fig. P.

r 6, 7, 8. fig.
gu. N.

s Sum. O. et
Mad N. fig.
7, 8.

t 10. fig. T.
u 6, 7, 8. fig.
gu. N.
x 6, 8. fig. a.
N ad p.
y 10. fig. H.
x 6, 8. fig. H.
P ad Q. x.
sexta secum
dum x. x.

missiorem² lienis partem anfractus quosdam leuiter inflexos obtinet, ac paulatim supra³ sinistrum renem per ilium sinistrum decliue fertur, secundum peritonæi latus ad pubis usque os⁴ descendens. ⁵ Hinc rursus ad sinistrum latus quasi ad umbilici sedem ac anfractum (quem à medicis propter suos clysteres, quos ad gracilia usque intestina sese infundere arbitrantur, colicosque cruciatu perpendimelius optari) hic constituens, super ossis sacri initium tenditur, à quo recta deorsum ad podicem usque descendit, in⁶ uiris quidem sub uestica, in⁷ mulieribus uero sub utero ossi sacro & coccygis instratum, huic intestino, ab ilei intestini fine ad podicem usque pertinenti: & si par undique propemodum, præterquam in initio, ubi multo capacius apparet, sit amplitudo, figura tamen ductuque uariat, ac proinde tanquam in duo intestina subdiuiditur, ut⁸ quicquid à dextro ilio super dextrum renem sub iecoris cauo, deinde secundum uentriculi fundum ad lienem properat, & hinc rursus super sinistrum renem uiscerum pubem fertur, ac alium anfractum supra internam ossis ilium sedem faciens, ad sacri usque ossis initium proripit, Latinis pariter ac Græcis colum intestinum appelletur. ⁹ quod uero ab offe sacro ad anum usque pertinet, Græcis ἀνθυμικόν & ἀνθὺμῳ dicitur, Latinis longæon, rectum, & princeps. Colum enim in hominibus, aliter quàm in canibus, non ad amulsum tenes est, uerum per uniuersum ipsius ductum superius inferiusque¹⁰ depressum uisitur, ad latera utrinque quadam serie, uelut in¹¹ medios globos cellulasque extuberans. Atque hæc figura eo minus conspicua sit, quo colon recto intestino uicinius accedit, quod exacte teres, non autem colimodo depressum extuberansque cernitur. Ambo itidem ut cæcum quoque tunica extruuntur¹² duplici: quarum, ut in gracilibus intestinis, interna exteriori neruosis membrae uic magis & durior est, uerum colon utramque tenuiorem gracilioremque quàm rectum obtinet: & quanto colon recto magis conterminum est, tanto quoque ipsius tunicae crassiores meliusque nutritæ conspiciuntur. Interna utriusque intestini tunica transuersis circularibusque fibris, ipsidemque frequentissimis solum abundat: externa uero in colo intestino transuersas quidem nanciscitur, sed & rectas quoque quamplurimas exigit, non quidem secundum uniuersam intestini superficiem protensas, sed duntaxat inferius & superius ubi colon¹³ depressum esse diximus. Secundum enim eas coli impressiones rectæ fibræ protenduntur, & coli tunicae ibidem sunt robustissimæ, admodumque spissæ, & ut Galenus in quarto de Partium usu, de pluribus animalibus innuebat, colon fortibus ligamentis utrinque singulis constringitur, secundum longitudinem desuper ad inferna porrectis, quod me Hercule & homini Galenus ascripisset, nisi ipsius intestina canum intestinis eiusmodi ligamentis carentibus respondere putasset. Porro exterior intestini recti tunica per totum intestini ambitum rectis fibris admodum frequentibus passim abundat, adeo ut hæc plures rectas quàm orbiculares fortiat. Cæterum tertia¹⁴ crassorum intestinum tunica, quemadmodum & gracilium tunica tertia, à mesenterio ipsis uasa porrigente pendet, hoc enim caue intestinum sedit applantatum, in tertiam ipsorum tunicam degenerat, quanquam coli intestini pars, uentriculi fundo attensa, priuatim in hominibus ab¹⁵ inferiori membrana omenti tertiam ascliscat tunicam, quod hæc coli sedes eius membranæ beneficio dorso ita affirmetur, atque reliqua intestina mesenterij interuentu dorso colligari nouimus. Coli itidem & recti intestinum uenarum & arteriarum, quas pauciores hæc quàm intestina gracilia exigunt, à portæ & magnæ arteriarum ramis pendent. Colo quidem intestino toto progressu, qui à dextro ilio ad sinistrum ferè renem pertinet, arteriarum uenarumque, quemadmodum ieiuno & ileo, implantantur, ex alto scilicet sursum seriatim conscendentes, ac parti ipsius inferiori à sinistro rene ad rectum usque intestinum ductæ, & ipsi quoque recto uenarum arteriarumque, quemadmodum¹⁶ duodeno¹⁷ porriguntur. ¹⁸ Vna enim insignis uena à portæ ramis in mesenterium excurrentibus, & arteria etiam ab¹⁹ illa principium ducens, quæ ab arteria magna ad mesenterium seu uasorum terminalium exortu depromitur, secundum dictam coli partem & rectum intestinum mesenterio suffultæ, recta protenduntur, ac in progressu furculos seriatim unoque ordine intestinis offerunt. Verum de uenis ac arterijs in mesenterij descriptione rursus pertractabitur. Nervos autem crassiora hæc intestina cum gracilibus communes habent, & utraque lento uiscidoque humore intus oblinuntur: ac uti obesorum uentriculi adipem, aliquando satis etiam copiosum intus adnatum exigunt, quemadmodum & exteriori superficiem coli intestini, quæ id recto proximum est, & ipsi quoque recto, pingues quidam appendices adnascuntur. Intestinum rectum²⁰ musculos uoluntariæ fecium excretioni præfectos sibi priuatim uendicat, quos quum in secundo libro persequutus sim, non est necesse hic quoque eosdem recensere. Sed admirabilis potius Naturæ industria hic consideranda uenit, quæ ea omnia adeo diuine machinata est, nec quicquam nisi ad summum usum in intestinis extruxit, primum & potissimum

Crassum intestine in colo
& rectum diuidi.

Coli à recto differentia.

Crassorum intestinum tunicae.

Coli & recti uenarum ac arteriarum.

Nervi.

Adipis intestinis obnat.

Recti intestini musculi.

Intestinum minus, ac deinceps eorum constructionis ratio.

ea

ea efformans, ut horum beneficio quicquid esset succulenti in cibo uentriculi opera elaborato, id ad iecur sanguinis officinam duceretur. Deinde ut feces & quæ fuscæ inepta essent, debite excernerentur. Postremum etiam coquendi alterandique ui modica non nihil intestina prodesse, Natura uoluit, ut à uentriculo scilicet prius confecta absolutius paulum emutarentur. Atque ad hos sanè scopos illa respiciens, intestina artificiosissime sabrefecit, quod enim præcipue neque gratia educationis excrementorum, neque concoctionis, sed ut id quod in cremorem uersum est, per uenas assumptum in iecur totum deferatur, intestina ad eum quem diximus modum, fabricata sint, coniectare licet permultis. Primò quidem, quòd in nullo animali constructus sit uentriculus illis organis contiguus, quibus egerendo idem expurgatur. quamuis non impossibile esset, uentriculum ad anum usque extendi. Deinde, quòd plurimis animalibus intestina in multos frequentesque gyros & anfractus inuoluuntur. Postremò, quòd constet uentriculum cibum non antea demittere, quàm perfectè illum confecerit. Ventriculum igitur sed non esse contiguum, aut illi recto saltem meatu ductu ue iunctum, liquidò commonstrat, aliud concoctionis esculentorum, aliud uerò redditionis digestionisque, aut ut Graeci dicunt, *aidion* & organum fieri oportuisse. Quippe si idem omnino existeret, metuendū esset, ne frequenter uenæ crudum in edoctumque assumeret cibum: qui postmodum à iecore malè confectus, homini inuitis noxiisque foret. Sed & redditionis instrumentum, quod non rectà à uentriculo ad anum extenditur, sed quàm plurimis orbibus & anfractibus spirisque (ne ocyus hominibus nutrimentum non exutum elaboratur) inuolutum uisitur, nunc dicta confirmat. Si enim alius uenter uentriculo succederet, essetque ille redditionis, sicut hic concoctionis est, promptuarium, nequaquam exiguo tempore & plurimum alimenti per uenas frequentes in iecur susciperetur. Nunc autem per innumeratas uenarum soboles, ex uarijs illis copiosisque intestinorum anfractibus, quicquid succulentum à uentriculo confectum est, in iecur promptè transsumitur. Aliàs uerò si raris uenarum orificijs parum cibi in cremorem uersi, continuo incideret, tarda & diuturna succederet digestio: quum necessarium sit, ora uasorum elaboratum succum tangere. Si uerò alter magnus uenter priori subterderetur, cibus omnino modicam eius uentris sedem tangeret, solam nimium eam cui proximus attiguusque suis parietibus esset. Plurima uerò cibi portio, quantacunque scilicet esset in profundo, seu medio eius uentris spacio, uenarum apprehensiones fustusque effugeret. Sed nunc demum transitus angustia cibum in exiguas cōminuens particulas, cogit ut is propemodum totus tangat intestinorum tunicam, ad quam uenæ suis oculis hiant. Et si quid in transitu primianfractus, uasorum ora in internam intestinorum sedem hiantia effugerit, per secundum quidem tangit: & si hunc præterlabatur, tum omnino per tertium, aut quartum, uel alium eorum anfractuum qui frequentes numerosique subsequuntur, ut tandem nullus effugiat, aut lateat, aut excidat cibus ad nutritionem utilis, quando lege Naturæ & morbo liberum corpus dispensatur. Intestinorum itaque anfractus, ut quicquid succulenti humidique in confecto à uentriculo cremore esset, uniuersum distribuatur, comparati sunt. Et id præcipue tenuium intestinorum munus est. Crassa enim, & si ipsa quoque ad succorum distributionem conducant, peculiariter tamen eò conferunt, ne continuo, sed per longa intervalla egeramus. Hæc enim tanquam uenter aliquis siccis excrementis, uti uesica urinæ, subiiciuntur: unde etiam inferiorem uentrem eam nonnulli appellant. In his namque excrementa ita colliguntur, ut repente uniuersa simul educi queant: ita tamē, ut & hinc aliquis homini usus accedat, quippe si gracilium intestinorum suctum aliquid præterfugerit, quum longiori mora excrementa in crassis intestinis resideant, ipsorum uasa id exugunt. Ad hæc, quo maior adhuc esset cōmoditas moræ ciborum per eos anfractus delabentium, quandam alterandi concoquendi que uim toti intestinorum generi Natura indidit. Quamuis quum prorsus impossibile sit, non adesse unicuique animalis particulae uirtutem quampiam alteratricem, & non absit longè, parumque à uentriculo intestinorum substantia: necessarium sanè est, & uirtutem alteratricem ijs inesse, & uentriculi uiribus consimilem, & proinde in ipsis quoque intestinis cibum concoctionem aliquam suscipere est quàm manifestissimum. Quod autem commemoratis iam uisibus, quæ de intestinorum constructione supra scripsi, omnia competant, obiter quoque nunc subnectam. Hæc itaque ad uentriculum statim, à quo cibum accipiant, opportunè locantur. Duodenum uerò etiam si id fuisset utile, in nullos tamen anfractus ducitur, quòd sub uentriculo, quæ fertur, nullam omnino uacuam sedem obineat, in qua aptè in gyros flexi queat: deinde quòd portæ uenæ à iecoris cauo prodeunt cedere oportuerit. Ieiunum uerò & ilium mediam uentris sedem iustissime occupant, quòd inibi mesenterij centro sint proxima, breuissimoque ductu & uenæ portæ rami, & arteriæ magnæ propagines illis hinc diffundi possint. Porro de coli situ nimis quàm miserè se torquent dissectionum professores, quòd id quum

Situs intestinorum ratio.

27 fig. ab
ad K.
y 12 fig. h
27 fig. d
per uarios
anfractus,
tadē ad ss.
a 10, u fig.
L.L.
b 6, 8 fig. N.
P, Q, R, T.
excre-

excrementorum uelut quoddam sit promptuarium, ad uentriculi fundum iecoris que cauum porrigi conspiciant, ac alius quidem quia id fæces continet, innato que calore destituitur, ad uentriculum ferri uult, ut illius uicinarum que partium contactu maiorem concoquendi uim assumat. Alius sub iecoris cauo colon deduci contendit, ut ex bilis uesicula in illud resudans bilis, incitando excrementorum egerendi uim feliciorem reddat. Alius aliud comminiscitur, & interea nemo animaduertit, colon mesenterij centro non admodum debere uicinum esse, neque id uenæ portæ ramos cauo iecoris proximos oportuisse assumere, quum parum quod exugi deceat amplexetur. Vt itaque grandior dexteræ uenæ portæ truncus breuiori ductu gracilibus intestinis infereretur, ac succinctiori uia cibum ad iecur transferret, colon intestinum gracilibus cedit, ac ueluti per distantia maximè à mesenterij centro loca procedit, atque hac etiam occasione id præcipua sua portione sinistram corporis sedem occupat. Rectum autem intestinum illic commodissimè reponitur, quò opportunè paulatim asseruata egerere tandem queat. Forma autem tereti in hoc intestina creantur, ut sint capacia, minus que iniurijs occurrantibus exposita. At angusta sunt gracilia intestina, ut minima cibi portio ab ipso rum tunicis, adeo que ipsorum uasis tangatur. Crassorum intestinum magna est amplitudo, ut multa colligere possint, ac ne frequentius egeramus opitulentur. Substantia constant, facile quæ continet amplectente, & rursus à contentis distendi apta. Duplicem uerò exigunt tunicam, ut iniurijs innoxie ferendis magis sint idonea, nam interior aliquando in intestinum difficultatibus, alijsq; diuurnis affectibus putrescit, exteriore salua; unde & agri nonnulli euadunt. Porro interior gracilium musculorum tunica interiori uentriculi tunica molliore est, quòd nulla aspera intrita ue illa, sicut hic, recipiant. Exterior uerò intestinum tunica interiore uentriculiminus carnosa est, quoniam digestionis potius quàm concoctionis organa sint. Cæterum tunica crassorum intestinum tanto gracilium intestinum tunica interiore durior est, quanto illa materiam continent durior, & à succo magis liberam. Quandoquidem quæ gracilibus continentur intestinis, liquida, fluida, aquea que adhuc sunt: quæ autem crassius, dura. Intestinorum tunica utraque transuersas fortitur fibras, ut ocyus quod in illa desluit propellant, ita que cito uniuersus succus ad iecur exugatur. At externa recti intestini & coli tunica, præcipue quoque rectas fibras obtinuit, ut hæc uelut uinculum circularium fibrarum efficerentur, ne fortè quum illæ dura excrementa crebrius protrudunt, iniuriam abscedant diuellantur que, atque hæc potissimum occasione recto intestino, ut quod sicciora excrementa amplectitur, eius generis distribuuntur quamplurima. Quamquam fortassis non ob id solum ut transuersas colligent, rectæ fibræ huic offerantur, sed etiam ut recrementa alioquin non admodum sequacia illæ attrahant. Tertia intestinum tunica secundæ uelut propugnaculum est, & copula, cuius beneficio intestina mesenterij interuentu dorso colliguntur. Cæterum uenæ arteriæ que (nam & hæc ex intestinis aliquid elicere creduntur) non omnibus pari numero ac frequentia distributæ sunt, quod non in omnibus intestinis eadem exugenda succorum copia sit. Quo enim intestina uentriculo in continuitate uiciniora sunt, eo plus optimi cremoris continent, ac proinde frequentiora uasæ gracilibus intestinis deferuntur, pauciora crassius, & pari hac ratione pauciores uenæ uentriculo, quàm tenuibus intestinis inferuntur: quoniam qui in ipso continetur cibus, non semper plenè confectus mutatusque est. Nervis autem intestina donantur, ut infestantes humores dignoscant: quandoquidem si sensus penitus essent expertia, nihil obstaret, quin ex flaua bile, aut alio mordaci succo intestinum penitus subinde corroderetur, priusquam homo sentiret. iam uerò bilis meatus in duodenum insertus, intestina bilis influxu sumulans, eorum actionem uehementer adiuuat, ac pituitam ipsi incidentem expellit. Atque hæc præcipua, præter succi tenuitatem, causa est, cur ieiunum intestinum suum quem continet cremorem ocyus quàm reliqua transmittat, nam dum bilis adhuc cremori non mixta, intestini lateribus adfluit, sua acrimonia id magis stimulans, ad ea quæ continentur uelocius propellenda inuitat. Reliquæ enim inanitatis ieiuni causæ, ut succorum optimorum copia, frequenter uenæ, proximus iecori situs, & ante hæc omnia recta tendens intestini ductus, & liquidissimus adhuc succus, duodenum magis ieiunum esse, uti sanè etià reperitur, documento sunt. Quamquàm bilis in ipsum influens, & illud quoque ad subitâ excretionē irritat impellit. Sed de bilis natura, ipsius meatibus, suo postea loco accuratius pertractabitur.

*Intestinorum
forma ratio.*

*Substantia.
Tunicarum.*

*Fibrarum
ratio.*

*Venarum ar-
teriarumq; ra-
tio.*

*Nervorum
ratio.*

*Vesiculæ bi-
lis meatus in-
sertionis ra-
tio.*

*Quomodo iei-
unum intes-
tinum cremorē
ocys trans-
mittat.*

MESENTERIVM inter ceteras figuras ostendit undecima, mox decima & duodecima, & non perfectorie uigesima quarta. uti ex illarum figurarum Indicibus colligere promptum est.

Mesenterij
nomenclatura.

Ipsius scus.

Substantia.

Forma de
cras.

In h. de Secti
one uenerum
& arteria. vii.

Substantia me
senterij n. a
ut usus.

Lib. 6. de Ad
min. dissectio.



ORPVS Græcis *μεσεντεριον*, & *μεσεντερικον* nuncupatum, Gaza in Aristotelis historia de Animalibus lactes appellauit. Cicero autem in tertio de Natura Deorum intestinum aliquod ita uocari arbitratus, medium intestinum uertit: quod quum falsum sit, neq. lactes idem omnibus significant, & medianum recepta parum uox uideatur, à Græcis nō inopportune uocem mutuabor. Mesenterium itaq. ad posteriorem intestinorū sedem locatum est, uinculum, cuius beneficio intestina inuicem ut ad dorsum colligantur, tutum. Ut uero id tantū homini usum securius præstet, dura membranaq. constat substantia. Ex² duabus enim mutuò attensis & accumbentibus membranīs à peritonæo originem ducentibus, mesenterium conformatur. Non quidem ex una eademq. peritonæi sede his membranīs origo est, uerū ex uaria, pro mesenterij ipsius nimirū forma, quam ferē intestina fingunt, à mesenterio colligata. Nam ut nō intestinorum omnium par anfractuū ductus est, ita quoq. non eadem undecunq. mesenterij effigies. Quam forsità Galenus animaduertēs, etiam si omnino continuū mesenterium sit, nihilo minus tria mesenteria quodāmodo recessit. unum quidem dextrū, alterū uerò sinistrū, tertiu aut medium inueniēs. Ac Galenū quidem medium mesenteriu appellare arbitror mesenterij partē, ieiunum ileumq. intestina dorso colligantē: quæ angusto orta principio, in miram amplitudinē latitudinemq. ducitur, ut omnibus ieiuni ileiq. intestini connasceretur anfractibus. Dextrum uerò & sinistrum appellare potuit, quod colon intestinum, & rectum dorso alligat, dextrum quidem in dextri illij regione, sinistrū uerò in sinistri collocans. Mesenterij itaq. pars gracilibus intestinis peculiaris, simile omnino cum inferiori membrana omēti sortitur exortū. Ex³ magnæ enim arteriæ & uenæ caue tunicis, quas ea uasæ secundū uniuersum suum per lumborum uertebras ductū à peritonæo obinent, membranæ fibræ admodū frequentes exurgunt, statim in duas degenerātes membranas, dextræ quidem in dextram, sinistræ autem in sinistram. Hisce membranīs mutuò adnexis, mesenterij pars gracilia intestina dorso colligans efformatur: partes autem colon & rectum dorso connectentes, ab illis peritonæi regionibus principium ducunt, secundum quas hæc intestina exporriguntur, peritonæo semper fibras qualdā quæ in mesenterij membranas degenerent, illis emittentes. Neq. profectò mesenterij substantia in hoc solum quo ualidius intestina dorso adnecieret, membrana est, uerū etiam alterius magni cuiusdam usus gratia, quo⁴ uenas omnes ex iecoris porta, & arteriæ propagines à magna arteria ad intestina excurrētes tutò colligaret, ac ne illæ dum homo salit aut cadit, contundantur & disrumpantur, tutò securèq. admodum suffulciret. Grandior enim uenæ portæ truncus, quā mesenterium iuxta renum regionem à dorso pronascitur, inter duas mesenterij membranas ducitur, arteriā habens comitem, quæ à magna arteria priusquam hæc ad renes ramos dispergat, in hoc ut in intestina diffundatur, originem ducit. Hæc quoque pertingunt⁵ duo nerui, utrinq. nimirum singuli, ab illis pronati ramis, qui à sexto neruorum cerebri pari costarum radicibus exporriguntur. Adeò ut ingens uenæ portæ truncus, & dicta nuper arteria cum duobus illis neruis simul mesenterij⁶ centrum subeant, atque inter duas ipsius mesenterij mutuò coherentes membranas ingrediantur, ac tutò postmodum per uniuersam mesenterij sedem numerosa sobole ad intestina perferantur. At præter commemoratam arteriam, alia quædam magnæ arteriæ propago eam mesenterij partem ingreditur, quæ sub renum regione à dorso principium obtinet, atque huius propaginis⁷ exortus paulo sub seminalium arteriarum principio à magna penderet arteria. Venas autem nullas præter dictum nuper uenæ portæ truncum, mesenterium admittit. Neque satis assequor, quid Galenus sibi uelit, quando intestinis, ipsiq. adeò mesenterio uenas offerri testatur in iecur non terminatas: & dum alibi, à caua intestinis ramos quosdam propagari commemorat, quod sanè falsissimum esse uel sectio ipsa luce clarius tibi demonstrabit: etsi nulla alia, saltem illa in qua portæ uena, & quos dixi, arteriæ ramis uinculo interceptis acrefectis, intestina simul cum mesenterio in uiuente adhuc animali à dorso auelluntur. Hæc enim si quis esset uel capillaris ramusculi à caua uena ad intestina exortus, sanguinem tibi ex illo profluentem ostenderet. Porrò in canibus duplicem mesenterij membranam adinuenire non adeò promptum est, quod illis macilentius obrigerit mesenterium, cuius membranæ inuicem omni ex parte (nisi quæ uasæ admittunt) perinde ac si simplici membrana mesenterium constaret, connatæ uisuntur.

sunt. At in homine binæ mesenterij membranæ inuentu sunt perquam faciles, ac multa intercedente pinguedine inter se distāt. Vt enim homo copiosa undecumq; abundat pinguedine, sic mesenterij quoq; præpingue adipiscitur, sanguine hic ex uasis resudante, membranarumq; ui in adipem mutato, ita ut præter uasa & nervos multum adipem mesenterij membranæ in sui medio contineant. Sed præter adipem aliud quoque mesenterio accedit, neq; enim sat esse uisum est Naturæ sagaci, frequentem illam uasorum sobolem mesenterij membranis cōtineri, quin glandosum corpus, Græcis *mesenterias* & *lactantes* dictum, singulis uasorum scissionibus, ita undequaq; substruxit simul & circumposuit, ut nulla ipsarū inualida fieri, aut per motum quassari posset: nō ignorans, quiduis suscipiendis noxis opportunissimum esse, ubi in ramos ducitur. Ac proinde ad mesenterij quidemⁿ centrum, ubi prima uasorum sit distributio, grandæ corpus glandosum extruitur, insigniores ac primos uasorum ramos securè admodum deducens. Per reliquam uerò mesenterij sedem, singulis propè uasorum diductibus Naturæ glandulam quoque aliquam interiecit, diuisionis robur simul ac firmamentum futuram. Adeo ut simul glandulis illis accedentibus, mesenterij membranæ uasa uersus intestina tutissimè deferant, intestinaq; omnia dorso quamaptissimè colligent, ac demumⁿ tertiā intestinorū tunicam efformēt. Quum enim mesenterij membranæ uasa ad cauam intestinorum partem deducunt, ipsis intestinis simul cum uasis adnascuntur, atque hic inuicem abscedentes singulæ per suum in intestina latus ascendent, ac in tertiā intestini tunicam degenerant, hac occasione fortius intestina ligantes, & ualidius uasorum propugnaculum constitutæ.

Mesenterij
adeps.

Glandes.

DE IECORE. CAPVT VII.

I E C U R plerq; ostendunt figuræ, uerū inter cæteras duodecima & uigesima cauam ipsius sedem imprimis spectandam offerunt. Gibbam uerò proponit decima octaua, & aliquā etiam ex parte secunda, sexta, ac uigesima secunda, & uigesima quinta, quæ & caua regionis nonnihil exprimunt: quum in his iecur ita collapsum sit, ut extra naturalem suum id anteriore ipsius sede sursum in duodecima & uigesima protrusus, quò caua ipsius sedes intergrā in conspectum ueniret.



I E C U R nutritionis organorum facile præcipuum, & sanguinis crassioris officina, animæq; cibos ac potus quæque corporis naturæ necessaria sunt, appetentis fomes, elatissimam ei ministrantium partium regionem obtinuit. Sub irascibilis enim & iam dictæ concupiscibilis animæ septo iecur statimⁿ collocatur, maximam inferioris septi sedis regionem occupans. Etenim totam dextram septi partem contingit, parum admodum illius partis intactum relinquens, quā septum undecimæ duodecimæq; costis adnascitur, suaq; ligamenta quibus uertebis colligatur porrigit. Mediæ autem septi parti uniuersæ iecur subrenditur. Sinistræ uerò parti non itidem, quanquam huius magnam quoque sedem teneat, totam uidelicet anteriorem ad eam usque partem, qua sinistrum septi latus costarum medio (quod ab ipsarum radicibus ad finem usque eorundem metiorⁿ) incumbere incipit. Et profectò longè magis quàm nostris uisum est medicis, in sinistrum latus iecur pertingit. Neque uerò septi transuersi latitudinem ullibi excedit, nisi quod paulo demissiùs, quàm mucronata consistit cartilago plerunque, & potissimum arcuato thorace pertingit. Porro humanum iecur maiorem sui portionem in dextro latere extensam habet, propterⁿ lienem, qui ipso dignitate multò inferior, sinistram sedem erat occupaturus. Vt igitur corpus redderetur æquilibre, sagax Natura minorem iecoris partem in sinistra deduxit, quod aues manifestò attestantur, quibus iecur propemodum æqualiter in utrunque latus consistit, ut & canibus. His enim quia gracilis, neque ponderosus admodum lien contingit, magna iecoris portio in sinistram fertur. Vt cunque tamen deducatur iecur, etiam si sub septo locetur, eam sedem perpetuò exigit, quæ costis succingitur, adeo ut cibi organorum situs magnam rursus Naturæ ostendat providentiam. Quum enim abdomen propter ea quæ extendi subdideretq; crebrò debent organa, ossibus destituatur, Natura eas partes quarum gratia illud ossibus carere uoluit, ab iniurijs minus texit: reliquas uerò hac extensione non indigentes, tutissimè condidit. Atque ita peritonæo inter dissecandum aperto, primū occurrit, uentriculus, intestina, uesica, & uteris. Verū iecur, lien, renes, uena caua, & arteria magna tutius reconduntur. Iecoris forma uaria est, & suis quibus accumbit organis respondens, non aliter quàm si id nullam peculiarem exigeret formam, & sibi à uicinis partibus, instar sicilis terræ, quamuis effigiem

Iecoris situs.

Situs ratio.

Iecur maxime ex parte costis succingitur.

Iecoris forma.

u indi

indi sineret. Nam & suprâ, & retro omni ex parte qua septum^h spectat, gibbum læueq; admodum uisitur, nullis omnino extuberans processibus: & cavitati septi, quæ in inferiori ipsius sede necessarioⁱ constituitur, ad amissim congruens. Videtur enim iecur uelut gleba illi inferiori septi sedi impressum fuisse, ac ab ipsa hîc formatum.^k Ne uerò uenæ caux caudex secundum posteriorem iecoris sedem protensus, aut huius gravitate, aut septi transuersi motu comprimeretur, tantus sinus in posteriori iecoris sede exculptus est, quantus amplectendo innascendoq; caux caudici sufficiat. Cæterum^l inferiori sede iecur admodum amice uentriculo cedit, ac ab illo (quem rotundum secundumq; corporis latitudinem oblongum necessario procreatum esse diximus) cauum efficitur: & læue quidem hîc existit, sed non undecunque processibus^m tuberioribusⁿ ue & sinibus liberum. Quemadmodum enim organa quibus iecur caua sui parte incumbit, simplici quadam superficie neutiquam gibba sunt, ita quoque iecur unica superficie haud sinuatum est, sed rupis præcipitio aliqua ex parte accedit. Quæ nanque^o duodenum exporrigitur intestinum, & uenâ^p portæ à iecore prodit, iecur quodam^q tubere prominet, sedem quam hîc uacuum reperit adimpleturum. Præterea ubi bilis^r uesicula caux iecoris regioni innascitur, sinus in illa exculpitur, medium eius uesiculæ corpus eleganter excipiens. Ad hæc, iecur quoque ea parte^s sinum adipiscitur, qua stomachum tangit, ipsiq; septum transeunt, & superiori orificio uentriculi continuando, locum præbet. Adeo sanè ut iecur nullam peculiarem formam obtineat, sed eam quæ à conteminis partibus ipsi imprimitur. Velut canum sectio pulchrè attestatur, in quibus iecur sinu suo superiorem dextri renis sedem concinnè admodum excipere cernitur. Atque hoc rectè à Natura factum est, quum iecoris munus nullam separata propriam ue exigat figuram, uti uentriculus, intestina, uesicæ, & eius generis per multa, quæ amplam cavitatem eamq; unicam necessario obtinentia, opportunissimè rotunda effinguntur, & septum quoque transuersum ob suam functionem dilatando thoraci imprimis præfectam necessario, quam nunc sortitur formam, obtinuit. Iecoris enim substantia & uenarum per ipsum reptantiū series, facile tibi documento erunt, ad ipsius usum quo sanguificationis est officina, magnum id & crassum oportuisse fieri organum, ac interesse, utrum rotundum an oblongum, gibbum ue an cauum extrueretur. Iecur itaque superius posteriusq; quâ septum spectat, præter sinum uenæ caux caudici paratū, exactè gibbum & læue, sed quâ uentriculum amplectitur, omni propemodum ex parte cauum cernitur. Rursus ubi posteriori uentriculi sedi & dextro ipsius lateri attenditur, crassissimum est: quâ uerò superiori orificio uentriculi eiusq; sedi superiori uersus sinistrum incumbit, tenuè apparet, & sensim hominibus illic in acutum fertur^t angulum. In dextra uerò parte rotundum quodammodo & orbiculare obseruatur, & nusquam tenuius est, quàm in ambitu, & præcipue in anteriori ipsius sede, ubi sanè tenuissimum uisitur, interdum inibi impressiones quasdam obtinens, sed omnes exiguas præter^u unam patulæ sectionis modo anteriori ipsius parti inductam, ac à mucronata pectoris ossis cartilagine parum in dextrum iecoris laus uergentem, & uelut^v foramine quodam ad eam iecoris sedem penitus pertinentem, à qua portæ uenæ^w caudex principium ducit. Atque hæc sectio seu foramen est, quo umbilici^x uena humano iecori implantatur. Cæterum nos neque porcini, neque canini, sed humani iecoris formam non persequimur. Quæ enim dissertationum professores de eius forma ac penulis seu fibris (quas λέξες Græci uocant) commentantur, e canum potius & simiarum sectionibus, quàm hominum didicerūt. Humanum enim iecur in fibras, porcini iecoris modo nō discinditur, & multo adhuc minus ut caninum. Nam unicum cōtinuumq; præcipua ipsius substantia corpus hominis iecur est: canum uerò in quinque, nonnunquam in sex aut quatuor tantum partes est disinctum, solarum uenarum interuentu inuicem continuatas. Porcis uerò in pauciores, uenis duntaxat hærentes: aut etiam in plures, si sectiones quoque impense altas fibrarum uice numerare lubeat. Atque hinc natum est illud medicorum ac Anatomes peritorum commentum, quo uentriculum à iecore quinq; fibris manus apprehendentis modo, amplecti asserunt. Quin Græcorū nonnulli, nescio à quibus ut testantur mathematicis medicis nomina mutuantes, illis fibris priuata (uti apud Theophilum illum parum Anatomicum uidere est) imponūt nomina. Quatuor enim quum sint, inquirunt, iecoris fibræ, prima focus dicitur: maximè nanq; ad succi concoctionem facit, quemadmodum concoquendis cibarijs focus. Secunda mensæ nomen sortitur, quod mensæ uices gerat: nam membrorum alimenta in ipsa apponuntur. Tertia culter nuncupatur: diuidit enim, segregatq; inter se humores, aut si quid crassius distribuendū sit, id secat atq; commutat. Quarta aurigæ nomine appellatur: nam naturales uires iam excoctos humores bene regunt, atque ita melius rectâ ducunt. Huiusmodi profectio eorum qui humanam fabricam imaginationibus,

Iecur nulla pe
culiari eguisse
forma.

Humani iecoris formam
à canis & porcorum iecoris
bus uariare.

b fig. 18. et
22 præci-
puè.
7 musul.
tab. a.
k id totum
fete ex
figura.
l 12 fig. I, K
cedit P, Q.
m 12 fi. N.
N. 10 fi. G.
G.
n 15 fi. P.
o 12 fi. b.
p 12 fi. inter
N, N.
q 20 fi. H.
r 12 fi. o. ce-
dit R. 20 fi.
E spectat
F.

20 figura
tucia C.

Inter H.
H. 2 figura.
C. ad E 6
fig. C. ad D
20 fig.
u 20 fi. qua-
si à D ad
G.
x 10 fi. I.
y 2 figura.
ad G.

tionibus, non sectionibus, aut brutorum potius quàm hominum administrationibus discere conantur, nugæ segmenta quæ. Ac proinde exuto affectu omnes qui mihi unquam secanti astiterent testor, me iecur in fibras aliquo pacto diuisum nunquam inspexisse. Neque est cur quispiam iecur duplici fibra constare astruat, propter scissionem seu foramen potius, quo uena ex umbilico proficiens excipitur. aut ob eius iecoris^a portiunculam, sub ortu uenæ portæ extuberantem, fibris aliquot constare affirmet: si modò unquam uel per somnium animalia quibus iecur in fibras uti cani diuisum est, contemplatus fuerit. non autem hæc solum læui negotio obseruabit, sed & animaduertet, quotquot hætenus uenæ cauæ exortum, & ad iecoris gibbum in duos truncos distributionē literis prodiderūt, ridiculè nugaciterque admodum delirasse. De magnitudine uerò iecoris, quod scilicet timidis gulosisque maius obtigerit, & quod iuxta proportionem homini, ut & cerebrum, inter reliqua animantia, grandius iecur datum sit, non præter rationem à quibusdam Anatomicis dictum est: quanquam nonnulli nostratum medicorum iisdem crapula absumi iecur, seriò adeoque cōtentiose affirmant, ut rerum omnium imperiti, & uulgo & sibi ipsis persuadeant, insignibus illis uini gurgitibus iecur ad nucis duntaxat molem reduci consueuisse. Porro de iecoris substantia, uenis, arterijs, tunica, & ligamentis plerique rectè sentiunt. Per uniuersum enim iecoris corpus ad humiliorem eius sedem uenæ portæ^b propagines innumeræ diffunduntur, in superiorem uerò ipsius sedem uenæ cauæ^c soboles numerosè sparguntur: quas & ab earum ortu, initijsque, aut ab ea parte qua caudices uenarum constituunt, describere integrum est. Orbiculatim nanque (uti in tertio libro complexus sum diligentius) ex omnibus extremis iecoris partibus infiniti uenarum furculi, capillorum modo tenues prodeunt, ex quibus alij in elatiori uisceris parte, alij in demissiori habentur. Inferiores furculi paulatim inter se in alios paulò crassiores colliguntur, & hi rursus in alios. Atque ita deinceps sensim ac tantisper coeunt, donec tandem omnes in iecoris cauo in^d unam uenam congreantur: non equidem ut quispiam dissectionū fidens professoribus putauerit, in cauæ sedis centro, sed in humiliori eius parte, qua dextro dorso lateri iecur proximū est. Hinc prodians uena eos quæ sæpe recensui ramos in bilis uesiculam, uentriculū, omentum, lienem, & intestina digerit. Sic ramorū qui superiorem iecoris sedem occupant, tenuissimæ soboles in grandiores paulatim, & hæc rursus in maiores, ampliores uel tantisper colliguntur, donec omnes in^e duos maximos ramos coeant, qui in anteriorem uenæ cauæ sedem, quā hæc iecori in nascitur, pertinent. præter aliquot etiam^f graciles furculos eidem uenæ cauæ sedi insertos. Neque rursus hoc in gibbæ iecoris sedis medio sit, sed^g in posteriori ipsius sede, qua septo incumbit potius quàm adhæret, dum resupinatum hominem intelligimus. In dictorum ramorum medio aliquibus in locis tenues gracilesque admodum deducuntur furculi, qui caui sunt, & uenarum corpore donati, in unum quoque caudicem mutuò collecti desinunt, in bilis uesiculam (uti post dicemus) deducendum. Quin & in humiliori iecoris sede, uti portæ rami in suum caudicem coaceruantur, exiles arteriæ in corpus iecoris excurrunt, ab ea diffusa, quæ dextræ sedi inferioris membranæ omenti à magna arteria offertur. His omnibus uasis rubra mollisque adnascitur substantia, nuper concreto sanguini quàm similima, nisi quòd durior, & possimum in iecoris gibbo cernatur. Hanc Erasistratus, quod uasis his & propaginibus circumfundatur, *σπινθηρ* nuncupauit. Præfens substantia iecoris uasa continet, & amplectendo suffulcit, totam propemodum iecoris molem constituens. quæ perquam tenui obuoluitur tunica, à ligamenti pronata, quibus iecur peritonæo, quā id septo subditum est, affirmatur. Sunt autem hæc duo præcipua: ^h unum quidem densum & insigniter ualidum, sed membranæ modo tenue, quod peritonæi pars inferiorem septi sedem succingens, paululum à latere dextro mucronatæ cartilaginis educit, rectā ex anterioribus in posteriora protensum. Alterum uerò, quā iecoris sinistra pars in acutum desinit angulum, à peritonæo nascitur. hic enim fortissimo & quodammodo tereti ligamento iecur peritonæo alligatur. Deinⁱ quā cauæ uenæ caudex septum permeat, & dein secundum cauæ per iecoris posteriora deductum, peritonæum iecori adnascitur, ipsumque peritonæum iecur colligat. Quinetiā cauæ iecoris sedi ubi portæ est principiū, omenti quoque portio adnascitur. Præterea iecur anteriori peritonæi sedi (quod alijs animaduertendum fuerat Anatomicis) cōnectitur, beneficio^j uenæ ab umbilico in ipsum iecur pertinentis. Hæc enim foetu è matre excluso arefcit, ac instar ualidis efficit uinculi, ipsum, ut iam dixi, peritonæo colligatis. Porro ex his omnibus uinculis quibus iecur peritonæo adnectitur, tenuem suā & sibi peculiare sortitur tunicam, in quam duo quoque inferuntur nerui: unus quidem à sexti paris cerebri neruorū ramis, elatiori orificio uentriculi implātatis: alter uerò ab alijs Anatomicis ignoratus, à sexti eius cōiugij propaginibus discit,

Iecoris substantia.

Venarum series.

Bilis uesiculae meatus in iecore.

Arteriae.

Substantia uasis circumfusa.

Iecoris ligamenta ac ex illis pronascent tunica.

Nervi.

ditur, quæ costarum exporriguntur radicibus. Hic in iecoris tunicam raris modicisq; furculis dispergitur, priori in iecoris quoque substantiam pertinente. Et talis quidem uisceris huius fabrica est. quod autem ad usum ipsius partium attinet, sic sese ordinè habent singula. Iecori quie
Iecoris officium, ipsiusq; structura ratio.
Lib. 4. de V. su partium.
 quid humidum succulentumq; a uentriculo conficitur, uenæ portæ rami ex ipso uentriculo
 & intestinis id depascentes, adferunt. Quod uerò idem rami priusquam iecori succulentum id
 porrigant, rudem aliquam sanguinis formam cremore seu succulento illi conferant, & ut Gale
 nus attestatur, modo iecori similimo istud præparent, nō facile concessero. Nam si uenis, non
 his solum, sed & omnibus cauæ uenæ propaginibus præter proprii nutrimenti alterationem,
 alia quæ toti subseruiet corpori alteratrix uis, quemadmodum uentriculo inesset, ea sanè nō in
 rubrū, at in albū quod à uenis amplecteretur, emutarent, siquidē alteratū in nutritione, alterātis
 colorem ut assumat, necessum est. Iecur itaq; in omnes portæ ramos per substantiā ipsius dige-
 stos, quicquid humidum succulentumq; uentriculus confecit, in se admittit, & substantiæ suæ
 ingenita ui alteratrice id emutans, sibiq; quā similitimum reddens, sanguinē generat. Verūm
 ut in omni concoctione, ita quoq; in hac iecoris sanguificatione duplex sit recrementum. Alte-
 rum quidem tenuius, alterum uerò crassius. At satius fuerit ad similitudinem actionis & conue-
 nientem euidentiam humido liquori iam quidē præcocto, & prius elaborato, indigenti ta-
 men absolutiori adhuc concoctione succum assimilare, quem ex uentriculo & intestinis uenæ
 in iecoris cauum deducūt. Sit itaq; uinum nuper ex uuis pressum, ac in dolia infusum, & quod
 ab infito innatoq; calore adhuc elaboretur, secernatur, cōcoquatur & ferueat; eiusq; excremen-
 torum quod quidem est graue & terrestre (fæcem uocant) in fundum uasorum subsidat, alte-
 rum uerò quod est leue & æreum supernaret, hoc autem flos uocatur tenuioribus uinis innatans
 copiosum, sicut crassioribus fæx residet plurima. Ergo iuxta exempli huius similitudinē,
 succus à uentriculo & intestinis in iecoris uenas allatus, à temperie alteratriceq; ui cōcoquitur,
 ac instar musti feruens ad sanguinis benigni generationem alteratur. In hac autem ebullitione,
 recrementum quantumcūq; lutosum crassumq; est, subsidet, & in lienem depellitur. Quod le-
 ue ac tenue est, spumæ modo sanguini innatat, & à bilis uesiculæ meatibus supra uenæ portæ
 ramos in iecoris substantia stratis assugitur. At humidum illud quod uelut uentriculi elaborationis
 aquem existit recrementū, in iecur per uenas cum benigno ad sanguinis generationem
 succo assumptū, à sanguine nondum in iecoris cauo repurgatur, sed sui iam maximū præstans
 usum, nutrimenti uehiculum, ut Hippocrates ipsum uocabat, se esse eleganter ostendit. Sanguis
 enim in iecoris cauo confectus, exilibus ē portæ uenæ furculis ad cauæ uenæ ramulos uersus
 iecoris gibbum procedit, ad cuius per angustissimos ductus transitum aquosus ille liquor ue-
 hicularitu plurimum auxiliatur. Caro igitur iecoris, quæ proprium ipsius est corpus, prima-
 rium sanguificationis est organum. Venæ autem per uniuersum eius corpus dispersæ sinus lo-
 co censentur, in quibus quod ab illa confici debebat appositè cōtinetur, & hi postmodum san-
 guinem præparatum, alijs partibus tanquam proprii iecoris riuiuli perferunt. Est autem uena-
 rum, quæ in iecoris substantiam digeruntur, tunica longè tenuior, quā earum quæ per uni-
 uersum corpus distribuuntur, ne scilicet uim substantiæ iecoris, cuius beneficio contentus in
 uenis succus elaboratur, sua crassitie retundant: quo fit, ut iecur etiam crassiori sanguine enu-
 triatur, quem tenuis uenarum tunica à iecoris facultate allecctum transmittit. Porro ut sanguis
 diutius in iecore moram traheret, ac perfectam elaborationē experiretur, utq; totus iecoris sub-
 stantiæ appropinquaret, non unum uentrem illi uelut lagenam quandam rerum Opifex indi-
 dit, uerū uenas illas omnes infinita ramorum serie, & in arcuissimos ductus digessit. Meatus
 autem bilis inter utraq; uenas locum obtinent, ut commodo ipsorum situ prius expurgatus
 sanguis in uenæ cauæ ramos absumeretur. Arteriam autem cauæ duntaxat iecoris sedi credi-
 mus exporrigi, ut huius tantummodo calorem euentilaret, temperaretq;, superiore iecoris
 parte, quæ septum contingit, ab eodem motum adipiscente continuum. Ne uerò iecur sensus
 plantæ modo expers esset, & à ui rationali concupiscibilis animæ pars minus moueri cohibe-
 riq; possit, Natura iecori neruos exprompsit, quibus ceu freno illa pro imperio uteretur. Tunica
 iecoris inuolucrum quoddam & tegumentum est: uincula uerò, ne ui-
 scus quum graue sit, aliquādo decidat, plura, eademq;
 ualida iecori committuntur.

HANC pulchrè liberam ostendit decimatertia figura, iecoris uerò cauo adhuc in-
nam refert duodecima & uigesima.



VESICA bilis flauæ conceptaculum in caua iecoris parte sedem obtinet. Bilis uesiculae situs.
iecori enim quâ dextrum uentriculi latus amplectitur, sinum insculpi an-
tea diximus, mediæ bilis uesiculæ portioⁿ exquisitè cōgruentem. Illi nam
que sinui media superior eius uesiculæ portio secundum ipsius longitudi-
nem innascitur, inferior autem extra iecoris substantiam deorsum promi-
net, à nullo cui innititur corpore grauius pressa. Nam uacuo penè intersti-
tio, ad dextrum uentriculi latus colonq; huc² prorepens intestinum con-

spicio incumbit, & sedem qua commodè flauum tenuè que iecoris recrementum suscipere,
idemq; ad intestina depellere posset, opportunam adipiscitur. Forma huius uesiculæ oblonga
rotundaq; est, sensim ad ipsius fundi usque apicem longioris cuiusdam pyri modo dilatescens.

Quo enim à caua iecoris sede, ubi portæ^b caudex educitur, ipsiusq; uesiculæ cervix consistit,
hec antrosum magis fertur, eo illa sensim magis ac magis senæ folliculi instar ampliatur. Cum
enim, ut reliqua corporis receptacula, capax esse debuerit, neque tum globi modo adamussim
rotunda fieri potuerit, ipsius cavitatis sua longitudine adaucta fuit, ita nullo à uentriculo dilatescens.
incommodo, ipsoq; iecore non nimis insinuato. Vt autem inanita bilis uesicula appositè sub-
dere, ac impleta uicissim extendi possit, membranæ neruæq; constituitur substantia: quippe
simplici & unica peculiari constat tunica, tenui quidem, sed densa & forti, ac triplici fibrarum
genere intertexta, & rectas quidem fibras intimas habet, quibus succedunt obliquæ, sed rectas
multo pauciores, extimæ uerò orbiculares sunt trāsuersæ ue. Huic tunicæ alia à iecoris tunica
obtenitur, non toti uesiculæ, sed illius duntaxat parti, quæ extra iecoris corpus propendet, so-
laq; propugnaculo & inuolucro indiguit. Vesicula etiam si iecori sanguificationis officinæ
innascatur, à portæ uenæ tamen caudicē, duas graciles admodum assumit uenulas, ea serie in

ipsius tunicam diffusas, qua in adhærentem¹ albam^{ue} oculi tunicam uenulas digeri conspici-
mus. Ab arteria quoque cauo iecoris exprorecta¹ ramus admodum gracilis uesiculæ illi offer-
tur, ad ipsius usque fundi extremum excurrrens. Et neque² neruulis destituitur, ne sensus sit ex-
pers. nam iecoris neruus per humiliorē omēti membranā à dextra sexti neruorum cerebri
paris propagine costarum radicibus exprorecta, diductus, etiam huic uesiculæ furculum pro-
mit, in macilentis uix minus quā ipsius arteria conspicuum. At meatus quibus uesicula bi-
lem allicit, rursusq; aliò depellit, ita se habent. ¹Cervix uesiculæ, fundo ipsius multo durior pau-
latim in angustum definit meatum, ad eam iecoris partem protensum, unde uena portæ prin-
cipium ducit. quò quum peruenit, in duos diducitur processus, ²hunc quidem sursum, ³il-
lum autem deorsum porrigens. Qui sursum fertur, anteriori uenæ portæ sedi innitens, in iecur
conscendit, & in duas primū dissectus propagines, unam dextrorsum, alteram sinistror-
sum in iecur porrigit. Hæ propagines singulæ in ipso iecore rursus in ⁴alios furculos, & hi in
alios rursus tantisper digeruntur, donec innumeram ramorum constituant seriem, per ieco-
ris corpus inter portæ uenæ ramos & cauæ propagines diffusam. Atque hi furculi, si sunt,
quorum ope bilis in uesiculam defertur. At ⁵processus, dicti nuper uesiculæ meatus, qui deor-
sum porrigitur, inferiori membrana omenti suffultus, parumper obliquè deorsum properat,
ac duodeno intestino non procul à ieiuni principio ⁶implantatur. Hic processus depulsam
ex uesicula bilem in intestina deferit, interim nihil ab illis neque cremoris, neque flatus, neque
ipsius intestina, quam deduxit bilis regurgitantis, quippiam admittens. Quod non solum tor-
tuosi in intestinum ingressus, sed & duarum membranularum beneficio fit, quæ utrinque ad
orificij latus laxè propendent, influentis bilis ponderi facillè cedentes, & ne quid in meatum re-
gurgitare possit, iter præpedientes, quòd scilicet collectæ ac primū meatus os subeuntes id
occludant. Non autem una aliqua est membrana ori huic præfecta, uti unus in foliis asser-

at, simplex in pilis quas inflamus lingula uisitur. Præsentis meatus in intestina implantatio
longius à uentriculi orificio inferiori, quā Anatomicorū uulgus existimat, remouetur. An
uero is intestino insertus simplex omnino sit, aut in progressu bipartitò scindatur, ita ut una
parte intestina, altera uentriculi fundum adeat: hoc loco me dicturum animaduertis opinor,
cū hac de re in scholis indies & in libris medicorum plenissimè contendatur, alijs affirmanti-
bus, hunc bilis uesiculæ meatum intestinis, frequentius tamen interdum uentriculi fundo in-
serti; alijs asserentibus, eum quandoq; bipartiri, atque altera portione in uentriculum, altera in
intestina

Bilis uesiculae situs.

Forma.

Substantia.

Vena arteria & nerui.

Meatus ex-
pientes & e,
miscende bile
parati.

Bilis uesiculae
meatus duode-
no insertus an
propaginem
uentriculo of-
ferat.

intestina tendere, alijs uerò semper hunc bifurcantibus, ac perpetuò alterum ramorum, nunc tamen amplio rem, nunc angustio rem in uentriculum distribuentibus. Interea omnes quotquot sunt auctoritatum congerie tantum, nò rerum ipsarum inspectione, sese tuetur. Equidem ut semel dicam, quid hìc mihi inter secundum contingere soleat, uerè affirmare possum, quod in uniuerso corpore neq; molestior, neq; difficilior mihiq; grauior sectio sit, quàm dum inferior omenti membrana, & caua iecoris regio, organaq; contermina nobis sunt aggredièda, maximè uerò in homine, aut animali quopiam præpingui. adeò sanè ut quemuis artificem, licet indutrium, facile hìc hallucinari existimem. Atq; hoc ideo dico, quòd certi nihil, sed id duntaxat quod mihi uidetur asserere statuerim. Nullam igitur uel minimam bilis uesiculæ meatus portionem in uentriculum porrigi animaduerti, præterquam in uno pontificis tritemium remige. Hic enim, ut alijs quibusdam organis, & præcipuè circa thoracis costas & musculos, ab aliorum hominum fabrica uariabat: ita & meatum hunc in duas dissectum propagines obtinuit, quarum minor gracilior uè uentriculi fundo, quàm primò uena dextram inferioris ipsius sedis regionem ambiens, uentriculo committitur, inerebatur. Is quidem calidi sicciq; temperamentis fuisse uidebatur: ut autem resciscerem num uomitu bilioso, quem huiusmodi hominibus frequentem Galenus esse testatur, uexari consueuisset, ab eius familiaribus diligentissimè quæsiui, ecquid eiusmodi in illo obseruassent. Asserebant itaq; se nunquam illi uomentem, aut in maximis etiam procellis nauseabundū uidisse: uerum ut erat robustissimus, ab omnibus eum prædicari affirmabant, quòd longissimo spiritu subinde cornu inflaret, omnesq; commilitones graui uoce, & uno spiritu recensendis numeris longè superaret. Verum non semper meatus huius de quo in præsentia gemus, portionem in uentriculum deduci, hinc mihi abunde persuadeo, quòd inter dissecandum, hoc à conterminis uasis membranisq; liberato, nullum foramen appareat, ex quo ad uentriculum propago eius meatus deducatur. quòd sese offerret, si modò uel minima quæpiam propago à præcipuo meatu diducta, per incuriam præcinderetur. Nam si uel acu meatum pertundas, ac bilis uesiculam digitis comprimas, bilis ex meatu defluit, quæ citius ex propaginis eius (si quam Natura condidisset) orificio promanaret. Ad stipulatur itidem ratio. nam si diligenter expendis, eum meatum bilem intestinis offerentem non in quamcunq; siue uentriculi, siue intestinorum sedem decenter inferi potuisse, sed in quâ & meatus ipse tutò implantandus, uentriculoq; & intestinis minus incommo daturus biliosum istud recrementū expurgare posset, nò debuisset ad uentriculum ne meatulum quidem inferi, uel citra sectionem fateri. Tutò enim ducuntur, quæ neque procul, neque alijs organis inconcomitata procedunt: quòd huic meatui usu uenit, qui nulla succinctiori uia, aut in uentriculum, aut in aliam intestinorum partem inferi potuit, quàm ea qua nunc implantatur, & interim tutò portæ uenæ caudicè & inferiori membranâ omenti deorsum modicè prorepens suffulcitur. Quòd si uentriculo inferendus fuisset, non adeò commodè atque nunc omenti membranis sustineretur, & obliquos anfractus faciens etiam longius abduceretur. Eodem modo, si biliosam hanc superfluitatem oblongo meatu ad sedem usque, ut in intestina primū illic defluens, unâ cum fecibus excerneretur, Natura perduxisset, periculum erat ne tenuis meatus quauis occasione ocyus rumperetur. Quòd autem materia hæc nutritioni inepta, duodeno intestino apuissima, non iudem uentriculi fundo innoxie immitti poterit, primū ex bilis natura, dein ex uentriculi & intestinorum muneribus, postremū pituitæ, quæ in utrisque necessariò in illorum obeundis functionibus asseruatur, examine, & è curatione quam huic exuberanti pituitæ adhibemus, discere licebit. Nam bilis flauæ naturam tenuem fluxilemque, & dein incidentem detergentemque ac expurgantem dum abundat nimium curationem adhiberi, medicorum præcipuis concessum est. Deinde cibum quousque concoctus sit retinendum, ocyssimè uerò cremorem confectum per gracilia intestina deducendum, nemo ambigit. Ventriculo itaque pituitæ istius incidendæ expurgandæque gratia bilem deferens meatus utilis fuisset: uerum quia uirentrice uentriculo utendum maximè fuit, summo malo Natura nonnihil boni nequaquam prætulit. Nam si uentriculo bilis infunderet, tum ille (uti Galenus rectè affirmat) huius mordacitate perpetuò ad excernendum iritaretur: neque tantisper dum cibus probè confectus esset, retentrice sua facultate fungere tur: & bilem illam respuens, eiusque occasione nauseabundus, quòd sibi offerretur, minus quam decet, ambiret amplectereturq;. At quo minus in intestina bilis infunderet, nihil omnino obstitit. Hæc namque pituitam, quæ in gracilibus illis ductibus ex intestinorum mune re coaceruatur plurima, incidit, detergit, atq; expurgat, deinde intestina iritâs & mordēs, ad feces excernēdas inuitat, & stimulat, & ipsa quoq; unâ cū excrementis nullâ (quâ lege Naturæ omnia in homine dispensantur) noxam, sed uti liquet summū usum præstās, è corpore tandem propel-

Ex bilis uesicula meatum in uentriculum non semper peruenire.

Vilem ex purgare conduxit.

Bilis in intestina fluxus uelut.

s. circa. cet. K. figu. 14. C. 15.

propellitur. Merito igitur intestinis, non autem uentriculo, meatus ille bilem deferens implan-
tatur, neque obiter cuius intestinorum sedi, sed ferè duodeni termino, quòd id primum in-
testinorum sit, quòd in eo bilis citius suum quem intestinis præstat usum conferat. Duode-
ni autem terminus tantum à uentriculo remouetur, ut rarius bilem in uentriculum ex intes-
tinis sursum conscendere contingat. Quanquam & id biliosis naturis familiare sit, quoties his
ieiunus uenter paulo diutius (ut ipse quoque nonnunquam experior) torquetur. At homines
qui bilis uesicula carent, quos Aristoteles enarrat, et post hunc cum alijs permultis Plinius,
hos uita firmissimos esse affirmans, hæcenus nondum comperi. Quanquam facile fieri posse
arbitrer, ut ex iecore ad intestina meatus aliquis bilem deferat, ita ut ea in uesiculam quam-
piam prius non colligatur. Et haud mediocriter inter dissecandum mirari solitus sum, quam-
obrem bilis recto ductu ex iecore in intestina non pellatur, non ignarus interim subtilis eius
Anatomicorum commenti, qui bilem in suam uesiculam afferuari docent, ut iecur à putredi-
ne uindictet: non expendentes quàm innumeros bilis folliculos & cerebro, & lieni, & pulmonib-
us, et plerisque alijs corporis parubus, ne ipsæ quoque putredinem contraherent, Naturam
adhibere oportuisset.

DE LIENE. CAPVT IX.

LIEN potissimum quatuor tabellis decimæ figuræ exprimitur. earum namque prima lienis
cauum cum omenti portione illi connata exprimit, secunda cauum omento liberum, tertia lienis
gibbum, quarta eiusdem substantiæ utcumque proponit. Quanquam etiã lien in corpore adhuc ser-
uatus, in secunda figura ad characterē d, et in sexta ad G, et in uigesima ad O, O, P occurrat.

6 fi. G. 20
1. O, O, P.7 miscul.
tab. Δ.
Specta fi-
guram 19.19 fig. E.
19 fig. D.19 figura
H, H

LIENEM ad sinistram uentriculi sedem secundum inferiora magis à po-
steriora locatum, iam antea recensuimus. Non enim is, ut medicorum
turba arbitrat, sanis alioquin hominibus extra costas, quasi ad abdo-
minis medium anteriora non adamussim costis, ceu tutissimis uallis se-
ptus, prominet, neque etiam tactu admodum depræhendi potest: quamuis
medici illū an mollis, aut durus sit, in omnibus sese equè contingere per-
suasum habeat. Innititur itaque lienis sinistra parti septi transversi, medius
ferè inter sinistram uertebrarum corporum sedem, & spiratur: costarum cartilagine. For-
mam adipiscitur sedi suæ proportionem respondentem, ac iecoris modo à uicinis partibus sibi
impressam. Quæ enim septum contingit, ut id leuiter inibi cauum est, ita etiam lien leuiter gib-
bus cernitur. Quæ uentriculus lieni quodammodo innititur, ut amplius ille & instar grandio-
ris globi hic extuberat, sic quoque lienis humanus modicè ac in superficie duntaxat, cauus occur-
rit. Nam porcis canibus ac bubus, quum longior, sed arctior lien obrigerit, ac uentriculi gib-
bo longiori intervallo in ijs obtendatur, magis quoque cauus magisque quartæ circuli partis mo-
do uentriculum complectitur. Homo quidem crassum & magnum & latum, sed breuiorem
quàm illius generis animalia lienem exigit, non tamen exactè, ut quispiam forte à spleniorum
forma monitus arbitraretur, quadratum. Longitudo namque latitudinem ipsius impense supe-
rat, deinde superior pars inferiori paulo elatior uisitur, ut linguæ ad incisivos dentes tantum
protenfæ imagini proximè accedat, unde etiam lien linguosum uiscus appellatur. Humilior
enim ipsius pars ad corporis anteriora magis protensa, in obtusum definit angulum: superior
autem in obtusorem adhuc angulum adeo comprimitur, ut hæc pars utrinque unum obtusum
exprimat angulum. Sinistrum latus leuiter gibbum est, dextrum uerò duabus quodammodo
leuib. impressionibus modicè sinum. Porro lienis non mediocriter, & omni ex parte prope-
modum æqualis crassities, ab ipsius latitudine ac multo adhuc magis à longitudine uincitur,
Lienis cauum profundiori linea secundum eius longitudinem ducta abundat, quæ rectà qui-
dem ducitur, & inæqualiter extuberans, sinuataque, lienis uasa (ut mox audies) admittit. At reli-
qua ipsius superficies non ita ut iecoris, aut renū, leuis est, sed obscuris quibusdam et leuiter pro-
minentibus tuberibus, ad eam ferè formā qua elephantiasi morbo insigniter laborantium cutis
inæqualiter extumescere cōsuevit. Neque illi solum inæquali cutis superficie respondet lien, ue-
rū etiam colorem quoque illius affatim exprimit. Parisijs enim in diui Lazari monasterio, & in
plerisque superioris Germaniæ agris, & alibi quoque elephantiasi morbo affectos uidi, nigricantē
lienis humani colorē superficiemque exactè referentes, non secus quàm si quis ex liene eos confin-
xisset. In homine namque hoc uiscus atro quodam & perquam obscuro colore nigricat, in canē
autem splendidius plerumque ipso iecore rubet. Sues albicantem magis lienem exigunt. Neque

Lienis situs.

Forma.

Lienis super-
ficies ac color.

uerò in externa tantum superficie, uerum etiam intus, siue coctum siue crudum lienem secueris, hic color sese offert. Neque inutiliter hominis uiscera in aqua nonnunquam elixantur, aut saltem ut magis cōcrescat sanguis, in calidam submerguntur. Solet enim fluxilis adhuc sanguis in iecore, & liene, & pulmonibus etiam, quo minus aprē spectari singula queant, impedimentum esse. Potissimum autem in liene tentandum hoc duxi, quòd de ipsius usu uehementer ambigerem, uenasq; & arterias longè aliter quàm in iecore, pulmonibus & renibus dispersas intuerer. etenim lienis substantia crasso nigroq; admodum, sed solidioris spongiae, aut leuioris pumicis modo, raro concretoq; sanguine constare mihi uidetur, frequentibus fibris filamentisq; non insigniter ualidis duntaxat implicita. Per huius enim corpus, & si per multas uenas & arterias inferi certo cognoscamus, nullè tamen quemadmodum in iecoris & pulmonum corpore, per substantiam ipsius dispersæ animaduertuntur, nisi perquam rare, eademq; admodum graciles, non aliter quàm si simulatque lienis sinum uasa ingrediuntur, in innumeram ramorum sobolem diffunderentur, adeò tenuium, ut cavitae carentes fibræ potius quàm uasa nūcupandi essent. Hisceramis seu fibris undecunque implexis, sæculentus crassusq; admodum sanguis obducitur, quem Erasistratus, ut opinor (quod uasis circumfundatur) *μεγίστην*, quemadmodum & in iecore, appellat. Neque profectò tenuis sanguis quo lienem enutritur damus, raritatis substantiæ lienis sola causa esse uidetur, sed innumerus ille fibrarum (uix ausim enim artiarum dicere, et uenarum) implexus. Talis mihi lienis in sanis hominibus apparuit substantia. In quodam laborante elephantiasi, quæ nondum penitus radices egerat, turgidior rem maioremq; lienem reperimus: in reliquis autem, sano similem. In ciue Patauino, qui annis tribus carcere detentus, tandem nigro arquato defunctus, sectioni publicæ adhibitus fuit, lienem præter cetera minus crassum latumq; & exiguum omnino reperimus, & gibba eius parte adipem adnatum, instar candidissimi durissimiq; lapidis concretum. Substantia uisceris huic erat arida, et impense dura. Qui Montisselis suspensus, ad publicam sectionem Patauium aduectus fuit, adeò grandem ostendebat lienem, ut modicè admodum iecoris molī cederet, & anteriori iecoris parti aduatus, anteriori quoque uentriculi sedi exporrigeretur. Lienis eius substantia, sanorum uisceris substantiæ penitus respondebat. Adolescens hic fuerat candidissima & glabra cute, nimisq; natura melancholicus. adeò enim ob Diogenicos mores plebi gratus extiterat, ut tera queum euaserit. Nam primum Venetijs loris cæsus, Patauium uenit, ubi dextro oculo & manu itidē dextra multatus, Montisselis iterum apprehensus (nam è carcere illic semel eruperat) extremū saxe tragœdiæ actum egit, & mori potissimum occasione à studiosis sectioni fuit adhibitus. Galli sacerdotis Bononiæ in xenodochio aqua subter cutem mortui, lienem albidum, sed exiguum adinueni. Hæc idcirco recenseo, ut huius uisceris substantiæ & usus (si modò de eo quem Galenus ipsi tribuit, dubitare fas sit) à studiosis sedulo indagaretur. Porro uenæ, arteriæq; & nerui lienis in hunc habent modum. Minor seu finis

Vnde lienis
ueneris
arteriæ
nerui du-
cantur.

Lienis tu-
nica.

Ipsius nex-
us.

ster uenæ portæ truncus, inferiori membrana omenti suffultus, transuersim ad lienem tendit, posteriori primum uentriculi sedi, eiusq; elatori orificio & humiliori membranae omenti, adeoq; ipsi colo, quā uentriculo exporrigitur, ramos offerēs: quos ubi deprompsit, reliqua ipsius portio in duos primum ramos, deinde hi rursus in alios disseminantur, ut tandem multiplici serie per humiliorē omenti membranā medio cauæ lienis sedi secundum rectam lineam illi implantentur. Porro priusquam hi rami in lienis substantiam deperdantur, ab insigniori ramo uisceris humiliora petente uena pronascitur, sinistram fundi uentriculi sedem amplectēs. ab alijs uerò lienem aduētibz ramis modò tres, modo etiam plures rami enascuntur, in sinistram uentriculi latus, uti sæpe prius relatum est, excurrentes, nequaquam autem ad superius usq; uentriculi orificium conscendentes. Quemadmodum uerò lienem accedentes uenæ inferiore omenti membrana suffulciuntur, sic quoque ab illis uentriculum petentes superiori membrana omenti sustinentur, cuius ut & uasorum interuentu lien uentriculo connascitur. Arteriæ itidem frequenti serie lienī implicite, ortum ab illa ducunt arteria, quæ à magna arteria supra renū regionem pronata, inferiori membranae omenti innascitur, ac sinistrorsum lienī potissimum offertur, pari prorsus serie cum uenis in lienem pertinentibus. Nerui lienis à sexto neruorum cerebri paris sobole pendent, quæ sinistri lateris costarum exporrigitur radicibus, & surculum humiliori membranae omenti mittit in lienis potius tunicā, quàm substantiam spargendum. Lien enim non minus quàm iecur tenui quadam & simplici obducitur tunica, ab omenti membranis, quæ lienis rectæ lineæ innascuntur, orta. Hæc nam que membranæ lienis cauo insertæ, in ipsius degenerant tunicam. Et quia à peritonæo originem ducunt, earundem beneficio interuentuq; peritonæū ipsum lienī tunicam offerre merito dicimus. Sed præter lienis ad dorsum & ad uentriculum omenti auxilio nexum, à peritonæo quā

fig. ca. 5. li.
3 d. 4 d.

b. ostendit
harum ferē
em 4. fig. ut
et 3. ac in
super i. tab.
fig. 19.
i. h. ca. 5. li.
3 F. diffun-
dens primū
K. L. M. N.
S. diuiditur
in T. T.
h. fi. cap. 5. li.
3 Z.
i. h. ca. 5. li.
X. X. Y. et
15 fig. 8. B.
m. ostendit
id. 3. fig. et
tab. fig. 19.
n. fi. cap. 11.
lib. 3. d. 4.
o. 2. fi. cap.
li. 4. x.
p. 19. fi. B. B.
C. C.

q 20 fig. V
subijctur
O, P, O.

quâ septum succingit, tendens interdum fibrâ impari numero lienis gibbo adnectuntur, ipsi quoque septo lienem ita colligantes. Verum ut in hominibus huiusmodi fibrâ quandoq; non reperiuntur, ita in canibus nunquam. Est etiam aliquando cernere, lienis gibbum exteriori renis sinistro inuolucro, quod multa abundat adipe, fibrarum quarundam medio firmari, potissimum si reni lien (ut non infrequenter fit) magna ex parte subternatur. Atque hæc est lienis situs, formæ, & partium enumeratio. Quam iustè uerò corporis nostri architectus illa dispensauerit, singulorum edocebit usus, & functio: de qua non medicorum modò procures, uerum & philosophorum præcipui disenserunt. Erasistratus uulgi opinione (quod cursoribus lienem eximi stultè credit) persuasus, lienem frustra factum esse quodammodo attestatur, dum air, Naturam timentem necubi artis suæ obliuisceretur, quum sæui uix dum cõcepto iecur in dextris conformaret, in sinistro quoque latere aliquid molitam esse, & consistentem in eo splenem iecori opposuisse: perinde ac si ipsa uentriculo paululum in sinistram producto, creationem superuacua uitare non ualuisse. Aristoteles communem usum, quem omnibus tribuit uisceribus, lienis quoque primum ascribit, uidelicet quo uenæ, utpote pensiles, sustineri, & copia uiscerum stabili ad corpus possint: Quasi enim (inquit) anchoræ partibus appensæ, uiscera ad corpus iaciuntur. Deinde iecoris lienisq; usum priuatim docēs, subiungit: Iecur & lienem ad ciborum concoctionem auxiliari, & lienem uapores uagantes diuertere, & ex uentriculo attrahere, eosq; posse concoquere, ut qui sanguineus sit, atque ut semel dicam, Aristoteles lienem adulterati iecoris loco recenset. Eodem modo autor libri de Respirationis usu, quem Galeno falso tribuunt, præter alia quædam de uenis, quæ gibbo lienis inferi arbitrat, nugamenta, lienem ex uentriculo & intestinis confectum cremorem per uenas uentriculi & intestinorum assumere, ac sanguificationis organum esse contendit. Huius sententiæ nonnulli etiam medicorum subscribunt, lienem iecore malè affecto nomine iecoris sanguinem elaborare affirmantes. At qui cæteris dissectionis professoribus probabilior esse uidetur lienis usus, in hoc illum à Natura fabricatum esse docet, ut luto si sæculentiq; in iecore confecti sanguinis sit receptaculum: & quem admodum tenuiori leuioriq; recremento bilis uesicula reficitur, ita lienem crassiori & grauiori suscipiendo extructū esse, quod lien ad se per portæ uenæ truncū, multiplici sobole eum adeuntem, tanquam familiare sibi alliciat exugatq; attractum autem conficiat, elaboret, ac suæ nutritioni aptum reddat, sanguinē illum, & si crassus sæculentusq; sit, rarum spongiosumq; efficiens. Ad quod præcipuè opiculantur frequentes in lienē insertæ arteriæ, suo calore ad exactam sanguinis illius elaborationem strenuè auxiliantes. Sed quòd primarius præcipuusq; huius actionis autor, lienis sit caro, etiam si nō dicatur, manifestum esse neutiquam ambigo. Atq; ita etiam omnibus concessum est, lienem non uniuersum sanguinem quem à iecore admittit, suaq; insitua ui allicit, conficere, ac in sui nutrimentum reponere: uerum quicquid nutritioni ineptum continet, suæq; substantiæ adaptari nequit, in uentriculum magni cuiusdam usus gratia reuomi. Primum enim omnes affirmant, succum melancholicum à liene in uentriculum eructari, alij quidem per uenam à liene in uentriculum pertinentem, alij per proprium quendam meatum, atq; inde à uentriculo in intestina, & hinc unā cum fecibus è corpore expurgari. Porro uenā illam, aut ut alijs arridet, meatum nonnulli simpliciter in uentriculum à liene duci scribunt: alij insertionis locum intrepidè exprimentes, illum in superius uentriculi orificium implantari adijciunt. Par etiam in eius excrementi usu assignando, inter dissectionis procures occurrit dissensio, nam alij perquam utile & amicum uentriculi functionibus hoc esse, sicut bilem flauam inimicum & hostem perniciosissimum astruunt. sed alij quidem contenti sunt, si doceant, atram hanc bilem sua saporis qualitate, quam acerbam & acidam esse fatentur, omnes uentriculi functiones, quæ in amplexu quodam consistunt, astringendo & colligendo corroborare, ac proinde ne in confectus à uentriculo cibus elabatur, prohibere. Alij autem huic tantum uisui non acquiescentes, iam dictis utilitatibus addunt, uim uentriculi appetitricem hoc excremento adeò incitari, ut eius præcipuè usus gratia uenam aut porū à liene in superius uentriculi orificiū inferi statuunt: imaginatione solum, non sectionibus ita edocti. Ego sanè de hoc recrementi lienis in uentriculum eructione, & eius usu nihil affirmare audeo: neque etiam sectio ista luculenter, quæ tamen citra ullam controuersiam Anatomes professores audacissimè asserunt, mihi commoustrat. Primum enim nullum meatū illi quo bilis in intestina repurgatur, similem esse haud ambigo: uenæ autem quæ sinistro uentriculi lateri implantatur, non à lienis prodeunt corpore, sed ab illis quæ iam lienī inseruntur. Neque alia penitus harum uenarum per uentriculum ferries uisitur, quam reliquarum omnium corpus uentriculi petentium. dein nulla hīc prorsus est uena, coniuge carens arteria. Postremò, si quid in uentriculum à liene defertur, id potius uentriculi fundum petit, quam superius illius orificiū. Vena namque sinistram fundi uentriculi sc-

Lienis usus ac
functio.

Quid lien in
uentriculum er
uctet & quo
meatu.

r Videre id
est in figu.
ca. 5. l. 3. C.
3 si. et 14.
fig. 19.
si. ca. 5. l. 3.
3 Z.

dem

dem perreptans, atq; ab ijs quæ humiliori lienis sedi inferuntur, principium ducens, omnium uenarum uentriculo ab illis quæ lien exporriguntur oblatari, facile maxima occurrit. Quamquam neque hæc uena, uti nec alia, prorsus sinistrum uentriculi adiens latus, ullo alio turgat sanguine, quam reliquæ uentriculū implicantes ueng. At hac de re paulo prolixius in ea Epistola egi, quæ in laterali morbo nihil interesse docet, dextrine an sinistri cubiti uenæ feces: aut si quid intersit, dextram cubiti uenam potius quam sinistram aperiendam. Caterum lienem suo calore innato, ac frequentibus qui illum intertexunt arterijs, uentriculi concoctionem fouere, iam antea proditum est. Quod autem uulgo lienem risus authorem esse dicimus, hinc fortassis sumptū esse consilio, quod crassum, fæculentū, & lutosum sanguinem ad se lien alliciens, reliquum sanguinem agiliorem, ac ut ita dicam, hilariorem reddere, omnibus creditum est. Porro lienis beneficio cor refrigerari (quod Arabum præcipuis affirmatur) non autumo; neque enim is cor contingit, & si quod illi innatum esset frigus, lienis arteriæ id ad cor haud deducerent.

DE RENIBVS. CAPVT X.

RENES pingui ipsorum membrana indutos, ac characteribus T. V insignitos, uigesima commonstrat figura. uigesima autem secunda, & uigesima quinta figure, eodem ea membrana liberos proponunt. Vigesima uero prima renem tribus tabulis dissectum continet, ipsius harmoniam concinne spectandam offerens.



Renis numerus et situs.

RGANA bili flauæ & fæculento lutosoque sanguini expurgando sacrata, sermo præcedens iam pertractauit. Hic uero illis dedicabitur, quæ sanguinem in cauum uenam ex iecore missum serosa aqua quæ humiditate colant, quam cremoris ex intestinis in uenæ portæ furculos sumendi, & elaborati sanguinis ex iecoris cauo in gibbum eiusdem ducendi, uehiculum, ex Diui Hippocratis sententia esse dicebamus. Hunc enim humorem postquam proprium opus expleuit, neque sanguis per plures atque ita angustos meatus ducendus est, non decet amplius in corpore omnem asseruari, uenis alienum onus futurū. Huius igitur usus occasione¹ renes, quod id recrementum & bilem ipsam & fæculentum sanguinem copia superet, bini sunt facti, situm, formam, totamque constructionem huic muneri conuenientem obtinentes. Quò ocyus enim humorem serosum, quem urinā & lotium uocamus, sanguini adimant, quam fieri potuit proximè ambo iecori allocantur. Dexter enim² superiori sua parte humillimam iecoris portionem³ contingit, in canibus sinum quoque in iecore sibi, ut altius collo caretur inculptum, appositè conscendens. Sinister uero ad eam altam sedem occupat, ut & lien aliqua ex parte substernatur. Vterque uero iuxta uertebrae corporum latera, humiliori⁴ septi sedi incumbit, qua id decimæ & undecimæ & duodecimæ costis obducitur, ea potissimum parte, qua costæ in posteriora impensius obliquantur. Is enim costarum in posteriora flexus, opportunam renibus sedem offerre uisitur, ut & tuò uallentur, & ne in anteriora uel minimum prominentes, cæterorum nutritionis organorum sedem occupent. Quæ nisi respexisset Natura, unum semper, eundemque maximum (ut interdum in habentibus uentrem impense prominulum, & uitiatum costarum ductum, moliri Naturam uidimus)⁵ super uenæ cauæ & arteriæ magnæ corpora renem collocaisset, breuiori succinctiorique compendio serosum sanguinem attracturum. Non enim renes, ut alijs scribitur Anatomicis, lumborum⁶ musculis, qui dorsi & femoris famulantur motibus, prorsus inferuntur, & etiam non multo humilior quam costæ sunt, uel⁷ infima sui parte uersus ilia descendunt, etiam si alter altero semper sit elatior, neque ad amissum⁸ è directo mutuo opponantur. Quum enim lien demissius quam iecur descendat, uterque autem ren uenæ cauæ, quæ sub iecoris corpore ducitur, uicinus esse contendat, meritò dextrum sinistro elatiorem esse plerumque cernimus, quippe non raro etiam sinister dextro elatior obseruatur, in ijs præcipue quibus lien minor & iecur maius obtigit: perinde ac si id dextrum renem deorsum deprimeret, ille autem sinistrum altius ascendere, sibi quæ subijci sineret. Porro contrarium hunc situm renibus non tam loci, quo aptè locari possent, occasione, quam ne è directo utrique serosum sanguinem attrahant, ac alter in contrarium reuellens alterius munus prohibeat, accidisse constat. Neque etiam in renum situ Galeni ratio probanda est, qua dextrum sinistro editiorè esse docet, ut secundum rescutudinè magis trahat, quæ ea quæ dextro uenæ lateri ascribit, non magis illi quam sinistro lateri propria sint. Nemo enim sanæ mentis ex iecore in uenæ cauæ latus dextrum plures uenas quam in sinistrum pertinere fatebitur, si ad amissum eius uenæ secundum iecoris posteriora ductum contemplatus fuerit. Caterum

Lib. 5. de V. su. perr.

420 fig. T.
V. 25 Y. Z.

b 23 figura
cha. 3.
c 25 figura X
uicinum est
L. aut 23 fig.
o ad c.
d 20 fig. V.
sub O. O.
c 7 muscul.
tab. 4.

f super P.
Q 25 fig.

g 7 muscul.
tab. 1. u.

h 23 fig. cha.
4.

utrunque

ut unque renes situ inter se discrepent, neuter tamen alterius altitudinem, quanta media est illorum longitudo, superat unquam. Sunt enim humani¹ renes oblongi, & minus lati, omni² que ex parte aequaliter crassi. Anterior³ namque & posterior⁴ comprimuntur renes, & in⁵ latere exteriori ad amulum orbiculares & gibbi⁶ in interiori autē, quod exteriori breuius est, partim gibbi, partim caui. In media enim interioris lateris sede sinu profundius sibi impressum exigūt, superius inferiusque uelut in acutū angulum desinentem, in medio autem extuberantē. Superiori parte paulo quā inferiori latiores sunt renes, & parū admodum exteriori quā interiori crassiores. Magnitudine ea donantur, qua probē quantum sanguini ex usu est, seroso humore illum emundant. Superficiem iecoris gibbo similiter impen⁷se leguem & lubricam fortuntur, ut & colorem intenserubrum & resplendentem. Substantia nanque constant carnea, densa, admodumq; solida & dura, parumq; a cordis substantia variante, prae⁸terquam quod nullis omnino fibris intertextitur. Renum enim substantia fibrarum, ut & iecoris pulmonumq; substantia, expers est: ualorum per ipsam diffusorum fibris ad attractionem, retentionem & expulsi⁹onem famulantibus. Quum enim sanguinis serum renes excolare oportet, neq; commodē uenae caue magnatq; arteriae¹⁰ corporibus, uti iecur, ad uenam cauam adnasci potuerint, in¹¹signis rami a uena ac arteria in ipsos deducti sunt. Ac a caua quidem duo grādes rami, urinq; nimirum singuli, ad singulos renes enascuntur, qui non ē directo inuicem prodeunt, sed pro renum situ, origine uariant, dexterq; ramus elatius sinistro principium possidet, si quidem ren dexter altius collocetur, si uerō sinister superiorem dextro sedem sibi uendicet, sinister quoq; ramus elatius dextro a caua pronascitur. Ac par sanē arteriarum est ratio, quae sub uenis protensa una cum illis transuersim ad renū¹² sinus, quos in interno ipsorum latere gerunt, perferuntur. Quum primum in hominibus ad illum alterius renis sinum uena ac arteria peruenerint, in duos ramos priusquam renem subeant, ambae diuiduntur, unum ramum superiori eius sinus angulo, alterum inferiori offerentes. In ipso autem ualorum ad renes progressu, admodum raro a se ramulos arteriae diffundunt, sed totae in renes absumuntur. quum interim a sinistro renis uena¹³, feminalis uena sinisterum petens testem depromatur: ab ea autem quae dextrum renem adit¹⁴ ramus in pinguem membranamq; renis tunicam numerosa sobole spargitur: quod & sinistra uena interdum imitatur, dum ren sinister elatiorem dextro sedem occupat. Cuiusmodi uerō sit haec pinguis renum tunica, paulo post exequar: nunc enim ualorum ductus, ac per renis corpus distributionem unā cum renis sinibus, & meatuum urinam ē renibus in uescam deducentium ortu, propter continuum de uasis sermone¹⁵ perscribere aggrediar. atq; utinam ita haec tibi ob oculos ponere, quemadmodum si praesens essem, leuiq; admodum opera in renis sectione monstrare possem: maximē quum tot fabulae de renum officijs, sinibus, membranis, & quae in renibus distribuuntur uasis, antehac ceteris dissectionis professoribus effictae sint. Galenus inquit simpliciter, uenas ac arterias per renis corpus distribui, & per ipsam duramq; renum substantiam, retento sanguine, urinam cum bilis quae sanguini adest portione transmitti, inq; urinarium meatum effluere. Nostorum medicorum, & qui Galenum sequuti sunt omnium, haec exprimere studentium, alij perperam oscitanterq; renis fabricam aggredientes, & quae haec ualorum sit distributio & situs non obseruantes, nescio quas colatorias membranas ementiuntur. Alij sectionem auersati, & in altis cathedris sedentes, sibiq; ipsis mirifice placentes Promethei, abundē suo munere se perfunctos esse arbitrantur, si discipulis imaginatione hominem cōsintant. Atq; hinc illud est, quod praecipuos nostros aetatis medicos & docuisse & scripsisse scio, nobis triplicem, quo urina a sanguine in renibus discernitur modum excogitari posse: non addentes interim, quid in ipsa hominis sectione appareat, sed sibi sinus & ductus suo arbitratu effingunt. Adeo sanē ut nunc omnibus recepta probataq; sit opinio, duos in renibus esse sinus, secundū uisceris longitudinem sitos, elatiore scilicet unum, demissiore alterū, qui transuersa quadam membrana interdiuidantur, superior dico

Reniformis.

Magnitudo:

Substantia.

Vena ac arteria renibus ob lata.

Renum in ternis sedibus conformatio.

0 23 fi. g. h.
p 20 fi. a. b.
c 22, 23 fi.
m, n.


q 23 fi. cha.
7, 8.

p 20 fig. e.
s 20 fig. x
ad T.

f Hic ne in notandum
mus sim, se
ratim spe
ctabis tabu
las 21, fig.

DVABVS praesentibus figuris medicorum de urina excolatione commentum exprimere conatus sum, ac superiori figura renem ab ipsius gibbo uersus sinum cauum¹ ut dissectum finxi, inferiori autem renis duntaxat media spectatur portio. Ceterum quid singula indicet, ipse characterum Index in hunc modum docebit.

- A Vena ex arteria serosum sanguinem reni offerentes.
B Sinus, in quem medici uenam ex arteriam nuper dictas serosum sanguinem profundere docent.
C Sinus, in quem urina ex iam dicto sinu colatur.
D Renis substantia orbiculari sinus hos amplectens.
E Beatum ex nugaris sinu renis colatorium, seu membrana cribri modo perita, ex urinam ex sinu B indicaco in sinum C in signum una cum bile promanare sinens.
F Vnam ē uenae ad uescam deferens meatus.



ab inferiori. In superiorem renis uenam arteriamq; finire, easq; serosum sanguinem in illum infundere,

fundere, deinde membranam sinus interceptientem, tam arctis angustisq; foraminulis perlutam esse, ut & aqueum illud ac tenue recrementum & bilem quoq; transmittat, sanguine interim propter sui crassitiam non penetrante. Addunt præterea illi humanæ fabricæ stupentes architecti, ut tanto scilicet elegantius Naturæ opus consingant, ex inferiori sinu meatum urinarium explantari, illumq; urinam iam colatam excipere. Profecto sagacissimus ille rerum Opifex tatum munus uni membranulæ cribri modo perforatæ non tribuerit, neq; in renibus eandem extruxerit. Quin renum substantia facultate sibi innata, ac propria ad iustitiâ temperie, ex uenis ac arterijs per ipsius corpus deductis, serosum illud recrementum excolat, ac in sinum qui urinario meatu excipitur, diffundit. Quod incredibile artificium ut uideas, caninum renem utpote macilentum, & nulla, quemadmodum humanus est, pinguedine oppletum, ad manum tibi esse uelim, illumq; uti renis administrationem ad præsentis libri calcem subiungam, te primum aggredi. Post aliquot enim obitas sectiones (dummodo prima non suffecerit) duos in renibus sinus adiuuenies, secus multo ac nostri arbitrantur medici, à Natura formatos. "Vena enim & arteria in renis corpus subeuntes, in unum degenerant corpus, arteriarum tunicis duritia crassitieq; respondens. Hoc cauum & uenæ arteriæ uero modo per renis corpus distributum cernitur. Primum enim paulatim latefcens, in duas quodammodo partes diducitur: quarum unam quidem anteriorem, alteram uerò posteriorem (renum figuræ perpetuò memores) doctrinæ studio uocabimus. Anterior una serie unoq; ductu, modò sex, modò septem, modò plures etiam, æquæ crassos producit ramos, in quos etiam anterior hæc membranei corporis pars finitur. Præsentibus rami per anteriorem renis partem æqualiter à se inuicem secundum renis formam abscedentes, uersus exterius renis latus præperant, nō quidem ad externam usq; lateris eius superficiem, sed interius multo in renis corpore permanent. Hic in aliquot propaggines rursus dissecti, corporis membranei posterioribus ramis, quos nunc prosequar, commiscuntur. Posterior enim corporis eius pars eodem modo quo & anterior in ramos digeritur, ad externū renis latus tendentes. Quum uerò hi eousq; quo anteriores deuenerint, mutuò posteriores rami cum anterioribus coeunt, ac singuli singulis, ac si unum idemq; corpus essent, uniuntur, mutuamq; ciuitatem constituunt. Elegans iste ramorum coitus in star semicirculi ad exterioris renum lateris formam perficitur. Porro membraneum cauumq; istud cum suis ramis corpus non unum deuncq; renum adnatam habet substantiam. Corpori enim ipsi priusquam in ramos digeratur, antè rursus posteriusq;, & ad internum ipsius latus, nō autem ad externum, renis substantia adnascitur. Ramis uerò anterioribus duntaxat antè rursus posteriusq; renis substantia adnascitur, quousq; ad mutuū coitum rami ducantur. Hic enim ubi in plures ramos singuli diuiduntur, ac anteriores cum posterioribus coeunt, renis substantiam adnatam undiq; habent, quāquam inter ramos ipsos, quā nihil adnascitur ad renis interiora, uelut septum quoddam procedit, ramis non connatum, & ab illa renis substantia prodiens, quæ ramis dum coeunt cōnascitur. Ad eò ut hic inter anteriores posterioresq; corporis illius membranei ramos alter quiddam renis sinus exurgat, quodammodo bipartitus. Quia enim is exterius membranei corporis latus, ubi primum ramos germinat, respicit, unicus esse apparet: quum autem secundum septū ex renis substantia pronatu, uelut ad exteriora fertur, geminus conspicitur. Vna enim eius pars inter septum & ramos anteriores, altera inter idem septum & posteriores ramos porrigitur. Sinus hic inter dissecandum subhumidus exanguisq; omnino occurrit, corpus autem illud membraneum cum suis ramis omnibus, aut primus sinus (si ita corpus id appellare uisum sit) sanguine plenus semper inuenitur. Homines ut passim pinguetudine, quemadmodum & porci, scatent, secundum sinum quoque adipe duriusculo, & quasi seroso humore enutrito oppletum habent: qui non solum humanorum renum speculationem dissecantibus obscurauit, sed quibusdam accuratè sectionem aggredientibus ita imposuit, ut hunc adipem* urinarij meatus operculum quoddam esse, & urinæ in renibus excretioni seu colationi præfici; & quoddam uelut colatorium esse, scriptum reliquerint. Qui enim suis imaginationibus & somnijs non contenti, plenam operam unā cum ratione sectioni quoq; impenderunt, si nihil aliud, saltem meatus urinarij^v initium uiderunt, quod sanè ex altero renis sinu pendet, non quidem ex humiliori ipsius sede, sed ex interni lateris secundum istius sinus medio. Incipit enim meatus ille ab externo latere membranei corporis, ubi primum in ramos scinditur, deinde per eius corporis medium procedens, ex renum medio in internum renis latus uenæ cuiusdam instar procidit. Hæc mehercule demum renum conformatio est, quæ in membraneum illud corpus ipsiusq; ramos serosum sanguinem renis substantiæ ui, & fibrarum eius corporis rectorum beneficio at trahi commonstrat: quo sanguis quantum sufficit seroso illo humore ita liberetur, ut sanguinē à portæ uenæ furculis in cauæ soboles assumi transmittiq; nouimus. Quippe non uniuersum

*Renum mu-
nus.*

u Vti superius monui sedulo hic inspicies tabulas 21 fig. 4.

22, 23 fig. 4.

21 fig. 4.

renes

renes alliciunt. Imò ut sanguis ad fluxum per uenarum cauitates aptior sit, eius humoris portio unà cum eo per reliquū adhuc corpus ducitur, quem extracto iamq̃ cōcreto sanguini innatare conspiciamus. Quinetiam manifestum quoque euadit, renum substantiam à sanguine nō solum in uena caua, sed & in arteria magna contento, aqueum illum humorem, & si quid biliosi excrementi adhuc ipsi sit admixtum, colare, atq̃ in alterum illum sinum protrudere, eumq̃ inde per² urinarium meatum ad uescicam huic humori instar lagenæ subditam sensum defluere. Quē uerò horum meatuum conformatio sit, ubi renum tunicarum explicationem præcedentibus addidero, statim audies. Renibus binæ sunt tunicæ, ortu substantiaq̃ uariantes. ¹ Prima, quæ *Renium tunica.* exterior est, renum corpori pertinaciter non adnascitur, nihilominus ipsi instar inuolucri circumquaque obducitur, & hinc etiam renis fascia uulgò nuncupatur. Hæc à peritonæo humiliorē septi transuersi sedem succingente principium ducit. Quā enim ipsi renes incumbunt, membranas quasdam fibras producit, in membranam tunicam, quæ renes ipsi colligēt, degerantes. Præsens tunica frequentibus uenis instar omenti intertextitur, multa pinguedine (ut & illud) abundans, renumq̃ actionem penicilli cuiusdam ritu fouens. Dextri quidem renis tunica à uena ad ipsū renum pertingente² propaginem exigit, in membranam frequentī ramorum serie excurrentem. Sinistri autem renis tunica³ uenam adipiscitur à sinistro uenæ caue latere, elatius quā renis uena enatam: aliquando etiam contraria est in eiusmodi tunicas implcantiū uenarum exortus ratio. Porro altera renum tunica tenuior est, & nullis uenis neq̃ etiā pinguetudine obsita, & ut iecoris & lienis tunica renum substantiæ connata. Hanc procreat tertia renē petentis arteriæ tunica, & uenę item altera. nam dum hæc uasā reni implantantur, hæc tunica ab eis abscedentes, in præsentis renis tunica dilatantur. Cæterum renis⁴ neruus, quem *Renis neruus.* quasi præterieram, gracilis est, neq̃ uenæ, neq̃ arteriæ renis proportionē respondens. Illa enim alterius usus quā nutriendi caloriscq̃ insitire creandi gratia reni offeruntur. neruum autem sensum duntaxat obitulum præstare oportuit, ac proinde à sexti paris ramis qui costarū exporriguntur radicibus, Natura singulos ad utrumq̃ renem diffudit, in internam ipsorum tunicam potius quā in corpus illos dispergens.

DE VESICA VRINÆ RECEPTACULO,

et meatibus urinam ē renibus in uescicam deducētibz. Cap. XI.

VIRILEM uescicam imprimis ostendunt uigesima secunda, et uigesima tertia figura, hanc simul cum uirarijs meatibus detestam prorsus exprimentes, uti et quarta figura Capituli quadragesimi noni, libri secundi. Superiorē uerò uescicæ fundi partem adhuc peritonæo nexam, proponit secunda figura, tertia, sexta, decima, duodecima, uigesima. Cæterum muliebrem uescicam pulchrè delineatam continēt uigesima quarta, uigesima quinta, uigesima sexta, uti ex illarum figurarum Indicibus petere licet.



ERINDE ac renes suis functionibus opportunam sedem sibi uendicant, tutoque locantur, ita quoque & uescica & urinarij meatus. ¹ Vesica enim quum sit aqueæ superfluitatis receptaculum, in quo sensum à renibus id collatum (ne frequenter & perpetuò, sed rarò & repente ac simul urina nobis reddenda sit) coaceruatur, eam sedem meritò obtinet, qua cōmodè dum urinæ copia aut qualitate molestatur, eam excernere possit: quem locum non decuit ab² eo quo sicca excrementa emittuntur procul abesse. Deinde elatiorem sedē alia nutritionis organa, hac uescica longè nobiliora, altamq̃ sedem expetentia, sibi occuparunt, adeò ut iure quodā non minus uescica quā intestinū rectum humiliorē locata sit. Ad posteriorem enim³ pubis ossis sedem uescica reponitur, elatiori sui parte superiorem pubis ossis sedem modò plus, modò minus, prout urina distenditur, excedens. Est namq̃ oblongæ sphaeræ instar aliquantulum rotunda, & elatiori parte, quam fundum ipsius propriè uocamus, apparet amplior: id quod situs occasione accidit. Quamquam enim ut capacior iniurijsq̃ ferendis minus obnoxia redderetur, figura ad amussim globi modo rotunda, magis ipsi conuenisset, etiamē oblongiorem suoq̃ fundo ampliōrē Natura machinata est, non quod eiusmodi commoditatem negligeret, sed ne pubis os rectumq̃ intestinum posteriori uescicæ sedi in uitis, ut & uterus in mulieribus attensum, eius distensionem nimium arctarent. quod sanè necessariò accidisset, si quam ex longitudine sortitur capacitas, etiam in latitudine inter pubis os & rectum intestinū adiecta fuisset. sed & fundum quoq̃ tanto est humiliorē ipsius parte, quę in ceruicem

Vesica situs.

Vesicae forma.

× uicem

gant, deducuntur. Ne uerò parum firmati, & omnino peniles uestigē infererentur, aut obliquū nimis ductū efficerent, nō elastissimæ parti uesticæ, ex qua¹ meatus, urinā sœctus extra umbilicū deferens pender, implantatur, sed illi uesticæ sedi, quæ posteriori peritonæi regioni, ad quam meatus toto ductu securē adnascuntur, uicinior est. Est autem ea regio in posteriore uesticæ se-
de paulo anteaquam in ceruicē desinat, cui utriq; meatus primū adnascuntur, & obliquo anfractu uesticæ tunicam à peritonæo pronatam penetrantes, tandem in uesticæ cavitatem alte-
ram quoq; tunicam penetrantes aperiuntur ingrediuntur^{ue}, modo sanē quā simillimo, quo bilis meatum in duodenum inferi relatum est: laxis nimirum membranulis utriq; ad meatus foramen ex uesticæ corpore appendentibus, non aliter quā si uesticæ internæ tunicæ tenues hu-
iulmodi processus inibi adnascerentur. Horum usus, membraneorū processuum bilem dedu-
centi meauū adnatorum usui responder, ut scilicet urinæ quidem ex meatibus in uesticam de-
fluenti cedant, & dum uesticā distenta urinam rursus in eisdem meatus regurgitare uolet, colle-
cti illi meatumq; opplentes, urinæ transitum præpediant. Id quod adeo præstant commodē, ut uesticā uel flatu plurimo repleta, nihil planē spiritus per hos meatus reddere queat. Verū quod
& obliquus ille in meatū insertionē ductus, eidem usui famuletur, uesticæ dum inflantur, ex-
actē cōmonstrant. Eadem in foliis indies experimur: nam per foramen quod à tergo illis adhi-
beri solet, aër quidem attrahitur, sed quum folliis comprimitur, propter aliterculum impetu aë-
ris foramini appressum, nihil uenti expirat. Idem quoq; in pilis obseruamus, quas flatu disten-
dimus. Quanquā longē maiore industria, neq; ita pendulis operculis rerum Opifex in urina-
riorum meatum implantatione utatur, q̃ nos ipsius artificium imitantes in foliis & pilis, aut
etiam in admittendis quas postmodum egredi nolumus columbis molimur. Vrinariorū itaq;
meatum implantatio ad inferiorem posterioremq; regionē uesticæ non procul ab ipsius ceruicē
constitit. Hic enim humillima uesticæ pars in angustum finitur² meatum, quem ipsius cerulcem
collum^{ue} nuncupamus: aliter in uiris quā in mulieribus protensum, & alijs quoq; in illis q̃
in his adnatum coagmentatumq; partibus, & usum deniq; ambobus diuersum præbentē. Com-
mune est enim utriq; huic ceruici seu meatui urinam ex uesticā deferenti³ musculum orbicula-
rim circum duci, quo cauetur ne urina præter uoluntatem nostram effluat: cuius usum, situm, &
formā in secundo libro diffusē persequuti sumus. Deinde utriq; & uiris & mulieribus per illum
meatū urina excernitur, sed uiris ad seminis quoq; ei aculationē ille auxiliatur. Ea q; propter pe-
culiariter huic glandosum illud corpus adnatū habent, semen deferentium uasorum⁴ insertionē
fufcipiens, quo corpore urinæ meatum humectante & irrigante mulieres destituuntur. Quine-
tiam mulieribus super uteri⁵ ceruicem meatus hūc seu uesticæ ceruicis fibris membraneis illi adna-
tus extenditur, ac ubi primū sub pubis osse cum uteri ceruicē sursum inflecti cepit, in illius
cavitatem cessat. Viris autem ultra⁶ porrigitur ac prominet. nam quamprimū humillimam
pubis ossium commissuræ regionē superauit, penis corporibus subnatus ad elatiorem usq;
pubis ossium commissuræ sedem sursum fertur, & hinc rursus prout rigidus flaccidus^{ue} est pe-
nis, sursum spectat aut propendet, nunc⁷ Græcorum, nunc⁸ Latinorum elementū exprimes.
At hæc opportuniū unā cum generationis organis pertractabuntur. Hactenus enim triplicia
cibi organa utcunq; persequutus sum: prima quidem quæ concoquunt, & quæ alimentū utile
propellunt ac transmittunt. Secunda autē quæ expurgant & deferūt, & fufcipiunt recremēta.
Tertia uerò, quæ excrementorū effluxui adhibentur. Atq; hæc in duplici erant differentia: alia
enim intempestiue effluere prohibent, ut orbicularis⁹ musculus uesticæ ceruici & podici adhibi-
tus: alia autem tempestiue excrementa propellunt, ut¹⁰ septum, & abdominis¹¹ octo musculi.

NATURAM PROPAGANDÆ SPECIEI
prouidisse. Caput XII.



presentis libri initio nutritionis organorum necessitatem in humana fa-
brica adinuenientes, ex humani corporis primordijs, & qua id constat
materia, hominem necessariò morti esse obnoxium colligebamus. Præter-
quam enim quòd mixtum genitumq; sit corpus humanum, id ipsum im-
mortale incorruptibileq; fieri nequaquam potuisse, arteriæ, uenæ, nerui, ca-
ro, & id genus partes reliquæ, è quibus conformatur, abundē commo-
strant. Quando itaq; uel materiæ occasione hominem producere immor-
talem rerum Opifici negabatur, ipsi ad immortalitatem quod licuit auxilium machinatus est;
instar boni ciuitatum conditoris, cui non præsens duntaxat cohabitatio cordi est, sed rationē
quoq; prouidet, quæ uel in æternū, uel ad quamplurimos annos ea duret. Sed ciuitas quidem
quantumuis bene fortunata, quæ non unā cum seculis ætatibusq; quandoq; intereiat, nulla
x 2 uide-

Artificiose
meatū urinæ
deducens in
seruo.

Vestica cer-
uix.

Quot nutritio-
nis organa ha-
ctenus commē-
morata sint.

Partitū gener-
ationis subser-
uiunt breuiss
enumeratio.

Vtendi appe-
tū generati-
onis organo
adfectus.

videtur unq̄ instituta fuisse. Prouidi uerò solertisq̄ rerum Opificis opera, quæ multis annorū millibus iam suffecerunt & perdurarūt, adhuc permanēt, mirabili quadam arte ab ipso inuenta, ut semper pro hominibus qui corrūpuntur noui succedant, perpetuaq̄ speciei conseruatio fiat. Homines namq̄ initio ita extruxit, ut unus quidem potissimū fœtus principij rationē exporri- geret, alter autem id sulciens fœtū enutritet foueretq̄. Sic uiro organa, testes scilicet ipsos in- didit, quæ præcipuum noui constituendi hominis principium efformarent, uasa illis adiungēs duplicia; alia quidem materiā ex qua hi apte semen cōficerent apportantia, alia uerò iam cōse- ctū in unū meatū, qui opportunē id in uterū projiciat, deducētia. Is enim mulieri dat, ut prin- cipiū hoc cōcipiat; deinde is quoq̄ uasis cōseritur, quorū beneficio genitura temporis successū enutriatur, ac præcipuo Naturæ miraculo in nouum hominem prodeat. Interim & testes uasa illorū functionibus seruientia uterus sibi uendicat, ut & mulier aliquā primarij principij ra- tionē fœtui adijciat. Quinetiā his omnibus non hominū duntaxat, sed & cæterorū animalū ge- nerationi famulantibus organo meras cōmiscendōrū corporū libidines, & peculiarē quandā delectationis uim ad generationē rerum Opifex copulauit, ipsi uerò anime ea usura mirabilem quandam & indicibile utendi appetitū quoq̄ elargiens. A quo usu animalia incitata & stimula- ta, etiā si stulta aut iuuenilia, aut ratione priuata prorsus fuerint, prouident tamē successione spe- ciei, haud secus q̄ si omnino essent prudentia. Quā enim Opifex haud ignoraret substantiā, ex qua instrumenta generationi subseruientia creauit, perfectam sapientiā neutiq̄ admittere ille ce- bram & uelut inelcationē, quam solum accipere poterāt, ad salutē conseruationemq̄ speciei ipsi indidit, delectationē uehementissimā illarū partū usui adijciens. Atq̄ hinc illa in Timæo Plato- nis de generationis amore à rerū Opifice nobis ingenta differētia sententia: Quociens pu- den dorū naturæ in uiris insita uis inobediens ac imperiosa, & quasi animal nō exaudiēs ratio- nem, furiosarū libidinū uolentia, subijcere sibi cuncta conatur. Vulua quoq̄ & uterus in fœmi- nis pari ratione animal auidū generandi, si intempestiue diuq̄ à generando abstineat, ægrē fert morā, plurimumq̄ indignatur. Vt modò nihil dicā de amore, quo animalia suos prosequuntur fœtus; & temperie à Natura mulieri priuatim cōcessa, ut nō solū utero adhuc cōtento fœtui ali- mentū subministraret, uerū natū quoq̄ suis mamillis tam sedulū & sollicitē enutrit. Quā uerò affabrē hasperinde ac reliqua generationi subministrantia organa extructa sint, iam paulatim auditurus es, quom cuiusq̄ organi situm, formam, substantiam, connexum, uasa, neruos, ortū, inuolūcra, quibus integritur aut constat, ductus, actiones, usus, & eius generis reliqua, à uiro- rum organo statuens sermonis initium, prosequi pergā.

DE VIRO- RUM ORGANIS GENERATIO- nis subseruientibus. Caput XIII.

PRÆSENTIA organa primū uigesima figura, mox uigesima secunda & ut-
gesima tertia absolutissime exprimentur, quemadmodum earum Index manifestō edocuit.

Quæstiones
ac controuer-
sæ in tracta-
tione de gene-
rationis orga-
nis obuiæ.



IRI semen primariū hominis effectiū esse principij, medicis iuxta ac phi- losophis concessum est omnibus: mulierē uerò semen emittere, & effectiū principij partē præbere, Aristoteles & alij pleriq̄ inficiātur. Rursus nō mi- nus ambigitur, nunquid genitale semē duorū principiorū materialis est effe- ctui rationē subeat, ut cū Diuo Hippocrate et Polybo Galenus existimat: an effectiui tantū, ut Aristotelis est opinio, qui licet principij motionis mē- struo sanguini à semine inferri arbitrabatur, non tamē ex ipso, ueluti ex ma- teria, animal formari putabat. His præter alias de seminis materia, & ipsius ab animalis parti- bus sedibusq̄ decisione, ac uasorū seminaliū ductu, forma, ortu, numero, insertionē, præterea et acetabulorū in utero essentia, & sanguinis mēstrui natura, fœtusq̄ enutritio, inter primarios medicos & philosophos innumeras atq̄ penitus ex diametro contrarias diffensiones, accedit, quæ testium sit conformatio, & nunquid semen illi, ut Galenus annuit, generent: num uerò tan- tum planarum, quæ Græcis λανθ uocantur, quasq̄ textrices suis telis appendent, uicem ex Pe- ripateticorum sententia gerant. Vt interim præteream mille de fœtus formatione, & quando masculus, quando femina producatur, de fœtus ad parentes similitudine, ac signis, de optima animæ parte: num scilicet hæc calor semini innatus, alia uel substantia sit, aut alicunde missa, ac ali- quid prorsus incorporeū aut corporeū: & rursus si ita sit, num id cū homine, an prius cū omni- bus animis creet, unde id dimittatur, præterea mortale ne an immortale sit, eiusq̄ generis alias penē infinitas philosophorum medicorumq̄ differēcias, & quæ cœlum terræ miscēt nomina à uarijs usurpata autoribus, ac diuersis pugnantibusq̄ partibus diuersimodē imposita, & denuò ab

ab interpretibus miserè conuersa. Ad eò sanè, ut ingentibus undequaq; opinionū dogmatumq; procellis fluctuans, uehementer ambigem, unde generationis in uiro organorū tractationē bo no omine aufpicer. Si enim meā cōmemoratorum dogmatū sententiā primū exposuero, prater hoc quod sanctissimæ religionis nostræ fides nō nulla sibi priuatim uendicat, & pleraq; meritò in dubiū uocari prohibet, hæc q; nostræ ætas rerum capitibus potius q; proluxa enarratione oblectatur, qui de seminarijs instrumentis incideret sermo, illis nondum explicatis, obscuritatem nō leuē pararet. Rursus si postpositis aliorū controuersijs, organorū descriptionē aggrediar, pleraq; illorū placitis repugnantia occurrent: quæ si exactius cōprobare adnissus fuero, manca interceptaq; reddet oratio. At quum alicunde inchoandū sit, nuda organorū descriptio subiicietur: quam ubi ex dissectione uerā (qualem profectò descripturus sum) animaduertis, ilico in prociñctu erit, quid de quamplurimis dogmatibus citra proluxam argumentorū consulationem sentiendum sit. In quibusdā autē quantumuis etiā sedulò Naturæ opera expendas, nihil quod tibi omni ex parte sanū uidebit, adinuenire poteris: nisi fortè in alicuius uerba secus atq; decet iurans, tuo sensui derogare lubeat, rationeq; prorsus careas. Atq; hīc adeò non iniuria miraberis, omnes qui huiusmodi tractationē aggressi sunt, subinde ignorata & neglecta organorū constructione, tot opinionū portēta inuexisse, omnesq; inter se quodāmodo dissentire, ac differētibus argumentis eosdē autores sua placita Andabatarū modo confirmasse. Quo autem ex his sententiā fluctibus assequuta Anatome facilius euadas, generationis in uiro organorū fabricā ordine explicabo. Testium itaq; in uiris situs nulli nō cōspiciuus est, ut & binarius ip sorū numerus, unde *diuiduus* & gemini appellatur: quamuis interdum unus tantū, & interdum tres simul reperiantur, at id rarius q; nōnulli existimant, tertium testem tuberculū prater Naturā ex meliceridum, aut scrotomatum, aut atheoromatū numero in scorto reconditū enumerātes. Porro testium forma, substantia, tunica, & illorū functionibus subseruientia uasa, nō etiā patent singulis. Sunt igitur testes rotundi, sed paulo admodū oblongiores q; aut lati, aut profundi: dein humiliori parte nōnihil obtusiores ampliōresq;, q; superiorifede uiisuntur. uerūm & id admodū obscurè: etiā si testes ouorū nomē à plerisq;, & præcipuè Arabibus inuenerint. In externa superficie nulli penitus sinū impressionem uē aut inæqualitatē obrinēt. Substantia constant alba, lactea, molli, & sibi undecūq; simili ac cōtinua, nisi quod uenulis frequentibus iisdemq; exi guis tenuissimisq; oppleta sit, ob idq; rara cauerosaq;, quemadmodū lienis substantia esse uideat. Atq; id parū alijs animaduersum est dissectionis professoribus, meq; diu latuit, quod inter dissecandum testē uehementius cōprimere soleā. Neq; uirorū testes ullum omnino sinū cavitatem uē exigūt, præter eā quæ secundariò ipsis eiusmodi uenularū gratia accedit. Vnde autē uenæ uascula uē, quæ testū substantiæ implicari dicebam, ortum ducant, sensim explicare contentam. Testes pluribus tunicis seu inuolucris integuntur: ac alijs quidem utriq; testī cōmunibus, alijs autē priuatim singulos testes inuoluentibus. Ambos enim testes unā cum ipsorū peculiari bus tunicis & seminarijs uasis, cutis ipsa & membrana, quā carnosa nō immeritò uocari diximus, perinde atq; uniuersum corpus, amplexant, & duo utrisq; testibus cōmunia statuūt inuolucra: cutis quidē unū, quod reliqua corporis cute tenuius est, et uelut futura quadā & rugis intertinguit, ac quibusdā scrotū, quibusdā uerò (qui se Latinius loqui existimāt) scortū, Græcis uerò *σπέρμα* dicitur. Alterū autē cōmune inuolucrū mēbrana carnosa efformat, hīc perinde ac cutis, longè q; in reliquo corpore tenuior, sed uenis frequentioribus intertexta. Præter hāc uerò tenuitatē cutis & mēbrana aliud peculiaritèr hīc, ut & in fronte ac pene sibi uendicāt, quādoqui dem nullus inter ipsas interuenit adeps: nō aliter profectò q; si Natura uirorū testibus laxius tenuiusq; uoluisset ac cute & ea mēbrana obduci inuolucrū, à uirorūq; testibus nō minus q; à cerebro omnē abesse pinguedinē. Nam & si membranarū quæ uenis arterijsq; frequentibus intertexuntē circa testes adsit copia, nullus tamē, ut ferè in reliquo corpore esse solet, hīc cōspiciē adeps. Porro utrumq; testē priuatim inuoluentes tunicae, amplitudine, conformatione, tenuitate inuicē admodū uariāt. Vna enim, quæ & exterior est, testē cū suis uasis ad eā usq; se dē, quā magnæ peritonæi amplitudini cōmittunt, induit, ualida quidē, sed tenuis, uenisq; abundās. Quā enim uenā arteriamq; seminales, ac dein uas semē à teste sursum ducens, ex peritonæi magna amplitudine in inguinū regionē ipsumq; scortū duci audies, illic peritonēū præfens educit inuolucrum, quod peritonæi pars proccensusq; meritò censet, itaq; ab ipso peritonæo prodit, ut scortū à cute deduci pronasci cernimus. Hoc inuolucrū seu tunica exteriori superficie, quā hanc carnosa mēbrana cōtingit, fibris quibusdā mēbraneis illi cōnascit, adeò sanè frequentibus, ut interdū has aliā testū tunica cōstituere arbitratus fuero, ut etiā subinde in aquosis ramicibus accidere cōspicimus. Ab his nāq; mēbraneis fibris tunica interdū conflāt, quā inter secūdū a quo humore oppletā inuenimus. Ceterū quā dextri testis tunica sinistri testis cōtingit tunica, ambe tunice si

Testium situs ac numerus.

Testium forma.

Substantia.

Testium inuolucra, utrisq; testibus cōmunia.

Priuatā utrisq; testibus inuolucra.

bris quoque mutuò cōmittuntur, ac ob id externā superficiē non admodū leuē habere videntur, sed membranarū inuicē cōnatarū modo asperā ac fibrosam. Interior eius inuolucri superficies, quā testē ipsiusque uasa respicit, leuīs & aqueo quodā humore obducta est, neque ulli penitus corpori cōnascitur, præterque quod elatiori sui parte, quæ ex peritoneo procedit, illi peritoneo cōtinuatur adnasciturque: quin & inferiori testis parti ualidē^h applantatur, nō quidem testis corpori, sed humillimæ uasis semen à teste deferentis parti, quā id sursum secundū testis humiliora reuoluitur. Ad hæc, tenuissimæ membranæ interuentu præsens inuolucrum interna ipsius superficiē uasorū membranæ adnascitur, quæ à peritoneo enata, uenæ quidē seminali alterā cōstituit tunicā, arteriæ autē terciā. Atque is cōnexus nō orbiculatim ad uasa perficitur, sed secundum rectā duntaxat lineā, quæ ad posteriorem uasorū sedem ducitur. Hoc inuolucrum aliquid cum carnosa corporis membrana cōmune nascitur. Vt enim hanc carnosam quibusdā fibrisⁱ aliqua sui parte augeri intertextūque ac in musculi naturā degenerare dictū est, sic quoque hoc testis inuolucrum secundum totā ipsius longitudinē posteriori in sede, à peritoneo usque ad humillimā testis partē, carnosas fibras obtinet, & longi stricteque cuiusdā musculi naturā refert, quem membranæ seu ipsi inuolucro innatum cernimus, nūscque ab inuolucro abscedentem, sed unā cum illo à peritoneo incipientem, & etiā inferiori parti uasis à teste semen deferentis, simul cum inuolucro adnatū. Inuolucrum hoc præterque quod testem commodissimē integit, illumque suspensum continet, musculi etiam illius beneficio, quasi uoluntario motu testem sursum allicere sentitur. Porro & musculi huius occasione, quod scilicet ruber ut reliqua caro sit, id inuolucrum^{ipso testis} priuatim appellatum à Græcis arbitror. aut etiam ob uenarum graciliū quæ id adeunt frequentiam, quæ illi inuolucro etiam ruborem aliquē conciliat. Verum nō ignarus quodā à uagina id Græcorum nomen deducere, nollem de nominibus quæ harum particularū innumera uariaque admodum (si modo alibi) occurrūt, uideri contentiosior. id enim mihi fat est, si uerē singula, uti inter discendum apparēt, describere, totius capitis ordinem ac nominū liberā impositionem lectori relinques. nihil enim in tractatione obstat, quod eundemque primū liberit prius et posterius hic perlegere, atque ex sententia singula nuncupare. Quod præcipue propter alterū priuatim testem ambiens^m inuolucrum addendum duxi. Quippe id præter testis corpus substantiamque nihil omnino amplectitur, testis figuræ ad amissum respondens, aut potius illam efformans. Quippe dura & crassa ac ualida admodum membrana est, testis substantiam ut eundemque mollem ac sequacem inuoluens. Atque is sanē præsentis inuolucri præcipuus usus censendus est. dein in hoc conducit, ut ipsius interuentu & medio, uasa testi cōmittenda ipsi adnascantur. Inuolucrum enim laxius, tenuius, molliusque inibi cernitur, quā uasa illi connascantur, quā per reliquam circūferentiam. Et elatiori quidem huius tunice parti uena ac arteria testis substantiam ut eundemque deferentesⁿ adnascuntur, ac quamplurimi ramuli eam tunicam hinc perforantes, in testis substantiam^o exporriguntur. Præter illos uerò, frequentes, sed perquam graciles furculi, deorsum in tunicā illius corpus à uena arteriā que deriuantur, in tauris & arietibus instar uitis capreolorum eleganter deducti. In posteriori uerò sede tunica hæc per uniuersam ipsius longitudinem ualidissime adnatos exigit omnes deferentis semen uasis^p anfractus testi obductos, inibi etiam undecunque tenuibus ac uisum fugientibus foraminibus pertusa. Cæterum per reliquam extero rem ipsius superficiē, leuīs & aqueo humore perfusa, nullique penitus parti cōnexa est. Interna uerò superficie, quæ testis substantiam hæc tunica continet, undecunque illi substantiæ connascitur. Porro hanc tunicam seu inuolucrum à primis Anatomes professoribus, qui testem^{si} uocauere, *ὑποδιδυμῆς*, quasi supergeminalem dixeris, appellatum fat scio: quicquid alij de testis nugentur capite, qui quum inuolucrum hoc ignorarent, & apud ueteres Græcos *ὑποδιδυμῆς* legerent, præter elatiorem testis partem, Galeno testis caput procul dubio nuncupatam, aliam effinxerunt particulam, quæ parui testis instar, testi imposita, ipsius caput & *ὑποδιδυμῆς* uocaretur. Alij horum errore (quem & Græcorum interpretes mirifice auxerunt) elusi, sed in sectione interim diligentes, quum huiusmodi caput non reperirent, Arabes quosdam imitati, uas aliquod hoc nomine appellandum finxerunt, quod inter testem & uenam ac arteriam, quæ præsentis inuolucro primum adnascuntur, medium posuere, eam fortasse semē deferentis uasis particulā ita appellātes, quæ ipsius est principiū, & in posteriori testis sede elatiorem ipsius sedem orbiculatim aliqua ex parte cōplectitur. Sed quū ex refectione horū nugæ etiā leui opera obseruētur, testis imposita nominū cōtentione, hanc ex proprijs cuiusque testis tunici alterā habebit, & *ἀναγνῆ* ueteribus etiā Græcis appellatā scito, nūc uasorū ductui mentē alacriter accōmodans. Ad singulos enim testes singule pertingūt uenę, ac itē arterię ortu differētes. Vena namque dextrū accedēs testē, à uenæ caudice demissius^q quæ uenarū ad renes exporrectarū origines pendēt, principiū ducit: nō quidem à dextro caudicis latere, sed ex superiori anteriori ue ipsius sedē

Testis musculi exteriori ipsius inuolucro innatus.

Intimū testis inuolucrum.

Testis testis sanguinis ac arteriæ deferentium nomen, mox cōstitutus.

h 22 fi. 24 plantatur.

i 3 muscul. tab. 3. r.

k 22 fig. 2.

l 22 fi. 2. ad nascitur.

m illo testis 22, 23 figurarū in diuitur, in uenę, simateria tamē ad q. a testis substantia mordec diuulsum cernitur.

n 23 fig. N. o 23 figura R. V.

p 23 fi. 2. 4. 1. et E. F. G.

q 22, 23 fig. n. et 23 fi. E.

r 22, 23 fig. s 22, 23 fig. m.

feda ad dextrum modicè declinans, oblongo quasi & crassiusculo tubere exoritur, ac sensim
 obliquè uersus dextrum latus protensa, peritonæoq; suffulta deorsum fertur. Sinistri testis ue-
 na non à cauæ caudice principium mutuatur, at elatius multò quàm dextra enascens, ex ue-
 nâ sinistro reni exporrectæ humiliori sede originem habet. Atque in hunc modum plerunque
 uenarum ortus cernitur, uerum quandoq; sed rarius, à sinistro cauæ caudicis latere ramulum
 exporrigi conspicies, qui deorsum ad sinistra repens, sinistra seminali uenæ commiscetur, ac
 cum illa coit. Galenus idem & dextræ seminali uenæ aliquando cōgisse testatur, quod scili-
 cet à dextri renis uenæ egrediens furculus, deorsum protenderetur, & uenæ commisceretur à
 cauæ caudice principium exigenti. At nescio quid Prometheis in mentem uenerit, qui suis som-
 nijs hominē in cathedra fingentes, dextram feminalem uenam à dextri renis uena, sinistram
 uerò ex cauæ caudice toties nasci docent, quoties sinister ren dextro elatiorem sedem occu-
 par: quasi uerò dextra uena non demissius multò, quàm renum uenæ initium duceret: & quia
 plerunque dextri renis uena nimis elata esset, testis dextri uena à cauæ caudice deriuaretur. Nos
 crebro eum renem obseruauimus situm, sed dextri testis uenæ aliud principium semel dunta-
 xat, quamuis tunc utriusque lateris seminales uenæ à renum uenis principium ducebant. Por-
 rò seminales uenæ, ad hunc modum deorsum protensa peritonæo fibrosis nexibus qui in alte-
 ram earum degenerant tunicam committuntur, coniuges arterias sortitæ. Vtræq; enim arteriæ
 humilius quàm dextrum testem petentis uenæ principium consistit: directio, & sibi proximæ
 ex elatioris anterioris uenæ magnæ arteriæ sedis medio promuntur, ac dextra quidem cauæ ue-
 næ caudicem (quod parum à Galeno animaduersum miror) conscendens, deorsum obliquè
 ad dextri testis uenam properat. Sinistra uerò sui lateris uenam accedens, non semel mihi defu-
 isse uisa est, sinistri testis uena solito tunc longè ampliori. Ab arteria uerò sinistro reni commu-
 nicata illam nasci, uix unquam occurrit: quanquā id interdum accidere possit, nō eo inficiamus,
 quòd tamen crebrius par uenarum & arteriarum testes petentium (uti passim Galenus docet)
 obseruetur exortus, nequaquam cōcessero. Dextra uena & arteria (idem de lateris sinistri uasis
 subaudito) sese inuicem contingentes, peritonæo uti dicebā incumbunt, & ipsi fibrosis mem-
 braneis uenæ nexibus alligatæ, decluesq; in dextrum protensa, super urinariū meatū ex dextro
 rene urinam uescicæ deferentē ducuntur, peritonæo in progressu tenues ac perquam graciles
 furculos diffundentes. Quum primum uerò uas hæc ad pubis usque ossis sedem peruenerint,
 quæ septimus femur mouentium musculus supra coxendicis os deorsum uersus minorem
 femoris processum fertur, illa peritonæum iuxta internum eius musculi latus permeant, & ex
 magna peritonæi amplitudine procidentia in exteriori testi peculiariū inuolucrum quòd hīc
 à peritonæo ducit principiū, pertingūt, unā cum neruulo ad testes usq; producto, qui interdū
 à lexti paris neruorū cerebri propagine costariū radicibus exporrecta diducit, interdū uerò
 à uigesimo primo spinalis medullæ neruorū pari. Porro peritonæi foramen uas cum neruo
 transmittens non ita patet, ac si quis ori pennam inderet, aut eadem chartā hanc pertunderet,
 sed peritonæum exactissimè uasorum lateribus, ipsarumq; tunica, quam in progressu adhuc in
 magna ipsius cauitate uasis exporrigit, cōnascitur, tutò ipsa nō secus transmittēs, quàm septum
 & quibus id succingitur membranæ stomacho & uenæ cauæ uiam offerit. Simulatq; uerò ua-
 sa illud peritonæi foramen superarunt, ex dextro quodāmodo latere rursus obliquè deorsum
 in sinistra ad dextri testis elatiorem sedem ducuntur, arteria non amplius uenæ duntaxat, ut in
 reliquo processu, accumbit, fibrisq; membraneis tantum cōnectitur, sed uaria quadam pecu-
 liariq; ratione uena cum arteria coit, & ambæ inuicem cōmiscuntur, corpusq; unum pyrami-
 dis anterius posteriusq; depressæ instar efformāt, cuius quidem conum uas ubi primū inuicē
 permiscuntur efficiunt, basim uerò ea sede qua elatiori testis parti cōmittuntur. Per uniuersum
 hoc corpus ramorū myriades inuicē complexi obseruātur, non quidem omnes rectā deorsum
 procedētes, sed aliq; partim rectā, partim orbiculatim, partim trāuersim, aliq; alio modo inuicē
 implicari apparēt: impossibileq; est, unam ductus seriem unum ue ordinē inibi animaduertere.
 Neq; etiam, quod alijs traditum est resectionis professoribus, hīc expēdere ualeo, quō nam pa-
 cto maiore dextri lateris quàm sinistri uasorū implexum fieri nugentur, quū mihi hac ex parte
 uasorum nullum conspiciatur discrimen, & aliundē profectò quàm à maiori illo minori ue im-
 plexu masculorum scēminarumq; pendet procreatio. Porro quum tot ramorum in membra-
 na illa quam peritonæū uasis inibi offert, quā illi fibrosis nexibus hærent, implexus fiant, cor-
 pus id nidum erucis uidelicet aut lumbricis oppletum referre uidetur, aut etiam senioris rusti-
 ci, aut baiuli suræ, temporum ue cutem uaricibus turgidam. Vtenim multifariam in illa uenæ
 inæqualiter extuberantes errabundo ductu feruntur, ita quoq; in hoc quod narramus corpo-
 re, uenæ seminalis ac arteriæ innumera soboles oberrant. Per quam raro enim accidit, uarices

Ad testem
ductus.

Vena cum ar-
teria cōmixtio
& implexus.

capreolorum uitis imaginem exprimere, sed uti dicebam hic rectā, illic transuerſim & oblique uarietq; admodū prominare. Atque ab hac ſimilitudine reor parentes illos omni laude digniſſimos, qui domi pueros ut lectione & ſcriptura, ſic etiam in cadauerum conſectionibus exercebāt, corpus hoc *lyopodolū* *lyopodolū*, quaſi uaricoſum ad teſtes aſſiſtente diceret, appellaffe. Quamquam Herophilus, Lycus, Marinus, & diſſectionis procerū primarius Galenus, etiam id nomen^p alijs parti, neque illi ſemper eidem, uti mox dicam, accommodent. Cæterum unicus mihi ex tot Galeni libris occurrit locus, ubi præſens corpus uariiformem plexum appellat, atque iſt eſt in nono de Partium uſu, quo reticularē in caluaria plexum ſuis bobus deluſus eſſingit. Vt cunque uero id corpus nuncupes,^q baſi ſua elatiori parti intimæ teſtis tunicæ, quam uerē primoq; *lyopodolū* uocatam arbitror, adnaſcit, ac multos ramulos rectā hanc tunicā perforantes elatiori quoque teſtis parti diſtribuit, multipliciter per teſtis ſubſtantiam perinde ac iecoris uenæ in ipſius ſubſtantiam diſſeminatas, & perquam tenui conſtantes tunica. Præter ramos, quos rectā corpus id teſtis ſubſtantia offert, alias per ambitum dictæ nunc tunicæ frequētes, & uenis in oculi^t tunica adhærente ſparſis, quā ſimilimas ſoboles diſſundit, à quibus denuo germina in teſtis ſubſtantia pertingunt. Hæc uenæ ac arteriæ ſeminaliū eſt ſeries, quas ſiue ita, ſiue uafa teſti ſanguinē ſpiritumq; deferentia, aut præparantia nuncupes, nihil moror, modò hæc à iam recenſendo^u uafe proſus diſtinguas. Ad externū enim uariicoſi illius corporis latus quā teſti applātatur,^u aliud corpus album & durioris nerui modò durum, intimæ teſtis tunicæ adnaſcitur, hincq; incipit. Hoc exterius quā teſti nō cōmittitur gibbum, & quodāmodo teres eſt, nam latius nōnihil quā crasſum uiſitur: qua uerò tunicæ illi connatū eſt, ſecundū conuexū teſtis id cauum^u exiſtit. Secundū hoc corpus ab externo uariicoſi corporis latere, ad ipſius poſteriorem ſedem fertur, & deorſum modicē uerſus interiora prorepens, ſecundū poſteriorem teſtis ſedē intimæ teſtis tunicæ ualidiſſimē tantisper adnaſcitur, donec ad humiliorē teſtis^u deſcenderit ſedem, à qua denuo ſurſum^u reflectitur intimæ teſtis tunicæ attenuſum, in cumbensq; quidem, at nō amplius ipſi connatū, & nō eandem formam retinens. Per totum enim ductum, quo teſtis tunicæ corpus id neſcit, propemodū æqualiter crasſum eiſdemq; figuræ eſt, quam compacto uitis, aut cucurbitæ capreolo aſſimilare queas. quanquā tamen nō in orbē, ſed uelut in latera, huius corporis reuolutiones ſiant, ad eum ſerē modū quo angues & anguillas ocyus repere cernimus. Huius namq; corporis anfractus & inuolutiones admodū inuicem cōtinuæ & connatæ cōſpiciuntur, ut & lignorū uermibus eas aſſimilare integrum ſit. Reſpōdent enim illis, & deinde etiā multum referunt cerebelli^u proceſſus, quos in ſeprimo libro à uermium imagine nomen inueniſſe dicam. Atq; hinc etiā fortaiſſ in Arabū interpretibus lumbrium nomen legitur: ita enim præſens corpus, quā teſti connaiſcitur, Arabū nōnulli uocauiſſe uidentur. nam eorum aliquis etiā^u implexum uenæ, uarietq; ſupra ſedem teſtis elatiorē, ita nuncupauere. Porro ſecundū hoc corpus quod uermi aſſimilabā, nihil proſus uariicibus, qui inæqualiter neq; eadem ſerie extuberant, accedit. Quanquā ſi bene Galeni ſententiam in libris de Semine percipiam, alibi has reuolutiones ex Herophili ſuffragio *lyopodolū* appellari uelit: alibi autem eo nomine aliā eiſus quod iam tractamus corporis^u partem, quā id peni inferitur, ita uocet: quæ uerò ea ſit, ubi corpus hoc, ſermone ad penem uſq; deduxero, audies. Ad hunc itaq; modū corpus id intimæ teſtis tunicæ cōnaiſcitur, & exterius demptis reuolutionū impreſſionibus læue eſt, intus uerò quum ab intima teſtis tunica acutiori cultello adimitur, aſperū, ſed nullis quæ oculis ſubijciuntur meatibus peruium eſt. Neque etiā aliter cauum eſſe uiſitur, nō hic ſolum quā teſtis tunicæ connaiſcitur, ſed neque quā ab illa abſcedens ſurſum fertur. Quum primum nanque ad inferiorem teſtis partem deſcendit, rectā^u ſurſum reflexum anguſtius, magisq; teres ſenſim efficitur, & non amplius inuolutum, in teretem quaſi neruum deſinit. atque id ipſi maxime^u euenit, ubi elatiorē teſtis partem ſurſum ſcandens ſuperat. Quò quum pertigerit, anteriori eiſus^u corporis, quod nos uariicoſum eſſe diximus, parti uerſus interiora innititur, & ipſi tenuis membranulæ interuentu connexum, algius tantisper procedit, donec per idem peritonæi^u foramen, quod uenam ac arteriam ſeminales tranſeunt, in peritonæi amplitudinem pertingat. In quo tranſitu corpus id non amplius anteriori uenæ arteriæq; parti^u attenditur, ſed in poſteriora reflexum, ſub illis in peritonæum tranſcendit.^u Hinc ex dextro latere (dextri enim teſtis enarationem proſequor) ad poſteriorem pubis oſſis ſedem reflectitur, & poſteriori peritonæi parti connexum, ſuper^u urinarium dextri lateris meatum ſub^u ueſica deducitur. Eodē parimino ratione à ſiniſtro teſte corpus ſimile perſertur, & ambo ſub poſteriori ueſicæ ſede ſuper^u rectum inteſtinum ad ueſicæ ceruicis initium protenſa, ſenſim mutuò^u appropinquant, & latiora craſſioraq; facta, inter ſe tandem cōeunt, unumq; corpus ſub ueſicæ ceruicis initio conſtituunt, in^u glanduloſa quæ nunc dicemus organa abſumptū. Hoc ſanè corpus à teſte ad hunc modum

Implexus uenæ ac arteriæ in teſtis ſubſtantia, uſq; proxi-mum inuolutum inferio.

Uas ſemen à teſte ad ueſicæ ceruicē deferentis hiſtorid.

p. 25 fig. mod. quæd.
p. 25 aut E. F. G. aut H. I. mod. autem f.

q. 25, 25 fig. u.
aut 25 fig. u.
D. O.
7 Seriatim id pete ex
25 fig. p. Q. R. S. T.
18 fig. cap.
14. li. 7. u.
7 dextre figure fig. 23
u. 1. 1. 2. 3. 4.
u. 2. 3. 4. 5. 6.
ad u. aut 23
fig. E. ad D.
x. 23 ſi. H. I.

22, 23 ſi. ab
u. ad 1. aut
ab E. ad F.
22, 23 fig. ab 1. ad n.

d. 11 ſi. lib. 7
C. C. et H. I.

b. 23 fig. d.
ad D. C. ab
N. ad O.

c. ſi. u. ſi.
figure 23 u.
x. 1. 2.

d. 22, 23 fig.
ab. 1. ad n.
e. 22, 23 ſi. 4.
u. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
C. D.

f. 22 ſi. 4. 5. 6.
g. ad n. 23 ſi.
figure id ſpe
clatur.

h. 23 figura d.
u. ad f.
i. 22, 23 ſi. ſu
pra dext-
rum q.

k. 22, 23 fig.
sub v.
l. 22 fig. u.
m. in ſini-
ſtra figura
23 fig. ad f.
n. 22, 23 ſi. 4.

modum ascendens, procul dubio id est quod Herophilus *σπερματικὸν πέγον* appellauit, quodque nos uas semen deferens, ad illius imitationē, aliquādo & iactatorē dicimus, nam re uera corpus hoc à testis substantia semen assumens, ad penem id deferit. Verū ut cauitas ipsius per uniuersum ductum perquam obscura est, raroque admodum sectione deprehenditur: ita quoque obscuriores meatus foraminaque sunt, quae à teste per intimā ipsius tunicā in eius corporis aut uasis semen deferentis reuolutiones pertinet. Præterea uasis huius in penem^o insertio conspectū quodammodo fugit, & coitus tantum aut excretionis seminis tempore aperitur, quod quidam Parauij dissectus facile edocuit, qui ante suspendium inuoluntario seminis fluxu laborans, hos meatus omnes apertos laxosque habuit, eos potissimum qui ex testibus in deferentis semen uasis reuolutiones pertingunt, & quibus dextrū & sinistrū deferentia semen uasa in uesicæ ceruicem terminantur. Herophilus, & ex ipsius suffragio Galenus, hic ubi dextrum uas sinistro permiscetur, amboque paulo antequam coeant latiora crassioraque reddi diximus, alijs quibuscumque reuolutionibus hæc uasa circumagi inuoluitū uidetur innuere, quū & in hac sede præsentia uasa subinde *ἡσπασμένους λεγόντων* nominat. Vasa hæc inibi nunquam nisi perque obscurē mihi inuolui uisa sunt: & si quæ sit reuolutio, ea penitus illi similis apparet, quam hæc uasa obtinent, quā primū ab intima testis tunica non amplius illi tunicæ connata abscedūt. tale enim quid canes, & magis adhuc caudati simij & tauri indicant, parum cōspicuis reuolutionibus ea sede frequenter donati. Cæterum corpus glandosum, in quod deferentia semen uasa postquam coiere inferuntur, quodque Herophilus *ἀδλωρόν ἡσπασμένον* appellat, ad humillimā uesicæ partem reponitur, mediū quodammodo inter uesicæ corpus & illius ceruicem. Est autem corpus id unicū, & subinde ipsis testibus grandius, at non ad amussim rotundū, nam antè & posterius depressum, à lateribus autem rotundum instar globi cernitur. per ipsius uerò mediū uesicæ canalis procedit, qui hic paulo quàm in reliquo progressu latior, ampliorue exilit: non tamen quod manifestè cōspici possit, à semen deferentibus uasis foratus, sed asper duntaxat ac inæqualis & rugosus: idque potissimum in posteriori ipsius sede, ubi interdum deferentium uasorum ingressum accurato studio secantes, conspici deprehendimus. Deinde uesicæ ceruix, qua per glandosum corpus fertur, distincta ab illo corpore membrana nequiquā est, nam solus glandosi corporis sinus communem hic urinæ feminique meatum conficit, per reliquum autem processum canalis ille priuatum est corpus, orbiculari musculo statim à glandoso corpore circumdatum, & dein duobus quæ penem præcipue constituunt corporibus adnatum. Quæ uerò hæc penis sint corpora, quum penis persequabar musculos, obiter cōmemorauī. ubi autem singulorum quæ iam complexus sum usus succinctè ascripsero, rursus paulo diffusius ipsorum constructionem (quod ipsorum cognitio manuali artifici, propter crebros quibus homines uexantur morbos, nimis quàm necessaria sit) recensebo. Quando itaque hæcenus enumerata diligenti sectione aggressus eris, ut singulorum usus tibi præscribatur, minime exiges, quum is attentè secantibus locupletius, ac cum maiori Naturæ admiratione occurrat, quàm quis prolixè & sedulo exprimere possit. Ex iecoris enim pulmonum lenis & renum constructione, pugnantium inter se autoritatum relicta congerie, doceberis, testium substantiam ingēnita sibi facultate, ex materia quam uenæ ac arteriæ illi deferunt, ac per totum testem (ut uenæ per iecur sanguinem) diffundunt, semen efficere: & quemadmodum iecoris caro sanguificationis opifex censetur, ita & hanc testium substantiam seminis procreatricem, paremque hic organorum ac in iecore, constructionem esse. Quemadmodum enim cibos nutritioni aptos ore assumimus, eosque uentriculo conficimus, & quod confectum est ex intestinorum anfractibus longo ductu in iecoris cauum fertur: ita quoque optimam sanguinis spirituumque portionem testium uenæ ac arteriæ perferunt. non quidem breui aliquo, aut non anfractuoso progressu, uerum longissimo, & innumeris reuolutionibus spirisque tortuosum & errantem: ut materiam testi præparatam, semini efficiendo magis opportunam communicent. neque id in unam amplam testibus incisam cauitatem, sed in tenuissima, eademque tunica subtili admodum formata uascula, per testis substantiam frequentissima serie distributa. Vt quemadmodum de iecoris carne dictum est, ita & testis substantia facultate sibi insita sanguini & spiritui suis uasculis contentis perfectam seminis naturam impertiat. Atque hæc uis in masculis roboris & uirilitalis, in feminis muliebritatis causa existit, corpusque uniuersum ita alterat, ut id quod neque mas, neque femina per se efficit, mas uel femina euadat. Rursus ut in iecore uenæ caux furculi ex portæ ramis sanguinem assuuebant, atque in illis quoque is perfectius elaborabatur: sic etiam pori meatusque innumeri, sed gracillimi, paratū à testibus semen in deferentis uasis anfractus testi connatos exporrigunt, ut hinc rursus ex utroque teste semen in eam sedem in uiris deducatur, qua commodè in uterum projici & eiaculari ualeat. Ad hanc functionem conducit, dextri testis uenam à ca-

Glandosum
corpus uasorum
semen deferentium
inferiorum
nem excipiens

Peritumque
hoc Capite de
scribitur constructio
ratiō.

Asorti testis
materiā deducunt
centum oritur
ratiō.

uæ caudice sub renum uenis enasci, quo puriorem syncerioresq; sanguinem testi offerat. Sic & utraque arterias à magna pariter oriri magnopere expedit, ut tenuioris, impetuq; ruentis sanguinis & diuinam quæ semini inest animam, spiritum uē infuscatū deducere. Quippe neminem iam esse opinor, qui in arterijs sanguinem cum Erasistrato non contineri, & feminales arterias nihil præter spiritum testibus adferre autumet, quanquam etiam & hoc Aristotelis fuerit dogma, feminales arterias sanguine uacuas esse falso docentis. Cæterum à sinistro renis uena, eius lateris testem, ipsius uenam in hoc obtinere Galenus cum alijs Anatomicis omnibus attestatur, ut hæc serosum sanguinem semini communicaret, cuius acrimonie & mordicationis ui in feminis emissionē pruritū, titillatioq; in organo multis neruis implicito, concitaretur. Eiusmodi enim hic delectationē Galenus fieri scribit, qualem ex salis mordacibusq; succis scabie laborantibus esse cognouimus, quando illi igne, aut lecti stragulis calefacti pruriunt, scalpendoq; succis illis cutem stimulantibus locum dant. Hoc Galeni decretum, & si Anatomicorum ueracem multitudinem, parum probabile ducō, quum mingētes ex tanta serosi humoris copia pruritu non afficiantur, etiam si rigido excalefactoq; pene crebro & præcipue ijs qui calculo uexantur, urinā reddi mouerimus. Quinetiā putridi seminis inuoluntario fluxu laborantes languido & flaccido pene pruritum etiam sentiunt, nulla præcedente penem excalefaciente causa. Ad hæc, qui ex ramicū uitio, aut alia occasione sinistro teste castrantur, coeunt, neque pruritu, neque uoluptate afficerentur: quod falsum esse, indies ab his quibus ramex manu curatur, audimus. Quod uero alij halituosum seminis spiritū ad delectationis causam etiam concurrere testantur, non mihi satis arridet, quum ea pungendi stimulantiq; uis spiritui inesse nequeat. Vasis uero à teste semen deferentis ad testem applantatio, nisi tenuissimis & angustis foraminulis, idq; intimæ testis tunicæ interuentu fit, quod uas id durum, ualidum, densum, iniurijsq; ferendis pertinax fieri oportuerit, testis uero substantiā laxam, mollemq; adeo ut prudens Natura hic, quemadmodum etiam nusquam, nulla essentis contraria in unum coegerit, nisi copulam aliquam amicitie societatisq; conciliatricem in medium conijciat. Quanto enim à uase semen deferente, ^bintima testis tunica densitate duritiāq; uincitur, tanto ipsa testes superat, non quidem per uniuersam circumferentiam qua testibus obducitur, sed eo tantum loco, quo uasa seminaria habet adnata, hic enim quā per reliquum corpus mollior existit, & ut dixi, tenuibus foraminibus perforata, in hoc nanq; potissimum creatur, ut testis substantiæ exquisitissimum sit inuolucrum. Vas autem deferens semen tot anfractibus, spirisq; super testem obuoluitur, ut citius & copiosius à testibus semen assumat, & aliquam quoque elaborationem in ipso semen obtineat. Posteriori uero testis sedi, non autem anteriori uas illud con nascitur, ut quum iam semen confectum porrigat, contineat ue, testis autem solum conficiat, tutori loco uas reponatur, teste propugnaculi loco utens: atq; eadem ratione quum uas peritonæum ingreditur, sub uena & arteria merito occultatur, quod semen sanguine spiritusq; ex quibus semen paratur, perfectius cōtineat. Dextrum uas cum sinistro coit, atque in uesicæ ceruicem ambo insinuantur, ut utriusque testis semen semel, eodemq; tempore in uterum projiciatur. Glandulosum uero corpus (quod caudatæ simiæ obtinent maximum, & instar nubium exterius reuolutum) urinæ, feminisq; in uesicæ ceruicæ meatum humectare certum est. Et deinde uelut meatuum quæ per ipsum à deferentibus uasis digeruntur, sicut & uenarum, & articularum, & neruorum uesicæ corpori & ceruicæ distributorum, sulcrum esse, & fortassis etiam semini quandam perfectionem indere, ad feminisq; generationem conferre uidetur. Etenim in inuoluntario seminis fluxu laborante, quem Patavij dissecuimus, corpus hoc glandosum quū diuideretur, non minus quā testes ipsos, semine oppletum conspeximus: & si uerum fateandum est, inter dissecandum in nulla penitus corporis parte, tanta feminis uis usquam, atque in his glandulis adinuenitur, quantum uis illæ à testium substantia mollicie æqualitateq; multum uariant. Cæterum de præsentī glandoso corpore Galeni demonstrationem ad calcem secundī de Semine positā admiror plurimū: qui quum hoc dissectionis imperitos ne prorsus quidem cognoscere, peritos uero uno ore omnes asserere semen illo cōtineri, dixisset, illorū opinionem improbaturus, hanc sæpius inculcatam ueramq; & irrefutabilem ab ipso habitam demonstrationem subiecit. Si in glandulosis astitibus (ut interpretis uoce, *ἡσυχίας ἀδλωδίας* ita uertentis, uoce utar) semen gigneretur (periti tamen, quibus glandulosum corpus cognitū fuit, contineri tantum dixerant) excretionem eius castrata animalia appetere, at hanc nō uidentur appetere: nullum igitur semen in his gigni perspicuum est. Profectō si Galeni libri de Demonstratione, eiusmodi crebris scatent demonstrationibus, quæ ipsi (si modò ausim proloqui) non infrequentes, ac potissimum in qua plurimum Galenus excelluit Anatome sunt, non est quod tantopere eos libros expetamus, illisq; ipsos inuideamus apud quos à tinea & blattis nullum

Vasis semē de
ferentis seruo
cluræ ratio.

a 22 fig. h.

b 22 figura
Q. R.

Glandosum cor
poris uesicæ
collo adnati
us.

c 22 fig. ad
sub d.

Galeni Ana
tomica demon
stratio, quæ
glandosum cor
pus semini pa
rando nō præ
esse cōficiunt.

nullum sui usum præbentes, deuorandi asservantur. Præter hoc enim quòd eiusmodi animalia subinde ut pueri in cassum uenere appetit, quo nam pacto quæso, etiam si tota seminis generandi uis glandosis corporibus inesset, testibus ademptis semen ea producent, quando relecti testes uasi ad glandosum corpus semen deferenti nihil exporrigent. Id enim ex sectione certo certius est, nullam omnino deferenti semen uasi cum uenis ac arterijs testium communionem esse, qua semen citra testium opus assumerent, etsi quid tale esset, quod aliquando mihi cum ple risq; Anatomes professoribus persuasissimum fuit, ut scilicet uena & arteria in deferentis semeri uasis naturâ degeneraret, ex q; uena & arteria illud cõformaretur, Galeni demonstratio duntaxat in illis animalibus locum haberet, in quibus industrius castrator testem illæsis seminarijs uasis (quod factum est impossibile) ademisset. Quantumuis enim studueris deferentis semen uasis super testem circumactus, & spiras, gyrosq; ab intima testis tunica rescindere, id non præstabis, quin uasis pars quæ testi adnascitur, aspera inæqualisq; & rala uideatur. Etsi fortè in castrando animali huius experientia studiosis intumam testis tunicæ aliqua ex parte diuideres, & tunicam ad seminaria uasa adhuc connatam relinquens, solam testis substantiam ex tunica liberares, necessariò adhuc pori meatusq; seminaliũ uasorum dirumperentur, quæ certò per testis substantiam digeri nouimus. Hoc enim gratia expendendæ Aristotelis sententiæ, quæ testibus nullant seminis generandi uim tribuit, in cane expertus sum: qui bellè quidem conualuit, sed generationi, ut reliqui quibus testes eruti sunt, ineptus esse uidetur. nam hic, ut & illi quoque, obesus admodum & ingenerosior redditus est. Verum ut reliqua taceam, mirum est Galenum nò ani maduerisse, quum huiusmodi texeret demonstrationem, ab Aristotelis sectatoribus suam demonstrationem, ut testes ad seminis generationem nihil conducere persuaderent, in hunc modum retorquere posse: Si in testibus semen gigneretur, animalia quibus uasa seminaria quæ ex peritonæo elabuntur, uinculo ita essent intercepta, aut præsecta, ut testes in scorto adhuc relinquerentur, seminis excretionem appetere. at hanc nò uidentur appetere: nullum igitur semeri in testibus gigni, est perspicuũ. Sed ut glandosum corpus si semen generaret absectis testibus suo munere, utpote deficiente materia, fungi nequiret: ita etiam testes suum nò obirent munus, quum nullus sanguis & spiritus, ipsis iam præsectis uasis, deduci possit.

DE VIRILIS MEMBRI PENISVE

structura. Caput XIII.

PENIS fabricam imprimis ostendunt figuræ capituli quadragesimi noni, libri secundi: ut & uigesima figura huius libri, & uigesima secunda, & uigesima tertia.



V A M. affabrè Natura humanum penem exstruxerit, ipsius functiones abundè documẽto sunt. Quippe hæc quum satius fore duxisset, duos qui cõmodè generationi subleruierent homines procreare, huic quidem ad suscepitonem, alteri potissimum ad seminis excretionẽ idoneas partes adaptauit. Viro igitur membrum semini in uterum fundendo aptissimum largitus est, quod concubitus tempore uarios ob usus tumidum, rigidum, & erectum prorsus esse oportuit. At si perpetuò tensum & prælõgum quoq;

seruaretur, per totam uitam præterquam congressus tempore, usui ineptum foret, ac promptè iniurijs nò secus afficeretur, quàm si quis manum semper protensam circumferret. Quum itaq; modò laxum, gracile & breue, modò uicissim tensum tumidumq; fieri debuit, laudandus uenit rerum Opifex, qui membrum his usibus idoneum cõfinxerit. Penem enim potissimum è^a duobus corporibus nullã in uniuerso corpore partem (nisi fortè papillam) sibi similem nanciscens fabricauit, quæ spiritu repleta erigi, produciq; & insigniter turgere possunt, & rursus eodem spiritu dissoluto arctari, concidere, flaccescere, breuioraq; effici. Non enim aut uenæ, aut arteriæ, aut nerui existunt: quippe uti docebitur, ex^b ossibus originem ducunt, non tendines, quum musculorum nò sint enervationes. non ut canibus & mustelis ossa, aut cartilagine censi queunt, quum laxata remissaq; instar ligamenti facile inuoluantur, implicenturq; nec etiam hæc corpora ligamẽta esse quis uerè asseret, quum sensu maximè participant, & forata, cauãq; cernantur, & etiã uelut carnea molliaq; in ipsorũ medio (uti mox audies) euadãt, sanguineq; nigro secus multo ac ligamẽta oppleãtur. Quòd uerò Galenus hæc corpora nunquã rescuerit, neq; illorum naturam perspectam habuerit, ipsius in decimo quinto de Partium usu orationis series plus satis tibi argumento erit, si modò tauri aut arietis penem uirilẽ cõtuleris, ac demũ Galeni descriptionem illorum animalium peni propinquius, quàm hominis cõuenire animaduertis,

Penis structura ratio.

Potissimã penis substantia.

Galeni humani penis fabricam nunquam secutus.

Penis situs. teris, quod tunc feceris ocyus, ubi uirilis membri fabricam subiunxero: cuius situm Galenus prolixissime & eleganter recenset, quod nimirum citra sectionem is illum non minus latuerit, quam hominis digiti, & ad inguina & poplitem inflexus, quibus locis duntaxat hominem à finia Galenus differre perspectu habuit. Atque ut situs in conspectu citra longiorem enarrationem est, ita quoque leui opera colligitur, quam is penis muneribus obeundis examulsum quadret, neq̃ aptius aliqd̃ reponi possit, ita sanè ut moles ipsius & conformatio nulli non pateant.

*Penis constructiōnem sub-
euntia.* Constructiōnem uerò ipsius subintrāt duo quæ illum præcipuè efformare docebimus corpora, meatus femini urinæq̃ communis quatuor muscoli ad penis radicem repositi, ac demum uenæ, arteriæ, nerui, cutis, & quæ huic substernitur carnosâ membrana, & uinculum cutem hanc cum carneâ membrana peni connectens. Ex dextro itaque pubis osse, ubi id crassius & quasi teres ad inferiorem commissuræ pubis ossa committentis sedem uisitur, teres quoddam corpus ualidissimè principiū ducit, ligamenti naturâ prorsus referēs, quod ab osse nōnihil sursum recedens interno latere aliud contingit corpus, similiter à sinistro pubis osse pronatum. Hæc corpora in eum modum inuicem cōmittuntur, ac si utrarumq̃ manuum indices internis partibus mutuò iungeres, unitosq̃ fingeres. Vt enim interna indicū sedes plana, nō autem gibba & teres, exterioris sedis modo est, ita etiā hæc corpora quā inuicem connascuntur plana sunt, externis autem lateribus & superiori sede teretia inuicem iunctorum digitorum instar, qui simul commissi latius quā profundius corpus ad penis modum efficiunt. Deinde ut inferior indicum, ita cōmissorum sedes modicè dehisceat, plana q̃ uisitur: sic & penis corporum inferior sedes dehisceat, ac^o uirinarium uesicæ meatum sub se ita porrectum exigit, ac si calamum quo scribitur, inferiori indicum sedi exporrigeres, & indices tibi penis corporum loco, calamus autem uirinarij meatus uice essent. Mox enim à corporum exortu ipsis uirinaris meatus seu uesicæ ceruix subtenditur, ac cum illis ad^h glandis usque initium in eum modum porrigitur, ut corporum substantiam nusquam ingrediatur: uti in glandis sede, ubi meatum in corporum substantiam duci paulo post audies. Corpora hæc in hunc modum enata, simulq̃ cōmissa seorsum singula oblongum referunt corpus, ex neruea cōtextum substantia, instar coriaceæ fistulæ, cuius interiorⁱ substantia rubra prorsus, & nigricans, & fungosa, & atro sanguine oppleta cernitur, ad eum ferè modū, ac si ex innumeris arteriarū uenarumq̃ furculis quā tenuissimis simulq̃ proximè implicatis retia quædā efformarētur, orbiculatim à neruea illa substantia tanq̃ in corio cōpræhensa. Atque hæc duo penis corpora ad glandem usque priuatim singula nerueum retinent inuolucrum, & fungosam hanc substantiā summa diligentia à naturæ operum studioso expendendam. Quum autem ad eam usque penis regionem perrepsere, in quā iam glandem efformata sunt, in acutū feruntur, & carnosâ glandis substantiā ipsi obnascitur, quæ meatum urinæ feminiq̃ communem nō subnatum duntaxat ut corpora illa exigit, uerū eum in se complectitur, meatumq̃ ambit, qui hic reliquo ipsius ductu^h ampliori efficitur: & rursus suo fine extremo ue arcatur, non secus quā si Natura in cōcubitu seminis moram, ac proinde intensiorem prurium in glande (quam affricus potissimum occasione adauxit) esse cupiuisset. Vnde etiam inuoluntario seminis fluxu laborātes, hac sede plurimum ulceribus infestantur, propter seminis in hac amplitudine asseruati acrimoniā, uirinarium meatum impense exulcerantem: qui profluentis urinæ mordacitate, dum urina redditur, in glande insigniter infestatur, non minus sanè quā rigidō pene eiusdē meatus sedes inter anum & testes, ubi perinæum nobis uocatum habetur, cōsistens, grauiter eo malo affectis cruciatur: quod imprimis meatus obliquitatis ac reflexus, & deinde decliuis etiam sedis ratione accidit. Quum enim meatus hæc primum sub penis corporibus sursum reflectitur, hæc q̃ sedes humillima est, seminis copia à quo meatus exulceratur, non minus hic quā in glande consistit, ac proinde magis quā in reliqua meatus sede erodit, & deinde erosus meatus quando unā cum pene tenditur, solutionē unitatis uehementius inibi percipit. Porroⁱ uenæ ac arteriæ ad horum penis corporū radicem accedentes, ab illis deriuantur, quæ humilioris illius diuisionis rami sunt, quam uasa os sacrum prætergressa tentare, in tertio libro prodidimus: & quanquam hæc uasa ad penis corpora pertingant, uix tamen sectione assequor, quo itinere in corporum illorum cavitatem inferantur, sanguinem illum nigricantē & crassum, quem fungosa corporū substantia plurimū possidet, deductura. Rami tamē^m cuti hæc corpora induenti, etiā ante sectionem cōspicui offeruntur, illamq̃ intercurrunt. Nerui quoq̃ huc plures ab infimis sacri ossis paribus pertingunt, secundum corporum longitudinem diffusi: ac^o duo teneus in humillima penis sede exporriguntur, unus utrinque ad meatus urinæ feminiq̃ communis latera. Quinetiam & alius subinde conspicuus est, superiori corporum sedi quæ hæc inuicem connascuntur, ^o expansus. His neruis accedunt membranea uincula, superiorem corporū sedem, quæ primum sursum ducuntur pubis ossium commissuræ

Meatus uirinae feminiq̃ communis.

Glandis.

Venæ, arteriæ & nerui.

Cutis.

d. 1, 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
ca. 2, fig. 1
ca. 19, lib. 1
ca. 2, fig. 1
ca. 19, lib. 1
ca. 2, fig. 1
ca. 19, lib. 1
ca. 2, fig. 1
ca. 19, lib. 1

g. 1, 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
g. 1, 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
g. 1, 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
g. 1, 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
g. 1, 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1

i. 1, 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
i. 1, 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
i. 1, 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
i. 1, 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
i. 1, 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1

h. 2, 3, fig. 1

i. 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
i. 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
i. 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
i. 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
i. 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1

m. 2, 3, fig. 1

n. 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
n. 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
n. 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
n. 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1
n. 2, 3, fig. 1
ca. 19, lib. 1

missuræ ad eam usq[ue] partem nec sentia, qua primū penis orbiculatim cute obtegitur.^p Muscu-
li quatuor penem adeuntes, in secundo libro descripti sunt: dum duos meatui urinæ, feminisq[ue],
& singulos singulis corporibus exporrigi recensuimus. Adeo ut nihil de penis fabrica modò
dicendum super sit: nisi quis Naturam laudare uelit, quod nullum adipem^m inter carnem mem-
branam & cutem peni obductas interiecerit, quo tenuius, & conuolui implicariq[ue] & extendi
aptius inuolucrum peni adaptaretur. Si itaq[ue] humanū penem resecueris, non unum concavum
reperies neruum, aut ligamentum à pubis ossē enatum, quemadmodum Galenus docuit, sed
duo quæ descripti corpora: quæ nō uacua & sanguine indiga, ut Galenus boum pene delusus
malè scribit, existunt, sed fungosa illa & ueluti carnea, uti Aristoteles rectè innuit, materia, &
plurimo nigricante sanguine instar farciminum implētur. Deinde ad feminis urinæq[ue] meatum
alij non exporriguntur musculi, quàm duo illi quos à recti intestini orbiculari musculo prona-
sci ostendimus. At Arabes adhuc magis admiror, qui tres in pene finxere meatus, unū quidem
urinæ dicunt, secundum feminis, tertium autem illi uiscido humori, quem ab illo glanduloso
corpore parari arbitramur, quod uesciæ ceruicis initio circumnascitur, quiq[ue] humectū penem
subinde reddit uiro impensius cōcubitum appetēte, quū interim his omnibus unus extruatur
meatus. Verum facillè existimo hanc sententiā primū ab Arabe quopiā fuisse inuēctā, qui pen-
nis sectionem aggressus, eiusq[ue] fabricam Galeni placitis non conuenire animaduertens, tres ar-
bitratus sit esse penis meatus, duo quæ dixi corpora, & meatum feminis urinæq[ue], & dicto etiam
nuper humori communem. Quandoquidem si transuersim penem resecas, neq[ue] nigricantem
qui inter secundum promanat sanguinem abstergis, profectio singula corpora singuli meatus
tibi apparēt, quibus tertius accedit qui uerè meatus est. At expresso abstergoq[ue] sanguine, fungo-
sa corporum se offert substantia, leui negotio probans corpora illa meatus non esse. Vt cūq[ue]
tamen sit, hūc Patavijs adolescens iuris studiosus, ac nobili Symionum apud Foroiulienēs fa-
milias natus, mihi familiaris est, qui in glandis apice duos obtinet meatus, unum feminis, alterum
urinæ paratū. Verū quum quæ non nisi rarissimè accidunt, hūc nequaquam recensenda du-
xerim, ea quæ præter naturam se habere comperi, nō lubens scribo. Quare etiam hermaphro-
dytorum species, quas aliquot uidī, modò non recensco, generationis non monstruose mulie-
ris organa nunc persequitur.

Lib. 15. de V.
su part.Lib. 1. de Hi-
stor. cap. 13.

DE VTERO RELIQUISQVE MULIE-

ribus generationi famulantibus organis. Caput XV.

P R A E S E N T I B V S organis ostendendis seriatim faciunt uigesima quar-

ta figura & uigesima quinta, duæq[ue] illas subsequentes, uti illarum Indices diffuse docuerunt.



N T E omnia uterum (nemox inter initia aliorum dissectionis professio-
rum dogmatum turbis obruamur) in^a fundum & ^b ceruicem seu collum
perinde ac uesciā meritò distinguimus: quandoquidē & si illis ambobus
ceruicē uidelicet & fundo uterū cōstituatur, unumq[ue] ex illis corpus con-
surgat, ea tamen situ, forma, magnitudine, constructione, substantia, ua-
sorum insertionē, & exortibus, implantationibus, ligamētis, & id genus
alijs, in uteri historia diligenter spectandis, admodum differunt. Ceruix
igitur uteri à mulieris pudendo rectā sursum sub pubis^c ossibus, & secundū^d recti intestini
ductum in peritonæi cavitatem tantisper ascendit, donec paulo demissius quàm ē directo sedis
pertingat, qua à pubis ossibus rectorum abdominis musculorum^e principia pendent. Inibi
enim^f ceruix in fundum uteri, aut fundus ipse in ceruicē definit, & rarissimè altius protenditur,
ac proinde humilior fundi pars hic habetur: superioris uerò ipsius partis, & laterum sedes pro
magnitudine ipsius uariant. Quanto enim maior magisq[ue] distentus est uterus, tanto elatius ad
umbilici regionē protenditur, atque ad ilia magis accedit. Adeo ut nullam peculiare ipsi sedem
circumscribere queam, nisi quod sub peritonæi anteriori parte elatius quàm pubis sunt ossa ple-
runq[ue] conscendat. In nullis tamen omnino mulieribus utero non gerentibus, fundus sacri ossis
^g initium infimæ lumborum uertebrae coarticulatum superat, neq[ue] in illis fundus & ceruix po-
steriori parte aliud præter rectum intestinū tangunt, uixq[ue] ipsius etiam uincunt amplitudinem,
neque elatissima fundi pars tam altè atq[ue] recti intestini^h sedes, in coli anfractus ducta proripit.
Anterior uteri pars uesciā habetⁱ prætensam, atque hac utero nō gerentibus uniuersus fundus
obtegitur, uesciā nimirum altius illo procedente. Nunquam enim in muliere uterum nō geren-
te, hunc tam altè atq[ue] uesciā uel prorsus inanitam, conscendere animaduerti, nisi fortassis ute-
rum manu apprehensum ipsius producta ceruice sursum traherem. Prout enim hanc in se laxa

V. terit in fun-
dum & cerui-
cem diuidi.V. terit stus,
partiumq[ue] uici-
narum conta-
ctus.

y tam

cauitas apparet. Sed harum sinus maioribus profundioribusq̃ rugis oppletur, illius autē pluribus quidem, at minus profundis, & uisum quodammodo propter continuitatē compressioniq̃ fugientibus, non aliter quā si exactissimē laeuis foret. Attamen præter uescicarum cauitatem humanus uterus, ut uiroꝝ sortum, leuem & perquam modicē extuberantem¹ futuram seu tenuissimā lineā instar prominēs tuberculum exigit, secundū uniuersā superficiē longitūdinem & anteriꝝ & posteriꝝ exporrectū, quasi quoddā sinistra à dextra superficiē interstitium, aut notula quēdam censenda esset. Superficies hæc fundi uteri sinus est semen genitale suscipiens, foetumq̃ cōtinens, quem nō imperitum uulgus modo, uerum & Anatomicorum sacx non unum enumerāt, sed septenario numero eum complectētes, septem matricis cellulas recensent: ac tres quidem in dextra uteri sedem asculis suscipiendis aptas enumerant, tres uerò in sinistra sceminis dicatas: septimā autē in uteri medio statuūt, illam hermaphrodytis cōsecrantes. Hæc memini me admodū puerum prima dialectices rudimēta addiscētē, in Alberti illius Magni indoctissimo, de uiroꝝ mulierumq̃ secretis libro, ac in quodā Michaelē Scoto non minus scētione eiusq̃ quam proficitur physiognomix indocto, quā barbaro legisse: & etiam apud lūreconsultos eiusmodi loculos describi, cum aliās sapius, tum maximē ab utriusq̃ iuris cōsultissimo literatissimoq̃ uiro GUILIELMO MARTINO STELLA cognato meo, ut cæterarum disciplinarū, ita quoq̃ Naturę operum mire studioso didici, quando prolixē de foetus formatione, ac quo profectum tempore perfectus is dici mereatur, & diuini Hippocratis nō firi suffragio partū septimestrem perfectum esse asserentis, colloqueremur. His accedit præter Nicolum Gentilem, & alios plerosq̃ eius cohortis homines, Mondinus, Alberti, & reuera tōcōtē illius meritiſſimus comes, qui alijs ipsius de uteri formatione commentis, à placitis scholasticorum theologorum (quibus frequentior de genitalibus & semine quā medicis disputatio est, quosq̃ quum generationis organa in scholis ostendimus frequētissimos habemus spectatores) declinare ueritus, septem sinibus uterum distinctū esse adiecit. Quos quibusdam imaginatos fuisse, non fat uisum est, nisi rursus septem illos sinus scrobēs ue, seu fossulas decem rugosos inflexus obtinere astruerēt, ut scrobiculi septē, rugę uerò septuaginta essent. Atq̃ hinc totidem fetus simul concipi posse pleriq̃ autumant: parū per louem in hominū, multo etiā minus in brutorū, quæ plures fetus plerūq̃ simul utero gerunt, dissectione uersati. Vnica enim duntaxat in uteri fundo est cauitas, latior quidem & altior quā profundior, cuiusmodi etiam uteri fundi formā esse retulimus.¹ Cauitas hæc seu sinus, in humilima sede iuxta fundi foramen, pro illius foraminis amplitudine angustior est, deinde secundū uteri formā sursum dilatatus, in elatiori sua sede uelut in duos cessat angulos, ad elatioris uteri partis latera cōscendētes, quæ uelut duos obtusiores efformare docuimus² angulos.³ Media enim sedes elatioris sinus partis non tam altē atq̃ latera ipsius cōscendunt, uteri substantia deorsum hīc quasi septum aliquod, in suam amplitudinē spectante. Hunc sinum in non prægnantibus talem semper adinueni, ut plurimum uiscido quodā & subalbo muco illitum, & læuem quidem, uti dicebā antea, & inconspicua propemodum futura, seu extuberantiori lineā interfunctum. In angulis illis aut in superioribus ipsius apicibus rugosiores, ac omnino illi⁴ cauitati similem deprehendi, in quam deferentia semen uasa in uiris inseruntur. Nullus enim hic in inuolutario seminis fluxu, seu albis, ut uocamus, menstruis non laborantibus, manifestus occurrit meatus: quemadmodū neq̃ in uiro aliquis conspicitur, nisi ex⁵ uasē semen deferente stylum acutiorē secundū uasis insertionem ui intrudamus, atq̃ secus quā secundū naturam habet meatū dilatemus, etiam si uaccis interim leui negotio stylus ex uteri amplitudine deferentis semen uasē indatur. Quinetiā non prægnantibus in sinum hunc nunquam arterias aut uenas prominere obseruauī, eorū capitulorū instar extuberantes, ex quibus sanguis ē uenis ad anum pertinentibus in hæmorrhoidum uitio effluxurus est. Nec sinus quoq̃ aliquos in nō prægnantis uteri sinu intuius sum, illis similes quos in sepiarum & loliginum & loliorum promulcidibus cernimus: qui eiusmodi sinus sunt, ac si ceræ medias pilas impressiles, uti caprarum & uacarum Galeni ostendunt uteri, quemadmodum in Capite quod priuatim acetabulis dedicabitur, diffusius ostendā. Ad hæc, uenam aut arteriam quoq̃ non extuberantem, sed nullo penitus pacto uisui sese offerentem in hoc, ut neq̃ in uentriculi aut intestinorū cauitates terminare, in non prægnantium mulierum uteris cōspexi: imò fundi sinus cōtinuo colore inter rubrum ac pallidum medio peruisus spectatur. Hæc quidem interne fundi superficiē sinus ue, cuius tractatio ad uteri formā spectat, est descriptio.⁶ Interna autē ceruicis uteri superficies magna ex parte uaria est. quū cōniet enim, neq̃ aliās distenditur, undecunq̃ rugosa implicitaq̃ est, ac in se cōcidit: si uerò admodū distenditur, exactē læuis & lubrica secundū uniuersam ipsius longitudinē, præterquam ad eam partem, qua in pudendum terminatur, apparere potest. Hic namq̃ perpetuò præter laxos implexus⁷ cuticulares illas

Interna ceruicis
superficies
eiusmodi

carunculas tuberculaq; non æqualiter omnibus mulieribus propendula adipsic, quæ *vuyq; lū*
 Græci uocāt. Ad hæc, in anteriori ceruicis sede paulo supra pudendū, ubi uelicæ collū ipsi¹ inse-
 ritur, nō ad amussim æqualis est. Nā utrinq; ad infertionis latera, tenuis uteri ceruicis portū cu-
 la excrefcit, in ipsius amplitudinē propēdens, ac illis mēbraneis processibus forma perq; similis,
 quos urinæ in urinarios meatus ē uelica, & bilis ex duodeno in deferentē illā meatū, regreſſum
 prepedire inuimus. Haud ſecus quā ſi uteri ceruix urinā admittit, penduli uerō proceſſus
 urinā aut aliā materiā in uelicæ collū regurgitare prohiberēt. Præterea uteri ceruicis amplitudo
 toto ipſius ductu nō anguſtatur, & eiuldē est amplitudinis² quā fundo cōtinuatur (ſi modō am-
 plior diſtēdiq; aptior inibi nō ſit) ac³ quā in pudendū ceſſat. Verū in huius amplitudinis finē
 ſeu elatiōrē ſedem, fundi⁴ orificium prominēt, nuſquā ceruicis latera ſuo mucrone cōtingens,
 neq; propter ceruicis cōtractionem aut diſtentionē mobile. Porrigitur enim ex humillima fun-
 di ſede in hanc ceruicis regionē, uteri ſubſtātia obtuſioris in pene glandis modō, cui tranſuerſa
 ſciſſura ſeu foramen ineſt, quod uteri aut fundi ipſius os uocari ſoliti⁵ eſt; quemadmodū mulie-
 bre⁶ pudendum, ceruicis uteri os nuncupamus. Verum ut hoc nō diſtentū alioquin ſecundū
 corporis rectitudinē ductæ ſectionis modō cōniet, ita quoq; illud tranſuerſa, at non perpetuō
 æquali. Prægnātibus enim rugoſa eſt admodū, & perquā anguſta, ut ſpecillum niſi ualidius
 impulſum uix admittat. Quæ nuper pepererūt, ampliorem hanc ſciſſionē, minusq; cōtractam
 rugoſam⁷ ue poſſident: nō prægnātes autem, medio habent modō. Quod uerō, quoties fundi
 orificiū diſtenditur ac dehileſcit, ut & ceruicis orificiū, orbiculare fiat, manifeſtū eſſe, etiam ſi nō
 dicatur, arbitror. Aperitur autē in coitu nō ſemper quidem, ſed quū uirile ſemen appetēs, id nā
 naturali motu fugendo allicit, & quando uterus non concepturus, uirile ſemen unā cum muliebri
 ſemine iterū eructat, aut in pollutione, uel affricū muliebri duntaxat ſemen excernit. Nequaquā
 enim diſtenta uteri ceruice, ſimul quoq; id perpetuō recluditur. haud enim decuiſſet inſatiatæ
 mulieris arbitrio, etiā poſt cōceptum uenerē procaciter nimium deſideraturæ, orificium illud
 ſubijci. Vt interim præterea quāta ſucceſſionis ſpeciei noxa, mulieres ſubinde geniturā præter
 ſententiā non reſeruarēt: quantaq; licētia nullo habito cōceptionis metu, maritis parentibusq;
 imponerent, ſi modō fundi orificio Natura muſculos arbitrarj motus opifices elargita fuiſſet,
 idq; ita ac ceruicis uteri fundi orificium ſemper aperiri potuiſſet. Quā ineptē uerō & falſo ple-
 riq; fundi orificiū penem in coitu excipere, illumq; in uteri ſinum inferi ſcripſerint, præter alia,
 corporis quoq; reſectio luculentiffimē teſtatur. Porro in partu quū toto tempore quo uterum
 geſſit mulier, ad amuſſim contractū ocluſumq; fuerit, adeo aperiri, extendi, remittiq;, ut ſœtus
 hæc procidat, ſcimus quidē, & audiētes ſtupēſcimus: at Naturæ miraculū nimis quā legniter
 admiramur, ſummi rerum Opificis providentiā hymnis parum celebrātes. Ad uteri quoq;
 formam ipſius cornua ſpectare uidentur, quæ Herophilus in mulieribus opportuniffimē iam
 naſcentibus boum cornibus aſſimilauit. Quemadmodum enim uitulorum capita utrinq; quā
 pronāſcentur cornua, extuberant: ita etiam ſuperior uteri pars, quam quartæ circuli parti com-
 parauimus, utrobq; ueluti in duos obtuſos deſinit angulos, qui re uera ueteribus Anatomicis
 hominū cadauera ſecantibus cornuū uice habebātur, ualorumq; ſemen muliebri deſerentiū
 infertionem excipiunt. Neq; hīc quenquam Galeni ſtudioſum (uti ſanē omnes qui Medicinæ
 nomen dedimus oportet eſſe ſtudioſiſſimos) mihi ob pleraq; illius dogmata obſtrepere uelim,
 atq; alias uteri partes requirere, quas cornu accuratius aſſimilari cupiat, priuſquā ſedulō Galeni
 loca in libris de Partium uſu, de Semine, de Vteri reſectione, expenderit, atq; uaccinū uterum
 muliebri, ac demum Galeni ſcripta ambobus uteris cōtulerit: ut tandem doceatur, Galenū, ne
 per ſomniū quidem muliebrem uterum unquam inſpexiſſe, ut uaccinū duntaxat, & caprinum
 & ouillum. inſuper ipſum in libris de Partium uſu aliorum Anatomicorū placitis nixū eſſe, ac
 proinde uterū illic uerius (quamuis interim obiter) deſcripſiſſe. in libro autē de Vteri reſectione
 humano capiti equinā ceruicem adieciſſe, atq; ex uaccino utero & muliebri chimeram texuiſſe,
 quum uaccini uteri deſcriptionem cum aliorum diſſectionis profeſſorū ſcriptis permixcet. Si
 itaq; quis naturæ operū ſtudioſior, Græcorū impoſturas uidendi cupidus hæc diligētē præ-
 ſtiterit, uaccini uteri cornua ad eum modum habere ſpectabit, ac ſi dextrum finiſtrumq; de-
 piti arietis cornua radicibus, ac internis lateribus linteo ſimul cōmitteret, ac cornuū radices uac-
 cino utero, quā is ipſius ceruici cōtinuatur, aſſimilaret, cornuū uerō apices uteri apicibus con-
 ferret. Hæc proſectio diſſuſius explicatiūſq; proſequerer, niſi cuius promptum eſſet macellum
 adire, uaccinumq; uteri ſitum, formā, magnitudinē, aliāq; in partiū fabrica ad amuſſim contem-
 planda, intueri: aut ſi grauius ſit parumq; deceat macellū accedere, ſeu omnino eſt iubere uac-
 cinum uterū adferri, ut tanti autoris ſenſa intelligātur, ac muliebri utero caſu oblato, obſeruet,
 quā cōcinne Galenus caprinū uaccinumq; uterum, non autē humanū depinxerit, ac demum

*Fundi uteri ori-
 ficium cuiuſq;
 modi.*

*Vteri cor-
 nuū.*

*Galenū huma-
 nū uterū nun-
 quam inſpexiſ-
 ſe.*

*025 fi. 226
 fi. uelica ei
 nam cuiuſq;
 ſuis ceruicis
 aperta ſpe-
 ctatur. dem
 27 fi. l.
 p 23 fig. v.
 dem 15 fi. R
 aut 13 d.
 q 27 fig. v.
 K, K.
 r 27 fig. ad
 crinam ſe-
 dem.
 126 fig. C
 dem D.
 25 fig. u.*

*u 25 fi. k.
 x 25 fig. u.*

*y 25 fi. fi.
 guram. m-
 ſice.*

expen

expendatur quæ ratione tot cōtrouersie inter præcipuos uiros fuerint cōcitata, quod cuius animalis partem describerent, non expresserint, ipsi quæ arbitrati sint hominis membra illorum animalium membris conuenire, quæ illi potissimum sectioni accommodare solent. Atque si quis hæc attente examinauerit, facile diiudicabit, quoties oratio alioquin satis prolixa mihi interturbanda esset, si perpetuo quædā à Galeni placitis studio & sciens declino, adherere, aut etiā rationem semper cur id faciā addere, ipsius loca simul prolixè adscribēs. Sint itaque muliebris uteri cornua dicta iam antea obtusi anguli, caprini uerò & uaccini & ouilli uterorū cornua apices illi arietū cornibus undecunquē simillimi: aut non apices solū, sed fundi uteri in illis animalibus tota pars, quam geminā esse, etsi longo interuallo connexa inuicē sit. postea dicā. Quandoquidē Galenus alibi etiā totas eas partes cornua nuncupauit, quum ex quorundā etiā ueterū sententia in cornibus fœtus cōplecti docet: quod nō ita inepte de illis animalibus prolatum est. quemadmodū multo adhuc rectius de canibus & fuis, qui uterum statim à fundi ipsius orificio, ita in duas partes diremptum gerunt, ac si in indicē à medio maximè diduceres, illosque digitos uteri partes esse fingeres, quæ in nō prægnantibus rectā quodāmodo ducuntur, & in apicē mucronem uel senili nō secus desinunt, quā si recta, nō autē obliquata essent cornua: in utero autē gerentibus quasi arietis cornuū modō, & hæc quoque inflectuntur. Porro ne latius expatiatur oratio, eorum animalū uteris neglectis, nunc muliebris uteri magnitudinē aggrediamur, quam modō antea in situs uteri descriptione utrunquē expressimus, neque fundi quoque moles magis quā uentriculi aptè describi potest, ut qui pro cōtenti fœtus seminis uel quantitate distēdatur, cōtrahaturque. Præterea idem quoque de ceruice censendum est, quæ modō uariè cōplexa rugosaque conuict, modō in coitu (quāuis non semper æquè promptè) pro penis, in partu autē pro fœtus mole, distenditur. Et quemadmodū latitudo ceruicis eadem nō est, ita quoque neque longitudo. nam nobis uterum inter dissecandū attollentibus, in miram longitudinem ceruix porrigitur, adeo ut non minus ridiculum sit, uteri ceruicis longitudinē uel latitudinē, quā penis describere: quanquā is minus adhuc quantitate quā illa differat. Quinctiā uteri ceruix pro mulieris libidine turgidior, angustiorque & directior (præterque quod alijs natura sit strictior) efficitur. ac proinde etiā haud miror omnes quodam digitorum numero eius longitudinē describere aggressos, inter se pugnare, & hunc à pudendo ad fundi sinum undecim, illum duodecim, istum plures, aliū pauciores digitos enumerare, & quod omnium absurdissimū est, parem cum nō prægnantibus fundi longitudinē atque ceruicis statuere. Præterea uterus in eum modum à peritonæo ligatus pēdet, ut ipsius fundus sursum & deorsum plus minus in coitu sese ducere, ac ad penis lummū tanquā animal quoddā, ut & Plato dicebat, dehiscere possit. Quanquā interim uetulis, & his quæ sæpius pepererunt, aut rudius ab obstetricibus in secundarū euulsione fuerūt tractatæ, fundi os in pudendū quasi depēdeat, ac proinde breuissima implexaque in illis ceruix uideat, quā inter secandū sursum tractā, aut aliās in uiuentibus intrō protrusam, insigniter producere integrū est. Quod autē puellis uteri fundus minor sit, quā illis quæ iam diu coiere, aut aliquando uterū gessere, etiā alijs prodium est Anatomicis: quanquā in his omnibus testium ferè modō ita fundus uariet, ut nullā ipsius molem, quemadmodū neque uelut etiā, priuatim circūscribere queam. Vigesima septima tamen præsentis libri figura, eam uteri magnitudinem exprimit, quæ frequēter in non prægnantibus, & præcipuè in huius anni cōsectione Patauij occurrit. Fundus enim multo minor est, quā dissectionum rudis sibi facillè persuaderet. Quod uerò Anatomes professoribus, etiā menstruæ purgationis occasione, fundi uteri magnitudinis differētia ponatur, legi quidē, quando uterū sanguine turgente, & paulo post menstrui sanguinē repurgaturū, grandiorē illo esse docēt, qui nuper uniuersum sanguinē, quem mensis interuallo asseruari sensim arbitramur, excreuit. Verū hac ex parte nunquā mihi se obtulit uteri differentia, & de sanguinis illius collectione purgationeque suo loco ad præsentis Capituli finem quædā subijciā. In uteri etiā substantia, non minus quā in describenda ipsius magnitudine, dissectionis professores grauiter dissentiunt, atque adhuc multo magis in ipsius tunicarū numero, & deinde in uenarū arteriarū & neruorū uteri ortu & implexu. Mihi (ne illorū falsis ac imaginatione plerunquē cōiectis dogmatibus enarrādis prolixè hæreā) nō prægnantiū fundi substantia cōspicitur neruca, membraneæ uel, sed crassa admodum, compactaque, neque nimis dura, & nō ad amissim, ut cætera quæ generatim neruosa dicuntur, candicās, sed carneū aliquid præ se ferēs. Quod autē in præsentia neruosa substantiā, non quæ frequēter cerebri aut spinalis medullæ neruis intertextitur uocē, sed eam neruorum materiā, quæ ligamētis, tendinibus, ac illis qui propriè nerui nuncupantur substantia (quanquā non uirtuti) respondet, neminē ambigere reor. Hæc uteri substantia, æqualis duritia, continuaque passim est, nisi fortassis ad fundi foramen paulo durior collectiorque euadat. In exteriorē huius substantiæ superficiē, uenæ obscuræ, gracilesque, sed admodū frequētes integro adhuc utero excurrere uident, quæ inter internā & externāque uteri tunicā porrigitur. Sūt enim duæ uteri

In lib. de Sectione uteri.

Muliebris uteri magnitudo.

Uteri fundi substantia.

Uteri tunicæ.

tunicæ, exterior una quam à peritonæo, ut & uesica ipsa cæteraq; quæ illo ambiuntur, insigniter ualidam ac crassam obtinet. Hæc principiū ducit à "membranis" uasa uterū accedētia continētibus, uterūq; peritonæo cōmittētibus. À peritonæo enim quæ uasa ipsi cōnascunt, quæ à maxima uasorū¹ distributione supra sacros os facta, uersus crura tendunt, ipsius peritonæi partes processus ue nascūtur, illis membranīs substantia formæq; similimi, quæ mesenterii efformat. Sunt enim hi processus instar duarū tenuium membranarū in ipsarum medio uenas & arterias deducentiū, & multo adipe oppletarū. Atq; tales membranæ à peritonæo utrinq; procedūt, quæ toti ceruicis & fundi uteri lateribus ad eum modū cōmittunt, quo cauæ intestinorū Anatomicis uocatæ parti mesenterii² applātari docuimus: & quemadmodū mesenterii intestinis tertiā obducit tunicā, ita etiā hæc peritonæi mēbranæ utrobicq; uterū accedētes, in secundā ipsius degenerant tunicā, longē crassiorē³ ea quam mesenterii intestinis offert. quod scilicet quatuor peritonæi portiones, utrinq; nimirū duæ, eam efforment, quum intestinorū tertiā tunicā duæ tantū membranæ constituant, ueluti & in canibus & suibus accidere uidemus, quibus⁴ ambæ uteri partes instar intestini sunt, singulæq; suo duntaxat latere ad peritonæum in lumborū regione colligant: quū unicū & simplex muliebris uterus utrobicq; peritonæo connectat. Porro præsentis tunicæ crassities ob hoc duntaxat nō tanta est, quod tot peritonæi partibus cōstituatur, sed quia hæc in cōtracto, neq; grauidō utero impense collecta compressa est, uti & modō de interna dicturus sum.⁵ Interna fundi uteri tunica ipsi peculiaris ac propria est, neq; à peritonæo pender, & quæ prius narrata est uteri substantiā constituit. Hæc tunica in non prægnati utero (quem donec aliud subiūxero, subaudiri uelim) crassitie omnes reliquorū corporis organorū tunicas, ut tres⁶ uentriculi & intestinorū simul etiā implexas, uincit. Ipsa tamen omni ex parte non pariter crassa uisitur. Vbi enim fundi efformat⁷ orificiū, crassissima est, & paulo quā alibi compactior: deinde etiā in⁸ media sede superioris fundi partis crassa quoq; est admodū, & ut in sinus uteri enarratione dicebā, in ipsum quasi sinum extuberans. Cæterum quā uterus in obitos⁹ angulos desinit, semēq; deferentia uasa excipit, hæc tunica tenuior, minusq; secantibus spissa, quā in reliqua parte occurrit. In lateribus autem & anteriori & posteriori sede pariter crassa uisitur, adeoq; compacta, ut nihil præter ipsius substantiam citra fibrarū quibus abundat distinctionē, ut eunq; eam disseces, intueri liceat: facileq; hallucinari illos intelligas, qui hanc uteri tunicā geminā esse uolunt, in dextris quidem unā, in sinistris uerō alterā, quasi utriusq; manus cōcaua simul ex opposito iungeres, ac singulas manus singulas esse tunicas fingeres. Ad eō enim Galeni locus in libro de Vteri sectione ualuit, ut in dissectione peritiores, eum legentes, utriq; dein constructionem inquirentes, suoq; sensu derogantes, illum geminum, etsi non sit, descripserint, quod profecto nō accidisset, si¹⁰ uaccinum caprinū ue uterū diuisissent, quem inibi, non uerō muliebrē, Galenus describit. Si enim exquisitē uaccinum aggrediaris, & partem ipsius quæ ab uteri ceruice ad eam usque sedem habetur, quæ is primū in arietis cornua duci conspicitur, tunica¹¹ liberaueris, quæ à peritonæo e ducta toti huic uteri parti communis, simplexq; existit, mox interna uteri tunica in cōspectu erit, non unica quidem, ut exterior, sed gemina, utriusq; scilicet uteri partis una peculiaris. quippe tunica exteriori ablata, uaccini uteri pars, quæ prius unica cernitur, ita gemina est, ac si indicē cum medio simul iunctum conspiceres: aut ut de cornibus arietis dicebam, duorū cornuū radices internis lateribus inuicem committeres. Neq; solum id Galeni nomine in uaccino utero expendendū uenit, uerū etiam externam utrorumq; fundi uteri partium communem tunicam ab interna, quæ singulis uteri partibus peculiaris est, adimens accuratē, obseruabis non oclitanter spectandum uenarum arteriarumq; implexum, inter internam externamq; tunicas consistentem: sed adeo internæ connexionem, ut eius connexus gratia internam uteri tunicam Galenus uenosam (uti sanē est) appellandam duxerit. Verū interim muliebris uterus¹² substantia adeo compacta constat, ut uix uenæ capillorum modo tenues appareant, neque interna tunica non prægnantibus uenis cōspicius intertexta cernitur. At de uteri uenis & arterijs paulo post agetur, & nunc internæ tunicæ quæ in muliebris uteri fundo simplex, uti diximus, est, fibræ explicandæ ueniūt. Triplici namq; fibrarum genere intertextitur, ac rectas quidē intimas exigit, sed eas nō ita numerosas. Extimas habet orbiculares, transuersas ue, rectorum copiam ut eunq; uincētes. At medias, quæ obliquæ sunt, possidet plurimas, easdēq; robustissimas. Atq; hæc omnes in his quæ utero aliquandiu gesserunt, non secus quā in uesica flatibus turgida cernuntur, in hisq; omnia iam emutātur. Venæ etenim ac¹³ arteriæ uterū adeuntes magnæ admodū & cōspiciuæ sunt, ac interior uteri tunica tanto tenuior rariorq;, & magis neruea uisitur, quanto magis uterus ipse in magnitudinem promouit. Neque amplius exanguis aut nullis consta uenis apparet, uerū magnæ frequentesq; uenæ eam intertextunt, ad internam ipsius superficiem usque ad¹⁴ secundas uidelicet, admodū dilucidē procedentes: ac deniq; (ut semel dicam) in utero gerētibus omnia à nō prægnan-

Libro de V-
teri sectione.

Interioris ut-
eri uenis
uisc.
nodi.

Interioris ut-
eri uenis
uisc.
nodi.

b 24 fig. O.
P. Q. c. 26
fig. E. E. 27
31.

25 fig. n. n.
7.

h ult. fig. li.
36.

124 fig. F.
G.

m Specta-
tur id m 10
figura.

n 9 fig. h. h.
educunt L.

o 28 fig. F.
G. atq; ita
que hic de-
scribitur, il-
linc ex chd
radicem or-
dice petes,
quem ad no-
dum c. 26

29 fig.
p 27 fig. E.
E. E.

q 17 fig.
r 9 fig.

s 27 fig. G.
26 C. D.

t 27 fig. F.
u 25 fig. h.

29 fig.

29 fig. a
D ad E.

29 fig. F.
F ad G.

29 fig.

29 fig. a
D ad E.

29 fig. F.
F ad G.

29 fig.

29 fig. a
D ad E.

29 fig. F.
F ad G.

29 fig.

29 fig. a
D ad E.

29 fig. F.
F ad G.

29 fig.

29 fig. a
D ad E.

29 fig. F.
F ad G.

29 fig.

29 fig. a
D ad E.

29 fig. F.
F ad G.

29 fig.

29 fig. a
D ad E.

29 fig. F.
F ad G.

29 fig.

29 fig. a
D ad E.

29 fig. F.
F ad G.

29 fig.

29 fig. a
D ad E.

29 fig. F.
F ad G.

29 fig.

29 fig. a
D ad E.

29 fig. F.
F ad G.

29 fig.

gnantibus plus minus emutatur. Ceuicis porro uteri substantia aliquid comune cum uirili pe-
ne Natura elargitur, eam dico qua duo penis corpora & glandem præcipue formari diximus.
Quemadmodum enim illa inuolucro inter neruū carnemq; substantia medio conformantur,
quā alia fungosa spogiosaq; oppletā esse diximus substantia, sic quoq; & ceruix uteri carnea ner-
ueq; constituit tunica, cuiusmodi etiā substantia fungosa nō nihil possidēte. Atq; huius substan-
tiæ beneficio uteri ceruix penis modo muliere uenerē appetēte extuberat, pudendiq; ipsius col-
liculi (quas & alas alij uocant) ac cuticulares illius caruncule extrā prominent, ceruicisq; ampli-
tudo penē amplexura, arctatur, & quod ad rectā uirilis seminis eiaculationē sat est dirigitur.
Atq; hoc parū ceteri animaduertērūt Anatomici, ceruicē uteri multis & orbicularibus muscu-
lis intertextā, non aliter ac¹ uesicæ sit ceruix, fingētes. Quod & si in plerisq; mulieribus concubi-
tus delectationē fortassis auget, & ille cōstringentiū arctantiūq; medicaminū uim nostris offi-
cinis relinquerent, nimis tamen uoluntariā uim Natura genitalibus in didisset, & nescio quo
pacto penem plus satis uteri ceruicis arbitrio subiecisset. At nō præterierunt Anatomici, cerui-
cem in puellarietate delicatiorē molliorēq; esse: contrā in prouectioribus, & ijs quæ fre-
quentius pepererunt, callosiorem temporis successu reddi, ut etiam cartilagini asperæq; arteriæ
illam in uetulis subinde assimilent. crebro enim congregientium attritu, partiumq; exeuntium
collisione ceruix occalescit: & frequenti astringentium lotionē, assiduq; mensium fluxu, haud
secus indurecunt, quā ob continuum acremq; humorem defluentem ulcera ad fistulas per-
mutari consueuerūt. Venæ & arteriæ ceruici insertæ non prægnantibus manifestiores mihi
semper uisæ sunt, quā fundi, at diuersum utero gerentibus accidere certum est. Vteri autē ue-
narum arteriarumq; seriem unā cum seminalium uasorum constructione iam opportunē subri-
ciam, ut deinde uteri connexu quoq; sermoni addito, uniuerſa ipsius fabrica absoluat. Mu-
lierum² testes uteri accumbunt lateribus, non prægnantibus quidem paulo elatiūſ quā fun-
di superior pars consistit, utero autem gerentibus eandem certē sedem occupant. at quo magis
uterus extenditur, eo inferiūſ quā ipsius summum habetur, ad latera illius³ accumbere appa-
rent. Innituntur plexus peritonæo ea parte, qua ilium ossa sacro committuntur, omnino laxi,
neq; aliter quā seminalium uasorum beneficio peritonæo connexi. Hi uirorum testibus mi-
nores multo sunt, forma autem oblongiores, & secundū latitudinem minus rotundi, & qua-
si latiores quā spissiores effici deberent, anteriūſ posteriusq; depressi. Externa superficies inæ-
qualis, ac haud secus quā mulieris eadēq; exiguæ unā colligarentur glandule, multis in qua-
libus tuberculis oppleta uidetur. Substantia quippe non constant, ut uirorum testes, molli, ac
innato sibi humido læui, continua & æquali: uerū duriori, mēlenterijq; ac⁴ inferioris omenti
membrane glandoso corpori non absimili, & præter exiguos uenarum ac arteriarum in ip-
sa consistentes plexus, sinuosa cauaq;. Habent enim mulierū testes intus præter uasa sinus quos-
dam tenui aqueoq; humore plenos, qui prius non læso teste, sed ui compresso, ac inflatæ uesicæ
modo crepante, in miram altitudinem inter disseccandum non secus quā ex scaturigine qua-
piam exilire solet. At huiusmodi sinibus nulla peculiaris est forma: inæqualis enim, ut exterior
ipſorū testiuū superficies sunt, & nō unus, sed plures, neq; illi semper ijdem uisuntur. Hæc testiuū
substantia mēbraneo inuolucro undiq; circūdatur, quod ipsi ualidiſſimē adnascitur. Atq;
hoc quidem durum est: sed tenuē & longē⁵ illi inuolucro quod uirorum testes proximē ambit,
duritia & crassitie cedens: neq; adeo promptē à testium substantia inter disseccandum separabi-
le, & sui testis substantiæ magis participans. Præfens inuolucrum mulieribus eundem quem
uiris usum præstat. seminarijs enim uasis excipiendis aptum est, testium⁶ que continet substan-
tiam. Præter hanc tunicam mulierum testes nullum exigunt inuolucrū, nisi quod in ambitu
peritonæi membranei processus seminaria uasa continentes, & uespertilionū alis longē simili
mi, testium mediā duntaxat partem integunt, non autem ut⁷ exterior uirilis testis tunica, pro-
fus induunt. Seminaria uasa mulieribus similiter ac uiris⁸ duæ sunt arteriæ, & totidem uenæ,
parem omnino cum uirorum uasis ortum sortitæ, at progressu distributionisq; serie differen-
tes. Dextra enim uena ac arteria, quemadmodū & alterius lateris uasa, à primo ipsarum ortu
dextrorūſ peritonæo, ut in uiris, firmatq; ad sui lateris testem descendunt, ac cum primū arte-
ria uenæ⁹ cōmittitur, ambe inuicem, ut uirorū¹⁰ uasa postq; aliquouſq; è magna peritonæi ampli-
tudine exciderūt, implicari inuoluiq; incipiunt: non quidē uniuerſum ipſorū corpus in implica-
tionē absumētes, uerū¹¹ mediā sui partē uena ac arteria in superiorē sui lateris fundi partē deri-
uant, multiplici sobole in ueri fundum excurrentē. Quod uerō ex implicationis initio reliquū
est, paulatim magis magisq;, ut in uiris, inuolui, uaricosūq; illud corpus efformatur, sua ba-
si elatiori testis parti adnatū, & similiter atq; in¹² uiris ramiōſ in testis substantiā, & illū ambiens
in uolucrū diffundēs. Deinde uas semē deferēs secundū testis corpus, ut in¹³ uiris habet: quanq;
magis testi orbiculatū, q̄ in posteriori solū sede aduolui. Ab interna enim sede basis uaricosi

*Ceruicis uteri
substantia.*

*Mulieris cer-
uicis cuiusmodi.*

*Testium inuo-
lucra.*

*Seminaria uas-
a mulieribus
cuiusmodi.*

corporis¹ incipiēs,² externo testis lateri,³ et⁴ deinde inferiori ipsius parti⁵ et nōnihil interno quoq⁶ lateri adnascitur, haudquaq⁷ tot in uoluntatibus, quā testi adnascitur, ac uirile uas donatū. Por⁸ tō et teste nōnihil sursum ascendens, et⁹ testi nō amplius¹⁰ adnatū, reuolutiones eas infat uermis aequaliter procedentes amittit, ac teres planumq¹¹ infat nerui in uterū errabundo duci fertur, in mediā¹² cornu dextri sedem infertū. His organis per me quidem licebit quēuis nomina impo¹³ nere; ego autem quoniā uirorū organis forma substantiaq¹⁴ correspondent, eadē nomina illis, quāe his indere inter ostendendū soleo, cum Aristotele, nam semen hāc quoq¹⁵ organa, ut in uiris, nū uerō duntaxat ad uoluptatē quandam preparent humore, non admodū contentens.

Vteri uenæ
ac arteriæ.

Porro hæc uafa pinguibus, quæ inter difficandum omnia obliterare solent, membranâs pe-
ritonæo natis suffulta tutò porriguntur. Cæterû præter nuper cõmemoratas uteri^æ uenas & ar-
terias quæ à feminalibus uafis principiû duxerant, aliæ multo insigniores à caua & arteria ma-
gna post illarû supra sacri ossis initiû diuisionẽ accedunt. Postq̃ enim ea uafa primû in duo
insignes truncos diuiduntur, & hi rursus singuli in duos insignes, sed amplitudine impares ra-
mos dissecti sunt, unû quidẽ qui maior est, ac per inguina crus accedit, alterû uerò humiliorem
minoremq̃, cuius^æ finis per pubis ossis^æ foramen elabi, uteri uenæ ac arteriæ oriuntur, à mino-
ribus humilioribusq̃ secundæ illius diuisionis ramis pronatæ. Rami itaq̃ in dextero consistẽtes
(ut qui in sinistro sunt quoq̃) insignẽ porrigunt propaginẽ: uenæ quidẽ uenâ, arteria autẽ arte-
riam: quæ simul accumbentes, dextrû uteri latus propter fundi orificiû accedunt, ubi in multas
scissâs lobulos, quasdâ fursum in humiliore fundi sedem exporrigunt, quasdâ per uteri ceruicem
deorsum digerunt, nōnullas etiâ uesicæ impartientes. Quæ uteri fundû accedunt, nō pregnan-
tibus quodammodo graciliores & pauciores apparent, q̃ quæ ceruicis & potissimum iuxta fundi
os implicantur. Neq̃ ut quispiâ arbitretur ab his uterû accedentibus uafis, uenæ & arteriæ
originẽ ducit, quæ secundò rectos abdominis musculos fursum ferunt, illisq̃ uafis quæ ad pe-
ctoris ossis posteriõrẽ exporriguntur sedẽ, cõmunes sũt, nam hæc ortû sumunt à præcipuis ua-
fis per inguina in crus deductis, à quibus etiâ furculi pronascunt, muliebri pudendum collo-
culosq̃ ipsius accedentes. Vnâ cum præsentibus uteri uenis ac arterijs ab ossis sacri neruorû pa-
ribus utrinq̃ etiâ nerui deducunt, tenuibus furculis potissimû in uteri ceruicẽ, & circa humilio-
rẽ fundi sedẽ excurrentes, ramosq̃ etiâ uesicę promittens. Ad elatiorẽ porrò fundi regionẽ fubin-
dè neruuli perq̃ graciles diffundunt, à sexti neruorû cerebri paris ramis deducti, qui costarû ra-

Quibus parti-
bus uterus ad-
nascitur, et
quas solum
tangit.

Vteri mu-
sculi.

cibus exporrigunt. Verum ut hi nervuli prætenuēs albicātesq̃ sunt, & pinguib⁹ mēbris
 suffulcuntur, ita quoq̃ inter difsecandū difficulter occurrunt. Atq̃ ideo nunc propemodū ma-
 nifestū ē arbitror, quas partes uter⁹ tangat solū, ac quibus alligetur & adnascatur. Anterior
 enim posteriorq̃ & superior fundi uter⁹ regiones nullis quas contingunt partibus adnascitur.
 latera uerò cōnascuntur, ⁊ membranīs uasā uterō deducētib⁹, & uterū peritonæo ualidē col-
 ligantib⁹, exterioremq̃ uterī tunicā producentib⁹, ac demū carneis illis fibrīs intertextis,
 quē duos efformant musculos, quorū beneficio uterus uoluntario motu nō nihil fursum, dum
 mulieres ilia trahunt & quasi colligunt, allicitur, quicq̃ adeo oblique prœpente, & quā uterum
 accedunt, adeo crassescunt, ut perperā uterī cornua illos musculos esse aliquādo arbitrat⁹ fue-
 rim, quod scilicet obtusos muliebris uterī angulos cornuū imaginī nō accedere uidebā. neq̃ ar-
 bitrarē mihi uacā aut caprā, ut Galeni Anatomicorū primarij sensū intelligerē, secandā. Cer-
 uix porro uterū ex laterib⁹ mēbris quoq̃ & uasis ipsi exporrectis adnascit⁹, & illorū interuē-
 tu peritonæo (sed quemadmodū & uterus, laxē) cōnectitur. Posteriori parte per mediā longitu-
 dinem, qua fundo propinquior est, ⁊ recto intestino ita innititur, ut accubentes inuicē inteli-
 gunt⁹ gyros mucuō allo cari cernimus. Verū ad ceruicis in pudenda finem, illa podici firmis-
 simē cōnascitur, perinde ac si recto intestino & ipsi cōmunis esset tunica, quemadmodū stoma-
 cho & asperæ arteriæ cōmune tunica esse nō dubitamus. Rursus ceruix anteriori sede elatius
 quidem ad fundi orificiū innitēte duntaxat habet uesicā, sed paulo inferius fibrīs quibusdā hu-
 millimā uesicæ partē & ipsius ceruicē adnatā possidet. Vbi autē hæc illi inferiē, uelut cōmune
 utriusq̃ corpus & tunica efficitur. Cæterū in fine quā ceruix in pudendū desinit, cōmune utri-
 usq̃, ceruicis scilicet & cutis, ut in labris & podice, corpus constituit. Hęc cutis præterq̃ quod
 pilosa euadat, ipsi duriculosa, quemadmodū & in mēto, subfrenarum pinguēdo, in uetulis (etiā
 si illis ceruix occalluerit) unā cū mamillis flaccelcens, neq̃ ita bellē pudendū colliculos alās ue-

Prominula
in cervicis ori
ficio caruncu
la.

in iunioribus sustinet. A quā hęc citra mortuorū sectionē conspicua sint, enarratione neutiq;
indigent: quemadmodū neq; illi primi in pudendo implexus, & utrinq; una¹ prominēs cuticu-
laris cuticula, longa quidē, sed tenuis, & ex longa basi in mucrone definitēs. Has *rugulis* Grecis
uocari inuimus, quicquid præcisionē plus q̃p quis arbitraretur cruentam, & cicatricē perinde
ac reliqua huius fedis ulcera difficulter suscipiēte, docuerūt: quod hæ coriacea quodāmodo
caruncula in nōnullis mulieribus ad tantā molē augeant, ut pudorē deformitatemq; inducant,
&

& multis nationibus quoque insignis impudicitiae argumento sunt; imò à uestimentis iugiter attrita, ad libidinē irritant, & Veneris ardorē suscitant. Vnde etiā Aegyptijs præcipue uilum est, ut anteaquam carunculae illae extuberent, tunc potissimum amputentur, quum proximè uirgines nupturae sunt. Porro quis harum præcipuus usus sit, suo ordine iam audies. Vterus concipiendo semini idoneus, & foetum tantisper complexurus, dum perficeretur, ac alius quàm sanguine nutrirī posset, in humillima trunci corporis sede locatus est, quae ad concubium seminisque susceptionem, & adhuc ad concepti foetus augmentum, perfecti que partum, nulla aptior excogitari posset. Haec siquidem longè à facie & nobilissima rationis arce situatur: deinde ossa nulla, quo minus in miram amplitudinem distendi uterus queat, inibi præpediunt, atque etiā ipsi parituro hinc ad inferiora & uersus crura exitus facilis est. Forma autem uteri fundo cōuenit rotundae proxima, quo reddatur capacior, iniurijsque minus sit obnoxius. Dein fundus unicus simplexque est, quod unicum foetum amplecti debeat: attamen latior uisitur quàm spissior, quod interdum & gemellos concipiat. Non enim geminus cernitur, & intestini instar oblongus, qualis cani & sui, & illis denique animalibus obigit, quae plures simul foetus semper propemodum enituntur. Paruus autem, ac magis quàm facile crederetur contractus in non praegnantibus uidetur, ut quàm minimum alia tunc comprimeret organa, & sinum ipsius adeo angustum redderet, ut quæ proximè uniuerfam genituram amplecti queat, eam nulla ex parte à se intactā relinqueret. Ac proinde commoda quoque ipsius functioni constat substantia, quae affatim scilicet contrahi colligi quæ nihil complectitur possit, & rursus secundum contenti augmentū sensim in miram amplitudinē distendi. Atque haec non imbecillis distendit ue citra diuulsione inepta uisitur, at ualida & iniurijs ferendis pertinax, fibrisque non infirmis, neque ipsi ut fors fert intertexta. Verum rectas habet intimas, quod ante omnia semen allicere debeat: & easdem possidet paucas, quod ocyus semen illi ex temperamento ad iustitiā placēs, ac fluidum aptoque membro porrectum, in illum labatur. Obliquas autē plurimas, easdemque rectis ordine succedentes possidet, quod conceptū diutissime retinendū sit. Transuersas uerò extimas nanciscitur, quod illas uterus tum primū maximè requirit, quando foetum diu fatis amplexū in lucem est editurus. Quod unica eademque crassa contentus fuerit peculiari tunica, neque duas cum uentriculo, carnosam uidelicet unā, & neruosam alterā obtinuerit, hinc factū nemo addubitat, quod continere tantū uterus amplectique debeat, non autē uentriculi modo præter hæc aliud quicquam à proprio nutrimento concoquere & elaborare. Peritonaeū illi ualidā exporrigit tunicam, propriæ ipsius tunicae inuolucrū, & tutissimū propugnaculū futurā. Haec externa superficie leuis aqueoque humore oblita est, aliarū partium modo quae inuicē tangere quidem, non autē cōnasci satius fuit. Si enim uteri fundus non praegnantibus incubenti illi uescit, & quod illi subiacet recto intestino cōnascere, neque laxis illis, sed duris uinculis quibus accubitis partibus alligaretur, quis inficias ibit, uterū cōmodè tunc unā cū foetu non posse distendi, aut etiā in congressu aut partu deorsum uelut animal quoddā reperire. Rursus si utero gerentibus, is omnibus quas tunc contingit partibus connatis hæreret, quo nam pacto obsecro semen denuo amplexurus in se concideret, debitamque angustiam efformaret: & quum minimè opus est, intestinorum functioni non semper obesset. Orificium fundi tale est, quod semper conuiuet, nisi quum naturali instinctu semen admittere, aut foetui, aut mensibus iter præbere debet. meritò enim ex mulieris arbitrio, uti & antea dicebam, ipsius apertio oclusioque haudquaquam pendet. Quod uerò crassiori & densiori, ac idcirco glandis modo in ceruicis amplitudinem protuberante substantia, quàm reliquum fundi corpus constet, nemo ambigere potest, id ob hoc maximè factum, ut in partu satis distendatur, neque in mira illa amplitudine lacerari diuellī ue periclitaretur. Atque insigni prouidentia in uteri ceruicis substantia efformanda Naturā uti, quis ignorat: qui eam ut dirigat, distenditque ad seminis susceptionē faciliè posset, & rursus ne uterus refrigeraretur, locusque seu amplitudo frustra inanis seruaretur, colligi & conuolutum ocludi queat, extructam conspicit: Dein de ceruicem substantia ad ueneris prurium apta constare diximus. Ut uerò ipsius conuolutio & inflexus, ne uterus frigore afficiatur, plurimum auxilij præstat: ita quoque conuiuentes pendendi colles, & illae cuticulares carunculae, ceruicis opplentes initium, eidem usui accommodè censentur. Vasorum seminalium in mulieribus ortus & ductus, ipsaque testium substantia & conformatio, mulieres semen habere mihi utcumque persuadent: uerum id humidius frigidiusque uirili semine esse, indubitatum est, quod testes ipsi & minores sint, & mediam duntaxat arteriae uenaeque seminalium portionem afficiant: dein quod præter sectionem, quae semen muliebrem ostendit, mulierem frigidiorē esse constet. Neque etiam frequens scortorum concubitus argumentum est, mulieri plus seminis, aut illius humoris quem libidinis nomine Aristoteles mulieri datum scribit, quàm uiro adesse, quum id non ex concubitus, sed ex seminis humoris ue illius eiectionis

Vteri officii, ipsiusque confortationis ratio. Sicut ratio.

Formae.

Magnitudinis.

Substantiae.

Superficie, & recessus ratio.

Orificij fundi ratio.

Vteri ceruicis ratio.

Seminalium uasorum et testium ratio.

Figura A, B, C.

tionis frequentia & copia (quibus illa à uiris longè uincitur) meriendum sit. Porro muliebriū uasorum & testium functionē ac usum, ea quæ de uiri seminarijs organis prodidimus, satis cōmonstrant. Sic quoq; ut uterus, & potissimum ipsius ceruix exacto sensu donaretur, nervos illis frequentes insertos fuisse, quē nunc obtinent sensus liquidō attestatur. Caterum uenis quas in fundum uteri & ceruicē pertinere diximus, uterum, & quando concepit mulier ipsę que fundū peculiāres sunt, fœtum quoq; enutrirī: arterias uerō communi, quod illæ reliquę præstant corpori officio fungi certum est, ipsaq; sectio in utero gerentibus, id nō minus iucundissimē q̃ luculentissimē attestatur. Et mulierum menstruas purgationes ex uterum quoq; petentibus uenis euacuari indubitatum est: at quo modo id fiat, & per quas potissimum uenas, fundi scilicet, an ceruicis ille sanguis profluat, fortassis si diligens Naturæ operum fueris admirator, neq; in alio iuraueris uerba magistri, & tu quoq; nō mecum modō, uerū etiam cum eruditissimis uiris IOACHIMO ROELANTS primario apud Mechliniensis medico, nostraq; Brabantie singulari ornamento, ac VITO TRITONIO ATHESINO, studiorum mihi dulcissimo comite, qui hac de re non semel mecum tum propter alias occasiones, tum maximē propter Hippocratis Aphorismum sexagesimum libri quinti, & Galeni in eundem commentarium literis egerūt, ambigas. Non sanē quod quis menstruus sit sanguis, & quæ ipsius natura, & quantus, & quā ratione in muliere abundet, & qui fœtū nutriet, quamq; falsa de ipsius prauitate & grauelentia Plinius, & cum alijs plerisq; Albertus ille scripserint, nos lateat. Neq; (et si quibusdam secus uisum sit) dubitamus, pariter sanguinem illum in fundi sinum toto mensis intervallo sensim minimē coaceruari, ac mensis periodo turgente iā utero promanare. Hoc enim si accideret, sanguis menstruus neuiquam tenuis, fluidus, ac illi perquam similis esset qui ē naribus guttatim distillat: à quo mēstruus neq; manandi forma, neq; alijs omnibus differt, nisi fortassis plerūq; tenuior & aquosior, alia uē eiūsmodi qualitate præditus occurrat. Qui si in utero seruaretur, quis ignorare posset, illum concretū & frustulatum educendū: ut taceam fundi orificium tum nisi purgatis mētribus nō posse in congressu recludi, alioquin quando mulier iniret, ac fundi ore semen acciperet, aut id os semē emitteret, etiam sanguini mēstruo uia pateret, isq; proflueret. Quin & magnam huius rei coniecturā dant mulieres quædam, nuper à partu neq; fluidum neq; tenuem sanguinem emittentes, uerū magna cōcreti sanguinis cum seroso quopiam humore frusta, perinde ac si sanguinem in uene sectione extractum, atq; in uitrum aliquot horis collectum in partes cultro diuideres, ac illum tunc in terram abijceres. Eius namq; formæ illis mulieribus sanguinem profluere aliquando conspexi, haud aliter q̃ si aperta adhuc in uteri fundum pertinentes uenæ, quæ secundinis innascebantur, in uteri sinum sanguinem effunderent: & is ita concretus, non autem stillatim, ut aliās solet, ex pueris manaret, adeo ut facile in fundi cavitatem sanis mulieribus sanguinē mēstruum nequaquā sensim asseruari, certō possimus colligere, & arbitrari ut in fœtum dissectione intuemur, uenas ad fundum ceruicemq; pertinentes, quā suis suffulciuntur membranīs, sanguinem hunc paulatim acerare, ac turgētes illum singulis mētribus apertis ipsarum ofculis emittere. Quod ex mulierum quidem sectione mihi uisum esse affirmare nequeo: uerū quod in quodam hæmorrhoidum uitio laborāte nō illubenter expendi, id mihi certissimō in uenis illum sanguinem, non autem in fundi amplitudine asseruari argumēto est. Hic namq; ordinatis uicibus, ut mulieres suis mētribus, ex uenis in se dem pertinentibus, sanguinis crassioris fluxu uexari consueuerat: & quū ex nigro arquato iecorisq; mira duritie perijisset, num portæ ramī, an cauæ hunc sanguinē euacuarent indagaturus, illum dissecui, atq; uenæ portæ ramū sub coli intestini fine, & tota recti longitudine in mesenterio ductū pollicis ferē crassituē æquare, & sanguine illo crassiori luto soq; turgere animaduerti, cauæ uenæ ramis huc pertinentibus nihil prorsus immutatis, adeo ut perq; stupidus censeret, si posthac ambigerem, num ex portæ ramis, an caug, melan cholicus sanguis ex sede frequētius promanaret: & nō certissimō mihi persuaderē, uenas has nimīū oppletas, quū iam sensim sanguinē illum admiserint, apertis ipsarū oris eructare. Atq; ita in mulieribus fieri arbitror, an tamē ex fundi uenis, an uerō ex ceruicis semper, aut modō ex his, modō ex illis mēses defluat, ignorare me, neq; quicq; certi quod mihi omni ex parte sanū esse uidetur, posse affirmare fateor. Hactenus enim nondum mulierem non prægnantē, quæ uenarū crassitie ab alijs differret inueni, quanq; tamē diuerso modo affectas pleraq; uiderim. Lutetię enim in publica sectione præstanti forma & floridæ ætatis meretricē suspenso necatam primū secui. Pataniq; quoq; altera obtigit, quæ sibi laqueo mortē intulerat. Deinde monachi cuiusdam diuo Antonio hic sacri elegās scortum repente uelut ex uteri strāgulatu, aut attonito morbo, mortuū, Pataniq; studiosi ex monumento ereptū ad publicam sectionē attulere, mira industria cadauer uniuersa cute liberātes, ne à monacho dignosceretur, qui id ē monumēto ereptū cum scortiparentibus apud urbis præfectum

*Nervorum
ac uenarū ratio.*

*Mēstruas pur
gationes unde
fluant.*

*if. ca. 3. lib.
d. 4. c. 1. au
hic 12. si. n.
h. fig. cap. 1.
lib. 3. 4.*

fectum conquerebatur. Præter hoc superiori anno mulierculâ utcunq; senē, & fame (uti conij-
cio) in ea annonę penuria enecatâ, pari ratione subductam in scholis adepti sumus. Quę autem
postremò nobis obigit, & qua in uigesima quarta & uigesima septima figuris exprimēdis uisū
mus, suspendij metu se grauidâ falsò finxerat. Verum Prætoris iussu ab obstetricibus (quę illâ
minimè grauidâ affirmabant) interrogata, nunq; quantum à menstruis purgationibus abesset,
utcunq; id sedulo nos resciscendum ab ea curauimus, indicare uoluit. Verum huic, & quas non
prægnantes uidi, omnibus uenæ pari se habebāt modo: neq; uel imaginari licebat, quò nam pa-
cto in uteri fundum sanguinē per crassam collectamq; adeò uteri substantiâ ducere possint, præ-
cipuè quum in his uenæ capillorū modo essent tenues, uisumq; quodammodo effugerent. Quæ
autem ad ceruicem & infimam uteri fundi sedem tendebant, apparuere crassiores, & facilius ex
his menses defluere expurgari ue posse uidebatur. Haud secus quàm si sectio ex uenis ceruicem
implicantibus menstruum sanguinem semper excerni, propemodum suaderet.

DE UTERI ACETABVLIS. Caput XVI.



ET ERVM dissectionis professorum de uteri acetabulis dissensio ad
nos quoq; manauit. Grauius etenim in scholis contenditur, quidnam
uteri sint acetabula: qua etiam de re tantisper dubitauī, donec in oue, quæ
non ita diu utero gesserat, quid uerè uteri acetabula sint, inspexissem. Hæc
enim altero ipsius uteri sinu semen receperat, qui dissectus asperâ inæqua-
lemq; ostendit superficiem, multis^a sinibus oppletam, qui tales prorsus e-
rant, ac si mediam pisæ partem singulis sinibus quis nō secus impressisset,
quàm si in ceram eiusmodi sinus pisæ quapiam moliretur. Quando itaq; sinus illos intuerer, ac
Galenilocī ad finem libri de Vteri refectione non inmemor essem, quo acetabula sinui foliorū
herbæ assimilant, quam Græci ab acetabuli, seu potius heminae forma κοτυλοειδές, & à cymbali i-
magine κυμβαλίου & κυμβαλίου uocant: nos autē acetabulum, & Veneris hortum, seu umbilicū
nuncupamus, promptè collegi, hos uteri sinus κοτυλοειδές Græcis, nobis autē acetabula primū
fuisse ad eū modū nuncupata, quo altius incisus ossium sinibus acetabuli nomen accommoda-
mus. Si enim coxendicis^b acetabulum intuius fueris, illudq; ad hos uteri sinus contuleris, nul-
lis reperies corporis partes æquē ex merito ab imagine nomen obtinuisse, atq; acetabulum id
coxendicis ossis, à quo iam paulo antè femur resectum sit, & hos uteri sinus. Vt enim coxendi-
cis sinus ita ac si medius globus ipsi impressus esset, cauus cernitur, sic etiā & hi uteri sinus infi-
nuantur: deinde ut coxendicis acetabuli^c supercilia extra reliquam ossis superficiē prominent,
ita etiam in uteri amplitudinem suorum sinuū supercilia procerius quàm reliqua uteri superfi-
cies in ipsius cavitatem extuberant. Ad hæc, ut coxendicis ossis acetabulum mucoso humore
oppletur, ita sanè & uteri sinus mucoso sanguine mihi conspiciebātur infartū: à quo iam in non
nullis sinibus teres & insigniter mucosum uasculū uidebat pronatū, ad eū prorsus modū quo
teres ligamentū ex coxendicis acetabulo in femoris caput inserit. Quum itaq; hos ouilli uteri si-
nus inspexissem, unde uteri acetabulorū nomē primū sit institutū, nequaquē hesi. Vt autē quò nā
pacto illa procrearentur cognoscere, non prægnantis ouis uterū mox aperui, & uteri amplitu-
dinem multo aliter q̃ muliebris uteri asperâ inæqualemq; adinueni. Per uniuersam enim superfi-
ciem^d subflaua uisebant tubercula, & semiglobuli, tales omnino ac si dimidiatas pisas uteri mu-
liebris amplitudini passim quis agglutinasset. Atq; hīc primū discere coepi, quid Anatomes
professores uellent, qui acetabula uteri extumescensibus in ano uenarū capitibus cōparant, ex
quibus iam paulo post sanguis melan cholicus est profluxurus. Si enim non prægnantem uac-
cæ uterum secueris, illo quauis ratione aperto, nihil eiusmodi prominētib; capitulis erit mani-
festius: nihilq; addubitabis, illa acetabulorum loco plerisq; Anatomicis habita fuisse. non for-
tassis quod illa ueris acetabulis assimilarent, uerūq; acetabula uteri esse arbitarentur, sed quod
ex uteri sectione didicissent, uenas ac arterias inter internā externamq; uteri tunicas admodum
multiplici & implexa prorsus serie in uaccis distributas, suis sinibus in hæc capitula per uniuersam
uteri amplitudinem extuberantia pertinere, ac demum cōcepto iam semine illa aperiri, se-
menq; amplecti, & uasa quædam educere, quæ à uenis & arterijs in capitula pertinentibus pro-
nata, ad seminis usq; superficiem infererentur, illiq; implicita^e secundinam seu tunicā fortis exte-
riorem efficiere. Præterea ubi sedulo in nō prægnanti uacca hæc tubercula expendis, & rur-
sus in illa quæ nuper cōcepit, sinus illos quos tubercula sese aperientia efformant didiceris, ac
pariter obseruaueris in uacca quæ paulo diutius cōcepit, qui sinus illi obliuerentur, & disten-
to iam utero prorsus uisum fugiant, ac uasa tantum appareant: ex sinuum loco ab uteri tunica
ad secundinam porrecta, etiam faciliè ratio cinaberis, quid medici indicauerint, qui acetabula

Quid uerè u-
teri sint acetabula,
ex quæ
primū ita si-
erint nuncu-
pata.

Quæ secundā
acetabula a ue-
teribus fue-
rint appella-
ta.

Ad quæ uerè
acetabuli no-
men fuerit de-
ductum.

a Hos sinus
speculabis in
oue, aut ea
pra. aut uac-
cæ quæ non
ita pridem
concepit.

b 1. 2. fi. ca.
29 lib. 1. g.
c. f.

c 1. 2. fi. ca.
29 lib. 1. 11.

d 2. fig. cap.
49 lib. 2. P.

e Et hæc
quoque ex
uaccæ uter-
o petenda
ueniunt.

f Specta D.
Fig. 19.

g 1. ta. figu-
ra 30 F.

Aphorif. 45.

uocare neque sinus illos, neque tubera, uerum uasa ex utero in secundam pertinentia. Ea enim Hippocrates tum alias, tum maxime in quinto Aphorismorum libro, acetabuli nomine intellexisse uidetur, appellationem hinc fortassis sumens, quod haec uasa ab illis uteri sinibus, quae primum acetabula uocari inuimus, porrigantur. Atque hinc liquet, unde tot in Naturae operum descriptione exurgant contrariae prorsus autorum sententiae, quod scilicet Galeno dissectionis studiosorum facile praecipuo nimium in humani corporis fabricae cognitione credamus, & ipsi nostris manibus dissectionem non aggrediamur: aut si id tentemus, ab illis casu abstineamus animalibus, ex quibus Galeni dogmata expendere liceret. Frustra enim in muliebris uteri^b amplitudine tubercula illa quae subflaua & dimidiatae pisae simillima esse diximus, indagabis: quum illa his penitus non donetur, uti neque a fine uterus. Si tamen uaccinum uterum ex macello tibi curaueris adferri, nihil his tuberibus (quouis etiam pacto uterum aperias) promptius occurret. Insuper in muliere quae non ita pridem concepit, incassum sinus illos quos coxendicis acetabulo conferebam, inquires: quod non solum hinc conijcio, quia non praegnantem mulierum uteri illis tuberibus prorsus expertes sunt, sed & quod refectione id in muliere fuisse a marito interfecta didicerim, cuius uteri interior superficies, & uasorum iam in semen pronascentium series nihil a canini & suilli uteri forma discrepabat, quam in foetis canibus indices conspice re licet. Porro quum in mulieribus ab utero in secundam uasa pertingere cernamus, illud acetabuli nomen illis propter Hippocratem ascribi poterit, quod ultimo recensiebam, quum uasa quaedam ab utero in secundam pertinentia, acetabuli nomine quibusdam comprehensa attestaret. At iam opportunum erit secundae & reliquorum foetus inuolucrorum naturam, & foetus formationem sermone quoad licebit uerissimè pertractare, & dein mamillarum quoque historiam hoc libro persequi.

DE INVOLUCRIS FOETVM IN VTERO regentibus. Caput XVII.

FOETVS inuolucra utcumque quatuor tabellis trigesima figura exprimere conati sumus.

Quae in tra-
datione de fo-
etum formati-
one in contro-
uersiam uen-
te soleant.



VVM praesente libro etiam organa generationi subministrantia propter sedis uiciniam describere proposuerimus, conduxerit hic quoque de foetu, & potissimum de ipsum inuoluentibus tunicis, quaedam subijcere. Quandoquidem diffusum de foetus formatione sermonem instituerè, prolixum esset negotij, & ut uerum fatear, hic mihi aliorum autoritatibus duntaxat insistendum esset, & tandem uix mihi ipsi probabilia, non absque frequentibus controuersijs, adducerem. Nam & si quaedam ex foetuum & praegnantium uterorum dissectione didicerim, & in scholis nonnulla demonstrare soleam, id tantummodo ex brutis, neque id ea qua oporteret diligentia habeo, praegnantem namque mulieres mihi ad dissectionem paucissimae hactenus obtigere. Quum itaque adhuc permulta ex frequenti ac sedula sectione me adepturum non diffidam, modò in dissertationum Oceanum me haudquaquam conijciam, praeter caetera disputaturus, num muliebri semen ad generationem aliquid praestet, mulieres etenim semen perinde ac uiros habere, muliebrium organorum fabrica superius edocuit. Dein num semen effectiuum simul & materiale principium foetui offerat, tantum effectiuum. Rursus si semen effectiuum principij tantum autor sit, quorsum id euanescat: & si materiale etiam principium sit, quas partes efformet, num scilicet eas quas solidas semper spermaticasque nuncupamus. Item quid primum generetur, omnia ne simul, an iecur, cor, & cerebrum prius simulque: an cor prius, aut iecur prius, & quo nam tempore singula in foetuum formatione fiant: praeter eius generis quaestionum quamplurimas, uix paginis aliquot enumerandas, in quibus omnibus fere Galenum ab Aristotele medici iuxta ac philosophi dissentire arbitrantur, hi quidem Aristotelis placita, illi uero Galeni mordicus defendentes: sed per loue omnes sectione postposita, friuolis quibusdam rationibus, & autoritatum congerie duntaxat innixi. Quum interim sectio hic pleraque luculentissime ostendat, quam si ita in mulieribus atque in brutis aggressus fuisset, & in his disceptationes me quoque iniiciens (uti aliquando quum quid ex citius repperer, facturus sum) aliquot chartas absumerem, & ostenderem pariter quam belle Galenus qui alios de sectionis negligentia increpat, sibi passim consentiat: & quam fuitiles rationes & a ueritate prorsus alienas in Aristotelem nimis profecto sophistice contextit, autumans neminem post illum sectiones aggressurum, suasque imposturas deprehensurum. Quanquam Aristotelis sententiam undique ueram esse, non annum, nihilominus tamen medicos expen-

dere

dere uelim diligentius Galeni nimium omnibus concessum placitum, quo præter simplicem carnem pinguedinemque corporis nostri, omnia semine constare docet: ossa uidelicet, cartilagine, membranas, ligamenta, uenas, arterias, nervos, tendines, musculorum fibras, cerebrum, & si quid aliud in corpore præter pinguedinem & carnem habeatur. Hoc enim ubi sedulo medici affectu omni remoto indagauerint, uiderintque, dein quæ Galenus ad^a secundi foetus inuolucris constitutionem, muliebrem semen non sufficiente uirili requirat. At præsens sermo quantumuis ipse renitatur, in alium locum suppressendus est, & ut mihi à principio institutum fuit, foetum inuoluentes tunicæ ueniunt pertractandæ, quas num rite Galenus & in libris de Partium usu, & libris de Semine & foetus formatione descripserit, aut uiderit etiã, ipse tecum ubi eas tute in homine, aut sue, canē uel obseruaueris, expendito. Quum enim Galenus canis & suis inuolucra hominis respondere docuerit, tantisper dum mulier sese offerat, in canem effecta aut sue foetum inuolucra non oscitanter inuestigare erit operæ precium, ut deinde hæc mea Galeni locis conferens animaduertas, num uel canis inuolucra is recte descripserit: ut etiam tunc perspectum habes, quousque ueram humani foetus fabricam Galenus recensere poterit. ^b Primum itaque foetus inuolucrum, quod & extimum mihi nominabitur, foetum uniuersum non eo modo obuoluit, quo nucleum à suo putamine obduci integri que cernimus, aut quo reliqua duo inuolucra foetum ambire mox audies, imò foetum duntaxat circulo uasa contingentium modo cingit. Haudquaquam enim superiorem, uti neque etiam inferiorem foetus partem contingit, sed tantum ita se habet, ac si quis à mucronata pectoris ossis cartilagine ad latissimam usque ilium ossium sedem fascia impense laxa cingeretur. Inuolucrum enim huius latitudo ex foetus proportionem tanta duntaxat est, quanta longitudo à foetus ilium ossium elasticissima sede ad mucronatam usque cartilaginem pertingeret: aut ut expressius dicam, inuolucrilatitudo non multum excedit cubiti cum extrema manu longitudinem: tantum abest, ut inuolucrum id foetum uesicæ alicuius, aut ipsius uteri modo amplexaretur. Porro inuolucrum ipsius latitudo tanta est, quanta summa interioris uteri superficiei extensio. inuolucrum enim hoc externa superficie utero undique contiguum est, & adnascitur quoque. Dein exacte constitit ad foetus mediam regionem, si modo mihi foetum ita iacentem subaudis, quemadmodum conuolutus implexus que in utero (aliter ac uulgo persuasum habet) secantibus occurrit. Porro ipsius crassities nequaquam membranæ modo tenuis est, sed quum foetus ab utero paulo post resoluendus est, utri inuolucrorum crassitiem longè superat, & pollicis etiam crassitiem facile æquat. Deinde substantia non constituitur membranæ, uerum peculiari, & cui in uniuerso corpore alteram non reperiis similem, nisi fortassis illam fungosæ penis, aut propinquius adhuc lienis substantiæ assimilare uelles. Est enim huius inuolucris substantia, lienis quasi modo nigricans, friabilis, fungosa, & frequentissima uasorum serie implicita. Quippe omnes uenæ & item arteriæ ab utero foetum percurrentes, in hoc inuolucrum duntaxat pertingunt, neque undique in foetus ambitu in aliquod uniuersum foetum inuoluens inuolucrum finiunt, sed in hoc duntaxat quod iam describere (utinam tam feliciter, atque præsens in sectione ostendere possem) conor. Vasa itaque uterum implicantia suis osculis in hoc inuolucrum, quod lato crassoque circulo non inopportune contuleris, pertingunt aperiunturque, & ex singulis uasorum oris noua procreantur uasa tot numero, quot uasorum ora inuolucrum id contingunt, atque à uenarum quidam oris uenæ procreantur, ab arteriarum autem arteriæ: quæ per huius inuolucris substantiam uariè admodum implicatæ, tandem inuicem colliguntur, uenæ quidem in uenas, arteriæ autem in arterias, & tantisper grandiores rami ita collecti in maiores adhuc coeunt, donec omnes uenæ in duos colligantur uenarum caudices, & arteriæ item in duos arteriarum caudices: qui ut uenarum caudices duo inuolucra, quæ uniuersum foetum ambire mox dicā, penetrantes in umbilicum pertingunt, sanguinem & uitalem spiritum foetui in eum prorsus modum deducentes, quo reliquæ corporis uenæ & arteriæ ipsas quas perreptant partibus suam quam continent materiam digerunt. Hoc itaque extimū foetus inuolucrum aliud nihil est, quæ plexus quidam & textum, in quod uasa uteri pertingunt implicanturque, ob hoc potissimum, ne totidem uasa foetum subiret, quot ab utero in inuolucrum hoc pertingunt, sed ut huius inuolucris beneficio collecta in pauca redigerentur uasa: quæ per foetus umbilicum ducta, unica tantum sede eademque tuta foetum perforant. ^b Exterior igitur præsentis inuolucris superficies uniuersa uteri internæ superficiei adnascitur, proximaque est: interior autem ipsius superficiei adhuc pertinaciùs obnascitur secundo foetus inuolucro, quod iam aggrediar: simulatque indicauero per melicere, ut huic extimo inuolucro ex tuo arbitrato nomen imponas, memor Galenum reliquosque dissectionis professores extimum inuolucrum *περιον*, uti & Latinos secundas, seu secundinā, alij et loculos appellare. & quum forte idem cum Galeno illi nomen impones, expende an is id rite descripserit: quod tum feceris

Lib. 2. de Semine.

In lib. de Foetus for.

Primitiæ ex simili foetus inuolucrum.

a 1 tab. fig. 10 G. G. 2 tab. L. L. 1. 4. tab. O. P.

b 1 tab. fig. 10 P. 2 tab. K. 3. 4. tab. L. Q.

c 3 fig. cap. 49 li. 2 E. d 19 fl. 1. K. e 25 fl. 1. 2.

f 1 tab. fig. 30 S.

g Hæc petes ex 1 tabella 30 figuræ, ne etiam ex aliquis.

Secundum me-
dum ue fetus
inuolucrum.

opportune, quum animaduertis id neutiquam membranā esse, sed potius lienis suo nigricante sanguine admodum turgidi substantiam: & non toti uteri superficiē adnasci, sed duntaxat tantæ superficiē uteri parti, quanta est ipsius inuolucri exterior superficies. ¹Secundum fetus inuolucrum à farciminis imagine admodum eleganter à Naturae ²ueteribus est appellatum, qui id secus ac Galenus uerè cognouerunt. Quum enim inter disseccandum extimum inuolucrum ab utero diuulsum est, atque & nigricans subuiridisq; sanguis ab illo profluxit, nulloque alio fetus inuolucro effracto, fetus ab utero eximitur, is unā cum suis inuolucris farciminis alicuius, nō quidē oblongi, & quod ex tenuibus formatur intestinis, sed breuis, & ex crassioribus intestinis formati, supraq; & infrā confuti, non autem laqueo tantum intercepti, imaginem exprimit. secundum enim inuolucrum intestino responderet: fetus autem, & omnia quæ id inuolucrum amplectitur, intestino infartorum rationem obtinent. Est enim secundum hoc inuolucrum exacta membrana, uenulis quibusdam & arterijs intertexta, ad eum ferè modum, quob^h adherens alba ue oculi tunica illis donatur. Externa ipsius superficies tanta amplitudine, quantum est extimum fetus inuolucrum, pertinacissimè illi connascitur, & uenulas suas arteriolasq; ab extimo fetus inuolucro assumit: nullum enim uas immediatè ab utero in hanc membranā pertingit, etiam si externa ipsius superficies reliqua (quæ scilicet extimo non connascitur inuolucro) uterum contingat, sed non connascitur. Nullibi enim secundum hoc inuolucrum utero, nisi extimi inuolucrum interuentu necitur. Interior huius superficies ad amussim læuis est & humecta, neque alteri prorsus parti connascitur, nisi puncto quodam (ut ita dicam) intimo seu tertio fetus inuolucro: atque is connexus, umbilici uasorum ab extimo inuolucro per secundum & tertium ad umbilicum tendentium sit interuentu. In reliqua enim amplitudine secundum hoc inuolucrū tertio nusquam adnascitur, & ^m inter secundum hoc & tertium inuolucrum fetus urina colligitur. A suprema enim fetus uesicæ fundi regione ⁿ meatus quidam per umbilicum in cavitatem pertinet, quæ inter secundum & tertium consistit inuolucrum, atque is meatus fetus urinam in illam amplitudinem deferret, ^o hinc appellatus, & mira industria in hoc à Natura formatus, ne fetus urinam per uesicæ ceruicem reddens, illam corpori suo proximam tantisper dum nasceretur asseruaret, & eius acrimonia mordacitatēq; molli illa ac tenerula cutis erodatur ulceretur ue: sed ut urina procul à fetus cute eius urinarij meatus beneficio, inter secundum inuolucrum & tertium deduceretur, & ut mox de fetus sudore quoque dicam, partus promptitudinem dum paulo ante egredientem fetum profluit, & uteri ceruicem humectando emollit ampliaretque, plurimum iuuat. Galenus secundum inuolucrum quo ipse urinam contineri scribit, toto fetus non obduci attestatur, sed duntaxat clunibus, & extremis partibus. qua in re tuum ipsius requiro iudicium: & hortor pariter, ut quum fecit, si non humanum, saltem canis fecas, ut mox atque extimum mihi appellatum fetus inuolucrum ab utero distraxeris, fetumq; & ipsius reliqua inuolucra manu contines, ut fetum erigas, ac urinam deorsum uersus pedum regionem colligi intuearis, ac dein capite illum rursus declines, & animaduertas mox urinam uersus capitis regionem asseruari, illudque membraneum inuolucrum quod ego descripsi, & utero undique (nisi ubi extimum inuolucrum obstat) dixi esse proximum, urinam continere, & neutiquam ^o esse, quum nullas prorsus possideat uenas & arterias, ab ijs quæ ipsi nutritionis gratia, ut & ceteris membranis offeruntur, & hæc neutiquam ab utero immediatè procedunt, sed ab illis quæ crasso illo & lioso fetus inuolucro implicantur. Si enim hæc sedulo expendideris, hæc que mea cum Galeni placitis ad sectionem contuleris, promptissimè dijudicabis, quam reliqua Galeni de Foetuum formatione & seminis natura constare possit sententia. ^o Tertium fetus inuolucrum forma prorsus secundo respondet, sed minus est amplum, & longè tenuius, tenuissima enim (unde & ^o dicitur) membrana est, alba quemadmodum & secundum inuolucrum, & uenulis pariter ac arterijs implicita, fetus proximè & undecūque obducta. Huius exterior superficies umbilicum petentium interuentu, hæc enim quum ab extimo inuolucro per secundum & tertium umbilicum adeunt, secundum inuolucrum primo committunt. Interior quoque tertij inuolucri superficies læuis quoque & humecta est, fetus nusquam nisi ad umbilicum, uasorum umbilici beneficio nexum. Inter hoc autem & fetus cutem sudor copiosus continetur, qui fetus est recrementum, ac ante partum non minus quàm fetus urina profluens ceruicem uteri irrigando, fetus faciliorem exitum parat. deinde fetus cuti subflaua quædam & luteola obduci substantia, eius concoctionis (uti arbitramur) recrementum, quod in singularum partium nutritione fieri putamus. Venæ & arteriæ hoc inuolucrum implicantes ab umbilici uasis, quum illud permeant, principium mutuantur: quæ & si sint longè gracillimæ ac tenues, tamen

Tertium foetus inuolucrum.

1. 1. d. fig. 30
G. G. 2. tab.
L. L. 3. 4. d.
O. O. 3. P.

h. 18. fi. cap.
14. li. 7. 1. 1.

1. 3. 4. d. 30
fig. N.
m. 1. d. fi. 30
inter O. O.
et M. M.
n. 2. fi. M. d.
N.

0. 3. 4. d. fig.
30 M. M.

P. 4. tab. 30
fig. N. et S.

men inter discendum promptè occurrunt, quòd hæc membrana præ cæteris corporis membris & tenuissima sit, & omnis prorsus adipis expers. Vnde etiam ipsa post partum apud quasdam nationes non ineganter exsiccata uesicæ modo seruatur, atque uulgò apud nostrates in masculis galea, in foeminis uitta, apud Italos uerò indusium fuisse perualum habent: in hoc errantes, quòd omnibus pueris hanc membranam communem haud esse arbitrantur. Quod obstetricum inscitia fieri uideo, quæ interdum, & ut plurimum tertium in uolucrum simul cum secundo à foetu abstrahunt, tunc illam suam camisiam non obseruantes. Aliquando uerò quum extimum in uolucrum utero adhuc in partu pertinacius adhæret, ipse que fecus antea prodit, tunc intimum ipsius in uolucrum capiti ipsius aut cruri, aut manui obductum absq; secundo in uolucro prodit: id que tunc mulieres religiosè, & magna superstitione asseruant, neq; ab his modò, uerùm & ab occultis philosophis summo opere expetitur. Quum interim pariter & intimum & secundum possent semper matres acque puerorū nomine (uti charissimam meam matrem fecisse uideo) reponere, si extimum in uolucrum, aut lienosam illam substantiam à secundo in uolucro deradi mox curarent, & ablutas postmodum niemembranas sceno leuiter opplerent, uesicarum que modo exsiccarent. Putauerim enim elegantius fore, si grandiam puero mater illius offerret in uolucra, quàm quod ea simul cum foetus urina, & sudore, & qui profluit tunc atro sanguine in cloacas reijci, aut in terram fodi curant. Quum cæteris uiuiparis animalibus ferè sit innatum, ut simul omnia quæ foetum inuoluunt, deuorent, ac deglutiant, id quod in parturientibus canibus non iniucundè aliquando obseruauit. Porro quæ uenarum & arteriarum in umbilicum pertinentium sit series, in tertio libro qui uenis & arterijs dedicabatur, exequutus sum, quum uenam dicerem in iecur ferri, à qua priusquam in iecur absumitur, in canibus ramus in mesenterij centrum pertingit: arterias autem secundum uesicæ fundi latera deorsum prorepere, atque in humiliores ramos arteriæ magnæ inferi, quos diffundit post magnam supra sacri ossis initium diuisionem. Quoniam pacto autem hæc omnia ad amussim dissectione indagaturus sis, ubi mamillarum sermonem absolueris, ordinatim subiungam.

DE MAMILLIS. CAPVT XVIII.

MAMILLARVM fabricam non aliter delineare licuit, quàm in dextro latere uigintiæ quintæ figuræ eam exprimere conati fuimus.

a Non cõti
nẽtur inter
A, B, C, D
fig. ca. 12
lib. 3. f.

b muscul.
tab. a.



MAMILLÆ etiam si peritonæo nulla ex parte amplexentur, quum tamen foetum ubi is in lucem prodijt, alant, atq; in organorum generationi subseruiuntium numerum recensendæ sint, hoc quoq; loco ipsarum fabricam opportunè prosequemur. Mamillarum itaque situs nulli non conspicuus est: super pectus enim ad ossis pectoris latera locantur, par-
ti inferiori brachium pectori admoventis musculi superstratæ. Verum ut figura admodum uariant, sic quoq; parent non semper sedem occupant.

Mamillærũ
situs.

Ampliores enim mamillæ latiori firmantur basi, propendulæ uerò ac flaccidæ à naturali loco declinant: & quibusdam mulieribus uicinijs ad pectoris medium inuicem accedunt, quibusdam autem (quod & pulcherrimum ducitur) inuicem recedunt, thoracisq; lateribus magis appropinquant. Forma illis penè propria, semiglobum refert: quippe exterius rotundæ, gibbæq; sunt, papillæ (quæ Græcis *ῥῆμα* appellatur) instar processus obtinentes: intus uerò seu posterius, quæ pectus spectat, leuiter admodum sinuantur, secundum pectoris gibbum planè & amplæ basi commissæ. Mamillarum moles quum à brachium pectori adducente musculo abscedit, quæ illæ potissimum dependent, ampliores quàm in medio ductu euadunt, ut plerisque foeminis simul in basi, & in ipsarum extremitate ampliores ob concidentem ipsarum substantiam uisuntur. Porro substantia qua constant glandulosa est, multo adipe abundans, & uenis paucisq; admodum arterijs & neruis intertexta. Nerui quidem semper ijdem in mamillas pertingunt, ac sibi perpetuò similes sunt: uenæ autem & arteriæ crassitie & contento humore admodum pro mamillarum mole, & quo tunc funguntur munere differunt. In glandularum forma, substantia, multitudine & situ multo maior singulis temporibus est differentia. Viris namque multis nullæ ac perquam paucissimæ eademq; aridæ sunt glandulæ, uti etiam admodum puellis. Alijs autem frequentes extuberantesq; ad sunt, duritia, & mollitie, ac forma uariantes. luenculæ enim quibus iam mamillæ in molem attolluntur, generationiq; aptæ sunt, harum glandularum obtinent copiam, sed inuicem compactarum & durarum, nulloq; lacteo humo-

Forma.

Substantia

re oppletarum. De in serie formaq; glandularum in mulieribus à cæteris animalibus, & potissimum uniparis differt. his namq; unicum quodammodo & continuum in uniuerso ubere consistit glandosum corpus, illis autem ad papillæ centrum una magnaq; & mamillæ modo effigiata habetur glans, cui alie frequentes, sed parue, & amygdalis à cortice liberatis similes in circuitu accumbunt, duriori adipe, & uenarum & fibrarum ex carnea membrana in cutem pertinentium interuentu mutuo commisse connataq;. Vniuersa enim mamillarum substantia ad ipsi ritu inter cutem & membranam à nobis carne dictam continetur, neq; costis incumbentibus musculis mamillæ alio nexu committuntur, quam per reliquum corpus carnea membrana subditis sibi musculis: nisi fortè hic paulo plures uenæ interueniāt, à musculis in mamillas digestæ. Vt cumq; tamen mamillæ aliquando flaccidæ propendeant, carnea membrana à musculis nō abscedit, uerū glandulæ illæ unā cum adipe non amplius constrictæ, sed flaccidæ à carnea membrana laxantur. Mulieres enim lactantes & ultimis mensibus uterum gerentes, has uenas lacteo humore aut lacte oppletas habent, & ipsæ etiam glandulæ eo abundant, & ob id molliores & fungosæ admodū, neq; ita inuicē continuæ redduntur, & illum tonum non amplius seruantes, neq; amplius duriusculo illas sustinente adipe, sensim flaccescunt & propendent. Verū nunquam eo perueniunt raritatis, ut deoratum à muliere pilum in se (uti Aristotelis est sententia) reciperent, & pilari morbo, Græcis ὀπλῆξις nuncupato, uexarentur, quandoquidem nulli dubium est, per tot angiportus tenuesq; anfractus ab ore in mamillas pilum nequaquā duci posse, etiam si illū mamillæ, quū in ipsarū consisteret uenis, amplexuræ essent. Est enim id Aristotelis commentū, ipsi ab anu quapiam persuasum. Quancq; fortassis, ut in renibus urinarijsq; meatibus, quid pili simile in mamillis progigni posse, non omni ex parte uideatur absconū. Cutis mamillæ obducta, reliquæ thoracis cuti congruit: mamillæ enim substantiæ, ut reliquo adipi, con nascitur, pariterq; inibi crassa est. At ubi orbiculatim ad papillam nigricat, circulumque constituit, qui quōs Græcis nuncupatur, pertinaciū maximæ in mamilla glandi connascitur, uelut plurimum neruorum, & tenuium uenarum instar fibrarum albicantium interuentu. Quinetiam cutis hic interdum tenuior quā alibi euadit, fungosum quippiam, ut & papilla, adipiscens. Huius namq; substantiæ penes substantiæ accedit, hoc est neruæ quodammodo cuti intus spongiosa substantia opplete, quæ dirigit ac uicissim laxari non minū quam penis apta, & parifensu prædita est. Obscure illi tenuesq; nerui ac prorsus fibræ modo albicantes, in papillam pertinentes meatus uenarū furculi sunt, multiplici serie inter glandulas excurrentes. Venæ porro mamillis exporrecitæ, à triplici plurimum pendunt radice. Axillaris enim uena thoracis amplitudinem egressa, ramum insignē in musculos pectori superstratos, & pectoris cutem ipsamq; demum mamillam depromit. Quæ etiam elatiorem scapulæ sedem, & summum humerum implcant ueng, deorsum in plerisq; mulieribus ante sectionem conspicuos furculos in mamillæ cutem ipsamq; mamillam deriuant. Apparent namque crebro mamillarum cutis uenæ in multis mulieribus, & potissimum quæ aliquando lactarunt, insignes, subuirides, & errabundo ductu, ut in sura & in cubiti interna sede, aut in tēporibus, tortuose incedētes. Porro uenæ mamillarū à tertia radice principium ducentes, non perinde in cutem atq; priores, sed in mamillarum substantiam penitus excurrunt, arterijs concomitata: perquam gracilibus. Hæc namq; uas germinant uenæ ac arteriæ à iugulo deorsum sub pectoris osse exporrecitæ, & inter cartilaginum interualla ramos pectori incumbentibus musculis & hinc mamillis disfundentes. Atq; hæ præcipuæ sunt uenæ in constructione mamillarum animaduertendæ, quandoquidem harum interuentu uterus cum mamillis consortij lege afficitur. Hæc namque mamillarum uenæ & arteriæ (si modò quæ illis dispergantur) à iugulo, uti in uenarum & arteriarum serie docuimus, pronatæ, eosque quos diximus ramos per cartilaginum interualla germinantes, deorsum sub pectoris ossis lateribus prorrepunt, atque thoracē excident, super anteriorem peritonæi transversorumque abdominis musculorum sedem rectis musculis exporriguntur, horum posteriori sedi innatæ, frequentesque soboles, donec ad medium illorum longitudinis deuenerint, huc illuc utrobique emittentes. Porro hæ iuxta umbilici sedem alias uenas & item arterias sub rectis musculis sursum conscendentes operiuntur, atque cum illarum ramis ita implicantur, ac si utriusque manus digitos inuicem infereres, neutiquam enim osculis suis ita conuiuent, ac si utriusque manus digitorum apices ēdirecto, non autem ex latere unā commiteres. Hæc uas sursum petentia ea demum sunt, quæ à grandioribus cauæ & arteriæ truncis per inguina crus accessuris principium assumere, in tertio libro commemorauimus. Quæ & si ab eadem cum uterum petentibus uenis radice non enascantur, ad eō tamen utero accumbunt, uicinaque sunt, ut qui hic in uteri uenis coaceruatur sanguis, illis uasis excipi, sursumque ferri posse credatur, aut suis osculis sanguinem à descendentibus sub pecto-

Libro 7. Historia de animalibus.

Papillæ substantia.

Venerum mamillam petentium series.

c 25 fig. C. d 25 figura D.D.

et tabula figura 22. f 22, 23 figura 24. q q.

g 3 fig. cap. 49 lib. 2. E. E, F.

h fi. ca. 6 lib. 3 parum figuram eductur P. b. hic 25. B. i. mus. tab. a. 5. la. r. 7. tab. L. h 25 fi. A. A. l. fi. ca. 6 lib. 3. L. aut 3. fi. lib. 6. B. C.

m Specta musculi tab. a. c. f. e. fi. cap. 6. lib. 3. L. M. r. e. fig. cap. u. h. 3. G. e. n. 6 musculi. tab. a.

o 25 fi. uter uenæ y notatur, illi autem ascendentes ramus.

pectoris offe uas, accipientia ad uteri uenas ac arterias diffundere. Verum hæc ad uenarū & arteriarū in tertio libro traditarū seriem spectāt, quæ in præsentī uenit adeunda, hoc paradoxo non postposito, paucissimas prorsus uenas ab illis quæ sub pectoris osse porriguntur, in mamillas diffundi, & arterias adhuc multo rariores, & si ausim dicere nullas. Nerui mamillarum ab illis pendent, qui sub ditis musculis exporriguntur, neq̃ aliter hi in mamillarum quàm reliquam thoracis cutem deriuantur, præter^p unicum qui subinde ex quinto costarum intervallo papillam adit, multosq̃ furculos ipsi offert. Quàm uerò singula primario mamillarum munerī idonea rerū Opifex iustissimè fabrefecerit, intelliges, si seorsum unumquodq̃ suo usui adhibueris. Ac præcipuum quidem mamillarum officium in omnibus animalibus quæ animal concipiunt, & animal in lucem edunt, censendum est, tenero adhuc ac iam nuper nato foetui alimentum præparare: quemadmodum uteri munus est semen concipere, foetum quæ tantisper dumt absoluat continere. Non autem in hoc præcipue, quanquam in quarto de Animalium partibus libro Aristoteles hoc innuit, ubera creauit Natura, ut cordis sedem operiant, & deinde in mulieribus secundario, aut illis abutente Natura ad lactis generationem, & ad ipsum continendum facerent. Quandoquidem plerorumq̃ animalium & uirorum puerorum quæ mamillæ ad lactis primò generationem, dein uerò ex positu, quem non solum in homine commodum, sed & necessarium in pectore obtinuerunt, cordi uelut propugnaculum eas effici documento sunt. Quum enim neque pueris neque alicui animali ad generationem nondum apto mamillæ exurgant, sed ueluti notæ cuiusdam gratia absque peculiari aliquo in illis corpore, quo à reliqua inter cutem & carnem membranam pinguedine discerni possint, duntaxat in illis habendæ sunt, certum est, eas primò non propugnaculi uice fieri: nam in illis animalibus ac pueris mamillæ neque copiosiore adipem, neque glandulas, neque aliud quippiam præter teneram papillam habent, quo propugnacula illis quibus incumbunt organīs meritò dicerentur. Ad hæc, si quod incrementum in uiris mamillæ recipere apparent, & quasi alterius cōmodi causā, quàm notæ cuiusdam habendæ sunt, id illis magna ex parte provenit peractio anno bis septimò, quum primū genitale semen ferre ac pubescere incipiunt, ut stirpes semen laturas primū florescerent, uimū, ad eò sanè ut lactis gratia potius quàm propugnaculi intumescere, effeminatiores quæ ipsi sis mamillas fieri constet. Nam & lac nonnullis uiris post pubem exprimi, & per suctum frequentiore uel multum prodisse, Aristoteles ipse asserit, & nos quoq̃ non semel id conspeximus: uerū hoc potissimū accidit iunioribus & senioribus uiris, quibus mamma redduntur conspectiores, præcipue si humidiores, leuiiores, neq̃ amplis uenis sunt, eorū quæ ipsorum hīs magis qui fusci quàm candidi sunt. Quod uerò mamillæ hominī, quemadmodum & simiæ, in pectore collocantur, non ita autem cæteris: præter hoc quod brachiorum manuum quæ operationes non impediunt, latum quæ pectus, neque ut reliqua ferè animalia in acutum prominēs habeat, mulier puerum lactans abundè indicat, nobis quæ in illo officio uarijs coniecturis colligere promptissimum est, mamillis commodiorem regionem fessili animali & manibus usuro (ut interim ueneris præteream usum) anteriori thoracis regioni nullam excogitari posse. Nam hic situs lactis generationi propter cordis calorem non est ineptus, & ex abundanti mamillæ cordis propugnaculum & uallum quoddam censerī possunt, hominī imprimis pectus exporrecturo, neque illo cæterorum ferè animalium modo humi redinaturō. Deinde & situs hic reciprocam quendam calorem (qui tamen magis necessarius uentriculo & intestinis fuisset) cordi retribuit. Mamillæ enim lanei penicilli, aut uestis, aut ipsius in corpore adipis, aut carnis ritu à corde caloris officina prius excalefactæ calorem illum reprimēdo tegendoq̃ reuerberant. Item, cordis thō racisq̃ cōtinuum motum, cordisq̃ in expugnabilem calorem ad lactis generationem plurimū conferre, qui concoctionis alterationisq̃ naturam perspectam habet, absq̃ negotiō colligit. Porro mamillas hominī elatus, cæteris uerò animantibus humilīus ex Aristotelis & Galeni aliorūq̃ philosophorum & medicorum suffragio collocatas esse propter alimentī, aut ut ipsi dicunt, excrementi quod in lac conuertendum erat, penuriam: nō omnī ex parte sanum esse arbitror. Primum enim huc scopum dirigūt, quod foetus in utero inferioris corporis partis excrementitium sanguinem in nutrimentum assumit, mamillæ uerò ad lactis generationem sanguinem præcipue superioris partis. Dein adijciūt, hominī in elatiori parte mamillas reponi, cæteris autem animalibus non item, quod his superioris partis excrementum in cornua & iubas, secus multo quàm mulieri absumeretur. Quasi uerò cerui, equæ, eiusq̃ generis animantia uenis quæ à iugulo deorsum sub pectore feruntur magis ac homines carerent: & in illis ex superioribus corporis partibus ad uterum sanguis minus quàm mulieri possit transsumi: & non multo plus mulieri, depiliatias omnino, excrementi in longissimos capitis crines, quàm alijs animalibus in cornua & iubas pro proportionē deperiret. Sed profectò hæc Aristotelis ratio illi correspondet, qua innu-

*Mamillæ uti
nerui unde diu
tancur.*

*Ad amillarū
munus & offi
cium, ipsarūq̃
constructionis
ratio.*

Situs ratio.

mera de menstruis purgationibus problemata, nescio an tam uerè ac audacter medici & philosophi soluant, quum inter reliquas huius generis questiones, quam ob rem animalium sola mulier, & fortè equa, menstruo laborent sanguine, interrogant, ac intrepidè uulgo imponentes asserunt, alijs scēminei sexus animalibus in penias, crines, cornua, squammas, eam menstruam purgationem absumi: in muliere uerò, utpote leui ac depili, singulis mensibus defluere. quasi uerò nō frequentioribus & procerioribus plumis gallus quàm gallina, & in reliquo auium grege masculi magis quàm femellæ ornarentur: deinde illi solidiores maiores què ungues, & cristam (qua aues ornantur) longè proceriorem maiorem què obtinerent. Ac dein quasi leo non hirsutior leona esset, & ampliori longiori què cauda & iuba equus quàm equa. & in ceruorum sexu & boum non tam pilorum quàm cornuum frequentia, & proceritate, nulla planè esset differentia: & quasi mulieris ad talos usque pendens coma, qua sponsas apud nostra tes crines, acium medicaminum uir, Italarum more haudquaquam erodentes, uelut chlamyde obiectas indies uidere est, non uiri omnes pilos saepe etiam mole superaret. Verùm hæc aliò spectant: quemadmodum & illud, cur mamillæ mulieribus maiores què uiris obtigerunt, ac proinde reliquam constructionis mamillarum rationem aggrediamur. His forma exterius rotunda, ut minus iniurijs essent obnoxia, perquam idonea fuit: intus uerò ea parte qua pectori committuntur, planas latas què merito illas fecit Natura, ut firma niterentur basi. Teneram quoque & prominentem merito adipiscuntur papillam, ut hanc angustio tenore què infantis osculo inditam, is confestim labijs molliuscule constringat, & inferiorem deducens maxillam, & buccas contrahens lac attrahat, deinde instar canalis linguam inflectens ad stomachum, à nemine interim eductus, propellat. Vt uerò in illo suctu papilla turgidior procerior quàm aliàs dum minimè opus est redderetur, similem cum pene possider substantiam, quæ & laxari concideret què, & rursus à suaui contactu intumescere erigi què idonea censeretur. Papilla autem sensu exactiori, & nervorum furculis abundat, ut mamillis hac quoque ex parte cum genitalibus esset affinitas. Vt enim illis ad uenerum congressum generis què propagationem, illecebram ac uoluptatem indidit Natura: sic quoque & uberibus, & potissimū papillis, ut in lucem iam editus foetus tenerulo & nondum dentato ori papillam lubentiùs mater titillandam prurientem què inderet, ac sugendam offerret. Mamillarum uerò glandulosa substantia eius est ad iustitiam temperiei, ut in uenis adductum sanguinem in lac familiare hominis alimentum conuere concocquare possit. Venæ etiam non mineri industria ex remotis longis què partibus multis anfractibus, ut sanguis melius mamillis præpararetur, sunt porrectæ: quod non tam necessario atque utiliter accidit. Necessario quidem, quoniam (& si secus Galeno uisum sit) succinctiori quàm nunc uia uenæ mamillis non potuissent deduci. Quo pacto enim, quæso, à uena caua, quæ inter septum transversum & cordis auriculam nulla suffulta basi uena quæpiam recta sursum inter costarum interualla ad mamillas (quod Galenus facile factu arbitratur) commodè deduceretur? Primū enim nō ut reliquis cauæ uenæ caudex, hæc crassam fieri oportuit, ac proinde fuisset inualida, neque cartilaginum interualla tantam uenam indemnem admississent, sed continuo comprimerentur, & ipsa tutius non firmata in thoracis motibus ilico diuellerentur, sanguinis què eruptionis periculo homines semper fuissent obnoxij. Verùm exacta uenarum inter dissecandum ductus consideratio facile argumēto est, neque ab illis quæ in brachium feruntur uenis, in mamillas furculos comodius quàm nunc posse porrigi, multo què minus à caua & arteria magna, nisi à iugulo ubi hæc pectoris ossis summum contingunt. Quis uerò inflexionum & errantibus itineris uenarum, & harum quidem frequentium, non autem unius grandioris ad mamillas ductuum usus sit, uenæ ac arteriæ seminalium & aliorum uasorum materiam ab alio organo concoquendam deferentium errabunda itinera & gyri commonstrant. Quid porro ualeat uteri cum mamillis communio, ac proinde uenarum à mamillis ad eas quæ prope uteri uenas enascuntur congressus, is demum pernoscit, qui ex Aristotele lactis generationē usum què, & lactis ad tenerum adhuc infantē alendum, necessitatē perdidicit. Primū enim inter mamillas & uterū mirificum esse consensum, præter què quod simul cum utero mamillæ exurgunt, quotidiana in abortibus, & quū secunda ualitudine foetus fruitur, experiētia crudat. Neque id profectò iniuria, quū ad unū opus conficiendū uterū & mamillas cōparauerit Natura: uterū quidē, ut & antea diximus, ad semē cōcipiendū, ab soluendū què foetū: mamillas uerò, ad foetū recēs in lucē proditū alendū. Atque hæc sanè cōsortij legē uenarū arteriarū què mutui congressus ductus què efficiūt, quæ necessaria est, ut quādo foetus in utero augeat efformatur què, illi soli alimentū ex utris què suppedita tū uenæ deriuēt: ubi uerò in lucē editus fuerit, totū id rursus mamillis influat. Vnde etiā fieri nō potest, ut simul & menses probè defluat, & mulier lactet. Alterū namque membrū semper siccescit, dū sanguis in alterū declinat, deferitur què. Sanguinis autē dum utero gerit mulier, ad mamillas refluxus

Formæ ratio.

Papillæ constructionis & totius substantiæ eiusdem ratio.

Uteri cum mamillis communio rationis ratio. Lib. 4. de Generatione animalium ca. 8.

q. fig. lib. 6. inter D. per. Cad. B.

fig. cap. 6. lib. 3. B.

s. 25 fig. 70.

et inuere 6
mijcul. tab.
d. 6. f.

Auxilis, priusquā parit, iam diu ad hunc modū incipit. Antequā mulier conceperit, & floridæ ta-
men sit ætatis, sanguis ille singulis mēsisbus profluit ex quo fœtus, ubi mulier cōceperit, alimen-
tum allieit. Cæterum uenæ indidem ad uteri latera consistæ, tam latæ, tamq̃ proluxæ frequen-
tesq̃, ac sanguine turgidæ sunt, ut efformatum iam fœtum, & augmento duntaxat indigentem
temporis successu affatim enutrient, & nonnihil semper superflui colligant; quod in illa colle-
ctum, aliò regurgitat, regionem quærens, in quem commodè transmigret. Commoda autem
regio sunt (sed ad hoc famulante Natura, & peculiari indita ipsis vi) uenæ secundum rectos
abdominis musculos sursum conscendentes, & ad illas accedentes, quæ sub pectoris offe deor-
sum excurrunt. illæ nanque suum sanguinem in has deponunt, & lac mensibus (ut diuinus aie-
bat Hippocrates) germanum efficiunt. Quod autem, ut Galenus asserit, uteri uenæ in quo su-
perfluum id reponeret, nullam commodiorem regionem habeant, falsum est, nisi diuinæ cui-
dam ac peculiari operationi tantum munus ascribamus. Venæ enim quæ in crus pertinent am-
pliores, & rectæ magis deorsumq̃ protense sunt: aut etiam ut inter conceptionis initia, aut
quum mulier uterum non gerit, per uteri uenas sanguis is abundans menstruarum purgatio-
num modo effluere possit. Et adhuc minus ueritati consonum est, ventris in utero gerentibus
molem comprimendo ad sanguinis illius ad mamillas influxum quicquam auxiliari, nam lu-
culentissimæ recti abdominis musculi, dum fœta rescindimus animalia, compressi, admodumq̃
latiores redditi, mirum Naturæ opus nos exosculari cogunt, quo sursum siue per uenas cuti
proximè subditas, siue eas quæ rectis exporriguntur musculis, crassior ille sanguis per compres-
sas angustasq̃ uenas, & etiam plus quàm non prægnante muliere inflexas tanta copia regur-
gitat. At in hunc modum de mamillarum usu sermo plus satis excreceret: quod ne fiat, nunc
opportunum erit omnium quæ hoc libro perstrinximus organorum dissectionem quàm ac-
curatissimè subiungere.

QUONAM PACTO ANATOMEN AG-

gredi conueniat, & priuatim omnium quæ hoc libro commemorantur
partium administrandi ratio. Caput XIX.



H O C Caput, ac dein postremum sexti libri, & postmodum septimi penul-
timum lubens ita accommodarem, ut singula capita eorum organorum quæ
suis libris tractantur secandi artificium sic persequerentur, ac si quis hæc
duntaxat in aliquo corpore intueri, aut alijs commōstrare proposuisset.
Deinde ea Capita ita uelim descripta, ut si simul nexa fingerentur, instar li-
bri cuiusdam essent inuicem secandi artificium completētis: quo quis
probè in Anatome uersatus, apud studiosos in publica sectione uti pos-
sit. Quanquam enim priuatam & inter paucos exhibitam sectionem, publicæ præferendam ne-
mo ambigat, quum tamen omnibus nō suppetat corporum copia, multoq̃ minus peritior ali-
quis, quid ad cuiusque uota sectionem aggredieretur, in promptu semper sit, publicam quoque
sectionem à studiosis summopere expectandam duco, ut ipsi uel obiter in ea spectatorum turba
edocti, si quando in cadauer incidant, proprijs manibus administrationem accuratè obeant,
& studia inuicem conferentes, hanc medicinæ seu naturalis philosophiæ partem debite ample-
xentur: idq̃ potissimum in nostra huius seculi felicitate, quando unā cum cæteris disciplinis,
Anatome prorsus sopita, eousq̃ promouerit, ut omnia quæ hoc opere persequor, una eademq̃
hyeme & Patavij & Bononiæ in ea spectantiū frequentia ad eum modum non semel aggressus
sim, quo præsentēs septem libros digessi. Primum enim adhibitis studioforum & mea opera
uariorum hominum senum ac iuuenum, mulierum & uirosum ossibus, compactis & dissolu-
tis, simul cum simiarum & canum, aliquotq̃ aliorum animalium ossibus, Galeni librum de Os-
sibus ad eos qui introducuntur, prælegi, ac ossium cartilaginumq̃, seu eorum quæ fulcri mo-
do humanam fabricam sustinent, ac quæ reliqua describuntur cognitionem unā absolui. mox
omnium musculorum & ligamentorum pariter, ac omnium quæ secundo pertractantur libro, fa-
bricam persequutus sum: priori lectione studiosos admonens, quoniam loco Galenus eos quos
sequenti lectione ostensus eram musculos describeret, atque quum longius duxissem Galeni
uerba prælegere, ante sectionem, ipsius sententiā semper recensui, ac postmodum hominem &
canem, & quum obtigit, simiam in omniū præsentia secui, sedulò omnia uti à me describuntur
commonstrās. Absoluta musculorum historia, in eodem corpore in quo illos administraueram,
uiscera, & quæ uulgò in tribus uentribus cōtineri dicimus, obiter ostendi: spectatorum animos
ad uenarum, arteriarum & neruorum disciplinam hac ratione parans, qua ante musculorum
doctrinam ossa aggredior, ut scilicet uenas postmodum, arterias & neruos commodius in alio

Ordo in
anatomie docen-
da obseruandus.

corpore tunc pertractare, ac pariter in eodem quæ ad interiora spectabāt ad amissum absoluerem, ante sectionum partium ostensionem earum fabricam ad eum modum semper docens, quo illam his libris commemorare adnisi sum. Quo autē modo quis hæc omnia obiturus sit, partim in primo & secundo recensui, partim uerò hoc capite & in calce subsequentium librorum complectar. In primo enim libro ossium parandorum rationem, in secundo autem musculorum dissectandi in uno corpore methodum persequabar. At hic me negotio ita accingam, ut etiam hæc omnia in uno tantum caduere, si modo in corporum penuria id opus esset, administrare queas: ac rursus, si uelis, priuatim singula in uarijs cadaueribus perficias: quod longè etiā est cōsultissimum, ne eorundem organorum partium uel series inturbetur, ac uenas quæ musculi ostenduntur, aut quum neruos tractas, musculos explicare tenearis. Corpus itaq; publicæ sectioni adhiberi conuenit, in suo sexu quàm temperatissimum, & ætatis mediæ, ut ad hoc tanquam ad Policleti statuam alia corpora possis cōferre. In priuatis autem sectionibus, quæ crebrius accidunt, utile erit quod uis aggredi, ut cuiusmodi id quoque sit expendas, corporumq; differentiam, uerumq; multorum morborum naturam assequaris. Theatrum porrò ac mensam cui cadauer imponetur, ea ratione confici curabis, qua hanc tibi commodiorem, illud uerò excipiendis spectatoribus aptius fore duxeris. Instrumēta autē operi adhibenda, in secundo libro utcumq; recensui. Quum itaq; in uno corpore omnia absolueri necessum est, neq; seriatim, ut in his libris docemus, singula pertractare licet, de corporis humani fabricæ cognitionis dignitate & usu quædam, si uisum fuerit, leuiter præsentis sceletō præfaberis. uix enim hodie ulla est Academia, quæ non unum atq; alterū habeat, quod sectioni semper utilissimè adhibeatur. Cadauer autē ipsum postquam hominem à cæteris animantibus distinxeris, in caput, corporis truncum, manus & crura, oratione diuides, aut tres ipsius sedes uel uirtutes constitues, quæ singulæ singulis secundum Platonis præcipuè sententiam dicantur animis, atque his sedibus & generationis organis postmodum manus cruraq; adiunguntur. Mox licebit accuratius corpus distinguere, & exteriorum partium nomenclaturam studiosè recēdere, quam ex uarijs Galeni & Aristotelis locis, deinde collectim ab autore Introductorij seu Medici, & Iulio Polluce, & cū alijs pleriq; Georgio Valla petes: quanquam & ego passim in primo libro Ossium nomina perstringens, earum uocum non penitentiam supellectilem collegerim. nomina enim superficialijs sedibus indita, etiā ossibus ferè adhibentur. Vnde etiā aliquando in cadaueris cute ossium delineationē in sua sede pinxi, quod ita aptius idem nomen ossi parti q; quam os occupat cōmōdum ostenderet. His nomēclaturis adnectes partiū differentia, eas in similes ac in strumētarias subdiuidentē. atq; hic utile fuerit commemorare, quæ nam partes in harum illarum uel classem reponantur, nō neglecta cōmuni cuiusq; partis descriptione: quam & hic noster labor assatim suggeret, si modo singulas descriptiones in suis locis requirere nō grauaberis. Partium namq; enarrationes ab ipsarum descriptione ferè auspicatus sum, uti etiā inter dissectandū cōsueui, quū seriatim omnia aggredior, & quam doceo partē in alio animali nudā ostendere conor: quod etiā nunc accepto cane, aut agno, aut alio quouis paratu facili nō absq; spectantium usu præstiteris: si modò quid os, cartilago, fibræ, ligamentū, adeps, caro, glādosum corpus, deinde quid musculus, eneruatio seu tēdo, aliq; musculi partes, uena, arteria, & neruus sint, lubeat docere, ac mox quo pacto magis instrumētarię partes cōficiantur ostēdere. hæc enim nō inopportunè generatim, uti dicebā, in animali quopiā (ne hominis corpus hac occasione uicies) cōmonstrātur, quod minus earum partiū ignoratiā in cuiusq; membri instrumētisq; enarratione spectatorē remorētur, & ipse narrationis seriē cogaris interrūpere. Porro differentias, quæ inter enarrandū à partiū usu, ut quod quædā ad uitā, aliæ ad speciei successionē, aliæ ad bene uiuendū faciant, aliæq; eius generis differentia, quæ huc quàm plurimæ referri possunt, in præsentia neutiquā propositū est recensere, quod huiusmodi passim in singularū partiū capitibus satis prolixè doceā, quodq; hic sectionis rationē mihi explicandā potius q; illum in cathedra citra partiū cognitionē, ac ex aliorū libris duntaxat philosophandi modum cōmemorandū assumpserim. Illā itaq; aggressurus, studiorū sodalibus potius quàm ministris, qui secantē adiuuent, adhibitis, acutiore nouacula orbicularē sectionē secundū umbilicū adeo profundā duces, ut cutem penetret, dein à mediā pectoris ossis longitudine rectā sectionē ad umbilicū usq; molieris, & ab infima umbilici sede perges ad pubis usq; mediū uirilis membri (si modò uiri cadauer ad manū sit) radicem cōtingēs: aut, si mulieris corpus secas, quousq; pubis ossis sedē inter uulua cervicalis colliculis superaueris, ut scilicet à pectore ad pubē usq; una quali sectio (integrali interim umbilico) pertingat. Post hæc, utrinq; ab umbilici latere sectionē trāsuersim ad lūbos usq; duces, id interim studēs, ut solā cutē pertundas, quod in homine, et potissimum obefiore, factu non adeo est arduū, quum adipis crassities, ne carnosam uitis membranā, pronptè remoretur. Factis hunc in modū sectionibus, cutis angulum

Cuiusmodi
corpus sectio-
ni adhiberi cō-
ueniat.

Quum in uno
corpore om-
nes partes
sunt ostendē-
dæ, a quibus
tractatio sit
inchoanda.

Cutis, cuticu-
la, adipis, &
carnose mem-
brana in abdo-
mine admini-
stratio.

a Bononia
& Patavij
tale parauit
mus, quale
ex dimidia
parte, huius
libri
frons pro-
ponit.
b fig. cap. 7
lib. 2.

6 fi. ca. 6 li.
3 à radicib.
uenarū L.
G r.

*Venarum per
abdominis re-
gionem inter
cutem & car-
neam membra-
nam excurrē-
tium.*

Osteo abdominis musculorū.

Vendrum, ar-
teriarum, ner-
uorum per aſ-
dominis n. uſcu-
los repentium.

Peritonæi à
partibus ex-
trinsecus ipsi
commixtis libe-
ratio.

*Apertio pe-
ritonæi, et una
uasorum unibe-
lici administi-
ratio.*

in Quemad-
modū in 17
fi. k ab l du-
mulum est.

bis usque os (ut aliquo intervallo ab ipsius medio in sinistru latu deuict) tentanda est. Insuper in hac sinistra peritonæi parte è directo umbilici sectionem uersus sinistrum ile molieris, & superiorẽ eius peritonæi partem ad costas, inferiorẽ uerò uersus coxam reflectes. Leuata autem nunc sursumq; nonnihil reuoluta, seu dextrorsum in uersa peritonæi dextra parte, uenæ ex umbilico in iecur pertingenti animu adhibebis, quæ potius funi multo adipe obli, quam uenæ respondet. Hanc quæ iecori proxima est, & ubi duntaxat à peritonæo abscedit, sinistra manu apprehendes, & acutiori cultello inter ipsam & peritonæum iniecto, transuersis sectionibus eam ad umbilicum sensim accedens à peritonæo diuides. Quò quum peruenieris, intacta uena, ab umbilici dextro latere ad ilia usq; sectionẽ in peritonæo duces, eam peritonæi partem, quæ nunc libera est, super dextri lateris costas reflectens. Cæterum iam adhuc una peritonæi pars, quæ in dextro latere inferior est, umbilico cõnata manet, nõdum uel libera pendet. quare ut & hanc liberares, neq; aliquid interim uicies, umbilico sinistra manu comprehenso, ab ipsius dextro latere, sectio in hanc peritonæi partem ad pubis usq; os faciendã est, quæ digitorum aliquot latitudine à pubis ossium commissura in dextrum declinet. In uersa modò peritonæi particula, quæ triangularis adhuc ab umbilico ad pubis os ac uesicæ fundum pertinet, tres quasi funiculi inuicem appositi, atque illi peritonæi parti interius adnati uisuntur, qui studiose cultello acutiori ab ea sunt diuidendi, ipsiq; funiculi inuicem attentè dirimendi ueniunt, ne in homine uersus pubis ossa nimium liberè sectionem producents, uesicæ fundum uulneres. Homini namque uesica, eo quòd tota anteriori sede peritonæo connascatur, multaq; pinguedine obducatur, ita rudibus imponit, ut hic uesicam reponi ignorent, uesicam quaerentes, quæ ipsis in hominibus perinde atque in bobus & canibus occurrat. Quum itaq; hæc nõ oscitanter expenderis, medium funiculum uesicæ fundi medio innasci, & nusquam à peritonæo abscedere obseruabis: reliquos autem duos secundum uesicæ latera deorsum, penitusq; ad arterias per pubis ossium foramina in crus delapsuras porrigi conspicias, modò eos à peritonæo acutiori cultello ad illorum usque insertionem liberare non pigeat. Medius funiculus, meatu est, quo è uesica, quũ uero gerimur, urina in mediã fetus tunica, quæ à farciminis specie non inuenit, excernitur. Reliqui autẽ duo, arteriæ sunt, quibus naturalis foetus calor recreatur. Verum neq; hæc tria corpora, neq; id quod iecori inseritur, ullam nunc cavitatẽ habere uidebuntur, sed planè mortua aridaq; & multo adipe enutrita apparebunt. Vnde etiã alios Anatomes latuerunt proceres, ea omnino aboleri in natis hominibus, quemadmodũ in canibus ferè accidit, asserentes. Cæterũ posteaq; uenæ ab umbilico iecori insertæ implantionẽ sedulo in spexeris, integrum est, eam cum umbilico, quem hactenus seruasti, deinde & tres alios funiculos rescare, animaduersoq; peritonæi ad uesicæ fundum connexu, sectionem ad omentum cõferes. Reliqua enim quæ in peritonæo adhuc uidenda super sunt, nisi paulatim organa hoc obcincta abstuleris, uidere nequis. Porro priusquam aliquid loco dimoueas, omenti situs uenit obseruandus, num scilicet ut in canibus & porcis, atque adhuc multo magis in simijs, ad pubem usq; id sub uesicæ posteriori sede exporrigatur: an uerò (uti frequentius obseruatur) uersus sinistru latu reuolutum, sursumq; etiam supra mediã intestinorum sedem contractum occurrat. Si postremum illud inueneris, utraque manu humilius omenti extremum modicè eleuabis, ac sensim æqualiter deorsum detrahens id omnibus intestinis ad pubis usque os obtendes. ita enim quantum sit, quodq; interdum ad inguina & scorum & inter uesicam & uteri ceruicem deuolui possit, condisces. Vt uerò omẽti ad colum intestinũ, quã uentriculo id exporrigitur, connexũ cernas, duabus rursus manibus humiliorẽ omenti finem sursum ad pectoris os attolles, & priusquam aliqua ex parte inferiorẽ omenti membranæ partem, quæ ueluti ex tertia coli intestini tunica enascitur, à colo disseces, omentum quàm possis maximè pectori obtendito, ac intestinorum situm summa qua poteris industria solis urens manibus inuestigato, & primũ antequam alicuius intestini locum perturbes, ipsa ut se eleuato iam omento spectanda offerũt, ad amissim contemplaberis. ut quũ cuiusq; intestini ductũ didiceris, cui peritonæi regioni unumquodq; uicinũ sit, in medicamentorum usu & affectibus dignoscendis perspectum habeas. Simulatq; igitur id accuratè neq; obiter profectò obseruaueris, dextram manum recti intestini quã id ossis sacri incumbit initio, accommodabis, & sinistra manu tenuia intestina leuiter in dextrum deprimes, non quidem omnia, sed eorũ partem quæ dextræ manui quum à recto conscendes, in progressu erit uicinior. Ad hunc itaq; modum sinistra dextræ famulãti, à recto intestino sensim dextram colo ad mouebis, atque secundum ipsius ductum reuolutionesq; ad sinistri renis sedem, hinc ad lienem & fundum uentriculi pertinges, quò quum perueneris, mutato manuum ministerio, sinistra colum est apprehendendum, dextra uerò tenuia intestina in sinistru modicè depellenda, quousq; omnẽ fundi uentriculi sedem, iecurq; superaueris, & colum sub dextri renis

Umbilici uerum præfatio. Omenti situs obseruatio.

Intestinorum situs examinatio.

n. 1. f. g.

o. ultimari fig. lib. 1. p. 2. figura M, K, L.

q. 2. fig. N.

r. fig. cap. 12. li. 3. e. f. et. inter f. et. n.

s. 2. 3. fig. O.

t. VI. Q. Q. in 2. fig. u. VI. inferior membr. 4. na. c. nota tam 3. fig. x. per f. 22. figura. y. inter T. et L. 24. fig.

z. Ad T. et Y. 6. 8. figura.

a. Secundum 8. fi. T. S. R. Q. P. ad N. aut 6. figura. R. Q. P. N.

renis regionem (ubi finit) deduxeris. Huc enim quum pertigeris, sinistra manu coli terminum modicè subleuabis, ac cæci intestini situ, formaq; similiter obseruata, manu dextra simul cum sinistra apprehēdes, & utriq; manibus sibi proximis, ipsiq; ab intestinis nunquam remotis, à colo mox ductus ilei intestini, & dein ieiuni sequeris, quod factū longè est facillimum, usque dum peruenieris ad ieiuni principium, quā sub colo retorquetur, ac dorso quodammodo alligatum duodeno continuatur. Quapropter ut uniuersus intestinorum ductus tibi occurrat, dextra adhuc ieiunum complecteris, sinistra uerò inter iecur & dextram ventriculi sedem intrudes, duodeni intestini inquirens principium: quod ubi inueneris, deorsumq; secundum ipsius ductum descenderis, ieiuni intestini principium, & quæ illi proxima est pars, quamq; dextra adhuc amplecteris, etiam innotescet. Si modò lubet (quod & faciendum maxime consulo) poteris à ieiuno ad ileum, & hinc ad cæcum ac colum, & à colo ad rectum contrario ductu intestini situm secundò examinare, nulla interim (ne quid uulneres) facta auulsione. Perpensio intestinorum situ, ac ijs utcumq; in suum locum repositis, omentum rursus intestinis est obuoluentum, uentriculiq; iecoris & lienis situs uenit examinandus. Primum itaq; inter septū transversum & iecoris gibbum, manum inferes, ut illius gibbum ligamentaq; in cōspectū ueniant, ac quoniam pacto ex præcipuo iecoris ligamento tenue ipsius inuolucrum nascatur intuearis, manum transuersim hinc inde ducens. Deinceps inter iecoris cauum & dextrum ventriculi latūs sinistram manum, dextram uerò inter septum & latūs ventriculi sinistram impones, paulatimq; inuicem adductis manibus, ad uentriculi superius orificium accedes. quod in cōspectū ueniet, si modò iecur sinistra sursum non nihil protruseris, & dextra uentriculi corpus deorsum compresseris, atque una eademq; opera iecoris cauum ac uniuersum ipsius situm obiter examinaueris. Præter hæc, ea quoque operatio uentriculi sedem etiam accuratè cōmonstrabit, dummodo hinc inde, nunc iecur sursum trudens, nunc uentriculum deprimēs, manus ducere non detrectes. Lienis porro sedem adinuenies, si inter sinistru uentriculi latūs & septum transversum, sinistra manu immiseris, uentriculumq; cum colo intestino hæc excurrente, in dextrum latus attraxeris: siquidem tunc lienis superius & dimidium ipsius caui latus sese uisui offerunt, et si dextram manum inter lienem & septum transuersum mediam immiseris, lienemq; modicè eleuatum uersus uentriculum protruleris, ipsius quoque gibbum apparebit. Quo tamen hæc omnia leuiori negotio conficias, nō erit inutile interdum aliquod costarum interuallum arctio uulnerè ad thoracis usque amplitudinem pertundere. Quum primum enim thoracem uulneraueris, septum transversum deorsum concidens insigniter flaccescit, quantumuis etiam uehementer antea tensum, sursumq; attractum, iecur & uentriculum in thoracis amplitudinem sursum duxerit, difficilēq; horum in spexione ob id parauerit. Cæterum iam omenti membranæ uicem sunt dirimēdæ, quod fiet, si dextram omento subieceris, hæcq; inferiorem membranam, sinistra uerò manu superiorem apprehendere, trahereq; studueris. hæc enim ocyus inuicem dirimuntur, marisq; seu sacculi speciem monstrantes: qua uisa, inuicem membranas adeò diuclles, ut alibi lacerentur, commodeq; manum in illarum amplitudinem inferas, & utrinq; in lateribus, & humiliori omenti sine superiore membranā ab inferiori discerpas. Iam inferiorem membranā intestinis exporrectā sinere conuenit, & superiorem adeò pectori supertendere, ut latius uentriculum ē sua sede eleuet. quod si nō successerit, foetalis manu id facias oportet, ut cōmodè inferioris omenti membranæ exortus, quæq; per ipsum ferunt organa in cōspectū ueniant: ac discēs pariter, quoniam pacto hæc in hominibus colo intestino mesenterij uice sit, tota ea sede quā colum uentriculi fundo attēditur. In hac enim membrana ubi uentriculo substernitur, minor portè uenæ truncus ferri, suosq; in quos digeritur ramos educere, apparebit. Deinde præter truncū conspicietur arteria, quæ lienī, uentriculo, iecori, bilis uesiculæ, & ipsi demum omento furculos deriuat. sic quoque & arteriæ radix, quæ superiori scde mesenterij disseminatur: deinceps & nerui duo, quorum dexter iecori bilis folliculo, & dextri fundi uentriculi sedi, & hac quoque parte omento spargitur, sinister uerò lienī & sinistri fundi uentriculi sedi, ipsiq; dextræ omenti parti distribuitur, & ante hæc omnia in humiliori omēti membranæ digitis superior omēti pars diligenter est inquirenda: quam obseruabis, si ministri opera uentriculo semper eleuato, ac uelut ad superiora truso, ab ipsius fundo deorsum uersus iecoris cauum, ubi omentum simul multa colligat corpora, & hinc per dorsum quā arteria magna septum permeat, secundum lienis cauū ad uentriculi fundum usq; deuenieris. Hic enim superior est omenti circulus, & si illud saccum marsupium uel esse dixerimus, eius orificium. Quoniam pacto autem ipsius ortum adinuenias, paulo post dicam. In præsentia enim uentriculo in suum

Ventriculi, iecoris & lienis situs examinatus

Quæ iecur, uentriculus, lien, ueluti in thoracis cauitate ueluti, deorsum protrahi queant.

Omentum quid uelle, ab ipsiusq; ortu, ut sitigantur, ut cum uasis illo suffulcitur.

g Corpus ad m. 2. n. 2. figure paraturus.

h A P A I O 6 fig. 4 Spectabūtur omnia quæ 3 et 4 figura characteribus insigniuntur.

*Qui organa
in caua iecoris
sede posita
sunt spectanda.*

locum reposito, illum in sinistram latus cum intestinis trahi^k curabis; iecur uerò, ut ipsius cauum adamussim uideas, in dextrum & uelut sursum protrudes. deinde postquam obiter bilis uesiculam contemplatus fueris, sectionem omnium totius corporis molestissimam maximeq; operosam aggredieris. Bilis namque meatus, & neruorum & arteriarum uenarumq; rami (qui omnes simul inferiori membrana omenti ad cauum iecoris colligantur) nunc ueniunt retusiori cultello examinandi, ne acutioris cultelli mucrone uenam quampiam pertundas, sicq; omnia cruore obliteres. Offertur itaq; primum neruulus ab humiliori uentriculi orificio iecoris cauo infertus, qui à sexti neruorum cerebri paris propaginibus superius uentriculi orificiū adeūtib; pendet. Vbi hunc à uicinis organis diremeris, à membranarū cōnexu diuidendus est alter neruus, qui uno ramo iecoris caui, altero autem bilis uesiculam accedit. Huic neruo arteria attenditur parem cum illo efficiens distributionem, ac mox post neruum liberanda. Huius uerò, ut & nerui initium, paulo post inuenies, nunc enim fat est, hæc inuicem iuxta iecoris cauum separare, hicq; eorum seriem discere. Sub arteria bilis uesiculæ meatus cōsistunt, à portæ uena iam liberandi; primum duo illi, qui ex iecoris cauo ex multis furculis colliguntur, & illico in unum cōeunt meatum, qui una parte in bilis fertur uesiculā, altera in duodenum intestinum. Vbi hos à portæ uena ad intestinum usque & bilis uesiculam seceueris, illam pollice ad eō comprimes, ut meatus bile turgentes cōmodius appareant, & num quis meatus ab hac uesicula in uentriculum pertingat, animaduertas: quem si non inuenieris, acu meatum in intestina properantem leuiter pertundes, ut profluens bilis argumēto sit, nullum processum ab illo meatu tibi incuria præfectum. Postremò uena portæ est examinanda, ac illico atque ipsius circumscriptionē quæ ex iecore prodit animaduertes, propagines illius obtusiori cultello sunt inquirendæ, semper arteriæ & nerui, uenæ per uniuersum ipsius seriem attenforū, diligenti habita ratione. Primum itaq; furculos portæ aggredieris, qui bilis uesiculæ exporriguntur; deinde eum qui ferè citra arteriæ consortium in dextrā uentriculi sedem, iuxta ipsius inferioris orificij posteriorem regionem modica ramorum serie digeritur. Hunc subsequitur, qui dextrā fundi uentriculi partem & medium superioris omenti membranæ perrepat. Post hunc, qui duodeno nobis uocato intestino deriuatur, quem secundum intestini longitudinē in^m corpus quoddam glandulosum carneumq; descendere obseruabis, si modò (uti iam monuimus) retusiori cultello uenam, illiq; accumbentem neruum, arteriamq; nudare studueris. Modò magnam portæ distributionem deteges, truncum, qui mesenterium adit, obiter tantum expendēs. Atque hoc in præsentia relicto, ad truncum qui lien potissimum exporrigitur, te cōferes. Atque ut hunc cōmodè uideas, uentriculus & intestina tibi ueniunt ad eumⁿ modum aptanda, quo situabantur dum inferiorē omenti membranam intuebaris, ac uentriculum sodalis manu sursum attolli, & intestina deorsum premi curares. Patente itaq; nunc tibi superiori sede humilioris omenti membranæ, accurata cura ramos omnes minoris portæ trunci examina, quos omnes aut uentriculo, aut lien, aut ipsi omento, coloq; intestino in homine exporrigi adinuenies. Interea uerò quā ramos hos inquires, ipsosq; à glandoso corpore illos suffulciente liberabis, omnibus ferè arteriam, multis autem neruum attendi obseruabis.^p Arteriarum radix sese offeret in elastissima inferioris omenti membranæ sede, ubi etiam occurrat magnæ arteriæ in mesenterium deducendæ origo: deinde utrinq; unus sese offeret neruus, ad magnæ hæc descendens arteriæ latera exiliens, sexti neruorum cerebri paris propaginum, quæ costarum radicibus exporriguntur, soboles. cuius ramuli unā cum arterijs dum uenam nudas, in conspectum semper ueniunt. Iam & grandioris portæ trunci & paulo antè dictæ arteriæ & nerui per mesenterium seriem, & quæ inibi diuisionibus præfunt glandulas^q inuestigare tempestiuum est. Primum itaq; solis manibus intestina hinc inde inuicem diduces, & nunc in dextrum, nunc in sinistram latus reuolues, ut citra sectionem mesenterij naturam perfunctoriè cōtempleris. Deinde obtusiori cultello maiorem uenæ portæ truncum & dictam nuper arteriam & neruum inuicè liberabis, & dein ut uniuersum ipsorum ductum, & glandulas diuicationibus interiectas intuearis, unguibus unam mesenterij membranam ab alia diuelles. Ac hoc per uniuersum mesenterium haud uenit tentandum, suffecerit enim in præsentia à centro ipsius aliquot ualorum furculos ad tenuia usq; intestina deduxisse, ac mox^r alteram mesenterij arteriam aggredi, à magna arteria ipsi post feminalium arteriarum ortum depromptam. Atque hanc promptè inuenies, si cum intestinis mesenterium in dextrum latus reuolueris, unguibusq; aut obtusiori cultello mesenterij membranas, quæ colo sub sinistri renis sede adnascitur, inuicè dirimere conaberis. Hic enim illico eius arteriæ rami uenis commissi sese offerēt, rursus arteriæ radicem cōmonstrantes. Quam ubi inuenieris, ipsius diuicationem prosequere, ut discas quā hæc cum uena mesenterio suffulta recto intestino ramos exporrigat. Parum modò sollicitus, etiam si uenæ huius extrema in rectum intestinū inferi

*Portæ rami
una cum arte-
rijs & neruis
illis atq; illis
examinandi.*

*Mesenterij
naturæ quæ in-
dugenda.*

*Quo dani-
modo i. fig.
gura para-
turus, atq;
ita hic spe-
clabis quæ
illa figura
et 13 char-
acteribus me-
tati, unde
tiam ex illi
figuris se-
quentiū no-
tas seriatim
petes.*

*Et hanc
quosq; petes
ex 12 figu-
ra, deinde ex 3
fig. cum 4
aut integrā
seriem ex 3
fig. ca. 5 li. 3.*

m 12 fig. 1. li.

n 4 fig. f.

*o Prorsus
ut m 3 fig.*

*p 4. fi. A. ue-
rum si hic
notas requi-
ris, illas om-
nes ex 3 et
4. fi. sumes.*

*aut 3 et
4. librorum
figuris ue-
nas, arteri-
as, neruos
exprimenti-
bus.*

*q Partim ut
in 10 figur.
partim ut
in 12 fig.*

*r 20 figu. h.
aut fi. ca. 12
lib. 3. 2. sub 1
et a. enasiā.
510 fi. circa
Hic illi pro-
ximū G. ac
12 fig. n. aut
11 fig. ab R
ad S. deim
ad T.*

non

non intuearis: id enim paulo post fiet facilius. Hac sanè omenti administratione intestinorum, uentriculi, iecoris, lienis & mesenterij situs, præterea quæ his omnibus exporriguntur uenarum & arteriarum & neruorum furculi sunt examinandi. Porro administrationi, quæ quæ adhuc

in illis organis uidenda super sunt, commode intuearis, alijsq; monstres, nunc me accingam. Mainticulae instar semicirculi obliquatæ acui filum, quo literarum fasciculi colligantur, tranſcien- dum est, hanc per mesenterium sub recto intestino, quæ sacro ossi incumbit duces, & eius inte-

stini facibus sursum ad coli amplitudinem protrusis, recto intestino uinculum inſicies, abſecto iam quod superest filo, facies uinculo proximas ex recto intestino sursum denuò comprimes, & intervallo trium digitorum plus minus interposito acum rursus sub recto intestino supra pri- uis uinculum traicies, secundò rectum intestinum ita ligaturus, ut inter duo uincula nihil excre- menti sit reliqui. Deinceps nouacula rectum intestinum inter duo uincula diuides, & superio- rem ipsius partem sensim à mesenterio obrusiori nouacula (ne fortassis negligentior intestina uulneres) rescabis, & dehinc colum, ileum, ieiunum continuò à mesenterio ad ieiuni usq; prin- cipium liberabis, intestinis in peluim repositis. Atq; in hac functione coli intestini supra renum pingues tunicas connexus sedulo est animaduertendus, unà cum uasorum frequenti serie in- testina implicante. Vbi uerò ad ieiuni usque principium pertigeris, id perinde atque rectum, duobus uinculis intercipies, ita ut elatius uinculum infertioni meatus uesiculæ bilis proximū sit, non autem elatius descendat. Intestina à uentre libera baiulo alicui, quales hic sectioni adhi- beamus, ablucenda offeres, ut si uisum fuerit ablutorum iam tunicas & longitudinem examina- re queas. Patauij & Bononiæ postquā abluta scholarumq; scamnis exporrecta essent, aliquan- do uesicæ instar inflari curauimus: ita enim nō solum longitudinem, quæ omnibus uix eadem est (quanquam quatuordecim ulnas ferè æquet) uerum formam ac amplitudinem facile didici- mus. Tunicas autem, intestinis ad hunc modum exporrectis, inquirere est longè facilius, ap- paret enim mesenterij pars intestinis proxima, quæ ex duabus constat membranis, una supe- riori, altera inferiori. Has si unguibus ab intestinis dirimes, quæ tertiam intestinorum efficiant tunicam intueberis, ac qua ratione hæc à peritonæo pendeant obseruabis. Quandoquidem mesenterij membranas paulo post à peritonæo enasci spectabis, & iam quæ hæc intestinis obuol- uantur discas. Hac tunica ab intestinis distracta, obrusiori nouacula sectionem secundum inte- stini longitudinem duces, studiose præcauens ne id uulneres. Huius insuper sectionis labra unguibus diuelles, & absq; negotio secundā intestinorū tunicam ab intima liberabis, præcipue si id iuxta rectum membranis, in tenuibus enim intestinis tunica nō ita facile in conspectū uenit.

Nunc licebit intestina inuertere, atque unum eius intestini quod nos cæcum esse putamus, orifi- cium examinare. Verum intestinorum tunicas licebit ijs adhuc in uentre relictis interdum di- scindere: quanquam illis exemptis, id fieri malim. Interdum priusquam uasa in caua iecoris se- de conspicua, & humiliori membrana omenti suffulta aggrediari, necessum erit intestina ad eum quem dixi modum auferre: idq; tunc potissimum, quum publicā obibis sectionem, in qua diutius quàm ubi ex usu esset, intestina forte afferuarentur. Porro iam uenterculus est adeundus, quem modò quoque cum liene eximere soleo, neruis ipsius orificio insertis diligenter prius exa- minatis, alias enim uentriculum redinquare consueui, quousque thoracis omnia essent dissecta, ut commodius ipsius orificium neruisq; examinari possent. Verum in præsentia ut rite illum eximas docebo: quum autē gulam persequar, ut relictum debite administres subijciam, Vnguibus ita- que quantum fieri licet in homine, peritonæum à septo transuerso ad uentriculi usque superius orificium auellere conaberis, ut tertiæ uentriculi tunicæ uideas principium. Quod ubi paululum à uentriculi orificio liberaueris, studebis utcumque etiam diuulsam ad uentriculi fundum dedu- cere, ut ex tertia uentriculi tunica superiorem omenti membranā consutui oririq; discas. Deinde acu sub superiori orificio uentriculi traiecto, uinculum sedulo nexum ipsi inſicies, paulo supra uinculum stomachum à uentriculo transuersim liberans. Nunc uentriculo ministri manu è uen- tre eleuato, non tamen penitus (ne uenas rumpat) exempto, inferioris omenti membranæ & mesenterij ex peritongo originem discas, solis unguibus hanc à dorso sensim distrahendo utens, uinculis uerò pleraq; intercipies. ⁶ Primum simul omnia quæ in cauo iecoris occurrunt, portæ scilicet uenam, arteriam, & bilis meatum, aut si lubet singulis seorsum uinculos accommodabis: post hæc arteriarum radicibus, quæ mesenterio & inferiori omenti membranæ primum dige- runtur, illa sanè arteria nō omiſsa, quæ sub seminalibus arterijs orta in mesenterium fertur. Atque his omnibus unum duntaxat uinculum addidit est, quanq̃ duo (ut in intestinis faciendum mo- nuimus) inſicere nihil prohibeat: imò, idq; præcipue ad superius uentriculi orificium, plurimum conduxerit. Inductis in hunc modum uinculis, portæ, & reliqua quæ interſepta sunt, ita ut uin- culum in corpore maneat diuidetur, & oculus solarum manuum opificio uenterculus cum me

Qui intestina
ad uenterum
reſectenda, ac à
corpore auſer-
renda.

Intestinorum
tunicarum
armatura.

Venterculus et
lien & enteriū
ac, ſenterij
qui ſimul ex-
imenda, ac p. c.
meo oſtendi
ſervanda.

*Lienis tunica
quæ obseruan-
da, simul cū ip-
sius ad ventri-
culum nexu et
substantia.*

*Ventriculi ca-
pacitatis et tu-
nicarum exa-
men.*

*Seminales ar-
teriae quæ obser-
uanda.*

*Cauæ uenæ et
arteriæ mag-
nae series, in
peritonæi am-
plitudine ser-
uata, quæ obser-
uanda.*

*Renū tunica-
rum totiusque
deorū cōsuetu-
dine examina-*

fenterio, omento & liene ex uentre exempta mensae imponentur, ac statim cum omenti portio-
ne extracto liene, ^h omenti pars lienī obnata unguibus ab illo est discernenda, ut expendas qui
lienī tunica ab omento initium ducat. Quod uero attritissimè summaque diligentia inspicendum
sit, num meatus aliquis à liene in uentriculi orificium pertingat, quæque uasorum hic habeatur
series, etiam si taceam, neminem ambigere reor. Cæterum ut lienī substantiā obserues, aliquot
sectiones ipsi induces, & illo inter duos asseres compresso, ipsius substantia ab illi infertis uasis
aliquot locis separabis, hæcque ratione uasa aliquot sola & lienī carne enudata spectabis. Ven-
triculum uero lauandum, deinde uesicæ instar inflandum dabis, ut ipsius capacitatem, quæ sa-
nè est quàm maxima, intuearis, & tunicas ipsius, ut in intestinis faciendum præcepimus, ^m exa-
mines, postmodumque inuertas, ac bilis meatus ⁿ insertionem in intestinū quod adhuc uentricu-
lo appendet, uideas. Porro ubi hæc omnia exemeris, si quis sanguis alibi effluerit, & quæ in
uentre adhuc reliqua sunt oblitterauerit, spongia aqua copiosiori, non autem aceto imbuta, se-
melatque iterum eluendus est. nam si lino abstergeris, plus tingendo oberis. Solent enim ple-
runque exigui uasorū ductus, multa adipe & membranulis obfiti, difficulter admodum in ho-
mine reperiri, idque magis si sanguine oblitterentur. Eluto itaque sanguine, ac obiter ijs quæ ad-
huc in uentre reliqua sunt absque sectione inspectis, & icore nulla ex parte uulnerato, sed uenæ
cauæ gratia in corpore asseruato, primum membranulas, quæ uelut uenæ cauæ secundā consti-
tuunt tunicam, ad sacrum usque os auellere conaberis, diligenter præcauens ne ^o dextrā semina-
lem arteriā, quæ cauæ corpus transcendit, simul cum membranā adimās. Est enim hæc tenuis
& membranæ modo albicans, multaque pinguedine in homine obducta. Quapropter comode
admodum feceris, si priusquam aliquid eorum quæ in uentre adhuc reliqua sunt aggrediaris,
^p arterias seminales inquiras, ac deinde ne lædatur in reliquarū partiū administratione caueas.
Ut uero id præstes accuratius, animum adhibebis ^q dextræ feminali uenæ, quæ ex cauā oritur:
deinde & arteriæ exortui, quæ inferiorem mesenterij sedem adit. Inter hæc duo organa partim
ascendens, partim descendens, nitēris obtuso cultello cautam uenam ex sinistro ipsius latere ab
arteria magna dirimere, membranosis fibris, quorum interuentu hæc uasa committuntur, disse-
ctis. In hoc opere duarum feminalium arteriarum radices in cōspectum uenient, eæque quò illæ
porrigantur commonstrabunt, si modò ab exortu eas arterias ex membranulis quibus inuol-
uuntur ad feminales uenas usque quibus tandem committuntur sedulo, nullaque in trahendo ui-
facta liberaueris. Hæc ubi præstiteris, uenæque cauā & magna arteria ut commodius in conspe-
ctum ueniant, membranulis fuerint detectæ, ramos quos in ipso per uentrem ductu emittunt
examinabis, ac primum ^r uenas renum pinguibus membranā implexas, & deinde magnæ arte-
riæ ac cauæ ^s propagines renibus serofum sanguinem deferentes. Horum origine citra omnem
sectionis operam inspecta, uenæ cauæ propaginē dextro reni propriam suis membranulis dete-
ges, & deinde renis quoque pinguem membranā unguibus lacerans, quo pacto illi ^t inuolui-
tur diligenter examinabis. Denudato rene ^u urinarius meatus quæ ex rene prodit, cultello est in-
quirendus: deinde & arteriæ magnæ propago dextrum renem accedens, quò simul integer ren-
uena & arteria & urinarij meatus principium conspiciantur. Licebit modò aut totam renis na-
turam examinare, aut quousque alia quædam dissecueris, renem relinquere. ^v Vt cumque uero id
modo postea ue feceris, uenæ cauæ, arteriæque magnæ propagines uinculis iuxta renis cauum
intercipi debent, & deinde nouacula acutiori sectio recta secundum renis longitudinē in ipsius
gibbo uersus cauum est ducenda, renque bipartitus aperiendus, sanguisque, si quis sit, spongia
madente eluendus uenit. Ita enim ilico renis sinuum natura, deinde & urinarij meatus princi-
pium intuebūtur, nisi cadauer nactus fueris obesus. solet enim pinguetudo in secundo huma-
ni renis sinu collecta, impedimento esse, cur minus sinuum natura penitus secanti occurrat.
Quapropter operæ precium fuerit, canis renem diligenter prius examinare, & ex illo dein hu-
manum cognoscere. Diuiso igitur secundum gibbum seu exterioris lateris rene, primum digito
sinus secundus in quem urina colatur latera inquires, & foraminis quod in medio ipsius, seu in
primi sinus membranei renum corporis externo latere apparet, stylum immittes, qui in urina-
rium meatū uersus uesicā facile protrudetur. Deinde ubi membranei huius corporis primi ue-
renis sinus anteriorum ramorum cum posterioribus ramis coitum, qui non procul ab externo
renis perficitur latere, obseruaueris, ut illorum ramorum ductus, & primi sinus reliquum cor-
pus & secundus sinus formam naturamque adinuenias, eā sectione diuisum & adaptum renem
uicissim claudes & recludes, quo mutuis nuper dictorum ramorum coitus manifestius appa-
reat: dein stylum secundo sinui indes, & ubi ipsius formam expendieris, ab anterioribus primi
sinus ramis eam renis præscindes substantiam, quæ posteriori illarum sedi obnascitur: à poste-
rioribus autem ramis eam adimes, quæ illarum anteriori sedi continuatur, ut modò integer ap-
pareat

h Quasi B.
B. C. di-
scipulus
ab A. m. 14
bul. 19 fig.
1 vt in 4. 14
bul. 19 fig.

m Vt in 17
figura.
n 15 fi. R.

o 20 fig. b.
25 fig. g.

p 20 fi. b. i.
25 fi. g. b.
q 2 fig. f. 25
fig. d.
r 20 fi. k.

s 20 figura
X. X.
t 20 fi. 4. b.
22, 23 fi. m.
n 25 T. V.
u Coniur re-
nes 20 figu-
ræ cum re-
nibus 22 fi.
x 20 fi. c. d.
22, 23 figu-
ræ 25 uic.
y Hic sectio
mesenterij di-
genter ob-
seruabis 14
bellus figu-
ræ 21.

pareat primus sinus, cui modò stylos, quo illum adhuc exactius cognoscas, indere possis, & admirari quàm ridicula ab Anatomis professoribus de renum officio fuerint hactenus prodita. Cæterum tunica præter pinguem membranam renem inuestiens, facile tibi occurret, si sectionis in renis gibbo ductæ labris animum adhibueris. solet enim ea tunica ibidem tunc nonnihil à renis substantia abscedere, & dein promptè ad renis usque cauum unguibus diuelli, ac qualiter hæc è renis uenæ & arteriæ membranis pronascatur, conspici. Hæc ubi in dextro rene intuitus fueris, sinistrum quoque sua pingui membrana liberabis, & uenæ cauæ & arteriæ ramum uersus ipsius cauum excurrentem inuestigabis, animum priusquam aliquid diuellas, sinistræ feminali uenæ adhibens, quam ex medio uenæ ductu enasci citra sectionem utcumque conspicias. Vt uerò ritè intuearis, num à renis sinistri quoque arteria, seminale uas originem ducat, obitum admodum cultello (nisi fortè secandi peritior fueris) membranulas à renis uena detrahes, & accuratè aliquoties uenæ feminalis principium quoque à membranulis liberabis: dein uenam renis ab arteria nonnihil deorsum reflectes, numq̃ ex ipsius ductu ramus qui sinistræ feminali uenæ exporrigitur, principium obtineat, inquires. Vbi uerò hunc non inueneris, sinistro rene pariratione atque dextro (si modò illum secuisse non suffecerit) aggresso, feminalium uasorum constructionem examinato. Arteriarum & sinistræ uenæ originem iam prius indagasti, ac dextræ etiam uenæ principium citra sectionem à caua oriri conspicitur. Vbi igitur ortum didiceris, & uenas ad arterias usque sensum ex membranis ipsas liberans deduxeris, si masculi obtigerit corpus, penis cutem & scortum à testibus adimes. Primum itaque à pubis osse recta sectione per penem in cute duces, & deinde eius sectionis labris hamulo aut unguibus eleuatis, cutem cum carnosa membrana à pene auferes, adamussim considerans in cuius extremo ipsius cum carnosa membrana coalitum, & carnosæ membranæ sub glande à penis corporibus abscessum. ad hæc, perpendes ipsius ad glandis radicem ligamentum, deinde & uenas cutem eam aduantes, postmodò nullam pinguedinē adipem uel inter cutem & carnosam membranam, ut neque in palpebris hic reperiri, ac proinde leui occasione, ut illas hyatide aut inflatione penis cutem infestari. Pene detecto, & deductis cruribus à pubis osse inter inguina & sinistrum testem sectio ad podicem usque ducenda est, & deinde cum penis cute scortum à testibus & interfeminio liberandū, sectionibus semper uersus dextrum latus deductis. Quum uerò testes cute carnosâq̃ membrana nudas, ne testes suo loco moueas inuertas uel, accuratè obseruandum est. Quum primum enim cute nudati sunt, ipsorum situm, & cuiusnam potissimum parti uasa feminalia illis applantētur, indagare oportet, ut Naturæ discas providentiam, quæ testes ita collocauit, ut ipsius uasa sint tutissima, illisq̃ ipsi testes uelut propugnacula præponantur. Iam dextrū testem cum ipsius uasis & tunicis à sinistro digitis aut cultello dirimes, & iunctis cadaueris cruribus dextrum testem femori impones, ac mox cultello uenam & arteriam feminales dextrilateris, uicinis membranulis ad peritonæum usque quæ illæ procidū, deteges, hic primum in interiori sede peritonæi, postmodum in exteriori qualiter transeat solis manibus considerans. Dein stylum foramini quæ egrediuntur uia ad testis usque in finem sedem protrudes, & peritonæum usque ad foramen qua uasa transmittit diuides. Insuper secundum styli longitudinem cultello foramini quoque indito, ad humilimam usque testis sedem primam ipsius peculiarem tunicam secabis, & reposito cultello, distentaq̃ tunica huius à peritonæo ortum, & ualidum ad humilimam testis partem adnexum, præterea & testis musculum examinabis huius nanque natura, ductus & forma in conspectum ueniunt unā cum gracilibus ramulis à uena & arteria in hanc tunicam numerosa serie excurrentibus. Hæc tunica relicta, testem & uasa nunc rursus hinc inde diligentius subleuans, reuoluensq̃ uenam, arteriamq̃ ab ipsis contemino semen deferente uale ad testis usque elatiora discernes. Vt uerò uenæ arteriæq̃ inferiorem adamussim discas, uas semen deferens à proxima testis corpori tunica est liberandum, non quidem uniuersum, sed ad eam usque partem quæ uenæ arteriæq̃ sinibus est proxima. Liberabitur uerò uas ipsum facile, si transuerlas sectiones inter testem & uas illud ad suum usque principium acutiori nouacula duxeris. Hæc siquidem administratione uasis illius anfractus, & ad testis connexū, ortumq̃ manifestè animaduertes. Verū nulla ipsius cauitas, neq̃ quo pacto illud à teste semen assumat, in conspicuo erit. Hoc enim nihil, nisi porosum quid quæ testis adnascitur referet, nullo meatu manifestè ex teste in ipsum pertinere. Semen deferenti uale ab intimo testis inuolucro ad eum modum liberato, uenæ ac arteriæ anfractuum ramuli proximæ testis corpori tunica oblatis melius cōspiciuntur. Vt uerò prorsus in conspectum ueniāt, sanguinem ex anfractibus ad testem comprimes, & deinde quæ ex tunica testi proxima, & ex anfractu sine rami ad testis substantiam excurrant, qualiterq̃ testi ea tunica com-

Vasorum sinistrū testem perentium ortus examen.

Testis et penis à suis inuolucris detectio.

Testium sinistrū examen.

Exteriori testis tunica a peritio, uasorumq̃ feminalium detectio.

Vasorum feminalium circa testem ac ipsius aduò testis examen.

mittatur, quæq; testis sit substantia, obseruare. Atque hæc primùm in uno quidem teste, dein in altero sunt examinanda. Quippe uix prima fronte hæc omnibus trunt obuia, quum hæc nemo hæc assecutus fuerit. Vnde etiam eadem administratio perpetuò non est utendū, sed quum commemoratam in dextro teste tentaueris, integrum tibi erit sinistrum tuo arbitratu aggredi. Examinatis ad hunc modū testibus, ipsorumq; nihil reiecto, penis musculi & ipsius corpora, deinde uesica & urinarij meatus, & reliquus semen deferentiū uasorum ductus, insertioq; cum adenofo assistente, & omnium uenis, arterijs, & nervis secanda ueniunt. Diductis

Penis musculorum examē.

Penis corporum ureus, & urinatum, arteriarum, & neruorum huc pertinentium examē.

Pubis ossa quid examē.

Urinarium meatum ad uesicam, & uasorum semen deferentium ad glandosum uesicæ corpus examē.

Caua & arterie magnæ distributionis sub ossæ sacro.

Musculi ceruicis uesicæ, ipsiusque uesicæ fundi & ceruicis examē.

Penis corporum.

Recti intestini musculi.

itaq; cadaueris cruribus, & cute uti monuimus ab intersemineo adempta, primùm^a duos musculos ab orbiculari musculo recti intestini in penis radicem, & potissimum in meatum urinæ feminiq; communem pertinentes aggredieris, dein^b alios duos, qui ab humiliori pubis ossium sede originem ducentes peris corporibus inseruntur, adimes, ac ilico penis corporum^c originem examinais, acuto cultello dextrum corpus ab ossæ unde pronascitur, quam poteris proximè diuidens. Deinceps uerò in penem excurrentibus uenis, arterijs & neruis perfunctoriè hic perpenis, ossa pubis inuicem sunt^d seiungenda. quod fiet ocyus, si uesicæ corpus à peritonæi parte pubis os succingente, cultello diremeris, & deinde cultro quam minimè crasso pubis ossium^e cartilagine recta sectione penitus diuideris. Nouacula enim quum crassior sit, illi officio non æquè est accommoda. Mox uno cadaueris crure in mensa relicto, & alio ab illa propendente, ita cadauer in mensa reclinabis, ut ipsius os sacrum mensæ lateri incumbat, & ui diductis cruribus, ad trium quatuorue digitorū latitudinem pubis ossa inuicem seiungas. parum enim aptè feceris, si pubis ossium^f portionē exemeris, quòd id & fiat incommodè, & præter alia multos ita uitaueris musculos, neque ullus postmodum ossium usus ad sceleti præparationem futurus sit. Quapropter pubis ossium cartilagine dissecta, & dein ipsis ossibus ui diremptis, primùm à renibus^g urinarij meatus à suis membranis quibus obuoluuntur sunt liberandi, atque ad uesicæ usque corpus perducendi; deinde^h uasa semen deferentia quæ ad pubis ossa deorsum in peritonæi amplitudinem reflectuntur, pari modo ad glandosum assistentem usque expinguioribus quibus integuntur membranis denudandi, atque in eo opere sodalis manu uesicam modò in dextrum, modò in sinistrū comprimere est necessarium, idq; maximè quum uenæ caue & magnæ arteriæⁱ seriem hac in sede inquireis. Hæc nanque iam uenit expendenda, ac primùm rami quos uena & arteria lumborum uertebis & spinæ, ab dominisq; musculis & peritonæo exporrigunt, qui omnes sunt repertu faciles, si uenam & arteriam nunc in hoc, nunc in illud latius ualidius reflectas, &^j neruos qui sub illis feruntur obtulo cultello quoque inquireas, ac demum ad ipsorum quibus inseruntur organa deducas: illos dico, qui testibus & uesicæ fundo exporriguntur. Porro rami uenæ ac arteriæ post ipsarum super os sacrum bipartitionem excurrentes, in cōspectum uenient, si radicibus semper animum adhibueris, & cultello retusiori, ne ramorū aliquem uitias, ipsorum sequaris processum ductumq; : & id eo leuiori præstiteris negotio, quo nostras uasorum delineationes diligentius operi accommodaueris. Verum ubi hæc diligenter eris intuitus, sinistrum penis corpus à pubis ossæ etiam dirimito, & quam poteris commodissimè uesicam, ipsiusq; ceruicem à recti intestini termino, cui fortium fibrarum interuentu hæret, diuidito, abscictis interim uenis & arterijs in uesicā penemq; excurrentibus: quas si prius uinculis fortè interciperes, parum profectò sectioni obesses. Vesicam modò simul cum pene exemptam, alteri cruri aut asserculo impones, & denuò seminalis uenæ ac arteriæ ductum uersus testem, & à teste dein semen deferentis uasis ad glandosum assistentem progressum obseruabis, quo denuò exactius seminalium uasorum harmoniam expendas. Post hæc musculus uesicæ meatui præfectum examinais, & oblongiori stylo penis glandi ad uesicæ usque fundum imposito, uesicæ meatum à glande ad ipsius usque fundum cultello secundum stylum porrecto^k diuides, ut simul uesicæ cauitatem, & ipsius tunicā, & urinam deferentium meatum insertionem, & semini urinæq; communem meatum peni exporrectum intuearis. Alicubi igitur urinarium meatum ex renibus in uesicam pertinentem forato, stylumq; ad uesicæ fundum usque indito, ut^l membranulas meatus illius ori in uesicæ fundo connatas species, quanquam etiam integrum sit, ex uesicæ fundo stylum ipsius meatibus indere. Corpus uerò glandosum semen deferentium uasorum suscipiens implantationem, ut lubet poteris discindere, & quo nam pacto ea uesicæ meatui immittantur perquirere. Postremò uesicæ ceruicem à duobus penis corporibus ad glandem usque cultello secernes, ac deinde duo corpora quoad poteris inuicem dirimes, quamq; habeant formam, quæq; natura ad glandem sint prædita conspicias. Vt uerò adamussim ipsorum discas substantiam, peni nunc transuersas, nunc longas, rectas^m ue sectiones induces. Reiecta modò cum suis appendicibus uesicæ, tres recti intestini musculos, &ⁿ uenas examinais, quæ à portæ uena huc deducuntur, & quæ caue hæc in parte sunt soboles,

p. 1, 2 fig. ca.

49 lib. 2 H. 1, ad M ad G.

q. 1, 2 fi. ca.

49 lib. 2 L. K in A, B.

r. 2 fig. cap.

49 lib. 2 C.

C.

s. Vti scilicet

cernis 22 fi.

t. ultimaria

fig. li. 1.

u. 22 fig. q. q.

ad 7.

x. 22, 23 fi. n.

1, n. uerf. f.

p. 19 hanc

ex fig. ca. 6

et ca. 12. et

ultima li. 3.

x. infimifur

culi fi. 2 ca.

2 lib. 4.

d. 22, 23 fi. 4.

b. Vti scilicet

est in dex-

tra figura

23 fig. r.

c. 23 fig. r.

d. 8 fig. d. 6.

c. dein d.

fi. ca. 5 li.

3, c.

foholes. Vbi id quoque præstiteris, recti intestini finem ex corpore exsectum abijcies. Deinde
 210 fig. Q. cauam uenam qua primum sub iecore conspicitur, & magnam arteriam quæ septum transit,
 211 fig. h. deinde ipsarum præcipuos ramos crus adeuntes uinculo duplici intercipies, ut simul cum re-
 7 mascul. tab. q. nibus si adhuc eos in corpore reliqueris, uenas omnes, arteriasque ex uentre auferre liceat. ita
 enim peritonæi discēs ortum, & musculos & neruos quoque crus petentes, si fortassis illos
 postmodum aggredi statueris, in corruptiores longè habiturus eris. Iecur autem, ut & antea di-
 xi, tantisper illæsum seruandum est, quousque cor respirationisque organa administrueris. Atque
 hæc quidem organorum nutritionis, generationisque in uiro est administrandi ratio, in muliere
 uerò erit huiusmodi. Primum mamillarum uisurus naturam, in cute ab ipso iugulo deorsum
 (ut in uiris) ad umbilicum ducenda est sectio: deinde à iugulo secundum clauiculā alia ad sum-
 mum usque humerum, cutisque à mamillis non aliter ac si in alia corporis sede, ea ab adipe diui-
 215 fig. A, B. deres, uenit liberanda. Mamillis cute detectis, & uenarum ramis qui à uenis in brachiū excu-
 3 mascul. tab. a. rentibus illis porriguntur, perpenſis, dextram mamillam à musculo brachiū pectori adducen-
 te aufero, uenarum arteriarumque examinans propaggines, ab illis quæ musculis thoraci incum-
 bentibus deriuantur, in mamillam assurgentes. Vbi mamillarum corpus à thorace fuerit libe-
 rum, & adeps undiquaque studioſissime ademptus, & uarijs per mamillarum corpus ductis
 sectionibus ipsarum substantiam condiscere licebit. Quanquam hæc quoque in uiro inquiri
 poterunt, is nanque si colore fusco & habitu sit obesiori, eandem quoque ostendet substantiā.
 Deinde & uenæ quoque & arteriæ sub rectis latitantes musculis, parī modo in ambobus, etiam
 si magis in muliere expenduntur, reliquaque administratio ad uasorum usque seminalium ortum
 216 fig. L. communis mulieri quoque censenda est. Simulatque igitur mulieris seminaliū uasorum originem
 217 fig. T. didiceris, solis manibus adinueniendus est uterus & uesica, insuper testes & musculi & uenæ
 218 fig. C. quæ cum arterijs uteri fundis & ceruici exporrectæ, priusquam scilicet aliquid diuidas. De-
 inde diductis cruribus à pubis offe utrinque secundum pudendi colliculos sectio in cute ad po-
 219 fig. C. dicem usque ducenda est, ut deinceps inguina aliquousque opportunè cute denudentur: & ea
 quæ in medio sectionibus intercipitur, uersus pudendum quoque à pubis ossibus separatur,
 220 fig. C. uuluaeque adhuc appensa maneat. Pubis uerò ossium cartilaginem, ut in uiris faciendum præce-
 221 fig. C. pi diuides, ac illis inuicē quam poteris maxime ui diremptis, mox cultello uenam ac arteriam
 222 fig. C. feminales dextralateris ad testem usque ex pingui cui obducuntur membrana nudabis, obser-
 223 fig. C. uans ne ramos ab illis priusquam anfractus suos constituent, in elatiorem fundi uteri sedem
 224 fig. C. exporrectos uulneres. Postquam uerò ad testem anfractus deduxeris, perinde ac in uiris ipso-
 225 fig. C. rum insertionem & deferentis uasis processum, ipsiusque in uterum insertionem, & testis sub-
 226 fig. C. stantiam formamque examinato, uas illud ex pingui cui inhæret membrana liberans, quæ re-
 227 fig. C. sperditionum alis imaginī multum accedit. Postquam hæc in altero quoque latere obseruaue-
 228 fig. C. ris, animam adhibebis uenis ac arterijs inferiori uteri fundi sedem, & ceruicem, uesicamque
 229 fig. C. adeuntibus, quæ in grauidis animalibus accuratissime, ut & illi qui à femininis uasis in uterū
 230 fig. C. porriguntur, usque etiam omnia uteri reliqua in conspectum ueniunt, quando quidem in illis su-
 231 fig. C. pra modum uenæ arteriæque turgent. Vrinarij meatus à renibus in uesicam pertinentes, simili-
 232 fig. C. ter ac in uiris ad uesicam usque à suis membranulis sunt emundandi, & deinceps uterus cum
 233 fig. C. uesica ex corpore eximendus, dissectis in ipsum & uesicam procedentibus uenarū arteriarum
 234 fig. C. & neruorum ramis, & membranulis uterum uasque illa continentibus, & fibris quoque quorum
 235 fig. C. interuentu uteri collū intestino recto ualide continuatur unā amputatis. Exempli iam uteri for-
 236 fig. C. mam contemplaturus, ipsius ceruicem inuolues, quo unā uesicæ ceruicis in illum pertinentis
 237 fig. C. foramen, & uteri fundi orificium citra aliam sectionem uideas, & modò opportune uesicam &
 238 fig. C. ipsius ceruicē musculumque urinæ meatui præfectū longa sectione diuidas, uesicæ amplitudinē
 239 fig. C. & urinariorū meatuum insertionem, ipsiusque ceruicis cum uteri ceruice coalitum inspeciturus.
 240 fig. C. Insuper uteri quoque ceruicē eodem modò ad illius usque os longam sectionem inferes, ac acu-
 241 fig. C. tiori nouacula uniuersum uterum secundum latera ab ipsius orificio ad cornua usque diuides.
 242 fig. C. ita enim illius sinum, substantiam, formamque exactissime cōtemplaberis. Porro si interdum gra-
 243 fig. C. uidæ mulieris cadauer nactus, & uterū duntaxat cum foetu, ipsiusque inuolucris intueri, animus
 244 fig. C. fuerit, ilico à mucrona pectoris ossis cartilagine, ad pubis usque os acutiori nouacula sectio-
 245 fig. C. nem molieris, quæ peritonæum quoque penetret: deinde aliam utrinque ab umbilico ad ilia
 246 fig. C. molieris. Hac nanque ratione ilico se uterus spectandum offeret: & si in alterum latus illum de-
 247 fig. C. truleris, uenæ & arteriæ ipsi insertæ supra modum apparebunt turgidæ, adeò ut ipsarum neque
 248 fig. C. series neque ortus citra aliam administrationem latere possint. His itaque uenis & arterijs unā
 249 fig. C. cum uenâ & arteriâ sub recto musculo conscendentibus, diligenter obseruatis, leuem sectionem
 250 fig. C. nouacula secundum uteri longitudinem tentabis, cauens ne altius quam uteri est crassities pe-
 251 fig. C. netres.

Peritonæi or-
 tus examinari.

Quis modi d-
 claua pueri u-
 ad uterū pueri
 in muliere sit.
 De uenarū
 examina.

Uteri ac uesi-
 cæ situs qui ob
 seruandus.

Seminaliū ua-
 sorum examina.

Uteri ac uesi-
 cæ situs qui ob
 seruandus.
 Vrinarij
 meatuum.

Forus ipsius
 que inuolucris
 examina.

netres, post hanc alias duas, utrinque nimirum unam duces, cum illa rectos angulos facturās. Sectionum labra unguibus apprehensa inuicē modicē dirimes, & uteri tunicam solis manibus à secundina sensim diuelles, uenarum arteriarumq; ora ex utero in secundinam pertinentiarum pens, quod in partui proximis feceris facilius. Exemptum ab utero unā cum suis inuolucris¹ fecit in peluim aqua plenam repones, atrum & uiridem quodammodo liquorem abluens, qui ex effractis uasorum oris promanat, secundinaeq; obducitur. Modò autē diligenter secundinae substantiam, & quaecunque in illa spectanda sunt unguibus aut cultello examinabis, id imprimis animaduertēs, num ipsa membrana quāpiā sit uniuerso foetui obducta: an tantum instar latoris cinguli sit, lienis substantia efformati. Atque hīc etiam sedulò expendes, qualiter secundinae substantia externae superficiei eius inuolucri pertinaciter obnaſcatur, quod farnicinis imā gini comparamus, secundumq; seu medium inuolucrum nuncupamus. Vbi itaq; secundinae naturam adamussim examinaueris, foetum hunc inde attolles, secundi illius inuolucri naturam consideraturus, quam simulatq; exteriùs inspexeris, atque quī totum foetum ambiat didiceris, cultello id alicubi pertundes, & foetus urinam profluere fines, ipsumq; inuolucrum à foetu² inuertes, atque ab umbilici uasis dependere tantisper fines, donec intimi quoque foetus inuolucris sudorem continentis harmoniam didiceris. Hoc itaq; pertusum & sudore euacuatum à foetu³ amoueabis, & ab umbilico etiam propendere fines, uasa umbilici inuicem disungens, meatum illum praecipue reperturus, cuius beneficio foetus urina in secundum ipsius inuolucrum perfertur. Inuenies autē hunc promptē, si cultello uenas & arterias qua umbilico proximae sunt, diuideris, ac meatum in ipsorum medio repositum indagaueris. Abscissis his umbilici uasis unā cum foetus inuolucris, & foetu in mensam extenso, à clauiculis per costarum cartilagineas ad pubis usque os sectionem in sinistro magis latere cultro aut nouacula molieris, quae in thorace & peritonaei usque cavitatem pertingit: deinde ab umbilico uenam in iecur & arterias, ad suos quibus inseruntur ramos, & meatum urinam deducētē ad uesicae fundum, paruo admodum negotio deduces, omnemq; foetus administrationem absolues. Nisi etiam uisum esset inquirere, num in foetu peculiaris aliquis processus⁴ à uena caua ad uenalem arteriam, & ab arteria magna in uenam arterialem pertineat. Acetabula uerò in oue aut capra sunt inuestiganda, utero utcunque uisum fuerit diuiso, abundē etenim fuerit uteri comparere cavitatem, quae in nō praegnantibus uaccis oppletur tuberculis ab illis non dissimilibus, ex quibus paulo post sanguis ē sede profluxurus est: aut si primo conceptionis tempore eiusmodi diuidatur uterus, tunc sinibus conspicitur decoratus, qui primū à uteribus dissectionis professoribus acetabuli nomen sunt emeriti. Atq; ita praesenti Capite partium quinto hoc libro traditarū administrandi rationem absoluiumus: itaq; corpus sectionis serie reliquimus, ut ad reliquarum partiū quas simul in illa administratione non recensui, demonstrationem neuiquam futurū sit inutile.

Umbilici uasorum examen.

Acetabulorum examen.

f. Vi. 2. tab. figure 30.

g. Vi. 3. tab. figure 30.

h. quādam 4. tab. figure 30.

i. Perit. ut 2. figure F, G, M, K, L.

h. A. C. figure 5. li. 6. m. figure 6. li. 6. m. figure 6. li. 6. m.


ANDREAE VESALII

BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPO

RIS FABRICA LIBER SEXTVS, CORDI IPSI QVE

famulantibus organis dedicatus, ac mox in fronte figuras sibi proprias offerens,
quò minus & hîc quoq; eadem figuræ uarijs Capitibus
passim præfigantur.

PRIMA SEXTI LIBRI FIGVRA.



PRIMAE FIGVRAE, EIVSDEM QVE CHARA-
cterum Index.

PRÆSENS figura tantam hominis in dorso cubantis partem ex sinistro latere com-
monstrat, quantam ostendende thoracis sedi sufficere arbitrati sumus. Ab anteriori itaq; tho-
racis sede et lateribus, ac dein ab aliqua colli regione cutem sectionis serie ademinus, ac dein mu-
sculis qui costis obducuntur resectis, costarum ossa à suis cartilaginibus unà cum pectoris osse li-
berauimus, & costarum ossibus uti intersecandum fuit effractis, costarum cartilagines sursum
uersus dextrum latus attraximus, ut thoracis amplitudo, hancq; intersepientes membrana, et pul-
mo, reliquaq; in conspectum uenirent, quæ modo in characterum Indice significabuntur.

- A, A* Sinistri lateris costarum indicantur cartilagines, unà cū pectoris osse, dextrosursumq; tractæ.
- B, B* Intercostales musculi interualla cartilaginum occupantes.
- C, C* Costarum à cartilaginibus seiunctarum ossa.
- D, D* Intercostales musculi interualla ossium adimplentes.
- E* Clauicula hic nuda, atque in sua sede adhuc asseruata cernitur.
- F* Venarum, articularum, neruorumq; in axillam perreptantium series.
- G* Exterior iugularis uena hic mox auulsa cute secantibus occurrens.
- H, H* Sinistra thoracis amplitudinem interdiuidens membrana: superficie ipsius sinistra hic conspicua,
quam etiam *L, M, N & O* indicant.
- I, I* Septum transversum ea superficie hic apparens, qua sinistram cavitatis thoracis sedem respicit.
- K* Sedes ubi interdiuidentium thoracem membranarum sinistra septo connascitur.

L Hæc protuberans sedes, cordis gratia hic in sinistrum adeo prominere, id namque una cum ipsius in uolucro inter membranas thoracem diuidentes comprehensum, in sinistrum longe magis quam in dextrum porrigitur. atque huius potissimum tuberis occasione præsentem figuram ex sinistro potius, quam dextro latere expressimus.

M Vena sinistro pectoris ossis lateri exposita, et sinistra thoracem inter diuidenti membrana uarios furculos offerens.

N Arteria sinistro pectoris ossis lateri exposita, et similiter ac uena *M* insignita ramulos sinistra thoracem intersepienti membrana exhibens.

O, O Ramuli à uena ac arteria deducti, quæ secundum pectoris ossis sinistrum latus à iugulo ad abdominis regionem pertingunt.


P, P Nervus septi transversi sinister, hic conspicue thoracem intersepientis membranae superficiei in progressu adnatus.

Q Vena in hominibus potissimum à iugulo una cum septi transversi nervo deorsum excurrere, et membrana thoracem intersepienti ramulos deriuans.

R, S, T, V Pulmonis pars sinistram thoracis cavitatem occupans, ac *R* et *S* huius partis sedem notant, quæ costis, seu ipsas succingenti membrana proxima est, gibba uernitur. *T* uero et *V* eius partis sedem indicant, quæ priusquam collaberetur, exteriori superficiei membrana thoracem interdiuidentis committebatur. Rursus *R* et *T* partis huius pulmonis superiorem insinuant fibram, seu lobum. S autem et *V* inferiorem.


SECUNDA SEXTI LIBRI

FIGURA.



- P R A E S E N S* figura, quam erectam, nō autem humi prostratam finximus, primam sectionis serie subsequitur. etenim anteriori thoracis sede & lateribus cute & musculis qui illis adnascantur, denudatis, ac costarū cartilaginibus ab ossibus liberatis, ipsiq; ossibus extrorsum effractis, tandem pectoris os unā cum ipsi coarctatis cartilaginibus ab utrisq; thoracem intersepiētibus mēbranis liberauimus, sursumq; deduximus, ut illius interior superficies obuia esset, et mēbranarum thoracē interdiuidentiū natura accuratiū adhuc quam in prima figura exprimeret.
- A, A* Pectoris ossis unā cum costarum ipsi commissis cartilaginibus interior, seu thoracis cavitatem spectans superficies.
- B, C* Duæ indicantur uenæ à iugulo pectoris os petentes, ac præter frequentes quas diffundunt ramulos, etiam ad elatiorem abdominis sedem excurrentes.
- D, E* Duæ arteriæ uenas nuper commemoratas ad umbilici usq; regionem concomitantes, nullibi tamē ut uenæ ad cutē subeuntes.
- F* Glandule sub elatissima pectoris ossis sede in iugulo repositæ, ac uasorum securæ distributioni à Natura præfectæ.
- G, G* Dextra thoracem interdiuidentium membranarum pars, quæ dextro pectoris ossis lateri adnascatur.
- H* Dictæ modò membranæ dextra, seu pulmonem spectans superficies.
- I, I* Sinistræ thoracis cavitatem intersepientium membranarum pars, quæ sinistro pectoris ossis lateri ante sectionem connata fuerat.
- K* Dictæ modò membranæ sinistra, seu pulmonem respiciens superficies.
- L, L* Intervallum indicatur inter duas thoracem intersepientes membranas inibi conspicuum, ubi humano pectoris ossi continuantur.
- M, M* Hæc protuberans regio cordis indicat situm. cor enim unā cum ipsius inuolucro immotum inter membranas thoracem sepientes collocatur.
- N, O, P, Q* Pulmonis gibbum sedes uē costis contermina indicatur. neutra namque ex parte pulmonis partes in latera refleximus. Verum *N* & *O* duas fibras dextræ partis pulmonis indicant, *N* quidem elatiorem, *O* uero humiliorem. atq; ita etiam in sinistro latere *P* & *Q*.
- R, R* Septi transversæ sedes, quā à mucronata pectoris ossis cartilagine hic *S* insignita, & dein à cartilaginibus quæ pectoris ossi non coarticulantur mucronibus, liberaui.
- T, V* Cutis deorsum à thoracis anteriori sede, euersa, atque ea superficie conspicua, qua musculis obducebatur.

TERTIA SEXTI LIBRI
 FIGURA.



QVONIAM duae praecedentes figurae cordis ac pulmonis siti abunde indicant, praesentem figuram (uti et subsequentes uniuersas) tanquam e thoracis cavitate euulsam delineauimus, ne si singulis figuris truncum corporis appinxissemus, negotium frustra operosius redderetur. Tertia itaque figura cor suo uestitum inuolucro continet una cum pulmone et septi transversae portione, cui in hominibus magna amplitudine cordis inuolucrum connascitur.

A Hic uenae cauae portionem sursum conscendentem et magnam arteriam praescidimus, tanta uasorum cordis asseruata portione, quanta cordis inuolucro obducitur, aut a qua id inuolucrum potius initium ducit. Vbi enim hic B ascripti, illic inuolucrum pertinacissime cauae uenae et magnae arteriae et uenae arteriali adnascitur, ab illis uasis non secus quam a corde, toto illo inter C uallo abscedens, quod a B ad C metitur. C enim cordis basis sedem regionem uel indicat. D, E, F Cordis inuolucrum anterior sedes, cordis figuram nuci pineae non admodum ab similem referens. D enim et E basin notant, F uero mucronem.


G Ab F ad G sedes insignitur, qua cordis inuolucrum septo transverso in hominibus secus multo quam in canibus adnascitur. Caeterum uenulae hic in cordis inuolucro conspicuae, non cordis, at ipsius inuolucrum sunt, id namque in hominibus tam crassum ualidumque uisitur, ut cordis color per illud uix transpareat.

H Septi transversae pars.

I, I Septi transversae ueni.

L, M, N, O Pulmo, at singuli characteres singulas humani pulmonis insinuant fibras, lobos uel.

QVARTA SEXTI LIBRI FIGURA.



QVARTAE FIGURAE, EIVSDEMQUE CHARA-
cterum Index.


HAE C figura cordis inuolucrum diuisum gerit, ipsumque cor et cordis uasa anteriori sede ab inuolucro deteximus, corde interim immoto.

A Sedes, qua cordis inuolucrum cordis uasis supra ipsius basin continuatur.

Cor.

- B, B Cordis inuolucrum ab anteriori cordis sede in latera reflexum.
 C, D, E Cordis anterior sedes. ac C quidem & D ipsius indicant basim, E uero mucronem.
 F Vena caua.
 G Arterialis uena.
 H Magna arteria. Venalis autem arteria nisi corde in dextrum latus (uti sexta ostendit figura) reflexo, nulla ex parte conspici potest.
 I Dextra cordis auricula.
 K Sinistræ cordis auriculæ apex.
 L, L Venæ sunt ac arteriæ à cordis basim cingentibus uasis pronatæ, atq; huc ex posteriori cordis sede, adeoq; sinistro ipsius latere antrosum reductæ.
 M, N, O, P Pulmonis indicantur fibræ lobæ ue.
 Q Septi transversæ pars.


QVINTA SEXTI LIBRI
 FIGVRA.



QVINTAE FIGVRAE, ET IPSIVS CHARACTERUM Index.

PRÆSENS figura una cum pulmonibus cor exprimit, uerum ab ipsius inuolucro penitus liberum: ac in sinistrum latus in hoc reflexum, ut uenæ cauæ ad cordis basim continuas oculis subijceretur.

- A Cordis dextrum latus, magnæ ipsius posterioris sedis regio.
 B Dextra cordis auricula.
 C Vena caua, quæ in cor dehiscit, aut ab ipso pronascitur.
 D Venæ cauæ portio, septum transversum permeans.
 E Septi transversæ pars.
 F Venæ cauæ portio iugulum petens.
 G Venæ pari carentis initium.
 H Arteriæ magnæ radix.
 I Arteriæ magnæ truncus, qui deorsum ad spinam explicatur.
 K Portio est nerui sinistri, sexti paris neruorum cerebri, à quo subsequens figura cordis neruulum deponi ostendit.
 L, M, N, O Pulmonis notantur fibræ.
 P Vasorum pulmonem aduentium hic aliqua series conspicitur.




SEXTAE FIGVRAE, ET IPSIVS CHARACTERUM Index.

- P R A E S E N S** figura cor in dextrum latus ita conuolutum proponit, quemadmodum mox praecedens id ad sinistram ostendebat reflexum, atque ut illa uenae cauae ad cordis basin continuitatem indicabat, ita praesens uenalem exprimit arteriam, ac sinistram cordis aurem, et cordis quoque neruulum, cuius ductus ut esset conspectior, arteriae magnae aliquot propaggines, et asperae arteriae et neruorum sexti paris cerebri portiones huic figurae adnexas reliquimus.
- A, B, C** Cordis sinistrum latus, et posterioris ipsius sedis magna regio.
- D** Venae et arteriae cordis basin cingentes.
- E, E** Venae et arteriae a uasis cordis basin ambientibus deorsum exprorectae.
- F** Sinistra cordis auricula.
- G** Arteria uenalis.
- H, H** Arteriae uenalis soboles in sinistram pulmonis partem excurrentes. Quae uero in dextram feruntur, oculis non patent: quod illarum radix sub corde mox in huius uasis ortu ad dextram pulmonis sedem prorepat.
- I** Venae arterialis principium.
- K** Arterialis uenae pars, sinistram pulmonis partem petens.
- L** Arterialis uenae pars dextrae pulmonis parti distributa, ac secundum posteriorem caudicis magnae arteriae sedem reflexa.
- M** Apex dextrae cordis auriculae.
- N, N** Vena caua.
- O** Magnae arteriae caudex.
- P** Magnae arteriae portio deorsum ad spinam detorta.
- Q** Magnae arteriae portio sinistram axillam accedens.
- R** Arteriae magnae portio iugulum petens.
- S** Arteriae magnae portio iugulum petentis dextra pars, a qua axillaris dextri brachij constituitur arteria T insignita.
- V, X** Soporaria seu somniferae arteriae.
- Y** Asperae arteriae caudex.
- a** Dexter neruus sexti paris neruorum cerebri.
- b** Ramuli, quos neruus a insignitus ad dextrum recurrentis nerui constitutionem digerit.

c Dexter

- c Dexter recurrens seu reuersus nervus.
d Sinister nervus sexti paris nervorum cerebri.
e Sinistri nuper commemorati nervi surculus, sinistra pulmonis parti oblatus.
f Ramuli sinistri nervi insigniti, a quibus sinister recurrens nervus constituitur.
g, g Sinister recurrens nervus.
h Neruulus secundum uenam arterialem exporrectus, ac cordis basis centrum adiens.
i, k, l, m Pulmonis indicantur fibræ.
n, o Septum transversum.

SEPTIMA SEXTI LIBRI FIGVRA.



SEPTIMAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

H A E C figura cor à pulmone & septo transverso liberum ostendit, cuius dexter uentriculus unica sectione adaperitus cernitur ab anteriori sede orificij uenæ caue ad cordis usq; mucronem ductæ, quò id orificium et ipsi præfectæ membranæ in conspectum uenirent. dein ut interior dextræ cordis auriculæ superficies oculis subiceretur, eam intro euerfam finximus.

A Venæ caue pars septum transversum permeans.

B Venæ caue pars iugulum petens.

C, C, C Orificium uenæ caue in dextrum cordis sinum pertinens.

D, E Orificia sunt ascendentis & descendents uenæ caue partium.

F Dextra cordis auriculæ inuersa, & inæqualem fibrosamq; ipsius notans superficiem.

G Coronalis uenæ principium.

H, H, H Protuberans in uenæ caue orificio circulus.

K, L, M Tres membranæ uenæ caue orificio præfectæ.


N, N Fibræ ab inferiori sede membranularum uenæ caue orificij, deorsum ad uentriculi dextri latera mucronemq; ductæ.

O, O Carneæ partes indicantur, quæ fibras nuper dictas amplexantur, teretemq; formam exprimunt.

P Hæc uentriculi dextri cavitæ uersus uenæ arterialis orificium pertinet.

Q, R Crassities substantiæ dextrum cordis uentriculum constituentis.

OCTAVA SEXTI LIBRI FIGVRA.



OCTAVA figura in hoc à iam præcedente uariat, quod ex dextri cordis uentriculi se-
de, inibi P insignita, sectionem duxerim in uenæ arterialis usque amplitudinem, ac eius uenæ ori-
ficium distenderim, ut membrana ipsius aptè in conspectum uenirent.

A Venæ cauæ portio iugulum petens.

B Arteriæ magnæ caudex.

C, D Venæ arterialis orificium. uerùm singuli characteres indicant singula foramina ramorum, in
quos arterialis uenæ caudex primum discinditur.


E, F, G Tres membranae arterialis uenæ orificio præfectæ.

H, H Cordis uentriculorum notatur septum, seu sinistrum latus dextri cordis uentriculi: atq; ita hic de
xtri uentriculi cordis uniuerſa amplitudo in conspectu est.

I Vna membranarum uenæ cauæ orificio adnatarum.

K Dextra hic pendet cordis auricula adhuc inuerſa, atque cum cordis substantia cui proxima est
reflexa.

NONA SEXTI LIBRI FIGURA.



NONAE FIGURAE, EIVSDEM QVE CHARA-
cterum Index.

HAC figura idem cor, quod duabus iam præcedentibus, ostenditur. uerùm hic una sectio ex
arteriæ uenalis orificio ad cordis usq; mucronem ducitur, ipsumq; uenalis arteriæ orificium unà
cum sinistro cordis uentriculo distenditur, apparentibus simul membranarum illi orificio præfe-
ctis, & inuerſa cordis sinistra auricula, ut & hæc internam ipsius superficiem ostenderet.

A Magnæ arteriæ caudex.

B Venæ arterialis portio.

C, C Venalis arteriæ orificium.

D, D Protuberans in uenalis arteriæ orificio circulus.

E, F, Duæ uenalis arteriæ orificio præfectæ membranæ.

G, G Fibræ ab humiliori dictarum membranarum sede deorsum ad sinistri cordis uentriculi latera
protenſæ.


H, H Carneæ cordis substantia, eas quas modo G & G insigniui fibras amplectens.

I Sinistra cordis auricula introrsum inuerſa.

K Septum cordis uentriculorum.

L Hæc sinistri uentriculi amplitudo ad magnæ arteriæ orificium conscendit, cuius membranas mo-
do explicaturi sumus.

M, M Substantia cordis, quæ sinistrum ipsius uentriculum constituit, crassities.



DECIMAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

H I C ex sinistri cordis uentriculi dextra elatioriꝫ sede sectionem ad arteriæ magnæ amplitudinē usqꝫ duximus, ut distīto eius orificio tres membranae ipsi præfectæ, in propatulo essent.

A Arteriæ magnæ orificium.

B, C, D Tres membranae arteriæ magnæ orificio præfectæ. uerū harum trium (uti inter disse-
candum crebro fit) una per medium dissecta est, & utrinꝫ una ipsius pars conspicitur. Estqꝫ
quam *B* insigniuimus.

E, F Principia sunt duarum coronalium arteriarum.

G Coronalis uenæ & coronalis arteriæ hic apparet portio.

H Arteriæ uenalis orificium.

I, K Duæ membranae arterialis uenæ orificio appositæ.

L Sinistra cordis auricula introrsum inuersa.

M Fibrae ab humiliori dictarum membranarum sede, ad sinistri cordis uentriculi latera per-
tinentes.

N Carneæ cordis substantia dictas nuper fibras adaugens, amplectensqꝫ.


O Portio uenæ arteriosæ.

P, Q Cordis substantiæ crassities, ubi sinistrum cordis efformat uentriculum, indicatur.

R Cordis uentriculorum septum.

S, S Hic ad arteriæ magnæ radicem dura & ueluti cartilaginosa cordis conspicitur substantia,
quæ dissectionis professoribus ossis nomine habetur.

VNDECIMA SEXTI LIBRI FIGVRA.




VNDECIMAE FIGVRAE EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

H A E C figura cor per transversum dissectum ostendit, ut cordis substantiæ secundū
ipsius uentriculos crassities in conspectum ueniret.


Bb i Cauæ

- A* Cavae uenae pars. *B* Dextra cordis auricula.
C Arteriae magnae caudex.
D Vena arterialis.
E Sinistra cordis auris, cui portio appendet uenalis arteriae. Atque hi characteres cordis basin insinuant. *F, F* Cordis mucro.
G, G Dexter cordis uentriculus.
H, H Sinister cordis uentriculus.
I, I Septum cordis uentriculorum.

DVODECIMA SEXTI LIBRI FIGVRA

DVODECIMAE FIGVRAE, EIVSDEM QVE CHARA
cterum Index.

- PRAESENT I figura anterior pulmonis sedes, à qua cor præsectū est, delineatur.
 quæ inferiori, terramq; spectanti bubuli pedis sedi non admodum imagine ab similis uisitur.
- A, A* Stomachi quo cibus in uentriculum fertur pars. *B* Aspera arteria.
C Vena arterialis. *D* Venalis arteria.
E, F, G, H Quatuor pulmonis fibræ, seu lobi. Verum *G* et *H* priuatim pulmonis sedem indicant, septi transversi gibbo thoracis amplitudinem spectanti congruentem.
I Septum transversum.

DECIMATERTIA SEXTI LIBRI
FIGVRA.

arterie serie digeritur, & calore singulis membris priuatim innatu reficit temperatq, quod ipsius diffusum est instaurans, haud secus sane atq membrorum substantia à sanguine per uenas adducto restituitur. Et quemadmodum respiratio & sanguinis ex ^k dextro cordis uentriculo in sinistram assumptus, cordi ad vitalis spiritus calorisq natui repositionem facit: sic pari ratione materia à sinistro cordis uentriculo per arterias reliquo deducta, corpori aliaru partium spiritum & natuum calorem recreat. Atque huius etiam occasionis gratia idem pulsus & respirationis usus censetur. quod enim inspiratio materiei in sinistro cordis uentriculo repositae praestat, id reliquis partibus in pulsu arteriarum dilatatio largitur: expiratio autem arteriarum contractioni correspondet. At quibus organis, incredibili diuinaq artificis ui fabricatis, haec omnia perficiantur, quaq ratione haec admiranda Naturae opera compleantur, iam ordine enitar persequi: ea interim non reperitur quae in primo libro de thoracis ossibus, & asperae arteriae cartilaginibus, ac in secundo de eorundem musculis, & in tertio de arteriaru constructione perfectus sum: Quapropter ut in libro hunc praecedente à peritonæo sermonis cibiac potius organoru initium opportunè instituimus, ita quoq & hic à tunica costas succingente nō immerito instrumenta aereae substantiae nutriendae dedicata auspicabimur.

h. Patet in
7. fig. 8.

R. respiratio
nis & pulsus
idem usus.

DE TUNICA COSTAS SUCCINGENTE. Caput II.

QUANDOQV IDEM costas succingens tunica aliud nihil quam membrana est, neque ita integrè à costis, ac peritonæum ab ipsi commissis musculis, liberari potest, eius delineationem aliunde sumere non licet, quam ex figuris internam thoracis amplitudinem superficiemq, exprimentibus, cuiusmodi imprimis censei potest octaua musculoru tabula: ac ex ossium figuris thoracis ossa simul proponētibus, ut duae priores Capituli decimionni libri primi, & tres ultimae eiusdem libri figurae.

Nomen & si
rus tunicae co-
stas succingen-
tis.



Magnitudo.

Figura.

Tunica su-
pericies qua-
les, quibusq, caru-
al alias par-
tes nexu.

TUNICAE membranæ ue costas succingentis, ac ^{secundis} Graecis, uulgo autem pleura dicta situm, nomen ipsius indicat: haec namque omnibus costis (praeterquam duodecimae à ^a septi transversae implantatione occupatae) praeterea & toti pectoris ossi subtensa, thoracis uero uertebrarum corporibus, & superiori septi parti thoracis amplitudinem respicienti obducta, si guram & magnitudinem totius thoracis cavitati correspondentem adipsi-
citur. Pertinet quidem parte ipsius posteriori à prima thoracis uertebradeortum ad undecimam, è cuius regione septi pars arteriam ^b magnam transmittens consistit. Anteriori autem ipsius parte à iugulo ad humillimam pectoris ossis partem, cui septum innascitur, descendit. In lateribus uero à prima costa ad superiorem septi superficiem, quam thoracis cavitatem respicere diximus, fertur, hanc uniuersam, ut & reliquam thoracis amplitudinem sublinens. Praesens itaq tunica, perinde atque thoracis cavitatis, figura admodum uariatur. Superiori enim parte, ut & thorax, angusta est, ac uelut in acutum definit. inferiori uero parte latior quam superiori existit, at in lateribus thoracis quoque modo latior, quam inferiori sede uisitur. Deinde anteriori parte breuior est, posteriori autem multo longior pro obliqui situs septi ratione existit. nam à pectoris ossis mucrone ad undecimam thoracis uertebram pertingit. Rursus anteriori parte, ut & in lateribus exterius, quemadmodum & thorax ipse, gibba uisitur: at posteriori secundum uniuersam longitudinem, uelut ad amplitudinem ipsius internam impressi-
nem peritonæi quoque ritu exigit, atque id ratione uertebrarum & radicum costarum, Ver-
tebrarum enim corpora in thoracis prominent cavitatem, ut & costarum radices, quae à uerte-
brarum corporibus retrosum tantisper reflectuntur, donec denuò uersus anteriora deorsum
procedentes obliquantur. Interius omni ex parte leuis, & ueluti aequo humore perfusa est, pre-
terquam ubi processus quosdam membraneos exporrigit, ex quibus aut alias educit membra-
nas, aut corpus aliquod sibi colligat. Fit autè id praecipue secundum uniuersam posterioris suae
partis longitudinem, ad uertebrarum nimirum progressum, ubi interserpientes thoracis mem-
branas educit, & ^a asperam arteriam, ^b stomachum, ^c magnam arteriam, & ^d sine coniuge uenam
firmat, & sibi ipsi haec uinculis connectit, illisq tunicas exporrigit. Pariter se habet secundum
ossis pectoris & septi quoque à pectore ad dorsum longitudinem, ubi interserpientes thora-
cem membranæ illi continuantur. Nonnunquam, sed admodum raro, non secus ac perito-
næo internae huius tunicae sedi adeps durior adnascitur, idque praecipue, ubi uertebris pro-
pinquior

a 7 muscul.
tab. 3.

b 7 muscul.
tab. 4.

c 1. fig. H, K,
L, O. 2. fig.
G, G, H et I,
J, K.
d 1. fig. ca. 38
lib. 1.
e 14. 15. fig.
li. 3. A, B, C.
f fig. cap. 12
lib. 3. i.
g fig. cap. 6
lib. 3. E, F.

pinquior est, quaque ipsius insigniores uenae porriguntur. Præterea modo in uno, modo in altero latere membranae fibras pulmoni applantat, quibus illum sibi admodum pertinaciter adnectit. Hoc enim non semel obseruauimus, idque potissimum in læuo latere, nō quidem ad costas duntaxat, uerum & ad septi^o partem pulmoni uicinam. In canibus uerò, suis, simijs id rarius, aut nunquam reperimus. Quinetiam in hominibus priuatim qua hæc membrana thoracis amplitudinem succingens septo obnaſcitur, cordis inuolucrum^h magna amplitudine ipsi coaleſcit continuaturque; haud secus, quàm si id hinc initium duceret. Porro hæc membrana superficie externa, quod undique adiacentibus partibus adnaſcatur aspera, inæqualisque, inuicem connexarum membranarum modo uiſitur, uix aliqua tamen pinguedine inibi obducta.

Insuper, ut neque peritonæum, præſens membrana non adeo pertinaciter omnibus partibus cohnata hæret. ualidius nanque costarum ossibus ac cartilaginibus tunica peculiariter unamquamque costam inuestit, cuiusque mox meminero, interuentu adnaſcitur, quàm internæ intercostalium musculorum sedi. Sic quoque septi carnosæ parti longè remissius quàm neruosa com

mittitur. Quod autè similia cum septo foramina peritonæi modo hic adipiscitur, perspicuum cuius esse arbitror. quâ septo namque obducitur, ternis foraminibus est peruium. uno quidem uenæ caue caudici parato, secundo autem stomacho, tertio uerò magnæ arteriæ & uenæ paricarentis fini. In iugulo amplo continuoque foramine non pertunditur, uerum quæ eam inibi præceptant uasa pluribus foraminibus cōplectitur, ipsique adnaſcitur, & tunica aliam à propria illarum ipsi offert. transmittit uerò hîc uenæ caue & arteriæ magnæ^h ramos, ad hæc stomachum, asperam arteriam, sexti paris neruorum cerebri^h neruos, & septi transuersi etiam

neruos. Postremò secundum posterioris ipsius sedis longitudinem utrinque ordinata serie perforatur, uenis ac^h arterijs costarum interualla petentibus uiam præbens. Substantia deinceps constat membrana, dura scilicet & tenui, alba, æquali, & robore nō nihil peritonæum superante; uerum similiter ipsi quoque peritonæo huius substantia ad dorsum durior quàm iuxta pectus fenitur. Ipsius namque origo à uertebrae ligamenti illarum corpora cōnectentibus potissimum pendet. Porro uenis ac arterijs & neruis quoque abundat, ac primum quidem in posteriori parte ipsi uena coniugis expers adnaſcitur: deinde & magna arteria. in lateribus uero subtenſas exigit longas, neque eas ualde graciles uenas & arterias, quæ singulis costis exporriguntur. Priori autem parti^h uasa ipsi incumbunt, sub pectoris osse deorsum ad abdomen su

periora proræptia, & ramos in costarum cartilaginum interualla digerentia. Neruos quoque adipiscitur quamplurimos; quippe in iugulo transmittit maximas sexti paris neruorum cerebri

portiones, quæ in pulmonem, uentriculum, & iecur distribuuntur, neruosque recurrentes germinant. Deinde etiam ibidem iter, uti diximus, præbet septi^o neruis, à quibus innumeras soboles tunica hæc mutuatur, quâ septum succingit. Atque hos quidem neruos intus complectitur, exterius autem^h magnos, eosdemque una serie ad singula costarum interualla deductos ob

net, qui huic tunicae una cum uenis arterijsque attenduntur. Præterea in posteriori sede utrinque ipsi subtenſuntur, sexti paris neruorum^h propagines costarum radicibus distributæ, ac tandem in nutritionis organa (uti diximus antea) diffusæ. Cæterum præter hanc costas succingentem tunicam singulis costis^h alia peculiaris obgit, quam Græcos alteram succingentem costas membranâ uo caſſe reor. Tale enim quid in libro de Cōstitutione artis medicæ Galenus, morbi lateralis species subdiuidens, indicare uidetur. Est autem altera hæc succingens costas tunica inuolucrum, quod omnibus propemodum ossibus commune cenſetur, ea nimirum membra

na, quam quod os ambit, *σπείρας* Græci nuncuparunt. Quemadmodum enim ossa huiusmodi membranula obcingit, ita quoque & singulae costæ orbiculatim ipsas ambientem membranam exigunt, peculiare nihil ab eiusmodi cæterorum ossium membranis sibi uedicantem, quas

ossium diximus esse inuolucra, & uelut amicitia uinculum quo aptè durū os molli carni committatur. At thoracis cavitatem succingens membrana, quia amicum pulmonis ad costas contactum molitur, totius thoracis cavitatem uelut una superficie non asperam reddit. Deinde omnibus quæ thorax cōtinet inuolucrum quoddam euasit, unde etiam ab usu tunica (uti à sub

stantia, membrana) dissectionis proceribus uocatur. Ad hæc ipsa quoque, ut & peritonæum ijs omnibus quæ amplectitur organis tunicas exporrigit, eademque firmata colligat. Quod autem cum thorace distendatur, arceturque, neminem ambigere arbitror. thoraci enim undique adnata, tali constat substantia, qualis & inuolucris loco habetur, ac simul leuis sequaxque est. His

accedit, quod præſens tunica septo transuerso tenui & robusto interim opportunè factio, non inefficax robur adiungat, & in ipso, ut & in intercostalibus musculis, membranæ musculorum uentrem ambientis uicem abundè gerat: quanquam & propriam membranam intercostales musculaliorum musculorum modo obſcurè fortiri uidentur. Venæ autem & arteriæ & ner

uosi

uosi

Bb 4 ui

Tunica cost.
foramina.

Substantia
mea costas
succingentis.

Principium.

Singulis cor
stis peculiaris
tunica.

Tunica cost.
usus, et ipsi
us cōstructionis
ratio.

ui quibus tunica committitur, etiam si ad ipsius nutritionem & sensum usui sint, non tamen hu-
ius gratia præcipue, sed uicinarum partium, illi adeo frequentes attenduntur. Vnde etiam ipsi
& crebrior cum magna tensione & punctili cruciati, ut & in cerebri membranis, inflamma-
tio oboritur.

DE MEMBRANIS CAVITATEM THO- racis intersepiens. Caput III.

MEMBRANAS thoracis amplitudinem interdiuidentes non aliter oculis su-
bicere potuimus, quam id prima & secunda figura præstare conati sumus, uti ex illarum figu-
rarum indicibus petere licet.

Intersepiens
membrana
tunc nomen la-
tina.
NUMERUS.

Situs.

Forma. Ma-
gnitudo.

Quo pacto in-
tersepiens
membrana in
uicem distent.

Quid inter
membranas in-
tersepiens re-
ponatur.



MEMBRANA superiori Capite explicata, uniuersam thoracis cavitatem
succingit, sublimitq, at membranæ quas Græci *διαφραγματος*, nos autem
intersepiens thoracem, aut uulgò mediastinū nuncupamus, eandem ca-
uitatem interdiuidunt, in duas præcipuas amplitudines eam distinguen-
tes, unde & nomen suum meritò obtinent. Habentur autem in thoracis
medio utrinque^a singulæ secundum ipsius longitudinem procedentes,
à iugulo enim ad totam septi longitudinem pertingunt, & à rota pectoris
ossis longitudine ad thoracis usque uertebrearum corpora exporriguntur. Atque his etiam ter-
minis membranarum amplitudo circumscribitur, quæ triangulum quodammodo exina qua-
libus & obliquis costis lateribus uel cōformatum relett. una enim costa, quæ & breuior est, à iu-
gulo secundum pectoris ossis longitudinem ad eius mucronem, & septi hinc connexum fertur:
secunda uerò hac longior, à iugulo secundum dorsi ductum ad undecimam usque thoracis
uertebream procedit: tertia longitudine inter illas media, ab osse pectoris secundum septi longi-
tudinem declinans ad dorsum descendens, duas priores costas cōmittit. Præsentem membranæ
in mutua distantia & coitu plurimum variant. secundum dorsi enim longitudinem, quæ uer-
tebris committuntur, inuicem cōtiguæ sunt, & quàm minimam inter se cavitatem fibris mem-
braneis oppletant efformant. Quæ uerò pectoris ossi cōmittuntur, in homine quidem inuicem
neutiquam contiguæ sunt, imò pro^b ossis pectoris latitudine murò^c distant. Superiori enim
parte, ubi id amplissimum est, ac clauiculas primamq, utriusque lateris costam sustinet, mem-
branæ etiam inuicem admodum abscedunt: cavitatem nihilominus uniuersam, quam inter se
continent, fibrosis membraneisq, nexibus adimplent. Vbi uerò pectoris ossi secundæ costæ
cartilago coarticalatur, quemadmodum pectoris os hic arcuatus euasit, ita quoque dextra mem-
brana minus inibi à sinistra remouetur. Hæc membranarū disunctio sensim secundum ossis
pectoris longitudinem descendens, ut os ipsum latius efficitur, sic quoque & illa capaciore red-
dita magis diducitur, ita sanè, ut tanta in homine hinc membranarum cōsfurgat distantia, quanta
undique pectoris ossis cernitur amplitudo. Cæterum quæ membranæ septo transuerso^d com-
mittuntur, omnium maxime inuicem abscedunt, atque hic tantam efformant amplitudinem,
quanta septi transuersi membranei circuli est^e latitudo. Cavitatis, quam ibidem membranæ effi-
ciunt rarioribus membraneis fibris obsita, admodum ampla disseccatibus occurrit, atque huius
amplitudinis basis ad amissim correspondet figuræ membranei circuli ipsius septi, quæ latior
est quæ pectus quàm quæ dorsum respicit, latissima uerò in medio existit. Præsentis cavitatis in ho-
minibus nihil prorsus præter cordis inuolucrum, ipsumq, cor & uenam cauam septum pene-
trantem cōplectitur. In canibus uerò & reliquis animalibus longius pectoris os, longioremq,
thoracem possidentibus, amplitudo hæc multo capaciore uisitur, nullis membraneis fibris ob-
ducta. Dein eius amplitudinis basis à cordis inuolucris mucrone multum, secus quàm in homi-
nibus, ut mox subiiciam, distat. Ad hæc, præter uenam cauam illa quoque amplitudo in distis
animalibus pulmonis lobum continet, qui substerniculi & manus cuiusdam instar cauam ue-
nam hæc progredientem suffulcit. hoc enim homines quum breuiori ductu ipsi uena, quàm
illis animalibus ducatur, destituti sunt: quanquam Galenus ex simijs cōiecturam faciens, hunc
lobum etiam hominibus tribuerit, ut post eum reliqui disseccionis scriptores ad unum omnes,
qui nulla rei habita consideratione, neq, quicquam minus quàm Anatomen aggressi, nil nobis
aliud præstiterit, quàm quod pèperam plerq, ex Galeno descripserunt: neq, solum cum illo
ueritati pepercunt, uerum aptè à Galeno edocta admodum misere deprauantes, ac nescio in
quæ compendia fœdissimè confarcinantes, ut Galeni ueterumq, omnes de re Anatomica libri
& septo connascuntur, distantia est descriptio. Præter quam & alia uisitur, eas quas dixi sedes
nequa-

a 2 fig. dex.
tra G, G.
H. sinistra
1, 1 et K in
figura.

b 6, 7 fig. ca.
19 lib. 1.
c 2 fig. G. G.
distant ab
h. l.

d 1 fig. K.
e ab n ad l
7 muscul.
tab.

f 3 fig. C. D.
E, F, G. de
in quæ ha-
bentur in B.
B 4 fig.

nequaquam contingēs, & ad cordis effigiem formata. Præfentes enim membranæ in ipsarum medio cordis inuolucrum, uti diximus, complectuntur, & pro eius amplitudine formaq; dextra membrana à sinistra abscedit, & utraq; inuolucrum id adnatum exigit. Ad eò ut inter has membranas cordis inuolucrum, ob idq; & ipsum cor unà cum suis uasis contineatur, deinde et cauae uenæ caudex, & innumeræ membranæ fibræ membranas has inuicem quibus dixi sedibus colligantes. His in medio nulla, nisi id perquam rarò, adnascitur pinguedo: exterius uerò quæ quæ suam thoracis respicit amplitudinem, multa sæpe, ac præcipue in hominibus, adipe abundant, adeò ut omento quibusdam partibus similes, & pinguiore sèpius uideantur. Præter pinguedinem ipsis adnascitur glandosum corpus, uasorū distributionibus in iugulo præfectum. ¹ Venis ac arterijs abundant, sed tenuibus, ac illis quæ per omenti membranas digeruntur perquam similibus. Venæ quidem non à caua, ² ubi septum permeat (quanquam ita Galenus censuit) originem ducunt, sed potissimum ab illis quæ deorsum à iugulo pectoris ossi exporriguntur. Illæ enim uenæ ac arterij secundum harum membranarum ad pectus ductum descendentes, in progressu surculos dispergunt ex anterioribus in posteriora pertinentes. Deinde aliquot soboles his membranæ à uena coniugis experte offeruntur. At præter has plerumq; & potissimum in hominibus, ³ alia notata dignæ crassitudinis à iugulo secundum utriusq; membranæ longitudinē deorsum ad septū usq; deducitur, septi neruo cōcomitata. Septi enim transuersi nerui in externa membranarum sede ipsis adnati deorsum protenduntur, æquali ferè interuallo à pectore & dorso in progressu distantes. Atq; hi solum nerui cum uasis & adipe ⁴ externæ membranarum regioni, quæ pulmonem respicit, adnascuntur, & læuis quodammodo, & aqueo quasi humore oblita uisitur: interdum etiam aliqua ex parte pulmonem adnatum possidens. ⁵ Interna uerò membranarū sedes tum propter fibras membraneas, quibus inuicem membranæ committuntur, tum eas quibus ualidissimè citra adipis interuentum cordis inuolucro adnascuntur, utraq; asperæ sunt. At si quæ iuxta septum huius cavitatis regio fibris non obidet, ea quoq; læuis similiter & aqueo humore madens uisitur. Membranæ hæc tunica costas succingente tenuiores aliquantulo sunt, ab hac ex omnibus illæ sedibus ubi ipsi membranæ committuntur ortum ducētes. Sunt autem illæ sedes, uti diximus, pectoris os, septum transuersum & thoracis uertebrae, unde potissimum illæ membranæ enascuntur. Quæ primario usu in hoc creatur, ut cordis inuolucrum, ac proinde ipsum quoq; cor, ne deorsum ac retrorsum concidat, in sua sede continerēt, id enim & si ab alijs minimè animaduersum fuerit, uiuorum & mortuorum sectio luculentissimè (si animū modò adhibueris) ostendet, quacumq; ratione has membranas aggressus fueris. Deinde ad uasorum securiorem ductum auxiliantur, & postremò ex uniuerfa thoracis amplitudine duas efficiunt cavitates, qui usus haudquaquam minimus censeri debet: quandoquidem huius beneficio altera thoracis cavitatem pertusa, & pulmone hac sede propter aërem per foramen ingredientem à motu cessante, altera cavitatem adhuc illaefa animali famulatur, quemadmodum in uulneribus & uiuis sectionibus frequenter condiscimus. Num autem ab his membranæ, an uerò à tunica costas succingente organa in thoracis cavitatem reposita, tunicas inuolucraq; mutantur, hinc contentiosè haudquaquam disceptandum duxerim, quum planè idem usus, quod ad eiusmodi tunicas uasorumq; connexus spectat, harum membranarū & tunicae costas succingentis censendus ueniat. Præterea ne utiquam inuestigandum est, num una tantum in uniuerfo thorace costas succingens sit membrana, quemadmodum eam descripsimus: num uerò duæ, ut una quidē dextra esset, ea scilicet quæ dextrā thoracis cavitatem succingit, unā cum dextra intersepiente membrana: alia autem sinistra, quæ ibidem thoracis amplitudini obducitur, & eius sedis interdiuidentem membranam efformat, quod prorsus non esset absurdum, essetq; peculiaris differentia, qua succingens costas tunica à peritonæo distinguere-tur, quum id unicum reuera sit, illa autem tunc duplex censeretur.

DE ASPERA ARTERIA.

Caput IIII.

AD asperam arteriam harmoniam spectandam imprimis conducunt figuræ trigésimi octaui Capitis libri primi, deinceps quæ uigésimo primo Capiti libri secundi præponuntur: ac proinde de illas, earundemq; Indices intueri erit operæ precium.

IN

Quæ intersepiunt membra nariū substantiam subeant.

Pinguedo. Glandosum corpus.

Venæ, arteriæ.

Tum alibi sepius, tum sista in Aristotelem arguente constringens in 6 de Placitis Hippocr. & Platonis. Intersepientium memb. suæ perficiet & connexus.

Ovis intersepientium memb. Intersepientium membranae usus.



Altera ar-
teria nume-
rus.
Situs.

Ipsi commissi
corpore.

Altera ar-
teria forma.

N tertio libro, ubi arteriarum complectebam seriem, hæc cuius constructi-
onem modò persequi statutum est, simpliciter quòd aërem contineat, arte-
ria ueteribus Græcis primùm appellata dicebatur: at temporis successu,
quum & uasa¹ uitalem spiritum sanguinemq; impetu ruen-²te deducenia,
& in uenarum numero non amplius habita, arteriæ etiam nomine donaren-
tur, hæc quidem læues arteriæ, illa uerò aspera, ab inæquali qua cõstit sub-
stantia, nuncupabantur: eoq; nomine ad hunc usque diem aspera arteria
est obuia, non minus sanè quàm situs quoque ipsius, & numerus citra longam enarrationem
conspicui sunt. Vnica enim non hominibus modò, uerum & animalibus quæ pulmonem nan-
ciscuntur omnibus obtingit, quæ longo ductu, instar caudicis cuiusdam, ex faucibus deorsum
protenfa, frequenti sobole in pulmonis substantiam digeritur. In faucibus enim (quæ Græcis
φάεγγυς³ nuncupantur)⁴ duobus narium foraminibus in oris amplitudinè pertinentibus, alia
duo in humiliori faucium sede correspondens, quæ quidem nõ secundum latum, ut illa, mutuò
contermina, sed unum altero prius cernuntur. At horum quidem posterius stomachi cibum
potumq; ex ore in uentriculum deducens initium existit. Anterius uerò asperæ arteriæ princi-
pium est, quæ hinc deorsum rectâ nusquam in latum declinans, secundum ceruicis longitudinè
ad quartam usque thoracis uertebam ducitur, tota posteriori sede⁵ substratum habens⁶ stoma-
chum, uertebrearum corporibus, primòq; dorsum mouentium musculorum pari absq; alterius
organi interuentu innitentem. unde & aspera arteria à uertebreis tantum remouetur, quãtã⁷ sto-
machi est crassities. Anteriori autem asperæ arteriæ sedi non eadem toto ductu præterduntur.
In elastissima nanque sede, ubi oris amplitudini committitur, os ab v figura⁸ uadit nuncupa-
tum, ipsi cum illius ossis quoque⁹ musculis & cute prælocatur. Hinc uerò ad iugulum ac pec-
toris ossis elatiorem sedem usque, præter cutem & illi¹⁰ subditum ex carnosa membrana mu-
sculum, arteriæ asperæ obtenditur¹¹ bifidus musculus, qui à pectoris osse enatus, ossis v referen-
tis anteriori parti inferitur, & deinde¹² alij duo à pectoris quoque osse in scutiformis cartilaginis
humiliorem antiquamq; partem pertingentes, proximæ arteriæ hinc incumbunt. Vbi uerò tho-
racem hæc ingreditur, principia quoq; musculorum ex clauiculis & pectoris osse ad¹³ mamil-
illares in capite processus deductorum, tanquam propugnacula ipsi quoq; præfiguntur. In
iugulo¹⁴ glandium inibi uasorum diuarcationi subleruens, & uasa ipsa præter pectoris os illam
obtegunt. Quod tamen ipsius corpori proximum est, in iugulo quidem est glandium, & pau-
lo demissius in thoracis amplitudine¹⁵ ramus arteriæ magnæ in¹⁶ soporales arterias distributus,
quæ unâ cum sexti paris cerebri¹⁷ nervis, & internis iugularibus asperæ arteriæ lateribus uici-
nè attenduntur. dein ad laryngis radicem utrinq;¹⁸ glandulosum, sed rubicans corpus (quod
postea expressius describemus) ipsi adnascitur. Caterum quum primùm ad quartæ thoracis
uertebra¹⁹ corpus arteria aspera²⁰ descendit, in duos pares bipartita truncos, unum²¹ dextris pul-
monis lobis, alterum²² sinistris exporrigit, qui pulmonis substantia undiq; amplexi, parem cum
pulmone sedem occupant. Imaginem asperæ arteriæ uix ulli rectius quàm arbori assimilaue-
ris, cuius caudex in duos primùm ramos discissus sit, & hi rursus in innumerâs soboles diffusi.
Huius nanq; arboris à radicem propaginibus liberatæ ex terra prodiens initium, laryngi re-
spondebit: totus autem caudex reliquæ asperæ arteriæ parti à larynge ad quartam usq; thora-
cis uertebam protensa conueniet: arboris uerò rami eorundemq; innumeras soboles arteriæ in
pulmonem diductibus conferuntur. Vt enim caudicis initium radices educens, uarium, neq;
pari undiq; constans forma uisitur, sic & larynx asperæ arteriæ caput undiq; uariâ dissimilemq;
figuram exigit. Superiorem enim parte prout aut depressum aut erectum finxeris laryngis²³ oper-
culum, acuta aut depressa obtusâq; erit. Anterior autem laryngis pars, & latera quoq; anterio-
rem²⁴ scutiformis cartilaginis superficiem commonstrant, quæ secundum ipsius longitudinem
in medio extuberat, illinc lateribus obliquè in posteriora extrorsum procedens. Ad hæc, ut hu-
ius cartilaginis superior pars amplior longè inferiori in hominibus (secus quàm in bobus) exis-
tit, ita etiam laryngis superior sedes hinc latior inferiori cernitur. imò²⁵ humillima laryngis sedes,
quæ secunda laryngis constituitur cartilagine, amplitudinem latitudinem uel reliqui asperæ arte-
riæ caudicis ductus adæquat. Posterior laryngis regio, ac præcipua huius regionis sedes quo-
dommodo plana est, propter primæ cartilaginis quæ scuti imaginem refert, ad posteriora suis
lateribus progressum. aliàs enim hæc regio secundæ ac terciæ laryngis cartilaginum gratia,
paulo minus tota teres esset, uti sanè est humillima posterioris regionis sedes, haud aliter quàm
anterioris regionis humilior sedes, idq; occasione secu-²⁶dæ cartilaginis humilior prima proce-
dentis. In posteriori sede, prout tertia cartilago in laryngis cavitatem cõtrahitur, aut extrorsum
porrigitur, ita quoq; elatiore ipsius apices in interiora exteriora uel magis prominent, laryngis

figu-

a Figura 12
cap. lib. 3.
b 2 fi. ca. 12.
c Posse illa
ferre petere
ex 3 fig. ca.
21 lib. 2 u.
unum esse
inter L. 1.
l. alteri ue
ro ipsum su
perius H.
a 7 mus. ca.
E subyicitur
F. quod pri
usquã præ
junceretur
incidebat
super B. 1.
C. D.
d 3, 35 fig.
cap. 21 libri
2 H.
e 1 fi. ca. 22
lib. 2 A. aut
4 mus. tab.
F. ci. R. Q.
S. T. V.
f 3 mus. cul.
tab. r.
g 4 mus. cu.
tab. S. T.
h 5 m. f. 12.
alter P. uia
tur, aut 1 fi.
ca. 21 lib. 2 G.
in g. prima
figu. aut 4.
aut 5.
i 4 tab. o.
h 3 4, 5 fig.
ca. 6 lib. 1.
l 3 fig. F.
m 6 fi. R. fi.
per Y.
n fig. cap. 9
lib. 2 m. ca.
F. F. G. G.
o Eiusdem
fig. N. 10.
p fi. ca. 6 li.
3 S. aut 5 fi.
cl. hic ulti-
mam fi. 3.
q 2, 3, 4, 5
fi. ca. 21 lib.
2 M.
r 12 figu. B.
aut 5 fi. ca.
1 fig. ca. 38
lib. 1.
s 2 fi. E. G.
t 12 fi. F. H.
u hic sedu-
lo 5 fi. ca. 1
gura 38 ca.
lib. 1. 1.
21 lib. 2.
22 3, 4 fig.
cap. 11 lib.
2 L.
24 5 fi. ca.
21 lib. 2 g.
24 5 fi. 10 fi.
ca. 21 lib. 2.
25 fi. ca. 38
lib. 1.

figuram emutantes. Cæterum reliquæ asperæ arteriæ caudex (ut & arborum caudices solent) ad ramorum usq; diuicationem sibi similis est, non tamen absolutè. Nam quum concidit arteria, neq; aëre distenditur, anteriori quidem parte teres est, uerum paulo uidetur latior ac depressior, hinc ad latera orbiculatim ita ducta, ut in posteriora procedens, angustior fiat. Posterior autem sedes anteriori angustior est, planaq; ac uersus internam ipsius amplitudinem nonnihil orbiculatim impressa uisitur. Quum autem arteria distenditur, ipsius posterior pars æquæ ac prior, & magis quodammodo latefcit, atq; in posteriora tumens orbicularis ut illa efficitur. Eandem formam seruant omnes asperæ arteriæ in pulmonem sparæ soboles, quæ arborum ramis affilantur, & uniuersam seriem cum pulmonis figura parem efformant, in omnes ipsius partes frequentissimis germinibus, uti iam dictum fuit, excurrentes. Externa asperæ arteriæ superficies præter laryngis, quæ uaria est, inæqualis, sed interim ordinata serie procedens uisitur, ac quum aëre distenditur, posteriori quidem parte leuis instar continuæ cuiusdam membranæ est, à lateribus uerò & anteriori regione inæqualis: membrana, quæ cartilagine mediat, ipsis cartilaginibus magis extuberante, contrà uerò quum laxa cōcidit: nam tunc cartilaginee membranae substantia eminentiores protuberant. Ad hæc, instar membranarum quæ alijs connascuntur partibus, externa quoque arteriæ superficies aspera est. Posteriori etenim sedi fibrosis nexibus, sed modicis stomacho cōmittitur: uerum superior laryngis regio quæ cōmunem cum stomacho tunica sortitur, ualidissimè illius tunicae gratia ipsi cōnascitur: quemadmodum & larynx stomacho firmissimè musculorū opera connectitur, qui stomachū amplectentes, primæ cartilaginis lateribus implantantur. Anterior asperæ arteriæ pars attensis musculis & uasis, ac præcipuè recurrentibus neruis connascitur. Quinetiam ubi asperæ arteriæ rami in pulmonem excurrunt, propter adnatam ipsis pulmonis substantiā minus læues existunt. Cæterum interior superficies etiam si inæqualis pro cartilaginum extuberantiā semper sit, læuis tamen ac uelut unctuofo humore perfusa, neq; ullis fibrosis explantationibus aspera existit. & talis quoq; quod ad læuitatē spectat, interna laryngis est superficies: quamuis interim neq; orbicularis, teres uè, aut tubularis minime sit libera. In humillima enim parte, utcunque aut arcetur, aut diducatur, orbicularis ad amissim patensq; eodem semper modo, ob perforatum quem secunda cartilago efformat circulum, euadit. in medio uerò quum arcatur, penitus conuiet, non orbicularis quidem arcuq; orificij ritu, uerum rectæ instar lineæ seu rimæ ab anterioribus in posteriora protensa, quæ si dirimatur aperiaturq; ab anteriori parte sensim in posteriora tātisper latior efficitur, donec laryngis interior superficies tota quodammodo orbicularis teresq; intus spectetur. Quando hæc rimæ arcatur, & conuiet, ipsaq; inferior laryngis pars, quam secunda cartilago extruit, teres orbicularisq; necessariò permanet, utrinq; ad rimæ illius latera una conspicitur fouea, altius quodammodo quam rimæ superficies conscendens, unde etiam hic cornuta superficies sub rimâ confurgit. Superficies uerò laryngis supra rimam consistens, prout hæc aut recluditur, aut comprimitur, etiam differt, nunquam tamen penitus est orbicularis, sed pro rimæ compressu ex posterioribus in priora magis minusq; arcatur. Inferior laryngis operculi superficies concava, superior autem conuexa cernitur. Cæterum uelim hæc uitulina aut bouina larynge (si modo humana non suppetat) assumpta examinari potius, quam obscura difficultiq; enarratione discere. Ita enim quæ hic propter dictionis obscuritatem præterimus, absq; omni negotio sedula inspectione non sine magna admiratione occurrent. Sic quoq; singulorum substantiam & conformationē una atq; altera larynge utcunque etiam rudi fueris manu, dissecta adinuenies, potissimum quod laryngis ac reliquæ asperæ arteriæ substantiā in primo libro & secundo, quantum illic conueniebat, persequutus fuerim. In primo enim præter laryngis operculum, trium laryngis cartilaginum situm, formam, & quantum ad musculos in secundo libro intelligendos sat fuit, uniuersam illorum constructionem tradidi. In secundo cum cæteris musculis omnes laryngis musculos ac ligamenta, prout inibi eorum requirebat tractatio, aggressus sum. Quapropter etiam illorū, ut & laryngis & totius asperæ arteriæ, neruorū & uasorum descriptioni hic minime immorandum est. Non profectò quod scribendi laborem subterfugiam, uerum ne à more quopiam eadem inculcare dicar. Quamuis etiam in re non minus pulchra quam difficili, undecimo de Confectionibus administrandis Galeni libro, cum alijs quinq; & libro etiam de Voce, priuati sumus. Præterea septimi de Partium usu fragmentum nobis duntaxat asseruatum est, idq; uniuersum in eo libro deest, unde Galeni enarrationem peteremus. Quæ itaq; superioribus libris necessariò recensimus, hic nō alius repetentes, id solum adiungemus, asperam arteriam membrana cartilaginea formatam esse substantia: ac laryngem quidem tribus consistare cartilaginibus, ea nimirum quam scuto Græci assimilant: secunda uerò, quam quod nomine

Quales asperæ arteriæ exterior superficies.

Connexus asperæ arteriæ.

Interna asperæ arteriæ superficies qualis.

Asperæ arteriæ substantia.

Quibus cartilaginibus asperæ arteria cōstituitur.

mine destituatur, quasi sine nomine uocauerunt: tertia autem, quæ gemina est, quamque uerum orificijs, quibus aquam manus lauaturis affundimus, respondere arbitati sunt. Deinde laryngis operculum ipsius quoque conformationem ingreditur, quod ex cartilaginea membranaque & pingui substantia (quemadmodum & tertiæ cartilaginis superior pars) constituitur. Reliqui asperæ arteriæ corpus innumeris conformatur cartilaginibus, una serie eademque forma sese habentibus. Forma quidem circulo correspondent, cui quarta pars sit exacta, propius enim ad anuli circuli uel perfecti figuram quam quidam arbitrantur accedunt. Quod sanè is ad amulsi perpendicularis, ex quo Celsus primum quarti libri Caput uertit, in quo hanc cartilaginum imaginem dorsi uertebis comparat. Quanquā enim Celsus illius auctoris mentem parum aptè explicauerit, ex cartilaginum tamen uertebiarumque imagine leui negotio colligitur, illum autorem cartilagine non simpliciter uertebis contulisse: uerum duntaxat circumferentiæ superficiem quæ corporum thoracis & lumborum (non autem cervicis) uertebiarum. Horum namque corporum imago cartilaginum orbi ductuque quam simillima uisitur. Cartilagine hæ in orbiculo arteriæ figuram imitantur, corpus tamen ipsorum teres non est, sed quodammodo quadrangulare, multo interim latius quam crassius. Dein cartilagine hæ non eandem toto corpore seruant crassitiem: in medio enim crassiores sunt quam in extremis, quibus paulatim attenuantur, ac uelut in membranam degenerant. Extremis his stomachum respiciunt, media autem parte & crassiori anteriorem asperæ arteriæ sedem efficientes. Neque arbitretur quispiam (illorum sententia delusus, qui à perfecti circuli figura cartilagine solū desinere prodiderunt, ne arteria stomachū plus æquo comprimeret, uerum potius ut stomacho deglutiti cederet) eas hanc formam speciemque in caudice ipsius arteriæ duntaxat seruare: in pulmonis uerò substantia completos effici circulos, quandoquidem in pulmonis substantia perinde ac in caudice sese habent, & quod inibi aliter construi nequiuerunt, in arteriæ partium usus commemoratione ostendam. Cartilagine hæ continua serie ac æqualiter semper mutuò distantes in arteria collocantur, & non tantum inuicem distinguuntur, quanta illarum à superiori parte ad inferiorem latitudo, nisi quum arteria aëre turget: concidente enim arteria, cartilagine inuicem propinquius accedunt. Cartilaginum inter se connexum primum propriæ cuiusque cartilaginis membranæ interuentu perficitur. Quemadmodum enim omnibus ferè ossibus, & etiam laryngis cartilaginibus membrana quædam, eo quod ossium sit inuolucrum, nuncupata obducitur, pari quoque ratione circulares asperæ arteriæ cartilagine simili membrana integuntur, quæ ex demissioribus elatioribusque sui partibus processus exporrigens, illarum interuentu cartilagine inuicem connectit, uelut membraneum uinculum inter duas cartilagine sese respicientes efformans. Neque solum inter cartilagine, ubi ab inuicem æqualiter distant, eiusmodi confurgit uinculum, uerum etiam ab extremis cartilaginum partibus stomachum respicientibus similes membranei processus exporriguntur, ex quibus continuum quoque instar membranæ uinculum efficitur. His cartilaginibus membranisque aliæ duæ accedunt membranæ, ab ipso usu tunicæ non immerito appellatæ. Atque una quidem externæ arteriæ superficiem undecumque amplexatur, membraneis illis cartilaginum uinculis pertinacissimè connata. Hæc tenuis est, illisque tunica par, quas peritonæum & succingens costas membrana ipsis affirmatis uasis præbent. Præsentis tunicæ interuentu arteria conterminis partibus colligatur, ipsaque imprimis recurrentes nervos securissimè deserit. Altera arteriæ tunica hac longè dignior, internam uniuersæ arteriæ sedem succingit, atque ad cartilaginum inter se colligationis robur plurimum auxiliatur. Interior tunica exteriori multo crassior existit, quamuis etiam tenuis sit & ualida. Adnascitur uerò robustissimè cartilaginum proprijs membranis, & interna sede pingui quodammodo humore oblita uisitur, non undecumque eandem seruans crassitiem. Quum enim linguæ, labrisque & palato, & ipsi demum stomacho communis sit, in laryngis cauitate crassior euasit, & pinguedine inter cartilagine & externam ipsius superficiem obducitur. Vbi uerò rima lingula uel laryngis conueniunt, hæc tunica utrinque ad latera dura callosa que efficitur, ac cum substantia colorem quoque immutat: ut enim hic durior, tanquam à frequenti dum spiritum retinemus compressu euadit, ita quoque magis ibidem callosa reddita, candicat, albescitque. Ea parte qua tunica arteriæ ramos in pulmonis substantia diffusos succingit, sublimiue, tenuior longè quam in larynge uisitur: in caudice uerò arteriæ medio se habet modo. Per uniuersam tamen arteriæ cauitatem, hanc tunicam rectis fibris intertextam esse, ex sectione didicimus. Quæ etiam ostendit glandulas alterutra parte singulas ad laryngis radicem adnatas, quæ magnæ sunt & fungosæ admodum, carnis que propemodum coloris, sed magis nigricantes, & uenis satis conspiciuis obductæ, quarum in secundo etiam libro, quum laryngis prosequeremur musculos, memi-

Qui asperæ
arteriæ carti-
lagines inuicem
colliguntur.

Duæ aspe-
ræ arteriæ tu-
nicarum exte-
rior.

Interior tu-
nica.

Glandes la-
ryngis radici
adnate.

h figure cu
pl. 16 et 17
lib. 1.

i spectatur
id., 2 fi. ca.
18 lib. 1.

k Quia o-
iis modi me-
branarum ac
arteriarum tenu-
ium ratio
exteriorior
gani circuli
scriptio illa
que membra-
ne tantum
sunt, eas
nisi quæ de
lineamentis.

12 fi. ca. 21
lib. 2.

m 6 muscu-
tab. 1. et 2.
34, 5 fi. ca.
21 lib. 2. 81.

meminimus. Aspera arteria omni prorsus sanguine uacans, primario animanti ad aëris in respiratione transitum ductum ue confert, deinde & uocis organum facile est præcipuum. Atque his usibus uniuersa ipsius congruit fabrica. Ex faucibus enim aërem per nares, aut os attractum, recta in pulmonem ducit, hunc per uniuersum pulmonis corpus ita numerosa ipsius serie distribuens, ut pulmonis substantia hunc promptè alteret, atq; cordis muneribus aptum reddat. Cæterum quod pulmonis proprium sit munus, suo dicemus loco. nunc enim sat est asperam arteriam ita efformatam innuere, quod aptissime aërem dum inspiramus pulmone deferat, ac rursus omnem qui cordi inutilis est, unà cum fuliginosis ipsius excrementis inter expirandum reddat. Ad hanc functionem, asperam arteriam instar membranei meatus, qui facile inanitus concidere, atque rursus oppletus distendi posset, extrui conducebat. Quod enim nisi uacui fuga magnopere replendum est, ac rursus compressionis duntaxat ui inanendum uenit, distendi comprimiq; aptum esse oportet. Quapropter quum inspiratione aëris ue attractionem dilatati pulmonis gratia fieri omnibus concessum sit, pulmonisq; dilatatio aliud nihil censeatur, quam suorum uasorum distentio, non quidem simpliciter omnium, sed in primis asperæ arteriæ propaginem expirationem uerò rursus fieri constet, quoties pulmo in se colligitur, concidit & arctatur, eaq; ratione aërem in sua amplitudine (uide licet in asperæ arteriæ ramis) contentum exprimit, propellitq; cuius ratio cinari promptum est, asperam arteriam, ut & distendi in inspiratione & denuo comprimì in expiratione posset, debuisse fabrefieri. Verum ad has functiones sat erat hanc ex membranea quapiam carneaq; substantia, ut uentriculū, stomachum, aut arterias ipsas & uenas construī, neque illis quibus abundat cartilaginibus donari, ad cō sanè ut nunc frustra, quod ad aëris ratione uacui attractionem, & sui ipsius corporis ex illo distentione, & rursus ad aëris propter ipsius cōpressionē arctationemq; ac expirationē attinet, uel aliquam cartilaginem rerum Opifex ipsi largitus uideatur. tantum abest, quòd illi opificis industriam ostenderet, qui omnes asperæ arteriæ ramos in pulmonis substantia distributos ex cartilaginibus perfectos circulos constituentibus fabricatos finxerunt, & aliam hic asperæ arteriæ quàm quā stomacho prætenditur constructionem enarrarunt, haud perpendentes, si aspera arteria ita extrueretur, pulmonem neque distendi, neque laxari ita opportunè posse, aut saltem in longitudinem, aut breuitatem duntaxat, nō autem in amplitudinem asperæ arteriæ ramos proficere posse. Neque minus illi hallucinātur, qui asperam arteriam apertam patentemq; & non stomachi modo concidentem efformatam asserunt, quo aëris liberior esset ingressus & egressus: quando quidē hi præterquàm quòd laryngis arctationē dilatationemq; ignorant, cō uenere ruditis, ut ipsos lateat, si aspera arteria cum omnibus suis propaginibus semper æquē tensa aperta q; esset, pulmonem neque unquam cōstringendum aut dilatandum, nihilq; uacui fuga in asperam arteriam (ut quæ prius concidisset) attrahendum. Nam hoc uel ex folliis animaduertere debuerūt, quibus longē aliud artificium ad eam partem quæ aërem reddit, quàm reliquæ follium amplitudini adhibetur. Hanc enim artifices distēdi comprimiq; promptam reddunt, ut oppleri inanitiq; possit; non autem ita canalem quem rigidum faciunt, & distēdi comprimiq; ineptum. cuius naturæ si totus folles esset, quis omnem ipsius usum nos perdituros, ac instar lagenæ uitææ follem futurum ignorat? Atque huiusmodi membranæ substantiæ arteriam constituentis est ratio, quæ hanc membrancam debuisse fieri cōmonstrat. At cartilaginibus abundauit quoque, ut non modò respirationis, uerum & uocis organum fieret. Quemadmodum enim asperam arteriam leuium arteriarum modò, respirationis nomine membrancam confici idoneum fuisset, ita quoque ad uocem amplam, rigidam, duramq; prorsus fistularū, tibiatarum & cornuum ritu effingi debuerat. Quandoquidem ut uox fiat, symmetriam quandam esse oportet, & robur aëris ipsius & substantiæ ab ipso percussæ. Huiusmodi sanè substantia est cartilago, ex qua uniuersam arteriam tibiæ modò extrui sine ligamentis & membranis oportuisset. Verum quum absq; inspiratione ac expiratione uox fieri nullo modo potuerit, illaq; cōpressionē ac distentionē necessariò indigeat, meritò laudabimus summi rerum Opificis solertiā, qui asperam arteriam simul commodum respirationis & uocis organum molitus est. Atque tantum artificium in laryngis cōstructione ostendit, ut illa nunc magis, nunc minus claudi possit, & spiritum ipsum ex nostro arbitratu ad magnos sæpe usus retinere ualeamus, & uocem nunc grauē, nunc leuem, prout rimā illam (quæ profectò uocis primarium est instrumentū) arctamus uel laxamus. Hæc nanq; illa est, quam tibiatarū cōiunctis arundinum frustulis similem esse diximus: ac illi etiam rimæ respondet, quæ fistulis illis inest quas labris amplectimur. Congruit etiam usu, quamuis non forma, cornuum & tubarū orificijs, quæ ori illa instantes accommodamus. Deinde & organorum quoque fistulis, & illarum etiam fistularum foramini, quas transuersim inflamus, hæc rima comparatur. At larynx longē

Aspera arteria uisus, ipsiusq; constructionis ratio. Situs ratio.

Aspera arteriam membranæ substantia oportuisse extrui.

Cui cartilago asperæ arteriæ constructione subeat

Laryngis rimæ usus.

omnium fistularum artificium uincit. quæ ita efficta est, ut modo minus, modo magis eam laxare possimus, ac uarias uoces, non autem unicam duntaxat (ut artificum instrumenta) edere ualeamus: & tanta demum thoraci uis inditur, ut ex nostro arbitratu nunc multum, nunc parum aeris ad solam respirationem, aut ut etiam simul uoci, quam effingere lubet, aer inter expirandum sufficiat, emittere queamus. Quàm fuerit necessum secundam laryngis cartilaginem perfectum efformare circulum, & arteriam asperam hic ad laryngis radicem haud posse comprimere, animaduertes, si diligenter uocis generationem ex aere ab ampla uia in strictam, & hinc rursus in latam impetu deducto, fieri didiceris, atque simul⁶ gargareonem uocis plectrum & palatum instar rotundi ampliusq; spacijs constructum, & cavitatem super id in narium^o foraminibus apparentem, & quarti maxillæ superioris in altero latere ossis cauernas, ac dentes pariter & linguam, & labra rimatus fueris, ac demum musica artificum instrumenta, illarumq; partium usum his Naturæ operibus diligenter contuleris. Neque hic in nominum disceptationem incidere uisum est, rixose certando de rimæ huius & laryngis operculi nomine, quod falso uocis proprium, præcipuumq; organum plerique recensent, quandoquidem hoc nihil uoci, nisi fortassis ad illius aliquam modulationem accommodat, & duntaxat ut & in primo libro commemorauimus, cibi & potus inter deuorandū in laryngem casum prohibet. Nam præter hoc quod sensu id ad uocem nihil facere ex uera sectione perspectum habemus, ratione id alijs cognitum esse oportuerat. nam nullus unquam quo operculum id ageretur musculus, ab alijs animaduertus fuit, neq; etiam ullis mouetur quàm ijs^o quos ab offe^o referente in id inferi commenda^o ue subseruiat. Insuper eius gratia omnem laryngis cartilaginum fabricam extructam esse cognoscere, si uel minima Naturæ operū cognoscēdi scintilla arderis, neq; illorū scientiā, indignissimū qui à Natura creatus sit hominis modo, respueris: nam uel brui alicuius larynge in manibus assumpta, artificum in musicis instrumentis parandis industria Naturæ opera sectantem maxima uoluptate admiraberis. Quod uerò & reliquarum cartilaginum situs non uulgaris sit, omnibus quoq; notū arbitror. crassior enim ipsarū pars, quæq; orbē efformant, anterio^ori parti, & quæ iniurijs magis exponitur, prælo cata est. Vbi autem à perfecti circuli figura in caudice arteriæ necessariō propter inspirationē deficiunt, opportunē stomachum respiciūt, quō minus illum cōprimant, minusq; ipsius in ciborū assumptione distentionē præpediant: quum interim arteria inibi suscipiēdis noxijs inepta sit. Pariter etiam asperæ arteriæ tunica Naturā nō ofscitant extruxit, externā quidem, ut cartilagine instar inuolucrum muniat, atque ipsius interuentu arteria uicinis partibus colligata firmataq; securius deorsum prorepit. Interna uerò non solum cartilagine firmitus cōnexura, uerū eandem succinctura, atq; à grauioribus iniurijs munitura, crassior externa euasit, nō tamen talis, ut sua crassitie magnā arteriæ amplitudinē oppleat, & ad defendendas tamen cartilagine sua densitate & robore sufficiat. Sæpe enim aliquid pituitæ in uillis à capite per arteriā defluit, necnō potus aliquid & cibi inter deglutiendū in illam illabitur. Præterea acris quædā qualitas, uel fumi, uel cineris, uel carbonū, uel alterius cuiusdā facultatis medicamentosæ etiā inter respirandū attrahitur. Adde quod pus tussi expectorandū quandoq; sit malignū, erodens, aut alius quis humor, utpote flaua bilis, ac atra, aut pituita falsa intus putredinem experta, per asperam arteriā efferri debet: à quibus omnibus obducta cartilaginibus tunica, ne ille radantur, & rosione alterationemq; ab his nō sine graui ipsarū uitio sentiāt, præcauet. Atque ut larynx eiusmodi noxijs (nimirū ori uicinior) magis subijcitur, ita quoque & tunicam hanc paulo crassiorē obtinet, quàm extremi arteriæ furculi, in quibus tunica tenuior euasit, ne plus æquo pulmonis substantiæ aërem cordi temperatīs uim obtuderet, & aeris in uenalis arteriæ germinæ assumptionē, & rursus cordis fuliginosorū in asperæ ramos attractionē prohiberet. Carterū pinguedo inter tunicā hanc & cartilaginem in larynge potissimum reposita, ipsaq; etiam tunica pinguior simul cum uiscido quo undiq; hæc oblinitur humore, ad facilem aeris ductum cōferre uidentur, atq; etiā ne in magnis clamoribus, multisq; motibus excicetur, uoxq; deficiat, plurimum accommodare. Huc quoq; faciunt asperæ arteriæ ad laryngis radicem utrinq; appositæ glandes. humore siquidem meatum imbuunt, nō fluido quidem, sed uiscido & pingui, quemadmodum & ipsæ crassiores spissioresq; cæteris humorem procreantibus glandulis sunt. Quantus uerò eiusce humoris ad uocem usus sit, indies fistulas humectante oleo inungi uidentes docemur. Neque profectō eiusmodi humore procreando illæ tantum quas diximus glandes sufficiunt, uerū & aliæ laryngi accumbunt, quarum nunc situm, ut & gargareonis, opportunē subijciemus: dein pulmonis, in quem aer assumitur, constructionem pertractaturi.

Vocis generationem.

Laryngis operculum.

Cartilaginis coordinatio.

Asperæ arteriæ tunica apte extructa est.

Pinguis & glandularum laryngis ratio.

n 6 muscul. tab E. o 2 fi. c. d. 12 lib. 1 n. o.

P 2 3 4 fi. c. d. 21 lib. 2 K.

Caput V.

TRIPLEX glandium genus in faucibus repositum, ac præsentī Capite nobis describendum, in uarijs spectatur figuris. Ac primum quidē sexta musculorū tabula L. insignitur, & in secūda figura, tertia, quarta, quinta Capitis uigefimi primi libri secūdi M. Secundū ue rō genus sexta quoq; musculorū tabula F. insignitur, & decima quarta quinti libri figura E, E. Tertium autē prima musculorū tabula A. indicatur, & in quarta inter G, Q, Z. consistit.



QUONIAM nonnullarum^a glandium asperam arteriam humectantium paulo antē mentio incidit, aliāq; eiusdem functionis gratia creatā illis ac cumbunt, nō inopportune eas quoq; simul hic, de nominibus haudquaquā anxie disceptaturi, prosequemur. Non enim modō minus quā alibi, in genti nominum pelago fluctuamus: ex quo ut emergamus, fauces nobis ci tra omnem contentionem uocari liceat uelim, uniuersum spacium ab^b infe riori maxilla intus circumscriptum, illud dico, quod in profunditate ab in terna menti sede ad ceruicis usq; uertebras pertingit: in latitudine uerō, quicquid inter dextram inferioris maxillæ partem & sinistra habetur. Hoc enim φάρυγς ueteribus Græcis uocatum arbitror, quo nomine & laryngem, quod hac sede contineatur, potissimū donarunt: Suidæ distinctionem parum obseruantes, qua masculini generis uocem laryngi accommodat, fecerū nini uerō fauces. Eundem locum & ἰδούρ^c ab angustia nuncupasse uidentur, quod nulla in uniuerso corpore sit regio æquē angusta, & tot inter organa donata. Hac enim sede nariū^d foramina in os descendunt, & hic reponuntur larynx uniuersa, stomachi initium, linguae radix cum ossē imaginē exprimēte, ac numerosis illarum partiū musculis, præterea & muscu li maxillam mouētes, tum^e qui ab ossis cuneum imitantis^f processibus instar alarū efformatis originem sumunt, tum^g qui huius angustiae imprimis nomine duobus donati uentribus infe riorē maxillam deorsum uellunt. Adde præter tertij, sexti, septimi parium cerebri neruorum^h propagines, uenas iugulares, & arterias soporales, & quas nunc clubens enarrarem glandu las hic cōtineri. Est autem harum genus triplex, acⁱ unum quidem, quod ad laryngis radicem asperæ arteriæ lateribus adnatum, in præcedenti Capite recensuimus.^j Secundum uerō elatius laryngi apponitur: quippe in spacio quod nobis hiantibus medium inter narium foramina & laryngem apparet, utrinque in lateribus una reponitur glandula utcunque in^k fornis, & glandi forma perquam similis. Oblonga enim est hæc glandula, ac secundū longitudinem sursum ac deorsum exporrigitur, communi oris tunica, sed ea hic quā alibi tenuiori fungosioriq; uestita. Substantia cōstat alijs glandibus simili, at impensius fungosa, in hocq; propria, ut saluam procreet, ac asperam arteriam & stomachum quoq; cum tota oris amplitudine humectet. Has glandulas Græci ἁγίδυα uocant, fortassis nō tam quod his angustijs cōtineantur, ac quod^l gargareonis latera respiciant. Si enim hiantis oris cavitatem intuearis, atque foramina narium & gargareonem obserues, quid aliud hic foramina quā duo uelut maria, ipse autē gargareo instar angustæ terræ inter illa deductæ apparebūt, adeo ut nihil obstitit, gargareonem ἰδούρ aliquando à ueteribus, qui pueros in cadauerum sectionibus exercebant, nuncupatum fuisse arbitrari. Aliàs enim si ad angustiam loci, instrumentorumq; hac in sede frequentiam, animum duntaxat adhibuerimus, glandes asperæ arteriæ adnatæ, quum in maioribus angustijs, quā secundū hoc glandiū genus reponātur, ἁγίδυα uocitandæ forent. uerū quū illas ab Anato mes professoribus hæcenus nō descriptas obseruauerim, magis secundū genus (quod etiam nimis quā oscitāter alij enarrarunt) ita appellandū duxerim. Cæterū secundū hoc glandularum genus amygdalis assimilatum, Græci quoq; ἀμυγδαλῆς nuncupauerūt, quam uocem^m interpretes tonfillas & amygdalas & Faux uertūt. Quāuis hæc posteriora nominaⁿ tertio glandoso huius sedis generi quidam attribuisse uideantur, ignorantes interim cum primo genere secundū. Non tamen in his nominū fluctibus & rerum interim incitiā prætereundū est, Græcos quum tumores præter naturā enarrāt, glandularū quæ in faucium initio sibi opponuntur, ac secundū glandularū genus cōstituunt, inflammationes ἀμυγδαλῆς nuncupauisse, & ἁγίδυα inflammationē corporū, quæ in faucibus sunt: nō adicientes, quæ nam illæ censeantur. Porro^o tertium genus^p, inguinum & axillarū glandibus respondet. numerosum enim sub aurium radi cibus & uniuerso spacio inferiori maxilla conscripto continetur, ac cavitates omnes exactē im plet, uasorumq; diductibus distributionibus ue præscitur, has partes quoq; sua humectandi uī imbūens. Hoc nullo peculiari donatum est nomine: uulgus tamen hic in porcis ac cæteris quibus uescimur animalibus, ut & reliquas glandulas, in delictijs ipsas quoq; habet, ac Animel-

Fauces.

ἰδούρ.

Triplex in faucibus glandium genus. Primum autem secundum.

ἁγίδυα.

ἀμυγδαλῆς.

Tertium in faucibus positum glandium genus.

las seu Lacticia nuncupat. Num uerò & has Græci quoque *σφιδνα* appellauerint, sciremus sanè, nisi temporum iniuria Marini uiginti de Confectionibus libri cum Græcorum omnium qui quicquam in Anatome dignum præstiterunt operibus, maxima ex parte intercidissent. Quartus enim Marini liber inter cætera glandulas tractabat, utcunque uerò sit, hoc tertium in faucibus glandularum genus nō minus quàm cætera duo ob uarios quibus implicatur affectus, & scrophulas præcipue, perpendendum uenit: hocq; imprimis tempore, quando nō id solum genus, uerum & alia duo Gallicus morbus simul cum palato & gargareone miserè exercet.

DE GARGAREONE. CAPVT VI.

IN biante ore gargareonem citra dissectionem uidere est, quanquam in sexta musculo-
rum tabula *E* insigniatur, in septima uerò *F*.

*Gargareonis
nominis.*



ISTA quoque corporis pars pluribus donatur nominibus. gargareonem, gurgulio, & gargareon, sibilus ac tintinabulum à uoce nuncupatur. Quia uerò instar uuæ superius angusta, inferius uerò sphaera instar rotunda ali-
quando dum inflammatione corripitur, propendit, Vnea, seu *σφιδνα* appel-
latur. Deinde quòd instar caudæ muris, aut columnæ extensa interdum ex
humorum affluxu gargareon producat, ut & affectus ille, *λυσι* ac colu-
mella dicitur. Porro quoniā secundum naturam se habens, superius latior,

inferius autem strictior uisitur, fundibulum aliqui eum uocauerunt, at nomina sonitus occasione
ipsi indita à multis toti laryngi, ab aliquibus uerò laryngis operculo tantū accommodantur. Cæ-
terum gargareonis, qui soli inter cætera animantia homini obtigit, situs, forma, color, ac omnia
ferè huc pertinentia nō minus ac externa unguium superficies euadent cōspicua, si alicuius hian-
tis os inspicere non piguerit. Vnde etiā horum enarrationi prolixius quoq; haud immorandū
est. Oblonga enim tunc spectantibus occurrit particula fungosa & carnea à palati sine, ubi na-
rium foramina ad os descendunt, in oris amplitudine propendula, superius ubi palato conti-
nuatur latior, inferius pyramidis instar acutior. Venulas quasdā ex uasis palati tunica adeun-
tibus in ipsius medio assumit: neruis autē non admodum participat. Porro ipsius primarium
ulū uocis modulationē esse, ac illum ad sermonē homini plurimū opinarī, argumento sunt,
qui hunc præfectum habet: dein quòd soli homines, auiumq; quædā genera hoc donari uidentur.
adeo sanè ut non immeritò uelut quoddā uocis plectrum, ita ad cauum palatum pendens,
censeatur. Secundariò autē ad aeris attractionē, ne scilicet nimis frigidus in pulmonē feratur,
aliquid & homini accommodare creditur, quum his quibus gargareo præfectus est, frigidus aer
impensus quàm cæteris noxius esse colligatur. Sic quoq; & ad aeris expurgationem nōnihil
conducit, nam puluerē sibi applicat, qui alioquin in laryngem simul cum aere erat assumendus.
At hic usus quū cætera animalia ad terram magis quàm homo spirantia gargareone destituan-
tur, parui pendendus uidetur. Quamobrem uerò aliq; gargareonem excrementorum à cerebro
in os descendentiū quoddam receptaculū esse tradiderint, nō satis assequor, & commentum il-
lorum esse opinor: quū gargareon nullam, qua aptè aliquid suscipiat, cavitatē nanciscatur: imò
quoties humore imbuitur, laxatus muris caudæ forma propendit, aut alio quopiā grauissimo
uitio dum fluxionem suscipit, conficitur. At nunc tempestiuū erit, pulmonis in quem aer per
asperam arteriam ducitur, constructionem aggredi.

*Gargareonis
situs, forma,
substantia.*

Vfus.

DE PVLNONE. CAPVT VII.

PVLNONE ostendit præsentis libri figurarū maior pars, prima uidelicet ad
characteres *R, S, T, V*. Secunda ad *N, O, P, Q*. Tertia ad *L, M, N, O*. Quarta ad
M, N, O, P. Quinta ad *i, k, l, m*. Duodecima ad *E, F, G, H*. Decimatertia ad *B, C, D, E*.
Vasa autem pulmonem implicantia partim exprimiuntur prima figura Capitis trigesima octaua
libri primi, partim duabus figuris Capitis decimi quinti libri tertij.

*Situs pul-
monis.*

Numerus.



ITEM pulmonis^a duæ thoracis cavitates indicant, in utraq; enim thora-
cis amplitudine, inter costas & alteram intersepiunt membranarum
cōspicua, pulmo locatur perinde ac cavitates ipsæ geminus. Ipsi enim
pars dextram cavitatem occupans, illi quæ in sinistra locatur, substantiæ
interuentu neq; continua, neq; etiam cōtigua est. Ambæ enim intersepien-
tium membranarū medio inuicem dirimuntur, & ^b uasorum duntaxat
interuentu, quæ ex una radice in dextram ac sinistram pulmonis partes di-
geruntur, illæ inuicem committuntur. Ac dextra quidem pulmonis pars dextram thoracis ca-
uitatem, sinistra autem læuam ita implent, ut nihil prorsus in thoracis amplitudine pulmonis
substan-

^a Una ad
dextrū la-
tus G, G. ad
tera ad fini-
strum latus
I, I. 2 fig.
^b 12 fig. B,
C, D.

c Inter G.
G. 1, 1, 1, 1
gu. 1.
d 7 muscul.
ta. h, l, m, n.

e 13 fig. quā
immissam
finges 8 mu-
scul. tabule
thoraci.

f 11 fig. G, H.

g 1 fig. I, L.

h 2 figura
N, O, P, Q.

i 1 fig. T, V.

k 1 fig. L, 2
fig. M, N.

l 1 fig. 3

m Singulis

fibris singu-

los adhibui

characteres

in 13 figu-

ris quibus

pulmo se of-

fieri.

n 13 fig. D.

substantia non oppletū sit, præter uniuersam regionem quam inter diuidētes membranas in se
cōplecti cōstituerēq; retulimus. Verū in hac cavitare, quam inter sepientes membranas in suo
medio super⁶ neruolam septi transuersi partem, ac sub cordis inuolucris mucrone efformat, pul-
monis quoq; portiuncula canibus & simijs continetur: uti & in reliquis animalibus, quibus pe-
ctus longius quā homini obgrit. Verū hæc pulmonis portiuncula uniuersam cavitare mi-
nimè intarcat, neq; etiam eius cavitatis formam exprimit, atq; ita dextra & sinistra pulmonis par-
tes, suas quibus cōtinentur sedes examussim referūt. Pulmo nanque priuatim nulla indigebat
forma, sed pro accumbentium corporum effigie, ut et iecur ipsum, efformatur, prorsus suarum
cavitatum effigiem assumens, haud secus sanè quā si aliquis gleba his cavitatibus impressa,
pulmonem construxisset. Vbi cūq; enim cavitatum sedes cōcaue sunt, inibi pulmo gibbosus
euasit: ubi autē gibbæ extuberantesq; uisuntur, pulmo etiā cauus redditur. Quapropter etiam
fit dextram pulmonis partem sinistra iunctam ad amussim bubuli, aut ceruini, aut alterius bisul-
ci animalis calcibus, unguibus uel simul commissis, rara quadam similitudine respondere, aut
alteram pulmonis partem unius unguis imaginem referre. Tota enim⁶ posterior pulmonis se-
des, lateraq; anteriori unguium regionē, ac lateribus respōdent. Quemadmodum enim unguis
anteriori parte linea impressione q; inuicem dirimuntur, ita quoque & posterior pulmonis se-
des huic lineæ similem omnino impressionem, prominentium in thoracis amplitudinem uer-
tebrarum corporū occasione, obtinet. Et ut impressio hæc secundum unguium longitudinem
gibbumq; modicè obliquatur, ita quoque & pulmonis hac sede impressio secundum dorsi in-
exteriora incuruationē ducitur. Rursus ut unguis anteriori parte magis quā posteriori, con-
rigit uidentur: ita & pulmo ipse, eo quod inter sepientes membranas ab inuicem multo minus
ubi dorso committuntur distant, quā ubi pectoris ossi proximæ sunt. Deinde determinans
unguis linea superius ac inferius magis patet quā in medio, & inferior rursus pars magis de-
hisceit quā elatior: quod & pulmonis quoq; quā ipsius partes inuicem dirimuntur, impressio
ostendit. atque id inter sepientium membranarū gratia magis quā iuxta iugulum & septum inui-
cem distant, quā in reliquo ad dorsum progressu: dein membranarum distantia septo proxi-
ma, latior illa est quæ iugulū respicit. Reliqua autē pulmonis posterior pars & latera, propter
costarum inflexus, ut & unguis ipsi, gibba uisuntur. Deinde etiā pari ratione inferior pulmo-
nis regio, ut & unguium ipsorum, latior superiori existit. Porro unguū parti quæ terræ inni-
titur pulmonis⁶ regio exactissimè cōuenit, septum transversum specians. Hæc enim pulmonis
regio, ut & unguium, caua uisitur, propter septi⁶ gibbosam imaginem. Ad hæc, pariter quoq;
amplo interstitio, ut & unguis etiam, propter amplam inter sepientium membranarum hie di-
stantiam dextra pulmonis pars impetere à sinistra disingitur. Porro pulmonis⁶ regio pectoris
os respiciens, ipsorum uel anterior pars adamussim refert posteriorem unguium sedem uniuersam,
quæ terrā nō cōtingit. Vt enim illa utrinq; orbicularis est, & amplo interstitio diffusa, sic &
hæc pulmonis regio inter diuiditur: quæ tanto posteriori etiam sede breuior est, quanto poste-
rior unguū regio terrā non cōtingens, longitudine ab anteriori uiuicetur. Cæterum alia adhuc
impressio hæcenus non commemorata pulmoni illic accidit,⁶ quæ is lateribus inter sepientium
membranarū accumbit. Harum nanq; latera quum hic cor cōtineatur, utrinq; extuberāt,⁶ gib-
bumq; efficiunt, cui proportionatum sinum pulmo (ut uniuersas quibus continetur cavitates
accuratè oppleat) meritò obtinet: qui sanè & in unguibus illi sinui correspondet, qui inter un-
gues quā inuicem accumbunt cernitur, illic nimirū, ubi duriore quidam pili inter ipsas obser-
uari solent. Atq; ita pulmonis forma unguium imaginē cōgruit. Cæterum hæc de humano pul-
mone dicta uelim, eoq; non flaccido, sed ut secundum naturā thoracem implet, distento.⁶ Aliàs
enim quum cōcidit, atque in lobos seu fibras insigniter distinctus uisitur, elegās hæc propriaq;
pulmonis forma deperditur.⁶ Distinguuntur enim utræq; pulmonis partes in duos lobos,
membraneis fibris in hominibus inuicem hærentes, neq; ita inter refecandum distinctu, ut in
quartæ thoracis uertebræ incipiente, & oblique deorsum in priora, quasi ad pectoris ossis mu-
cronem, protensa. Hæc linea æqualem pulmonis partium diuisionem quodammodo efficit,
quāquam humilior lobus superiori longior existat. Neq; sanè perpetuò in duos solum lobos
pulmonis partes secantur, uerum aliquando in tres, interdum in nullos, aut duos, ita tamē inui-
cem nexos, ut sectionis potius nota, quā re uera distinctio in homine uideatur. Lobum au-
tem qui in canibus simijsq; cauæ uenæ⁶ caudicem suffulcit, uti iam antea dixi, nunquam in ho-
mine obseruauit, & hunc illo destitui certo certius scio. Quāuis interim Galeni locus in septimo
de Administrandis dissectionibus nondū mihi memoria exciderit, quo inquit, quantum hunc
pulmonis lobum illos non latere, qui rectè sectionē administrant: innuens Herophilo & Ma-

Pulmonis
forma.

In quos lobos
fibras uel pul-
mo diuidatur.

In homine nul-
lum pulmonis
lobū cauæ cau-
dicem sufful-
dere.

rino eiusmodi lobum fuisse incognitum, uti sanè fuit, quòd illi hominū cadauera, non autem cum Galeno simiarum ac canum aggredierentur. in quibus præsentī lobo nihil est manifestius, uti sanè hominem secanti liquidissime etiam constat illum deesse, tum quòd id sensus indicet, tum quòd uena septum permeans cordis penetret inuolucrum, neque aliquid prorsus est interuallum ductus caue inter septum & inuolucrum, quale in canibus maximum uisitur, unde etiam in illo interuallo uena caua hoc quinto lobo tanquam à manu quapiam suffulciri debuit. Pulmo externa superficie læuis undique est, & ueluti humore lento madidus. attamen in plerisque hominibus non infrequenter hæc superficies aspera earum membranarum modò conspicitur, quæ inuicem connascuntur, quandoquidem in illis iam dextra pulmonis pars, iam sinistra, iam utraque etiam pertinacissime thoracis lateribus fibrosarum nexuum interuentu colligatur, adeò ut id hominibus quodammodo peculiare esse uideatur, ut & fuscus quidam, nò autem candente rubore rubeus color, & quædam instar nubium oblineatio, ac in colore inæqualitas, in hominū pulmonibus conspiciuntur: non quidem in laqueo suffocatis solum, aut aliquandiu mortuis, uerum & in illis quibus adhuc uiuentibus cor excacatur: quamuis tamen sensim mortuis pulmones intensius nigricent, concidantq̃. In alijs autem animalibus nisi per quàm rarò, pulmo nulli thoracis parti uel minima fibra hæret, neque thoraci aliter quàm uasorum interuentu committitur. Aspera enim arteria dorso colligata, & in pulmonem profectia, eum dorso alligat: uena autem arterialis, & arteria uenalis similiter illum cordi connectunt, illaq̃ duntaxat pulmonis uincula, nexūs uel censenda ueniunt. Nisi etiam tenues pulmonis neruos, & tunicam uasa inuoluentem, quæ à membranīs thoracem intersep̃iūbus, aut illa quæ costas succingit exoritur, ac nexum quoque ad colligationem conducere arbitreris. Vti in hominibus pulmo ualidissime thoracis lateribus subinde, ueluti diximus, alligatur, quod etiā in uulncribus egregiè expendendum uenit. Thorax enim sæpe perforatur, & interim in læso latere pulmo non concidit: quòd pulmo à uulneris lateribus non liberatus, aërem qui thoracis cauitatem oppleret, atque occasio esset quo minus pulmo uacui beneficio cum thorace dilataretur, haudquaquam ingredi finit. Vt taceam, eiusmodi connexus opera pulmonem thoracis motibus quodammodo sequaciorem effici. Cæterum uniuersa pulmonis substantia nihil aliud est, quàm caro mollis, fungosa, rara, læuis, aërea, ac uelut ex spumoso sanguine spuma uel sanguinea concreta, multisq̃ uasorū germinibus oppleta. Vasa sunt tria, ac primū quidem est aspera arteria, quam iuxta quartæ thoracis uertebræ corpus in duos truncos diduci diximus, quorū dexter in dextram pulmonis partem, ut sinister in sinistram exporrigitur, & primū in duos ramos sectus, ac his rursus in plures, hisq̃ rursus in alios diuisis, multiplici sobole pulmonem intertextit. Secundum uas uenalis est arteria, tertium autem uena arterialis, quarum in tertio libro cum reliquis uenis ac arterijs necessariò meminimus. Adeò ut de illis hic nihil planè amplius donec ad cordis cōstructionem deuenierimus, repetendum sit. Hæc uasa similiter ac aspera arteria in pulmonem digeruntur ea serie, ut arterialis uenæ ramī, asperæ arteriæ propaginum posteriori sedi attendantur, uenalis uerò arteriæ soboles anteriori. Atque hæc uasorum digestio undecunque ad externam usque pulmonum superficiem adamussim seruat, non situ modò semper sibi similis, uerum & magnitudine etiam. Vt enim multo maior est arteriæ asperæ truncus pulmoni insertus, uenæ arterialis & uenalis arteriæ primis in pulmonem implantationibus, ita quoque uniuerso per pulmonem progressu ramorumque serie, soboles asperæ arteriæ ampliores, patentioresq̃ uenarum & arteriarum furculis existunt. Huic in numero uasorum implexui, ea quam diximus pulmonis caro intertextitur, atque omnes uasorum amplectens furculos pulmonem efformat, quemadmodum iecoris substantia iccur ipsum cum frequenti uenarum sobole iecur constituit. Vniuersum uerò pulmonis corpus non aliter ac iecoris, tenui quadam membranaq̃ obducitur tunica, principium ab illis uasorum inuolucris ducens, quæ asperæ arteriæ ac alijs duobus pulmonis uasis ab intersep̃ientibus thoracis membranīs, seu ea quæ costas succingit, offeruntur. Quum primū enim hæc uasa in pulmonis ducuntur substantiam, ea tunica à proprijs uasorum tunicis abscedens, in pulmonis tegmentum degenerat: cui ueruuli à sexti paris neruis recurrentes neruos constituentibus, & postmodum in uentriculi superius orificium diffusis communicantur. Nulla autem, aut per quàm graciles in pulmonis substantiam sensu non admodum indigentem disseminantur. Pulmo enim in hoc potissimum factus est, ut aërem cordi (quo potissimum ad naturalis caloris non qualitatem solum, sed sanè & substantiam indiguit) præpararet, ac demum cor uiscus aliquod sibi appositum haberet, ex quo aërem suis functionibus aptum semper allicere posset: & ne quemuis statim nos ambientem aerem, eundemq̃ aliter non immutatu assumere cogeretur, præcipue quum natura non solum cordis occasione quamplurima animalia respirare uoluerit,

Qualis pulmo
nis superfie-
cies.

Pulmonis cō-
nexus.

Pulmonis sub-
stantia.

Pulmonis
uasa.

Pulmonis tu-
nica.

Pulmonis
nerui.

Pulmonis u-
sus & cōstru-
ctionis ratio.

04 fi. B. B.

p 6 fi. Y. 12
fig. A.
q 6 fig. L. 12
fig. C.
r 6 fi. G. 12
fig. D.
s 6 fi. C. et 2
fi. C. 2 lib.
49.

t 1 fi. C. 38
li. 12 fi. B.

u 2 fi. C. 15
li. 3, 12 fig. 4
ra D.
x 1 fi. C. 15
li. 3, 12 fi. C.

y 2 fig. C. 1
lib. 4 q. 1
fig. 6 C.

ris, uerū & uocis ad commodam animalis uitam necessariæ gratia. Quod enim à pulmone inter expirandum redditur, uocis optima euadit materia. Atq; ita uniuersa respirationis organa summus rerum Opifex machinatus est, ut ex nostro arbitratu aerem attrahamus, eumq; rursus reddamus, aliter quàm cor ex nostra uoluntate neutiquam pendens, agitur. At quum hæc quoque latius dum thoracis musculos traderemus complexi fuerimus, ad pulmonem redeundum est, qui in istar promptuarij cuiusdam in duos asperæ arteriæ ramos aerem assumit, cordi illum ingenua suæ carni facultate præparans, ut deinde cor per arteriæ uenalis ramos ex asperæ propaginibus sibi illum allicere queat, ac dein rursus à pulmone quod cordi inutile est, per expirationem reddatur. Quis itaq; asperæ arteriæ sit usus, neminem latet: quemadmodum neque uenalis arteriæ usus nulli incognitus est, quum is præcipuus sit, ut aerem cordi aptū, ac à pulmonis substantia in asperæ arteriæ ramis confectum, in se pelliciat, ipsiusq; interuentu cor eundem in sinistrum ipsius uentriculum attrahat. Arterialis uena in hoc potissimum facta censetur, ut pulmoni aptum suæ substantiæ alimentū ex dextro cordis uentriculo exporrigat, quod laue, aerem, spumofumq; esse oportuit, si modo ulla mutatis aerem substantiæ, ad aerem emutandum debebat esse proportio, atque ipse etiam pulmo comprimi colligiq; & rursus distendi sequaq; esse posset. Ad quam functionem etiam uenalis arteria pulmoni utilis est. nam & hæc illi sanguinem suo nutrimento aptissimum deriuat, quo pulmo tum propter ipsius mollietatem, tum propter continuū motum, tum propter caloris copiam, quam ex cordis uicino in deflumq; cordis motum adipiscitur, plurimo præ cæteris corporis partibus indiget. Quod autem pulmonis tunica ipsius substantiæ quæ aeris alterandi uim possidet, atque ramorum implexus firmat, impletq; inuolucris uice sit, omnibus perspectum reor. Sic quoq; hanc iustissimè tenuem mollemq; ut cum pulmone promptè concideret, & facillè dilataretur, factam esse, neminem ambigere decet.

Vasorum pulmonis ratio.

Tunica ratio.

DE CORDIS INVOLUCRO.

Caput VIII.

PRÆSENS inuolucrum membranis thoracis amplitudinem intersepientibus liberum, nullaq; ex parte dissectum tertia ostenditur figura, ad characteres B, C, D, E, F, G: uti apertum spectatur in quarta figura ad A, B, B. Rursus ipsius portio spectatur in ultima tertij libri figura ad B.



MEMBRANAM uniuersum cor cum suis auriculis ac uasorū initijs instar arcule cuiusdā aut thecæ inuoluentē, in medio thoracē intersepientū membranarū collocari antea diximus. Verū in præsentia huius inuolucris sitū paulo altius repetituri, eius effigiē primū nucis pineæ formæ q; simillimā esse dicemus. Quemadmodū enim ex orbiculari neq; penitus depresso basi pineæ nucis in obtusum, neq; impēse prominentē conū mucronem uel desinit, omniq; ex parte orbicularis quodāmodo uisitur, sic quoq; & cordis inuolucrum orbicularē basim & mucronē obtusum exigit, pineamq; nucē proximè refert. Cæterum inuolucris basis minime cōtinua est, sed ut minimum quinque foraminibus peruiat: duobus quidem, quibus causæ uenæ iter præbet, uno nimirum, quā hæc septū perforat: atq; id foramen in hominibus perficitur, ubi dextrū latius eius amplitudinis habetur, quā inuolucrum pertinacissimè septi neruose parti, secus atq; in cæteris animantibus, cōnasci docebimus. secundū autem foramen illud est, quo eadē uena sursum à cordis basi iugulū petit, tertiu porro foramen arteriā uenale transmittit. quartū uerō arteriæ magnæ paratur, & quintū arteriali uenæ uia præbet. Atq; id quodāmodo duplex est, quod arterialis uena priusq; ex inuolucro labitur, in duos truncos discindit, bina in inuolucro foramina perpetuò ferè adeptos: quantq; et uenali arteriæ duobus quodāmodo locis iter præbeat. His uasis notatū digno intervallo à cordis superficie abscedentibus, præfens inuolucrum ualidissimè obnascit, quodāmodo ab ipsis principiu ducēs, uidentur nanq; arteriæ magnæ & arterialis uenæ tertiæ tunice (quas ab intersepientibus thoracē membranis, ac ab illa quæ costas succingit, exigunt) deinde & secunda uenæ causæ & uenalis arteriæ tunica ab ipsdē membranis profecta, cordis inuolucris principiu statuere. Vasa etenim medio inter cor & ubi inuolucrum ipsis cōmittitur spacio, eiusmodi tunicis penitus destituuntur, ac notatū dignum interuallum inter cordis basim & inuolucris ad illa uasa coalitum existit, neque magis inuolucrum cordis basim, quàm mucronem aut latera illius contingit, quod sanè à Galeno expendendum erat, quum inuolucris originem à cordis basi pendere scriberet. Atque hæc foramina inuolucris potissimum basis necessariò obtinuit, se hinc quàm maximè licuit rotundam

Forma inuolucris cordis.

Quibus uasis inuolucris cordis uiam præbeat.

Cordis inuolucris initium.

Lib. 6. de V. su partium.

dam efformans. Cæterum reliquum inuolucris corpus nihil prorsus transmittens continuum est, & sibi undecumque, præterquam in forma, quæ ex basi, uti diximus, in obtusum mucronem tendit, respondens. Basis hæc summo apice paulo altius quintæ thoracis uertebre corpore locatur, huic non penitus, sed duntaxat regione incumbens. Basis enim mediæ est inter pectoris os & quartam quintamque thoracis uertebas, æqualiter ab utrisque pectoris dico ossibus & uertebis, distans. Item basis quoque à dextris sinistris que costis pariter remota pendet. In progressu uero descensuque inuolucris situs uariatur, ac alijs quidem animalibus longiori pectoris ossis quam homines donatis, inuolucrum id à dextris ac sinistris pariter seiunctum deorsum tendit, sensim in anteriora porrectum, adeo ut iam basis posterior, aut si animal refuspinum intellexeris, humilior ipso mucrone cõspiciatur. In homine autem cui anteriore thoracis partem rerum Opifex breuiore largitur, inuolucrum decliue ac antrorsum sinistrorsumque adeo protenditur, ut mucro magis deorsum quodammodo pertingat, quam pectoris ossis pars, cui superior maxime que antiqua septi transuersa pars adnascitur: dein in sinistrum adeo pertinet, ut dextrum inuolucris latus uix thoracis medium attingat. In anteriora quoque adeo mucro procedit, ut sinistrum pectoris ossis latus, quæque huic coarticulantur cartilagines, contingat. Atque hoc inuolucrum in se intersepientes membranæ amplexantur, secundum ipsius formam in latera extuberantes. Porro hoc inuolucrum substantia constat membranæ, atque in similiarum partium numerum cum reliquis membranis reponenda, nullis enim fibris intertexta, sed simplex est membrana, utcumque crassa, & admodum dura, cavitatemque constituens, in qua cor facile dilatari constringique queat. In se enim cor continet nulla prorsus portuicula illi cõnata, sed æqualiter ab illo undique, uti superius commemorabatur, distans. Cautas hæc læuis omnino est, tenui quodam humore oblita, ac adipe penitus omni destituta. Exterior quoque inuolucris superficies omni adipe uacat. Quanquã secus arbitratu sit Aristoteles, cordis inuolucrum pingue esse asserens: intersepientibus membranis forte delusus, quæ huic inuolucro obnatæ præpingues, ac potissimum in hominibus, uisuntur. Cæterum exterior hæc inuolucris superficies propter fibrosos nexus, ut membranæ inuicem cõnatæ, aspera cernitur. Inuolucris enim lateribus intersepientes membranæ quodammodo orbiculatim obnascuntur. Anteriori parti, cui illæ membranæ non obnascuntur, fibræ membranæ earum membranarum cavitatē implentium cordis inuolucro adnascuntur. Posterior pars uniuersa intersepientes quoque membranæ habet cõnatas. Cæterum uniuersus mucro, & dextri lateris inuolucris egrègia portio septi transuersi nerueo circulo ad latus sinistrum ualidissime, amploque admodum spacio cõnascitur, quod hominibus est peculiare. Similis quippe & canibus & porcis à septo multum distat: tantum abest, ut ipsi magna sui portione inuolucrum cõnecteretur, adeo sanè ut & hinc luce clarius constet, Galenum hominis uiscera aut ostentat, aut neutique spectasse, simiasque & canes nobis descripsisse. Verum & homini adhuc priuatim anterior mucronis pars tunicæ costas succingenti fibrosis nexibus hæret, ea parte qua sinistri lateris sextæ & septimæ costarum cartilagines pectoris ossi coarctantur, sed & is inuolucris nexus inter thoracem interdiuidentes membranas perficitur: nullibi enim ex illarum medio inuolucrum cordis excedit, neque pulmonem ulla ex parte nisi illarum interuentu contingit. Hoc nullas arterias in se disperlas exigit, neque etiam uenas, nisi perquam tenuissimas ab illis ferè exortas, quæ intersepientibus membranis tantum in omentum deriuantur, quum enim cauum transmittit, ab illa uix aliquid mutuatur: quæ autem septo in hominibus cõnascitur, communia cum septo uasa sibi uendicat. Nerus quoque adipiscitur nimis quam obscuros, ac ab illis pronatos, à quibus recurrentes nerui iam pullularunt. Quod uero membraneum hoc cordis inuolucrum cordi id sit quod dicitur, omnibus conspicuum esse arbitror: quum instar domus & arcule cuiusdam ac thecæ cor luculentissime amplecti, ac intersepientium membranarum beneficio sustinere uideatur. Præterea ut leuius esset, & durius, ex ualida extrui membrana, neminem quoque ambigere putauerim. Cæterum an hominibus secundum naturam se habentibus inuolucrum id aqua contineatur, quæ serosi humoris modo in ipsius cavitatē inter disseccandum reposita obseruamus, mihi non admodum perspectum est. Quauis nullam sanè humani cordis sectionem unquam aggressus sim, in qua non multum eiusmodi aque quantitatem repperim: quocumque etiam mortis genere siue paulo, siue multo ante homo interisset, etiam si adhuc maiorem copiam in mulieribus quam uiris animaduertim: nisi illi natura admodum fuissent humida. Quinetiam ferè minus in nuper mortuis adinueni, quam in his à quorum sectione diutius temperassem. Is cui Bononiæ cor uiuo eximi spectauimus, aquam etiam in inuolucro continere uidebatur: uerum id non admodum commodè, utcumque etiam nos tragediæ adiungeremus, expèdere licuit. Patuim huius aque intuitu cupidi, pulsans adhuc cor cum pulmone reliquisque uisceribus ilico atque exemptum erat, in proximam pharmacopolæ officinam deferri curauimus, ac in inuolucro aquam nonnullam repperimus. Canes uero

Inuolucris cordis situs.

Inuolucris cordis substantia.

Superficies & necus inuolucris.

Quibus uasis ac neruis inuolucrum impleretur.

Inuolucris uisus, & cõstructio, & cõstructio.

Quis modi aqua in inuolucro obseruatur.

8. fig. par. sub S.

h. vii. fig. in a. fig. 7. u.

i. Inferius L. inter G. I. h. 3. fig. D. E.

12. fig. ca. a. lib. 4. r.

cauitatem inuolucris & cordis superficiem humectas habent, at in his nulla aquæ obseruatur quantitas, ut sanè in mortuis quantumuis etiam exigua semper, perinde ac in porcis occurrat, quibus tamen in uiua sectione aqua asseruata uidetur. Adèò ut de uiuorum aqua nihil asserere uelim, uerùm nullam penitus in illis contineri (ut hodie omnes ex spiritu in aquam post mortem conuerso, hanc in mortuis reperiri contententes affirmant) falsum esse noui. Quandoquidem (ut sæpe antea monuimus) membranæ nullis partibus connatæ, neque inuicem hærentes perpetuò madidæ apparēt, ut oculi palpebrarumq; interior superficies. Ad hunc quoq; modum ubi membranæ cerebrum inuestientes mutuò internuntur, & interna costas succingentis membranæ, & peritonæi superficies, ac iecoris quoq; & intestinorum, reliquarumq; partium inuicem tantum accumbentium, non uerò connatarum superficies madorem semper commonstrat. Nunc autem cor in continuo uersans motu, neq; dum uiuit animal unquam uel momento quiescens, calidissimū uiscus merito censetur, cur minus non madorem duntaxat, ut reliqua omnia, sed & aquam à Natura ipsi priuatim eiusdè usus gratia largitā nanciscetur? Præcipue quum in humidioris temperiei uis ac mulieribus copiosior aqua, quàm in siccis calidisq; quibus plures adesse spiritus constat, reperiamus: atq; à phrenitide mortuo cerebri uentriculos seroso humore non nihil falso acrisq; plenos obseruauerimus. Neq; hic the mouet, quod quis unde hæc aqua calidissimo uisceri affundatur, interrogare possit: quum præter adipem, quo humanum cor imprimis cætet, madorem in reliquis nuper commemoratis sedibus animaduertamus, & in aquæ subter cutem specie, ab utero æonius dicta, tantam aquæ uim in peritonæi amplitudine, & etiā in aquoso ramice, & interdū uiuentibus in thoracis amplitudine asseruari indies discamus. Preterea æstiuo tēpore suspēsi, ac in cruce, ut Gallis & nostratibus moris est, nō procul à suburbij ad publicas uias relictis, paucis post suspēdium diebus, ac si uesicæ aqua distentæ essent, in mirā molem intumescunt. Meminietiam in diebus canicularibus una die occisos canes, quibus curē detraheram, & musculi alicuius motum examinaueram, negligentia non abiectos fuisse, & casu in sole relictos, maximam serosæ aquæ uim in peritonæi cauitate, & in thoracis amplitudine collegisse. Cæterum nugaci hac disceptatione relictis, ad cor properemus, ne tandem in theologorum quæstionem, qua de mysterijs plena Saluatoris nostri IESU CHRISTI aqua sanctissimè pertractant, incidamus: ac diuini Ioannis uerissimum Euangelium, his nostris de solis calore in suspensis uirationibus, & carnificinis minimè miscuamus.

DE CORDIS SITV ET FORMÆ.

Caput IX.

SITV cordis in sua proportionē ostendit ultima figura tertij libri: de in prima & secunda præsentis libri figura idem quoque ostendunt, quamuis in illis cor suo inuolucro intectū sit, ac inter membranas thoracis cauitatem intersepientes contineatur. Ac in prima quidem figura id ad *L* spectatur, in secunda autem ad inferius *L* & *M*, *M*. Porro cordis formam ex quarta, quinta, & sexta figuris petere licet.

a 3 fi. C, D,
F, E, G.
b 4 fi. C, D.
c 2 fig. A, B.
d 4 fig. E, G.
fig. C.



*C*ORDIS situm formamq; ipsius enarratum modò inuolucrum commonstrat. Cor namque pyramidalis figuræ uisitur, & nuci pineæ non admodum est ab simile: ex^a basi nimirum latiori in^a mucronem paulo quàm nucis pineæ acutiorem sensim desinens: est^a que multo longius quàm crassius, quanquam in homine, quod ad externam superficiem attinet, non æquè crassum secundum orbem, ut ceteris fere animalibus, sit. Ipsius etenim latitudo profunditatem nō secus excedit, quàm si quis cor in anteriori posterioriq; sede non nihil depressum affirmaret. Atq; id potissimum in dextra sede illi accidisse, discantibus obseruatur. Tota exterior superficies à basi ad mucronis usq; extremum impensè læuis cernitur, nulli prorsus parti connata. ^aCoronalis tamen uenæ^a propaggines à cordis basi ad mucronem usq; cum coniugis suæ arterijs excurrentes, sanguineq; turgentes, paulo magis reliqua cordis superficie exuberant, inæqualitatemq; minimam efformat: quippe maxima sui corporis portione in cordis substantiam imprimuntur, deinde & adeps etiam, quo humanum cor plerumq; abundat, aliquid inæqualitatis inducit. Basis propter ualorum egressus inæqualis utriusq; uisitur. dextra enim ipsius sedi^a dextra auricula simul cum^a uena cava, & ^aarteriali uena committitur, in sinistra autem sede læuam habet auriculam, & præter^a arteriam uenalem, magna quoq; arteriæ initium. Porro cordis auriculas, uasa, ut & ipsorum orificia & membranas, cordisq; uentriculos seorsim ordine persequemur, iam cordis situm subnexuri, de quo prolixè

Cordis figura.

d 6 fig. D.
e 6 fig. E.
f 4 fi. I, J, fi.
B.

g 4 fig. F, G.
fig. C.
h 4 fi. G, G.
fig. I.
i 6 fig. E.
h 6 fig. G.
i 6 fig. O.

Cordis superficies qualis.

Cordis situs.

prolixè

lixē admodum dissectionis professores contendunt: his quidem id in sinistrum thoracis latus collocatum inuentibus, illis autem in medio, quod ad dextrum ac sinistrum attinet; alijs uerò non ad hanc tantum positionis differentiam cor in medio esse placuit, uerum & secundum thoracis anteriora & posteriora, deinde superiora & inferiora, alijs rursus hæc omnia quidem toti cordis moli, alijs autem duntaxat basi ascribentibus. Quod autem in præsentia thoracem omnes appellent^m quicquid costis & pectoris ossis, & duodecim thoracis uertebri intercluditur, manifestum esse arbitror: quum alioquin si uniuersus corporis truncus cum Aristotele ipsi thorax appellaretur, plurimum in situ cordis enarrando aberrarent, quamuis alioquin ad ueram situs descriptionem non admodum accedant. Quandoquidem brutis animalibus quibus pectoris os homine longius obtigit, non basis solum, sed & cordis propemodum mucro in medio, quod ad dextrum & sinistrum spectat, continetur. Deinceps secundum dorsi longitudinem basis uicinior longè est primæ thoracis uertebre, quam mucro ipsi duodecimæ. Insuper magis ab elatiori pectoris ossis sede cordis basis remouetur, quam mucro à pectoris ossisⁿ cartilagine gladij modo in aciem cessante, adeo ut hac dimensione, quam in longitudine metimur, uniuersum cor mediam sedem nullis animalibus exactè occupet. Quod ad anteriora posterioraq; attinet, omnibus animantibus cordis basis in medio eius thoracis sedis quam sibi uersificat, collocatur. Mucro autem in anteriora magis exporrigitur, non tamen pariter omnibus. Cæterum hominis cor sua basi, quæ ipsius dignissima nobilissimaq; pars, quum ualorum origo sit, censetur: exactè, ut in reliquis animantibus, dextræ sinistræque sedis medium obtinet: atque quod ad anteriora posteriora que spectat, pariter sese habet, tatum enim à pectoris distat osse, quantum à uertebRARUM corporibus abscedit. In thoracis autem longitudine, quæ posteriori sede duodecim constituit uertebri, quintæ uertebre corpus respicit, quæ ex tribus totius thoracis dorsi longitudinis partibus primæ humilior sedes & secundæ elatior existit. In anteriori uerò thoracis sede, quæ pectoris ossis longitudine terminatur, ad amissim mediam sedem exigit, tantundem à iugulo remota, quantum ab ea ossis pectoris sede, cui septum inferiur. Arque hictu-ⁿ nissimus, & plurimum ab ijs quæ foris incidere queunt, remotus, basis locus est: à quo reliquum cordis corpus sensim in anteriora, & in sinistrum latus eousq; exporrigitur, ut mucronis posterior pars magis ad pectus atq; antroRum tpi ipsum basis centrū uergat, & dextra quoq; mucronis pars in sinistrum magis ipso basis centro protensa, medium pectoris ossis in sinistrum excudat, ipsumq; mucronis centrum sextæ & septimæ costarum sinistri lateris cartilagines respiciat, quæ pectoris ossi coarctantur. Præsentibus terminis quibus cordis situs comprehenditur, illius quoque magnitudo innotescit: quæ sanè homini, ut & cerebrum ac iecur, quam cæteris animantibus est grandior. Neque id solum homini priuatim evenit, uerum & illi quoque cor septi transversis nervose parti in læuo latere, cui cordis inuolucrum magno spacio^o adnascitur, quam proximè accedit: secus longè quam canibus & simijs, quibus cor magno intervallo à septo remouetur.

DE CORDIS SUBSTANTIA. Caput X.

CORDIS substantia quoad fieri licuit, illis potissimum figuris delineatur, quæ id quous pacto dissectum referunt, ut septima, et quatuor illi proximè sequentes.

Cordis caro.



Cordis fibra.

PRAECIPVÀ cordis substantia carne constat, musculorum carne paulominus rubra, uerum duritia, spissitudine, & fibrarum quo intertextitur genere plurimum ab illa uariante. Cordis enim caro longè durior existit, & spissior, iniurijsq; ferendis pertinacior, & demum uario robustissimarum fibrarum genere donata. quum interim unius musculorum sedis caro unicam ferè speciem, eamq; sparsim satis disseminatā duntaxat fortiaur. Porro species fibrarum, quæ cordis carne continentur (nō enim de membranarum uenæ cauæ & uenalis arteriæ orificiorumⁿ fibras agimus) haud æquæ ac musculorum conspicua est: quandoquidem nullum prorsus inuenias musculum, qui uel citra dissectionem ilico atque detectus est, fibrarum suarum differentiam non accurate ostendat: & adhuc multo accuratius, si uel crudus uel coctus unguibus, aut cultro discerpatur. at cordis quidem caro fibris compactissimis, & inter se plurimum differentibus oppleta uisitur: quæ uerò earundem situs differentiarumq; sit ratio, cōiectura potius tpi sectione assequimur. Quouis enim modo cordis carnem aut elixam aut crudam rectis uel obliquis uel transversis sectionibus aggrediaris, uel utcunq; lubet eandem unguibus dilaceres, uix unquam cordis notatu dignam portionem secundum

unum

a7figu.N.
membrana
iū K, L, M.
et 8 fig. G
G. membrana
narū E, F.

unum fibrarum genus diuelli posse obseruabis, ac omnē carnis partem diuersis multiplicibusq̃ (sed potissimum transuersis) fibris abundare astrues: non enim in corde, ut sanē in stomacho, uentriculo, intestinis, & ipso etiam utero, & ambabus uescicis sectionis beneficio fibrarū situm adinuenire integrū est. Quantq̃ interim triplex fibrarū genus à Natura ipsi largitū esse, nō possumus ire incicias, quum ob uarium & rarum quem in illo uidemus fibrarum implexum, & nullum simplicem earundem ductum: tum etiam propter manifestam ac uehementem cordis functionem, quæ fibrarum potissimum, ut statim dicturi sumus, auxilio perficiuntur. Ceterum & si ratio fortassis suaderet rectas fibras quibus attrahēdi facultas tribuitur intimas, & deinde his obliquas, quæ in alijs organis naturali motu agentibus retentioni præesse creduntur, positas esse, & extimam sedem transuersas ac orbiculares, quæ expellunt, obtinere, nō tamen cordis fibris eum situm ascribemus, quum sectio ipsa triplex hoc fibrarum genus inuicem commisceri ostendat, & nunc rectas, nunc obliquas, nunc transuersas, & rursus rectas & obliquas & transuersas quodammodo commonstret, quasi tres priores differentię singulis uentriculis peculiare essent, posteriores uerò toti cordi ambobusque uentriculis simul dedicarentur. Appello autem in corde rectas fibras, quas in eo perquam elixato ex ipsius basi ad mucronis usque ipsius centrum deduci, tam per cordis uentriculorum septum, quam reliquā sedem conspiciamus, transuersas autem, quæ orbiculatim cor uentriculosq̃ ambiunt: obliquas uerò, quæ quidem orbiculatim cor uentriculosq̃ ambiunt, at oblique secundum cordis longitudinem procedunt. Suntq̃ hæc in duplici differentia. Aliquæ etenim in dextro cordis latere basi sunt uiciniores, in sinistro ipsi mucroni: aliæ autem in dextro latere mucronem magis respiciunt, in lauo basim. Atque his sanē fibris pro cordis mole, si eam scilicet ad musculum conferas, perquam numerosis, & carne has continente amplexanteq̃, potissima cordis substantia constituitur, cui eadem cum musculorum uentrium substantia accidit compositio. Vt enim in musculis fibræ ne numerentur, carnes undique habent circumpositam: sic & cordis fibræ peculiari ipsis carne continentur, fulciunturq̃. Quæ porro per uniuersum cor fibrarū & carnis simul sit crassities, tunc demum opportunè explicabitur, ubi cordis uentriculos oratione complexi fuerimus. In presentia autem suffecerit, carnis fibrarumq̃ cordis usum, quæq̃ adhuc ad cordis substantiam spectant, adijcere: ac innuere, cordis carnem in mucrone quam in basi spissiore solidioremq̃ apparere. Non ob hoc profectò (ut Galenus arbitrat) ne hîc cor in suis contractionibus pectoris os accedēs facilius lederetur: uerū quòd ea cordis pars tenuis sit, & quòd ad eā fibrarū rectorū concursus perficitur, qui carnē mucronis, & si ab alia nō differat, compactiorē cōmonstrat, ad eū prorsus modū quo solidiorem carnem in musculi capite, aut tendinis principio uidemus, quam in musculi uentris medio, ubi fibræ nō adeò atque in illis locis compactæ, ab inuicem magis dirimuntur. Carnis itaque uisus non postremus usus cum musculorum carnis usu in fibrarum firmatione correspondet. Quod uerò propriā peculiariq̃ ipsius secundum iustitiam temperie ad præcipuas cordis functiones, quæ in sanguinis gratia pulmonis emutatione, & uitali spiritu conficiendo potissimū cōsistunt, opituletur, imò primarius harum functionum autor sit, ex aliorū uiscerū substantia ratiocinamur. Cæterū cordis fibræ alteri functioni subseruiunt, quæ cor tantisper dum uiuit animal, & dilatatur & contrahitur, & aliquandiu inter contractionem dilatationemq̃ quiescit. Deinde quemadmodum cordis fibræ cum musculorum fibris non nulla consequuntur communia, sic etiam ut & illæ motui famulantur, sed prorsus diuerso. Musculorum enim motus arbitrius est, cordis uerò naturalis, ac absque lassitudine inscrutabili rerum Opificis industria indefessus, arbitrioq̃ nostro minimè subditus, neq̃ ex cerebrinervis, ut musculorum motus, ulla ex parte dependens. Porro cordis dilatationem, quæ mucronis ipsius ad basim centrum est attractio, & omnium laterum cordis distentio, recte efficiunt fibræ, mucronem uersus basim contrahentes. Quod sanē ita perficitur, ac si uimineo circulo orbiculatim eademq̃ serie complurimas iuncorum scirporum uel radices connecteres, & capitibus illorum simul collectis, uelut pyramidem quandam efformares, ac demum funiculum ex mucronis medio per circuli centrum dimitteres, quo deorsum tracto, pyramis breuior, intusq̃ multo capaciore redderetur. Hinc siquidem cordis dilatationem condiscere quam optime liceret: quippe uimem quodammodo cordis basi responderet, iuncorum autem collectio cordis mucroni: deinde iunci ipsi & funiculus ille rectis fibris congruerent. Iunci quidem illis responderent fibris, qui in cordis lateribus & anteriùs et posteriùs consistunt: funiculus autem illis conferretur fibris, quæ in cordis carneo septo inter duos sinus posito frequentissimæ habentur, quanquam quod omnimodam cum rectorum fibrarum motu similitudinem obtinet, nihil confingere possimus. Transuersarum autem seu circularium fibrarum actionem ad aliquid referre, est quam facillimum. hæc enim cordis contractioni imprimis præfunt, quæ mucronis

*Carnis cordis
usus.*

Fibrarū usus.

coronis cordis à basi est discessus, & quædam cordis productio, quâ illæ moluntur fibræ, quoties laxatis rectis impensius arctantur colligunturq̃, haud secus quàm si prius cōtractum in pyramide illa funiculum iam laxes, ac manibus aut alio circulo in medio pyramidis iuncos introrsum comprimās, itaq̃ illius cavitatem minuas, & inferim tamen prociorem reddas. Nun c uerò qui obliquæ fibræ quieti præsent, hoc est aliquantisper, prout cordis functionibus ex usu censeatur, simul cum alijs fibris ad contentas materias undiquaque se contrahant, imaginari nō est arduum: præcipue si diuersos cordis pulsus in uiuo animali examinaueris. Quod lanē facturus es iucundissimē ea administratione, quam septimi libri calci (uel huius tantum rei gratia) subiiciam; in qua non hæc modò, uerum alia pleraque spectanda proponentur. Nunc autem ad fibras reuersi, eas non motuum cordis duntaxat opifices esse arbitramur, uerum rectas ad attractionem, ad expulsionem orbiculares, ad retentionem uerò obliquas conducere etiam nobis persuasum erit. Cæterum præter cordis carnem & fibras propriæ ipsius uenæ illius substantiam enutrientes, & arteriæ innatum suæ substantiæ calorem fouentes, huc etiam enumerandæ ueniunt: ipsa uidelicet coronalis uena, & duæ coronales arteriæ per cordis substantiam quasi musculorum uasa distributæ. Quis uerò uenæ arteriarum quæ coronalium sit ortus seriesq̃, in tertio libro abunde complexi sumus. Quare cordis neruulo sermoni quoque addito, ad cordis tunicam est accedendum: ac eum quidem neruulum in quarto libro à sinistro sexti paribus cerebri¹ neruo depromi retulimus, quando ab illo, ubi sinistri lateris recurrentem neruum constituit, sobolem deriuari diximus, quæ cordis inuolucris basim penetrans, & sinistro¹ uenæ arterialis lateri posterioriq̃ sedi exporrecta, in cordis basim (oppidò quàm obscurè) pertinet. Verum cordis tunica illi membranæ prorsus correspondet, quæ musculorum uentribus pertinaciter obnascitur, tenuissima nimirum membranula quæ à musculorum substantia diuelli nequit. Eiusmodi nanque cordis extimæ superficiei obducitur, cui in hominibus præcipue ad basim durius adipsi copia obnascitur: aliquando & per reliquam cordis superficiem ad mucronem usque, ac id semper imprimis secundum¹ uenarum & arteriarum per cordis corpus digressum, illi enim copiosior adipis portio (ut in¹ omento & membranis thoracis intersepienibus accidere conspiciamus) attenditur. Integrum esset & ad cordis substantiā referre¹ tres membranas uenæ cauæ, & duas arteriæ uenalis orificio præfectas, deinde & auriculas, & quatuor ipsius præter id circumuoluentes uenas arteriasq̃, uasa, nisi nunc tempestiuus foret, singula seorsum priuatis Capitibus recensere. Pari quoq̃ ratione & cordis¹ os huc spectare uideretur, nisi & id in primo libro prolixius effemus persequuti.

DE CORDIS SINIBVS, SEV VEN

triculis. Caput XI.

SEPTIMA figura & octaua dextrum cordis uentriculum apertum proponunt, non uerò & decima sinistrum. undecima autem cor transuersum dissectum oculis subiiciens, uentriculorum cordis naturæ ostendende plurimum iuuat.



Ventriculorū
numerus & si-
tus.

Forma dex-
tri.

Forma si-
nistri.

NONAM pacto cordis uentriculi hominibus, ac proinde & reliquis animalibus pulmonem habentibus conformentur, quoq̃ consent numero, nunc subiungam, sermonem à Galeni cum Aristotele in illorum numero disceptatione omnino cohibentis. Humanum itaque cor in duas insigniter amplas obtinet cavitates, secundum cordis latera sitas: unde etiam unam uentriculum sinum uel dextrum, alteram sinistram merito nuncupamus. Horum dexter sinistri amplitudinem uincit, amboque inuicem forma plurimum uariant. Dexter nanque magis deorsum ad cordis¹ mucronem ipso sinistro descendens, cavitatem instar crescentis lunæ paratam adipiscitur: quandoquidem dextro ipsius latere, anterioriq̃ & posteriori sede instar interioris semicirculi, aut ita extructæ cameratæ sedis concaua est, exteriori cordis in his regionibus superficiei, quæ gibba est, respondens: in sinistro autem latere externæ fornicis aut semicirculi sedis ritu (ut sic dicam) gibba cernitur, propter cordis uentriculorum septum semiorbis modo dextra ipsius superficiei in dextri uentriculi amplitudinem protuberantis. Atque hanc formam dexter cordis uentriculus à basi ad mucronem usque seruat, simul cum cordis effigie ex latiori basi angustior redditus. Sinister uentriculus ampla etiam basi incipit, sensimq̃ in arcum uersus cordis mucronem desinit, cavitatem instar conij, quod ad totam superficiem spectat, orbicularem obtinens. Cordis nanque uentriculorum septum¹ sinistro ipsius latere, quo sinistri uentriculi dextrum latus efformat, concauum,

26 fig. D. 7
p. G. & p.
ca. 6. l. 3. E.
h. 6 fig. D. 10
fig. E. 3. E.
p. 1. 1. 1. 1. 1.
3 B. B.
16 fig. h.
h. 6 fig. d.
16 fig. l.
m. 4 fig. L.
6 fig. E.
n. 1. 2. 3. 4.
4. h. lib. 5.
07 fig. K.
L. 1. 1.
p. 2 fig. E. E.
44 fig. l.
K.
15 fig. C. de-
in 6 fig. N. 1.
G. O.
57 fig. ad
D. D. 10 fig.
ad 5. 5.

4 Patet in
7 et 8. et G.
G. in 11 fig.
b. Patet in 9
et 10. et H.
H. in 11 fig.
c. 4 fig. E. 6
fig. C.
d. Hanc ma-
ximè ostendit
11 fig. ad
G. G.
e. 11 fig. 1. 1. 1.
fig. H. H.
f. 11 fig. 1. 1. 1.
g. 10 fig. R.

uum, non uerò ut^h dextro latere gibbum extuberansq; uisitur, & parem crassitiem naturamq; cum cordisⁱ substantia sinistrum latus & anteriorem posterioremq; sinistri uentriculi sedes constituentes exigiti itaq; prorsus se habet, quasi sinistri uentriculi potissimum gratia cor constitueretur, ac ut dexter uentriculus fieret^k tenuis quædam cordis substantia dextro septi lateri adnasceretur. Vniuersa namq; cordis substantia, præter uentriculorū septum, dextri uentriculi amplitudinem constituens, tenuis admodum est: quæ autem sinistrum uentriculum orbiculatim ambit efformatq; dextri uentriculi substantiam multis numeris crassitie superat, & undiq; eque crassa uisitur, præterquam in ipsa basi, ubi uasorum illinc prodeuntium dehiscientiumq; gratia, cordis carnea substantia tanta amplitudine deficit, quanta orificiorum est amplitudo. Vtriq; uentriculi^m superficies perquam inæqualis est, & multis quasi foueis in carneam substantiam penitus impressis obsita. Neq; istæ ad latera tantum, & si secus cæteris omnibus dissectionum proceribus uisum sit, consistunt, ubi dexter uentriculus sinistrum respicit: uerum per uniuersam prorsus uentriculorum superficiem, non solum in nuper occisis animantibus, sed perpetuò, tan-

Ventriculorum superficies.

tisper dum cor ipsum seruare uolueris, apparentes, neq; unquam uel in exiccato corde coniuuent. Deinde præter hanc inæqualitatem, quæ in sinistro uentriculo nonnihil insignior est, ambobusⁿ carneas quasdam explantationes processus ue intus exigunt, qui teretes sunt, & graciles, & in^o fibras mēbraneas cessant, humiliori sedi^p membranarū in ipsis sinibus positarū continuas. Cernuntur autem carnei hi processus potissimum ad uentriculorū mucronem, humiliorem ue sedem, quos ad fibrarum quas continent robur facere ostendam: quum secundo ab hoc Capite membranarum cordis naturam persequar. Ventriculorum igitur^r septum crassissima, ut dixi, cordis substantia efformatum, utrinq; foueis ipsi impressis scatur, hac imprimis occasione inæquali superficie qua uentriculos respicit donatū. Ex his foueis nullæ (quod sensu saltē cōprehendi licet) ex dextro uentriculo in sinistrū penetrant, adeo sanè ut rerum Opificis industriā mirari cogamur, qua per meatus uisum fugientes ex dextro uentriculo in sinistrum sanguis refudat. Præter hæcenus commemorata, in utrisq; duo habentur orificia, & totidem uasa in eminentiori uentriculorum sede, in cordis nimirum basi consistentia: & substantia, quum unū quidem uenofum, alterū autem arteriosum sit, differentia. Deinde ambobus uentriculis^s membranæ quedam insunt, quas uasorum orificijs paulo post præfici commemorabimus: ac in dextro quidem uentriculo tres habentur, uenæ caue os spectantes: in sinistro autem dug, uenalis arteriæ originis connata, adeo ut & hinc uentriculis quædam exurgat differentia, quemadmodum etiam & ipso usu, & quam continent materia inter se differunt. Porro usum illorum unā cum cordis uasorum & orificiorum & membranarum & aurium usu priuato Capite merito pertractabimus, quod hæc simul omnia cordis functionibus famulentur: quas, nisi enarratarum iam partium constructione prius descripta, recensere absurdum foret.

DE CORDIS VASIS, ET EORVN.

dem orificijs. Caput XII.

CORDIS uasis eorundemq; orificijs spectandis pleraq; faciunt figura: ac quinta quidem præcipue uenam cauam proponit ad characteres C, D, E. Sexta autem uenam arterialem insignitam, & arteriam uenalem, G notatam, & magnam arteriam O indicatam. Ceterum septima cauæ uenæ proponit orificium ad C, C, C. Octaua arterialis uenæ ad C, D. Non uenalis arteriæ ad C, C. Decima magnæ arteriæ ad A.



UPERIORI Capite, quo duos cordis uentriculos complectebamur, quatuor cordis uasa & totidem orificia esse, obiter innuebamus. Ac in uasorum quidem numero sunt uena caua, uena arterialis, arteria uenalis, & magna arteria, quæ omnia singulis ad cordis uentriculos spectantibus donantur foraminibus. Vena caua ad dextrum cordis latus dextrumq; uentriculum refertur: num uerò ab illo in hominibus originem ducat, non admodum contentiose friuolis quibusdam auctorum suffragijs innitens, agrediendum duxi, quum sectione (ut rationes subiceam) in natis hominibus nihil aliud quam cauæ ortum à corde pendere (non secus ac reliquorum trium uasorum) queam colligere. Atque idem de fœtibus, quoad hæcenus illorum sectioni incubui, fateri cogor: non interim Galeni sententiæ passim mihi reclamantis ignarus. Quæ enim is de uenæ cauæ principio in sexto de Hippocratis & Platonis dogmatibus contra Aristotelis placitū adducit, omnia in illum (si mo-

Cordis uasa quot & quæ.

Vena caua.

a Tota fig. cap. 5. lib. 3. hic autem 5. fi. C, D, E.

D d dō

dò id quis proposuisset retorquere esset quam facillimum. Nisi forte cum Galeno illi conueniret, quod iecur sanguificationis officinam esse haud falso enunciauerit, quanquā etiā Achillem illum arteriæ uenolæ principium deturbaret. Ex dextro itaq; latere basis dextri uentriculi ad humiliorem eiusdem basis sedem, uena caua¹ amplo patentiq; admodum orificio exoritur, ac illico ab exortu (qui totius uenę capacitatem amplitudine multum superat, ac uelut extuberans ad cordis substantiæ terminos, "circulus uisitur) sursum ad iugulum, & deorsum uersus septum^a contendit; neque, ut quispiam forte arbitraretur, uena caua unico ad hunc modum enata principio, in duos truncos magnæ arteriæ¹ modo dirimitur, sed dextro basis cordis lateri instar recti palati tenditur, ac suo ueluti sinistro duntaxat latere uena ex dextro uentriculo enascitur, ac facile citra aliam diuisionem (quod interim arteriæ magnæ ex cordis basis centro quodammodo prodeunti negatum est) cordis inuolucrum permeans, sursum deorsumque prorepat. Neque profecto alia cauæ exortus, aut si mauis cum Galeno dicere, insertionis est species, quam originis trium reliquorum uasorum cordis uentriculos spectantium: Cæterum quoniam pacto toti anteriori cauæ exortus sedi secundum illius longitudinem¹ dextra cordis auris adiacatur, in eo quod statim de cordis auribus subnexuri sumus Capite, audies. Vena igitur caua primum cordis uas censebimus, & ipsius ortus similiter primi orificij loco opportunè habebitur. Vena arterialis etiam dextro cordis uentriculo ascribitur, est que ea uena, quam quidem quod sanguinem in pulmonem deferat, uenæ que prorsus uicem gerat, Venam: quod uerò arteriæ corpus nanciscatur, Arterialem appellari antea diximus. Hæc multo minori quam caua¹ orificio ex dextri uentriculi basis elastissima parte iuxta dextrum latus uentriculorum¹ septi enascitur, & magnæ¹ innitens arteriæ, sinistrorsum¹ que nonnihil suo caudice inclinans, ac cordis inuolucrum permeans, tandem in¹ duos truncos discinditur, quorum dexter ad sinistram latus caudicis magnæ arteriæ, posteriorem¹ que eius caudicis sedem reflexus, in¹ dextros pulmonis lobos digeritur, sinister uerò in¹ sinistros. Porro¹ uenalis arteria, quam in tertio libro pariter cum arteriali uena persequuti fuimus, atque etiam ab usu quod aërem continere deducit ue, Arteriam: à substantia autem, quod uenarum corpori responderet, Venosam nuncupari retulimus: inter sinistri cordis uentriculi uasa connumeratur, ac ut uenarum corpus adipiscitur, ita quoque ex molliori sinistri uentriculi sede (ut caua ex dextri) principium ducit. Ex sinistro enim sinistri uentriculi latere ad eiusdem uentriculi demissio-rem partem pari pignus modo¹ ut caua, uenalis arteria¹ patenti admodum orbiculari que orificio enascitur, ac statim ab ortu, aut in ipso potius ortu, in¹ duos truncos deriuatur, quorum dexter sub cordis basi productus, ac cordis inuolucrum penetrans, in dextram pulmonis sedem dispergitur, sinistro interim in sinistram pulmonis partem exporrecto. Cæterum hæc uenalis arteriæ in primos truncos distributio, adeò illius origini uicina est, ut hoc nomine nonnulli dissectionis professores eius in corde orificium multiplicauerint, ac id geminantes quinque quatuor cordis uasorum orificia enumerauerint. Etrursus fortassis pari ratione uenæ cauæ attendentes, ipsius quoque orificium geminarunt: quum in ipsa etiam origine¹ hæc sursum deorsumque properat. Huiusmodi enim quid Herophilus contra Galeni Erasistrati¹ que sententiam ex septimo de Administrandis sectionibus libro innuisse colligitur. Porro nos quatuor cordis uasorum, quatuor tantum orificia, ut re uera sunt, enumerabimus. Quo autem pacto uenalis arteriæ exortui in anteriori quoque ipsius regione¹ laua cordis auricula adnascatur, secundo ab hoc Capite explicabimus. Quartum uas, quod adhuc enarrationi deest, quartumque cordis constituit orificium, magna censetur arteria, pari ratione ex sinistro uentriculo, qua arterialis uena ex dextro, principium ducens: Ex dextro enim elastissimæ sinistri uentriculi sedis latere, & ex cordis basis ueluti centro arteria magna enascitur, ali-quousque recta¹ sursum sub uenæ arterialis caudice tantisper prorepens, donec cordis inuolucrum permeans, in duos truncos discindatur, quorum unus corporis superiora, alter inferiora petit. Atque ita profecto durorum crassorumque uasorum, ipsius nimirum arterialis uenæ, ac arteriæ magnæ principia adeò respondent, ut sinistram arterialis uenæ latus dextro arteriæ magnæ lateri in ipsa origine adnatum sit, amboque uasa hinc ex eminentissima cordis uentriculorum septi sede communè principium radicemque possideant, quod eousque quibusdam animalibus indurascit, ut id Galenus reuera os esse affirmet. Cæterum¹ hic in sinistro cordis uentriculo ad septi eminentissimam sedem ascensus post dextram orificij uenalis arteriæ membranam inter dissecandum latens¹ confendens que Aristoteli imposuit, ut inibi tertium cordis uentriculum constituerit, illum arteriæ magnæ principium esse recensens, quod sanè multo minus inculandum uenit, quam quod uentriculorum cordis numerum pro animalium mole uariare scripserit. At quemadmodum Galenus in huiusmodi leuib¹ & obiter

Vena arterialis.

Venalis arteria.

Diuersa Anatomiconum de cordis orificijs placita.

Magna arteria.

Li. 3. de Partibus animal. cap. 4.

b. fi. ca. 6. li. 3. D. 7. fig. h. C. C. C. c. 7. fi. H. B. H. d. 7. fi. A. B. aut D. E. e. ut 6. fig. O. in P. C. R.

f. 3. B. 7. fi. gura F.

g. 1. fi. cap. 15. li. 3. 7. fig. L.

h. 8. fig. sub E. F. G. i. 8. fi. H. H. h. 6. fi. 1. super O. l. 6. fi. L. X. m. 3. fi. L. M. 6. fi. J. K. n. 6. fig. L. M. o. 2. fi. ca. 15. li. 3. 6. fi. G.

p. 9. fig. D. D. C. 7. 12. fig. gu. D. q. 2. fi. ca. 15. li. 3. K. L.

r. 7. fi. D. E.

s. 6. fig. F.

t. figura ca. 12. li. 3. 6. fi. O. 10. fi. A. u. 10. fi. S. S. x. 6. fig. O. sub I.

y. 9. fig. L. sub E.

ter tantum traditis ab Aristotele descriptionibus prolixè refutandis occupatur, ita sanè Aristotelis sectatores hortarer, ut in Aristotelem affecti, sedulo humani corporis fabricam ipsi refecerent, eam Galeni placitis accuratè conferentes, ut tandem Galeno Anatomicorum principi id obijcerent, cuius dissectionis professores crebrò insinulatur, quum utrunque leuiter Aristotelis ut in confectionibus parum exercitati errorem illum circa partium inuentionem committentes fert: at eos grauius inculcat, qui totam uitam huic speculationi dedicauerunt, & tamen in plerisque falsi sunt. Si enim quis Galeni dogmatibus non adductus, ea diligenter examinaret, complurima profectò occurrerent, quæ altius refelli possent, quàm quæ Galenus alijs imponit Anatomis. Non enim admodum leue censetur, quod in sexto de Partium usu arterie magnæ orificium amplius uenosa: arteriæ orificio esse asserit: quum interim hoc, illo longè amplius cernatur. Neq; simpliciter Galenus magnæ arteriæ orificium uenosa: contulit, imò ceteris cordis orificijs id amplius esse contendit, adeò in Aristotelis dogmata incitatus, ut nō animaduertit uenæ causæ orificiū uel triplo maius arteriæ magnæ orificio cerni, ac re uera esse, uti & uenalis arteriæ orificiū grandius magnæ arteriæ orificio esse dicebamus. Porro quod & ego in Galeni medicinæ parentis uerba iurauerim, ac philosophis nos infectandi anam præbere neuiquam insituerim, non lubet hæc, & eius generis permulta diffusius persequi: un de etiam ad cordis membranas sermo iam uenit refectendus.

DE VNDECIM MEMBRANVLIS QVA

tuor orificiorum cordis. Caput XIII.

PRÆSENTES membræ scriatim in septima, octava, nona & decima figuris occurrunt. Septima namque tres proponit unæ causæ orificio præfectas, ac *K, L, M* insignitas. Octava tres in unæ arterialis orificio positas, & *E, F, G* notatas. Nona duas venarum arteriæ orificij *E* & *F* indicatas. Magnæ autem arteriæ tres membræ in decima *B, C, D* insignite proponuntur.



A CORPORA cordis membranas nuncupamus, quæ cordis uasorum radicibus, ipsorum uel exortibus adnata, calore, substantia, crassitie, prorsus membranæ existunt, materiem regurgitationibus præfectæ. Sunt porro hæc omnes ex præcipuorum Anatomicorum sententia undecim numero, ac tres quidem singulis trium uasorum orificijs, duæ autem duntaxat uno quarto uel adnascuntur. Vena caua, quam primum dextri uentriculi uas esse recensuimus, * suas membranas, uti modo subsistit. Cauæ exortui, qui uelut extuberans in cordis substantia, ex quo præcipuus membraneus circulus humiliori uenæ exortus parti proximè adnari modo ac uenæ initium ex cordis substantia principium ducit: & quantum exorforum è cordis uentriculo fertur, ita quoque membraneus hic cili dextri uentriculi amplitudinem procedit. Insuper ut uena caua ilico à uisui termino (ut ita dicam) enascitur, abscedit, solo exortui, qui breuissimæ substantiæ adnata: sic etiam membraneus circulus minima amplitudine cordis insidet, illico ab illa abscedens ac exacta, & solida, citra que insignem crassitiam apparens. Hæc in uentriculi cordis amplitudinem deorsum ducta, ita in tres ueluti membranas scinditur, ex amplis basi in obtusum mucronem à semicirculi conuexo differentes. Mucro autem harum membrandarum uentriculi dextri longitudinem cessat, neque aliqua ex parte, quam circum hæc tribus ipsius processibus cordis substantiæ adnascitur. Verum trium membranarum seu processuum, quæ reliquæ ipsarum corpore dior quæ efficiunt, * fibræ quædam frequenti serie enascuntur, quæ deoraplitudinem ductæ, uentriculi lateribus iuxta ipsius mucronem adnascuntur, ut Galenus innuit, ad uentriculorum cordis septum, æt etiam ad mucronis amplitudinem. Omnis namque inferior membranarum uentriculi mucronis sedi exporrigit, quæ ipsi è directo constituitur. Præsentibus commissuntur, excarnes sunt, & cordis substantiæ hæud adnascuntostoles illas nervos esse arbitrans, hinc cor neruorum principium esse dei fibræ ad uentriculi mucronem implantantur, aliquosque * carnosa

Membr. a
rum numerum

Cauda men.
branca.

Dd 2 fuba

substantia adaugentur suffulciunturque: non aliter profectò apparentes, quàm si carnes in cordis uentriculo uirgulæ essent. Cæterum mēbrana hæc propter tres membraneos ab ipsa deductos processūs, trium uenæ cauæ orificij membranularū loco enumeratur, atque quòd processūs illi quum clauduntur, atque inuicem conuiuent, spiculorū fulcis structura similiter existant, Græci *τριγώνων*, quasi trifulcas dicere, eos appellauere. Quū enim membraneo circulo adhuc patente & orbiculari seruato, tres ipsius processūs inuicem è regione illius centri cōiunt, formam effingunt triangulari cuspidi non absimilem, id quæ potissimum illi cuspidi, quo in telis Turcæ penetrandis loricis hodie utuntur, qui triangularem quidem efformant cuspidem: sed quò minus oblongum illud ferrum grauaret, anguli quæ acutiores redderentur, illi inter duos angulos sulcum elimant, adeò ut cuspis ex basi in mucronem desinens, simul tres angulos & totidem sulcos ostendat: uti etiam hīc in corde fieri animaduertes, dum inter dissecandum tres membraneos processūs inuicem committes. Cæterum si totius membranei corporis cum ipsius processibus & fibris adapti similitudinem petis, eam ex coronæ forma opportunè sumes, quam regum capitibus antiquitatem inculpsisse, in illis quæ Romæ effodiuntur imaginibus uideamus.

Venalis arteriæ mēbrana.

Porrò quemadmodum ^h uenalis arteriæ cauæ tum corpore, tum intro mittendis ad cor materijs, & ortu propemodum accedit, ita quoque uenalis arteriæ mēbranae cum cauæ orificij membranīs pleraque exigunt communia. Ad ^l radicem enim orbis uenalis arteriæ, ^k membraneus circulus ex cordis substantia enascitur, qui in sinistri cordis uentriculi amplitudinem introrsum (ut ^l uenalis arteria extrorsum) ducitur, statimque ab exortu à cordis substantia abscedit, uenæ cauæ orificij membraneo corpore huc usque quàm simillima. Verum quum aliquantisper in uentriculi amplitudinem descendit, in ^m duos tantum membraneos processūs partitur: forma quidem ⁿ illis qui ad uenæ cauæ orificiū pertinent respondentes, sed mole & robore superiores. Ex ampla enim basi in obtusum mucronē finiunt, longius in sinistri uentriculi cavitatē, quàm cauæ orificij membranulæ in dextri contingentes. Horum processuum unus dextrum uentriculi sinistri latus, alter sinistrum respicit. Anteriùs enim & posteriùs inuicem de hiscunt. Secundum uniuersam eorundem humiliorem sedem (quæ etiam ut cauæ orificij membranularum, crassior duriorque existit) ^o fibræ seriatim ex illis enascuntur, quæ deorsum porrectæ, tandem cordis substantiæ ad mucronis sinistri uentriculi amplitudinem passim adnascuntur: & quemadmodum in dextro uentriculo fieri diximus, ^p carnea cordis substantia adaugentur stabiliunturque. Cæterum quia membraneus uenalis arteriæ circulus in duos tantum processūs dirimitur, dissectionis procures duas tantum membranulas ipsius orificio præfici asserunt: quas mitræ episcopali non admodum ineptè contuleris, si modò partem caput amplectentem ipsi membraneo circulo, & huius processūs anteriori posteriorique mitræ cacumini assimilaueris. quum enim duo tantum hīc cernantur processūs, utcumque eos inuicem coniuere fingas, *τριγώνων* cum Galeno ipsas appellare non poteris, quod scilicet triangularis cuspidis imaginem nunquam referant.

Arterialis uenæ mēbrana.

Venæ arterialis ^q mēbranae dictorum modò orificiorum membranīs neque situ, neque forma, neque etiam robore respondent. A uenæ enim arterialis exortu hæc introrsum in cordis dextrum uentriculum haud pertingunt, sed totæ in eius uasis caudice consistunt, ita ab orificio extrorsum ductæ, ut commemoratæ priùs membranulæ ab orificio introrsum pertinebant. Neque etiam his unus communis quæ est circulus, uerum tres distinctæ, & non admodum ualidæ sunt mēbranae, singulæ semicirculi modo principium ducentes. Venæ enim arterialis orificium introrsum, atque in suam ipsius amplitudinem nonnihil in origine extuberans, suæ amplitudinis superficiē in tres semicirculos extrorsum à corde latefcentes distinctam obtinet: qui crassiores redditī, in ipsam uasis amplitudinem protuberant, ac suis tuberibus uelut tres triangulos ita efformant, ut in puncto se contingentes circuli extra suam superficiem, supra infraque contactus terminum angulos constituunt. Ab his semicircularibus tuberibus mēbranae tota ipsarum amplitudine, quasi semiplenæ lunæ imaginem referentes pronascuntur, nusquam uasi ipsi, præterquam ad hæc tubera, adnatæ. Harum membranarum latissima sedes, quæ extrorsum à corde magis reliquis membranarum partibus remouetur, & sola membranarum latus est, uasi ipsi non connatum, haud ita rectè cernitur, ac si singulæ mēbranae dimidiatum circulum ad amussim exprimerent: uerum modicè id latus introrsum obliquatur, & non adeò altè extrorsum uē in medio conscendit, atque terminis quibus utrinque uasi continuatur. Quum itaque hæc superior latissima quæ membranularum pars latus uē in stat dimidiatæ parenthesis ad hunc modum (inflectatur, & ipsarum membranularum exortus, & ad uasa connexus semicirculum ad amussim exprimat, Græci has membranulas *συνυσσολαί*, nuncuparunt, ab illorum *C* imagine. His tribus uenæ arterialis membranulis, tres in arteriæ magnæ ostiolo à Natura creatæ respondent, in nullo profus ab illis quàm

b6 fig. G.

19 fi. D. D.
8. Est 16 B.
F. proxima
D. D. 9 fig.
19 fi. C. C.
19 fi. E. E.
10 fig. 1, K.
17 fig. 4, K.
1, M.

09 fi. G. G.
10 fi. 16 sub
1, K.
19 fi. H. H.
H. 10 fi. N.

18 fi. E. E.
G. et 1 fi. ca.
15 li. 3 cha.
1, 2, 3.

110 fi. B. C.
D. et 1 fi. ca.
1 mjerite li.
3 charactere
res 1, 2, 3.

quàm in magnitudine & robore differentes. Magnæ enim arteriæ membranulæ tantò grandiores ualidioresq; uenæ arteriosæ membranulis uiuntur, quanto uenæ arteriosæ corpus ab arteriæ corpore duritia amplitudineq; uincitur.

DE CORDIS AURICVLIS. Caput XIII.

CORDIS auriculas quarta figura proponit I & K insignitas, ut & sexta M & F notatas. Verùm dextram auriculam inuersam ostendit septima figuræ F, & octaua K. Si nistram uerò nona figuræ L, & decima L.



VRICVLAE cordis dissectionum professoribus uocantur, appendices quidam basi ipsius adnati, à similitudine enim, quam illi in situ, non autem in usu, cum propriè dictis auribus obtinent, aurium nomine donantur. Emicat namq; ad utrumq; cordis basis seu capitis latus appendix unus, ex ampliori basi in mucronem desinens, quem ex latere quo rponitur, aut dextrum, aut sinistrum nuncupamus. Dexter itaq; appendix seu auris, dextro cordis basis lateri attenditur, totì anteriori exortus uenæ ca-

Dextrum cor-
dis auriculæ
situs.

Dextræ auri-
culæ situs, for-
ma.

uæ regioni secundum illius longitudinem obducta, & etiam suo mucrone à uenæ corpore abscedens, elatius nonnihil quàm cordis basis sursum conscendit. Voco autem exortus uenæ caua longitudinem, totam eam sedem quæ à uenæ caua parte qua propinquius cordis mucroni uena cordis substantiæ adnascitur, usq; ad eam quæ basis cordis cetro, aut ipsi arteriali uenæ uicinior est, atq; huic exortus longitudini dextræ cordis auriculæ basis longitudo respondet. Huic enim auriculæ effigies pyramidem refert, exq; oblonga basi in mucronem, qui non admodum acutus protensusq; est, desinit. Auriculæ etenim basis longitudo, quam uenæ caue ex corde principij longitudine metiri diximus, ipsius auriculæ etiam admodum distente amplitudinē ferè triplo excedit; deinde & longior multo est, quàm progressus à basi auriculæ ad ipsius mucronem pertinens. Porrigitur autem auricula à basi sursum antrosumq;, adeo ut nulli auriculæ forma, quod ad basim mucronemq;, & deinde ad cavitatem ac compressionem distentionemq; attinet, exquisitiùs contuleris, quàm coriaceis tuberibus utrinque Turcærum sellis affutis, quæ equis fluuium transnatauri uesciarum ritu magno usu inflant. Exterior namq; auriculæ superficies pro ipsius repletionem uariat: quæ enim auricula in cordis constrictione turget, operataq; est, gibba undique & æqualis & aqueo ueluti humore oblita cernitur. At inanita concidenteq; auricula, superficies hæc rugosa ac ueluti plicis oblita spectantibus occurrit: interim tamen auricula exterius aqueo humore, ut & cordis superficies, obducitur. Verùm quandoq;, licet id rariùs, exterior distente etiam auriculæ superficies inæqualis, propter adipem illi tum obnatum uisitur. Interior autem superficies auriculæ cavitatem circumscribens, uentriculorū cordis superficiei omnino respondet. Ut enim hæc ubi uasa educit leuis, tota autē reliqua sede alpe ra & foueis plena cernitur, ita quoq; illa ubi uenæ caua exortui adnascitur, leuis quidem est, reliqua autem amplitudine foueis ac fibrosis implexibus adeo scatet, ut cordis superficiei inæqualitate uincat. Atq; hæc cavitatis in amplitudine prout auriculæ corpus aut concidit aut distenditur uariat, foueæ autem nunquam penitus explicantur. Porro auriculæ substantia triplici fibrarum genere, & modica, eaq; admodum dura, & quasi cuticulari carne eas fibras amplectente constat, adeo ut auricula fibris cū cordis substantia respōdeat, ac carne (que, ut diximus, neruea magis cuticularisq; & subnigricans est) à corde differat. Neq; ab hac fibrarum cum ea carnis commixtione uix cutis crassitiem superante, aliud peculiare auricula in sui constitutionē aspicit, nō enim uenas arteriasq; & nervos peculiariter ipsi insertos comprehendimus. Cæterum auriculæ connexus propemodum ita se habet, sinistrum sui basis latus extremo cordis substantiæ, ubi anterior uenæ caue in dextro cordis sinu orificij regio consistit, adnascitur: aut uerius ab illo extremo auricula prodit. Dextrum autem basis latus uenæ caue corpori secundum ipsius exortus à corde longitudinem, & in anteriori illius sede cōnascitur, ac ueluti cum uena commune corpus efficitur. tota reliqua parte auricula ab omni prorsus cōnexu libera est, & perinde ac cordis corpus in cordis quoq; inuolucro continetur, nullis fibrosis nexibus illi commissa. Sinistra cordis auricula plerq; cum dextra possidet communia, hæc namq; in anteriori sede exortus uenalis arteriæ secundum ipsius longitudinem consistit. Deinde ex basi in mucronē quoq; cessat. uerùm is mucro qui acutior dextræ auriculæ mucrone habetur, non adeo sursum, sed in sinistrum magis atq; in latus exporrigitur. Insuper sinistra in prouectioribus ætate hominibus dextræ auriculæ dimidiatæ magnitudini cedit, ut & ipsum quoq; uenalis arteriæ ostioli longè

Dd 3 minus

Dextræ auri-
culæ substan-
tia.

Nexus auri-
culæ.

Sinistra cor-
dis auricula.

a 4. fi. I. fi-
gura B.
b 5. fig. B ad
C, aut poti-
us F septi-
mæ fig. ad
H proximū

c 7. fi. F. 8. fi.
gura K.

d 6. fig. F. 4.
fi. K. 9. fi. I.
10. fig. L.
e 6. fig. G. 9.
fig. C. C.

minus uenæ cauæ orificio uisitur. Quod ad externam internamq; attinet superficies, auriculæ utrunq; respondent. quanq; exterior sinistra superficies rugosior magis, multoq; inæqualior semper occurrat. Interior autem superficies similiter atq; in dextra auricula inæqualis, & foueis obrita cernitur. Substantia etiam similes sunt: uerum sinistra multo durior, ac minus in contractione distentioneq; sequax uisitur. Quinetiam si illam dextræ conferas, uelut marcida exsiccataq; spectabitur, adipe semper magis quam dextra exterius abundans. In connexu prorsus conueniunt, nam uti dextra uenæ cauæ & dextro cordis lateri secundum cauæ ortum adnascitur, ita quoq; sinistra dextro sui basis lateri cordis substantiæ, ubi uenalis prodit arteria, cōnascitur: sinistro autē latere ipsi uenalis arteriæ corpori. Vfu, ut suo ordine paulo post dicturi sumus, parum admodum inter se differunt. Nunc enim omnium cordis particularum, quarum iam numerum, situm, formam, connexum, substantiam que complexi sumus, uisum & functionem seriatiim subijcere enitemur: id non prætereūtes, in fœtibus & nuper natis animalibus auricularū molem longē maiorem ex proportionē occurrere, quā in ætate prouectioribus.

CORDIS, IPSIVSQVE HACTENVS COM

memoratarum partium functio et usus, ipsarumq; constructionis ratio.

Caput XV.

Cor cuius ani
ma sedes.



Medico de
animæ facul
tatibus ac fide
cōsiderandū.

Cui functioni
omnes cordis
partes simulē
iuv.

OR irascibilis, seu uindictæ honorisq; concupiscibilis animæ sedem esse, Hippocrati, Platoni, Galeno, & Stoicis ac Peripateticis pariter omnibus concessum fuit. Verum ad hæc, Zeno, ipsiusq; dogmata corroboraturus Chrysippus, Possidonius, cæteraq; Stoicorum familia, & Aristoteles cum Theophrasto, reliquisq; ipsius asseclis, cor principium fontemq; esse uoluerunt, non nunc dictæ tantum irascibilis facultatis, at etiam eius quæ ciborum, potuū, & uenereorū est appetitrix, quam alteratricē Aristoteles, alij uerò naturalem, alij autem simpliciter concupiscibile appellare cōsueuerunt. Deinde etiam Stoici unā cum Peripateticis rationis uim, & ut semel dicā, animæ principatū in corde collocarunt, omniū id in animali functionū atq; officiorū initium esse arbitrati. Quanq; interim idem inter se decretis pugnēt. Aristoteles enim, Theophrastus, ac reliquus Peripateticorū chorus, & ex Stoicis Possidonius, irascibile uim, ac cōcupiscibilem rationalemq; unius substantiæ ē cor de proficiscentis facultates esse asserunt, animæ autē species partes uel esse inficiantur, neq; eas distinguūt. Chrysippus uerò Stoicorū non postremus, sicut in unā substantiā, ita quoq; in unam facultatē & iram & cupiditatē cum ratione cōiungit. At his omnibus refragat, ex diuini atq; inter medicos facili primarij Hippocratis, & inter philosophos eminentissimi Platonis sententiā, Galenus, quū in alijs plerisq; locis, tum potissimū in nouē libris quos de Hippocratis & Platonis dogmatibus inscripsit. Illis namq; libris tres animæ species partes uel Natura admodum inter se discrepantes docens, firmissimis atq; scientiā proptus suo ipsius suffragio faciētib; demonstrationibus cōprobat, iecur ciborū potuūq; & uenereorū cōcupiscibilis animæ, cerebrū autem rationalis ac principis locum esse, cor duntaxat irascibilis animæ ergastulū esse concedens. Porro ne hic forsitan in aliquem *μετασχηματισμὸν*, ac nescio in quem hæresis censorem impingā, ab hac de animæ speciebus earundemq; sedibus disceptatione prorsus abstinebo. quū tot hodie, ac potissimum apud nostros sanctissimæ uerissimæq; nostræ religionis censores reperias: qui si aliquē aut de Platonis, aut Aristotelis, suorum uel interpretū, aut Galeni de anima sententijs, uel etiam inter celebrandā Anatomen (ubi hæc potissimum examinanda ueniunt) mussitare audierint, ilico illum de fide ambigere, ac nescio quid de Animarum immortalitate hæsitare astruūt, non perpendentes necesse esse medicis (si modò non temerē ad artem accedere, neq; inopportunē aegrotati membro remedia applicare uoluerint) de ijs quæ nos gubernāt facultatibus cōsiderare, & quot numero sint generatim, & qualis quæq; sigillatim habeat, quo uel in animalis mēbro sin gulæ constitutæ sint, & præter hæc maxime (si modò id adipisci mente possemus) quæ animæ substantia essentia uel sit. Quasi uerò non citra impietatem nullamq; prorsus fidei labem quis de grauium illorum autorum decretis nihil proponere, aut etiam illorum rationes alijs nouis corroborare, aut friuola aliorum argumenta refellere posset: ac quasi nō aliter de sanctissima, quæq; accedentibus pijs operibus fide saluamur, felicemq; æternitatē hominū animæ adipiscuntur, q̃ de his autorum dogmatibus, ac quas imbecillis & humana ratio suppetit hoc in negotio opinonibus, loquendum interrogandumq; foret. Nihilominus interim de animæ facultatibus, functionibus, substantia, natura, speciebus, & earum sedibus inuestigatione remissa, libere asseremus cor facultatis, atq; adeo spiritus uitalis fontem, & caloris natui sedem fomitemq; existere, ac pulsuum autorem esse, singulasq; cordis partes illi ad calorem spiritumq; spectanti usui subser

subseruire commonstrabimus. Quis itaq; cordis¹ inuolucri (ut singula ea serie qua earundem prius cōstructionē enarrauimus, persequamur) sit usus, peculiare de inuolucro Caput utenq; pertractauit. Deinde & cordis situs, antea commemoratus, in ipso thorace est tutissimus, & ab omnibus quæ thoraci extrinsecus noxā inferre possunt remotissimus. Præterea cor in pulmonis id suis lobis ueluti digitis quibuldam amplexantis medio ita² consistit, ut æqualem prorsus ex omnibus pulmonis partibus aëris per³ uenosam arteriam molliatur attractionem, & rursus fuliginosorum recrementorū egestionem in pulmonem tener, & iusta etiam portione per uenalem arteriam & uenam arterialem pulmoni sanguinem porrigat. Ad hæc, cor non admodum procul ab ore, per quod inspirationē perfici necesse fuit erat, locatum, eam corporis sedem nihilominus obtinet, ex qua commodè per⁴ arteriæ magnæ ramos toti corpori natium calorem, spiritumq; uitalem offerre queat. Quamuis etiam, quod ad totum corpus attinet, à medijs partibus tantū superius recedat, quantum à pubis ossiū coalitu distat. is enim erecti adultorum corporis exquisitissimū habetur medium, nō autē umbilicus, quem Galenus cordis situm enarrans, medium adamussim esse censebat. Insuper nō omnes corporis partes sedem æquē tutam nanciscuntur, quandoquidem⁵ basis ipso⁶ mucrone impensius occultatur, thoracisq; mediam sedem magis occupat. Non enim omnes cordis partes, quum idem usus singulis haud delectetur, pari tutela indigebunt. Partes enim in basi cōstitutæ, uasorū explantationi & exorui destinantur. Quæ uerò ab hac ad mucronis usque cacumen utrinq; in lateribus, & anteriùs posteriorisq; habentur, cordis uentriculorū⁷ parietes censeantur, atq; ad uentriculos cōficiendos subleuiunt. Mucro autē quodammodo processus est ualidis, ac propter cordis fibrarū hīc collectio nem copiamq; & carnis eas suffulcentis amplectentisq; duritiem, solidus admodum, & uelut cordis uentriculorum operculum recenseatur, instar propugnaculi uniuerso cordi præfectum, adeò ut mucro securius, quàm basis ipsa pectoris os anterioraq; corporis accedere queat. Mucro itaq; cordis portio ignobilissima & abiectissima creditur: basis uerò, quoniā uasorum exortibus præficitur, omniū est primaria: quæcunq; autē inter has sunt mediæ, cum uicinarum dignitate proportionē exigunt. Quæ enim basi uiciniùs accedūt, paulo minùs habendæ sunt potissimæ. At quæ inter has sunt mediæ, quantum abscedunt ab alterutra extremitatum, tantū ab earum dignitate uel deficiunt, uel accedunt. Quod porrò propter basim quoq; quam latam amplamq; ob⁸ quatuor illorū grandium uasorū initia esse oportuit, cor non exacte rotundū effectum sit, etiam si nō dicatur, omnibus manifestū esse consilio. Quamq; Natura interim cor sphericæ figure iniurijs innoxie ferēdis omniū pertinacissimæ, & cæteris omnibus capaciori, adeò accedere uoluit, ut cor in maximis ipsius dilatationibus prorsus sphericū appareat, quæ admodum in ipsius contractionibus oblongū, & pinæ nucis modò productū cernitur. Neq; etiam ob aliud oblongū cor esse dicimus, quàm quod id in mortuis concidens, productūq; semper offenditur. Si enim id in mortuis ita distentū obseruaretur, quemadmodū in uiuis sectionibus id quoties dilatur breuius quidem, sed latius fieri spectamus, tunc meritò non oblongū, sed rotundū, ac paulo minùs toto sphericū esse censeremus. Quis autem cordis substantiæ sit usus, in decimo Capite, quādo cordis cum musculo cōmunitatem, & rursus differentiā prosequemur, necessariò complexi sumus, præcipuè tum explicantes, cui potissimū muneri triplex fibrarum genus cordis substantiā intertexens, dein & caro has amplectens & suffulciēs, præficere tur. Cæterum⁹ uena cordis basim coronæ instar cingens, & ramos per externā cordis superficiem deorsum à basi exporrigens, cordis substantiæ nutrimentū suppeditat, argumētū est, cordis substantiā potius sanguine crassiore hac uena deducto, quàm tenuiori & leuiori & expurgatori quem cordis uentriculū cōtinent, enutrirī. Neq; etiā hanc mihi sententiā quis disturbaret, etiam si uenæ coronalis ramos nō penitus, sed ueluti superficietenus in cordis substantiam dispargi cōtenderet, quū tot innumeris musculis etiā uniuerso cordis corpore crassioribus uenas duntaxat ad extimā superficiē adnasci sciamus, pauciq; admodū in uniuerso corpore sint, qui in ipsorū uentres uenas penitus disseminari permittūt. Deinde nō oscitanter perpendendi ueniūt præcipuè uenæ coronalis¹⁰ rami, ex basi deorsum uersus mucronē descendētes, quorum unus anteriùs, alter posteriùs exporrigitur, uterq; secundū cordis uentriculū septi ductū protensus, quasi cordis substantiā his sedibus¹¹ septi gratia plus alimēti requireret. Quod etiā testatur ramuli sinistro cordis lateri insigniores quàm dextro exporrecti, nam quāto substantia cordis ad sinistrū finem crassior est, tanto etiā eius sedis ramuli tumidiores, frequentioresq; cernuntur. Atq; hæc eò diligētius sunt examināda, quo magis scholastici disputatores suis nugis dissolutionem interturbare assueti, sese excruciat, num uentriculus intestinaq; suo quem totius corporis gratia cōficiunt succo, an uerò sanguine enutritur: non expēdentes, alia prorsus functionē organū aliquod, puta uentriculū, intestina, uescas utraq; urinarios bilisq; meatus, uterū, ue-

Inuolucrum
us.
Situs cordis
ratio.

Lib. 2. de
cretis Hipp.
& Platonis.

Omnes cordis
partes non æ-
quē dignas ef-
fic.

Formæ cor-
dis ratio.

Cordis substantiæ
us.

Coronalis uenæ
us.

*Coronaliū ar
teriarū usus.*

*Cordis neruū
li usus.*

*Dextri cor-
dis uentriculi
usus.*

*Vena caue o-
rificij in cor-
poris uenis
usus.*

*Arterialis
uena usus, &
ipsius constru-
ctionis ratio.*

nas, arterias, & eius generis organa, sui ipsius corporis substantie nutritioni providere, & eam actionem cuius potissimum nomine cōdita sunt, obire. Parum quoque animaduertunt, publicis illis attrahendi, retinendi, propellendiq; facultatibus fibras subseruire, priuatarū autē eorundē functionum (quas in ossibus, membranis, cute, & eius generis partibus fibris carētibz expendere licet) insitam duntaxat uim citra fibrarum subsidij, autorem esse. Quinetiā huc accedunt cordis substantiā implicantibz arteriā, quas per cordis substantiam uenarum propaginibus concomitatas deferri retulimus. Hæc enī, etiam si cor instar communis officinæ caloris innati sōns sit, eumq; imprimis contineat, cordis substantiæ offerūt, eius insitum calorem temperaturæ. Porro quum hæc adamussim inquires, Galeni placito in septimo de Administrandis confectionibus libro neutiquam acquiescendū uenit, quo coronales uenas ex cordis dextro sinu pronasci docuit, illæ etenim extra sinum à caua^o enascuntur, supra trium uenæ cauæ orificij membranularum principium, adeo ut coronales uenas adiens sanguis à caua assumatur, priusquam hæc in cordis sinum sanguinem depromat. Cæterū^o neruulus cordis basi oblaues, tristantium duntaxat sensus gratia, non autem motus cordis largitur. Cordis cartilagineam, aut si uoles dicere ossēam substantiā, uenæ arterialis & magnæ arteriæ^o origini additam, aut ex qua potius illa uasā originem ducunt, ad cordis fulcimentum facere, dissectionis professores arbitrantur; & quamuis etiam ea ipsa substantia, nullum prorsus cui insisteret firmamentum habeat, nisi forsitan quatuor cordis uasā cordis inuolucrum penetrantia, uerū illa non magis huic cartilagineæ substantiæ, quàm reliquæ cordis basi (si quid modò ad stabilitatē conducerent) firmamento essent. Porro cordis uentriculorū officium eiusmodi ferē est. dexter eo quod sanguinem præcipuē cōtinet, sanguinisq; elaborationi potissimum dedicatur, sanguineus Latinis iuxta ac Græcis nuncupatur. is namq; pulmonis duntaxat gratia, à summo rerum Opifice insigni iustitia cordi insculptus est. Pulmo enim qui instar promptuarij cordi circumponitur, ut id ab illo aërem perpetuò allicere queat, rarus, fungosus, leuis, ac ad thoracis motus sequeacissimus fieri debuit. neque eiusmodi profectò suis functionibus idoneo nutrimento ali potuit, nisi priuatim illi sanguis ex eo quem caua cōtinet leuis, aërius, spumofus, expurgatus, nihilq; minus quàm seculentus, ab alio organo præpararetur, atque ita ipsi pulmonī ad opportunam nutritionem deduceretur. At nullum organū corde ipso calidissimo, & pulmonī proximo uiscere, ad id munus erat aptius: neq; etiam aliud omnino iustius pulmonī hac in re famulari poterat: quandoquidem nimis quàm ingratum cor habendum foret, si pulmonī tam amicē aërem, quo nihilico concidere emoriq; uelit, perpetuò indiget, ipsius nomine attrahenti, ac obsequentissimi famuli ritu præparati, & illius potissimum gratia fabricato, nullas uices referendas putaret, ac non modis omnibus cor, ut gratiam reponeret, pulmonī opportunum alimentum (quum id citra incommodum possit) conficere, præparare que studeret. Pulmonis igitur occasio ne dexter cordis uentriculus creatus est, quod etiā liquidissimum animalia confirmant pulmone carentia, ac ob id dextro cordis uentriculo destituta. Hic namq; uentriculus in animalibus quæ illo donantur, à^o caua uena quoties cor dilatatur, ac distenditur magnā sanguinis uim attrahit, quem adiuuantibus ad hoc uentriculi foueis excoquit, ac suo calore attenuans, leuioremq; & qui aptius impetu postmodū per arterias ferri possit, reddens, maxima portione per uentriculorum cordis septi poros in sinistrum uentriculum desudare finit; reliquam autem eius sanguinis partem dum cor cōtrahitur arctaturq; per uenam arterialem in pulmonem deriuat, ac proinde cor in dextrum uentriculū sanguinem ex caua uena quoties dilatatur, pulmonī & sinistro cordis uentriculo attrahit: atque is quem in præsentia nouimus, uenæ cauæ in cordis uentriculum orificij est usus. Vena autem arterialis sanguine in pulmonem deferendo potissimum auxiliatur. Cur uerò hæc inter reliquas corporis uenas arteriæ^o tunicas adipiscatur, in pulmonis sermone obiter expressimus, quum eam crassam ualidamq; factam esse diceremus, tum propter continuos pulmonis & cordis motus, tum etiam ne pulmo tenuis illius quem cōtinet sanguinis plus quàm ad nutritionē sufficere possit (etiam si quàm plurimo indigeat) sibi alliceret: dein ut pulmo, continuo ipsius motu & calore sanguinē in arteriali uena deductum sibi magis excoqueret, spumosioremq; redderet. qualis is iam profectò est, qui per arteriā uenalem ex sinistro cordis sinu pulmonī offertur, quum is iam in utroque cordis sinu elaboratus fuerit. Accedit huc, arterialem uenam organum soli nutritioni opportunissimē subseruiens, quodq; secundum pulmonis compressionem & dilatationē quiescere, atque quàm minimum moueri oportuit, magna Naturæ providentia alijs corporis uenis impēius rigidum, crassumq; & cōpressu dilatatuq; difficilīus factū esse. Hac siquidē ratione uenæ arteriales propagines, arteriæ uenalis & asperæ distentionē & dilatationē haud impediūt: quum interim si illæ propagines sequeaces essent, atque leui occasione distenderentur, magnam pulmonis amplitudinem illo dilatato implerent,

n 6 fig. D.
10 fig. E, F.
et h. ca. 13
lib. 3 B, B.

o 7 fig. G.

p 6 fig. h.

q circa s, s
10 fig.

r Patet in 7
et 8 fig.

s 7 figura
C, C.

t 8 fig. C, D.

u 1 fi. ca. 15
lib. 3 B, C.

plerent, & rursus compresso pulmone subsiderent, magnamq; uim in asperæ arteriæ propagi-
 nibus ex pulmonis cōpressu fieri prohiberēt. Et sanē hinc dum de uasorum robore loquimur,
 * dextræ cordis auriculæ usum petere poterimus. Quum enim cor ualido impetu distentū san-
 guinem in dextrum ipsius sinum ex caua allicit, & quodāmodo rapiens eum absorbit, quumq;
 ipsa uena caua ut ex illa in alias corporis partes sanguis non ita, ac ille pulmonis tenuis gratia
 nutritionis refudaret, non adeo crasso ualidoq; ac arteriæ constat corpore, periclitaretur profe-
 ctō uena in ualida illa cordis attractione, ne rumperetur, nisi sagax Natura dextram cordis au-
 riculam creasset, quæ ad cordis motus sequax, & sanguine plena, quum cor dilatatur, sanguinē
 eum quem continet, in dextrum uentriculum diffundere posset, ipsaq; quodammodo in uen-
 triculum attractionis impetum solutura conuolueretur, cordiq; instar promptuarij esset. Atq;
 huic usui auriculæ correspondet cuticularis constructio, quæ leuis & iniurijs interrim perferen-
 dis contumax, & ad cordis motus sequax est. caua autem uiuitur, ut continere materiam possit:
 & fibris cōstituitur, ut attractioni, retentioni & expulsionī subsēruat. Neq; etiam carne, quæ
 fibras illas amplectitur, destituta est. Verū quod cordis substantiæ ipsius auriculæ substan-
 tia adeo conuenit, uidentur ostēdere, & innata sibi facultate ad sanguinis leuem quandam cor-
 dis motu iam cessante, neq; dilatatiōe ex caua influitur, auriculas tamen adhuc palpitare, postea
 diq; ac contrahi obseruas. Cæterū ne irrita cordis dum dilatatur in dextrum sinum sanguinis
 ex caua uena fiat attractio, eodem scilicet rursus dum cor comprimeretur per idem orificiū Eu-
 7 ut in si-
 gura. ripi ritu, propulso, tres membranulas cauæ orificio Natura præposuit, quæ quidem sangui-
 nem dilatato corde in sinum ex caua influere sinunt. at compresso corde, ne idem in cauam re-
 fluat, prohibent. Quum enim dexter cordis sinus distenditur, quod fit quoties breuior reddi-
 tus in latitudinem insigniter proficit, tunc membranæ illæ laxiores factæ, ad uentriculi dextri
 latera cōcidunt, ac sanguini recluso cauæ uenæ orificio aditum præbent. At uentriculo rursus
 contracto, seu, ut in contractione fit, longiore factio, & interim arctato, membranarum fibræ,
 ipsæq; membranæ propter cordis mucronem ab ipsius basi magis abscedentem tendūtur. &
 quum uentriculi mucro in eum modum angustior efficitur, membranularū quoque fibræ mu-
 cronī uentriculi potissimum adnatæ, inuicem colliguntur, ac proinde etiam e regione centri ue-
 næ cauæ orificij, suis extremis inuicem accedentes, orificiū id occludunt, ac quo minus san-
 guis rursus in cauam profluat, obstaculo sunt. Verū & ad hanc actionem, sanguis ipse à uen-
 triculi lateribus compressus auxiliatur. is namq; quum uenæ cauæ orificiū petit, ad postero-
 rem membranarum sedem impetruit, eas uersus orificij centrum comprimens, ut illæ ma-
 gis inuicem conuieat, autor est, sibiq; ipsi ne hāc illi aditus detur, obstat, uenæ tunc arterialis
 orificiū accedens, quod quidem in cordis cōtractionibus patens sanguinem uersus pulmo-
 nem transmittit. at quo minus idem rursus dilatato corde in dextrum sinum regurgitet, tres
 membranæ arterialis uenæ orificio præfectæ cauent. Illæ etenim quia principium cum uenæ
 arterialis origine ducunt, ac sursum tensæ, in uenæ cauitatem cessant, atq; ad uenæ latera concī-
 dunt, sanguinē in cordis contractionibus promptē in uenā fluere sinunt. at quum is rursus ob
 cordis dilatationē ad uentriculū uacui fuga retractus, aut etiā in pulmonis cōpressionē uersus
 uenæ arterialis caudicē protrusus ad cor impetu uergit, per uenæ latera descendens, inter uenę
 corpus & posteriorē membranarū sedem cōcidit, spaciū quod inter corpus uenæ ac mem-
 branæ est, implens. Vnde etiā necessariō membranæ deorsum protrudens ipsis, ut ad orificij
 uenæ arterialis centrum inuicem cōnuent, orificiūq; claudant, occasio est. adeo ut quanto
 uehementius cor sua dilatatione sanguinē retrahit, ipseq; pulmo inter expirandū comprimitur,
 tanto exactius membranæ uenæ orificiū obturantes, sanguinē in cor refluere prohibēt: uerū
 nō ita accuratē id præstāt, ut nihil prorsus sanguinis in primo retractionis impetu in cor rursus
 defluat. Nam obstaculum, ne quid penitus regurgitaret, effingere, fuit impossibile. Cæterū
 quum arterialis uenæ membranulæ nullum nisi à sanguine refluente impetum sustineant, quæ
 autem uenæ cauæ orificio præficiuntur etiā secundū cordis motus^b fibrarum suarū quibus
 dextri cordis uentriculi mucrone cōnascuntur interuētū, tensionē experitū, haud mirum est,
 has illis longē ualidiores à Natura procreatas esse, atque huic cauę orificio auriculam propter
 uehementem cordis attractionē præfici, siue hanc fabrorum follium aërem attrahentiū modo
 cor molitur, id enim cordi magis quā cuius aliq; inest: siue lucernarū flammæ oleū attrahen-
 tis ritu, quippe hac uirtute cor quū innati caloris fomes existat, haud destituitur: siue rursus ut
 magnes

*Dextræ cor-
 dis auriculæ u-
 sus, & ipsius
 cōstructionis
 ratio.*

*Membranula-
 rum cauæ ori-
 ficij præfecta
 rum usus.*

*Membrana-
 rum arterialis
 uenæ orificij
 ratio.*

x fig. B. 7
 fig. F.

7 ut in si-
 gura.

7 fig. K.
 L. M.

a 8 fig. E.
 F. G.

b 7 fig. N. N.

*Sinistri cor-
dis uentriculi
usus et costru-
tionis ratio.*

magnes familiaritate qualitatis ferrum trahit: quid namque familiarius est cordi ipso aëre, ad infri-
gerationem & caloris natui enutritionem: deinde etiam sanguine utilius & benignius nihil, ad
enutritionem ac spiritum uitalem restaurandum censetur. Sinister cordis uentriculus, quod
spiritum uitalem præcipue contineat, & cõficiat, aëremque amplectatur, dislectionis professori-
bus spirituosus aëreus uenuncupatus est. Hic tanto crassioribus ex cordis substantia lateri-
bus quam dexter uentriculus, cõstituitur, quanto materia quam ipse in clusam seruat, leuior, ra-
riorque, & euaporatu promptior, uelociorque illa est, quam dextrum in se habere diximus. Eadem
enim est laterum horum uentriculorum in crassitie ob cõtentam in ipsis materiam ratio, quam
in uenæ arteriæque tunicis esse aliquando cõmemorauimus. quanquam etiam fortassis humanæ
machinæ architectus, sinistrum cordis uentriculum crassioribus lateribus etiam cõstituerit, ut
ille laterum grauitate sanguinis in dextro uentriculo cõtenti copiam pensaret. Minus enim san-
guinis in sinistro uentriculo asseruatur, estque is plerumque tenuior & flauior, quanquam interim
quandoque e contrario crassior rigidiorque appareat, calidior uero semper. Porro reliqua quæ ad
huius uentriculi partium usus enarrationem requiri possint, ex dextri uentriculi enarratione
non importunè petentur. Quemadmodum enim dexter ex caua sanguinem trahit, ita quoque
sinister aërem ex pulmone in arteriam uenalem attractum, ad se dilatato corde allicit, illoque ad
caloris innati refrigerationem & substantiæ ipsius enutritionem, spiritumque uitalem utitur, hunc
aërem excoquens & præparans; ut is unà cum sanguine qui ex dextro uentriculo in sinistrum
per uentriculorum septum copiosius refudauit, in magnam arteriam, totumque adeo corpus de-
legari possit. Quod autem eiusmodi alterationibus, cordis caro insigni artificio à rerum com-
ditore ad iustitiam temperata præficiatur, quoad diuinam hominis fabricam cognoscere possi-
mus, fatemur. Cæterum si quæ fuliginosa recrementa ex hac aëris in sinistrum uentriculum di-
latato corde contracti emutatione, ipsosque innato calore producantur, ea rursus per arteriam ue-
nalem cõstricto corde in pulmonem excerni arbitramur. Atque ea potissimum arteriæ uenalis
corporis est ratio, nam continuò indefesseque aërem ex asperæ arteriæ ramis, ipsosque adeo pul-
mone in se assumere debebat, & rursus suis motibus cordis rhythmis correspondentibus, fuligi-
nosas eiusmodi reliquias in asperæ arteriæ ramos propellere: quod sanè difficulter admodum
fecisset, nisi corpus tenuius rariisque alijs arterijs nacta fuisset. Nam et si hæc eundem cum reliquis
partibus corporis usum præstet, in quo hæc cordi accõmoda censetur, nõ tamen arteriæ pro
ipsarum mole tantum aërem qui illis non per occultos meatus, sed per patentes in ipsis cauitates
à corde unà cum sanguine offeruntur, assumere, rursusque propellere, ac arteriæ uenalis debebāt,
adeo sanè ut hæc necessariò tenui & uenarum corpore confirmata sit. Quanquam natura inter-
im adeo suæ securitati atque possibile fuit, prouidit: quippe longum ex sinistro uentriculo ad
pulmonem ductum (qui ipsi nocuus fuisset) præcauens, statim in ipso ortu eam diuisit, atque bre-
uissimo prorsus ductu illam in pulmonem digessit, ut hæc illico pulmonis substantia undique
suffulta, implicitaque, à ruptionis periculo securior euaderet. Deinde & ex ipsius corporis tenui-
tate, quam Natura nisi illa maximè indiguisset, facile uitasset, alius usus accedit, pulmonis nutri-
tioni accommodus, nam hæc arteria, ut relique totius corporis (præter asperam) omnes, san-
guine tenui ac spirituofo oppleta, etiam pulmone idoneum suppeditat sanguinem, id pulmone
supplens, quod nimium seuera rigidaque arterialis uena ob corporis sui crassitiem, & sanguinem
quoque minus quam arteriæ uenalis sanguis, leuem aëremque, pulmone denegabat. Porro sinis-
tra cordis auricula uenosa arteriæ adnata, idem prorsus officium huic & sinistro cordis sinui
præstat, quo uenæ & dextro cordis uentriculo dextram auriculam uisum esse diximus: & sinistra
auricula tanto minori cauitate donatur, quanto etiam arteriæ uenalis orificium, caux orificio
angustius uisitur. Deinde aër etiam ipso sanguine sequacior est, adeo ut & hac quoque occasione
sinistra auricula iure minor dextra creetur. Nam quum aër ita promptè attrahatur, nõ tantum
periculum erat ex attractionis impetu (qui potissimum uacui fuga aërem trahit) uenosa arteriæ
corpus, ita atque caux cõuelli. Quod autem sinistra auricula pro ipsius mole paulo carnosior
ac perinde etiam crassior & pinguior, & ad motum minus sequax quam dextra auricula cerna-
tur, argumento quoque est, ad quandam materierum præparationem auriculas cordi famula-
ri, & auriculas ipsas proportionem quandam cum cordis sinibus sortiri. Porro ut auricularum
par usus est, ita etiam sinistri uentriculi membranulæ usu penitus cum dextri uentriculi mem-
branulis conueniunt.^b Duæ enim uenalis arteriæ orificio commissæ, ac intorsum in cordis
uentriculum deductæ, corde quidem dilatato aërem ex uenali arteria in uentriculū ferri admit-
tunt, ipsarum fibris propter cordis mucronem uersus basin in dilatatione magis adductum la-
xatis, ipsisque membranulis ad uentriculi latera concidentibus. Quæ autem cor constringitur,
obstaculo sunt, ne aër rursus in uenalem arteriam ruat, irritusque cordis labor efficiatur. quan-
quam

c Patet in
9 et 10 fig-
uris.
d Rete id
ex 11. fig.

e 6 fig. 9
fig. C. C.

f 1 fig. cap.
38 lib. 1.

g 9 fig. E.
9 fig. 1.

h 6 fig. E. F.

*Cordis carnis
usus.*

*Venalis arte-
riæ corporis
ratio.*

*Sinistra cor-
dis auricula
usus.*

*Membranulæ
uicinalis arte-
riæ et mag-
næ arteriæ
usus.*

quam interim credamus has membranulas quum duæ duntaxat sint, suum orificium cui præciuntur, non ita adamussim obturare, ut fuliginosis excrementis per uenalem arteriam exitum in cordis constrictione præpediant. Quinetiam magnæ arteriæ orificium occupantes¹ membrang, ijs omnino functione respondent, quas in uenæ arterialis orificio haberi retulimus. Hæ siquidem in cordis cōtractione spiritum uitalem unā cum sanguine, quem impetu ruere Plato dicebat, in magnam arteriam profluere sinunt. at corde rursus dilatato, spiritūq; ac sanguine denuo ad uentriculum tracto, illius regurgitationē in uentriculum prohibent, sanguine nimirum eas uersus magnæ arteriæ orificij centrū (ut in arteriali uena fieri nouimus) cōprimente.

Præfens itaq; liber constructionē partium, quas Natura aëreæ substantiæ reficiendæ fabrefcit, utq; complexus est, quæ quum sui spiritus magnam portionem ad animalis spiritus in cerebro generationē mittunt, opportunē quum iam eo usq; humani corporis harmoniā deduximus, sequenti libro cerebrum sensus ac motus arbitrij principij & rationis sedem, omniumq; uiscerum in altissimo corporis locatum regem, aggrediemur. Priusquam tamen huic libro colophonem adijciam, operæ precium fuerit hoc libro traditarum partium administrandæ sectionis rationē eo ordine cōplecti, qua proximē præcedente libro, cibi portionisq; ac generationis organorum sectionem docuimus.

CORDIS, PVLMONVM, RELIQVORVM

que respirationi seruientium organorum administrandi ratio.

Caput XVI.



NATOMICAM hanc administrationē in eo cadauere, quo superiori libro descripta organa aggressus es, persequi conuenit. ita enim præfens illi administrationi, & ei quæ in septimo tradetur libro accommodabitur, ut in eodē corpore uniuersam humanarum partium fabricam in cadauerum penuria, alijs ostendere queas. Vt enim simul omnia in uno primum tua solius opera adamussim discas, impossibile arbitror. Præcedentis itaq; libri cōtinuata administratione, sustentaculum ceruici subijcto, cuius ope ea exporrigatur, caputq; in posteriora reclinatū pendeat, in quem usum quadrangulatis illis fictilibusq; lapideis uti consueui, eos secundum longitudinem tenuioribus suis lateribus mensæ innitētes ceruici supponēs, ac caput deprimēs. Deinde ut in secūdo libro docui, faciei & uniuersam colli anteriore sedē cute nudo, ac primum faciei¹ musculos, qui frōtis cutem & palpebras, deinde qui genas, labra, & nariū alas mouent aggredior, nō præteries in altero latere² uenarum, arteriarū, & neruorū ramos. Quum itaq; ad eum quem præcepimus modū, faciei musculos demonstraueris, eos qui ossi³ imaginē referenti proprii sunt, ac qui à pectoris ossē in primā laryngis cartilaginē scuti assimilata feruntur, aggredieris. Deinde à pectoris ossē & clauiculis⁴ musculū liberabis brachiū pectori adducentē, insuper⁵ illum qui à clauicula primæ costæ inseritur. Ad hos, musculū quoq; scapulam pectori adducentem à costis separabis, uenis, uti iā diximus, cū arterijs neruisq; obseruatis, aut musculos in uno latere duntaxat, in altero uerò uenas, arterias & neruos expendes: quorū series si memoria exciderit, à tertio libro & quarto uenit petēda. præfens enim locus in immensum excresceret, si illā hīc quoq; ordine recenserem. Post hos à pectoris ossē & clauiculis rescabunt, qui⁶ hinc ad mamillares capitis processus ascēdūt, hac in omnibus obseruata ratione, ut singuli suis quibus inserunt ossibus integri adhuc appensi seruetur, postmodumq; in ostendēdo reliquorū sui articuli musculorū numero accommodari possint. Quoniam autē artificio singuli sint scindēdi, quidq; in cuiusq; sectione priuatim ueniat obseruandū, in secundo libro suis locis abunde sum persecutus. In præsentia à pectoris ossē⁷ clauiculas acutiori cultello liberare contendes, robusta quibus illæ pectoris ossi colligantur ligamēta diuidēs, ac interim accuratissimē cauēs, ne cultello altius iniecto, quæ huic articulo sub sunt uasa uulneres. Atq; hic⁸ cartilaginē examinabis, quæ clauiculā pectorisq; ossis sinum, præter alias articularū cartilagines intercedit, & aliquò reponenda est, ut illa postmodū in sceleti connexu (si uisum fuerit) uti queas. Liberatas autē clauiculas nitēris ui à pectoris ossē attollere, ac ab illo primāq; costā in exteriora reflectere. ita enim primæ thoracis costæ cartilago, quā costæ ossi cōtinuatur, in conspectum ueniet: quæ cultro non admodum crasso ab ossē⁹ est liberāda, hīc quoque mente adhibita, ne culter profundius mergens, quicquam in iugulo uitiet. Vbi primæ costæ dissecueris cartilaginē, deinceps ordine reliquas omnes à costis cultro, aut si uoles nouacula dirimes, continuāq; linea intercostales musculos ad thoracis usque capacitatem¹⁰ diuidēs. Liberatum nunc cum cartilaginibus à costarum ossibus pectoris os, nōnihil eleuatim modō in dextrum, modō in sinistrum latus¹¹ reflectendū est, & thoracem intersep-

Que hoc libro petra-
data sint.

Musculorū
quorūda ex uae-
serum admini-
stratio.

Clauiculæ
à pectoris os-
se liberato.

Costarū car-
tilaginū cum
pectoris ossē,
ab ipsarū ossi-
bus liberatio.
Membr. et o-
racis ampli-
tudinē interse-
piū exan-

res

cis aliquando occurrit uena quæpiã, in sinistrum latus porrigatur, iuxta cauæ ad cor cõnexum pronata. Porrò cauæ in iugulo distributio, retusiori cultello, quo incumbens illi glandium adimetur inquirenda est, neque sanè alio tibi utendum est artificio, quàm ut nostras ad manum habeas uenarum delineationes, mentemq; summa cura accommodes, ne uenam aliquã pertundas. Vbi uerò cauæ seriem adinueris, utraque iugularis & humeraria, prius tamen quantum poteris sanguinis in illis compresso, & deinde caua uena, ubi sine pari promit uenam, uinculis interceptentur, ac quicquid uenarum inter uincula consistet, è corpore adimetur, & deinceps abluto sanguine illico ad arteriæ magnæ propaggines neruosq; recurrentes adinueniendos sectio conuertetur. Corde itaque in manu assumpto, uenæ arterialis, & arteriæ uenalis, ipsiusq; magnæ arteriæ radices, quæ cordis basi proximæ sunt, intueris: quod factum est facillimum, si cum ipsarum coloribus, tum situi mentem adhibueris. dextræ enim auriculæ uicina est arterialis uena, & albicans, ac quodammodo in sinistra proficiscens uisitur, ac inter cordis uas elatori est. Arteria autem uenalis uenæ modo nigricat, & cæteris uasis demissior, propter sinistram auriculâ latitat, neq; adeò longè ipsius progressus se offert. Magna autem arteria in cordis basi medio sub arteriali uena quodammodo occultata conspicitur. Hanc ubi primum ignitus fueris, nostra neruorū recurrentium cum arterijs effigie sectioni adhibita, omnes magnæ arteriæ ramos inquireto, quorum superiores ac iugulo proximi citra aliud opus iam erunt conspiciui, nisi fortassis glandij aliquot reliquæ adhuc supersint. Truncus autem qui ad dorsum retorquetur, non nisi sinistra pulmonis parte in dextrū latus eleuata intuebitur. Cæterum ut recurrentes uideas neruos, postquam cõmunes laryngis musculos, qui à pectoris ossis elatiori sede procedentes, infimæ scutum imitantis cartilaginis sedi implantantur, administraueris (si modo illos priusculum pectoris os adimeres, cum ossis referentis musculis, non resecueris) sexti paris neruum in latere primum dextro secundum soporariæ arteriæ longitudinem ab illa cultello sensim liberabis, ipsius ramulum qui costarum radicibus exporrigitur, quum iuxta thoracem accesseris, & quos hic musculus ex pectoris ossis summo enatis furculos deriuabat, perpendens. Simulatque uerò neruum ad arteriam dextræ axillæ porrigendam deduxeris,

Arteriæ magnæ per thoracem et iugulum et collum distributionis et neruorū recurrentium examen.

tres quos ad illam reflectit furculos (nisi duo aut unus tantum sit) quàm poteris studiose uicinis membranulis acutiori cultello liberabis: ne fortè retusiori, membranulas inter scindendum traheas furculos uiolos. quanq̃ denuo acutus fortassis furculos simul cum membranis incautè resecabit. Inuentis furculorū principijs neruū asperæ arteriæ lateri exporrectum à sua cui nectitur membrana, ipsaq; aspera arteria liberabis, longa sectione inter neruum & asperam arteriam acuto quoque cultello facta. Liberatum hoc pacto neruum summis sinistrae manus digitis apprehensum modicè ab aspera arteria attolles: sexti uerò paris truncum quæ soporariæ arteriæ exporrigitur, dextra manu eleuabis, ac deinde mutuò nunc sursum nunc deorsum ductis manibus, nerui recurrentis reflexum naturamq; perquires. Ad eundem sanè modum sinistrum, sexti paris truncum à soporaria sinistra lateris dirimere conuenit, & ipsius furculos quos musculis à pectoris ossis elatiori sede enatis, & costarū radicibus exporrigit indagare, & postmodum obseruatis quas pulmonis tunicæ deriuat propagginibus, & eo furculo quem secundum uenæ arterialis trunci sinistrum latus cordis basi offert etiam accuratè perquisito, ad magnæ usq; arteriæ truncum, qui ad dorsum reflectitur, sexti paris huius lateris neruus est deducendus, & acuto similiter cultello soboles recurrentè neruū hic efformantes sunt adinueniendæ. Hos ubi uideris, obtusorem stylo sub eo arteriæ trunco uersus sinistram asperæ arteriæ latus protrudes, & leuato nō nihil stylo, truncū arteriæ à dorso cui firmissimè cõmittitur, modicè dirimes. Deinde ab aspera arteria, neruū ad arteriæ magnæ usq; truncū liberabis, & utraq; manu ipsius reflexum, ut in dextro latere, ostendes. Reliqua uerò sexti paris neruorū ad stomachum series, nō nisi exempto pulmone cõspicietur. nunc autem si uisum fuerit, foramine inter asperæ arteriæ cartilagine factò, illiq; fistula quapiã indita, & aspera arteria super foramen compressa, pulmonem inflari curabis: inflatus siquidem suam formā manifestius commonstrat, corq; ex toto amplexatur. Demisso dein pulmone, cordi à dextræ auriculæ radice ad ipsius usq; mucronem, nouacula sectionem induces, in dextrum ipsius uentriculū usque penetrantè. Mox uentriculo digitis distento, spōgia sanguinè semel atque iterum elues. Vena enim caua & arterialis uena, ut sanguis in uentriculū fluat, isq; postmodum spongia exugatur, comprimendæ sunt. Exterio sanguine dextri uentriculi amplitudo est indaganda: deinde stylo tres membranæ ori uenæ cauæ præfectæ obiter ueniunt spectandæ. Ut uerò prorsus in conspectum ueniant, cultello ex dextro sinu in cauā uenam intruso, sectionem à uentriculo per aures corpus in uenam usq; duces: qua distenta, membranæ omnino uidebuntur, & aures cavitatis, naturaq; si ipsam inuerteris, facili hac administratione cognoscuntur. Deinde quum uenæ cauæ intueris orificium,

Pulmonis inflatio.

Dextri cordis uentriculi et ipsius orificiorū membranarūq; examen.

Et cium,

cium, coronalis uenę origo etiam apparebit: cui si stylum ex molli plumbo indideris, quo nam pacto cordis basim cingat, ramosq; in ipsius corporis superficiem deriuet, obseruabis. Hic uelim quoque ex uenę cauę amplitudine stylum in uenam coniuge destitutam inderes, ipsius a caua originem, ridiculamq; nostrorum Aesculapiorum rationem consideraturus, qui in octo utriusque lateris inferiorum costarum inflammatione, Hippocratem non mittendum esse sanguinem asseruisse affirmant, quod cor ex uena sine pari sanguinem adeo rapiat, ut nihil sanguinis missione ex uena hac educi possit. Quasi uero nunc tibi secanti non longē esset clarissimum, cor in sanguinis missione, inflammatis octo inferioribus costarum interuallis nihil ob stare, ac proinde sanguinem tunc quoque mittendum: & Hippocratem non adeo fuisse stupidum, ut octo humiliores costas sub septo transuerso esse arbitratus fuerit, & inflammationem huius sedis ad clauiculam usq; etiam tensionem producere ignorauerit. Verum hic sermo ne præter institutum ad meum de uena in laterali morbo secunda placitum longius expatietur, refrenandus uenit: quanquam meherculē nunquam magis hac de re sententiā quam præsentibus uenis indagandam arbitrer, non autem citra uenarum cognitionem solis autorum distortis suffragijs eruiendam. Porro simulatque coniuge carenti uenę stylum immiseris, oblongus crassusq; baculus cauę uenę est^o imponendus: quem quum absque negocio rectā per cauam ad inum usque uentrem protruseris, quā bellē Galenus & ceteri dissectionis professorēs huc usque hallucinati sint, discēs, qui cauam ex iecoris gibbo uno caudice enatam^o similiter ac magnam arteriam in duos trūcos, quorum hic inferiora, ille uero superiora petit, diuidi censerunt. Verum hæc quum iecur aggredieris, uisurus es explicatius, quanquam nihil prohibet, modō septum transuersum ē corpore quantum poteris refecare, iecurq; in sinistrum latus adeo reflectere, ut posterior ipsius sedes in conspectum ueniat: ac ubi baculum a uenę cauę sede quā cor spectat ad eam usque regionem qua renibus uenę offeruntur, detrusum aliquandiu in uena seruaueris, animaduertetisq; iecoris substantiam toti cauę posteriori sede non^o obduci, cultello secundū baculi longitudinem ducto cauam diuides, ac uenarum a caua iecori exportectarum^o ora inuestigabis. Deinceps qui nimium pertinaciter in Galeni Anatomes professorum primarij uerba iurauerunt appellatis, singula ipsius argumenta de uenarum ortu refutes, atq; studiosos ne ex commentarijs nauigare discant, hortaberis, unicam ueritatem, non uero auaritatem, illosq; in cathedra gestus commendans. Porro sectione rursus ad cor conuersa, digito aut stylo in elatiori dextri sinu sede arterialis uenę orificium^o inquires, & illi intruso cultello, ex dextro uentriculo aliquousque in arterialem uenam sectionem duces. Qua facta, sanguineq; si quis erit eluto, uisui sefe arterialis uenę orificium simul cum suis^o membranis offert: quas, ut exactius contempleris, stylo attolles, eodemq; arterialis uenę ductum in pulmones examinabis. Tunica etiam ipsius ex quibus arteriæ instar conformatur, facili uidentur, modō quis ductam sectionē a lateribus labris^o ue animum adhibuerit. Sinistrum cordis sinum similiter longa sectione a sinistræ auris radice ad cordis usque mucronem facta aperies, & sanguinem perinde ac in dextro exterges. In hoc ipsius primū intuebere amplitudinem, deinde cordis substantiæ in hac sede^o crassitiem, postmodum stylo^o duas arteriæ uenalis orificio præpositas membranas facile adinuenies, ac quā inuicem in cordis constrictione conuiuant, obseruabis. Ut uero exactius se offerant, cultello uenalis arteriæ ori immisso, sectionē in ipsius usq; cavitatem^o molieris, ac ad apertō distentoq; ore membranas denuō contemplabere, plumbeo stylo uenalis arteriæ in pulmones primas distributiones inquirens. Magnæ autem arteriæ orificium, & membranę ipsi præfectæ inueniuntur, si post^o alteram arterialis uenę membranā, quæ cordis sinuum septo uicinior est, digitum in elatissimā sinistri sinus regionem protruseris, is namque magnam subibit arteriam, & dein cultello secundū digitum in arteriæ orificium intruso, ex cordis sinu sectionem in arteriæ amplitudinem duces. Quando enim hanc tentaueris, & arteriæ magnæ^o membranas in ipsarum sede, quā uasis corpori incumbunt, inspexeris: coronalium arteriarū^o ortus tibi occurret: adeo ut nunc nihil in corde spectandum tibi sit reliqui, nisi fortē illo uariē dissecto, ipsius substantiam & arteriæ magnæ arterialisq; uenę dissectis radicibus, os inquirere statueris, quod cordi priuatim ab Anatomes professoribus ascribitur. Si igitur nullum os præter cartilagineas dictorum modō uasorum radices adinuenieris, illas a reliqua cordis substantia refecabis, ut simul cum cartilaginibus clauicularum articulationibus peculiare ad ossium compositionem referuari recondiq; ualeant. Corde in hunc modum abiecto, asperam arteriam (seruata interim larynge) examinabis, primū quidem ipsius cartilagineas & membranas, quibus illæ inuicem colligantur: & dein ipsius primam in pulmones seriem. qua inuenta, aliquam pulmonum fibrā integrē a reliquis pulmonibus absecabis, ac in uenę arterialis ramum, & arteriæ uenalis & asperæ ramos stylum intrudes, & diuisa pulmonis membrana horum ramorum

*Caua uenę
ortus examē.*

*Arterialis
uenę orificij
ac membrana
ruri examē.*

*Sinistri cor-
dis sinus ipsi-
usq; uasorum
ac membrana
ruri examē.*

*Cartilagineę
cordis substan-
tię examē.*

*Asperę ar-
terię
Pulmonis.*

17 fig. G.

m s. fi. G.
fig. cap. 6
lib. 3. F.

n. In D. 7. fi.
et figure
ca. 6. li. 3.
o. Vi. O. in
p. R. fi.
guar. 6.

p. V. fi. spe-
clatur in
18 fig.
q. Vi. uidere
est in fig. 6
capit. lib. 3
inferia ad
A. B.

r. Ex 7. fig. u.
ra. factus
oculauit.
s. 8. figura
E. F. G.
t. 1. fi. ca. 15
li. 3. B. C.

u. 9. figura
M. M.
x. 9. fi. E. F.
y. 9. figura
paraturus.

x. 10. fig. A.
a. Vbi in 9
figu. K. lat
tati sub E.

b. 10. fig. B.
C. D.
c. 10. fi. E. E.

nis stylum in oris usque amplitudinem protrudes, ^agargareonis naturā examinās. Mox cultello ^{a 7 muscul. tab. A.} à gargareonis radice ad incisivos usque dentes in oris tunica sectionē duces, eam cutis alicuius modo non nihil ab incumbentibus organis liberans. In hoc opere tertium ^{x 2 fig. ca. 2 li. 4. S. T. Y.} nervorum cerebri par se se offeret, quā linguæ & inferiori maxillæ derivatur, dein ^{7 2 fig. cap. 2 li. 4. r. 7.} septimum cerebri nervorum par ^{200. fig. si. e.} sexto commissum, unā cum ^{a fig. ca. 12} soporali arteria, ^{lib. 3. 25. d.} interiorique iugulari uena, & si aliquantulum ascenderis, ^{b fig. cap. 6} quartum quoque nervorum cerebri par, & ^{lib. 15.} ramos quosdam tertij paris & quinti paris temporali exporrectos musculo uidebis, si modò unum organum ab alio sensim separare non piguerit. Ad hæc linguæ musculi, uti in secundo docuimus libro, adinuenientur, in quorum administratione nervorum in linguam excurrentiū propagines, ac uenæ simul & arteriæ se se offerent. Musculi enī inferioris maxillæ reconditi, hīc paruo negotio occurrunt, ^{c 2 fig. ca. 2} is uidelicet qui in ore delitescens cum temporali & massetere maxillā sursum ducit, & ^{lib. 4. Z.} is qui a processu stylum referēti enatus, ad summū mentum inferiori maxillæ implantatur. Præterea ^{d cusp. fig. Q. 2. R. b. c.} tonsillæ, ^{e figure ca. 19 lib. 2.} aliæque glandes uasorum distributionibus in faucibus præfectæ, tibi hanc administrationem molienti pulchrè occurrent. Laryngis autem ^{f 6 muscul. tab. D.} musculi ita prorsus atque in secundo monuimus libro, sunt aggrediendi, ipsorumque nerui dum diffecantur, non perfunctoriē ueniunt anima ducendi. Ablato itaque nunc unā cum lingua osse ^{g 5 ta. H. I.} u imaginē referente, laryngeque ac stomachi initio, ^{i 1 tab. F.} inferiorem maxillam à superiori prorsus liberabis, non neglectis interim peculiaribus hīc repositis ^{k figure ca. 21 lib. 2.} cartilaginibus, quas perinde ac cartilagine clauicularū cum pectoris osse articulos intercedentes, ad scheletī cōstructionem asseruare nihil prohibet. Atque ita enī pari ratione os ^{l figura in. serra capiti 10 lib. 1.} u imaginem referēs, & laryngis nasi ^{m 4. musc. tab. L.} que alarum cartilagine ad eundem usum aliquò repones. Nunc palati tunicam, & eam quæ nares fuccingit, ab osse sedulo in hoc abrades, ut mutuum earum tunicarum discas nexum. Si uerò quum caput dorsumque mouentes musculos aggredieris, ^{n 8 musc. ta. A. B.} primum dorsum agentium par ex sententia non spectaueris, id modò ablatis his quæ fauces occupabant factu est facillimū, adeo ut & capitis dorsique motibus præfectos musculos tantisper integros asseruare nihil prohibeat, quousque inferiorem maxillam, eaque quæ faucibus continentur, sectionis seriē ademeris. Quanquam hæc omnia ex secundo libro cuius obuia esse debeāt, quemadmodum quoque ex primi libri calce discitur, quī costæ à uertebriis ad scheletī præparationem sint auferendæ, pectorisque os & cartilagine ipsi commissæ, seruandæ. Adeo ut nihil præpediat, in proposito cadauere à prima uertebra caluariam caputue ipsum liberare, in illoque quæ sequens liber enarrabit condiscere, ad cuius finem omnia quæ in nobis proposito cadauere adhuc uidentur reliqua, commemorabo.

LIBRI SEXTI FINIS.

AN-

ANDREAE VESALII⁶⁰⁵

BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPO-

RIS FABRICA LIBER SEPTIMVS, CEREBRO AN-

malis facultatis sedi & sensuum organis dedicatus, & mox in initio omnes
propemodum ipsius figuras, uti & duo proximè præceden-
tes libri, cōmonstrans.

PRIMA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.



PRIMAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERVM INDEX.

PRIMA septimi libri figura humanū caput ita adaptatū exprimit, quemadmodum id cerebro ostendēdo opportunē à collo & inferiori maxilla dissecātibus liberatur. Præterea tan- tam calvaria partē orbiculatim serra abstulimus, quanta quoq; omnīū quæ in calvaria cōtinen- tur amplitudine uidentorū gratia, auferri solet. quanta uerò illa sit, liquidò dijudicabis, si septi- mam figurā sexti capitis libri primū examinaueris, quæ hinc ablatā calvaria partem interna su- perficie exprimit. Quæadmodū itaq; præsens figura sectionis serie cæteras omnes inuicē ordine succedentes præcedit, ita quoq; illā septimi libri figurarū primā non inopportune inscribimus, quæ durā cerebri cōmonstrat membranā adhuc illasam, neq; aliqua ex parte pertusam, uulne- ratam uel. quamvis interim ipsius membranæ uincula diuulsimus, quæ per capitis suturas ad mem- branā efformandā porriguntur. quæ quod caluariā succingit, nuncupabitur. atque cum his fibris pariter uascula sunt effracta, quæ per calvaria foraminula & suturas deducta, ipsi duræ membranæ, ac illi quæ calvaria succingitur, communes censentur. Cæterum ex duobus qui figurā ambire conspiciuntur orbibus, humiliorē, cutis & membranæ ipsi subditæ cōstituunt, elatior autem ipsa est calvaria. Vniuersum uerò hoc orbe complexū, durā cerebri membranā refert, omnibus characteribus in figura cōspiciuis uniuersim. semelq; indicatam. at singuli chara- cteres in hunc modum priuatim habent.

A, A Dextrā duræ cerebri membranæ latus, seu eius membranæ pars dextrā cerebri regionē ambiens.

B, B Sinistrum duræ cerebri membranæ latus.

C, C Tertiū duræ membranæ sinus secundū capitis longitudinem exporrectus, & hic nulla ex
Ec 3 parte

parte ad apertus, uerum elatiorem ipsius costam uti naturaliter se habet integram, & quartæ circuli partis modo extuberantem ostendens.

D, D, D Duo inuicem appositi ductus, uenarū modò in duram cerebri membranam secundum ipsius uniuersum latas excurrentes.

E Ductus duræ cerebri membranæ, in quem sexta caluariæ ingrediens uena exhauritur.

F, F, F His characteribus uenulæ indicantur, à dura cerebri membrana per caluariæ foraminula ad capitis cutem, membranasq; caluariam succingentes, transmissæ, quarū frequentiores & crassiores iuxta **F** maxime latitantis sedem plerumq; obseruantur.

G, G, G Portiuncula fibrarum à dura membrana per coronalem suturam ad caluariam succingentis membranæ constitutionem profluentium.


H, H Portiuncula fibrarum quibus sagittalis sutura uiam offert.

I, I Hi quoq; characteres in umbra occipitij regionis latitant, sedem notantes, à qua fibræ porriguntur per suturam **Λ** Græcorū similem, ad calariæ inuolucri constitutionē deductæ.

K Unum tuberculū eorū quæ inæqualibus caluariæ sinibus plerumq; iuxta sagittalis suturæ cū coronali coitū cōspicuis, adnasci solēt. Caput ex quo hanc primā depinximus figurā, tribus eius generis donabatur tuberibus, quorū unum **K** insigniuimus, & utrinq; ad **H** unū quoq; se offert.

L Cautitas frontis osi iuxta superciliorum sedem propria, quæ inter secandum subinde aperitur, si quando frontis os non procul à supercilijs serra diuiditur.

SECUNDA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.



SECUNDÆ FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

PRÆSENS figura sectionis seriæ primam subsequens, tertium duræ membranæ si um (quem prima figura **C** aliquot insignitum gerit) longa sectione secundum capitis longitudinem ducta ad apertum commonstrat. Insuper ad huius tertij sinus latera, per capitis quoq; longitudinem duas deduxi sectiones, utrinque nimirū ad sinum singulas, quæ duram membranam duntaxat penetrarunt, & duræ membranæ latera ab ea membrana separariūt parte, quæ dextram cerebri partem à sinistra dirimit, atque in subsequēti figurā tribus **D** insignietur. Præter tres iam cōmemoratas sectiones utrinque aliā quoque molitus sum, quæ ab aure ad uerticē pertingēs, solam

solā quoq; durā diuisit membranā, ut illa postmodū aptē à tenui membrana cerebri possit deduci, deorsumq; (ut hic factū cernis) reflecti. Occurrit itaq; hic tenuis cerebri membrana prorsus illaesa, cerebroq; proximē obducta, & uasorum ipsius seriem in hactenus denudata regione, elegantē commonstrans.

A, A, A Elatior sedes duræ membranæ, partis dextram & sinistram cerebri partes intercedentis, atq; hæc sedes **A** & **A** notata, tertij duræ membranæ sinus costā est caluariam cōtingens, & hic per medium dissecta.

B, B Tertij duræ membranæ sinus cavitās hic est in propatulo.

C, C Orificia, uasorumq; initia ex tertio duræ membranæ sinu in tenuem membranā pertinentia. atq; hic uasorū orificia in cōspicuo sunt, à læuo huius sinus latere in tenuis membranæ partē pertinentiū, quæ sinistræ cerebri sedi obuoluitur. Orificia autem à dextro latere pronata, hic nō cōspiciuntur, uerū initia occurrūt uasorum in tenuem membranā, quæ dextræ cerebri sedi obuoluitur propagatorū, ac **D, D, D** insignitorum.


E, E & c. Tenuis membrana cerebrum inuestiens.

F, F, F Ductus, uasā ue in tenui membrana secundū cerebri inuolutionum seriem excurrentia.

G, G, G Propagines notatæ à ductibus secundū duræ membranæ latera excurrētibus, atq; in prima figura aliquot **D** notatis, in tenuem membranā pertinentes.

H, H, H Duræ membranæ portiones à tenui membrana diuulsæ, & deorsum reflexæ.

TERTIA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.

TERTIÆ FIGVRAE, EIVSDEM QVÆ CHA-
racterum Index.

IN præsentī figura à tota cerebri parte supra sectionem cōsistente, quam orbiculatim serra in caluaria molimur, utrāq; cerebri membranā, tenuem nimirum & durā auulsimus, ac duræ membranæ portionē, dextrā cerebri partem à sinistra dirimentē, atq; in secūda figura adhuc in sua sede seruatā, ab osseo diuisimus septo, quo odoratus organorum sinus distinguūtur. atq; hanc partem, ut ipsius effigies in cōspectū ueniret, super sinistrā cerebri sedē explicatā reliquimus, dextra & sinistra cerebri partibus adeo ab inuicē manūū beneficio diremptis, ut callosi corporis superior sedes elegātē se hic spectandam offerat.

- A, A* Dextra cerebri pars. *B, B, B* Sinistra cerebri pars.
C, C & cat. Hic passim cerebri conuolutiones, gyri & anfractus indicantur.
D, D, D Duræ cerebri membranæ portio, dextram cerebri partem & sinistram intercedens, hic ex sua sede super sinistram cerebri partem producta.
E, E, E Quando primum dextram cerebri partem à sinistra inter diffecandum diducere contendimus, tunc manus ope ea uasa effringuntur, quæ ex tertio duræ membranæ sinu in tenuem membranam utrobique pertinent, ac proinde quum in huius figuræ administratione id quoque nobis faciendum fuerit, effracta eorum uasorum initia hic oculis subjiciuntur.
F Ductus uenæ modo in humiliorem sedem duræ membranæ partis excurrēs, quæ dextrā cerebri partē à sinistra determinat, atq; hic ductus à quarto duræ membranæ sinu anteriori sede enascit.
G, G, G Ductus iā ante F insigniti ppagines in eadē duræ membranæ partē sursum aliquousq; excurrētes.
H, H, H Surculi ab humiliori angulo tertij duræ membranæ sinu propagati, in duræ membranæ partem, quæ dextra cerebri pars à sinistra dirimitur.
I, I Principia sunt ductuum, qui à quarto duræ membranæ sinu uenarū prorsus modo in tenuē cerebri membranam secundum callosi corporis regionem perferuntur, atque hic una cum tenui membrana auulsi sunt.
K Initium uasis à quarti sinu duræ membranæ termino pronati, atq; sub eo cerebri corpore quod testudini seu cameræ instar arcus constructæ assimilamus, in tertium cerebri uentriculū, & dehinc ad plexus constitutionem excurrentis, quem secundis seu extimo foetus inuolucro comparamus.
L, L Cerebri callosum corpus.
M, M Sinus utriusq; ad callosi corporis latera in cerebro conspicui, quos hic aliter quàm modo præstitimus, exprimere nequimus, quum angusti sint, & angustiores rimas plurimum referant.
N Portio duræ membranæ partis, dextram cerebri sedem ac sinistram interuenientis, ac superius D aliquot insignitæ, quæ septo connascebatur, olfactus organorum sinus dirimenti, ac octauo capitis ossis processui.
O, O Tenuis membranæ portio à cerebro diuulsa. *P, P* Duræ cerebri membranæ portio.

QVARTA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.



IN quarta figura omnes duræ tenuisq; membranarū partes rescuimus, quæ in prioribus figuris occurrerunt, ac dein dextrā sinistramq; cerebri portionē sectionis serie ita ademimus, ut iam cerebri uentriculi in conspectū uenire incipiāt. Primum namq; secundum dextrū callosi corporis latus, ubi sinus altero M in tertia figura notatus cōsistit, longā duximus sectionē, quæ per dextrū cerebri uentriculū ducta, dextræ cerebri partis eam portionē abstulit, quæ supra sectionē habebatur, quæ orbiculatim caluariā serra diuisus. Atq; quum idem quoque in sinistro latere absoluius, hic ad sinistrū latus sinistrā cerebri partē ita reposuimus, ut superiorē sinistri uentriculi sedem aliqua ex parte cōmonstraret, calloso interim corpore in capite adhuc seruatō.

- A, A, A Cerebri adhuc in caluaria relicti pars dextra. B, B, B Pars sinistra.
 C, C, C Portio cerebri sinistra, quæ sectionis serie à reliquo cerebro ablata, hic resupina iacet.
 D, D, D Lineæ partim cerebri assectus, et partim uariū cerebri substantiæ colorē cōmonstrantes, quicquid enim extra lineas cōsistit, quasi luteū & subcinericiū magis est: quicquid intra, ad a-
 E, F. musim album uisitur, quemadmodum E & F in dextra & sinistra cerebri parte luteum est: G
 G, H. uerō & H album prorsus, & interdum rubris punctis interstinctum.
 I, I Callosū corpus utrinq; à cerebri substantia, cui alioqui continuatur, liberum.
 K, K Callosi corporis portiuncula, adhuc sinistræ cerebri parti quæ adempta est, continua.
 L, L Dexter cerebri uentriculus. M, M Sinister cerebri uentriculus.
 N, N Sinistri uentriculi superioris sedis portio.
 O, O Plexus cerebri ab imagine quā cum extimo fœtus in uolucro similem exigit, xegodis nuncupatus.
 P, P Aranearum modo graciles uenæ dextri & sinistri uentriculi substantiæ hoc in loco connatæ, ac ab illis diductæ uasis, quæ nuper commemoratū, & secundis nō absimilem plexum extruunt.
 Q Venule à nuper quoq; cōmemoratis uasis in tenuē cerebri membranā sub callosi corporis anteriori sede huc excurrentes, & incerta serie (quemadmodum & P notatæ) inter rescandum se offerentes.

QVINTA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.

PRÆSENS figura quod ad reliquam in caluaria cerebri portionē attinet, nulla ex parte uariat: atq; id solū habet propriū, quod callosum corpus hic anteriori sua sede à cerebro primum liberauimus, ac dein eleuatum in posteriora refleximus, septum dextri ac sinistri uentriculorum diuellentes, & corporis instar testudinis extructi superiorem superficiem ob oculos ponētes.

A, A, A itaq; B, B, B, ac dein D, D, D, & E & F, & G & H eadem hic indicant, quæ in quarta figura. Sic quoque L, L, & M, M, & O & P & Q eadem insinuant.


R, R, R Notatur inferior callosi corporis superficies, est enim id à sua sede motum, atque in posteriora reflexum.



S, T, V Super-

- S, T, V Superior corporis instar fornix seu testudinis extructi superficies, & ueluti ipsius triangula-
ris circumscriptio, quam ab S ad T, & à T ad V, & ab V ad T metimur.
- X, X Dextrū uentriculū et sinistrū intercedētis septi inferior pars, corpori testudinē referēti cōtinua.
- Y, Y Septi iam commemorati superior pars, calloso corpori continua. Hoc namq; septū nō secus atq;
modo disruptū est, depingi licuit. & alia quoq; parata fuit figura, in qua duae manus (uti inter
secundum facere consueui) callosum corpus nondū in anteriore ipsius sede liberatum, modicē at-
tollebant, quo speculum seu septum adhuc integrum oculis subijceretur. Verū quū nō adeo cōcin-
nē in pictura atq; in ipsa sectione successit, eam figuram ne frustra paginā obliteraret, reieci.

SEXTA SEPTIMI LIBRI FIGURA



HÆC figura
quod ad cerebri porti-
onem in caluaria re-
lictam spectat, etiam
quartæ correspondet.
atq; à quinta in hoc dif-
fert, quod corpus testu-
dinis modo fabricatum
anteriori sua sede à ce-
rebri substantia libera
uerimus, id sursum in
posteriora reflectētes,
ut inferior ipsius super-
ficies in conspectū ueni-
ret, & uas illud etiam
cernerēt, quod à quar-
to duræ mēbranæ sinu
proratū, sub corpore
testudinis modo extru-
cto fertur, & plexum
tandem nō minimā par-
tem constituit, quos se-
cundarū imagini uete-

res assimilant. Huius autem figuræ characteres ita ut sequitur, se habent.

- A, A, A Corpus testudinis modo extructum hic inferiori ipsius superficiei, qua tertij uentriculi
superiorem constituit sedem, conspicuum.
- B, B Portio corporis instar testudinis efformati in dextro uentriculo, à cerebri substantia hic princi-
pium ducens.
- C Portio corporis testudinē forma & usu referentis, quæ ex sinistro cerebri uentriculo pronascit̃.
- D, D Dexter cerebri uentriculus. E, E Cerebri sinister uentriculus.
- F Arteria per inferiorem posterioremq; dextri uentriculi sedem à dextræ soporalis arteria re-
mo duram cerebri membranam perforante, huc in dextrum uentriculum conscendens.
- G Arteria in sinistram cerebri conscendens uentriculum.
- H Vas à quarto duræ cerebri membranæ sinu principii ducens, ac sub corpore instar testudinis
efformato, in cōmunē dextri & sinistri uentriculorū cavitatē, seu tertii uentriculū properans.
- I Vasis H insigniti in duas portiones diuisio.
- K Vasis H insigniti diuisionis altera portio, dextrum cerebri petens uentriculum.
- L Portio nuper commemorati uasis, sinistram accedens cerebri uentriculum.
- M Plexus dextri uentriculi à secundarum imagine comparatus, atq; ab arteria F insignita, &
uasis H indicati portione, quam K notauimus, constitutus.
- N Plexus sinistram cerebri uentriculum occupans, ac ex uasis G & L insinuatīs conflatus.

O, O Huius


O, O *Huiusmodi uenulae cerebri substantia hic obnascuntur, ab illis producta uasis quæ K & L nominamus.*

P *A uenis quæ cerebri substantiæ hic offeruntur, ramusculi extra uentriculorum amplitudinem hæc ad tenuem cerebri membranam pertinent.*

Q *Meatus ex cõmuni concauitate dextri ac sinistri uentriculorum, seu à tertio cerebri uentriculo recta decliuis pertinens uersus peluim, quæ cerebri pituitam excipiens, eam infundibuli modo ad glandem deferre, eius infundibuli extremo subditam.*

R, S *Canales sinus uel leuiter in uentriculorum substantia exsculpti, & pituitam ad meatus nuper Q insigniti orificium deducentes.*

SEPTIMA SEPTIMI LIBRI
FIGURA.




SEPTIMAE FIGURAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

P RÆSENS figura à tribus proximè præcedentibus plurimum uariat. nam cerebri substantiæ in illis relicta, ea pars in hac ablata cernitur, quæ dextri sinistriq; uentriculorum sedē in illis figuris cõspiciam efformabat. dein tota ea quæ cerebello adhuc innitebatur, hic quoq; resecta est, ut duræ mēbranae conspiceretur portio, cerebellū ac cerebrum intercedens. Insuper duræ membranæ sinus in illa consistentes ductis cultelli anterioris mucrone sectionibus, hic etiam aperuimus, & uas à quarto sinu duræ membranæ in cerebri uentriculos pertinēs, hic ex tertio cerebri uentriculo subleuatū, & à plexibus secundinae similibus auulsum, in posteriora refleximus,

- ut tertij cerebri uentriculi seu communis dextrij sinistriq; uentriculorum concauitatis sedes in conspectum melius uentret, unā cum eius cavitatis meatibus.
- A, A* Cerebri substantiæ adhuc in caluaria reliquæ dextra pars.
- B, B* Cerebri substantiæ adhuc in caluariæ asseruatæ sinistra pars.
- C, C, C* Lineæ hic passim conspicuæ illis correspondēt, quas tres modo præcedentes figuræ similiter cō monstrarunt. Verum quia huiusmodi lineæ substantiæ uel cerebri diuersitas, inibi duntaxat consistunt ubi cerebrum tenui membrana uicinius est, præcedentes figuræ eas solum in lateribus ostē derunt. hæc autem quum hic tanta cerebri portio ablata sit, ut iam apparens superficies in basi non procul à tenui membrana distet, etiam lineæ in basi spectantur. Quod itaque lineis hic inter *D, D, D* cipitur, fuluam seu subpallidam cerebri notat substantiam: quemadmodum sedes *D, D, D* insignita. Quod uero extra lineas consistit, alba est prorsusq; candicans cerebri substantia, hic *E, E, E*. *E, E & E* insignita.
- F* Portio est soporalis arteriæ secundum humiliorem angustiorēq; dextri uentriculi sedem sursum ad plexus secundas imitantis constitutionem prorepens. Ceterum si perpenderis quānam sede hic *F* reponatur, & quānam in sexta figura, promptē expendes, qui dexter cerebri uentriculus, quemadmodum et sinister, ex posteriori sua sede instar cornu arctatus, deorsum in anteriora per cerebri substantiam ducatur. Hic namque ubi plus cerebri substantiæ quā in sexta figurā abstulimus, præsens arteriæ portio *F* notata antrorsum magis uergit, quā *F* in sexta eadem quoque notans arteriæ portionem, ubi iam posteriorem uentriculi sedem conscendit. Atque id *F* & *G* subsequēntis figuræ magis liquidō ostendunt, in qua huius uentriculi ductus nomine, adhuc plus cerebri substantiæ, quā in hac quæ ordine septima est, abstuli.
- G* Arteriæ soporalis portio secundum humiliorem posterioremq; sinistri uentriculi sedem sursum, quemadmodum arteria *F* insignita, prorepens.
- H* Humillima sedes tertij uentriculi: quam ut aptius cerneretur, nonnihil distentam sinximus.
- I* Meatus recti decliuis ex tertio cerebri uentriculo pertinens, cerebriq; pituitam ad peluim huius excipiendæ paratam deferens.
- K* Meatus ex tertio cerebri uentriculo inter cerebri testes natesq;, in cavitatem cerebelli et dorsalis medullæ communem pertinens.
- L* Glandula nuci pineæ non ab similis, & uasorum ex quarto sinu duræ membranæ cerebrum petentium fulcrum.
- M, N* Hanc cerebri partem testes & nates quoque cerebri appellauimus, hic adhuc tenui membrana obtectas.
- O, O, etc.* Duræ cerebri membranæ processus portio uel, inter cerebellum & cerebrum reposita. Qui hæc accedunt instar uenarum ductus, partim à primo secundoq; duræ membranæ sinibus, partim uero à quarto pronascuntur.
- P, P* Duræ cerebri membranæ dexter seu primus sinus.
- Q, Q* Duræ cerebri membranæ sinister seu secundus sinus.
- R* Primi & secundi duræ membranæ sinuum congressus, quem Græcorum nonnulli *συνεχ*, quod est torcular appellarunt.
- S* Principium tertij duræ membranæ sinus.
- T* Quartus duræ membranæ sinus, similiter atque alij hic adaperitus.
- V* Vas à quarto sinu duræ membranæ in cerebri uentriculos porrectum, hic autem in posteriora ex sua sede reflexum.
- X, X* Hac sede cerebellum dura cerebri membrana non obtectum ostenditur.
- Y* Ductus uenarum modo à quarto duræ cerebri membranæ sinu in tenuem membranam pertinentes, quæ cerebellum ipsiq; cerebri testes induuntur.
- Z, Z* Duræ membranæ sedes, qua osi omnium totius corporis osium durissimo, & auditus organum intus continenti adnascitur. Hanc namq; caluariæ regionem cerebro deteximus.

OCTAVA SEPTIMI LIBRI

FIGVRA.



OCTAVAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

PRAESENS figura à septima in hoc uariat, quòd hic adhuc cerebri plus rescuerimus, & testes longa sectione in hoc diuiserimus, ut meatus occurreret ex tertio uentriculo in quartum pertinens. Ad hæc, duræ membranæ portio cerebello obducta, hic dissecta, atque in posteriora reflexa cernitur. Quum itaque præsens figura pleraque cum septima habeat communia, in hac idem *A A*, & *BB*, & *CC*, & *DD*, & *EE*, & *F* & *G* & *H*, quod in septima indicabunt. Verum arteriæ *F* & *G* insignitiæ, tanto magis hic quàm in septima antrosum uergunt, quanto magis cerebrum uersus basim in septima quàm in sexta ablatum est.

I Meatus in sexta etiam figura *I* notatus, qui recta decliuis fertur, atque cerebri pituitam ad peluim defert.

K Meatus pituitæ deducendæ paratus, qui interdum ab illo deducitur meatu qui ex tertio uentriculo inter testes in quartum uentriculum pertinet.

L Ne *L* in umbra prorsus latitaret, aut si suo poneretur loco, & eius nomine quo in conspectu esset umbra ueniret exsculpenda, itaque delineatio hic omnino uitanda, *L* ad anteriorem cerebelli partem reposui, foramen meatumque notaturus, qui ex tertio uentriculo cerebri in quartum fertur. Quod foramen si *L* in illo locaretur, exprimi neutiquam potuisset.

M Glandulam hic adhuc reliquimus, quæ pineæ nucis formam ostendens, uasorum ex quarto duræ membranæ sinu in cerebri uentriculos pertinentium fulcrum efficitur.

N, O, P, Q Quatuor his characteribus corpus id indicatur, quod ante sectionem unicum est, atque in septima figura *M* & *N* insignitur. hic uero ex sectionis serie diuisum occurrit. ac *N* & *O* eius corporis sedes indicant, quibus testium nomen accommodatur. P uero & *Q*, illas quas nates ferè nuncupamus.

Ff Cere-

- R, R, R Cerebellum tenui adhuc obductum membrana.
 S, S, etc. Vasa uenarum modo tenuem cerebelli membranam implicantia.
 T, T Propagines uasorum tenuem cerebelli membranam implicantium, ad eas producta arterias, quæ secundum dextri & sinistri cerebri uentriculorum posteriora sursum cõscendunt plexus efformaturæ, quos extimo foetus in uolucro dissectionis proceres contulerunt.
 V, V Duræ membranæ portio, quæ superiorem cerebelli sedem à cerebro dirimebat.
 X, X Propagines notantur à uasis, dictam nuper duræ membranæ portionē implicantibus, in tenuem membranam qua cerebellum uestitur excurrentes.
 Z, Z Idem hic Z & Z notant, atque in septima figura, duram uidelicet cerebri membranam ossi adnatam, in quod auditus organum reponitur.

NONA SEPTIMI LIBRI FIGURA



NONAE FIGURAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM INDEX.

IN hac figura eadem cerebri portio, quæ in octaua seruatur, uerum præsens figura in faciem prorsus reposita, eam duræ membranæ partem abscissam habet, quæ cerebrum à cerebello dirimit. deinde cerebellum hic deorsum è sua caluariæ sede manibus protractum, ac deorsum modicè inuersum propendit, ut ipsius regio caluariæ aliàs contigua, oculis subijceretur, & dorsalis medullæ cavitates uideretur, alteram partem quarti uentriculi constituens. Ad hæc, præter uenarum quarundam & neruorum progressus, etiam primus & secundus duræ membranæ sinus hic aperti ad amussim exprimuntur.

- A, A Cerebri portio adhuc in caluariæ amplitudine reliqua, atque hic in sua sede adhuc asseruata.
 B, C, D Tribus his characteribus cerebellum deorsum ex sua sede reflexum indicatur, tenui membrana adhuc inuolutum, ac dorsali medullæ connatū. Verum B priuatim cerebelli dextram indicat sedem, caluariæ sinui P notando correspondentem. D uerò sinistram, quæ illi caluariæ sedi infidet,

insidet, cui *R* inscribam. *C* autem cerebelli media pars insignitur, uermi non absimilis, & suis finibus eos constituens processus, quos uermium imagini ueteres compararunt.

E Posterior terminus medię partis cerebelli, qui uermiformiū processū posterior mihi recēsebit.

F, G, H Dorsalis medullę pars adhuc in caluaria consistens, ac *F* & *G* huius partis seu dorsalis medullę sedes indicant, quibus cerebellum cōnascitur. *H* uero sedem dorsalis medullę significat, ē caluarię amplitudine procidentem.

I Sinus dorsalis medullę calami quo scribimus mucroni non absimilis, ac mediam cavitatem constituens communis uentriculi dorsalis medullę & cerebelli: quam quartum cerebri uentriculū dissectionis periti uocarunt.

K Vasa ductus ueuentis quā, simillimi, hęc in cerebellum ab illis uasis pertinentes, quę in primum & secundum durę membranę sinus exhauriuntur, atque ut hi ductus frequentes admodum sunt, ita etiam non semper pari propagantur serie.

L Et hęc quoq; ductus uenę similis in tenuem cerebelli membranam pertinet, ab illis uasis quę hac in parte duram cerebri membranam intertexunt.

M Quintum cerebri neruorum par.

N Sextum cerebri neruorum par.


O Septimum par neruorum cerebri, atq; hic uidere est quot surculis duo postrema cerebri neruorum paria principium a dorsali medulla, nequaquam uero a cerebello, ducant.

P, Q, R Sinus occipitis ossis, quibus correspondet cerebelli figura, nam *P* cerebello inscriptum, *B* congruit. *Q* autem, *C, R* uerò, *D*.

S, S, S Dexter seu primus durę membranę sinus, hic cultelli mucrone ad apertus.

T, T, T Sinister seu secundus durę membranę sinus, atq; in nulla cerebri delineationum, horum sinum ductus ita conspiciē ac in præsentī oculis subiicitur.

DECIMA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.



DECIMÆ FIGVRÆ, EIVSDEM QVE CHARACTERVM INDEX.

H A C figura eam cerebri portionem expressimus, quę dorsalis medullę educit initium: dein cerebellum a dorsalis medullę hic conspiciua parte ademptum est, & cerebri testes, & nates, et glans pineę nucis imaginem referens, ac postremo cavitates ea dorsalis medullę quę cum cerebelli cavitare quartum cerebri efformat uentriculum, hic pariter exprimuntur.

A, A Cerebri pars dorsalem producens medullam.

B Meatus ex tertio cerebri uentriculo in quartum sub cerebri natibus tendens, cuius terminum in

C quartum pertinentem uentriculum *C* insigniui.

D Glans cerebri, nucis pineę imagini a dissectionis professoribus assimilata.

E, F, G, H His characteribus cerebri testes ac nates indicantur, uidetur nāq; dissectionis proceres gratia linę inter *E* ac *F*, et inter *G* et *H* cōspiciuę, superiora tubera *E* & *G* insignita ab inferiorioribus *F* & *H* notatis distinxisse, ac superiora testes uocauisse, quod illis glans penis quasi modo incumbit. Inferiora autem nates uocarunt, quod meatus ex tertio uentriculo in quartum per-

tinents terminus *C* hic insignitus, podici conferri possit.

I, K Sedes duæ, quibus dorsalis medullæ initium cerebello adnascitur.

L, M, N, O Cavitās dorsalis medullæ initij, alteram partē quarti uentriculi constituens, atq; ab *H*erophilo calami cavitati assimilata, quam atramēto scribentes intingimus. Sedes enim *L* insignita eius calami cavitatis parti respondet, quæ indici scribentis proxima est. *M* autem & *N* angulis illis assimilari possunt, quæ in cavitatis calami lateribus consistunt. *O* uerò mucronem exprimit, quo characteres formamus.

P Dorsalis medulla hic præsecta est, quæ in uertebras procidens caluariam egreditur.

VNDECIMA SEPTIMI LIBRI

FIGVRA



VNDECIMAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM INDEX.

HAC figura cerebellum à caluaria, ipsaq; adeo dorsali medulla auulsum & supinum iacet, humiliorem ipsius sedem qua dorsalem spectat medullā cōmonstrans. Ac proinde regiones ipsius quibus dorsali medullæ continuatur, ac sinum insuper ostendit, qui alteram portionē efformat quarti uentriculi seu sinus, cerebello & dorsali medullæ communis. Porro ad humiliorem præsentis figuræ sedem fines pinximus mediæ partis cerebelli, ut processuum uermis imaginem referentium natura conspiceretur.

A Dextra cerebelli pars tenui membrana cerebellum inuestienti liberum, uti etiam totum cerebellum hic ea membrana denudatum cōmonstratur.

B Sinistra cerebelli pars.

C, c Mediæ cerebelli pars. ac *C* notat huius partis anteriorem regionem, *c* uerò posteriorem.

D, d Fines terminiq; mediæ partis cerebelli: quorum anteriorem *D* indicat, posteriorem uerò *d*.

E Cerebelli sinus, qui cum dorsali medullæ sinu quartum nobis appellatum cerebri uentriculum constituit.


G, G His sedibus cerebellum dorsali medullæ adnascitur.

H Anterior finis mediæ partis cerebelli hic, ac si ab alio cerebello is reflectus esset, expressus.

I Posterior finis mediæ partis cerebelli, à cerebello quoq; exectus.

DVODECIMA SEPTIMI LIBRI

FIGVRA.



DVODECIMAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM INDEX.

HAC figura caput à sinistro latere exprimitur, dextro nonnihil subleuato. Ex caluarie autem amplitudine cerebellum hic euulsimus, ea tantum cerebri relicta portione, quæ in octaua & nona figuris adhuc seruabatur. Verum illa cerebri portio hic in sua non consistit sede, sed eleuata est, & in posteriora ab ipsa caluarie basi aliquousque reflexa, ut tandem in conspectum uenirent cerebri processus forma neruis non absimiles, et olfactus organo subministrantes: quorum sinister è sua sede cum ipso cerebro eleuatus est, dextro adhuc duræ cerebri membranæ quæ octauo capitis ossi obducitur, connexo.

- A, A* Cerebri pars dextra.
B, B Sinistra cerebri pars, tenui membrana adhuc quemadmodum & dextra pars obuoluta.
C Dextrum olfactus organum in sua sede adhuc seruatum.
D Sinistrum olfactus organum, una cum cerebro in posteriora reflexum.
E Sinus, cui sinistrum olfactus incumbit organum. eaq; regio duræ membranæ hic indicatur, quæ odoratus nomine hac in sede multis, sed exiguis foraminibus peruia cernitur.
F Vena caluariam petentium sexta, hic in duram cerebri membranam aliquot surculis excurrens.
G Septimus sinus olfactus organis incisos interdiuidens.
H Duræ cerebri membranæ partis portio, quæ dextram cerebri partem à sinistra dirimit.
I, I Cerebrum passim excavatæ sibi in caluarie amplitudini respondens, hic quoque ad frontis ossis regionem sibi insculptis cauernis congruit, & leuibus tuberibus prominet, quæ alij mamillares cerebri uocantur processus.
K Vena caluariam petentium quinta, cui iter præbet foramen secundo neruorum pari exsculptum.
L L, ut & subsequentes characteres, in umbra occipitij cauitatis latitat, & parui etiam est motus.
M menti, quandoquidem L caluarie sinum indicat, cut dextra cerebelli pars congruit. M sedem, N. O. quæ mediam cerebelli partem respicit. N sinum, in quem sinistra cerebelli pars reponitur. Oue P. Q. ro dextrum seu primum sinum indicat duræ membranæ. P autem tertium, Q secundum, seu sinistrum.



DECIMAE TERTIAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE
characterum Index.

HÆC figura occipitio prorsus innititur, & uniuerſa cerebri ſubſtantia quæ adhuc reliqua erat, in poſteriora deorſum deflexa pendet, ut olfactus organa, & uiſoriorum neruorum coitus, & maximi ſoporalis arteriæ rami in conſpectum uentrent.

A, A Dextra cerebri pars, adhuc tenui membrana cerebri obducta.

B, B Sinistra cerebri pars.

C, C Cerebri tubera, quæ à ſimilitudine quam cum papillis habent, mamillares cerebri proceſſus plerisque nuncupantur.

D, D Sinus olfactus organis parati.

E Septum olfactus organis paratos ſinus interdiuidens.

F, F Sinus caluariæ, quibus mamillares cerebri proceſſus *C* & *C* inſigniti congruunt.

G, G *V*tring notatur uena caluariam ingredientium ſexta.

H *V*ena caluariam ingredientium quinta.

I *V*as notatur uenæ correſpondens, in tenuem cerebri membranam ab illis uafis excurrens, quæ in dura conſiſtunt membrana.

K Principium eorum ductuum qui per duræ membranæ latus excurrunt, perinde ac ſi uena eſſet arteriæ commiſſa. Atq; hi ductus in prima figura multis *D* inſignuntur.

L, L Olfactus organa hic una cum cerebro à dura membrana deorſum diuulſa.

M Neruorum uiſoriorum coitus.

N Viſo.

N Visorius neruus dextrum oculum petens.

O Visorius neruus sinistrum petens oculum. & perinde ac dexter uenula cōcomitatus, ab illis propagata uasis, quæ tenuem cerebri membranam inibi contextunt.

P Soporalis arteriæ ramus duram cerebri membranam perforans, ad latus glandis cerebri pituitam excipientis.


Q Arteriæ *P* notatæ propago, dextrum accedens cerebri uentriculum.

R Arteriæ *P* notatæ propago hic in tenuem cerebri membranam surculos diffundens.

S Hic portio conspicitur peluis cerebri pituitam excipientis.

DECIMA QVARTA SEPTIMI LIBRI

FIGVRA.

DECIMAE QVARTAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE
characterum Index.

CAPVT hic in sinistram aurem reclinatum iacet, internæ caluariæ amplitudinis basin exprimens, dura cerebri membrana succinctam. Atque tanta duntaxat cerebri dorsalisq; medullæ adhuc asseruatur portio, quanta cerebri neruorum paribus uidendis sufficit. Visorium porro neruorum exortum cōitumq; refecui, ne peluis latèret cerebri pituitam excipiens.

A, A Modica cerebri portio unâ cum dorsalis medullæ initio.

B, B Nerui uisorii ea parte hic tantum conspicui, qua caluariæ amplitudinem egrediuntur.

C, C Peluis cerebri pituitam excipiens.

D Hic in peluum pertinet meatus cerebri pituitam ex tertio uentriculo deducens, ac *I* in septima figura & octaua notatus.

Ff 4 Dextræ

- E* Dextrae soporalis arteriae ramus, duram membranam ad latus dextrum glandis perforans, qua cerebri pituita excipitur.
- F* Sinistrae soporalis arteriae ramus iuxta sinistrum latus dictae nuper glandis duram cerebri membranam perforans.
- G* Secundum cerebri nervorum par.
- H* Tertij paris nervorum cerebri gracilior radix.
- I* Tertij paris nervorum cerebri crassior radix.
- K* Quartum nervorum cerebri par, tertij paris crassiori radici conterminum.
- L* Minor radix quinti paris nervorum cerebri, omnibus ignorata Anatomes professoribus.
- M* Quintum nervorum cerebri par, seu maior quinti paris radix.
- N* Sexti paris nervorum cerebri principia ac furculi.
- O* Septimi paris nervorum cerebri principia ac furculi. Si quid in hac figura spectandum sit reliquum, id absque characterum opera prompte, uel ex proxime praecedentibus percipitur.

DECIMA QUINTA SEPTIMI LIBRI

FIGVRA.




DECIMAE QUINTAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

PRÆSENTI figura portionem eam amplitudinis calvariae dura cerebri membrana succinctam depinximus, quæ supra ossis cuneum imitantis medium habetur, una cum modo indicandis organis. Abs re nancq; fuisset, integrum caput harum particularum gratia delineasse.

- A, B* Nervorum inferiorum portiones.
- C* Sinistri lateris arteria, quæ duram membranam hic perforans, partim in tenuem cerebri membranam, partim uero in dextrum cerebri uentriculum digeritur.
- D* Dextri lateris arteria.
- E* Sic pelvis collecta propendet, cerebri pituitam ex tertio defluentem uentriculo excipiens.
- F* Foramen, quo pelvis huius infundibuli modo extructæ finis glandem petit, cerebri pituitam excipiens.
- G, G* Secundi paris nervorum cerebri portiones.

H *A* *C* figura nudam depinximus glandem, qua cerebri pituita excipitur, una cum pelui seu infundibulo pituitam huc deferente, & hic flaccido propendente. *A* lateribus uero arteriarum soporalium portiones, quæ reticularem plexum efformare dicuntur, ita hic expressimus, uti nobis inter secundum occurrere. Atq; ut eæ arteriarum portiones uariè se secantibus offerunt, ita quoq; uariè eas delineauimus.



A Glands, cerebri pituitam excipiens.

B Peluis, seu infundibulum cerebri pituitam super modò dictam glandem deferens.

C, C Arteriarum portio, quæ secundum suorū in osse caluariæ foraminum ductū obliquè ferūtur.

D Sinistræ arteriæ ramus in duræ membranæ sinistrum latus excurrrens.

E Arteriæ sinistræ portio per proprium foramen ad narium usq; amplitudinem pertingens.

F, F Hac sede diuersam arteriæ seriem delineauimus. ac dextrum quidem *F* arteriam notat ea seriem ductam ut hic non dirimatur: quemadmodum sinistrum *F* arteriam banc in duos ramos, qui mox in unum rursus coeunt, insinuat.

G Arteriarum portiones duram cerebri membranam perreptantes, ac partim in cerebri uentriculos, partim in tenuem membranam cerebri basio ductam digesti.

H Propago arteriæ per foramen secundi paris neruorum cerebri caluariam excidens, ac neruum uisorium, ac dein oculum petens.

DECIMASEPTIMA LIBRI SEPTIMI
FIGVRA.

H *A* *C* figura plexum sinximus, cuiusmodi is esse deberet, qui Galeni in *A, B,* libris de *V*su partium descriptionibus conueniret. Significet itaq; hic *A* & *B* arterias caluariam subeuntes, moxq; in mirabilem illū plexum diffusas. *C, D,* *E* ramos in quos plexus illius propagines colligūtur, quiq; illis prorsus arteriarum magnitudine respondent, quas *A* & *B* indicauimus. Cæterum *E* glandem notat, pituitam cerebri excipientem.



P R A E S E N T I figura arteriarum sub dura cerebri mēbrana cōsistentium, ac ad glandis cerebri pituitam admittentis latus reptantium seriem depinximus, quam in ouium ac bonum capitibus obseruamus. Atq; hanc proponere libuit, ne quis nos latere arbitraretur, quæ illorum animalium hic cum homine sit differentia. Significat autem in hac figura *A* dictam iam sapius glandem, *B* & *C* arteriarum sedem, qua primum in caluariam ingrediuntur.



DECIMAOCTAUA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.

P A R V A hac figura erectam sinximus peluim, seu cyathum, quo cerebri pituita in glandem ipsi subditum distillat. ac dein hic sinximus quatuor ductus a glande pituita per proxima glandi foramina deferētes. Indicet igitur *A* glandem, cui pituita instillatur. *B* peluim, qua hæc ducitur. *C, D,* *E, F* uero, meatus ad faciliorem pituitæ huc decubentis egressum paratos.



Porro præter has septimi libri figuras, ad earum potissimum cognitionem spectantes quæ in caluariæ habentur amplitudine, etiam hic faciūt duæ figuræ mox ad finem primi Capitis libri quatti additæ, & septem partium neruorum cerebri delineationem exprinētes: quas quum illic prolixè indicauerimus, abs re prorsus esset easdem hic quoq; reponere, et earū indicē ascribere. Præterea figuræ oculi constructionem exprimentes, etiam si ad septimum referantur librum, tamen Capiti decimoquarto duntaxat illas præponam, quod oculorum fabricæ dedicabitur. Atq; id in illis figuris priuatim faciam, quod nulli alteri quàm dicto iam Capiti famulentur.

CEREBRVM GRATIA PRINCIPIS ANIMAE,
quemadmodum sensus quoque ac motus ex nostro arbitrato pendens,
extractum esse. Caput I.

Quid quintus
liber et sextus
pertractatus.



Septimi libri
argumentum.

Cerebri fun-
ctionū et par-
tium breuiter
numeratio.

In lib. de Ve-
narum et Ar-
teriarū sectio-
ne.

INSTRUMENTA nutritioni famulantia duobus proximè precedentibus libris utcunq; aggressus sum. Prior namq; cibi potionisq; organa (in quorum præcipuo uiscere concupiscibilem animā residere diximus) & dein propter loci uiciniam, partiumq; cōnexum membra generationi dedicata enarrauit. Posterior autem eas partes recensuit, quibus aeræ substantiæ reficiendæ, ac innati caloris augendi recreandiq; munus concreditur: in quorum primario uiscere uim irascibilis animæ insitam esse innuimus, inibi Stoicorum & Peripateticorum suffragijs haud adeò acquiescentes, ut & animæ principatum in corde collocari testemur, neruosq; ab illo originem ducere donaremus.

Quapropter quum sensus motusq; arbitrarij, & principis animæ (cuius beneficio imaginamur, ratiocinamur, memoramus) fomes adhuc commemoranda supersit, præfens liber illi opportunè consecrabitur, cerebrum ipsiusq; partes uniuersas unā cum sensuum organīs pertractaturus. Quemadmodum itaq; cordis substantiæ, uitalis animæ uis, ac propriæ iecoris carni, naturalis animæ facultas induntur, in super ut iecur crassiorē sanguinem, ac qui perquā caliginosus est, naturalem spiritum, & cor item rursus sanguinem impetu per corpus ruentem unā cum uitali spiritu conficiunt, & perinde atq; hæc uiscera per dedicatos sibi canales omnibus corporis partibus suas materias deriuant, ita quoq; cerebrum aptam ipsius muneris obtinens materiā, in proprijs sedibus, ac illius functioni appositè subministrantibus instrumentis, animale spiritum longè clarissimū tenuissimūq; parat, quoad diuinas principis animæ operationes partim utitur, partim autem ad sensuum motusq; instrumenta per neruos tanquam per funiculos continuo distribuit, ea nunquam spiritu, qui præcipuus eorum instrumentorū functionis autor censetur, destituens, non minus sanè quā iecur & cor nullas corporis partes suis quas illis impertiunt materijs (tantisper dum ualet homo) indigas relinquunt, etiam si non semper cum qualitate tum copia easdem diffundant. Nervi igitur (quorum originē à cerebro pendere in quarto libro indicauimus) id cerebro præstant, quod magna arteria cordi, & caua iecori, ut qui paratum à cerebro spiritum illis quibus hunc mandari oportuit instrumentis deducant, diligentesq; cerebri satellites & nuncij censeantur, Cæterum animali spiritui materiā suppetit uitalis spiritus, in arterijs numerosa serie ambas cerebri membranas accedentibus abundans, & dein aer quem uersus cerebrum tum per foraminula priuatim olfactus organi occasione in octauo caluariæ osse excelsa, tum comprimis per ea caluariæ foramina quæ palatum spectant, inter spirandum attrahi multo antè diximus. Ac aer quidem, qui dum inspiramus per angustissimos flexuososq; & tortuosos ductus inter duram cerebri membranā ac tenuem attrahitur, atq; ob difficile transitum extenuatur, cerebroq; aptissimus redditur, undecunq; ubi aditum reperit, in cerebri dextrum & sinistrum, & horū medium uentriculos sese insinuat. Vitalis autem spiritus & copiosissimus in omnibus tenuis duræq; membranæ ualis ductibus ue habeatur, attamen in dextrum & sinistrum cerebri uentriculos plurimus à præcipuis arteriarum ramis fertur, quas superius obliquo longoq; ductu contra Galeni placitum caluariam perforare, atq; ad glandis cerebri pituitam excipientis latera porrigi retulimus. Ab his namq; arterijs, quas reticulatè plexum Galenus efformare docuit, non minimæ soboles tenuis membranæ processibus suffultæ, per humillimas dextri sinistriq; uentriculi sedes ingrediuntur, tandem secundum totum uentriculorum progressum in illorum amplitudinem incedentes. Verum præter has arterias, & quarto quem ego ita nunc cupaui duræ membranæ sinu uas quoddā sub eo corpore quod testudinis, cameræ ue instar arcus extructæ imaginē refert, ac nobis cameratū appellatur, in anteriora cerebri per cōmunem dextri sinistriq; uentriculi cavitatem, seu potius tertium cerebri uentriculum cōtēdit. Hoc uas tandē in duos ramos bipartitum, uno ad dextrum, altero ad sinistrum uentriculum diffunditur, & eius loci arterijs commixtū, rete efformat, quod ab extimi foetus inuolucri imagine nomē inuenit. Ab aere itaque in cerebrum ingresso, ac uitali illo spiritu ob frequentes sanè anfractus ad cerebri usus magis magisque adaptato, in cerebri dextro sinistroy uentriculis, & ipsorum mutua concacuitate

tertio ue

d 2 fi. ca. 2.
e 2, 3 fig.
ca 11 lib. 4.
b fi. cap. 12
lib. 3.
c fig. cap. 6
lib. 3.
d 8 fi. ca. 6
li. 1 A, B, A.
e 2 fig. cap. 5
ca 12 lib. 1.
f 2 fi. inter
H, H, H
E, E, E. aut
inter D, E.
G, H, K
A, A, B, B fi
gura 13.
g 4, 5 fig.
L, L.
h 4, 5 fig.
M, M.
i 7 fig. H.
k Totā fig.
ca. 14 li. 3.
l 6 fi. C, C.
aut fi. cap.
14 li. 3 L.
m 16, 18 fi-
gura A.
n 14 fig. E.
p aut 6, 7
8 fig. F, G.
o 7 fig. T.
p 7 fig. V.
aut 6 fig.
H, I, sub A.
A, A.
q 6 figur. in
K, L.
r 6 fi. M, N.

tertio uentriculo animalis spiritus à cerebri uirtute elaboratur, quam ab opportuno elementorum ad iustitiam cerebri substantiæ temperamento, pendere credimus. Porro huius spiritus animalis portio^s tertio cerebri uentriculo per oblongū meatum^s inter ea corpora cerebri quæ clunibus & testibus assimilabuntur porrectum, in cerebelli uentriculum fertur, quem partim cerebelli sinus, partim dorsalis medullæ cavitās efformant. Ab hoc uentriculo in^s dorsalem medullam, atq; ita in neruos ab illa propagatos, animalis spiritus non medio cris portio digeritur. A reliquis autem cerebri uentriculis, spiritum in neruos ab illis proximè principii^s ducentes, ac sic in sensuum motusq; arbitrarij organa dispensari arbitramur, non admodum anxie disceptantes, num spiritus ille tenuissimus per aliquos neruorum meatus (ut uitalis per arterias) an secundum nerui corporis latera luminis modò ad columnam, dirigatur: an uerò neruorum duntaxat continuitate cerebri uis ad partes pertingat. Atq; hætenus sanè cerebri functiones in uiuorum animalium sectionibus admodum probabiliter & uerè quodammodo possum assequi. Sed quò in imaginatione, ratiocinatione, cogitatione, memoria (aut quomodocunq; aliter, nescio quorum dogmatibus acquiescens, principis animæ uires subdiuidere, aut enumerare uelis) cerebrum suo fungatur munere, haud quaq; ex sententia apprehendo, & si fortè accurato indefectòq; cerebri partium intuitu, ac deinceps ex reliquarum partium corporis, quarum usus uel leuiter in dissectione exercitatum haud latet, speculatione, qua similitudo indagaretur, uel probabile quid in dispisci possem, id sanè citra sanctissimæ fidei labem neutiquam conficeretur. Quis enim, Deum immortalē, huius ætatis philosophorū, addam & theologorum uulgus nō admirabitur, qui tam ridiculè diuinæ ac summè admirabili hominis cerebri machinæ detrahentes, ex ipsorū somnijs in humanæ fabricæ cōditorem impijsimis, nō secus quàm si Promethei essent, nescio quam cerebri struem nugacissimè ementiūt, eam quam incredibili prouidentia atque ad eòs quos corpori præstare debuit uisibus affabrè immensus rerum Opifex effinxit, procul ab oculis arcentes, suamq; tot inartificiofis abundantem monstris præponentes, & parum (prò pudor) solliciti in quantam impietatem teneros quos instituunt animos temporis successu rapiunt, tunc uidelicet, quum illi præceptorum secus non amplius addidit, & Naturæ operum discendi cognoscenti q; studio flagrantes, proprijs manibus in homine cæterisq; animalibus, quæ ipsis fuere tradita, rimari, altiusq; expendere aggrediuntur. Nondū enim memoriæ excidit, me quum in Castrēnsi pædagogio Louaniensis gymnasij facillè præcipuo ac laudatissimo, philosophiæ operam nauarem, in commentarijs quos præceptor noster professione theologus, ob idq; ad pias opiniones cum philosophorū miscendas inter reliquos eius Academiæ moderatores paratissimus, in Aristotelis libros de Anima prælegebat, scripsisse, cerebrum tribus donari uentriculis, atq; horum primum anteriorem, secundum medium, & tertium posterio-rem esse, eosq; à situ ad hunc modum nomen obtinere, & à functione etiam aliter appellari. Siquidem primus seu anterior, qui frontem respicere dicebatur, sensus cōmunis uentriculus nuncupatus est, quòd ab hoc quinque sensuum nerui suis instrumētis deferri, & dein horum neruorum beneficio odores, colores, sapores, sonos, & tactiles qualitates in hunc uentriculum deduci, illi homines arbitrantur. Ac proinde præcipuus primi uentriculi usus censebatur, ut obiecta quinque sensuum, quorum genus sensum communem uulgò uocamus, reciperet: atq; illa ad secundum uentriculum, qui meatu quodam primo nesciebatur, transmitteret, quò secundus de eo obiecto imaginari, ratiocinari & cogitare possit, quippe uentriculo illi cogitatio seu ratio tribuebatur. Tertius autè uentriculus memoriæ erat sacer, in quem secundus omnia quæ ex obiectis illis, de quibus abudè ratiocinatus esset, mādari uoluit, cōmodo deponerebat. Atq; tertius uentriculus hæc prout humidior siccior uel erat, aut ocyus aut tardius sibi, uelut in ceram aut lapidem duriorē insculpebat. Dein pro sculpturæ leuitate uel difficultate præsentem uentriculum quæ ipsi mandātur, aut breuiori, aut longiori temporis intervallo asseruare, commentaria illa docent. Neque profectò tertius iste uentriculus hæc sibi suoq; nomine, aut retinet, aut insculpit, sed secundi uentriculi gratia, nimirū ut quoties hic de aliquo memoriæ sinui concreto, ratiocinari instituit, ille ocyus hoc quicquid est in secundum uentriculū deleget, ac ueluti in rationis officinā uersandū exporrigat. Cæterum ut singula quæ ita nos edocebamur, aptius assequeremur, tabula quædā ostendebatur nescio à qua philosophiæ Margarita deprompta, dictosq; iam uentriculos oculis subiiciens, quam nos discipuli prout scholasticæ picture quicq; erat studiosior, suis commentarijs expressius appingebamus. Neq; hac figura tres duntaxat uentriculos completi nobis persuadebatur, uerum ipsam quoq; omnes simul capitis partes, nedum cerebri, ostendere arbitrabamur. Atq; hæc Opificis nostri solertiā in corporis humani fabrica nunq; inspicientiū sunt figmenta: qui quàm in cerebri cōstructione enarrāda aberrant, sequēs sermo ostendet, qui eadem methodo qua in duobus proximè præcedētib; libris usus sum, post perfunctoriam hanc cerebri descriptionem, ipsius partes seorsum singulas unā cum

Thomæ, Scoti, Alberti, & eius cohortis scriptorum de cerebri uentriculis opinio.

omni.

s 7, 8 fig. ab
H per K in
I si. none et
E si. undec
m. s.
t 10 si. E, F,
G, H.
u 9 fig. H.

omnibus sensus instrumentis explicabit. Quantum uero impietatis imperitis, & non adeo adhuc in sanctissima nostra fide obfirmatis animis, eiusmodi uentriculorum cerebri usu (quod ad principis animae uires spectat) descriptio conciliare possit, hi (etiam si ipse sileat) perpendunt, qui quaedrupedum (quibus omnem rationis uim, ac praecipue animam rationalem ex theologorum praecipue placitis adimimus) cerebra, hominum cerebris quam proximè omni ex parte accedere didicerunt. Quandoquidè ouis, caprae, bouis, felis, simiae, canis, & quas secui auius cerebri cum humano cerebro in partium conformacione, ac potissimum in uentriculis, uix ulla prorsus occurrat differentia, nisi quod mole cerebra pro animalium qua donata uidentur ratione, certo uariare cognoscimus. Homini namque cerebrum obtigit maximè, mox simiae, cani, ac eadè serie deinceps, prout animal quoduis ad rationis uim uiciniùs accedere quibusdà argumentis colligimus. Neque cerebrum homini tantum pro corporis ipsius portione grandius obtigit, imò id omnium animalium cerebris maius uisitur. Hominis namque cerebrum uel duobus equorum, bouum, aut aliorum cerebris grandius apparet. Sed haec omnia, ut & uentriculorum fabrica, ex sequentibus euadent perspicuissima.

DE DURA CEREBRUM AMBIENTE

membrana, & sub cute caluariâ succingente membranula. Caput II.

DURA cerebri membrana in multis occurrit figuris. in prima enim externa ipsius proponitur sedes uniuersa, quae supra scissuram consistit, qua cerebrum ostensuri, caluariam diuidere solent. Secunda uero eam membrana partem interna monstrat sedem, uti etiam nona, duodecima, decimatercia, internam sedem proponunt, qua caluariæ regionem succingit infra dictam nuper scissuram, consistentem. Ceterum processum ipsius inter dextram & sinistram cerebri partes deductum, refert tertia figura ad D, D. Illum autem qui cerebellum infernitur, septima figura O, O, O. Atque in illis etiam figuris dura membranae occurrunt sinus, uti optime figuræ capitis decimi quarti libri tertij. Porro membrana caluariæ exterius obducta nullibi priuatim delineauimus, quum tenuis sit, ac ossi undique circumdetur, atque ex ossis circumscriptione petenda ueniat.



Dura mēbra
nae siue, ac nu-
merus, magni-
tudo, forma.

QUAMADMODUM sanè uniuersam cauitatem qua nutritionis organa continentur, peritonæo succingi recensuimus, atque id instar sacci cuiusdā omnia illi imposita amplecti, & pariter quoque costas succingentē tunicam omnia quæ in thorace collocantur, ambire commemorauimus, ita etiam uniuersa caluariæ^b cauitas cerebro excipiendo adaptata, quadā subducitur membrana, quam propter crassitiem qua cæteris non cerebri modò, uerū totius corporis præstat membranis, crassam, & ab insigni duritiæ duram, ut & cuticularem, nuncupamus. Hæc non minùs quam peritonæum & costas succingens membrana unica cōtinuatur omnino uisitur, præterquod quibusdā^d foraminibus & sinibus uenarū modò extructis sit peruia. Vnde etiā ilico præsentis membranae sitū, & quod ad ipsius externā superficiē attinet formā, magnitudinēque, etiā si aliud nihil sermoni addidero, ossium cognitio edocet. Quandoquidè nullā caluariæ os priuatim alicuius usus gratia, in caluariæ amplitudinē extuberat, cui hæc mēbrana non cēdat, sed ab illo introrsum premisat. Rursus nullus in ea cauitate consistit sinus, quæ hæc quoque mēbrana non impleat, atque (ut semel dicā) omni ex parte ossibus proxima nectitur, alijs locis remissius, alijs uehementius, uti paulo post audies, cōnata. Atque hinc etiā sit, externā durioris membranae superficiē propter ossium sinuum, tuberaque inæquale, & deinde fibrarū quibus hæc ossibus cōmittitur occasione, asperā, aut non adamussim læuē lubricamque uideri. Ac præcipua ossium tubera, quæ eā orbicularē sphaeræque modò rotundā esse prohibent, in capitis potissimum basi cōspiciunt. & horū quidē primū censerī potest^e ossis septū olfactus organorū sedē inter diuidēs: dein ea caluariæ^f extuberantia, quæ ut oculis in caluariā^g sedes cōmoda exsculperetur, in capitis amplitudinē iuxta illius basis anteriora ac septij illius latera extuberat. Præterea inæqualitas illa, quæ propter ossis cuneiformis crassitiē in qua ipsi propriae consistunt^h cauernæ parandā, & aptaⁱ glandule cerebri pituitā excipietis sedē insculpendā, in medio ferè amplitudinis caluariæ cernit. Deinceps alia duo insignia quoque tubera in hac amplitudinē ideopminēt, ut idonea auditis^j organi sedē Natura fingeret. Postremò ea quoque^k eminētia iā dictis accedit, quæ in occipiti ossis à posteriori parte foraminis spinalē medullā transmittētis rectā sursum ad mediū interuallū porrigit, quod inter id foramen & futuræ Græcorū^l imaginē exprimentis eminentior sedē consistit. Atque hæc capitis ossium tubera quæ minus dura mēbrana in ipsius basi instar oblongæ sphaeræ utrinque ad anteriora leuiter depressæ appareat, in causa præcipue censent. Alia uero^m tubercula, quæ propria duræ membranæ uasa uenarū ac arteriarū ferè maioriā continētia in exteriori ipsius superficie efformant, non adeo illius orbiculatim formā interturbant, E.

a 1, 2, 3 fig. l. l.
5 A, B, C, D.
b Hæc ossis
dicitur simul
in 6 & 7 fi-
guris cap. 6
lib. 1.
c 1 fig. A, B,
B, 2 fig. A,
H, H. deim
in tota cal-
uariæ basi
in 14 fig.
d 1 fi. C, C,
C. D, D. E.
7 fig. P, P.
Q, Q. R. S.
T.
e 3 fig. cap.
12 lib. 1. n.
f ad latera
m, n, x, l. fi-
gu. 3 capiti-
12 lib. 1.
aut hic ad
latera G, G
13 fig.
g Occurrit
hæc pluri-
mis insigni-
ta characteri-
bus 1 fig.
ca. 9 lib. 1.
h 8 fig. ca. 6
lib. 1. C, D.
i 3 fig. cap. 12
lib. 1. M.
k 16 fig. A.
l Inter T, T,
R, A, A, A.
fi. 3 ca. 12 li-
1. aut hic 7
8 fi. Z.
m fig. cap.
8 lib. 1.
n 3 fi. ca. 12
lib. 1. ab e ad
h. aut hic 9
fi. Q. 12 fi-
gura 13.
o 1 fig. C, C,
C, D, D, D.

bant, seu quo minus rotunda uisatur, non magnopere obstant, quum hæc uenarū duntaxat ritu protuberent. Porro nullus in caluariæ amplitudine sinus (præter eos quos necessarîo nuper commemorata in basi capitis tubera constituunt) occurrit, quem Natura non exculperit duræ membranæ uasorū gratia, ut scilicet sinus uasis cedant, ac citra compressionē ipsius locū dent, & ne duræ membranæ uasa ipsi membranæ damno sint, quo minus hæc ossi proxima apponi

*Duræ mēbra
næ ad caluarii
am nexu.*

queat. Ex horū sinuum numero illæ cauitates sunt, quæ extuberans latus⁹ primi duræ mēbranæ sinus & secundus & tertius admittunt, deinde illi quoque sinus, qui in caluariæ lateribus instar mediæ cauitatis uenarum multiplici serie exculpuntur, & si quis alius eius generis in anteriori olfactus organorū sedis regione conspiciatur. Cuiusmodi uerò hæc duræ membranæ uasa sint, ac unde principium ducāt, in tertio libro fidelissimè expressimus. Porro ut externā huius membranæ superficiē cognitu meherculè in capitis uulneribus perq̃ necessariam, sermone totam & diligenter perstringamus, nunc fibras ipsius, & ad caluariā connexū recensebo. Primum citra alterius corporis interuentum hæc undiq̃ ossi attigua est, parua omnino ipsius regione dempta, quæ super ossis cuneiformis⁹ mediū habetur, ubi dura mēbrana nonnihil ab osse abscedit, substratam habens glandulā cerebri pituitā excipientē, et soporalū arteriarū maximas soboles, quæ reticularē plexū efformare alijs dissectionis professoribus falso creduntur. Omnibus partibus caluariæ quibus hæc membrana est attigua, in eum modū cōmittitur, ut duo inuicē accumulantes mulculi mutuo hæerere connectiq̃ solent. Verum eo cōnexionis genere in capitis basi firmius q̃ in lateribus & uertice & fronte & occipito affirmatur. Deinde uniuersis acutioribus ossium processibus pertinacissimè cōnascitur, perinde ac si ab ipsis originē duceret. Sunt uerò huius generis processus⁹ ossu illud septū olfactus organorū sedem distinguens, deinde illi qui ad latera foraminū⁹ uisorios nervos transmittentiū, & sinū glandi pituitā excipienti paratum consistunt, & qui iuxta⁹ foramen uisuntur quinti paris neruorū cerebri crassiorē⁹ radicē transmittens, & uniuersim omnes processus foraminū⁹ capitis amplitudinē respicientia. Pari quoque ratione præfens membrana caluariæ futuris adnascitur, quanq̃ is connexus non æquè ualidus sit, atq̃ is quem ad ossis processus perfici relatu est, quod ille instar simplicis tantum lineæ, nō autem notatu digna amplitudine huius modo accidat. At futuris non solum dura membrana cōnascitur, uerum tenues membranæq̃ fibras inter illas uersus capitis exteriorā trāsmittit, quæ caluariæ uertice inter diffecandum abstracta, in dura membrana simplicis lineæ ritu extuberant, asperamq̃ ipsius membranæ superficiē ostendunt, futurarū situm ac imaginē in ipsa etiam membrana tunc referentes. Cæterum præter fibras externā quoque duræ membranæ superficiē minus æqualē reddunt tubercula quedā in uertice frequēter prominentia, ubi sagittalis futura coronali iungit. Hæc si quando adfunt, inæqualiter extuberant, & pares sibi in caluariā insculptos sinus obtinent, quibus pertinacissimè innascunt. Vnde etiā huius generis tubera nō obiter, neq̃ per transeñā expendenda ueniūt, ne minus cauti in cauterij administratione & capitis uulneribus caluariā perforemus: etenim horū tuberū nulla ratione habita⁹ quod in his locis & in futuris mēbrana ab osse difficulter abscedat eā unā cū osse haud leui malo pertunderemus. Ad hæc, mēbranæ ad caluariā connexū, & exterioris ipsius superficiē asperitatē⁹ uenulæ quædā adaugēt, per caluariæ poros partim ex dura mēbrana ad caluarię inuolucra, partim ab ipsis inuolucris ad durā mēbranā deducit. Hoc itaq̃ modo dura mēbrana caluarię cauitatē succingit, & omnibus ea cauitate contentis obducitur organis. Verum præter hæc, dura membrana

*Duræ mēbra
næ processus.*

magnā sui portionē inter cerebrū ac cerebellum insinuat, quæ uniuersam cerebelli superiorem sedem integēs, cerebri regionē cerebello in cumbentē ab illo interdiuidit. Quinetiā à media federe huius duræ mēbranæ portionis, ubi dextra cerebri pars sinistra respicit, & secundū totā⁹ tertij duræ mēbranæ sinus longitudinē⁹ alia quoque duræ mēbranæ portio processus⁹ ue educitur, secundū capitis longitudinē dextrā cerebri partē à sinistra dirimens. Hic processus falcis mello riae imagini aliqua ex parte accedit: nam ipsius sedes illi duræ mēbranæ portioni cōtinua, quæ cerebellū integit, falcis basi correspondet. ea uerò quæ septo sinuū olfactus organorū cōnascit, falcis mucroni assimilari potest: is nanq̃ mēbranæ duræ processus à posteriori capitis sede anteriorum ductus, sensim falcis ritu arcatur. Deinde processus huius pars tertio duræ membranæ sinui cōtinua falcis dorso nō ab similis secatibus occurrit. siquidē extrorsum curuatur, & tertij duræ mēbranæ sinus nomine crassior uisitur. Processus autem pars⁹ callosi cerebri respiciēs corpus in trō obliquatur, ac proinde falcis aciei forma accedit. Hæc mēbranæ portiones processus⁹ ue nihil omnino à reliquo ipsius corpore, nisi una duntaxat sede in crassitie duritiæq̃ uariāt. Nūq̃ enim membrana crassior secantibus obseruat, q̃ in illa parte qua cerebellū integit. Hæc nāq̃ ubi⁹ natibus cerebri proxima cernit, triplo serē q̃ in reliqua sede crassior duriorq̃ euadit, adeo sanē, ut canes hoc loco os possideant superiorem cerebelli regionē integens, cerebriq̃ ne id

Gg cerebellum

*Liber de Ad
ip. ci.*

cerebellum premat suffulciēs. Sed & neuter horū processū seu partiū duplicatur (ut Galenus rem parum expendēs docuit) uerū simplex est, quemadmodū & ipsa membrana, quā cerebri lateribus aut caluariæ attenditur. Nam & si tertius duræ membranæ sinus cultello secundū longitudinem^o dissectus, primo intuitu membranæ^p processum inter utraq; cerebri partes intercedentem geminā, exq; duplicata membrana constare ostendit, id tamen sinus duntaxat gratia uisitur. Quātūvis namq; inferiorē sinus tertij angulū dirimere studueris, membranā extra sinus amplitudinem nūq; in duas subdivides. Atq; par ratio eius^o partis duræ membranæ censetur, quæ elatiorē cerebelli sedem obuelet. Deinde si infimus ille duræ membranæ sinuū angulus duplicationē argueret, idem sanē in duobus reliquis sinuum angulis accideret, ac non perperā cerebri duram membranā duplicem esse assereres, quacūq; parte caluariā contingit. Insuper horum duræ membranæ processuum superficies specie cum reliqua interiori membranæ superficiei congruit, quā uix inter omnes corporis superficies aliā magis splendidā læuem^{ue}, & (quod non obiter expendendum uenit) omni adipe, quemadmodum quæ in caluariæ consistunt amplitudine omnia, destituta reperias. Quinetiam interior hęc superficies aequo humore longē magis quā exterior perfunditur, & multo candidior apparet: & quum fibris omnibus quibus alteri parti adnascetur, uacet, impensius lubrica tersaq; quā exterior superficies conspiciatur. Porro quemadmodum exterior superficies os caluariæ undiq; respicit, ita & interior tenuē cerebri spectat membranā, cui nullius corporis interuentu, quā ductuum instar uenarum ab ipso in tenuem membranā pronatorum ope adharet committitur^{ue}. Quandoquidem si dura membrana parī modo tenui membranæ, ipsiq; adeo cerebro, ut caluariæ connasceretur, quo minus tenuis membranæ uasa, & ipsum adeo cerebrum distendi contrahi q; possint, illa impedimento foret. quod præcauēs Natura, ampliorem duræ membranæ cauitatem ipsa cerebri mole, nō secus atq; cordis^o in uolucrū corde etiam ipso amplius uisitur, produxit. Quanquam interim duram membranā a tenui non ita liberauerit, ut cordis inuolucrum a corde, quod illi ne unius quidem fibræ interuentu connascitur, quum tamen innumeros uenarum instar ductus dura membrana tenui membranæ exporrigat, mirabili industria horum beneficio illam si bi affirmās. Ut simul ductus illi uenæ arteriæq; & postmodum uinuli uices gerant, ut cerebri ne concidat commodē subleuetur, interim uasorum tenuis membranæ & ipsius cerebri motibus non præpeditis. Atq; hoc singulare Naturæ mysterium ipse leui negotio colligis, si modō uasorum cerebri series, quam tertio libro docui, ex animo nō exciderit. eam dico numerosam ramorum sobolem, a tertio duræ membranæ sinu utrinq; secundum totam cerebri longitudinem, in dextræ partis cerebri & item sinistrę tenuem membranā procurrentem. Hęc namq; superiorem cerebri partem duræ membranæ admodum ualidē appensam reddit, & dura membrana caluariæ connata, & propter^o fibras quas per suturas diffundit a caluaria abscedere prohibita, cerebrum quo minus in se delabatur, subleuat. atq; quum nulla alia ex parte dura membrana tenui (nisi forsitan hīc atque illic raris iisdemq; perquam laxis^o ductibus) commissā est, liberum cerebri & uasorum tenuis membranæ motum non obtundit. Cæterum præsens sermo nunc sanē exigeret, ut sinuum uasorumq; duræ membranæ numerum, situm & naturam explicarem, at quum id pro uiribus in tertio libro tentatū sit, non abs re chartis hīc pepercero.

*Duræ mēbra
na interior su
perficies qua
lis.*

*Duræ mēbra
na cum tenui
connexus.*

*Duræ cere
bri membranæ
uasa.*

Foramina.

*Duræ mēbra
na uisus, & cō
structionis ra
tio.*

Pari quoque ratione duræ membranæ foramina ex proposito neitiquam enarranda putaue rim, quod prolixior foret oratio, aliud nihil propemodum complexura, quā caluariæ foraminum in caluariæ amplitudinem qua cerebrum continetur pertinentiū catalogū, in primo libro iam pridem cōmemoratum. Vbiq; enim in caluarię dicta amplitudine uisuntur foramina, ibidem & dura quoq; membrana ferē peruia est, sui processu perpetuō exporrigens, illis qui a cerebro principium ducunt neruis, & ipsi etiam dorsali medullæ inuolucrū modo obductos. Ac proinde tot primū foraminibus dura cerebri mēbrana donatur, quot neruorū paria a cerebro initū ducūt. Nam & si^o idē quarto pari & crassiori tertij paris radici foramē insinuatū sit, gracilior tamē tertij paris radix, priusq; secundij paris^o neruū contingat, priuatim durā mēbrana perforat. Septē his utrinq; positis foraminibus, aliud ab utroq; latere accedit, quod^o neruulū transmittit, quem ego non procul a quinti paris radice pronatū obseruauī. Ad hęc, dura membrana^o unico eodemq; in coniugato & orbiculari ueroq; foramine pertunditur, quod infundibulo cerebri pituitam excipienti uiam præbet. Dein iuxta huius foraminis latera^o aliud utrinque spectatur foramen, maximum arteriarum cerebrum petentium ramum transmittens. Postrēmō^o multis foraminulis ad olfactus organorum sedem dura cerebri membrana abundat. Porro præsentis membranæ^o sinus, qui uenas arteriasq; caluariam subintrantes exhauriunt, neque etiam ductus ex his sinibus in tenuem membranā instar uenarum propagatos, in foraminū numero habemus. Atqui inter primarios duræ membranæ usus non minimus censetur,

*o uim z fi.
B.B.
p 3 figura
D.D.
q 7 fig. O.
O.O.*

*r 2 fi. D.D.
G.G. 8 fig.
r 2 X.X.*

*s 4 fi. lib. 6
B.B.*

*t 2 fig. C.G.
C.C. D.D.
D.*

*u 1 fi. G.G.
G.H.H.I.I.*

*x 2 fi. G.G.
8 fi. X.X.*

*y 3n figura
ed. 12 lib. 1.
x Quo edu
citur K et I
fig. 14.*

*144 fig. H.
b 14 fig. G.
d 14 fig. L.
non procul
ab M.*

*e 15 fi. ad F
uā præbēs
E.*

*f 15 fi. for
amina hęc
transmittit
C et D.*

*g Ad E. 12
fig. et 13 fi.
D.D.*

*h 1 fi. C.C.
D.D. 7 fig.
P. Q. R. S.
T.*

ut

i fig. 14. ed.
li. 3 in altero
latere u.
u. alioquin
abforbētur
C, D, E, K,
F, G, H.

ut aptis quibuldam sinibus omnes caluariā petētes uenas, omnesq; (si duos modō ramos dem-
pferis) arterias excipiat, ipsarūq; materiam in suos sinus assumat, eam ita deducētes, ut hæc
propaginibus uenis similibus, atq; ab illis sinibus depromptis in tenuem membranā cōmodis-
sime deferatur, & dura membrana ipsi tenui membranæ & cerebro instar lagenæ fiat, ex qua te-
nuis membrana, & dein cerebrum materiam ad opportunos usus sibi alliciant, in uenis & arte-
rijs uersus caput transmissam. Cæterū propagines à tertio duræ membranæ sinu utriq; in-
numera serie in sedem tenuis membranæ sibi proximam deriuatæ, cerebrum uelut suprà innui-
mus, suspensum, atq; ne deorsum con cīdat, uentriculū ipsius comprimantur, opportunissimē
sustinent, ut dura cerebri membrana pariter ipsius inuolucrum et fulcrum reddatur. Ad quod
rursus summopere conducunt fibræ per futuras à dura membrana prorepentes, quæ duram ce-
rebri membranā (quæ alioquin non satis durissimo ossi connasci poterat) caluariæ firmant,
atq; quo minus cerebri grauitate tracta, deorsum labatur, in causa sunt. Neque id sanē prestitit-
sent, nisi peculiare artificium extra caluariam Natura moliretur, quod indies fabri imitantur,
quoties clauorum acies quando duos simul compingunt asseres reflectūt, ne uno assere tracto,
ex altero clauus prōptē uellatur. Natura namq; fibras has Vulcani ligamenta, quibus is Martē
Veneri colligauit, cū simul & uinciāt & sustineāt, artificio superiores, nō solum per reflexos ad-
modū & obliquitatis nomine firmātes ductus transmissit: uerū trāsmittas rursus dilatauit, auxit,
atq; in unū omnes ad eō cōmiscuit, ut in membranā quandā tenuē degenerent, quæ quod calua-
riæ obducatur, *περιγαλινος* Græcis nuncupatur. Quāuis hæc omnia nō citra alterius corporis in-
teruentū, ut cæteris uisum est dissectionis professoribus, caluariæ adnascatur: sub ipsa enim alia
adhuc tenuis consistit mēbrana alijs quoq; omnibus propemodū ossibus præcipuē cōmunis, ac
ab amplexu quo ossa succingit *σπίσσω* appellata. Inter reliqua autē ossa hac mēbrana priuata,
caluariæ interna est cavitās cerebro excipiendo adaptata, cui nūq; ubi durā membranā contin-
git, eiusmodi mēbranula obnascitur, ad eō ut tanta etiā huius cavitatis sedes, quantæ dura mem-
brana non connascitur, hac quoq; membranula alijs ossibus communi obcincta sit. Visitur au-
tem illa sedes ^k ubi duræ membranæ glandula cerebri pituitam excipiēs, & maximi arteriarum
cerebrū petentium rami substernuntur. Quod autem rerum parens Natura harum præcipuē si-
brarum gratia duas transuerfas, & unam secundū capitis longitudinē ^l futuras digesserit, ipsa
duræ membranæ forma commonstrat, quæ superiori sua sede illis lineis opportunissimē ueni-
ret firmanda. Quemadmodum inter dissecandum tertio duræ membranæ sinu sursum tractio
liquidō discimus, impense Naturæ industriā admirantes, quā duræ membranæ portionē pro-
cessū uē inter cerebellum & cerebrum ita produxit, ut illo sursum ducto, ita cerebrum susti-
neat, ne suo pondere cerebello quicquam comprimendo obsit, ad quod egregiē auxiliatur du-
ræ membranæ pars, dextram cerebri partem à sinistra dirimens, & tota basi dicto nuper pro-
cessui continua. Porro si quid interim artificij in duræ membranæ harmonia enarrandum ad-
huc reliquum sit, id unā cum tenui membrana iam subiunxero.

Membrane
exterior calua-
riæ succingēti-
s creatio ex
us.

k Vbi sub
figure F,
C, D, consi-
sit tota is
figura.
l Spectatur
figuris 6 &
pi. li. 3.

DE TENVI CEREBRVM INVOLVENTE membrana. Caput III.

TENVIS membrana cerebro obducta occurrit in secunda figura, auulsa autem
in tertia. Atque ita etiam cerebello obuoluta spectatur in octaua.



a Hæc exfi-
guris pete-
re debet se-
ctionis serie
sepe conse-
quentibus,
ut 2, 3, 8, 9
b 2 fi. L, L,
c 3 fig. C, C,
C. et passim
in superio-
re n. fig.

TENVIS cerebri membrana, quemadmodum & dura, duntaxat unica & Tenuis mem-
sibi ipsi continua est: nullam siquidem prorsus suæ naturæ aut ad cerebel-
lum, aut ad utramque cerebri partem, aut in ipsis cerebri uentriculis anfra-
ctibusq; ac ut semel dicam, tota amplitudine, quam dura membrana con-
stituit, inuenias, quæ non unius tenuis membranæ portio habeatur: ad eū
modum quo in animalis cute iam à corpore detracta, partes cutis cōtinuas
esse dicimus, quibus aures, pedes, & cauda induebātur. Porro ipsius situs
ex cerebri ac cerebelli cognitione desumendus est: nihil enim dura membrana amplexatur, cui
tenuis membrana exterioris non obuoluitur. Nulla etenim ^a exterioris superficie cerebri & cere-
belli & dorsalis medullæ & neruorum portiuncula conspicitur, quam tenuis membrana uici-
nissimē, & citra alterius corporis interuentum proximē non integat, si modō ^b superiorem cal-
lo si corporis superficiem exceperis, quæ sola eiusmodi membrana, quum dura utcunque sit,
haud continetur. Præterea omnes cerebri ac cerebelli ^c anfractus, in quos tenuis membrana un-
Gg 2 dicunq;

Tenuis mem-
brana nuncu-
rus.

Situs.

Exterior su-
perficies.
Constructio-
nis ratio
usus.

dicuntque sui partes processus uel ingerit, huius situm ostendunt, uti sanè & ipsius quoque figuram & magnitudinē. Hæc membrana exteriori^a superficie uelut aquo humore oblinitur, secundū partium quas ambit tubera extuberans. ipsa namque uix alibi crassitiei uariat, ac tenuissimæ semper membranæ innumeris ualorū ductibus oblitæ speciem cōmonstrat. Quippe ualorum potissimum gratia illam rerū Opifex condidit, nimirū ut instar^b mesenterij & humilioris membranæ omenti & extimi foetus inuolucris (à quo suum nomen tenuis membranæ Græcis χορδον nuncupata, mutuauit) ea uasa tutò deduceret suffulciretque. Quinetiam cerebri & cerebelli est inuolucrum, non simplex profectò, ut dura membrana, quæ propugnaculū potius ac defensoriū cerebri aduersus caluariæ occursum censetur, quàm operimentum: sed quod ipsorum substantiā proximè contineat & firmet, non secus quàm caleorum formæ lac paulo antè coagulatum sustinent, & fingūt pariter. Atque ad hos usus Natura hanc membranam summè idoneam produxit, tam mollis enim tenuisque & sequax est, ut aptissimè omnibus anfractibus sinibusque sese ad profundissima usque ingerat, & quæcunque uasa cerebrum expetebat, ea deducere possit. Quinetiam adeò leuis cernitur, ut sua grauitate neutiquā uim cerebro inferat: & tam ualida interim duraque existit, ut à dura cerebri membrana sursum tracta non diuellatur, imò illum suspensionis impetum à Natura sagacissimè frequentinumerolaque & continua ualorum serie paratum sustinet, copollens robore, ut concinnè cerebri substantiam instar formæ cuiusdam (uti iam diximus) amplexetur & sustineat. Cæterum magis Naturæ sapientiam admirabimur, si non minori industria illam hinc atque in quatuor elementorum sedibus assignandis usam esse inquisuerimus. quod sanè illico obuium fiet, si terræ caluariam, aquæ duram cerebri membranā, aëri tenuem, & igni substantiam cerebri assimilaueris: ac dein expendis rerum Opificis solertiam, qui ut inter terrā & ignem, quoniam natura à se inuicem maximè ab sunt, aquam et aërem collocauit, ita quoque in medio caluariæ & cerebri (quod substantijs longè discrepant) utraq; membranas interiecit, nō contentus uno amicitiae uinculo illa interueniente. Oportet namque nō situm solum id in medio locari quod est uerè medium, sed etiam naturā: si modò quod secundum eandem proportionem ab extremis uariat, uerè medium censeatur. Neutra autē membrana proportionaliter à caluariā & cerebro uariabat; nam tenuis plus ab ossis duritie uinebatur, quàm ipsius cerebri mollities superaret. Econtrariò autem dura multo erat cerebro durior, paulo uerò offe mollior. Quapropter si tenuem duntaxat membranā Natura creasset, nequaquā indemnīs caluariæ occurset: si duram, cerebrum ipsius consuetudine læderetur. Quo minus igitur ipsum cerebrum aut eius proximum inuolucrum offenderetur, prior tenuis membrana, post hæc autem dura locatur: quæ quanto est offe mollior, tanto ipsa tenui est durior: quanto uerò hac tenuis est mollior, tanto tenui mollius est cerebrum. Quanquā rursus tenuis membranæ mollities usui sit, ut illa commodè undeque in cerebri anfractibus sese ingerat, & in uentriculos, processus uarios unā cū uasis porrigat, uti prius est relatū. Qui nam uerò eiusmodi habeantur processus, in plexuum & uentriculorum cerebri descriptione persequar, præsentī sermone ad cerebrum opportuno deflecto.

DE CEREBRI AC CEREBELLI NUMERO,

Situ, forma, reuolutionibus & substantia. Caput IIII.

HIS quæ præsentī Capite pertractantur ostendendis, potissimum seruiunt tertia figura, ac dein omnes ferè ad decimam quartam usque: sed potissimum prima figura Capitis secundi, libri quarti, basim cerebri ac cerebelli cum dorsalis medullæ initio proponens.

Cerebri numeri.



DISSECTIONIS professoribus cerebrum in^a anterius, quod cerebrum, & in^b posterius, quod cerebellum uocant: deinde anterius in^c dextrum & sinistrum diuidi consuevit; non quòd Anatomicorū procures cerebrum omnino diuisum, & non aliqua semper ex parte continuum esse arbitrati sint (quanquam etiam illorum scripta tale quid subinde innuant) at quòd ut unica manus in digitos, ita quoque cerebrū in diuersas partes discretum uideatur. Quemadmodum enim prius de tenui cerebri membrana differebatur, sic etiam dextra cerebri pars, & sinistra, & cum his cerebellum, & dorsalis medulla, neruique ad unum omnes, in super & nates testesque cerebri, deinde^d callosum corpus, & id quod instar testudinis effigiatum est: præterea dextri sinistrique uentriculorum^e septum, & uermiformes cerebelli processus, & si quid est eiusmodi, inuicem continuas partes existunt, eademque substantia constituuntur in duritia coloreque aliquantulum uariat. Insuper omnia quæ modò recensabam, situ, usu, conformatione, magnitudine, & id genus alijs, quæ in partium constructione

h 6 fi. H, I,
F, G, M, N.

a 3 fig. A, A
et B, B. 1 fi.
cap. 2 lib. 4
A, A.
b 8 fi. R, R.
R. tota 11 fi
gura et 1 fi.
cd. 2 lib. 4
B.

d 3 fi. A, A.
e 3 fig. B, B.
f Quicquid
præter ossa
ult. fig. deli-
neatur lib.

4.
g 7 fi. M, N.
h 2 fi. L, L.
rima.

i 6 fig. A, A, A. h 5 fig. X, X, X, X. l 11 fig. C, D, e, d.

rimamur, ita ab inuicem differunt, ut nō aliter q̄ si differentes disiunctæq̄ partes essent, pleriq̄ imposuerint. Quorū enim quemq̄ Anatomicorū inuenias, qui cerebrū nulla substantiæ continuitate cerebello continuū esse nō asserat: adde alios qui cerebrū in duas partes ut pulmones dissectū esse docēt, et omnia nobis indefesso scribendi pruritu, suis somnijs hīc dantes, perturbāt. Cerebrū nanq̄ quantūuis tota sede, ^m quā cerebello incumbit, & ^m quā frontē spectat, penitus in duas partes dissectū sit, & eadē sectio secundū totā cerebri longitudinē in ipsius elatiori regione ducatur, non tamen ob id in medio ipsius iuxta ^a basim inter occipitium & frontem omnino diuisum cernit̄. Quanta enim callosi corporis est ^a longitudo, tanta quoq̄ sedes secundū longitudinē cerebri consistit, quā dextra eius pars sinistræ continuatur. atq̄ ita uel huius corporis interuentu, & eius ^o quod instar testudinis extructū est, & ^o septi dextri sinistriq̄ uentriculorum supra cōmunem eorū uentriculorum ⁱ cavitatē, tertium uē uentriculum duæ cerebri partes continuæ sunt. Deinde in basi etiam eas esse continuas ostendit, cum magna & secundū longitudinē & profunditatē qua continuant̄ regio, tum cerebri testes & nates & omniū maximē quod ex cerebri basim medio pronascit̄, dorsalis medullæ ⁱ initū, quod amplum crassumq̄ est, & perinde ac illæ duæ cerebri partes hoc in loco continuū unumq̄. Deinceps etiā si dextra sinistræq̄ cerebri partes quā cerebellum integunt, nihil ^o minus q̄ cerebello continuæ sunt, tamen inferior cerebelli sedes iam dicto dorsalis medullæ initio duobus locis ⁱ continuatur, idemq̄ cum ipso corpus, si continuitatem spectes, efficitur. Cæterū quis præcipuus continuitatis locus sit, quæq̄ omnes illæ quas paulo antē enumerabam partes censeantur, ordine suo loco seorsim enarrabo. Hæcenus enim quæ nunc præcessere sermone complexū libuit, ne in cerebri numero aliquis, qui iam admonitus sectionem aggressurus est, ilicō me unā cum cæteris Anatomicis hallucinatum arbitretur. Ac proinde nunc cerebri situm opportunē aggrediar, quem ipsius cerebri membranae, & potissimum ⁱ interna caluariæ amplitudo edocent. Quicquid enim eius amplitudinis duabus cerebri membranis & ⁱ glande pituitam cerebri excipiente & ramis quibuldā maximarum cerebri petentium arteriarum non occupatur, id uniuerſum cerebro ac cerebello adimpletur. ² Cerebellum decuplo aut undecuplo minus cerebro est, atque unā cum dorsalis medullæ principio eam caluariæ amplitudinis sedem sibi uendicat, quæ posteriori parte ⁱ tuberum in capiti samplitudinem cavitatem uē auditus organorum causa prominentium, & deinde duobus in occipitij ossis ⁱ sinibus circumscribitur, qui ut duobus primis duræ membranæ sinibus, quos dextrum & sinistrum nuncupamus os, cedat, caluariæ cavitati insculpuntur. Hanc enim instar circuli circumscriptionem cerebellum nulla ipsius parte excedit, hæcq̄ circumscriptio cerebelli situm opportunissimē demonstrat. Haud enim hominibus, ut bobus fortassis (quos Galenus ad cerebri cognitionem duntaxat aggressus uidetur) cerebellum in occipitiū adeo porrigitur, uocatū occipitium impleat. Quippe postrema & elatissima humani cerebelli pars uix couisq̄ ascendit, ubi digitis infimam occipitij partem attingere possumus. Neq̄ etiam in nobis aliqua occipitij ossis sedes musculorū insertionibus libera contingi potest, quā cerebellum implet, etiam si interim Anatomici ipsius situm ita recenscāt, quasi totā in occipitio prominulam regionem, ex cuius tubere uulgo memoriæ ingentiq̄ uim metitur, cerebellū infarciret: imō elatissima cerebelli portio ad ^a mediā duntaxat sedē pertingit, quæ à posteriori sedē ⁱ foraminis dorsali medullæ uiam præbentis, & ^a literam imitantis futura ^a partem habetur, quæ sagittali committitur, usq̄ ad quam aliq̄ cerebellum conscendisse suis bobus & asinis, aut somnijs delusi scripserunt. Præterea superior cerebelli pars in hominibus, quemadmodum sanē in canibus, bobus & ouibus instar globi cuiusdam, aut etiā acutius nequaquā extuberat, sed plana et depressa minimumq̄ in medio prominens conspicitur. Hæc itaq̄ caluariæ sedes cerebello dedicata, ipsius situm, circumscriptionem, formam ac magnitudinem edocet. Cerebellum etenim, quemadmodū & sua sedes, latius est quā longius aut profundius, & humiliori ipsius regione, idq̄ potissimum iuxta ipsius posteriora latioris globi imaginē exprimit: in cuius medio acuta, neq̄ admodū lata habetur ⁱ impressio, quā illi inducit tuber instar crassissimæ lineæ in occipitij osse prominēs, quod eius ossis robur insigniter adauget, cuiq̄ dura cerebri membrana pertinacissimē connascitur. Porro in anteriori parte, ^k quæ cerebellum ad cerebri nates exporrigitur, id quasi in acutum fertur, undiq̄ suæ sedis formam accuratē referens. Ceterū eiusmodi omnia in cerebro, quod per me si uoles antierius cerebrū etiam adhuc nuncupare poteris, ostendit reliqua caluariæ cavitates cerebello nō oppleta. Vnde etiā cerebrū secundū ipsius basim depressum est, neq̄ globi modo extuberat, quamuis interim inæquale & nō unius formæ uisitur. ^m Vbi enim oculorū sedibus & olfactus organorū sinibus innititur, uariū est: nam ad sinus organorum olfactus antroorsum ⁱ extuberat, utrinq̄ autem ad sinū illorū latera propter ossis in caluariæ cavitatē extuberātis prominentiam, unā impressionē admittit. Prominet uerō ibidem in equalibus tuberibus os ad com

Quibus sedib.
dextra cerebri
pars sinistræ
continuatur.

Cerebelli quā
dextra sinistræ
continuum.

Cerebelli situs
et magnitudo.

Cerebelli forma.

Cerebri magnitudo et forma.

modos oculorum sedes & foramina narium confingenda. Deinde cerebrum opplet duos grandes in caluariæ cauitate sinus, qui ad ossis cuneum referentis sinus latera spectant, quo glans cerebri pituitam excipiens sustinetur. Vnde etiam cerebrum ossis quo continetur formam glæ hærit sibi uendicâs, utrinque in ipsius basi instar medij globi prominens tuber constituit. In horum tuborum medio cerebrum impressum cernitur, cuneiformis ossis processum occasione hinc circum sinus latera productorum, quo nuper commemorata glans sustinetur. Quinetiam simili prorsus modo basis cerebri reliqua ipsius sede pro ossium tubulis auditus organa continentibus, & cerebelli superiori regione suam figuram effingit, omnibus sinibus sese inferens, & amicè admodum tubera admittens. Atque hinc etiam in lateribus & anteriori & posteriori & superiori sede cerebrum caluariæ cauitatis effigiem exprimit. His enim sedibus cerebrum instar oblongæ sphaeræ utrobique uersus anteriora propter temporum cauitatē depressæ, rotundum, & in posteriori parte multo quàm in anteriori latius uisitur, quasi cerebrum ipsum & cerebellum nullam peculiarem formam exigerent, ac abundè ipsis esset, si propria illorum substantia magna mole, & simul utcumque quò in se sinus cerebri cerebellique functionibus aptos habere posset, collecta in capite reponeretur. Eiusmodi siquidem quid caluariæ basis sinus tuberaque ostendunt, & impressiones in temporibus temporaliū musculorum gratia conspicuæ. Caluariæ itaque cauitas externæ cerebri superficiei imaginem commonstrat, ad quam & 9^o sectio cerebri diuidens, & innumeri quidam gyri ac circumacti referuntur. Vniuersa namque cerebri sedes illa sectione diuisa, atque utriusculorum pedes in duos quasi ungues illius beneficio disuncta, extimæ cerebri superficiei magna pars existit. Attamen dictam cerebri formam parum inter turbat, quum dextra cerebri pars sinistra accumbat: neque recta illa linea diuise cerebri partes inuicem magis desincant, quàm quanta duræ cerebri membrana, & tenuis duplicata est crassities. In homine etenim secus atque in oue uniuersam sectionem interdidiuit duræ membranae portio, processus uel, duas cerebri partes septi ritu interstinguens. Dein seorsum utramque cerebri partem tenuis membrana ambit, & implicat. Cæterum gyri ac reuolutiones cerebri, quas tenuiū intestinorum in fractibus elegantissimè Erasistratus assimilauit, per uniuersam cerebri superficiem undique eadem frequentia habentur. Sunt uerò sinus permulti penitus in cerebri substantiam penetrantes, & perfectio imagine intestinorum tenuium reuolutionibus simillimi. Neque opinor illos alicui aptius quàm his, aut etiam nubibus quos rudes pictorum discipuli, aut in scholis pueri delineare solent, conferri posse: quanquam in similitudine indaganda non admodum sit laborandum, quandoquidem hominis cerebrum hac ex parte nihil peculiare adipiscitur, & hos in cerebri substantia apparentes circumacti asinis, equis, bobus, & alijs quæ hætenus uidi animantibus communes homo obtinet. Nisi forsitan aliquis hinc differentiam assumere statuisset, quod tanto profundiores homini illos gyros Natura insinuauerit, quanto ipsius cerebri substantia copiosior uisitur. Horum itaque inflexuum effigiem cuiusuis animalis cerebri uel in prandio aut coena spectans, discas licet. Porro in illorum usu recensendo non medici modò, uerum & philosophi plurimum se excruciant, contententes, num ipsorum beneficio homines intelligant, an uerò minime: quemadmodum Galenus contra Erasistrati placitum pugnans, in hunc modum censuit. Quum asini etiam admodum multipliciter cerebrum habeant complexum, quos deceret, quantum ad morum ruditatem attinet, omnifariam simplex, & minime uarium nascisci cerebrum. Melius autem arbitraretur bonam substantiæ temperiem corporis intelligentis (quodcumque hoc fuerit) prudentiam sequi, & non uarietatem compositionis. Neque etiam multitudini spiritus animalis oportet, ut puto, magis quàm qualitatē perfectionem intellectus acceptā referre. Atque hic Galenus sibi dum maxime illius operā requirimus similis, orationē uelut freno cohibens, aliò quum reuolutionū usum exprimere debuisset, reflectit: factis esse aritratus, si non intelligentiæ præesse has reuolutiones indicauerit, quod sanè non inficiamur, sed interim eas magnum Conditoris artificium ostendere, & non ob aliud quàm ad cerebri substantiæ nutritionem eas procreatas esse, à Galeno additum oportuit. Cerebri namque substantia citra omnem membranosarum fibrarum plexum continua, neutiq; adeò firma fuerat, ut per illam arteriæ uenæque, ut in reliquis corporis partibus, digeri possent: & tam multa crassaque est, ut uenæ & arteriæ in superficie tantum exporrectæ ipsi nutriendæ, illiusque insito calore resocillando sufficerent, quum penitiores cerebri partes si ad illum modum uas protenderentur, illorum materia carerent. Quod prouidens Natura, sinuosos illos implexus passim cerebri substantiæ alimentū apposuissimè ita subministratura. Atque huius etiam nutriti potissimum occasione cerebrum in duas partes dissectum fuit, ut scilicet tenuis membrana sese in ipsius mediū implicaret: ac inibi in reflexus deducta, cerebri substantiam enutrirer. Haud enim citra eiusmodi cerebri dissectionem, & profundissimas reuolutiones illa cerebri sedes qua dextra sinistram respicit,

Sectio dextra nobiscum uocaturam cerebri partem à sinistra dirimens, & cerebri anfractus.

Cerebri anfractus uisus.

Lib. 8. de V. su part.

Cerebri sectionis ratio.

*o Adle
M. fi.
lib. 1.*

*P. 4. musculi
tab. r.
q. Spectatur in figura
in 3 fig. C.
C. C.*

*d. 1. fig. D.
D. D.*

c. 7. lib. 9.

*f. 3. fig. E.
E. E.*

*g. 1. fig. A. A.
C. B. B.*

h speculatur
in 11 fig.

i 11 fig. E.

k 9 fig. R, R,
R 9 fig. A, B,
C 11 fig.
A, B C, C,
D, E, d.l 9 fig. C, aut
11 fig. C, D,
E, d.m 11 fig. C,
D C, d,
dem H, L,
n ad A, Bo 11 fig.
11 fig. C, G.p 11 fig. cap.
11 lib. 4.q 11 fig. cap. 2
lib. 4. D.r 10 fig. L,
M, N, O.s 11 fig. E.
t G, G fig.
r 11 comit
tuntur 1 Cu 11 fig. E.
v 11 fig. E.
x 11 fig. E.
ad 1. 9 fi.y Speculatur
id 11 fig.
cap. 2 lib. 4.

z 11 fig. E.

a 11 fig. E.
b 11 fig. E.
c 11 fig. E.
d 11 fig. E.
e 11 fig. E.
f 11 fig. E.
g 11 fig. E.
h 11 fig. E.
i 11 fig. E.
k 11 fig. E.
l 11 fig. E.
m 11 fig. E.
n 11 fig. E.
o 11 fig. E.
p 11 fig. E.
q 11 fig. E.
r 11 fig. E.
s 11 fig. E.
t 11 fig. E.
u 11 fig. E.
v 11 fig. E.
w 11 fig. E.
x 11 fig. E.
y 11 fig. E.
z 11 fig. E.

respicit, enutriripotuisse. Atque huic sententiae suffragantur cerebelli reuolutiones, quae ne-
tquam aequae atque cerebri reuolutiones aliter penetrant, sed paulo minus quam superficialia, at
frequentes admodumque continua serie deductae uisuntur. superficialia quidem, quod exigua
pars alenda sit, quodque facile cerebellum a profundioribus anfractibus ad uentriculum uique
ipsius perforaretur. frequentes autem, ut copia aliquantulum leuem illam penetrationem sup-
pleat. Porro harum series quodammodo triplex est, effigie cum cerebri reuolutionibus neu-
tquam conueniens. apparet namque cerebellum ob suas reuolutiones & impressum illum, quem
ab occipitis offis tubere in posteriori sede obtinet, tribus partibus efformari, dextra una, &
alia sinistra & tertia media. ac dextra quidem sinistraque cerebelli partes duos quodammodo glo-
bos inuicem appositos ostendunt, in quorum inani spacio, ubi scilicet globi sese non contingere-
rent, tertia cerebelli pars reponitur, quae ligni caseiue recentis uermem refert ob suas reuolu-
tiones, quae transuersim secundum cerebelli longitudinem mutuò aequè distantes ducuntur.
Huius partis apices uersus inferiorem cerebelli sedem reflexi, uermiformes cerebri processus
suo loco efformare docebimus. Dextra autem sinistraque cerebelli pars in superiore cerebelli
sede parallelas quoque & secundum cerebelli latitudinem ductas reuolutiones exigunt, quae
deorsum protensa, quasi in centrum colliguntur, ad eam cerebelli sedem, quam dorsalis
medullae initio connatam esse dicemus, contendentes: ac dextrae quidem partis reuolutiones
ad sui partis sedem porriguntur, dorsalis medullae initio continuam: sinistrae autem, ad sui
partis sedem. At haec cerebelli partes inuicem discretæ incontinuaeque nequaquam sunt, sed in-
uicem continuæ unicum corpus, ipsum scilicet cerebellum constituunt. quod unicum, non au-
tem cerebri modo genitum Galenus a Natura extructum esse asserit, quod duo dorsa, neque
totidem dorsales medullas hominem habere minimè decuisset: quasi ex cerebro, quod ne-
cessario ueluti in duas partes diuisum, neque substantia continuum, unica dorsalis medul-
la produci nequiuisset, ac proinde cerebellum ut corpus unicum necessario procreatum fuis-
set, ut unicae dorsali medullae aptum principium fieret. At Galenus, qui in nugis cerebro qui-
busdam, & etiam subinde immerito tuis delusus simijs, Herophilum, & Lycum, & Andream,
& alios Alexandriae dissectionis professores, qui humana aggrediebantur corpora, irridere
soles, cerebrum in suae basis medio unicum, neque ut in superiori parte diuisim cernitur,
& unicam dorsalem producit medullam, in cuius superiori sede mox ab ipsius exortu Na-
tura sinum insculpsit, qua mediam quarti cerebri uentriculi amplitudinem constitui dice-
mus. reliquam enim eius uentriculi amplitudinem, cerebellum supplet, quod utrinque dun-
taxat ad dorsalis medullae sinus latera quasi duabus circularibus applantationibus adnasci-
tur, continuum cum dorsali medulla corpus effectum. medio namque posterioris cerebelli
sedis pars, ut neque etiam anterioris dorsali medullae continua, connata ue est, sed tantum te-
nuis membranae interuentu posterior pars dorsali medullae committitur. Non aliter, mihi cre-
de, quam si Natura cerebellum condidisset, ut dorsali medullae transmissum a cerebri sinibus
spiritum magis adaptaret, tuereturque. A cerebello etenim quantumuis in ipsius duritie a cere-
bro differentia assignanda, & ratione cur cerebellum a cerebro diuisum sit expendenda solici-
tus fueris, nullius omnino uel minimi neruuli propago a cerebello ortum ducere reperies. &
profecto nulla est cerebri qua frontem spectat, & qua in occipitium etiam longius in homine
quam ipsum cerebellum fertur, in duritie differentia: neque etiam adeò notatu digna cerebelli,
quum tenui membrana id liberatum cernitur, cum cerebro in duritie est pugna. At ut cere-
bri basis, unde dorsalis medulla ortum ducit, ceteris omnibus cerebri partibus, & ipso quo-
lore, neque duritia cerebello ipsi supernato correspondens. Cerebellum enim magis flauum,
cinericium ue est, perquam paucis albescentibus lineis interstinctum, & duntaxat in sui si-
nus superficie candicans. uniuersum uerò dorsalis medullae initium cerebello adhuc in capite
subnatum albidissimum est, ut & cerebri basis ipsi originem praebens, quae omni prorsus reuo-
lutione ac anfractu quibus cerebellum scatet, destituitur. Porro quae horum omnium sit sub-
stantia, uel in mensa etiam ex uitulorum, aut leporum, aut auis alicuius cerebris discere inte-
grum erit. est autem substantia quaedam peculiaris & propria, qualem in uniuerso corpore
similem nullam reperias, ad ingenitas cerebro actiones idonea: non minus sanè quam cordis
substantia, & pulmonum caro, & iecoris, & lienis, & renum, & testium suis quibus praesunt
functionibus aptissima censetur. Cerebri substantia, quam capitis medullam alij appellarunt,
ab ossium medulla differt, tum alijs plerisque accidentibus, tum quod liquefieri nequeat, neque
inediae tempore aut alijs occasionebus, ut reliqua corporis pinguedo absumatur, minuatue.
Haec non uniuersa candicat, uerum quicquid reuolutionibus proximè est, subflauum aut subci-
nericium est, aequali semper a reuolutionis superficie distantia, quanta namque reuolutionis pro-

Cerebelli im-
pressum ratio
species.Galenus ratio-
nem unitatis ce-
rebrelli partum
apertè assignat.
sc.Dorsalis me-
dullae initium.In li. 8. de V-
su part.
Cerebrum ac ce-
rebrelli duriti-
es, neruorum
ortus.Cerebri, cere-
belli, & dorsa-
lis medullae co-
lor et substantia.Cerebri sub-
stantiae effigie
suum medullae
discrimen.

funditas est, tanto quoque ab intima reuolutionis parte interuallo, in cerebri substantia, is quem diximus, color obseruatur: quasi rursus color ille in substantia, quod ad colore attinet, reuolutiones duplicaret. Quicquid autem cerebri ita coloratum non est, albidissimum & candidum prorsus uisitur. Verum ut permulta cerebelli sunt inuolutiones, ita quoque uniuersum propemodum, ut paulo ante admonui, secantibus flauum occurrit. Quacumque itaque ex parte cerebri cerebelliue substantiam tenui qua proxime continetur membrana detexeris, hanc subflauam ac uelut aqueo humore oblitam, & nunquam uenis implicitam adinuenies, etiam si interdum rubra & uelut sanguinea puncta in illorum cerebri substantia in illis potissimum obseruaturus sis, qui phrenitide ante mortem laborarunt, uerum illa nulla uenae exprimitur imaginem. Cerebrum namque ex nullo uase alimentum assumit, quam ex his quae tenui membrana suffulta ipsi circumdatur, ut autem illi frequentia uasa undique obducuntur, cerebrum in tot quot diximus partes praecipue diuisum fuit: quamquam etiam diuisiones illae, ut & anfractus ad mollem cerebri substantiam ne concideret sustinendam, equaliterque suffulciendam, non mediocriter auxiliatur. Parum enim Galeni rationi cur cerebrum diuisum, aut, ut ipse loquitur, geminum sit, tribuo, inquit namque, cerebrum hac occasione geminum esse, ut quemadmodum uno oculi uitato, aut uno teste execto, alterum seruamus: ita etiam dextro cerebri uentriculo laeso, sinister adhuc suo munere fungeretur. Haec siquidem Galeni ratio aliquem in copia uentriculorum recensenda locum fortassis haberet, non autem in enarranda cerebri diuisione, quum id nisi supra uentriculos geminum diuisum uel sit, callosum enim nobis uocandum corpus, quod cerebri partium continuitatem demonstrat, ad elatissimam dextri & sinistri uentriculorum sedem constitit. Ceterum nunc tempestiuum erit, cerebri uentriculos aggredi, atque ita internam cerebri superficiem, quaeque ipsius partes adhuc narrandae super sunt, persequi.

DE CALLOSO CEREBRI CORPORE, ET
dextri sinistrique cerebri uentriculorum septo. Caput V.

SUPERIOREM callosi corporis sedem nulla ex parte diuisam eleganter proponit tertia figura characteribus L, L. Insuper hanc sedem, sed a cerebri substantia in lateribus liberam, ostendit quarta ad I, I, I. Humiliorem uero sedem spectandam offert quinta ad R, R, R. ubi etiam praesens spectatur septum ad X, X. deinde Y, Y.



Callosi corporis sedes et nomenclatura.

PAULO ante omnem cerebri cerebellique substantiam exterius tenui membrana circumdata, ea parte qua membranam respicit subflauam, & quasi cinericiam esse retuli. At quaedam cerebri pars in externa ipsius superficie sese offert, tenui membrana non obuoluta, uerum intimae cerebri substantiae modum, externa superficie candidas albasque, & reliqua cerebri substantia ad superficiem consistentem durior, unde etiam uetustissimi Graecorum partem hanc *trachosia* appellauerunt, quae imitatus in orationis serie, hanc partem callosum corpus semper appellauimus.

Deinde Graecorum nonnullis id etiam a forma, quod inferiori sede arcus modum sinuatum sit, ac ab usu quod sustineat, *trachosia* uocatur: quamquam in cerebro corpus recte sebo, quod hoc nomine a pluribus magisque ex merito donatur. Ceterum callosum corpus in medio cerebri uisitur, si cerebri dextrum sinistrique & basis cerebri medium in humiliori ipsius sede, & elatissimam cerebri in uertice regionem spectes, & quodammodo etiam ad priora posterioraque facta comparatione. Callosi enim corporis postrema pars anteriori cerebri sedem paulo uicinior est, quam antica posteriori. In conspectum autem secantibus uenit, leuiter dextra cerebri parte a sinistra manibus dirempta, quicquid enim ita diducto cerebro, inibi partes ipsius unit, album candidasque conspicit, ipsumque callosum est corpus, longum quidem, sed arcuatum. Praesens corpus in illa superficie quae ita diducto cerebro in conspectum uenit, gibbosum cornu, eo quasi pacto, quo capitis uertex supra elatissimam frontis & occipitis sedem, & capitis latera protuberat: quamquam adhuc callosi corporis obliquitas non adeo insignis est, atque uerticis iam dictae partis. Quoadmodum uero cerebrum, ut dicebam, diremptum superiorem callosi corporis superficiem egregie laeue aequalemque ostendit, ita quoque indicat corpus id communem cum cerebro partem esse, & non ex cerebri substantia superficie quae mollior & subflaua est, sed ex intimiori substantia quae durior & alba uisitur, enasci. Obseruant enim utrinque ad callosi corporis latera secundum ipsius longitudinem singuli sinus in cerebri substantia instar profundioris lineae insculpti, ac cum superiori callosi corporis superficie eo magis patefcentes, quo cerebrum uehementius, quasi id sursum in latera etiam acturus, diduxeris. Interior autem inferior uel ipsius superficies dextro sinistroque cerebri uentriculo ad apertum secantibus primum occurrit: quae etiam secundum callosi corporis longitudinem introrsum, ut superior extrorsum curuat, haud tamen simplex est, nam secundum callosi corporis longitudinem duae instar quartae circuli partis insinuae superficies ducuntur, & in medio callosi corporis tuberculum quoddam instar lineae secundum

Callosi corporis sinuatus seu ciliatus cerebri substantia & ciliatus. Sinus ad callosi corporis latera obuij.

c. 3 fig. L, L.

a. 3 fig. L, L.

b. 5 figura R, R, R. c. 5 fig. S, T, V. 6 figura A, A, A.

d. VII fig. est in 3 fig.

e. Ad M. 3 fig. f. 3 fig. idcor p. iurim et in posteriorare esse. xii est atq. ita hic certatur ad R, R, R. g. utrinque una ad X. Y 3 fig.

illius longitudinem exporrectū uisitur, perinde ac si altero quidem puncto duas quartas circuli partes in callosi corporis medio iunctas, reliquo autem puncto ad latera sursum protensas, intelligeres. Præsens tuberculum deorsum prominens, sensimq; extenuatum, tandem dextri sinistriq; uentriculorum cerebri septum efficitur: & tota interna callosi corporis superficies tanta dextri sinistriq; uentriculorum est portio, quanta est hæc ipsius callosi corporis superficies. ac dextra quidem superficiei portio dextrum uentriculum, sinistra autem sinistrum respicit. Porro dextri & sinistri uentriculorum septum eadem cum cerebro cōstat substantia, sed in medio quod ad superiora & inferiora attinet, adeo est tenuē, ut quum clara luce confectionem administramus, aut in altero tantū latere candelam admoemus, splendor ipsius pelluceat, similiter lapidibus hisce specularibus, quos extenuantes, & quā exactissimē læuigantes instar orbū aut quadrangulorū in ostiorum & fenestrarū lapidibus Italos architectos inglutinare cernimus. Commodius tamen hanc septi regionē madidæ hostiæ, quales missæ sacerdotes adhibere solent, quā duris illis lapidibus comparaueris. Nisi etiam quia id corpus diaphonum quodam modo est, illud cum speculari lapide cōferre uisum sit. In superiori parte qua septum toti lōgitudini corporis callosi continuatur, & inferiori qua superiori parti eius cerebri partis, quam fornici cameræ ue simillimam esse dicemus committitur, ipsum crassius quā in media regione existit. Quandoquidem humiliorem septi sedem corpus testudinis modō effigiatum ex superiori sua parte educit, quemadmodum superior septi pars ab inferiori callosi corporis regione enascitur, producitq;. Callosum corpus unā cum septo nullis uenis, neq; etiā tenui membrana, uel aliqua etiam parte atextum est, sed ē uicinis partibus nutrimentū mutuatur. Non enim adeo grandis, crassaq; cerebri est portio, ut priuatis uasis indigeat, quamuis interim magnum animanti usum præbeat. Huius siquidem interuentu, dextra cerebri pars sinistra continuatur, deinde dextri & sinistri cerebri uentriculorum septum producit, atque id etiam subleuat, ac demum eius septi interuentu attollit fulciq; testudinis instar effigiatum corpus, quo minus id magno omnium cerebri functionum malo cōmunem duorum cerebri uentriculorum cauitem compressurum delabatur. Cæterum duo sinus in cerebri substantia profundioris lineæ ritu ad superiorē corporis callosi superficiē in cisi, præter hoc quod ea cerebri pars calloso corpori producendo inepta sit, idq; expenitiori substantia nasci debeat, ad pituitæ defluxum ex superioribus cerebri partibus facere creduntur, quam excipientes per gibbam callosi corporis superficiem in anteriora profluere sinunt. Verum de pituitam expurgantibus meatibus suo loco agendum erit, nunc autem uentriculi opportunē pertractabuntur.

Dextri sinistriq; uentriculorum septi historia.

Callosi corporis ac septi figura.

DE CEREBRI VENTRICVLIS.

Caput VI.

DEXTRVM cerebri uentriculum ostendunt quartæ & quintæ figuræ L, L, & sextæ D, D. Sinistru autē quartæ & quintæ figuræ M, M, & priuatim quartæ N, N, deinde sextæ E, E. Communem uerō horum concauitatem seu tertium uentriculum exhibet septimæ & octauæ figuræ H, cuius meatus ad quartum tendens uentriculum K insignitur, qui partim undecimæ figuræ E notatur, & partim nonæ I, & decimæ L, M, N, O.



VENTRICVLORVM cerebri numero is ascribitur, qui cerebello dorsaliq; medullæ communis est, ac quartus etiam dicitur, tres nanque in cerebro uentriculos, Herophilum imitati, collo camus. Ac unum quidem in dextra cerebri parte, alterum in sinistra, & tertium in cerebri, seu duorum primorum uentriculorum medio recensemus. Dexter prorsus cum sinistro situ, forma, magnitudine, alijsq; omnibus quæ in partiu constructione examinari solita sunt correspondet: quare etiam singula quæ de dextro scribentur, de sinistro quoq; nos dixisse arbitrari conduxerit. Ponitur autem in dextra cerebri parte secundum totam quasi huius partis longitudinem protensus, tantum enim antica sede à fronte, quantum postica ab occipitio distat. remouetur autem adeo illis locis ab externa cerebri superficie, quantum ipsius uentriculi dextrum, exterius ue latus à superficie cerebri distat, caluariæ latera respiciēte. Internum autē uentriculi dextri latus secundum callosi corporis longitudinem sinistri uentriculi interno lateri proximum est: neque aliud interstitium ambos separat, quā tenuis quædam, & uelut quod ad subtilitatē attinet membrana cerebri portiuncula, quam septum uocauimus, atque à calloso corpore enatā, toti superiori parti secundum longitudinem cameræ modō extructi corporis continuam connatamq; esse diximus. Dextri itaq; & sinistri uentriculi latera toto spacio quo septum illud porrigitur, quanta ue callosi corporis est

Ventriculorum numerus.

Dextri & sinistri historia.

h ins fi. diuulsum est, et una pars X, X infignitur, altera Y, Y.

i 3 fig. L, L, et sp. R, R, R. publicatæ Y, Y, X, X. ius fig. et Y, X, attollit S, T, V eus fig. rene A, A, A 6 fi. premar H, I, G fig. am H 7 et 8 figuræ. h 3 fi. M, M.

a 4, 5 fi. L, L. 6 figura D, D. b 3 fi. A, A.

c 5 fig. L, L. 4 fig. L, L, L. d 5 fi. X, X & Y, Y. e 5 fi. R, R, R. f 5 fig. S, T, V.

est longitudo, in minimo interuallo ab inuicem remouentur. Verum ubi in ea cerebri parte consistunt, quæ prorsus diuiditur, ut illa quæ cerebello incumbit, & quæ fronti proxima est, ibi uentriculi latera mutuo maxime distant: nam præter cerebri membranas hanc sectionem subintrantes, etiam plurima cerebri substantia uentriculos dirimit. Vnde etiam sit, dextrum exterius uel dextri uentriculi latus nonnihil oblique duci. Anteriùs enim & posteriùs in dextrum magis quàm in medio accedit, sinistrum autem latus sinistrorsum magis media ipsius sede, quàm eius extremis protenditur. Anterior uentriculi pars obtusa est & rotunda, non autem ut omnes mihi scribere uidentur, in acutum uersus olfactus organa, aut uisorios neruos definens. Neque etiam hac parte aliquem ductum à se porrigit, nisi quod interno latere, ut mox dicà diffusius, decliuus ad tertium uentriculum pertingat. Cæterum posterior uentriculi regio occipitum respiciens, obtusa quidem est & rotunda, at deorsum sensim in cerebri substantiam uersus priora paulatim arcuata tantisper descendit, donec ibidem desinat, ubi olfactus organorum & uisiorum neruorum consistit principium, & quæ maximi soporalium arteriarum rami in cerebrum feruntur. Atque hic ductus si longitudinem spectes longior est, quàm media ipsius uentriculi longitudo, quàm ab occipitio ad frontem protendi diximus. & sub media etiam illa longitudine ductus hic in cerebri substantia tenditur, cornu modò in mucronem definens, qui non in uisiorum neruorum & olfactus organorum initia finit, & quadam continuitate neruos illos & organa olfactus nequaquam perforat: uerum in unam cerebri reuolutionem ibidem ad cerebri basim terminatur, atque in se maximam cerebrum petentem arteriam cum tenuis membranæ processu illam suffulciente admittit. Hæc quum dico, innumera Galeni dogmata

*Permuta
Galeni parit
uera dogma
ta hic non
describi.*

mihi reclamare haud ambigo, quæ olfactus organa cerebri anteriores esse uentriculos docet, & eosdem uentriculos tenues sensim factos in uisorios neruos suo mucrone finire, & quod longè alienissimum est, anteriores hos cerebri uentriculos uersus nares pituita eructare attestatur, eiusmodiq; nō pauca, quæ potius ex refectione, quàm proluxa quapiam disceptatione disci consulerim. Quandoquidem hæc adeò manifesta sunt, ut admonuisse tantum abundè sit, si modò non duntaxat libris confisus, tuis manibus cerebrum etiam aggrediaris, aut alteri accuratè fecanti asteris. Vniuersa igitur uentriculi superficies leuiss & aqueo humore oblita, & inter discendum subinde eodem oppleta conspicitur. Superior uentriculi pars omni inæqualitate est expers, quemadmodum & utraq; latera, nisi quod leuis ille uentriculi obliquus ductus quasi tubera inducere uideatur. Inferiorem uentriculi partem inæqualem efficit sinus quidam, ex posterioris uentriculi sedis externo latere antrorsum oblique ad communem uentriculorum cauitatem prorrepens, atque ad pituita leuiorem defluxum paratus. Dein ad inæqualitatem facit ea uentriculi pars, quæ deorsum uersus anteriora è posteriori uentriculi sede prorrepit. Ille nanque uentriculi reflexus unà cum sinu illo in causa est, ut monticulus quodammodo in anteriori posterioriq; inferioris sedis uentriculi regionibus extuberet. qui à dextro latere decliuus ad sinistrum latus fertur, uersus cōmunem uentriculorum amplitudinem. Inferiores enim uentriculi dextri & sinistri partes, quæ tota callosi corporis longitudine cōtinuè uiuuntur, uersus utriusq; medium communem eorundem cauitatem deorsum inclinatur, neque ut superiores partes & latera orbiculate, & ab inuicè septo aliquo diremptæ sunt. Neque profectò aliud est communis uentriculorum cauitas, quàm inferiorum dextri & sinistri uentriculorum partium sub corpore testudinis imaginè à dissectionis professoribus comparato descensus cōcursumq; qui inferiori parte oblongam uallem duorum uicinarū montium exprimit, acutum uel secundum ipsius longitudinem angulum efformat. Superiori uerò sede ad testudinem imitantis corporis effigiem cauitas illa secundum concauum orbiculate, teres uel uisitur. Cuiusmodi uerò corpus illud sit, paulo post explicabitur: nunc interim uentriculorum sermone tantum instituto, quorū iam duos dextrū uidelicet & sinistrum recensuimus, & propemodum etiam tertium, qui communis amborum est cōcauitas, quæ binos à se educit meatus, quorum unus ex humiliori ipsius sede, ubi acutum angulum secundum totam sui longitudinem uallis cuiusdam ritu exprimit, restā deorsum uersus glandem porrigitur, cerebri pituitam excipientem.

Communis uentriculorum dextri et sinistri concauitatis, seu tertij uentriculi bistroria.

Meatus a tertio uentriculo educi.

"Alter autem meatus qui posterior est, tertij uentriculi non minima pars censendus uenit, qui inter cerebri testes & nates ac super dorsalis medullæ initium decliuus, ad quartum uentriculum retrorsum pertinet. Meatus huius initium non adamussim orbiculate uisitur, sed quodammodo triangulare. seruat enim in inferiori sede acutum suæ cōcauitatis unde prodit angulum: in superiori uerò meatus parte, quæ glandi uasorum tertium cerebri uentriculum petentium diuisioni præest, proxima cōspicitur, transuersa linea anguli illius latera connectit, ipsaq; cum illis alios duos angulos constituit. Atque huiusmodi etiam meatus ipsius orificium est, quo quartum uentriculum sub cerebri natibus respicit. Ex inferiori meatus angulo, quæ primum

g 13 f. L. L.
h 13 fig. N.
O.
i 5 f. sub S.
T. V. & 6
f. ubi consi-
stunt H. L. et
7 fig. H.
k Cōfer. F.
G. 6, 7, 8 fig.
guam.
113 figu. P.
m sp. c. a. f.
guam 3 ca
piti inserta
lib. 4.
n 13 p. 2 Q.
6, 7, 8 p. F.

o 4 f.
N. N.

p 6 fig. aut
R. aut S.
quasius cha
racteres nō
notatus in
4 figu. pul-
chre occur-
rat.

q 6 fig. sub
H. L. 7, 8 fig.
guam H.
r 5 fig. S. T.
V. 6 fig. A.
A. A.

s 7, 8 fig. L.

t 16 18 figu
ra A.

u 7, 8 fig. K
& octaua
etiam L. 10
fig. B. C.
x 7 fig. M.
N. 8 fig. N.
O. P. Q. 10
E. G. F. H.
y 7 f. L. 10
fig. D.
z 10 fig. C.

ad vbi K. cō-
stituit in 8. fi.
b. 14. fig. C.
C. 15. fi. E.
c. 9. fi. L. 10.
L. M. N. O.
cum 15. fi. E.
constituit
quo tū uen-
triculum.
d. fi. cap. 2.
lib. 4. D.
e. 7. 8. fi. K.
10. fi. B.
f. 10. fig. L.
M. N. O.
g. 9. fig. H.

mum inter cerebri testes ferri incipit, ^a meatus alius raro educitur, qui per cerebri substantiam deorsum in priora protensus, tandem ad ^b cyathum usque peruenit, quem cerebri pituitā excipere docebimus. Ceterum ^c quartus uentriculus, ad quem posterior meatus tertij uentriculi porrigitur, ex dorsalis medullæ & cerebelli sinibus componitur, nō secus quā si utraque manū unam cavitatē fingeres, totus enim uentriculus in cerebelli corpore haud insculpitur. Dorsalis itaque medulla ex cerebro ^d prodit, ubi tertius uentriculus ^e meatum uersus quartum uentriculum primū porrigit, testesq; ipsi & nates dorsalis medullæ principio continuantur, ac meatum illum tertij uentriculi cum dorsalis medullæ initio æqualiter deducunt, ita ut meatus superior pars illis, inferior autem dorsali medullæ incisa sit. Postquam uerò meatus ille nates superauit, eius portio quæ dorsali incisa uidetur, dilatari incipit, ac ^f sinum efformat usque ad eum ferè dorsalis medullæ ^g locum, quā caluariam hæc egressura est, pertinentem. Sinum hunc rectissimè Herophilus concauitati assimilauit calami quo scribimus, nam si huic sinui eam calami partem, quam atramētō intingimus, comparaueris, animaduertes profectò calami orificiū ubi adhuc calamus teres est, & sectioni uicinus, tertij uentriculi meatus fini respondere, qui sub natibus prominet: deinde cuspitem quo literas fingimus, similem obseruabis infimæ sinus partī, quā is in dorsalem medullam iam ex caluaria excisuram, ueluti porum angustumq; meatum producit. duos autem calami angulos, quos inter mucronem & elasticissimæ sectionis initium fingimus, cavitatisq; cōmilatera sinus lateribus similima offendes. Ad huius cavitatis latera, ubi anguli illi constitunt, unus ^h utrobique dorsalis medullæ processus orbicularis habetur, cui duntaxat cerebellum adnascitur, continuumq; cum dorsali medulla corpus efficitur. Atque huiusmodi dorsalis medullæ cavitās est, alteram quarti uentriculi cavitatem constituentē. Quæ autem in cerebello spectatur, uti iam dicturus sum se habet, inter ⁱ duas orbiculares cerebelli sedes, quibus dorsali medullæ continuatur: & inter eius cerebelli ^k partis ^l extrema, quam ueluti tertiam ipsius portionem recensuimus, sinus quidam imprimitur latior quā longior, non tamen admodum profundus, qui alteram quarti uentriculi partem constituit, in anteriori & posteriori sede patens, quod neque anterior neque posterior cerebelli pars dorsali medullæ adnascatur. quamuis interim sinus hic tenui cerebri membrana, & anteriori & posteriori parte occludatur. In ^m anteriori enim parte tenuis membrana, qua cerebellum cerebro & cerebri natibus cōmittit, sinum obuoluit, ⁿ posteriorem uerò sinus sedem obstruit, eius loci tenuis membrana portio cerebellum dorsali medullæ ibidem colligans. Quartus uentriculus nihil in se præter aqueum humorem, qui & alijs uentriculis cōmunis est, inter dissecandum cōtinere animaduertitur, quemadmodū neque meatus ex tertio cerebri uentriculo in quartum pertinens. Porro dexter & sinister præter huiusmodi humorem etiam ^o plexum quandam in se continent, quem dissectionum periti ^p extimo factus inuolucro comparāt. Communis autem cavitās, seu tertius uentriculus ^q uenofum illud uas deducit, quod plexus illius constituendi gratiā à quarto duræ membranæ sinu in tertio libro propagari docuimus. Deinde anterior quoque horum uentriculorum pars ab illo uasē ^r uentulas impensè graciles interdum assumit, illis quā simillimas quibus ^s adhærentem oculi tunicam exornari conspiciamus, atque huiusmodi uenulæ uentriculorum superficiei adnascuntur facilius, quod durior & quasi callosior cerebri substantia in uentriculorum superficie, quā alibi esse uideatur. Ceterum Galenum miror, cæterosq; omnes, qui post illum in Anatome nobis quicquam prodiderunt, & ab ipso perperam citra sectionis aggressum illi nimium fidentes (si modò quid boni complexi sint) deprompsere, quod hos scribere non pudeat, trium cerebri uentriculorum superficiem tenui membrana, uti ipsū cerebrum cingi obducitq; quartum autem non ita; quum nulla prorsus alicuius uentriculi meatus ue superficies tenui membrana obuoluatur. Quis enim, obsecro, diligenter humanæ fabricæ partes examinans, neque alicuius scriptis picturis ue (uti sanè debet nemo) solum addictus, non uel hinc conspiciet, Galenum pleraque, & præcipuè in libris de Vsu partium imaginatum fuisse: Arbitrabatur namque tam mollem cerebri esse substantiam, ut incisi ipsi uentriculi in se colligi debuissent, si tenui membrana intus non succingerentur. uerū duriorum cerebello tribuens substantiam, sibi persuadebat, eius uentriculum citra membranæ, quæ ipsi fulcri loco esset, beneficium posse contineri. Ego sanè arbitror Galenum quum illos libros scriberet, apud Herophilum, aut Andream, aut Marinum, aut Ly cum, aut alium quempiam ex illis proculdubio præstantissimis Alexandriæ dissectionis professoribus, tenuem cerebri membranam describentibus legisse, in tres cerebri uentriculos tenuis membranæ processū partes ue porrigi, at non item in quartum uentriculum. quæ ratio ne illi uentriculos membrana quapiam ueluti peritonæo, aut tunica costis subducta succingi non indicabant, uerū eas tenuis membranæ ^t partes intelligebant, uasa in uentriculos dedu-

Quarti uentri-
culi historia.

b. 10. fi. K.
i. 11. fi. G. G.
18. fi. medullæ
R. 9. fig. C.
m. 11. fig. C.
D. c. d.

n. 7. fi. X. X.
i. 11. fi. G. G.
o. 9. fi. quasi
E. ad H. cō-
mutares.

p. 4. 5. fi. O.
O. 6. figura
M. N.
q. 1. tabella
fig. 30. P. 2.
12. K. 3. 4.
14. Q. R.
r. 6. fig. H. I.
e. 7. fig. V.
e. 11. fig. A. T.
s. 4. fig. P. 6.
p. 2. O. O.
e. 11. fig. cap.
14. 15.

Quid singule
instit. uer. cu-
lis.

Tres primos
cerebri uentri-
culos tenui
brana non ju-
cingi.

u. 6. fig. M.
N. H. I.

centes, à quibus secundarum modo efformati plexus fabricantur, cuiusmodi pars in quantum ventriculū nulla exporrigitur. Quinetiam præter id quod uentriculi membranis neuitquam succinguntur, illæ obstaculo essent, quo minus cerebri substantia materiā suis uentriculis oblatam, in animales spiritus, interstitio quodā præpedita, emutaret. Cæterū præter narratos iam tenuis membranæ processus dexter cerebri uentriculus, uti etiā sinister in posteriori sua sede, ubi deorsum reflecti incipit, * principii corporis cameræ aut testudinis modò effigiati continet, quod obiter additū adhuc esse (ne quid in uentriculorū cōstructione prætermissum uideat) uolui, nam peculiare illius corporis Caput præsentī subiicietur, quod ut uentriculorum usum recenserē expeteret quidē, at quicquid propemodū adducere scriptisq; mandare ausus essem, in huius libri initio, ubi cerebri usus obiter enarrandus erat, recensui. Nihil enim in præsentia uentriculis aliud tribuere statui, quā illos amplitudines sinusq; esse, in quibus attractus per inspirationē aër, uitalisq; spiritus à corde ipsis transmissus, priuatæ cerebri substantiæ uel in animalem spiritum emutatur, qui postmodum per nervos ad sensuum motusq; organa distribuitur, ut illa huius spiritus beneficio, & apta suis munij cōstructione suo fungantur officio, quo muscoli mouent, oculus uidet, olfactus organa olfaciunt, auditus organa sonos percipiunt, & lingua sapores dignoscit, & demū omnis pars cui neruus exporrigitur, tactiles qualitates diiudicat. Hunc itaq; in gignendo animali spiritu usum uentriculis ascribere neuitquam uereor, at de principis animæ facultatum in cerebro sedibus (quamuis etiam has illi qui hodie theologi uocari gaudent, omnia impunē sibi licere arbitrati, assignent) nihil enarrandum ducō. Quando omnes quibuscum uiuimus, præcipuas principis animæ uires simijs, canibus, equis, ouibus, bobus, eiusq; generis animantibus penitus adimunt, & ut cæteras taceam, soli homini ratio cinandi facultatē, eamq; omnibus quantū ab ipsis capere possum, parem tribuunt: quamuis interim homines nullo sinu illa animalia superare inter dissecandum cōspicimus: neque solum numerus idem est, at cætera omnia (si modò molem & temperamenti ad iustitiam integritatem excipias) inter se sint similima. Liceat itaq; uel illorum hominū gratia me ab alio uentriculorū usu inquirendo abstinere: neque uel hic Galeni placitū meminisse, qui in tertio de Hippocratis & Platonis dogmatibus, mediū uentriculum: in libris autem de Partium usu postremum, principalissimum esse docet. Ac proinde Deo rerum omnium opifici hymnos canentes, gratias agemus, quod nobis rationalem animā, quam cum angelis (ut Plato etiam male tractatorum philosophorum haud immemor innuebat) cōmunem habemus, largitus fuerit, cuius beneficio si modò fides adsit, æterna illa felicitate fruemur, quando animæ sedem ac substantiā non corporū refectione, aut nostra corporeo uincolo obruta ratione inquirere necessum erit. nā is qui uera est sapiētia, nos nō hoc generabili & putrescibili corpore amplius, sed spirituali suoq; quā similitudo constantes, edocebit. At quum adhuc id sumus quod nos esse debilis ratio dicitur, in reliquis cerebri partibus summi rerum Opificis industriam pro uirili indagemus.

DE CEREBRI CORPORE, TESTVDI

nis cameræ uel imaginē à dissectionum peritis comparato.

Caput VII.

SVPERIOREM huius corporis, quod in Arabum interpretum libris Zac & Zachd dicitur, sedem ostendit quintæ figuræ S, T, V. quanquam & eius sedis modicam partem etiam proponat quartæ figuræ L, M, & sextæ figuræ B, C. ubi etiam inferior sedes spectatur ad A, A, A.



ORNICIS seu testudinis modò extructum corpus, in illarum cerebri partium numero reponendū uenit, uel quarum etiam interuētū dextram cerebri partem sinistra continuam esse nequimus inficiari. Est itaque id unicum, & in cerebri medio repositū, ac pariter utriusq; cerebri partibus commune. Hoc eandem cum calloso corpore substantiam, & parem quoque longiitudinē, ac usum etiam quodammodo eundem adipiscitur. Verum forma ortusq; huic peculiariis accidit. Ex posteriori namq; dextri & sinistri uentriculorum sede, qua hæc deorsum in priora reflectitur, statim in ipso reflexu corpus quoddam enascitur, similem prorsus substantiam cum cerebri uentriculorū substantia sortitum, nisi quod paulo quā uentriculorum substantia candidior, duriorq; uisitur. Huius corporis pars, quā dexter uentriculus educit, ei continua est, cuius principium ex sinistro pender, ac simul ambæ partes latum quoddam corpus efficiunt, quod statim ab ortu à reliqua

x 4 fig. L,
M, S, T,
6 fig. B, C.

a 3 fig. L, L,
4 fig. L, L, S
fig. R, R, R,
b 4 fig. L, M,
5 fig. S, T, 6
fig. B, C.
c 5 fig. S, con
tinuum est
cum T. et 6
figura B, A,
cum A, C.

ad fig. S.T. ad V. 6 fig. B. C ad supremū A. e luxia V. 6 figure. f. fig. ab S. ad T. aut 6. fi. ad B. ad C. g. fig. ab S. ad V. aut 6. fi. ad B. ad fa. premū A. h. fi. ad T. ad V. aut 6. fig. ad C. ad supremū A. i. fig. O. O. 6 fig. M. N. h. 6 figura A. A. A.

qua uentriculorum cerebri substantia abscedit, ac sensim in acutum^d desinens antorsum perferitur, ad eum usq; cerebri locum pertingens, ubi anterior cōmunis dextri & sinistri uentriculi cavitatis, tertij uel uentriculi pars^c cessat. Ibidem namq; acuto quodā angulo corpus hoc substantiæ cerebri rursus unitur, cōtinuum uel est, toto reliquo ductu à principio statim inferiori ipsius sede tribus cerebri uentriculis nusquam connatum, corporis uel alicuius interuentu cōnexum. Obtinet itaq; præfens corpus triangularem figuram inæqualibus lateribus conformatam. ac primum quidem latus, quod & breuissimum est, à posteriori sede dextri uentriculi ad posteriorem sinistri protenditur.^e Alterum in dextro cōstitit uentriculo, à posteriori ipsius sede uersus interiora usq; ad priorem tertij uentriculi partem protensum.^h Tertium in sinistro positum uentriculo, secundo lateri longitudine respondet. Secundum duo hæc lateraⁱ plexus illi prorepunt, quos ad secundarum formā dissectionis professores extructos aiunt. Cæterum hi tres huius corporis anguli duntaxat cerebro inferiori corporis sede connati, continuūq; sunt. latera enim omnia à cerebro prorsus abscedunt. Superiori uerò parte corpus id unico tantum angulo, qui acutus est, anterioraq; spectat, cerebri substantiæ continuatur. Inferiori sede corpus id unica donatur^j superficie, triangulari testudini fornicis uel quàm similitima. unde etiam corpus hoc, quemadmodum & ab usu ueteribus Græcis *κωνοειδής* nuncupabatur. Hæc superficies, tertij uentriculi elatiorem sedem constituit, ac proinde etiam sub ipsa dextri sinistriq; uentriculi sit communio. Cæterum^k superior huius corporis superficies, gibba, ac pro inferioris superficiæ cavitatis ratione conuexa uisitur, non tamen simplex cōtinuaq; ut illa. Ea namq; secundum corporis longitudinem in medio in^l acutum quodammodo extuberat, continuaq; cum dextri & sinistri uentriculi septo efficitur, adeo ut in utroq; latere una haberi uideatur superficies, quæ in ipso corporis ex posteriori uentriculorū sede exortu impensè orbicularis, ac oblongæ sphaeræ superficiæ tam similis conspicitur, ut nonnullis hi^m exortus eousq; imposuerint, ut illos cerebri nates esse arbitarentur. Alij, magno supercilio, uermium cerebri loco, operæ præcū sese quippiam inuenisse iactitantes, in Italici gymnasijs ostenderūt. At hic mihi sermo cohibendus est, ne ad eiusmodi Anatomes imperitos homines expatiatur: quibus non sat fuit omnia ignorasse, nisi sibi particulæ, nullius in medicina usus, in uentionem magno fastu uendicaret, quam fortè à Galeno eleganter accurateq; percriptam nugacissimè & falso commōstrarent. Corporis itaq; testudinis modo conformati omnes superficies, quæ leues omnino sunt, & æque humore perfusæ, tres cerebri spectant uentriculos. tota enim inferior ipsius superficies tertij uentriculi superiorē sedem, uti iam dictum est, conficit: dextra pars superioris superficiæ dextrum respicit uentriculum, sinistra sinistru. Vt uerò uentriculos ipsos neutiquam tenui membrana succingi relatum est: ita quoq; hoc corpus tenui membrana prorsus liberum est, nihil aliud in sui constructione præter cerebri substantiam admittens. Porro Natura id creauit, ut in testudinis, superiorum corporum impetum, quo minus illa corruant, sustentis, tertium cerebri uentriculū amplum seruet, seseq; ipsum haud cōcidere sinat, ad quem usum, præter aptam constructionē, tres eius anguli quibus se sustinet, auxiliantur. quinetiā septum uentriculorū, callosi corporis beneficio sursum tractū, hoc quoq; corpus subleuat, attollitq;. Quæ quū ita sint, corpus istud magna ex parte tertij uentriculi cavitatem efformat, & sub seⁿ uas, à quarto duræ membranæ sinu, citra omnē compressum securissimè deduci sinit: quod per tertiu uentriculū rectā fertur, actandem bipartitū in dextrum sinistruq; uentriculū digeritur.

DE CEREBRI GLANDE NYCIS PL

neæ imaginem exprimente. Caput VIII.

Ostenditur hæc septima figura L. & octaua M. & decima D.

ad fig. S.T. V. 6 figura A. A. A. b. 6 fig. H. I. c. 7 fig. T. d. 7 fig. L. 8 fi. M. 10 figura D. e. 7 fi. K. 10 fig. B.



7 fi. M. N. 10 fi. E. G.

V X T A posteriorem testudinis modò formati^a corporis sedem, qua primum^b uas uenosum ex^c quarto duræ membranæ sinu in tertium cerebri uentriculum porrigi incipit, glandulam Natura condidit nuci pinæ aut turbinate figuræ similem, ac proinde *κωνοειδής* & *κωνοειδής* à ueteribus appellatam. Reponitur autem sub uasis illius initio, mucrone suo sursum spectans: basi uerò, cerebri substantiæ incumbit paulo posterius quàm^d meatus initium uisitur, qui ex tertio cerebri uentriculo in quartum procedit. Neque profectò aliter ipsius situm exprimere possum, nisi etiam eminentissimæ & anteriori^e testium cerebri parti glandem illam inniti adijcerem. Hinc nanque cerebri parti in homine potius innititur, quàm quod quadam substantiæ continuitate hinc cerebri substantiæ cōtinua, aut quæpiā cerebri particula censenda esset. In hominibus namq; cerebro uix hæret: frequentissi meq; nisi quis mentem operi accommodet, in confectione unā cum uenoso uale auelli cōsueuit.

Glandis pineæ nuci similis sita.

Hh In

Presentis
glandis usus.

magis autem, aut prouectoris ætatis oue, cerebro non hæret modò, uerum etiã cerebri substantiã quodammodo continua cernitur. Insuper homò eam glandem, minorem quàm uel agnus, sortitur. unde tum hanc ipsam, tum quæ sequenti Capite describentur organa uisus, commodissimè agninum cerebrum aggredieris, habebit enim id omnia procetiora, & ut opportunè alicui rei eadem assimiles, accuratius conficta. Galenus glandem hanc quæ cerebri substantia durior, magisq; ad glandis quàm ad cerebri naturam accedit, meatui à tertio cerebri uentriculo in quartum porrecto præesse, & quod aliquibus dissectionis professoribus uisum erat, glandem hanc meatum illum occludere, aperireq; prorsus negat: nò eandem huic glandi, ac glandoso corpori usum tribuens, quod sub dextro uentriculi orificio, duodeno intestino connascitur, quodq; apertioni constrictioniq; eius uentriculi orificij præesse arbitratu est. Verum ut id illius muneris gratia, haud fabricatum suo loco ostendimus: sic etiã hîc cum Gale- no testamur, præsentem cerebri glandem meatum nequaquam obturare, uel ob hoc præcipuè quod haudquaquam meatum adeò cõtingat, ut antè ipsius orificium cõiuere posset. Verum ob id factam opinor, ut quemadmodum aliæ corporis glandulæ permultæ firmamentu esset uasi quod tertium cerebri uentriculũ accedit, & ab ortu statim in frequẽtes ramos tenui mem- brana contextos diuiditur, id ipsum suffulciens, ne meatus illius principio statim in ingressu incumbens eum obstrueret, animalemq; spiritum ex tertio cerebri uentriculo in quartum ferri prohiberet.

g 12. fi. lib. 5
i. 1. 15. fi. S.

h 6 fig. H.

DE TESTIBVS ET NATIBVS CE-
rebr. Caput IX.

PROPONVNTVR hæc primum in septima figura ad M, N. dein in
octaua ad N, O & P, Q. postremo in decima ad E, G & F, H.



Testis & na-
tū cerebri nu-
merus.

Situs.

Substantia.

Forma.

As quoque cerebri partes illarum classi annumeramus, quæ dextram cerebri partem¹ sinistræ continuam esse arguunt. Sunt autem testes hi na- tesq; aliud nihil prorsus, quàm quædam cerebri particula in hoc fabrica- ta, ut² meatus ex tertio cerebri uentriculo quartum accedens uentriculum tutò citra aliquem à superioribus cerebri partibus compressum deduce- retur: neque etiã, etsi multitudinis nomine particula nominatur, ob id in plures disinctasq; partes diuisa est, nam unica cernitur, elegãter à qua dam similitudine hæc nomina sibi uendicans. Reponitur enim illa cerebri³ pars inter antero- rem cerebelli sedem, & posteriorem tertij uentriculi partem: deinde inferiori sede spectat dor- salis medullæ⁴ initium, superiori eam cerebri partem quæ cerebello iam innitui incipit. Continua- tur autem cerebro, aut (ut rectius dicam) à cerebro nascitur tota, anteriori scilicet sede sua & in- feriori: in lateribus autem & superiori partibus nulli particulæ continua est, sed, fed- tantu tenui membrana ut reliqua cerebri superficies obducitur. Substantia ipsius, quoniã tenui membrana succingitur, subflaua est, illiq; substantiæ cerebri respõdet, quæ proximè tenui mem- branæ passim accedit. In superiori parte iuxta anteriora, glandula incumbit ipsi, quam paulo antè uasorum deductui præfectam ostendimus. Pars hæc, effigiem quandã exprimit, duabus sibi commissis natibus quàm similitimam. Verum quoniam⁵ superior ipsius pars testes magis, propter glandem illam quæ peniã assimilãt, refert, ueteres qui pueros iure hæreditario domi in cõspectionibus exercebãt, *testes* eam appellauere. Nos itaq; illos imitati, testes ipsam & gemel- los nuncupamus. Cæterum quia in⁶ posteriori inferioriq; huius corporis parte prominet orifi- cium⁷ meatus illius qui ex tertio uentriculo quartu petit, quodq; id orificium similitudinem ani- referre uideatur, & in posteriori huius cerebri partis sede⁸ impressio quædã instar linæ tran- uersim feratur, superiora quodãmodo ab inferioribus distinguens, huic posteriori inferioriq; parti *γλαριον* nomen ueteres indidisse arbitror, nos autè natulas, aut clunes dicere poterimus. Cæteru temporis successu uidentur Græci hæc nomina cõfudisse, & partẽ hanc quæ meatum ex tertio uentriculo in quartu summa Opificis solertia deducit, cõtinetq; modò *natulas*, modò *γλαριον* appellauisse.

43 fig. A, A.
b 3 fi. B, B.

c 7, 8 fi. E.
10 fig. B, C.

d 7 fig. M.
N ponun-
tur in H, K,
c 2, X, X.

e 1 fi. cap. 2
h. 4. D. aut
hic quod in
10 fi. habe-
tur sub A,
A, I, H.

f 7 fi. D, D.
g 7 fi. L, 10
fig. D.

h 10 fig. E,
G. quibus
proximum
est D.

i 10 figura
F, G.
h 10 fig. C.
18 fig. K.

m 10 fi. in-
ter E, G &
F, H.

DE CEREBELLI PROCESSIBVS VER-
mis imaginem exprimentibus, ac demum tendinibus illos continentibus.

Caput X.

PROCESSVVM horum natura potissimum petitur ex undecimã figurã C, D, & c, d. ac dein ex H, I. Octaua uerò figura huc quoque confert, ad medium R uersus L, & nonnã figurã C, E.



VPERIVS cerebelli formam explicantes, cuiusmodi uermiformes cerebelli processus sint, innuimus. Dicebamus namque^a unam quodammodo cerebelli partem à prioribus in posteriora, ueluti in orbem duci, eamque talibus implexam reuolutionibus, ut uermis in ligno nascentis ef figiem appositissimè ostenderet. Duo huius partis apices, quorum^b hic anteriorem uentriculi cerebello & dorsali medullæ communis sedem respicit,^c ille uerò posteriorem, procul dubio à dicta nuper similitudine uerteribus Græcis σπυλινος^d nuncupantur. Nihil enim aliud sunt quàm prominētiō cerebelli substantia, uermē (uti dicebam) refrens. At non satis scio, quid Galeno in mentem uenerit, quod uermiformem processum^e meatus ex tertio uentriculo in quartum pertinentis^f orificio inferiori præfectum esse finxerit, ac uelut alterius tantum processus apicis^g ue usum explicauerit. Quamuis etiam uix satis mihi constet, utrum ipsorum, anteriorem uidelicet aut posteriorem in dicauerit. Nam si priorem intelligit, is suo apice, quum ad posteriora ex anterioribus ducere tur, ad meatus orificium nequaquam sese producere posset: imò si pròreperet, in posteriora magis dirigeretur, communem cerebelli & dorsalis medullæ uentriculum potiùs occupaturus. Posterior processus, qui in priora ex posterioribus protenditur, præterquam quod suo apice in cerebelli sinus substantiam confundi magis quàm prior uideatur, neque ut ille promineat, neutiquam ad communis eius uentriculi orificium usque produci posset. Sed quorsum hæc commemoro: quum neminem ambigere àrbitrer, meatum illum ex tertio cerebri uentriculo in illum qui cerebello dorsali^h que medullæ communis censetur, pertinentem, nunquam debere occludi, quum nullum obstructionis usum, quicquid nobis confinxerimus, in dagare ualeamus: quum interim ut continuò in dorsalem medullam animalis spiritus confluat, illum perpetuò patere ex usu sit. Neque quinquam, nisi fortè ab Alberto, Thoma, Scoto, eiusq; cohortis Theologis, edoctum esse opinor, qui alterum uermium (nam utriusque par ulus in unius orificij clausione esse nequit) meatus huic præfectum esse sibi persuaderet, ut phantasmata in memoriæ sedem, quam in cerebello esse confingunt, ingredi sineret: & rursus fures in memoriæ carcere colligatos, in medium uentriculum, quem rationis sedem esse aiūt, transmitteret. Siquidem frutitane rerum Opifex Deus eiusmodi uermiformes processus cani, ouibus, & id genus animalibus, quibus illi nullam ratiocinandi uim ascribunt, elargiretur. Sed unde, obsecro, huic processui iste ex uoluntate sua pendens motus obtingeret: & si ipsi processui aliquis fortè motus peculiaris alicuius substantiæ aut temperiei ratione assignandus esset, nō tamen uermis modo processusⁱ educi contrahi^j que posset: quandoquidē reuolutiones illæ, quarum gratia processus isti uermibus comparantur, non orbiculatim ipsos ut uermium gyros ambiunt: neque quo sese processus illi rependo firmarent aliud est, quàm qua secundum eorum etiam ductum continui sunt cerebelli substantiæ. Vt cunque sit, mihi in præsentia sat est, locum constructionemq; horum processuum indicauisse: illis interim nullum motū aut usum aliū tribuenti, quàm reliquæ cerebelli substantiæ. & si quid confingere liberet, non unius tantum processus, quem Galenus aliquando duntaxat cognouisse uidetur, sed duorum, quos rursus solo multitudinis nomine indicauit, usum nugacissimè ementire, intrepidè asserens anteriorem quum elongatur, atque in posteriora magis ducitur, sese extenuare, atque principium quarti uentriculi, cuius superiorem sedem constituit, amplius apertiusq; reddere. Posteriorem uerò processum similiter in anteriora aliquando produci, ac attenuari, ob idq;^k uiam aperire confingere, que ex quarti uentriculi posteriori sede in dorsalis medullæ regionem, quæ modò ex caluaria procidit, instat meatus cuiusdam terminatur. Atq; ut processus quoties extenuarentur, apertioni præesse dicerem: ita rursus eosdem collectos, ob idq; in crassatos meatus, quibus præfunt, angustiores reddere affirmarem. At mihi non libet paruam aliquam, eamq; falsam Creatoris industriam recensere, & interim reliquum cerebri artificium propemodum uniuersum destruere. Vnde etiā multo maxime Galenum miror, qui tenuis membranæ partes cerebellum cerebri testibus^l colligantes, tendines & ueluti uincula appellauerit, quæ utrinq; latera uermiformis processus complecterentur, ne fortè dum is mouetur, in obliquū declinet. Nihil enim aliud sunt illi Galeni tendines uincula ue, quàm nunc dictæ tenuis membranæ portiones. Mirum quoque est, eam tenuis membranæ^m sedem, quæ dorsali medullæ posteriorem cerebelli partem, quæ uermiforme illud corpus intrò ac ad anteriora uersus quartum uentriculum reflectitur, colligat, in tendinū numero Galenum non reposuisse, quum illa membranæ portio posteriorem processum exactius quàm priorem eius sedis membranæ pars dirigeret.

as si. medi-
um R. 9. fi-
gure.

b si. fig. C.
D. & H.
c si. fig. C. d.
C. l.

d si. fig. K.
e si. fig. C.

f si. fig. L.
M. N. O. C. l.
E. si. figure.

g si. fig. O.

h Inter M.
N. et X. X.
7 fig.

i Que ef-
fer ab E. ad
H.

DE INFUNDIBULO, ET GLANDULA

pituitam cerebri excipiente, reliquisq; ductibus eandem expurgantibus. Caput XI.

HVC primum spectant M, M tertiae figurae sinus notatitia, ad callosi corporis latera positos. Deinde septima & octava figurae I, meatum indicat, qui ex communi dextri & sinistri uentriculorum cerebri cœcavitate pituita deducit. Postea S decima tertiae figurae, & C, C decima quarta, & E decima quinta, & B decima sexta ac decima octava peluim indicat pituita excipientē. Glans uero in quam hæc distillat, notatur A decima sexta, & E decima septima, & A etiā decima octava: ubi C, D, E, F obiter ductus notant, pituitam a glande deferētes.



Brevis enumeratio partium ad pituitae defluxum famulantium.

Meatus ex tercio cerebri uentriculo ductus.

Peluis in quam cerebri pituita destil-
la.

Glandis pituitae excipientis historia.

ALVARIAE^a futuras ad fuliginosorum cerebri excrementorum transitum summopere opitulari, primus liber ubi futurarū usus recenscebatur, ostendit. Præfens autē locus exigit, ut partes singulas pituitosæ excretionis famulantes enumeremus. Sunt autē hæc, duo in cerebri substantia insculpti meatus, dein tenuis membranae portio infundibuli instar efformata, postmodum glandula infundibuli huius mucronem excipiens, & meatus a glandula hac ad palatum nariumq; foramina pituita deducentes. Duos equidem cerebri meatus, quum tertium cerebri uentriculum, seu communem dextri sinistriq; uentriculi cavitatem prosequeretur, antea recēsiui. ac^b unum quidem insigni satis amplitudine ex media cōmunis cavitatis sede rectā deorsum in cerebri substantia insinuatū descendere dixi, ita sanē ut præfentis meatus finis ē regione eius caluariæ^c partis sit, quæ sinum^d glandulae qua cerebri pituita excipitur reponendæ aptum, constituit. Alter meatus, quem rarissimē obseruavi, quicq; dicto longē arctior secantibus occurrit, ac ex^e meatu illo deducitur, qui a tercio uentriculo in quartum per cerebri testes natesq; pertingit. quamprimum enim meatus is cerebri testes subire incipit, ex anteriori inferiori ue ipsius sede, alter pituita expurgandæ subseruiēs cerebri meatus producit, sensim deorsum in anteriora tantisper protensus, dum in finem primi meatus terminetur, idemq; ex ambobus meatibus orificium cōsurgat. Ad huius^f orificij latera, tenuis membrana etiam hic cerebelli basim succingens, orbiculatim a se educit sui^g portionem processum ue, substantia prorsus cum reliqua tenui membrana similem, nisi quod gracilibus prorsus uenis, quanq; interim frequentibus, intertextitur. Præfentis processus initium accurate refert elatissimā regionem infundibuli, quo in angustioris orificij lagenas uinum infunditur, est enim amplum, & orbiculare. Ab exortu uerō sensim in arctum infundibuli quoq; modo cōgitur, donec tandem ueluti in angustā oblongamq; fistulam similiter atque infundibula finiat, quæ deorsum protensa, per peculiare sibi in dura cerebri membrana excisum foramen descendit, suo mucrone adⁱ glandem qua cerebri pituita excipitur, desinens. Adeo ut uniuersum hoc membranaceum corpus infundibulo, & imagine, & usu quāmsimilimum censerī debeat, unde etiam Græcis^j γλάνη nuncupatur. quanquam etiam a scyphi, seu in qua in balneis lauamur conchæ forma (quam superior huius corporis pars exprimit) πύλος^k appelletur. Nihilominus alibi a nominū impositoribus, humilior corporis huius infundibuli fistula non absimilis, γλάνη dicta uidetur. reliqua autē pars superior, quæ sensim in arctum desinit, magna ex parte uisorijs neruis quā illi inuicem cōeunt, subīeditur, πύλος. Rursus integrū hoc membranaceum corpus, πύλος nonnullis uocatum uideo: glandem autem in quam pituita distillat, γλάνη^l quasi forma quæpiam esset, in quam aliquid infunditur. Et si ueteres, qui generis successione pueros Anatomen edocebant, id nomen glandi nō attribuerint, eam inter omnes in caluariæ amplitudine repositas partes solam priuato nomine indigā reliquisse uidebuntur. Locatur autem glandula sub dura cerebri membrana in proprio ipsi in osse cuneum imitātē exculpto^m sinu, cuius etiā effigiem exprimit. depressa nanq; est, & in humiliori parte quodāmodo gibbosa orbicularisq; in superiori uerō concava, & sinu quodam insinuata, secundū orbem nō prorsus circularis cōspicitur, uerū paulo minū toto quadrata. Substantia constat glandulosa, sed cæterarum glandiū corporis substantia longē duriori & compactiori. Omni ex parte tenui membrana caluariæ os tota illa sede succingēte, quā in hac regione dura cerebri membrana a caluariæ osse abscedit, distatq;. Huius caluariæ ossi obductæ inibi membranae interuētū glandula firmatur, & etiā duabus insignioribus soporalū arteriarū propaginibus adhaeret, quæ ad ipsius lateraⁿ prorepūt, & ridiculē in hominibus reticularē plexum formare cæteris dissectionis profectoribus creditur. Nō secus profectō quā si & illarū propaginū gratia, hæc glandula effingeretur,

a Spectantur figurae ca. 6. lib. 1.

b 7.8 fig. 1. c 3 fig. ca. 12 lib. 1. M. aut hic ad D

d 16.18 fig. 14. fig.

e luxta K 8 figurae.

f 7.8 fig. K 10 fig. B. C.

g 14. fig. D. b 14. fig. C. C.

i 16.18 fig. 18 fig. B.

j 16.18 fig. 18 fig. B.

k 13 figurae 3 est sub B. N. O.

l 13 fig. ca. 12 lib. 1. M.

m 1d petos ex 16 fig.

geretur, ipsisq; eundem præberet usum, quo reliquæ glandulæ uasorum distributionibus ductibusque firmandis & sustulcendis, præfunt. Porro ad huius glandis latera deorsum utrinque canales duo descendunt, ac unus quidem uersus anteriora prorepat in^o foramen desinens, quod^p secundum cerebri neruorum par deducit, quodq; contra Galeni placitum multo uisforij nerui foramine maius esse innuimus. Alter uerò in posteriora magis descendit, atque per inæquale asperumq; foramen seu rimam ducitur, quæ ad anteriorem sedem lateraq; foraminis quod soporalis arteriæ^p insigniorem ramum in caluariæ amplitudinem transmittit, habetur. Atque hæc omnia pituitæ cerebri euacuandæ ministrant. quippe duo meatus, quos in cerebri substantia incisos diximus, ex cerebri uentriculis humorem illum deducunt, atque in infundibulum defluere sinunt. Ipsum autem infundibulū superius amplum latumq; extruitur, non horum duntaxat meatuum, qui in unum tandem orificium desinunt, occasione, uerum etiam ut fines illos dextri sinistriq; uentriculorum cerebri contineret, quos ex posteriori uentriculorum sede deorsum in anteriora reuolutos inter cerebri reuolutiones hîc desinere commemorauimus, quandoquidem & hi suæ sedis pituitam deferunt, atque in infundibulū exporrigunt. Præterea in fundibulū eā cōstat amplitudine, ut si quid pituitæ super^p callosum corpus & sinus illos colligeretur, quos ad callosi corporis latera conspici retulimus, id ipsum in infundibulum tenuis membranæ beneficio procumberet. Siue enim eiusmodi humor ab anteriori callosi ac instar arcus protuberantis corporis sede, siue à posteriori descendat, ad tenuem membranam cerebri basim inuestientem influere, & hinc paulatim in infundibuli amplitudinē prolabi potest. Infundibulum uerò ab omnibus his ductibus pituitam excipiens in angustum cogitur, ut tandem hanc per unicum & priuatim sibi in dura membrana patens foramen deducat, ac innoxie in illius glandulæ centrum promanare sinat. Glandula quadam substantiæ familiaritate defluxus imperum sustinens, & quantum conijcere possum, os ab iniuria uindicans, pituitam hanc excipit, ac sensim citra stillicidium à lateribus suis eam undequaque defluere sinit, per omnia foramina hîc in caluariæ basi tum uenis tum arterijs tum neruis ipsis exculpta. Priuatim enim pituitæ gratia foramen nullum ossi insinuatur, nisi forsitan rima anteriorem sedem lateraq; foraminis soporalis arteriæ insigniorem ramum deducens ambiens. Ridiculū nanq; est, quod Galenus de foraminibus spongiarum aut cribri perforationes referentibus nusquam nō comminiscitur, quum huius generis foraminulum sub glande nullum consistat. Quod te malim ex^p ossis cuneum imitantis constructione, & deinde humoris defluentis lentore & substantia metiri diligenterq; expendere, quàm re oscitanter indagata, solis autorum suffragijs deditum impietatis me arguere, tanquam Galeni omniumq; quos legi dissectionis professorum decreta hîc perturbem, quibus illi nos in tantam conditoris admirationem allicere se arbitrantur: non perpendentes, si ad eum modum quem illi ementiuntur, Deus os illud creasset, quàm parum fuisset prouidus, qui hîc continuum os ne pituita quicquam ipsi incommodaret procreandum duxerit, tantum abest ut foraminibus peruium (ut ipsi constringunt) fabrefecerit, præcipue quum hæc caluariæ pars tantis foraminibus neruorum, uenarum & arteriarū gratia sit insculpta, & ipsum cuneiforme os hac sede qua glandula ei incumbit, intus^p duas tam insignes & notatu dignas cauernulas adipiscitur, duobus foraminibus in narium amplitudinē, uti in primo docuimus libro, pertinentes: & si quādo illæ cauernulæ, quemadmodū inter secandū aliquādo uidimus, nō occurrēt, tunc os ipsum inibi ut calcis aut tali os solidū uisitur, & nihilæque promptè cōmonstrat, ac per ipsius foraminulas seu cauernula pituitam neutiq; defluere. Decum bit itaque pituita & in palatum per ea quæ palatum spectant foramina, & non minima profectò portione per foramen secundi paris neruorum ad oculorū sedis radicem, & hinc per^p amplum foramen cum alijs quamplurimis foraminibus, cæteris ignotum dissectionis professoribus, in narium amplitudinē fertur. Neque etiam ambigo, aliquem & hîc admiraturum, quamobrem nullo adhuc meatu pituitam ad olfactus^p organorum^p sinus deducētes enarrauerim: quod sanè non ob aliud accidit, quàm quod nullam prorsus pituitam per hos sinus expurgari autumem, mirerq; plurimū, qua fronte alij per tenues illos ac neruis nō ab similes cerebri processus, quos olfactus organo tribuimus, ab anterioribus cerebri^p uentriculis pituitā ad nares deduci, non erubuerint scribere: quū nullus omnino in ipsis meatus sit, neq; etiā in hominibus ea consistant crassitie, ut uel meatum quo pituita deduceretur, habere possent. Adde nullū prorsus pituitæ ductū ad olfactus organorū sinus imaginari posse, nisi fortassis^p anteriore callosi corporis regionem, quæ pituitam sibi influentem in illam sinuum olfactus organorū amplitudinē dimittere queat: uti fortassis accidit, si quando cerebrū nimia pituita uexatur. unde etiam non naturalis per nares pituitæ fluxus perficitur, & pruritus, calor, dolor & odorandi uirtutis noxa, eiusq; generis symptomata oboriuntur quàmplurima, quemadmodū indies in distillationi-

Canales à glande deducit.

Eorum partem quas pituita expurganda subteritur baculus diximus, usus, & constructio ratio.

118 fig. C.
D & E. F.
013 fig. ca.
12 li. G.
14 fig. G.
13 fig. ca.
12 lib. X.
ultime fig.
lib. 31.

13 fig. L. L.
13 fig. M. M.

18 fig. cap. 6
lib. 1.

18 fig. cap. 6
lib. 1. C. D.

20 geritur
sub chara.
Aere in
12 cap. li. 1.
13 fig. L. L.
13 fig. D.
G & D. G.

16 fig. D. D.
E. E.

18 fig. L.
13 fig.

bus quæ ad narium summa pertinent, ac grauedines nuncupamus, accidere experimur, adeo sanè ut si adamussim singula perpenderimus, necessario per olfactus organorum sinus foramina uel aut cribri aut spongiæ modò forata, quum lege Naturæ homo dispensatur, nihil pituitæ defluere fatendum erit: & si fortè casu defluit, non minus præter naturam fluxum esse donabimus, quàm quum foramina quæ ad glandis exsculpuntur latera, totam pituitam non adamussim deducunt, hæcquæ deorsum uersus^a foramen dorsali medullæ transmittendæ paratum decumbit: ac cum dorsali prolapsens, in dorsum, & dein secundum neruorū ductum modò in brachia, modò in crura, modo in lumborū musculos, modò aliò quouis promanat, ut nunc taceam, quàm grauiter Natura ueniret inculanda, quæ tam patètes amplosquæ pituitæ in caluariæ amplitudine, dum adhuc tenuis aquea^b est, ductus fecisset, adeo autè retortos angustosquæ & inflexos in^c octauo capitis osse produxisset.

d. Q. de-
ducitur H
9 figura.

c 8 fi. ca. 6.
li. 1. A, B, A.

DE CEREBRI PLEXIBVS, QVORVM

alter reticulari, alter secundarum efformato plexui similis esse creditur.

Caput XII.

HVC facit maxime decimi quarti Capitis libri tertij figura, & huius libri figura quarta & quinta ad O, O, sexta ad M, N, & dein tota fere decima sexta & decima septima.



QVANTVM Galeno dissectionis professorum facile principi à medicis & Anatomicis illum secutis nōnunquam præter rationem attributum sit, uel beatus ille & mirabilis plexus reticularis attestatur, quem is nullibi non in suis libris inculcat, quoquæ nihil frequentius medici in ore habent, eumquæ etiā si nunquā (uti fere nulla in humano corpore) uiderint, ex Galeni sententia enarrant. Verū ut alios taceam, ipse meam stupiditatem & nimiam in Galenialiorumquæ Anatomicorū scriptis fidem haud satis demirari possum, qui adeo in Galenum affectu laborauerim, ut nunquam in publicis sectionibus humanum caput, absque agnino aut bouino offendere aggressus fuerim, ut quod in homine neuiquam reperirem, id ouillo capite refarcirem, spectatoribusquæ imponerē, ne plexum illum nomine omnibus notissimum, neuiquam inuenisse dicerer. Nihil enim minus à soporalibus arterijs, quàm eiulmodi reticularis plexus, quem Galenus recenset, perficitur. Multoquæ minus arteriæ foramen quod ipse tradit ingrediuntur, aut totæ etiam in plexum illum absumentur. Primum enim^a tota soporalis arteria dextra (est enim eadem utriusque ratio) caluariam petens per unum foramen indiuisa, uti Galenus commemorat, non ingreditur, uerū ubi ad caluariæ usque basim conscendit, insignem sui propaginem ad^b foramen nerui^c sexti neruorum cerebri transmittit, quæ unā cum grandi^d uena sibi coniuge in dextrum, primum uel duræ cerebri membranæ sinum exhauritur. Secundò soporalis arteria nequaquam commune^e foramen cum^f tertio neruorum pari obtinet: uerū longè maiori industria, quàm Galenus arbitrabatur, rerum Opifex usus est, maiori nanque soporalis arteriæ ramo^g obliquum & in osse diu procedens foramen machinatus est, in cuius ductu id fieri uoluit, ob quod Galenus plexum efformatum confinxit, ut enim uitalis spiritus in multis gyris anfractibusquæ arteriæ excoqueretur, apta^h animali spiritui efficiendo materia fieret, Galenus arteriam ilico atquæ in capitis amplitudinē ingressa esset, in innumeros ramos diffundi dicebat, qui inuicē ita imponerētur commiscerētur ue, ut plexum efformare uiderentur illi similem, qualem in collecto piscatorio reti fieri cernimus: aut illi plexui, qui ex pluribus inuicem incumbentibus retibus consurgeret. Atque hunc plexum inter os & duram cerebri membranam fieri asserit, interim tamen duræ membranæ portiuncula quæ os succingeret, plexui substrata. Deinde ut plexus ille ex uno uase, aut si dextrū sinistro coniunctū fingit, ex duobus complicari incipit, ita quoquæ plexus huius surculos sensim colligi, ac tandem in duo rursus uasa desinere attestatur, molle illis uasis respondentia, quæ plexum efformare dicebātur. Quam uerò hæc ab omni prorsus ueritate sint aliena, quantumquæ Naturæ oscitantiam arguant, is demum percipiet, qui ueram eius arteriæ soporalis ramī seriem didicerit, quem per oblongum illud ossis foramen in caluariam penetrare diximus: & ut plexus itaque taceam, expenderit pariter, quàm impossibile sit uasa æquæ grandia cerebrum petere, atque in caluariam primum pertingunt, quum tam insignesⁱ ramī duræ membranæ latera, & per^k foramina secundi paris neruorum ad oculos, ac ad narium amplitudinem ab illis uasis priusquam tenuem accedant cerebri membranam dispergantur. Cæterū quæ horum uasorum uera sit series, in tertio libro dum cerebri uasa non minus quàm reliquas corporis uenas & arterias persequerer, adeo uerè & ad amussim describere conatus sum, ut hic locus neuiquam

In lib. de Venarum & arteriarum sectione.

Hic spectabis 16 et 17 & ipsi proxima figura.

a. fi. cap. 12. lib. 3. c. 1. fi. ca. 14. lib. 3. B. quod dicitur in F. G.

b. 2. 3. fi. ca. 12. lib. 1. c.

c. 1. 2. fi. ca. 2. lib. 4. c.

d. fi. cap. 14. lib. 3. c.

e. 2. 3. fi. ca. 12. lib. 1. c.

f. 1. 2. fi. cap. 2. lib. 4. M.

g. 2. 3. fi. ca. 12. lib. 1. X.

h. ut spectatur 17 fig.

i. fi. cap. 14. lib. 3. r. x. f. h. 1. 2. fi. ca. 12. lib. 1. G.

eius seriei enarrationem expetat: uerum si memoria quæ illic complexus sum exciderint, cōlectorem remitto, hortor quæ ut illo capite diligenter perlecto, id uniuersum hîc denuò poni sibi persua-deat. Porro ut huius soporalis arteriæ rami sobolem ibidem enarraui, sic etiam plexus, quem extimo fœtus in uolucro comparamus, naturam quoque inibi recensui: ac proinde in præsentia duntaxat superest, ut studiosos qui duobus proximè præcedentibus annis mihi secanti non astiteret, sedulo ad uolucrum horter, quo iam admoniti, corporis humani fabricam Galeni meaq; descriptione perlecta diligenter expendant, in posterumq; Anatomicorum libris mi-nus fidei adhibeant. Hîc autem denuò cerebri plexuum obiter memini, ne quid in cerebri con-structione hoc libro præterisse uideret. Atq; quo minus id fiat, singula sensuum organa seria-tim iam aggrediar.

DE OLFECTVS ORGANO.

Caput XIII.




LIBRI quarti tertium Caput conscribens, atque necessariò propter ner-uorum seriem olfactus organi constructionem prosequens, arbitrabar me hoc loco certius aliquid de olfactus instrumento præcepturum, quam illo Capite nudam constructionem enarrans, faciendum duxeram. Verum quum aliud nihil certius mihi studiose admodum odoratus organi naturam inquirenti hætenus occurreret, præsens Caput cum illo commune esse uelim. Præter duos enim illos neruis non absimiles cerebri processus, qui in octauæ caluariæ ossis sinus pertingunt, & frontis ossis sinus, & substantiam illis contentam, & foramina tum duræ cerebri membranæ, tum ossium hîc recensere possem. Nollem namque hîc de odoribus, & huius sensus medio, & dein temperie aliquid pertractare, ne in immensum hîc meus conatus, qui præter opinionem iam excreuit, impensius crescat.

DE OCULO VISVS INSTRUMENTO.

Caput XIII.

PRIMA DECIMIQUARTI CAPITIS

FIGURA.



HÆC figura earum quæ præsentî Capiti præpo-nuntur prima, alteram oculi partem exprimit, una sectio-ne ab anteriori sede per posteriorem, atq; ita per neruum uisorium diuisi: perinde scilicet, ac si quis diuisæ secundum longitudinem cepæ alteram partem ea superficie delinea-ret, qua alteri parti connata continuq; fuerat. Atq; hoc quoq; modo cælos, & quatuor elementa in plano depinge-re solemus.

A Humor crystallinus.

B Tunica anteriori humoris crystallini sedi obducta, & tenuissimæ ceparum pellicula instar pellucida.

C Humor uitreus.

D Nervi uisorii substantia.

E Tunica quam reti assimilamus, quamq; resoluta uisorii nerui efficit substantia.

F Tenuis cerebri membranæ portio, neruo uisorio obducta.

G Uvea tunica, in quam tenuis uisorium neruum inducens membrana degenerat.

H Hac sede uvea tunica in posteriore cõprimitur, neq; cornæ exterioris illi obductæ cõtingit tunicâ.

I Foramen, quo uvea foratur, ipsa uel pupilla.

K Tunica ab uvea initium ducens, & cilijs seu palpebrarum pilis imagine correspondens, ac inter-stitium pariter uitrei humoris ab aqueo.

Hh 4 L Duræ

- L Durae cerebri membranae portio neruum visorium obuolvens.
M Dura oculi tunica, quam dura cerebri membrana constituit.
N Durae oculi tunicae pars, quae cornu instar pellucida visitur.
O, O Humor aqueus, atque inferius O sedem indicat, in qua suffusiones plerunque proueniunt.
P, P Musculi oculum mouentes.

Q Adhaerens, albaue oculi tunica. Caterum subsequētes modō figurā seriatim oculi partes exprimunt; primū quidem humores, ac dein tunicas. Atq; has figuras omnes semper ad primam quam modō expressimus, non ineptē contuleris: quandoquidem illae compositionis ordine inuicem subsequuntur, ac ad primae huius figurā proportionem sunt expressae.

SECUNDA. III.

IIII.

V.

VI.



DECEM ET OCTO FIGVRARVM HIC SERIATIM
primam subsequentium, & earundem characterum Index.

SECUNDA figura solum crystallinum humorem anteriori sede ita exprimit, quemadmodum is omnibus illum ambientibus partibus liberatus, è directo intuenti occurreret. Tertia figura nudum prorsus crystallinum humorem commōstrat, ea sede se ostendentem, quae R. ex latere, ut ita dicam, ab aliquo spectaretur. Verūm R asperitatem, sedemq; notat, cui oculi tunica

tunica palpebrarum pilos referens, ac undecima & duodecima figuris exprimenda, humori crystallino connascitur.

Quarta figura humorem vitreum ita efficitur demonstrat, quemadmodum is si suam formam, quam in oculo obtinet, referuaret, in anteriori ipsius sede conspicuus esset, quum crystallinus humor ex illo euulsus esset. Senim cavitatē ipsius indicat, in quam media crystallini humoris pars reponcbatur.

Quinta figura vitreum humorem eadem facie qua quarta exprimit, verum adhuc ipsi crystallini humoris T notatus innat.

Sexta vitreum humorem ex latere exprimit, una cum crystallino, qui ipsi adhuc innatans V notatur.

Septima figura aqueum humorem ex latere ita exprimit, quemadmodum in oculo consistit, & adhuc anteriore crystallini humoris sedem integrit. X namq; crystallinū humorem in presenti

Y figura notat, ac Y eam humoris aquei sedem indicat, qua uuea tunica pars in ipso (dum integer est oculus) continetur, qua a cornea abscedit, distatq;.

Octava figura vitreum humorem a notatum, & aqueum b insignitum simul cōmonstrat, ita inuicem distos, quemadmodum ea dirimuntur tunica, quam palpebrarum pilis non perperam in effigie assimilamus. Atq; huius tunicula sedes inter hos humores consistens c indicatur.

Nona figura tunica anteriori crystallini humoris sedi obnatā, & insigniter pellucidā, atq; hic ab ipso humore liberatam, a latere exprimit.

Decima figura crystallinum humorem a latere ostendit, adhuc ea tunica interclum, quem nona figura exprestit, atq; hic d tuniculam, e uero crystallini humoris partem indicant posteriorem, & illa tunica nō obductam, sed in vitreo humore, quum integer est oculus, natitatem.

Vndecima figura anteriorem seu posteriorem partem indicat tunicae quam uuea producit, qua g palpebrarum pilis assimilatur. Ceterū haec circulo g & g notato ab uuea pronascitur, circulo f & f finisignito crystallino humori inseritur, adnascitur ue.

Duodecima figura tunica, quam undecima ostendit adhuc vitreo humori obductam, & crystallino adnatam continet. h enim & h tunicam notant, i uero humorem crystallinum.

Decima tertia figura, tunicam ostendit, quam reti dissectionis peritū comparat, atque haec a latere exprimitur una cum nerui uisoria substantia k insignita, & dura tenuiq; cerebri membranis libera.

Decima quarta figura uuea tunica internam ostendit superficiem. hic enim ipsam eversam, ut inter secundū sit, delineauimus. l itaq; portiunculā notat tunicae, in quam uisoria nerui substantia dissoluitur, in sedem, in qua anterior uuea regio introrsum seu in posteriorem comprimitur.

Decima quinta figura externam uuea tunicae superficiem ex latere delineatam continet, una cum nerui uisoria substantia, tenui membrana cerebri obducta. n enim nerui uisoria substantiam

o notat, hic a tenui qua inuoluitur membrana liberam. o tenuis notatur membrana, nerui uisoria substantiam integens, & hic a dura membrana, qua ipsam quoque ante sectionem obuoluit, denu

p. p. data. p. p. uenarum arteriarumq; a dura oculi tunica in uueam pertinentium sunt portiuncule, q. q. iam ex serie sectionis effractae. q. q. sedes, qua uuea tunica anteriori in parte comprimitur, &

r. a cornea abscedit, r foramen, uuea pupillam constituens.

Decima sexta figura duram oculi tunicam ex latere commonstrat, transuersa sectione in hoc diuisa, ut series in conspectum ueniret, uasorum ab ipsa in uueam pertinentium. Significet igitur

f. neruum uisorium, una cum duabus illum inuoluentibus membranis abtruncatum, & uenis arterijsq; concomitatum. t uero & t uenas, arteriasq; per duram oculi tunicam excurrentes. u au

u. u. tem & u uueam tunicam hic propter durā scissionem, conspicuam, & ramulos durā tunica uasorum excipientē. Ceterum x sedem indicat, ubi dura oculi tunica instat cornu laeuigatur, pel

y. lucidāq; cernitur, sedem autem y notat, pupillae respondet foramen.

Decima septima figura integram nudamq; durā oculi tunicae externam superficiem ex latere spectandam exhibet, una cum magna uisoria nerui portione, in qua a notat ipsius substantiam,

b. y. d. b uero tenuem qua obducitur membranam, y autem duram cerebri membranam, a uenas arteriasq; neruum uisorium concomitantes. Porro x, & dein y, idem hic atque in decima sexta indicant.

Decima octava figura oculum à palpebris liberatum, atque ex sua in calvaria sede erutum, una cum ipsius musculis nondum disjunctis à latere exprimit. atque nervum indicat uisorium. *2. 2.* musculos oculum mouentes, *u. 2.* adhaerentē oculi tunicam, & maiorem oculi circumulum seu iridem, ubi adhærēs membrana desinit, corneaeq; tunicæ pertinacissimè adnascitur. *u.* autem sedem notabit, è regione pupillæ seu minoris circuli consistentem.

Decima nona figura anteriorē oculi integri, & à palpebris tantum liberi sedem exprimit. atq; hic *u.* carunculam insinuat, in maiori oculi sedis angulo repositam. *u.* uerò *2. 2.* & dein *u.* idem *u. 2.* hic atque in præcedente figura indicant. Cæterum si alicui oculi enarrationem ab extimis ipsius partibus persequi uisum sit, is inuerso oculi figurarum ordine decimā nonam secundæ loco habebit, & decimā octauam tertiæ, atq; ita deinceps.

Oculorum
suis.



Oculi constructio
quo qui enarratur.

ATIONEM formationis capitis primo libro perquirentes, oculorum situm, qui neminem latet, descripsimus. in secundo autem libro oculorum numerum & mouentes ipsos musculos, uti & palpebrarum quoque naturam necessariò edocuimus. In præsentia uerò oculi sphaeræ modò exactè rotundi constructionem enarraturis, eam à centro aut ab ultima ipsius circumferentia auspicari integrū erit: perinde ac si oui constructionē quis, ab ipsius luteo ad albū, & dein ad tenuem membranulā albo obductā, &

postea ad putamen crustam uel aggredieretur: aut à crusta ad tenuem eam membranulam, ac dein ad album, & hinc ad luteum enarratio fieret. Pari prorsus modo quo mundi partes, aut à terra ad aquam, aërem, ignem, lunæ cælum, ac sic deinceps ad extremum usq; cælū, aut ab hoc cælo ad centrū usque mundi, ipsam uidelicet terram, recensceremus. Mundo namq; & ouo oculi fabrica quod ad constructionē spectat, cōferri potest. Quam quo exactius tradatur, eademq; postmodū memoriæ firmitus hæreat, à centro primū ad extimā superficiē, & postmodū ab hac ad illud pertractabimus. Est itaq; oculi centrū humor, quem Græci *λεπτομασδι* uocant, uti & nos quoque, qui & glaciale illū nuncupamus, à similitudine nimirū quam cum lucidissima glacie & exactissimo crytallo obtinet, nō quidem in consistētia aut duriciē, uerū in colore, seu luce potius & pelluciditate. Est enim is humor optimi crytalli modò pellucidissimus, & omnia quibus iam exemptus uitri alicuius modo imponitur impense quorundā specillorum ritu adaugens. Consistentia autē ea constituitur, ut ab oculo liberatus nō defluat, sed ipsius rotundam



Humor cry-
stallinus.

anteriori & posteriori parte leuiter non secus compressum, quā si ex lignei globi medio secundum lineas æquidistantes orbem crassiusculum serra exemisses, & dein duas globi partes denuò conglutinaßes, adeo ut præfens humor in anteriora & posteriora minus protuberet, quā secundum orbem in latera, & superius & inferius quodammodo ad lentis similitudinem. unde etiam hunc humorem *quasi aqua* Græcis nuncupatū fuisse arbitror, etiamsi nescio quam oculi tunicam alij ita uocare uideatur. Superficie constat læui & insigniter lubrica. Vniuersæ ipsius anteriori sedi *b* tunica obnascitur instar tenuissimæ ceparum pelliculæ, cuiusmodi inter crassiores ceparum orbes reperimus, tenuis & exactissimè pellucida. at hæc tunica eius generis ceparum pelliculæ durior est, ac (ut dicebam) toti anteriori humoris crytallini sedi obducitur, nulla parte posteriori ipsius sedem cōtingens, sed inibi finiēns, ubi crytallinus humor am-
plissimus cernitur: & ipsius capacior consisteret circulus, si illum multis æquedistantibus circulis, seu lineis orbiculatim obuolutum fingeremus. Huic tunicæ nullum priuatim nomen inditum esse uidetur, nisi fortè à cōtinuarum aranæ telarum imagine hanc *ἀραχνώδης* Græci uocauerint. respondet enim tenuitate, quamuis neuiquam robore & duritia, illis aranearū telis. Ego illam inter disseccandum, uti iam dixi, ceparum tenuissimis, ac pariter pellucidissimis membranulis cōfero: cornu etiam illam collaturus, si modò cornu in laminas diuisum tam tenue ac pellucidum & læue, atque hæc est tunica, reddi posset. Tunica enim huius substantia à cornu substantia nihil differt. Sit igitur præfens tunica secundum in oculi constructione nobis enarratum corpus, quod quidem anteriori tantum centrū, hoc est humoris crytallini parti, obducitur, ac uelut semiglobus tantum in oculi fabrica censendum uenit. Porro posterior humoris crytallini sedes, dicta nuper tunica nō obrecta, in alio continetur humore, qui instar medij globi in posteriore oculi sede copiosius reponitur, uulgarī quidem albo uitro iam refrigerato colore seu luciditate correspondens. non enim adeo lucidus est, atque crytallinus humor, aut exactissimū crytallum. Consistentia autem, humore crytallino longè mollior uisitur: & ab oculo exemptus, suum terminum formam uel neuiquam seruat, quamuis interim aque modò non defluat, sed ita consistat, quemadmodum uitrum in fornacibus fusum, & ferreis canalibus

d. fig. A. &
totalis 3 fig.

b. fig. B. to-
tal 9 fig. et 10
fig. d.

c. 10 fig. e.
d. 3 fig. B.

e. fig. C. &
dein 4, 5, 6
fig. et 8 fig. d.

nalibus, quibus id ab artificibus à fornace eximitur, obuolui cernimus. Atq; huiusmodi uitro quidem ita ignito, consistentia hic humor congruit: at non colore seu luciditate, quum humor, uti prius dixi, refrigerato uitro luciditate respōdeat, fufum autem uitrum candenti ferro colore quam similitimum uideamus. Quando itaq; præfens humor cōfistentia fufo uitro, luciditate autem refrigerato & formato iam uitro respōdet, *ut ad huc* Græcis, nobis uerò uitreus merito nuncupatur. Atque hic humor multis numeris copiam cryſtallini humoris superās, quum adhuc in oculo reponitur semiglobo similis est, cuius plana superficies oculi anteriora spectaret, rotunda autē seu conuexa in posteriora protenderet: & in cuius anterioris sedis, seu planæ superficiei medio^o sinus imprimeretur tantus, quanta posterior humoris cryſtallini pars est. Is namque humori uitreo ita immititur, ac si globum in aqua natantem cerneret, cuius media pars exacte in aquam mergitur, altera supra aquam conspicua, atque ut inter eiusmodi globum & aquam nihil mediat, ita quoq; inter cryſtallinum & uitreum nihil prorsus intercedit: neque illi humores inuicē secus cōmittuntur, quàm globus aliquis in duriuscula pīle complecteretur.

Porro reliquæ regionī sedis anterioris uitrei humoris cryſtallino non occupatæ^o tuniculam quandam obducī, suo loco dicam, quæ cilijs palpebrarum uel pilis assimilabitur, quæq; orbiculi latini lineæ modò cryſtallino humori, ubi is amplissimus est, adnasci docebitur. Nunc autem inuolucrum mihi uenit enarrandum, quo posterior uitrei humoris sedes proximē cōtinetur, quamq; nerui uisorijs substantia in quarto libro constituere dicta est. Nerus etenim uisorius tenui, duraq; cerebri membranis, & aliquot uenis arterijsq; cōcomitatus, ad posteriorem oculi sedem fertur, ac illi non nihil uersus externum oculi latus implantatur, ipsius substantia in inuolucrum iam enarrandum dissoluta, tenuis autem membrana nerui substantiam obuoluens, in aliam degenerat oculi tunicam, quæ uuea uocatur, & dura quoq; membrana in aliam quæ dura dicitur, & uenæ quoque & arteriæ (uti seriatim enarrabo) oculi constructionē subintrāt. Quum primum itaque nerui uisorijs substantia in oculum mergitur, mollior reddita dilaturur, in latum quoddam inuolucrum posteriori uitrei humoris sedi obductum, & nō ultra mediam oculi sedem in anteriora pertinet, & extremē gradibus, sed interim cōspicuis uenulis, ac item arterijs intertexta. Hæ uenulæ à tunicæ radice antrorsum ductæ ipsi exporriguntur, quum primum neruus ille dilatur. Cæterum Galenus in decimo de Partiu^o usu innuit, hoc inuolucrum à plerisq; tunicæ nomine nō dignari: forsitan quòd cæterarum tunicarum modo membrana non sit, sed mollis, & ueluti mucor aliquis ex naribus procidens, quum enim hoc inuolucrum secantibus in unum colligitur, atque à sua radice propendet, mucorem, aut cerebri substantiam aqua quapiā dilutā refert, nō enim ita solidum crassumq; ac cerebri substantia uisitur. Vt cūq; uerò sit, siue tunica nuncupandū ueniat, siue minus, constat Galenum quoque in libris de Hipocratis & Platonis decretis, & item in octauo de Partiu^o usu hoc inuolucrum, tunicam appellasse. Neque ego scio quod nomen illi aptius quàm inuolucrum, aut tunicæ indipossit: quum, uti diximus, toti posteriori sedi humoris uitrei proximē obducatur, illumq; integat, perinde atque tenuis oui pellicula oui album tunc cōtinere diceremus, quum dimidiā oui partem ab alia effractam & adhuc oppletam manibus seruaremus. Est enim hoc inuolucrum forma dimidiato tantum quo comparandum, aut minori piscatorum reti, quod uni accommodatur baculo, & ex ampla basi dimidiati globi modo in obtrusum mucronem fertur. Ab huiusmodi enim retis imagine arbitror præfens inuolucrum Græcis *ὀφθαλμοειδὲς* nuncupatum fuisse, nam retis formam, non autem plexum refert, quum undiq; sibi sit continuum. Nisi forte uenulas & arterias ipsi intertextas, quis reti assimilandas cōtenderet. Hactenus itaq; quatuor oculi partes recensui, duos nimirum humores, & totidem tunicas: ac proinde iam meritò^o eam aggrediar tunicam, quæ à tenui membrana nerui uisorijs substantiam concomitantem producit. Mox enim atq; hæc membrana simul cum neruo oculum subit, in tunicā degenerat ad omnes oculi sedes, globi modo, ut ita dicam, pertinentem. non enim uti nuper cōmemorata tunica, quam nerui producebat substantia, posteriorem oculi sedem solum occupat, uerum & anteriori quoq; obducitur, & in tota posteriori oculi sede proximē tunicam inuestit, à nerui substantia pronatam, & in horum contactu prorsus nihil mediat, neq; ambo etiam inuicem aliquo nexu præterquam contactu committuntur. quā autem præfens tunica à tenui membrana conformata, anteriori oculi sedi obducitur, interna sua superficie undiq; humorem cōtingit & cōplectitur, quem aqueum & albugineum uocari paulo post audies. Externa uerò huius tunicæ superficies passim^o ea tunica proximē obducuntur, quam à dura membrana uisorio obducta pronasci dicam: neq; quicq; inter eas duas interuenit, sed ita inuicem cōmittuntur, quemadmodū dura membrana tenuem succingit in nerui uersus oculum progressu. Verum id priuatim huic tunicæ quæ à tenui pronascitur membrana accidit, quod exacti globi modo prorsus nō sit rotunda, nam anteriori regione

Oculi:

crum

uile

t

zeta

Tunica à tenui cerebri, & brana par. t. & uuea nuncupata.

f. 4. fi.

g. fi. 15. &

h. fi. 12. fi.

i. 12. fig. h. h.

adnascitur.

turt.

k. fi. E. &

l. 12. fig.

dem. 12. fi.

cap. 2. li. 4. l.

eduam

ex G.

l. 17. fi. cū

b. 7. d. aut

1. fig. E. cum

F. & L.

m. 1. fi. G. et

tot. 1. 14. 15

fig.

n. fi. M. &

tota ferē

16 & 17. fi.

o. fig. G. ab

F. eductum.

et tota fe-

re 14. 15. fi.

p. fi. O. O.

et 7. fi. &

8. fig. b.

q. fi. M. &

nau. ab L.

aut 16. et 17.

fig. a.

r. fi. H. 14.

fig. M. 15. fi.

g. u. a. q. q.

gione non nihil introrsum comprimitur, aliqua sui parte planam superficiem pro conuexa ac orbiculari commonstrans. Quum enim hæc tunica ad eam usq; anterioris oculi sedis regionem pertingit, secundum quam maior oculi educitur circulus, quem iridē uocamus, aut quo albū oculi (ut ita loquar) à nigro distinguitur, & ea tunica à dura cerebri membrana pronata pars consistit, quam cornu in luciditate & substantia quoq; cōparabimus, ipsa ab hac abscedit quam dura procreat membrana, neq; amplius illam contingens inibi in posteriora comprimitur, quā illi parti quam cornu assimilamus, ita subduci debuisset, quemadmodum secundum reliquam oculi regionē illi subducitur tunica, quam dura membrana efformat. Neque hac duntaxat in pressione præfens tunica à tenui membrana cerebri generata donatur, uerū etiam in huius compressionis medio foramine quodam peruia est, quod * minimū in oculo apparentē effor-

Pupilla mat circulum, & pupilla nobis appellatur. Adeo ut hæc tunica uae folliculo, à quo pedunculum quo affirmatur extraxeris, quā simillima sit, præsertim si uiam illic parum concidisse, & ut sit uacuari intelligas, ubi pedunculum extraxeris. Totus enim uae folliculus tunica huic respondebit: ea autem coincidentia illi respondebit compressioni, quam in anteriori parte hæc tunica sibi uendicat. Foramen autē quo pedunculus firmabatur, ipsi pupillæ cōparatur. Atq; ab hac similitudine Græci præfentē tunica *παροδὴν* & *πάρεν*, nos autē uae appellamus. Quoniam uerō à tenui cerebri membrana *παρενδὴς* dicta, hæc tunica constituitur, Græci illam quoque *παρενδὴς* nuncuparūt. Quamquam nō ob id solum quod à tenui membrana cerebri produci, eam ita uocarunt, sed forsitan quod ipsa uenas arteriasq; oculi sustinet, perinde atq; tenuis membrana cerebri uasa suffulcit. Quandoquidem passim quā uae tunica, illa obducitur, quam duram cerebri membranā progenerare mox dicam, uenarū arteriarumq; furculi ab hac in uaeam pertingunt, & uaeam ita exasperant, ut hac quoque ex parte internæ superficiei folliculi uae accedat, quæ fibras illas continet, quibus uae caro & acini sustinentur. Quum itaque ab ea tunica quam dura cerebri membrana procreat, complures uasorum furculi sparsim in uaeam producantur, sit eorum furculorum internentu uaeam illi tunica connasci. Quā uerō uae tunica ab illa secundum iridis circulum abscedit, introrsumq; premittitur, uae pertinaciter secundum totum circuli ductum ipsi adnascitur, & colorem euariat. Vae namq; tota superficie qua dura tunica succingitur, perpetuō nigra est, & modicē humecta: in anteriori autem suæ compressionis fede uariē tingitur, eumq; semper exprimit colorem, qui in oculi iride seu maiori circulo, aut oculi nigro occurrit, cuius gratia oculos nigros aut cæcios, aut glaucos dicimus. Neutiquam enim is color humorū oculi beneficio cōfurgit, quod & si magnū sit paradoxū, nō secus tamen id probatum uelim, quā quod is oculi color in uae perpetuō appareat, siue integro oculo, siue effluxo humore, siue ipsa uae tunica à dura liberata, diuisa q; . Quod non solum in hominis oculo est cernere, sed & in cuiusuis alterius animalis oculo. Cæterum interna uae superficies uarijs interstinguit coloribus. in posteriori enim oculi fede, qua hæc tunica primū pronascitur, subalba est, mox uiridis, & dein cærulea iridis in modum efficitur. atq; hos colores in posteriori oculi fede adhuc interna hæc superficies possidet, in anteriori autē oculi fede uniuerfa impense nigricat. & non adeo læuis hic atque in posteriori fede uisitur: quod illi potissimum accidit propter processum, quos à se hac in parte educit tunica constituturos, quæ anteriori uitrei humoris sedi obducitur, & ueluti interstitiū est uitrei & eius quem aqueum nominabimus. Præfens tunica planis duntaxat donatur superficiebus, non autem concavis aut conuexis. Quandoquidem hanc tunica constitueres, si ex tenuissima araneæ tela orbem excinderes tantum, quāta est anterior sedes uitrei humoris, ac dein in hoc orbe alium orbiculū excinderes, foramen facturū tam amplum, atq; crystallinus humor amplus est, ubi uisitur amplissimus. Huiusmodi namq; orbi præsentem tunicam cōferre posses, si illum circularit̃ ab uae tunica pronasci fingeres, illicq; suo foramine crystallino connasci, ubi is amplissimus cernitur. Verū hæc tunica tenuitate araneæ telas ferē superat, & processibus ab uae pronatis talibus constat, ut nigra cilia, seu palpebrarum pilos imagine insigniter exprimat. Num autem tunica, aut aliter nuncupanda sit, nō admodum moror: modo quānam sede reponatur, & quibus cōmittatur, qua sit imagine & substantia, explicē, mihiq; nullum occurrit nomen quod ipsi aptius sit quā tunica, aut si uoles, interstitij inter uitreū humorē, & eum quem albugineū aqueū ue

Ex humorū aut spirituum copii, oculorū colorum non euariari.

Tunica cilijs & palpebrarū pilis comparata.

Dura oculi tunica à dura cerebri membranaeducta.

s 16, 17 fig. x. 18, 19 figurat. i. 11 fig. N.

u. 1 fig. 1. 14. fig. m. 15 figurat. x. 16, 17 fig. 18, 19 figurat.

15 fig. p. p. 16 fig. u. u.

21 fig. K. 22 fig. gura.

23 fig. K inter C et O. 24 fig. c inter C et b.

b. 1 fig. m. c. ductum ab L. et tota ferē 16, 17. c. 16 fig. f.

d. 18, 19 fig. f. rem

c. fi. N. 16,
27 fig. x. fi.
mul. c. 7.

rem oculi circuli seu iridem usq; pertingit, crassa & dura est (unde & *σκληρότης* nuncupatur) & dein duræ cerebri membranæ modo opaca, & minime pellucida. Ea uero sede qua o culinigrū seu iris cōstitit, hæc tunica in cornu imaginem degenerat, quod in laminas diuisum & exacte læ uigatū, uitri alicuius loco lucernæ accommodatur, pellucidumq; est. Neq; hæc præsentis tunicæ pars, cornu in luciditate qua id etiā superat solū respōdet, uerū & substantia quoq; est enim hæc tunicæ pars cornu modo dura, & ut cornu in laminas diuidi radiq; potest, ita etiā hæc tunicæ pars secantibus nō secus radi diiungiq; ualet, quā si ex laminis aliquot seu squamis inuicem compactis cōstitueretur. Atq; hinc est ea oculariorū medicorū cura, quæ senibus hanc tunicæ partem deradi præcipit, quā à tanta cum cornu similitudine *λεπιδωδης* Græci, nos uerò corneam nominamus. Quāq; uidentur Græcorum pleriq; non hanc tantum præsentis seu duræ tunicæ partem ita appellasse, uerum uniuersam (quum ipsa insigniter dura sit) tunicā. Quod uerò pellucidā duræ tunicæ partem à reliqua ipsius sede nō pellucida, ac si illa diuersa esset tunica, in præsentis non distinguā, neminem iam mirari arbitror, quum haud aliter quam modò diximus illæ partes inuicem uariant. Interna huius tunicæ superficies, tota ea sede qua cornu modo non pellucet, uueam tunicā absq; alicuius substantiæ interuentu succingit, ip siq; uenarum articularumq; gratia, uti prius diximus, adnascitur: quemadmodum etiā illi pertinacissimè ac orbiculatim adnascitur, secundum maiore oculi circuli seu iridē. Porro ea sede qua hæc tunica cornu instar pellucida cernitur, uueā non cōtingit, & tantisper atq; oculus sanus est, ab uuea notabiliter interuallo inibi distat, quā uuea anteriori in sede comprimitur. Hoc interuallum & uniuersum spaciū quod inter anteriorem crystallini humoris sedem & pupillam habetur, humore illo adimpletur, qui adhuc enarrāndus superest, ac uerus humor censetur, nam aquæ modo tenuis quodammodo secantibus & suffusionibus curantibus occurrit, & insigniter aquæ modo pellucidus cernit: unde etiā *υδαρωδης* Græcis, nobis uerò aqueus nominat. quamquam pleriq; hunc oculi humori comparātes, illum albugineum nuncupent: etiam si arbitret Græcos hunc humorem in albo non cōsistisse, quū neutiquā æquè crassus sit, & multū accedit illi humori, quem ex recentibus integrisq; ouis igni appositis resudare cernimus. Atq; hic humor uueæ tunicæ partē corneæ in sano oculo nō contiguam sustinet, & (uti dixi) in priori ac in posteriori eius partibus continetur: atq; quum in oculo cōsistit, terminoq; alieno, ut sic dicā, cōcluditur, uitrei humoris modò dimidiū exprimit globū, cuius posterior pars, quæ plana cōstat superficie, tantū habet sinum, quanta in anteriora protuberās crystallini humoris est pars. Anterior autē aquei humoris sedes gibba, dimidiatq; globi modo rotunda est, secundū oculi nimirū formam. Cæterum externa duræ tunicæ superficies tota sede qua pellucida cernitur, ac reuera cornea exiit, admodum læuis est & lubrica: uerū cætera sede ita aspera inæqualisq; uisitur, quemadmodū inuicem cōnatæ mēbranæ admutuū contactū exasperatur. Posteriori enim duræ mēbranæ sedi præter uenas & arterias ipsi implicitas musculus inferi, quem musculorū oculū mouentiū septimū numerauimus: deinde lateribus superiorib; ac inferiori externæ huius superficiei sedibus, neruosaæ tenuitates musculorū inferuntur, quos sex primos oculū mouētes recensuimus. & deinde anteriori quoq; duræ tunicæ parti ad iridē usq; seu maiore oculi circuli tunica obnascitur, quæ adhuc cōmemorāda superest, ac adhærēs eo quòd oculū continet, & uicinis partibus cōmittit, dicit, alba à colore quē possedit etiā nuncupata. Hæc mēbrana anteriori tantū oculi sedi obducta tenuis est, illi cōtinua quæ internā palpebrarū sedē inuestit, oculiq; partiū numero ascribitur, quemadmodū & ipsæ palpebræ, si modò cui id uisum sit, his quoq; partibus adijci possunt. Fuit itaq; hæc oculi partiū series: humor crystallinus: tunica cepis pelliculæ tenuissimè modò pellucida, anteriorib; crystallini humoris sedi obnata: humor uitreus in posteriori oculi sede tantū positus: tunica in quā uisoriū nerui substantia resoluit, ac posteriōrē humoris uitrei sedē tantum amplectit: tunica uuea, à tenui cerebri mēbrana principiū ducēs: tunica seu orbis araneæ telæ modò tenuis & nigricans, & interstitiū uitrei humoris ab aqueo: tunica dura, quæ in anteriori oculi sede cornu modo pellucida reddit: aqueus humor: septē oculum mouētes musculi: tunica adhærēs, seu alba, anteriori tantū oculi sede obnata: palpebræ, & demū uenæ ac arteriæ. Cæterū si quis modò oculi cōstructionē ab extimis ad intima aggredi uelit, iam promissum est retrograda serie illū eas persequi: aut si uolet separatim humores, & dein tunicas cōmemorare, nihil prohibet. Ego uerò nunc ea oculū enarratione persecutus sum, qua in scho lis uti soleo, primū oculi cōstructionē explicans, & in charta maiusculā effigiē ita sensim delineans, atq; in prima huius Capitū preposita figura oculū exprimere conatus sum. dein post enarrationē ita sectionē obiens, quæadmodū suo loco in ultimo huius libri capite subiiciā. Verū ut oculi fabricā adeò studiose soleo cōmonstrare, ut spectantiū nemo in ipsa quicq; desideraret: ita in ipsius partiū usu explicandō hic prorsus obmutesco, quod mihi ipsi de primario uisus instrumento nō satisfaciā, atq; hac in parte quod sanū undiq; sit, à me non adferri posse, mihi persuasum.

d. fi. u. u.

e. In: fig. a.
Bad I.
fi. fi. o. o.
tota ferē 7.
fi. c. 8. fi. b.

Humor
uitreus.

g. 16 fig. 1.
h. 12 fig. P. P.
aut potius
musculorū
imaginē pe
te ex figu
ris capitis
13 lib. 2.
i. 1 fi. Q. 13
fig. 2. 1.

Adhærēs ab
hanc oculi tu
nica.

h. 1 fig. A.
i. 1 fig. B.
m. 1 fig. C.
n. 1 fig. E.
o. 1 fig. G. H.
p. 1 fig. K.
q. 1 fi. M. N.
r. 1 fi. O. O.
s. 1 fig. P. P.
t. 1 fig. Q.

Oculi partiū
usus.

deam. Non sanè quasi crystallinū humorem præcipuū uisus instrumentū esse, & ut hic alatur uirum produci, & huius gratia oculi reliquas partes efformatas esse, quemadmodū Galenus in decimo de Partū usu diffuse persequitur, cōmemorare, aut hic prolixè etiā scribere nequirit: sed quod mihi certū quū uisus fiat, nō constet, hincq̃ reliqua oculi cōstructio depēdeat, quodq̃ potissimū de huiusmodi philosophorū & medicorū cōtrouersijs priuatim quādā aliquādo mihi scribenda duxerim, præsentī labore ad iustam molem perducto.

DE AUDITVS INSTRUMENTO.

Caput XV.



QVAE de auditus organi fabrica modò enarranda essent, superius in primo libro ita explicui: atque in præsentia, si inibi nihil commemoratum fuisset, ea pertractarem. In octauo enim primi libri Capite^a cavitatem auditus organi gratia in caluaria exsculptam, paratamq̃, & deinde huius concauitatis foramina membranas & ossicula recensui. In decimo sexto autem eiusdem libri Capite, auris cartilaginū & reliquarum constructionem, uī tunc occurrit, modoq̃ animo obuersa, persectus sum. Nihil enim hic certius de auditu sonituq̃ percipiendo, quā inibi attexere possum, nisi etiam plus nunc quā dum illa scriberem, ambigem, mihiq̃ longè minus satisfaciā, & non satis mirari queā, omnes de auditu, ipsiusq̃ obiectis tam prolixè citra organi ipsius uel maximè superficiali cognitiōē scribere: ex quo tamen præcipuè ad præsentem disceptationem petendæ erant demonstrationes.

DE GUSTVS INSTRUMENTO.

Caput XVI.



LINGVAM oris amplitudini adamussim congruentē gustus esse instrumentum, medicis iuxta ac philosophis concessum est omnibus. quū itaq̃ in decimo nono secundi libri Capite, nouem linguæ musculos, & variā illam fibrarum, compositionisq̃ in ipsius parte hiantē ore ante cōsectionem conspicua speciem unā cum illius inuolucris recensuerim, & in tertio libro^b uenas arteriasq̃ linguā petentiū seriem similiter descripserim, in quarto libro ipsius neruos minime negligēs, quorum^c alter præcipua maioris tertij neruorum cōiugij radices numerabatur portio, gustus occasione potissimū linguæ oblata, alter uerò septimi neruorū cerebri paris propagines musculorū nomine linguam implicātes, nemo, uti arbitror, hic à me requiret, ut prolixa de linguæ fabrica inter cæteras partes, ut uerū fatear, mihi minus cognita, sermonem institua, aut diffuse saporum differētijs & qualitates commemorem.

DE TACTVS INSTRUMENTO.

Caput XVII.



TACTVS quoq̃ instrumentū in quarti libri initio me persectū arbitror, quum nullum neruū tactus sensu nō præditū per corpus digerī assererē, & Naturę scopos in neruorum distributione quantum is locus exigebat enarrarē: illorū subridens sententiā, qui unam eiusdem nerui portū unculam sensui, aliā motui absq̃ sensu præesse docuerūt. Ac proinde totius humanæ fabricæ partiū enarratione pro mea uirili absoluta, nunc superest, omniū partium quæ præsentī libro aggressi sumus, sectionis rationē per scribere: & si cuius partis in alijs libris traditæ secandi ratio nō expressa sit, etiā illam ad huius libri calcem seriatim subijcere, & postremò de uiuorū sectione nōnulla proponere.

CEREbRI, OMNIUMQVE QVÆ PRÆ-

senti libro traduntur organorum administrandi ratio.

Caput XVIII.



DE VMODO musculos cervicem occupantes, & neruos ē cervicis dorsali medulla profluentes, in corpore quod nutritionis uitalisq̃ facultatis organis inspicendis hactenus subseruiuit, aggressus fueris, suadeo nunc caput ita atque ad præcedentis libri finem recessui, à reliquo corpore auferri. Ablatum enim longè commodiùs, minoriq̃ molestia atrectabis, unde etiam capita detruncatorum hominum ad hunc usum sunt accommodatissima: præcipuè quod illa uix bene mortua, statim à sumpto supplicio minus morosorum iudicum ac præsectorum opera, obtineri possunt. In quorū numero si quis unquam alius, meherculè habedus est, studiorū unicus Meccenas, illustrissimiq̃ senatus Veneti singu.

a Hec omnia ostendit fig. cap. 8 lib. 1.

a Hi obuij sunt in figura cap. 19 lib. 2. b fig. cap. 6 lib. 3. ramuli ab X. c fig. cap. 12 lib. 3. d 2 fig. ca. 2 lib. 4. Y. Y. e 2 fig. cap. 2 lib. 4. ramuli li. 4. w.

Galenus in primo libro de Locis affectis.

Caput ad cerebri inspectio nē qui parandū.

singulare ornamentum MARCVS ANTONIVS CONTARENVS, obraram philo-
 sophiæ linguarumq; cognitionem, ac tot felicissimè obitas legationes, toti orbi clarissimus,
 qui nunc Patavinæ urbis Prætor uigilantissimus, uberè profectò nobis ad Anatomes admini-
 strandas copiam suppeditat, ipse humanæ corporis fabricæ studiosissimus indefessusq; specta-
 tor, ac alius ueluti Romanorum Boëthius aut Sergius. Qualecunq; igitur caput obtigerit, sem-
 per eius os ferra^a diuidendum est, ac proinde nouacula aut cultro in capitis cute ad os usque or-
 bicularem duces sectionem, quæ pollicis latitudine elatius quàm supercilia sunt, non inoppor-
 tunè auspicabitur, hinc per tempora ad eminentissimā maximeq; posticam occipiti sedem ten-
 dens, & illinc rursus per tempora frontem accedens. Ducta hac linea, tenuiori ferra, qua in gan-
 grena auferendis membris uti consueuimus, aut alia ab eburneorum pectinum artificibus pe-
 tita, caluariam secundum illam lineam diuides, studiose præcauens, ne altius quàm os sit, ferra
 descendat. In hoc opere conduxerit capitis crines nondum abrasos, neque etiam aures præ-
 sectas esse, quo leuiori negotio altera manu, & sodalis utraque caput ne ferræ cedat cõtineatis.
 Vbi caluariam orbiculatim diuiseris, obtuso cultelli mucrone secundum sectionem ducto, num
 aliqua ossis pars adhuc diuidenda supersit examinabis, ut & eam quoque ferra diuidas. Porro
 ne sectionis finem ipsius principio elatiorem, depresso rem uel mollioris, si modò id citra aliam
 operam (quamquam factu sit longè facillimum) te facturum nō fides, nihil obstitit funiculum
 colore aliquo intinctum nudæ caluariæ fortiter illorum qui trabes in asseres diuidunt modo,
 circumdare, ut coloris orbicularem lineam, quæ ferram dirigat, caluariæ intingat. Atque hunc
 funiculum ossi obuoluere conuenit, postquam iam cutem orbiculatim dissecuisti: quippe cu-
 tis sectio te manu ducere nequit. nam sectionis in cute factæ latera, dum caput ualide cõtinetur,
 hinc inde abscedent cute diuelluntur. Diuisa ad hunc modum caluaria, si à ceruice inferioriq;
 maxilla caput habueris liberum, illud sua basi mensæ impones, utrinque si uisum fuerit ne in la-
 tera concidat, lapidem, aliud uel simile collocans. Si uerò caput reliquo corpori sectionis ratio-
 ne adhuc hæreat, tot ceruici occipitiq; quadratos lapides, aut truncum aliquem subijcies, ut
 caput in anteriora reflexū eleuatumq;, ac si basi inniteretur, tibi assurgat. Insuper sectioni per cal-
 uariam factæ ualidioris cultri dorsum transuersum ad frontem primum impones, & illo modi-
 cè sursum deorsumq; acto, sectionem aliquousq; dirimes. Idem quoque in occipiti temporib;
 usq; tantisper faciendum est, quousq; caluariam à dura cerebri membrana liberam esse conie-
 ceris. tunc enim uerticis crinibus apprehensis attrahentē manū os subsequetur. Adempto osse,
 cutem simul cum adipe & carne mēbrana solis manibus (alicubi tamen cultro prius liberatā)
 facillè diuelles, & deinde cultelli mucrone Græcis uocatū *μενυρπιον*, ipsumq; *μενίστοιον* indaga-
 bis, deinde etiam^b uenulas ex uerticis cute in caluariā uersus durā cerebri membranā, aut ab
 hac in illam profectas. Iam dura cerebri membrana aliqua ex parte cultello est perforanda, &
 calamo fistula uel, aut quo in elicienda urina uti consueuimus syphone, foramini indito, sectio-
 nis latera ad illum digitis cōprimenda sunt, ut postmodum syphone inflato, quanto dura mem-
 brana cerebri mole amplior sit, condiscas. Atque suffecerit in altero tantum latere eiusmodi fo-
 ramini fieri, nam copiosus qui inflatur spiritus undiquaq; duram cerebri membranā disten-
 dit, inflatq;. Verū si quum caluariam ferra diuideres, duram membranā alicubi oscitanter
 dissecueris, illa quoq; sectio dum inflatur membrana opportunè, ne aërem transmittat compri-
 metur.^c Diuisa rursus membrana, acutioris cultelli mucronem tertio duræ membranæ sinui,
 per totam capitis longitudinem in elatissima eius membranæ sede procedenti intrudes, long-
 gaq; sectione uniuersum quoad poteris, aut ab occipito ad frontem usque, aut à fronte ad occi-
 pitū diuides. Atq; hic sinus si suspēdio, aut aliter quàm capitis supplicio homo necatus fuerit,
 sanguine oppletus conspicietur, quem extergere conuenit, & distento sinu ipsius formā, &^d ra-
 morū qui utrinq; ab ipsius lateribus, & ex inferiori eius sede pullulant, orificia inspicere. Porro
 ut cerebrū dura ipsius membrana nudes, iuxta frontis os eam ad tertij illius sinus latera perfo-
 rabis, et deinde stylo in foramen indito, secundum illum cultello ad occipitis usq; os cōtinuè ad
 sinus eius latera sectionē deduces. Hac ad utrunq; sinus latus facta sectione, rursus durā mem-
 branā cultelli mucrone propter aurem, quā ossi proxima est perforabis, hincq; rectā sursum
 usq; in priorē, seu secundum capitis longitudinē, ductā sectionem secando perges. Postremò
 in capitis uerticem quatuor sibi proximarū sectionum angulos unguibus attolles, & deorsum
 tractas à cerebri reflectes, habita ramorū ratione, qui ex tertij duræ mēbranæ sinus lateribus,
 & ijs uasis quibus duræ membranæ implicatū latera, in tenuē cerebri membranā pertinent.
 Insuper dextra cerebri parte à sinistra modicè manū benefici diducta, septum à dura mem-
 brana inter utranq; cerebri partē extructū, & soboles à tertio duræ membranæ sinu utrinq; in
 tenuem membranā diffusæ, quantū fieri poterit attollētur, ut qui illarū interuentu in uiuentibus

Caluaria ad
 cerebri Ana-
 tomen qual-
 iter aperienda.

Cutis, adipis
 mēbrana cer-
 uicis, ac den-
 caluariae into-
 lucis, illiq; sub
 dicit adhuc mē-
 brana examē.
 Dura mēbra-
 ne amplitudo
 qui examina-
 da.

Tenuis men-
 brana deter-
 ctio.

cerebrum erigatur utcumque intuearis, ac dein a cutiori cultello illis propaginibus à suo sinu liberatis, eam duræ membranæ partem à septo sedium olfactus organorum liberes, ac ueluti ex cerebro eleuatam in posteriora reflectas, ipsius sinu qui uenæ instar toti inferiori ipsius sedi exporrigitur inspecto. Cuius origo, ut & cæterorum omnium, paulo post in propatulum ueniet. Nunc autem ductus in tenuem membranam excurrentes, ipsaq; membrana inspicietur. Vbi itaq; nuper dictam duræ membranæ partem in posteriora reflexeris, ac utranque cerebri partem disunxeris, longos in tenui membrana ductus intuebere, qui per capitis longitudinem in illam ex quarti duræ membranæ sinus termino producuntur. Horum ortus in præsentia curiosius non uenit inquirendus, ne fortassis quum cerebrum nimium studes disiungere, aliquid incuria rumpas. Alias enim hortarer, ut utraq; cerebri parte quàm maximè in posteriori sede disincta, duram membranam quæ cerebri partes intercedere incipit, quam posses proximè ab illa duræ membranæ parte, quæ cerebellum ac cerebrum interuenit, acutioris cultelli mucrone diuideres. tunc enim quartus tibi appareret sinus, & quæ ille educit propagines. Deinde etiam cerebro à dura membrana, quæ id & cerebellum intercedit, modicè eleuato, ramuli ex illius duræ membranæ parte in tenuem cerebri membranam exporrecti uisarentur. Verum hæc cerebri portione ablata inspicere longè erit fatius, ac proinde illis ductibus qui secundum capitis longitudinem in tenui membrana supra callosum corpus feruntur expensis, ungibus, aut cultello alicubi tenuem membranā diuelles, ac deinde sensim à cerebro ipsiusq; anfractibus eam digitis detrahes. Cerebrū hac liberatū membrana suos ostendit anfractus: argumento q; est, quī a tenui membrana cōtineatur, quū scilicet hac detracta, impense dilatescat, & cōcidens prorsus, quodammodo defluat. Porro cerebri anfractuum altitudo ac profunditas digitis, aut stylo uenit indaganda. atque ita etiam solo digitorum munere elatior callosi corporis sedes, & qui utrinque hic consistunt sinus, inquirentur. Simulatq; uerò hos inueneris, utrinque magnam cerebri auferes portionem, primum magna & acutiori nouacula sectionem per dextrum, qui ad callosum corpus cōsistit, sinum deducens, quæ totam cerebri partem sinu illo superiorem, à fronte ad occipitiū usque simul in dextro latere adimat. pluribus enim reiteratis sectionibus, operatio turpiter uiuiatur. Ademptam cerebri partem in mensam ita repones, ut elatior dextri uentriculi sedes in conspectu sit. ea enim quam fieri præcepimus sectio, dextrum uentriculum diuidit, si modò rectè secundum sinum qui ad dextrum callosi corporis latus uisitur, administrata fuerit. Dextra cerebri parte ad eum modum ablata, in sinistra idem quoque (ut & sinister quoque pateat uentriculus) moliendum est, per sinistram iuxta corpus callosum consistentem sinum facta sectione, callosoq; corpore quàm fieri licebit maximè immoto, diuulsoq;. Quandoquidem id postquam sinistram quoque cerebri uentriculum inspexeris, uidendo uentriculorum septo seu speculo, sensim, & quàm accuratissimè ubi utrinque continua illi cerebri pars adempta est, summis utriusq; manus digitis modicè æqualiterq; attollendum uenit. Septum enim si ad eum modum callosum corpus crexeris, & dein candelam contrario eius quod inspicis lateri (nisi illi clarior dies obluceat) adhibendam curaueris, euadet cōspicuum. Iam callosum corpus anteriori parte, qua olfactus organorum interstitio uiciniū est, cultello à cerebro liberabis, & deinde id hac parte eleuatum digitis sursum trahes, in posterioraq; diuulsum reflectes. ita nanque elatiorem speculi septi uē sedem calloso corpori, inferiorē uerò illi cerebri parti quam testudini ac camerato assimilamus, cōnatam cernes.

Tenuis membrana à cerebri reuolutionibus auulsiō.

Superioris callosi corporis superficiē examina. Dextri & sinistri uentriculorum apertio.

Dextri sinistri uentriculorum septi examina.

Corporis callosi studas modo efformatæ examina.

Ventriculorum dextri & sinistri, & in ipsis uisitorum examina.

83 fig. N aut 6 fig. cap. 6 lib. 1. v. b 3 fig. F secundum G. G.

i fig. ca. 14. li. 4. d. c.

h 7 figura O. O. O. l 7 fig. T. m fig. ca. 14. li. 3. Y. Y. a. a. b. d. e. f. i. n 3 fig. L. L.

o 3 fig. C. C. C.

p 3 fig. L. L. & de m. M. q paratu rus 4. figuram, quam hic sedulo inspicies.

r 5 fig. X. X. & Y. Y.

s Ex quarta figura nune parabis quintam. t Vbi infimum l con siliit in 4 fig. u 5 fig. Y. Y. x 3 fig. X. x.

y 5 fig. S. T. V. & 6 fig. A. A. A. z Ex quinta figura parabis sextam. a 7 fig. V ex T.

b 6 fig. H. J. c 4. 5 fig. O. O. 6 fig. M. N. d 6, 7, 8 fig. E. G.

to duræ membranæ sinu in cerebrū sub camerato proficiscitur. Hunc enim restā supra com-
munem dextri sinistriq; uentriculi cavitatem longius procedere obseruabis, & deinde biparti-
tum uersus dextrum & sinistram cerebri uentriculum porrigi, tandemq; ab hoc ac commemo-
rata ultimò arteria nuper dictum plexum efformari. Cæterum quum hos ductus ex quarto du-
ræ membranæ sinu prorepentes conspicias, illi quoq; spectandi sunt, qui tenui membranæ &
humiliori parte duræ membranæ dextræ cerebri partem à sinistra interdiuidenti, à quarto sinu
offeruntur. Vbi enim hos inspexeris, ductus qui à quarto sinu sub camerato in cerebri uentricu-
los pertinent, ea sede cultello sunt diuidendi, qua commemoratos efformant plexus. Hinc ele-
uati in posteriora leuiter reflectentur, ne simul^g glandula quam *Λωυδωλει* Græcis uocari diximus,
auellatur, hæc siquidem illis ductibus sua sede remotis, in conspectu iacet. Verum hæc tentanti
ouillum cerebrū ad manum esse uelim, quòd id glandulam illam & cerebri^h testes, natesq; aper-
tius nonnihil quàm humanum caput commonstret. Glandula hac in suum locum repòsita, di-
gitisⁱ communem dextri sinistriq; cerebri uentriculorū sinum, qui instar rimæ modò spectanti
occurrit distendes, ac mox^j meatū quo pituita uersus^k peluim ex tenui membrana extructam
defertur, unā cum^l meatus principio intueberis, qui ex tertio uentriculo cōmuni^m ue hac cōcui-
tate in quartū uentriculū pertinet, quibus inspectisⁿ totā cerebri portionē cerebello incumbētē
transuersa in cerebro ducta sectione adimes, id duntaxat hīc præcauens ne^o ductus arterias^p ue
per posteriorem dextri sinistriq; cerebri uentriculorū regionem ascendentes, unā disseces. Ap-
paret modò duræ membranæ pars cerebellum ab ipsi incumbente cerebri portione diuidens,
& etiam^q illa quæ inter dextrā cerebri partem & sinistram ducitur, quapropter tempellium
est, ut quattuor duræ membranæ sinus simul examines. Tertio itaque duræ membranæ sinui
quem dudum per longitudinem^r dissecuisti, plumbeum inferes stylum, quē facile in tres reli-
quos eius membranæ sinus hinc protrudes: si modò utrinq; ad latera primum, ubi cerebelli ela-
tior pars ossi proxima est, illum impuleris. ita enim dextrum & sinistru sinum, seu primum ac
secundum inuenies. Deinde si sub radice duræ membranæ partis dextram & sinistram cerebri
partem interueniētis stylum detruseris, quartū sinum comperies. Quo tamen eos uideas ex-
actius, acutioris cultelli mucronelongs ductis sectionibus omnes sunt aperiendi: & deinde cul-
tello tota duræ membranæ pars cerebello superius obducta, orbiculari sectione secundum os
ducta uenit præsecanda, aut sectione secundum longitudinem ducta, diuidenda, ac retrorsum
reflectenda. Vt cerebello obiter inspecto, cerebrum denuò aggrediaris, cōmunem dextri sini-
striq; uentriculi sinum distendens, ac exactius pituitæ ductus immisso stylo examinas. Vt uerò
communis cavitatis seu tertij cerebelli uentriculi meatum in cerebri cavitatem porrectū obser-
ues, obliquatum stylum meatui indes, leuiterq; in cerebellum concidere fines. Stylus enim gra-
uior phononis modo incuruatus, etiam nō impulsus secundum meatus ductum, in cerebellum
deuoluitur. Manente adhuc in meatu stylo, digitis cerebellum nonnihil à cerebri testibus diri-
mes, quoad scilicet stylum inter cerebellum & testes ipsos intuearis. tunc enim, & præcipuē in
ouis cerebro, quæ pars^s testibus, & quæ^t natibus similior sit, disces. Quod quū obseruaueris,
cultello testes ipsos natesq; secundum stylum^u diuides, ut meatus ille ex communi dextri & sini-
stri uentriculi cavitae ad cerebellum porrectus euadat conspicuus, pauloq; accuratius meatus
à cerebro ad peluim pertinens, pituitamq; eò deducens, reddatur conspectior. Poteris modò
tenuem cerebelli membranam hamulo discerpere, &^v uenam quæ ab illius ductibus in poste-
riorem humiliorēq; anteriorum uentriculorū sedem pertinet examinare. Quippe hanc repe-
ries facillimè, modò illam iuxta antice cerebelli partis cum cerebro connexum inquisueris, qui
præsentis uenæ potissimum fit interuentu. Vt uerò^w coalitum cerebelli cum dorsali medulla
cognoscas, caput quasi in faciem^x reclinandum est, & manu inter cerebellum & duram cere-
bri membranam occipitis ossi commissam, imposita, cerebellum in priora, deorsumq; detra-
hi debet, quousq; uniuersum à dorsali medulla liberatum decadat. in ea enim administratione
nihil obstat, quo minus^y uenulas ductus^z ue ex primi secundiq; duræ membranæ sinuum
principijs, aut^{aa} uenis arterijsq; per transversos ceruicis uertebrarum processūs repentibus, in
cerebellum porrigi uideas, ac dorsalis ex ipso cerebro ortum, formam, & sinum cum cerebelli
sinu^{ab} quartum efformantem uentriculum cernas. Deinde etiam repòsito capite, & cerebello
in^{ac} pronum posito, ipsius intueberis sinum, & partes quibus dorsali medullæ connasceba-
tur, & præcipuē ipsius reuolutionū anfractuū ue pulchram imaginem à quibus illico uelut
manu ducēris ad duos reuolutionum^{ad} apices uermibus asmilatos, & uelut reuolutionum
terminos per cerebelli medium secundum ipsius longitudinem deductarum. Atque id ap-
parebit clarissimè, si per eam longitudinem utrinque longa sectione ad earum reuolutionum
latera ducta, eas à reliqua cerebelli substantia liberaueris, exactas que in mensam exporre-

*Glandula testis
bus incutitur.*

*Tertij uentri-
culi, ipsiusq;
meatum.*

*Duræ mētra
ne sinuum.*

*Cerebelli detra-
ctio.*

*Testium et me-
num examen.*

*Dorsalis me-
dulle cum cere-
bello coalitas.*

*Quartū uentri-
culi examen.*

*Vermis formit
processuum*

xeris, ita nanque unius tibi apparebit uermis, illis quàm similimus, qui ueris tempore è salicibus decidere solent, aut bōmbicibus priusquam sese folliculo includant: & adhuc multo magis quum iam aliquandiu inclusi fuerūt, folliculum tamen non dum corrodere. At si uniuersas illas medias reuolutiones simul non abstuleris, & duntaxat extrema execueris, duos poteris com-
monstrare uerminiformes cerebelli processus, unum quidem priorē, posteriorē uerò alterum. Porro non solum exectis ad hunc modum uermiformibus processibus, ipsorum imago exami-
nanda uenit, uerum etiam quando cerebellum à dorsalis medullæ initio auellitur, ipsorum usum præcipuo studio expendere conduxerit. In spectis itaq; cerebelli partibus, neruorum paria inuesti-
gabuntur, quod ut fiat ocyus, manu inter cerebrū & frōtis os inserta, cerebrū sensim attolletur, ut primū à plerisq; uocatum cerebri mamillarē processum, & dein olfactus organo seruien-
tes uideas processus, qui è suis sinibus stylo quopiā aut digito ueniunt euellendi, & unā cum cerebro sursum in posteriora flectendi: in quo opere caput non inutiliter in occiput reclinabi-
tur, ita enim reuolutum eorum processuum ortum pulchrè ostendet. Atque hic pariter in con-
spectum ueniunt uisiorum neruorum principia, & eorundem congressus, & sub illis peluis cerebri pituitæ expurgandæ parata. Mox & arteriarum in duræ membranæ amplitudinem
ingressus occurret, quæ partim in tenuem absumuntur membranam, & partim in dextrum & sinistrum cerebri uentriculos properant. Vt uerò exactam earum arteriarum seriem spectes, & hīc quoque tenuem membranā à cerebro diuelles, & uentriculorum terminos inibi in reuo-
lutiones, nō autem in olfactus organa uisorios uerū neruos finire, nihilq; minus quā à uentricu-
lis in ea organa pituitam excerni, illisq; ad octauum capitis os deduci. Nunc uisorios neruos à cerebro diuides, & totam ipsorum portionem in caluariæ amplitudine tibi conspicuam, stu-
diose refecabis, ne nuper dictam peluim simul auferas. ea nanque hac administratione tota oc-
currit, pulchrèq; cernitur, qui meatus ex tertio uentriculo ad hanc pertinet, & qualiter illa in
glādem cesset, quæ duræ membranæ subijcitur, facileq; dilatato hīc proprio duræ membra-
næ foramine spectabitur. Cōduxerit tamen membranā inibi tantisper illatā seruare, dum reliquos cerebri neruos examinaueris. Capite igitur in sinistrū latus reclinato, & cerebri parte
quæ adhuc reliqua est, in suum locum utrunque reposita, cerebrum postea in sinistrum latus deorsumq; reflectes, & secundi paris originem contempleris, mox minorem tertijs paris ra-
dicem, quæ diuisa cerebrum adhuc magis in sinistrum deflectes, & mox tertijs & quarti paris exortum intueberis: insuper & quinti paris originē, quā similiter diuidere competit, ut ner-
uulum intuearis, qui iuxta quinti paris radicem principium obtinens temporali euaculo, & in ore delitescenti maxillamq; attollenti offertur. Sextum quoque par & septimum euadunt
conspicua, si uarijs ipsorum quibus ortum ducunt propaginibus animum adhibueris. Certe-
rum quum paria hæc perquisis, ductus quoque uenarum modo ex duræ membranæ sinibus in tenuem excurrentes obseruandi ueniunt, & neruorum exortibus in sinistro si uisum erit latere, similiter
adinuētis, quicquid dorsalis medullæ, aut cerebri in capite reliquum est auferes, ut duram membranā quā cerebri basi subiacet, adhuc integram uideas, & olfactus organorum si-
nus foraminulis peruios, & undique egredientes neruos intuearis: quibus inspectis, primi ac secundi duræ membranæ sinuum originem, & in illos subeuntia uasa examinabis, ac utiori cul-
telli mucrone ipsos aperiens. Ductus autē secundum duræ membranæ latera excurrentes, & in ipsius iuxta frontem basi conspicui, uel citra aliam sectionem sunt obijci, ut uerò glandulam, & quem dissectionis professores ementiuntur reticularem plexum uideas, animum adhibebis
duræ membranæ foramini peluis infundibili uel mediū excipienti, & adhuc peluis portionem adnatam habenti, non negligens interim arteriam utrinque ad foraminis illius latera duram
membranā penetrantem, quæ ubi obiter intuitus fueris, acutioris cultelli mucrone sectionē ex illo foramine utrinque ad arteriarum usque transitum duces, & labris sectionum distentis, glandula
sefe offeret, arteriæq; ad ipsius latus strætæ. Verum hæc magis reddentur conspicuæ, si ha-
mulis & acutioris cultelli mucrone, quā poteris maximè duram membranā hīc liberaueris, aperueris uel, ac ab arteria duram penetrante membranā plumbeum stylum ad soporariam
usque arteriā in ceruice adhuc consistentem, impellas. Id nanq; in homine faciū promptum est, si modò tuis oculis Galeni nomine fidē derogare nolueris. Hīc enim quā pulchra de reticu-
lari plexu in hominibus cōmentī sint hactenus omnes, obseruabis: potissimum si ouillum aut bubulum cerebrum hīc quoq; sectioni adhibueris. Præterea glandulam suā sede dimouens, ac ut duritiem ipsius experiaris eandem cōprimens, perpendes quid Galeno in mentem uenerit,
quod per crassissimā ossis cuneum referentis sedem, quā spongix modò peruiam esse scribit, pituitam ad palatum colari censuerit, & non potius proprios hīc pituitæ & attracto per inspi-
rationem aëri ductus, foraminaq; non minūa etiam indagauerit. Relicta modò interiori calua-
riæ

Neruum
pariū examē.

Forū quæ in
duræ membra-
næ basi sunt
exantem.
Glandæ pitui-
tæ excipien-
tis, ipsiq; accū-
benunt arte-
riam.

h vii fig. a
est in 11 fi.
112 fig. 1, 1.
aut 13 fig. a
C. C.
112 fig. C.
D. 13 fi. L.
L.
n vii fig. a
in 11 fig.
013 fig. M.
N. O.
p 13 fig. S.
aut 14 fig.
C. C.
q 11 fig. B.
14 fi. E. F.
r 8 fig. ca. 6
li. 1 A. B. A.
s vii fig. a
est in 14 fi.
t 14 fig. D.
u 16 fig. A.
x 15 fig. F.
y vii in 14
figura.
z 14 fig. G.
a 14 fig. H.
b 14 fi. K.
c 14 fig. M.
d 14 fig. L.
e 4 m. f. c.
f 6 m. f. ta.
D.
g 14 fi. N.
dem O. aut
potius serua-
tim spectat i
fig. cap. 2
li. 4.
h Apparent
in 9 fi. ad 1.
in 13 ad 1.
i vii fig. a
est in 9 fig.
h 13 fig. H.
K.
l 15 fig. F.
m 15 fig. C.
D.
n Inspectu-
rus 16 figu-
ram.

riae sede oculum aggredi conuenit, ad cuius sectionem humanus, si recentius adhuc fuerit cada-
uer, suffecerit: alioqui enim bubulus quàm nancisci poterit recentissimus, simul quoque operi
adhibebitur. Primum itaque palpebrarum, & deinde oculi musculos, quemadmodum in se-
cundo docuimus libro, inquires: in quo opere neruorum quoque & uenarum arteriarum que
per oculorum sedem ductuum habenda est ratio, secundi dico neruorum cerebri paris, & mi-
noris radices tertij paris, quorum ramulos faciliè adinuenies, si eos in pinguedine oculi muscu-
lis obducta perquisiueris, & præcipuè si ossa referuare nolens integra, terra frontis os superio-
rem oculi constituens sedem, instar trianguli prius execueris, & deinde primum neruos illos, &
postea extracto oculo ipsius musculos indagaueris. aliàs enim oculus cum musculis illaeso osse
esset eruen dus, ac utiori cultro in oculi circuitu proximè ad os ductis sectionibus, usque ad ner-
ui uisoriij è caluarie amplitudine qua cerebrum continetur egressum. Vt unque uerò oculum
euulseris, conduxerit semper adhærescentem membranam quàm licebit uicinissimè ab osse
dirimere, imò etiam eius portionem qua internam palpebrarum efformat sedem, oculo appen-
sam seruare. ut interdum adhuc intactis oculi musculis, cultello acutiori ad iridem usque ab
oculo ac si cutem à corpore auferres, auellere, & deinde unde ortum duxit considerare possis.
Aliquādo uerò ipsam nō nisi ablatis oculi musculis aggredieris, perpendens semper hanc totā
anteriorē oculi sedem, præter corneam tunicam seu pellucētem duræ tunice partem ample-
cti: illos uerò totam posteriorem, præter portiunculam ab ingrediente uisorio neruo occupatam.
Cæterum oculo & musculis & adhærescente membrana libero, uisorium contemplate-
ris neruum, primum uenas arterias que secundum ipsum ex cerebro in duram usque tunicam
exporrectas: deinde portionem uisoriij nerui longa sectione diuides, & cultelli mucrone duræ
cerebri membranæ, & tenuis membranæ portiones neruum inuestientes, & postmodum ner-
ui substantiam inquires, ut uelut trium præcipuarum oculi tunicarum initia ostendas, & dein-
de uisorium neruum ab oculo diuidas, ut nihil præter duram, ceu exactissima quæpiam sphæ-
ra, appareat. Sphæram hanc summis digitis sinistræ manus ita apprehendes, ut pollex quidem
pupillam, reliqui autem eam sedem in quam uisorius neruus implantatur comprehendant, dein
dextra manu acutiori nouacula sectionem quàm poteris longissimā in dura oculi tunica trans-
uersum ducas, ut citra compressionem omnes oculi humores excidere possint. Hi enim hac du-
cta sectione, oculo que in dextram manum assumpto, in manus sinistræ uolam ita sunt demit-
tendi, ut crystallinus uitreo elatorem locum habeat: negocium enim confuderis, si uitreus super
crystallinum reuoluatur. Atque id ne fiat uitabis, si quum in uolam ex oculo humores pro-
labi sinis, oculum non admodum à uola eleuatum tenueris, & posterior oculi pars, qua uisori-
us neruus inseritur, uolam magis respexerit. Susceptis ad hunc modum humoribus, & repo-
sita illa oculi parte ex qua humores prolapsi sunt, manū leuiter modicè ue inuerter, ut aqueus è
uola sinistræ manus profluat, solusq; uitreus cum crystallino referuetur. Mox considerabis tu-
nicam palpebrarum pilis quàm simillimam, quæ orbiculatim crystallino humori connata, an-
teriorē uitrei humoris sedem inuestit, integitq;. Tuniculam hanc cultelli mucrone à crystal-
lino humore primū diuelles, & deinde à uitreo subleuatam, supra chartam extendes. Crystalli-
ni humorem digitis ex uitreo quàm minime compressum eximes: & uitreo in suum locum in
charta reposito, illa solum crystallinum humorem scripturæ alicui primū importes, & deinde
cultelli mucrone ipsius lateri modicè indito, scripturæ nunc altius, nunc demissius accommo-
dabis, quā omnia specilli instar longè quàm sint maiora reddat, consideraturus. Porro ipsius
tunicæ, quam tenuissimæ in cepis pelliculæ modo tenuem ac pellucidam, sed duriorē esse di-
ximus, ex ipsius primū lateribus cultelli mucrone dirimere conuenit, & deinde unguibus ab
humore auulsam, in suum in charta locum reponere. Vt uerò crystallini humoris discas duri-
tatem, poteris illum inter digitos premendo confringere, & postmodum chartæ adhibere.
Cæterum ut tres adhuc reliquas contempleris tunicas, oculi partem ex qua humores decide-
runt, super sinistrum pollicem euertes: & illico quæ ex uisoriij nerui substantia dissoluitur, tuni-
ca sese offerret, aut extensa adhuc, aut ut plurimum solet, instar mucī collecta. quapropter stylo
rursus uenit extendenda, & quantam habeat amplitudinem, cuius que coloris & substantiæ sit
inquirendum. Deinde rursus erit colligenda, ac denique à suo principio ubi duntaxat firma-
tur absecta, in chartam reponenda. Iam interna uueæ tunica sedes undiquaque est conspicua,
in qua primū ipsius intueberis colores, deinde hamulo à dura ipsam diuellens, uenarum ex
dura in illam transiitum, & nigricantem ipsius colorem perpendes. quum uerò ad iridem diuel-
lendo pertigeris, ipsius hinc contempleris ad corneam firmissimum connexum, & pupillam:
cuiusq; caloris uuea sit, quā à cornea abscedit, atq; è corneæ regione consistit. Diuulsam hoc
modo uuea, & à suo exortu ubi firmissimè corneæ duræ ue committitur, dissectam, in chartam

repones, & solam iam durā cum pellucida ipsius instar cornu partem quam carneā uocāstus, contemplaberis, ipsius examinans crassitiem, & eam partem pellucidam. Postquam & hanc in suum ordinē in charta locaueris, memoriā omnia cōmendaturus, uelut ab oculi centro ad extremam usq; superficiem, & hinc rursus ad centrum singula enumerabis, & postea nisi molestum fuerit, sinistrum aggredieris, à quo adharentem membranā, & musculos, ut in dextro administrabis. uerū in duram quā uueam simul peneret sectionem, nullam ducēs, sed quam minime compresso oculo nouacula mucrone sensim sectionē in dura molieris, nō quā primo incitū eam diuidat, sed quā saepius iterata, ad uueam usq; pertingat. sectioni deinceps tenuem, sed retusum styllum inferes, ac sensim uueam à dura dirimes, ut iam commodē forpicula duræ tunice sectionem, quā orbicularim oculum ambiat, illa interim uuea perficere queas, ut uenarū ex dura in uueam transitum, & uuea postmodum dissecta, humorum situm paulo melius contempleris. Absoluta oculi Anatome, auditus organum, si ossa referuanda minus duxeris, erit aggrediendum. & primum auris Natura euadit conspicua, si à cartilaginea qua conformatur substantia, cutis utrinq; separatur. At auditorij nerui processus difficilissimè adinueniē, ferra tamen maxima ossis portione, quā supra meatum habetur, & deinde cultro fortiori reliquo osse ad meatum usq; exsecto, membrana in quam neruus degenerat, & huius organi ossicula cuadunt conspicua. Si enim ferra meatum tetigeris, omnia uiciabis, & cultro etiam subinde nihil promouebis, quod in angusto & anfractuoso meatu, mollis tenuisq; neruus facile cum ossibus diuellatur, contundaturq;. Omnia tamen mihi per commodē succedunt, si ferra totum ossis partem, quā auditus organū continet, à reliqua caluaria libero, & deinde transuersim ualidiori cultro os uniuersum impetu dissecō. Cōuenit autem ita sectionē moliri, ut ea ossis sedes quā neruum à cerebro procedentem primum excipit, ab illo separatur, cui auris connascitur. Rursus si ossa haud referuanda putas, sua serim ut frontis os quā supercilia spectat, passim effingeres, si num illum quem continet accuratē examinaturus. idem quoq; in osse cuneum imitante molientum est, ut ipsius quoque antra crebro apparentia, & quā illis cōtinetur materia in conspicuo sint, neq; quicq; septimo hoc libro descriptū lateat. Ceterū nunc aliquot musculorū administratio adhuc superest, quibus uidendis alterū latus suffecerit. Aggredieris itaq; musculos cubitum mouentes, & qui radium, & brachiale, & digitos mouent: mox tibiam mouentes, & qui femoris motuum autores censentur: dein de pedis & digitorū motuū opifices ita simul cum ligamentis resecaabis, quemadmodū in secūdo libro iam multo antè commemorauī. Prorsus enim absre ducerem, si eos musculos, administrandi q; rationem uel obiter etiam hic pertractarem. Quod uerò ad manus & cruris uenas, arteriasq; & neruos attinet, quum horum administratio nondum expressa sit, aliquid dicam, reliquarum enim partium uasa, neruosq; iam pridem retulimus. Primum itaq; à summo humero ad pollicis usque unguem in cute sectionē adeo leuiter ducēs, ut carnosam membranā non uulneres: deinde sectionis labris inuicem diremptis, omnī studio laborisq; patientia cutem à carnea membrana ita auferes, ut adipem omnē membranæ adherere sinas. studio scq; expendas, ne uenam quampiā, aut neruulum cuti connexū sinas. & si forte aliquem ramum cuti exporrectum negligentia diuiseris, atque cum cute aliquousq; à carnea membrana sciunxeris, illum à cute sedulo reseca, & carneæ membranæ ita atq; prorcepebat, obtendito, ac dein cutem quemadmodum cœpisti adimito, nullibi cutis aliquid, neque in brachio, neq; in cubito, neq; in manu extrema relinquens. Iam uenulas & neruulos obseruabis, duræ membranæ qua brachium attollentē integit musculum oblatos: dein primum neruum brachij, qui carnosæ membranæ aliquousq; in externa brachij sede exporrigitur, dein ramulū tertij nerui inter musculum brachium attollentem, & cum qui brachium pectori adducit, in carneam membranā hīc in anteriori brachij sede disseminatū. In posteriori autē brachij sede & inferiori regione externi lateris brachij neruorum surculos expendes, carneæ membranæ à quarto neruo brachium ingrediente deriuatos, simul cum ramo quem externæ cubiti sedi oblique offert. Mox sexti brachiū petentis nerui seriem uniuersam expendes, ea enim tota carneæ membranæ duntaxat exporrigitur. Iam humerariæ secundum internum latus musculi brachium attollentis egressum spectabis, & ramulos quos hinc inde donec cubiti attingat articulum dispensat. Ad cubiti autem articulum ramum obseruabis oblique deorsum ad cōmunis uenæ constitutionē, ab humeraria diffusum: dein eum qui secundum radium in posteriora cubiti ad paruum usq; fertur digitum, axillaris uenæ ramum sibi affilcens. Ramum uerò quem humeraria rarius ad articuli cubiti profundiora mittit, si modò adfuerit, etiam citra sectionem expendes, axillaris uenæ portioni animum accommodans, quæ sub media longitudine brachij carneam membranā subit. Hanc enim ramum ad communis uenæ cōstitutionem promere cernes: dein alios ipsius ramos secundum ulnam, seu inferiorem cubiti regionem ad brachiale ferri

Alia oculi ad
ministratio.

Auditus or
ganū examin.

Musculorū
in proposito
huc lenius cor
porē non disse
ctorū examē.

Tentum, ar
teriarū et ner
uorum per ma
nus serici exa
mini.

lib. 19. fig. ca.
pi. 14. v.
m. 8. fig. ca.
14. 51.
n. v. u. l. e. a.
tū est in 16
fig. cap. 14.

o. Exprimi.
tur fig. ca. 8
lib. 1.

p. 3. 4. fig. ca.
12 lib. 1. K.
q. 8. fig. cap. 6
lib. 1. C. D. G.

r. fig. ca. 6. lib.
3 d.
s. 2. fig. ca. 11
lib. 4. g. h.
t. eius. fig. 2.
u. eius. fig. 2.
x. 3. mus. t. a.
inter p. et
a.
y. 3. fig. ca. 11
lib. 4. n. o.
char. 32. de
riuat. a. o.
z. eius. fig. 2.
char. 33.
* 2. fig. ca. 11
lib. 4. r.
a. fig. ca. 6. lib.
3 inferius d.
dein e. e.
b. eius. fig. h.
ad a.
c. eius. fig. d.
u. eius. ubi
suscipit x.
x.
d. eius. fig. g.
e. eius. fig. r.
f. eius. fig. b.
ad a.
g. eius. fig. u.
x. 2. 2.

ferri spectabis, & etiam animaduertes huius portionis suboles per interiorē cubiti sedem uarie admodumque implicite ad brachiale usque & manus uolam excurrentes. Præterea communis uenæ seriem uniuersam quoque intueberis, ad secundū brachium petentis nerui propagines animū dirigens, quæ ab illo producuntur, simulatque in cubiti articulo carneam membranam ex alto adit, ad hæc ramum quarti nerui etiam spectabis, qui externæ cubiti sedi ad brachiale usque spargitur. Nerus autem digitos implicantes, aliquo pacto etiam modò cernis, uerū magis conduxerit, eos tum primū expendere, quum radices ipsorum ad digitos usque perduxeris. Postquam itaque hæc omnia, non relecta adhuc carneâ membrana diligenter non sine magno usu spectaueris, carneâ membranā unā cum ipsi annexis uenis & neruis à succumbentibus musculis auferes: ac mox musculum, cuius beneficio brachium pectori adducitur, ad ipsius usque insertionem ab illis quibus adnascitur partibus liberabis, idem & in illo molle ris, qui brachium attollit, & qui scapulam mouentium primus & secundus habentur, dein clauiculam à summo humero resecabis, & musculum auferes à pectoris osse & clauicula mamillari capitis processui insertum, & eum qui à scapula ossi imitanti implantatur, & eum quoque qui à prima pronatus costa, transuersis processibus ceruicis uertebrarum inseritur. Cæterum quum hos adimis musculos, parum curandum est, num illos auferas illatos, parumque uulneratos. hinc enim non musculorum, sed uasorum natura uenit discenda: & perpetuū cauendum est, ne uas, non autem musculus uiuietur. Si itaque ad hunc modum accuratè hos musculos ademeris, in ceruicis uertebrarum latere neruorum radices seriesque eleganter occurrent, qui ab illis prosiliunt uertebri: atque ita etiam plexum neruorum in brachium excurrentium obseruabis, à quo seriatim cuiusque nerui digestionem persequeris. Ac primus occurrit, qui musculo brachium attollenti præcipue offertur: deinde secundus, & tertius, quorum seriem commodius spectabis, si capita musculi cubitum flectentium anterioris illin unde prodeunt liberaueris, atque à subdito illi musculo ad insertionem usque ipsius detraxeris. Mox enim ita præter secundi & tertij nerui ad brachium ingressum, etiam quarti & quinti & sexti nerui, & dein arteriæ & axillaris, & humerariæ uenarum ingressum adiuuenies, sensimque singulorum seriem sequeris, quæ in secundo neruo obseruatu est prompta, & tertij quoque nerui series ad cubiti usque articulum in propatulo est, uti etiam & quinti nerui & sexti. Quartus autem neruus, quæ secundum brachii os uersus externum illius tuberculum retorquetur, non occurrit, nisi oblique secundum nerui ductum musculos cubiti extensionis autores dissecueris, neruique progressum ita uitatis musculis persequutus fueris. Vbi autè hunc ad externū cubiti articuli la tus usque deduxeris, ramosque quos hæcenus in progressu edidit examinaueris, musculis ab externo humeri tuberculo principium ducentibus, à sua origine liberatis, ramos quarti nerui expendes, qui illis musculis offeruntur, & eam sequeris propaginem quæ tandem externæ pollicis regioni, ut & indicis quoque & medij furculos exhibet. hanc enim leui negotio repe ries, si musculo attenderis bisido tendine brachiale extendenti. Iam quarti nerui progressio similiter inquirenda est, quæ ulnæ exporrecta, ad brachiale usque excurrit, & musculis ab externa ulnæ sede initium ducentibus furculos depromit. Vt uerò reliquum tertij quintique nerui, & dein reconditæ axillaris uenæ portionis, & manus arteriæ in cubito extremaque manu progressum uideas, musculorum ab interno humeri tuberculo originem summentium capita ueniunt liberanda: ita enim in anteriori cubiti articuli sede uenæ & arteriæ, & tertij nerui in cubitum ingressus occurrit: & eleuato secundos quatuor digitorum articulos flectente musculo, ipsorum ad brachiale usque progressum etiam obseruabis, unā cum quinti nerui (qui secundum posteriora interioris humeri tuberculi in cubitum fertur) portione ulnæ exporrecta, atque sub medio longitudinis ulnæ ramum diducente, qui in cubiti exteriora reflexus, externæ sedi parui digiti & anularis & medij furculos offert: quem leui negotio, quum in superficie prope modum ducatur, adiuuenies, reliquum uerò quinti nerui & tertij progressum reperies, si trans uersum in interna brachialis sede repositum ligamentum diuiseris, ac dein exiguo cultello uenæ, arteriæ, & eorum neruorum seriem ad extremos usque digitos perduxeris. Cæterum priusquam cruris neruos & uasa inquires, etiam diligenter obseruabis neruorum ex lateribus thoracis uertebrarum prosiliuntium distributionem, quam tunc demum opportune inuenies, quum sedulo illorum distributione perfecta, musculorum dissectionem perspectissimam habes, quæ hinc non minus indiges, quam ante musculorum administrationem absolutissima os sum cognitione. Quum itaque ad lumborum uertebras usque deuentum erit, ab inguine ad pedis usque pollicem similiter atque in manu, sectionem duces: cutem ad carneam usque membranam diuidens: ut dein uniuersam cruris & pedis cutem illata carneâ membrana, & uenis, & arterijs, & neruis, inter hanc & cutem excurrentibus ad carneam membranam relictis, commo

Venarum, ar
teriarum et ner
uorum cruris
examen.

dē (licet laboriose) auferas, ac mox ⁷² quatuor neruorum crus petentium radices exortusq; inuenias, quos reperiēs neruos ē lumborum uertebri & sacro ossē profluentes, secundū ipsorum seriem subsequendo. Deductis autē ad crus quatuor neruis, primi nerui ^{lib. 4. char. 57, 60, 66, 71.} sobolem obseruabis, carneæ membranæ in externa femoris sede exporrectam, dein secundi nerui ^{2 eiusd. fig. cha. 58.} sobolem in anteriori femoris sede ad carneam membranā diffusum, atque hic ^{a eiusd. fig. cha. 61.} uenam obseruabis per femoris & tibiæ interiora ad pedis usque summū simul cū illius rami sobole exporrectam. Tertiū nerui ^{b fi. ca. 6 li. 30.} sobolem carneæ membranæ oblatam inuenies, si inguini animum adhibueris. Vt autem quarti nerui ^{c2 fi. ca. 11 lib. 4. cha. 68.} ramum in carneam membranā diffusum inuenias, ^{d eiusd. fig. cha. 72.} primum femur mouentium musculum ab ilium ossē & sacro coccygeq; ad insertionem usque liberabis, moxq; quarti nerui truncum eumq; ramum spectabis. Quo inuento, etiam ^{e 9 muscu. tab. n.} ramum quarti nerui in carneam membranā iuxta poplitem, femorisq; humiliora diffusum absque sectione inquires, & dein quarti nerui ramos tibiæ cuti multifariam simul cum uenis depromptos in carneā membrana peruestigabis. & mox ad inguina reuersus, primi nerui seriem in musculis occultatam cultello per musculos quæres, quod & in secundo & tertio facies: quanquam cum tertio etiam arteriæ & uenæ ^{f2 fi. ca. 11 lib. 4. char. 74.} propagines inueniendæ sint, quæ per pubis ossis foramen in femur delabuntur. Venam autem & arteriam insigniores femur petentes dissectis uiciatisq; musculis sensim adinuenies, & ipsarum obseruatis ramis, progressum eorundē sequeris, quā secundū femoris os re-
torquentur, ac poplitem unā cum quarto neruo adeunt. Atque ubi tria hæc, uenam scilicet arteriam & neruum reperiēs, quī in poplite diuidantur peruestigabis, & musculis ligamentisq; uariē dissectis, uniuersam ipsorum seriem disces. quod sanē feceris facile, quanquam laboriose, si modō horum distributione sedulo prælecta, & meæ de humani corporis fabrica Epitomes tabulis ob oculos positis, exactam ossium musculorumq; cognitionem habueris. Est enim in hominis partibus accuratē discendis diligens ordinis habenda ratio.

DE VIVORVM SECTIONE NONNVL la. Caput XIX.

Quid mortuorum sectione, & quid uiuorum dissectur.



Ossis ac cartilaginis usus in uiuo animæ et quī uidendus.

Ligamentorum usus.

Musculorum usus et functio quī spectatur.

Nerui in musculis usus.

TI sanē mortuorum sectio cuiusque partis numerum, situm, figuram, substantiæ proprietatem, compositionem accuratissimē docet: ita quoque uiui animantis sectio interim functionem ipsam manifestō ostendit, interrim ad huius inuentionem rationationes per commodē exhibet. quare etiam meritō in mortuis animantibus primū studiosi ueniunt exercitandi, ut postmodum actionem usumq; partium inquisituri, promptē uiuum animal aggrediantur. Cæterum quum corporis permultæ sint particularæ, differentibus actionibus uisibsq; dicatæ, multiplices quoque uiuorum sectiones esse, neminem ambigere decet. In ossibus enim, ut seriatim singula pertractemus, à uiuorum Anatome petimus, num corporis hæc optimum fulcrum ac firmamentum sint, numque omnia his adnascantur ad stabilitatemq;. quum enim uiui animantis os aliquod ruptū cernimus, uniuersum membrum fracturæ subiectū collabi, neq; amplius firmari intuemur: quod quia crebrius casu obuenit, in ossium usu indagando uiuorum sectionem non magnopere requirimus. Cartilagine quoque simili ratione quædam firmare, quum franguntur, discimus: in articuli uerò alicuius dissectione, uidemus quid cartilago præstet, etiam si hanc in uiuo animante non obeamus, atq; ita etiam ligamenti ossa colligantis usus in mortuis quoque uisitur, ut & ligamentorum etiam transuersim tendinibus obduktorum, dum enim ^{a4 muscu. tab. 8.} transuersum in brachialis interna sede positum ligamentum diuidimus, ^{b 4. muscu. tab. 8. 5. tab. 8. 5. tab. 8. 5. tab. 8. 5.} musculumq; digitorum secundos aut tertios articulos flectentem ad suum principium trahimus, id uidemus in hoc potissimum factum, ut tendines, quominus ē sua sede exurgant, contineat. quanquam id in cane uiuo etiam licebit cernere, si obiter cutem à cubito & manu, ut ita dicam, extrema liberaueris, & cultello transuersum in brachiale ligamentum, & alia quæ in externa ulnæ radī sede ad brachiale habentur, diuiseris. mox enim quum canis suo impetu digitos flectet, & extendet, tendines ē suis sinibus subleuari cernes. Atque in hac eadem administratione musculorum actionem specularē, quum illos in se, ubi maxime sunt carni, colligi crasse cære, & rursus produci graciles que fieri uidebis, prout collecti partem attrahunt, aut remissi eductiq; eam ab alio musculo in contrarium uelli sinūt, aut etiam alioquin suam collectionem non exercent. Neque id hīc in cubito duntaxat est obseruandum, uerū altius ab eodem cane cutis est adimenda, ut brachium uniuersum axillaq; denuderetur, & nerui per axillam in id prorrepentes appareant, atque ex illis aliquem laqueo intercipias, cuius seriem in musculos quosdā pertinere cognoueris. Verū quū canis neruorū & hominis nuerus

72 fi. ca. 12 lib. 4. char. 57, 60, 66, 71.
2 eiusd. fig. cha. 58.
a eiusd. fig. cha. 61.
b fi. ca. 6 li. 30.
c2 fi. ca. 11 lib. 4. cha. 68.
d eiusd. fig. cha. 72.
e 9 muscu. tab. n.
f2 fi. ca. 11 lib. 4. char. 74.
ita tota reliqua quar ti nerui seriem inde pete.
g ulni. fig. lib. 3 li.

a4 muscu. tab. 8.
b 4. muscu. tab. 8. 5. tab. 8. 5. tab. 8. 5.
c2 muscu. tab. 8. 5. tab. 8. 5. tab. 8. 5.
res 1, 2, 3, 4, 5, 6.

rus distributione non admodum conueniat, suaserim ut quum hanc sectionem in uiuo cane obiturus es, mortuum quoque ad manum habeas, in quo neruorum per brachium & cubitum excurrentium seriem didiceris, atque ita neruum aliquem inueneris, qui in musculos quosdam digeritur, uti ferè illi erunt, quorum alter in homine tertius est, ac secundum anteriorem cubiti articuli sedem in cubitum fertur: alter uerò quintus, secundum posteriorem humeri tuberculi regionem in cubitum properans. Huiusmodi enim nerui in cane etiam obseruantur, & illis alibi priusquam ad cubiti articulum pertingant ligatis, motus aboletur musculorum digitos & brachiale flectentium, unde si & illum neruum etiam uinculo interceperis, qui in homine mihi quartus numeratur, atque secundum humerum ad externum ipsius tuberculum porrigitur, etiam motus abolebitur musculorum brachiale & digitos extendentium. Conduxerit autem huiusmodi neruos laqueis interciperi, quo illis modo in hoc modo in illo neruo solutis musculorum motum restitui obserues, lam musculo alicui muris forma donato (quales hic in cubito occurrunt plurimi) longam sectionem induces, quæ uentrem totum penetrat, ut musculi illius motum, huius sectionis gratia non perdi expendas. Dum autem transuerfam sectionem uentri induces, tantum musculi motum aboleri uidebis, quanta erit sectionis profunditas. Atque quum uentrem prorsus diuides, musculum ad insertionem ipsius una parte, alia uerò ad exortum colligi obseruabis, si uerò alterius musculi tendinem præscindes, musculum uersus exortum conuelli cernes. Item si caput diuideris, is ad insertionem contrahetur. Si uerò insertionem & caput abtruncaueris, musculus ad ipsius uentrem sedemque qua maximè carneus est conglobabitur, itaque musculorum functio tibi hæc molietur erit obuia. Si autem priuatim nerui alicuius, aut musculi functionem inquirendam duxeris, eum neruum & musculum, ut iam in brachio & cubito faciendum præcepti, aggredieris. Neque est quod hic prolixè commemorem, qualiter in his administrationibus canes aut eius generis animalia ligare conueniat, quum quisque pro sua industria, si modo in mortuorum sectione adamussim uersatus fuerit, hæc omnia rectissime obiturus sit, & circa mortuorum sectionis peritiam in uiuorum Anatome omnia in cassum tententur. Adeo ut de neruorum musculorumque sectione mihi nihil dicendum superfit, quanquam &

*Nerui uti
suis exam.*

*Dorsalis me-
dulla.*

Venarum.

Arteriarum.

de neruis recurrentibus paulo post quædam subiiciam. Ut autem uideas num⁶ nerui substantia, aut membranæ illam induentes animalem uim præcipue porrigat, opportunè feceris, si cutem femoris tibie & pedis auferas, ac primo femur mouentium musculo à suis exortibus liberato, quantum femur petentem neruum inquireas: & huius membranæ à nerui substantia detractis, expendas qui pedis digiti ipseque pes adhuc moueatur, ipseque neruus concreditur. Verum si quis medullæ dorsalis munus rimari statuisset, ac uiderè cuperet, qui ea læsa, partes læsioni subditæ sensum motumque perdant: huic licebit canē ita asseri cupiam autem trunco alligare, ut dorsum ceruicemque porrigat, quo dein grandiori cultro uerbrarum aliquot spinæ præscindi queant, tandemque dorsalis medulla ea sede nudari possit, quam quis secandam arbitrabitur, nihil enim facilius est, quam tunc uidere motu sensumque subditarum sectioni partium abolepti. Caterum in uenarum usu inquirendo, uix quoque uiuorum sectione opus est: quum in mortuorum Anatome assatim discamus, eas sanguinē per uniuersum corpus deferre, & partē aliquam non nutriri in qua insignis uena in uulneribus præscinditur. Item in arterijs uiuorum sectionem uix requirimus, quanquam licebit alicui⁷ arteriam in inguina procedentem nudare, uinculoque interciperi, ac intueri partem arteriæ uinculo sustentam, non amplius pulsare. Atque ita leui negotio obseruatur in arterijs sanguinem natura contineri, si quando arteriam in uiuis aperiamus. Ut autē certiores fiamus, pulsant diuim non arteriæ inesse, aut contentam in arterijs materiam pulsuum opificem existere, uerum à corde eam uirtutem pendere, præterquam quod arteriam uinculo interceptam non amplius sub uinculo pulsare cernimus, licebit inguinis femoris uel arteriæ longam sectionem inducere, & canaliculum ex arundine tam crassum assumere, quanta arteriæ est capacitas: & illum ita sectioni indere, ut superior canalis pars altius in arteriæ cavitatem pertingat, quam sectionis superior sedes: & ita inferior quoque canalis pars, deorsum magis ipsa inferiori sectionis parte protrudatur, ac dein uinculum arteriæ circundetur, quod ipsius corpus super canalem stringat. Quum enim id sit, sanguis quidem & spiritus per arteriam ad pedem usque excurrit, uerum tota arteriæ pars canali subdita non amplius pulsatur. Soluta autem uinculo arteriæ pars canali subdita, non minus quam superior pulsum ostendit. Quanta uerò uis à corde per arterias cerebro deducatur, postea uidebimus: nunc Galeni uiuam in hac demonstratione confectionem summopere mirantes, qua omnia præscindi suadet quæ cerebro & cordi sunt communia, semper omittens⁸ arterias, quæ per transversos uerbrarum ceruicis processus caput petunt, & etiam non medio cretam portionem uitalis spiritus in⁹ primos duræ membranæ sinus, atque ita etiam in cerebrum deferunt, adeo ut non mi-

rum

d. 2. 3. fig. ca. 6.
u. li. 4. r. 7. 8.
cus lib. ult.
figure T.
c. 2. 3. fi. ca.
u. li. 4. r. 8. et
ult. fig. m.
f. 2. 3. fig. ca.
u. li. 4. r. 8. et
ult. fig. c.

g. Inimam
nerui substā-
tia, & duas
illi obdu-
ctas membra-
nas ostendit
15. fi. ca. 14.
huius libri
a. b. 7.
h. ut in 10.
mus. lib. 4.
ratiū est a.
et uidetur f.
i. 2. 3. fig. ca.
u. li. 4. r. 8. et
7. et ult. fi-
gura 12.
h. fi. cap. 12.
u. li. 3. p.

1. fig. cap. 12.
u. li. 3. p.
m. 7. fi. p. p.
et 2. 3. fig.
9. fi. 8. 8. et
T. T.

rum sit, cerebrum diutius in illa administratione suo munere fungi, quam commodè Galenus fieri arbitrabat. respirat enim in hac sectione diuissimè animal, & aliàs mouetur. si uerò currit, itaq; multo spiritu indiget, non multo post concidit: quanquam adhuc postea cerebrum animalis spiritus substantiam recipiat, ab illis arterijs quas per transuersos cervicis ueritebrarum processus caluariam petere recensui. Cæterum hoc loco ubi de uiuorum sectione obiter tantum pertractandum duxi, haud proposui Galeni aut rectè, aut minus rectè celebratas uiuorū sectiones recensere: quum hic abundè fecero, si perfunctoriè aliquot sectiones recenseam singulis libris dicatas. Atque quum iam ad quintum usque sit deuentum, modò de nutritionis organis sermonem insituemus, quorum munus ferè in mortuorum sectione etiam discimus. Videmus enim peritonæū omnium ipso complexorum organorum esse inuolucrum, omentum ut & mesenterium uasorum deductioni & distributioni optimè subseruire, uentriculum cibos & potum conficere, hosq; per stomachum huc deferri. Quanquam & uiuos canes, qui modò paulo aut multo antè cibum sumpserunt uiuos aggredi, atque ita etiam intestinorum munus rimari, nihil prohibeat, lecoris autem officiū, ut etiam lienis, aut renum, aut uescicæ, in uiuorum sectione uix melius quàm in mortuorum intueri possumus. nisi quis uiuo cani lienem excicare uoluerit, uti & ego aliquādo feci, diebusq; aliquot canem asseruauī. Atque ita etiam renem aliquando excui: uerū uulneris curatio molestior est, quàm quæ hinc sumitur cognitio iucunda, nisi quis nō tam organorū cognitionis ratione has sectiones aggredere, quàm ut manum exerceat, ac abdominis uulnera aptè suere discat: quod & in intestinis studiose experiendum est, quo quis uulnerata cōsuere, atque in abdomen quum exciderint, imponere assuescat. Verū hæc perinde ac ossium luxationes, & fracturæ quas in brutis, ut & medicaminū quorundam uires aliquādo tentamus, exercendis potius manibus, & rectæ curationi instituendæ, quàm organorum officijs indagandis conducunt. Porrò uiuas sectiones instrumentorum generationi subseruientium indies ferè in ramicum curationibus, & in animalibus quæ castrantur obseruamus. atque illæ propemodum uasis seminarijs & testibus spectandis sufficiunt: nisi quis illam quoq; addere uelit, qua testis substantiam ex tunica ipsi proximè obducta eximimus, aut etiam à seminarijs uasis testis substantiam unā cum illa tunica uerendum. Verū in scetuum uiua administratione iucundum est spectare, qualiter simulatq; scetus aërem ambientem contingit, respirare nititur. Atque hæc sectio opportunè in cane aut lue obitur, quum nō multo post ille est paritura. Si enim ipsius abdomen ad peritonæi usque cavitatem diuideris, atque dein uterum quoque in unius scetus sede aperueris, ac secundina ab utero liberata scetū mensæ imposueris, cernes per pellucidas membranasq; ipsius tunicas, qualiter frustra respirare conatur, & ueluti suffocatus moritur. si uerò ipsius inuolucra pertuderis, scetusq; caput illis liberaueris, mox illum ueluti reuiuiscere, & eleganter respirare cernes. Atque quū id in uno scetu in da gaueris, alium aggredieris: quem ab utero nō liberabis, uerū apertum uterum ita inflectes: & inferius illic aperies, ubi scetus secundinum desinere, aut secundinæ inferiorē partem haberi arbitraberis, quo scilicet ea uteri pars integra seruetur, quæ secundinæ obnaſcitur, per reliquam uerò sedem scetus detectus sit. ita enim spectabis arteriarū uteri, & dein secundinæ pulsum: & scetu adhuc in suis membranis ueluti sursum protruso, cernes umbilicum petentū arteriarum motum, & scetum nondum respirare, neque etiam ad respirationem conari. mox uerò atque membranas pertundes, scetus respirabit, & umbilici arteriarum pulsus intercidet, pulsantibus interim adhuc uteri arterijs. In cordis & pulmonis functionibus pleraq; expendimus, motum uidelicet pulmonis, & num aspera arteria eorum quæ bibuntur portionem assumat: dein cordis dilationem & cōstrictionem, num idem rhythmus sit pulsus cordis & arteriarū, & dein qualiter uenalis arteria distendatur ac cōprimatur, & qui ex cō corde animal adhuc uiuat. In quibus obseruadis, magnoperè animali indigeremus lato pectoris osse donato, & mēbranas thoracem intersepientes tam distantes obtinente, ut diuiso secundum longitudinem pectoris osse, sectionem inter eas membranas ad cor usque ducere possimus, citra thoracis cavitatem (quibus pulmones continentur) pertusionem. Verū quum nullum eiusmodi animal præter hominem, & non caudatam simiam occurrat, in canibus ac porcis illisq; animalibus quorum nobis datur copia, sectiones ita sunt aggrediendæ, ut prædicta omnia intuearis. Quod itaque pulmo thoracis motum sequatur, hinc patet, quòd sectione in aliquo costarum intervallo ad thoracis usque cavitatem ducta, læsi lateris pulmonis pars concidat, neque amplius cum thorace distendatur, reliqua adhuc pulmonis parte thoracis motum sequente: quæ etiam mox concidet, si & in altero latere sectionē in thoracis usque cavitatem molieris, atque ita animal etiam si thoracem aliquandiu moueat, non minùs morietur quàm si suffocatum esset. Verū in hac administratione obseruandum uenit, ut sectionem quàm proximè ad superiorem alicuius co-

Forū que peritonæo continetur functionem examinet.

Generationis organorum.

Scetuum.

Cordis ipsius subministrantium partium usus examinet.

*in l. 5. f. 30
lib. 5. f. 30
ta. K. et 3 et
4 ta. Q. R.*

*o. fig. li. 6
G. G. et 1, 1.*

stæ ducaſ, ne ad inferiorem ſectionem dirigens, uafa hæc exporreſta pertundas, tum enim ſanguis illinc profluere, qui æris per uulnus immiſſi & emiſſi gratia, ſpumofus redditus, pulmonis loco tibi imponeret. Incautè enim ſecantibus eiufmodi ſpuma pulmo eſſe uidetur, ipſiſq; pulmonem aliquandiu etiam ſua inſita ui diſtendi opinantur. Vt uerò naturalem pulmonis cum thorace ſequelam uideas, ex altero latere duarum aut trium mediarum coſtarum cartilagineſ diſſecabis, & ſectionibus per illarum coſtarum interualla ductis, ſingulas coſtas extroſum reflectes, ipſasq; franges, quo opportunitate cõſtituas ſedem, per quam lateris illaſi pulmonem uidere queas. quum enim thoracem intercipientes membranæ in canibus admodum pellucidæ ſint, per facile eſt, per eas pulmonis partem thoracis motum adhuc ſequentem intueri, ac illis etiam membranis leuiter pertuſis conſiderare, qualiter & ea pulmonis pars intercidat. Priuſquàm tamen eas pertuſas, cõduxerit arteriæ uenalis propagineſ in eam pulmonis partem, quæ iam cõcidit, manibus apprehendere, & aliquouſq; ab ipſis ſubſtantia pulmonis liberare, ut diſcas num ille perinde atque cor moueatur. Cordis enim motus etiam hic tibi eſt conſpicuus, præcipuè ſi cordis inuolucrum diuiferis, atque ab illo cor in eo latere detexeris, ubi hanc adminiſtrationem molieris. Conduxit uerò hanc in ſiniſtro latere tentari, ut ſcilicet dextra pulmonis pars adhuc moueatur, & etiam uniuerſum arteriæ uenalis truncum manu apprehendere queas. In huiufmodi quoque adminiſtratione non inutiliter cordis baſim apprehendes, & uno uinculo uafa ab ipſa prodeuntia ſimul & oculus intercipientes, ac dein ſub uinculo cor excecabis, ſolutisq; quibus animal colligatum eſt laqueis, currere ſines. Vidimus enim aliquouſque etiam ita affectos canes, ſed præcipuè feles, cucurriſſe. Caterum cordis motus, ut & arteriarum, rectiùſ ſpectabis, ſi mox atque canem aſſeri alligaueris, ſectionem à iugulo per coſtarum cartilagineſ, quæ illæ oſſibus continuantur, in utroq; latere acuto admodum cultro duces, ac mox ab unius ſectionis ſine tranſuerſim ad ſinem alterius ſectionis, tertiam ſectionem in peritonæi uſque amplitudinem molieris, & leuato pectoris oſſe cum ipſi coarctatis cartilaginibus, & ſepro tranſuerſo ab ijs liberato, pectoris os ad animalis faciem ſurſum reflectes, ac mox diuiſo cordis inuolucro, una manu cor apprehendes, & alia arteriam magnam dorſo exporreſtam continebis. Quanquã hæc omnia melius obibis in ea uiua ſectione, quam inter alias utpote uberiorè in ſcholis exhibere cõſueui, atq; hanc ideo ſimulatq; nonnulla de cerebro ſubiunxero, perſcribam prolixius, ut ab alijs leuiori negotio etiã aggredi poſſit. In cerebri igitur ipſiusq; partium examine, parum omnino in uiua ſectione uidendum eſt, quum hic uelimus noliſ, uel theologorum noſtratum cauſa, memoriã, rationem, & cogitationem brutis animalibus adimere debeamus, utcumque illis cum homine eadem ſit conſtructio: atque ita Anatomes ſtudioſus, & in mortuorum ſectione uerſatus, nullaq; hæreſi infectus, probè intelligit, quàm malè mihi cõſultum uelim, ſi quod aliàs longe lubentiſſimè facerem, de cerebri uiua ſectione aliquid inſtituerem. Quòd tamen ad ſenſum & motum attinet, uidere eſt, cerebro ablato utruſq; perire. Atque hic eadem indagandi eſt ratio, quam in neruorum adminiſtratione præcepimus. Num uerò cerebri ſentiat, in homine uenit inueſtigandũ: qui quũ id ſcinditur, aut premitur, indicet num dolore afficiatur, num ue quo cerebrum alteratur, ſentiat, uti in capitis uulnere indies experiri integrum eſt. Rurſus caluariã canis poſſe frangi, & cerebri uentriculum aut dextrum aut ſiniſtrum aperiri, ac qui animal motum perdat, illumq; denuò ocluſo uentriculo recipiat, neminem ambigere arbitror. Porro ſectionem quam me deſcripturum paulo antè pollicebar, in prægnante cane, aut ſue aggredieris: quanquam uocis occaſione ſuam accipere magis conueniat. canis enim aliquandiu ligatus, utcumq; illum afficias, ſubinde neque latrat, neq; ululat: itaq; uocis ablationem aut reſolutionem interdum expendere nequiſ. Primũ igitur animal ut ſupinum iaceat, anterioremq; colli ſedem, & liberum corporis truncum porrigat, aſſeri ita quàm poteris ualidiſſimè alligabis, quemadmodum hic modò interieſta tabella proponit: quanquam id quiſq; pro ſua induſtria, rerumq; copia facile præſtabit. haud enim arduum eſt aſſerem quempiam ſumere, cui foramina inſint, ligandis cruribus apta: aut ſi nulla adſint foramina, promptè aſſeri duo baculi ſubijciuntur, illisq; crura aduinciuntur. Inter cætera autem, ſuperioris maxillæ præcipua habenda eſt ratio, ut illa ualidè aſſeri firmetur, quod feceris catenula, aut cor da quapiam robuſtiore ante dentes caninos ligata, ac dein cuiſpiam aſſeris anulo, aut foramini, aut ut commodius duxeris commiſſa, ut ſcilicet collum exporreſtum, caputq; immotum ſit, &



Cerebri ſum-
tionis exa-
men.

Viua ſectio,
quæ præſtat
ac beneuolens
Anatomes
ſpeculationem
colopho addi-
teri ſolent.

interim animal libere respiret clameſq. Priuſquā uerō animal ita uincitur, ſpectatoribus in mortuorum Anatome uerſatis recenſere ſoleo, quā potiffimū præſenti ſectione ſint utdendā, ne proluxa in diſſectione enarratio operi obſit, illamq. interturbare cogar. Mox itaque longam in collo ſectionem acutiori nouacula duco, quæ cutem & ſubiectos illi muſculos ad aſperam uſque arteriam diuidat, id cauens, ne ſectio in latuſ aberret, uenamq. notatu dignam uulneret. dein manibus arteriam aſperam compræhendo, & illam ab incumbentiſ muſculis digitorum duntaxat opera detegens, ad huius latera ſoporales arterias, illiq. attenuſos ſexti paris neruorum cerebri neruſ perquiro, dein recurrentes neruſ lateribuſ aſperæ arteriæ adnatos etiam obſeruo, quos interdum laqueis intercipro, interdum præſcindo, idq. primum ex altero latere, ut neruo hic intercepto præſecto ue dilucidè obſeruetur, qui media uox percat, totaq. ambobuſ neruiſ læſis intercicat, & ſi laqueos ſoluo ruruſ redèat. id enim citò & citra inſignem ſanguiniſ fluxum expenditur, ac pulchrè auditur, quā ualidā effluſionem animal citra uocem molitur, recurrentibuſ neruiſ cultello diuiſiſ. Hinc ad abdomen uenio, & acuta ualidaq. nouacula ſub ſpuriarum coſtarum cartilaginibuſ, mucronatāq. pectoriſ offiſ ſede ſectionem inſtar ſemicirculi uno ductu ad peritonæi uſque cauitatem molior, ex cuiuſ ſectioniſ medio ad pubem uſque aliā tento, quæ promptè ſuccedit, ſi cultrum aut nouaculam peritonæi amplitudini indēm, itaq. inſtina & utrū ſectibuſ diſtentiſ duabuſ illiſ ſectionibuſ detegem, id ſedulò ſtudens, ut perituſ ſodaliſ pollicem^a uafiſ obdat, quæ ſub pectoriſ offe deſcendentia abdomen petunt. illa enim ſola hæcenus multum ſanguiniſ fundunt. Hic modò ſectioni uicinioreſ hortor, ut manu^b ſepto tranſuerſo adhibita, ipſiuſ motum experiātur: diſſitoſ autem, ut uentriculi & iecoriſ ueluti in thoraciſ cauitatem aſſumptionem & diſmiſſionem ſpectent. Interea in altero thoraciſ latere longam ſectionē ad coſtarum uſque oſſa duco, ad eam ſerè regionem, quā coſtæ in cartilaginē^c degenerant. & dein ſecundū coſtarum oſſa tranſuerſaſ ſectioneſ molior, ut oſſa incumbētibuſ muſculiſ aliqua ex parte liberem: & dein ſi operoſiorem adminiſtrationem ſequi uiſum ſit, intercoſtales muſculos in duobuſ coſtarum interualliſ à tunica coſtaſ luccingente auellam, ut dein mediā inter illa interualla coſtam ſolarum manuum auxilio à tunica coſtaſ luccingente auellam, illaq. à ſua cartilagine fracta, & deorſum in latuſ inſlexa, magna tunica coſtaſ luccingentiſ appareat amplitudo, quæ pellucida pulmoniſ motum utcunq. arguat. Hac inſuper pertuſa, uidetur qui huiuſ lateriſ pulmo concidat, thorace interim a quē ut priuſ moto. Vt uerō id magiſ in conſpicio fiat, plura coſtarum oſſa à ſuiſ cartilaginibuſ libero, & quā poſſum maxime hoc thoraciſ latuſ^d aperio, ut commodè per membranaſ thoracem interſepienteſ, altera pulmoniſ pars, quæ in thoraciſ cauitate nondum læſa pulchrè cum thorace mouetur, in conſpectum ueniat, ac deincepſ illiſ membranaiſ pertuſiſ, hæc quoque mox à perforatione concidere uideatur. Nunc in altero etiam latere acutiori cultro, una ſectione coſtarum oſſa à cartilaginibuſ diuulſiſ thoracem interſepientibuſ membranaiſ, ſurſum ad collum reſecti queat, cordiſq. inuolucrum in conſpectu ſit. quod ilico cultello aperiendum eſt, obſeruandūq. quantum aquæ contineat, & qui cor agitur. Verū cordiſ motui non diu animū adhibebiſ, quin potiuſ ut animaliam ſerè propter concidenteſ pulmonēſ ſuffocato ſuccurres: ut dein adamuſſim ruruſ cor arteriaſq. & ſætuſ in utero contentoſ, quandiu uiſum erit, examineſ. Hæcenus enim ſanguiniſ fluxuſ parum incommōdi animali intulit, ſi modò illa quæ ſub pectoriſ offe repunt^e uafa ſodaliſ diligenter pollice, aut indice & medio obturauerit, atque pectoriſ oſ ſurſum ad collum reflexum iaciat, itaq. ob uaforum obliquitatē illa nihil ampliū fundant. quod & in uafiſ coſtiſ ſinguliſ exporrectiſ ſit, quum coſtæ effractæ deorſum, uui fieri ſolet, euertuntur: ipſeq. dum ſectionē adminiſtrāſ, uafa tantisper dum obliquēntur ocludere admiſiſ fueriſ, illorumq. ſerieſ te non fugerit. utcunq. ſit, mihi in hac ſectione ſanguiniſ fluxuſ obſeſ nūquam uiſuſ eſt. Vt uerō uita animali quodāmodo reſtituatur, foramen in aſperæ arteriæ caudice tenandū eſt, cui canaliſ ex calamiſ aut arundine indetur, iſq. inſtabitur, ut pulmo aſſurgat, ac ipſum animal quodāmodo aërem ducat. leui enim inſtatu in uiuō hoc animali pulmo tantum quanta thoraciſ erat cauitaſ intumet, corq. uireſ denuō aſſumit, & motuſ differentia pulchrè euariat. Inſtato igitur ſemel atque iterum pulmōne, cordiſ motum uiſu tactūq. quantum lubet examineſ, & arteriæ magnæ caudicem dorſo explicatam, aut in thoraciſ cauitate, aut ad lumborū uertebras comprēhendiſ, & ſpectaſ pariter, nihilq. tibi manifeſtuſ occurrit, quā cordiſ & arteriarum pulſuum rhythmuſ, quo aliquandiu obſeruato, pulmō ruruſ inſtandū eſt: hocq. artificio, quo mihi gratiūſ in Anatome nullum comperi, magna pulſuum differentiā cognitiō paranda. Quum enim pulmo diu flacciduſ concidit, unduſuſ, formicāſ, & uermiculariſ cordiſ arteriarumq. pulſuſ mo

Nerui re-
currentiū exa-
men, uociſ ſe-
ctione
abolitiō.

Sæpi tranſ-
uerſi ſectio-
niſ examē.

Pulmoniſ
motum.

Aquæ in cor-
diſ inuolucro
repoſita, cor-
diſ motuſ
examē.

Num cordiſ
arteriaſ
pulſuſ ſit,
examē.

ſpectaſ ſuiſ
ſum ſicut
figuram ca-
piti 9. li. 4.
impoſita.

a 6. muſcu-
tab. a.
b 7. muſcu-
tab. a.
c Inter T et
S 6. muſcu-
ta.

d Quaſi pe-
ratur eſt
fig. lib. 6.

e Quaſi 2
fig. li. 6. pe-
ratur.

f 2. fili. 6.
B, C, D, E.

tuſ ue

tus^{ue} spectatur, inflato autē pulmone, magnus rursus & uelox efficitur, mirasq; inæqualitates proponit, & ut semel dicam, hæc administratio eiusmodi est, qua omnium optime pulsum naturam medicinæ candidatis proponere soleo. Verū in horum examine foetuum gratia non diu hærendum est, sed in aliqua bicorni canis suis^{ue} uteri sede, sectionē super foetum aliquem duco ad² extimum ipsius usque inuolucrum penetrantem: quo deinceps ab utero diuulso, foetum cū suis inuolucris extimo, & effracto extimo, medioq; inuolucro, per intimum ualde pellucidum ostendo, quī foetus respirare conetur, quamq; pulchrē intimo quoque inuolucro fracto aërem ducat. Mox proximum foetum, quantum possum detego, uterum nulla ex parte ab extimo inuolucro diuellens, ut hic ita foetus uasorum natura examinetur, uti prius uiuam foetuum dissectionem faciendam præcepi. Et quum hæc facio, ac per interualla pulmonem inflari curo, nondum cordis & arteriarum motus latet, uerū magno admodum interuallo animalis uitæ succurritur, & cordis¹ auricularum motus expenditur, perinde ac¹ arteriæ uenalis, & rursum² uenæ arterialis: quæ si non sat sit proximè ad cor tetigisse, in aliqua pulmonis fibra ipsius substantiam à uasis unguibus discerpo, & quod hīc animaduertendum est, pro spectatorum industria obseruari sino. Quum hæc absolui, dextrum cordis uentriculū aperire soleo, & obseruare quī cor nihilominus adhuc moueatur: dein³ sinistro similiter aperto, aut cordis media parte transuersa sectione⁴ ablata, spectatores moneo, ut adhuc auricularū cordis motum nondum quiescere intueantur. Dein si animali potius colore aliquo infectus ante sectionem oblatus sit cuiusmodi ille in pulmonibus occurrit, perquiro: hac sectione, quam pro spectantium eruditione adhuc operosiores interdum instituo, toti Anatomiciæ speculationi colophonem in nostris scholis perinde addens, atq; huic meo de Humani corporis fabrica studioforum nomine suscepto labori, finem impono.

Foetuum
examen.Arteriæ ue
nalis, cy uenæ
arterialis mo
tuum examen.LIBRI SEPTIMI ET VLTIMI
FINIS.

depravatorum emendatio lectio.

*Pag. 8. vers. 1. legem. friabili 10. 35. brachiale 13. 30. fissureosis 17. 40. cartilagine 19. 45. PFLVEGEL 43. 39.
 delatense 51. 29. confinxisse 54. 7. secunda figure 73. 27. connexum 76. 27. excipit 78. 51. uocatum, secundum excep. 49. 51.
 figura decem 81. 45. continua 89. 7. insensibilis 111. 24. comprimitur 114. 32. immoreri 135. 55. additiones 139. 27. transposui
 132. 16. infusatum 135. 49. plurimis 65. eleganter 136. 10. suo 157. 27. certius 158. 16. nihilq. non 167. 2. appuadit 171. 2.
 173. 16. insinuatum 135. 49. 174. 16. 175. 16. 176. 16. 177. 16. 178. 16. 179. 16. 180. 16. 181. 16. 182. 16. 183. 16. 184. 16. 185. 16. 186. 16. 187. 16. 188. 16. 189. 16. 190. 16. 191. 16. 192. 16. 193. 16. 194. 16. 195. 16. 196. 16. 197. 16. 198. 16. 199. 16. 200. 16. 201. 16. 202. 16. 203. 16. 204. 16. 205. 16. 206. 16. 207. 16. 208. 16. 209. 16. 210. 16. 211. 16. 212. 16. 213. 16. 214. 16. 215. 16. 216. 16. 217. 16. 218. 16. 219. 16. 220. 16. 221. 16. 222. 16. 223. 16. 224. 16. 225. 16. 226. 16. 227. 16. 228. 16. 229. 16. 230. 16. 231. 16. 232. 16. 233. 16. 234. 16. 235. 16. 236. 16. 237. 16. 238. 16. 239. 16. 240. 16. 241. 16. 242. 16. 243. 16. 244. 16. 245. 16. 246. 16. 247. 16. 248. 16. 249. 16. 250. 16. 251. 16. 252. 16. 253. 16. 254. 16. 255. 16. 256. 16. 257. 16. 258. 16. 259. 16. 260. 16. 261. 16. 262. 16. 263. 16. 264. 16. 265. 16. 266. 16. 267. 16. 268. 16. 269. 16. 270. 16. 271. 16. 272. 16. 273. 16. 274. 16. 275. 16. 276. 16. 277. 16. 278. 16. 279. 16. 280. 16. 281. 16. 282. 16. 283. 16. 284. 16. 285. 16. 286. 16. 287. 16. 288. 16. 289. 16. 290. 16. 291. 16. 292. 16. 293. 16. 294. 16. 295. 16. 296. 16. 297. 16. 298. 16. 299. 16. 300. 16. 301. 16. 302. 16. 303. 16. 304. 16. 305. 16. 306. 16. 307. 16. 308. 16. 309. 16. 310. 16. 311. 16. 312. 16. 313. 16. 314. 16. 315. 16. 316. 16. 317. 16. 318. 16. 319. 16. 320. 16. 321. 16. 322. 16. 323. 16. 324. 16. 325. 16. 326. 16. 327. 16. 328. 16. 329. 16. 330. 16. 331. 16. 332. 16. 333. 16. 334. 16. 335. 16. 336. 16. 337. 16. 338. 16. 339. 16. 340. 16. 341. 16. 342. 16. 343. 16. 344. 16. 345. 16. 346. 16. 347. 16. 348. 16. 349. 16. 350. 16. 351. 16. 352. 16. 353. 16. 354. 16. 355. 16. 356. 16. 357. 16. 358. 16. 359. 16. 360. 16. 361. 16. 362. 16. 363. 16. 364. 16. 365. 16. 366. 16. 367. 16. 368. 16. 369. 16. 370. 16. 371. 16. 372. 16. 373. 16. 374. 16. 375. 16. 376. 16. 377. 16. 378. 16. 379. 16. 380. 16. 381. 16. 382. 16. 383. 16. 384. 16. 385. 16. 386. 16. 387. 16. 388. 16. 389. 16. 390. 16. 391. 16. 392. 16. 393. 16. 394. 16. 395. 16. 396. 16. 397. 16. 398. 16. 399. 16. 400. 16. 401. 16. 402. 16. 403. 16. 404. 16. 405. 16. 406. 16. 407. 16. 408. 16. 409. 16. 410. 16. 411. 16. 412. 16. 413. 16. 414. 16. 415. 16. 416. 16. 417. 16. 418. 16. 419. 16. 420. 16. 421. 16. 422. 16. 423. 16. 424. 16. 425. 16. 426. 16. 427. 16. 428. 16. 429. 16. 430. 16. 431. 16. 432. 16. 433. 16. 434. 16. 435. 16. 436. 16. 437. 16. 438. 16. 439. 16. 440. 16. 441. 16. 442. 16. 443. 16. 444. 16. 445. 16. 446. 16. 447. 16. 448. 16. 449. 16. 450. 16. 451. 16. 452. 16. 453. 16. 454. 16. 455. 16. 456. 16. 457. 16. 458. 16. 459. 16. 460. 16. 461. 16. 462. 16. 463. 16. 464. 16. 465. 16. 466. 16. 467. 16. 468. 16. 469. 16. 470. 16. 471. 16. 472. 16. 473. 16. 474. 16. 475. 16. 476. 16. 477. 16. 478. 16. 479. 16. 480. 16. 481. 16. 482. 16. 483. 16. 484. 16. 485. 16. 486. 16. 487. 16. 488. 16. 489. 16. 490. 16. 491. 16. 492. 16. 493. 16. 494. 16. 495. 16. 496. 16. 497. 16. 498. 16. 499. 16. 500. 16. 501. 16. 502. 16. 503. 16. 504. 16. 505. 16. 506. 16. 507. 16. 508. 16. 509. 16. 510. 16. 511. 16. 512. 16. 513. 16. 514. 16. 515. 16. 516. 16. 517. 16. 518. 16. 519. 16. 520. 16. 521. 16. 522. 16. 523. 16. 524. 16. 525. 16. 526. 16. 527. 16. 528. 16. 529. 16. 530. 16. 531. 16. 532. 16. 533. 16. 534. 16. 535. 16. 536. 16. 537. 16. 538. 16. 539. 16. 540. 16. 541. 16. 542. 16. 543. 16. 544. 16. 545. 16. 546. 16. 547. 16. 548. 16. 549. 16. 550. 16. 551. 16. 552. 16. 553. 16. 554. 16. 555. 16. 556. 16. 557. 16. 558. 16. 559. 16. 560. 16. 561. 16. 562. 16. 563. 16. 564. 16. 565. 16. 566. 16. 567. 16. 568. 16. 569. 16. 570. 16. 571. 16. 572. 16. 573. 16. 574. 16. 575. 16. 576. 16. 577. 16. 578. 16. 579. 16. 580. 16. 581. 16. 582. 16. 583. 16. 584. 16. 585. 16. 586. 16. 587. 16. 588. 16. 589. 16. 590. 16. 591. 1*

RERVM ET VERBORVM

IN PRAECEDENTIBVS DE HVMANI CORPÖRIS

FABRICA LIBRIS MEMORABILIVM INDEX, IN QVO PRIMVS NV
merus paginam, secundus uersum indicat. Animaduertendum tamen etiam, quibus numeris * adiectus
est, in secundo alphabeto querendos esse. quod ideo obseruauimus, ut errorem in
numeris à pagina 312 usque ad finem libri tertij, operarum incu-
ria commissum, emendaremus.



BARTICV

latio. 13.8

abdomē cur

nō etiā ossēū

creatū. 89.18.

& 505. 50

abdominis

membrana,

335. 45.

abdominis musculi recti pars, qua si

mię abundante, & cancs 282. 35

abdominis musculi transuersi, 356. 4.

& 355.

abdominis musculi transuersi à pe-

ritoneo separatu difficilis, 283. 1.

abdominis musculorum octo descri-

ptio. 280. 50. oblique descendētis,

281. 11. ascēdētis. ead. 42. recto-

rum descriptio. 282. 12. transuer-

forum. ibidem 46.

in Abdominis musculorum descri-

ptione uarij Galenus 283. 6.

abdominis musculorū functionem

inepte assignat medicorū uulgas.

283.

abdominis musculorum uenæ ac ar-

teriae. 355. 21.

abdominis musculorū usus, 283. 10.

abdominis musculorum octo admi-

nistratio. 549. 25. eorundem ad-

ministrandi modus duplex. 285. 33.

prior, qui sit à musculorum exortu

oblique descendētis, 283. 43. ascē-

dētis. 284. 7. recti. ead. 34. transuersi,

45. Alter modus, ab iporū termi-

nis. oblique descendētis, 284. 56.

ascēdētis oblique. 285. 9. recti.

ead. 14. transuersi

16.

abdominis musculorum delineatio.

oblique descendētis. 179. ult.

ascēdētis, 183. 2. recti, 185. 46.

transuersi, 188. 34.

abdominis musculos solos nouisse

uidetur Medicorū uulgas. 283. 27.

abdominis sectio. 548. 57. inde

αἰκασία. 167. 31. 33.

αἰκασία. 57. 28.

acceptabulum

10. 25.

acerabulum

10. 2. 25.

acerabulum herba. 539. 27.

acerabulum femori articulando pa-

ratum 130. 53.

acetabulum in coxendicis ossē, & hu-

mero 5. & 6. 44.

acerabulum uteri examen. 558. 28.

acies digitorum quæ 121. 48.

αἰκασία. 116. 3.

αἰκασία. 99. 23. 54. & 100. 3. & 167. 55.

αἰκασία. 167. 55

acuale os. 166. 57

acus sectionibus apti. 236. 50. 60-

rundem delineatio 235

adaicon. 168. 3

Adami morsus os. 167. 27

additamentum. 7. 18. & 8. 1

additamentum necatum. 168. 14

* αἰκασία quid. 261. 29.

αἰκασία. 525. 18. & 526. 51

adepts, αἰκασία. 233. 28.

adepts quid. 233. 28. ubi sit copiosior.

ibid. 31. qbus sit copiosior. ibid. 41

adepts cur albet. 233. 50.

adepts intestinis obnatus. 501. 51.

adepts mesenterij. 505. 2.

adepts omenti. 497. 19.

adipis omenti usus. 497. 51.

adipis administratio, siue relectio.

234. 1. & 548. 56. & 549. 10.

adipis delineatio 231. 30

adipis usus quis 233. 41. & 51

adiutorij brachij 168. 4

adnatum 7. 18

adnexus 7. 18

Aegyptis cur præcisi ab Athenien-

sibus pollices 125. 1

Aegyptiorū pudendi muliebri ca-

runculas amputandi mos 537. 2

aër qui in respiratione digeratur.

569. 27

aëreæ substantiæ rescindendæ quas par-

tes Natura fabrefecerit 569. 27. inde

ætas nostra rerum capitibus potius

quam proluxa enarratione gaudet

521. 5

αἰκασία. 11. 6. & 168. 13

agis os 168. 28

al Arabum articulus. 385. 56

ala omenti superior quid 358. 15. &

humilior. ead. 13

alæ nasi 351. 27

alagatos 167. 40

albadaran officulum 126. 55

alberiteren 385. 56

Alberti Magni de menstrui sangui-

nis prauitate error 558. 18

Alberti Magni de fecretis mulierum

indocissimus liber 531. 13

alcaicos 167. 28

Alfud, Alfaud, Alphaed 387. 49

αἰκασία, secundū foetus inuolu-

crum ueteribus appellatum 542. 4

αἰκασία musculi 297. 14

alterati color in nutritione alteranti

similis 508. 10

αἰκασία 237. 23

αἰκασία 11. 1

αἰκασία membrana cuiusmodi, & cuf

dicta 542. 46

αἰκασία tunica 647. 41

amygdalæ faucium quæ 579. 46

αἰκασία 502. 15

Anatome priuata publice præferen-

da 547. 35

anatomia hæcenus obseruata ratio

inutilis 155. 40

anatomes studiū cum Galeno pror-

us collapsum 83. 14

anatomes studio ueteres exercere pu-

eros soliti 83. 22

ad Anatomen cuiusmodi corpus ad

hiberi conueniat. 548. 10

* anatomen spectantium notata ne-

gligentia 222. 6

in Anatome docenda qui ordo ob-

seruandus 547. 44. inde, per totū

anatomicorū instrumentorū descri-

ptio 236. eorundē delineatio 235

anatomicorum de cordis ossē error

94. 13

anatomicorum de cordis orificijs di-

uersa placita 590. 34

anatomicorum de intestino caeco nu-

gæ 500. 18

anatomicorum de pylori sinu error.

390. 28

anatomicorum de uentriculi cellulis

error 391. 35

anatomicorū de uentriculi exteriorē

tunica in fundo nimis carnosae-

ror. 392. 10

Anchæ os 163. 20. 28

anchoraformis processus 168. 1

αἰκασία processus 98. 23. & 163. 1

10. ANDREAE ALBII HO-

spitalitas 78. 50

And. Vesalij admonitio ad lectores

& typographos 267. 47

And. Vesalij primum compingē-

di sceleti tyrocinū Louanij factum

161. 46

αἰκασία 168. 116

anima Galeno quid 569. 28

de Animæ facultatibus ac sede con-

siderare, Medici quoque officium

594. 45

animarū immortalitatis disputatio-

nem solos Theologos sibi uendi-

care 126. 48

animellæ quæ 579. 56

αἰκασία 290. 47

anæ ossium tēporum 167. 10

ANTONIVS ZVCCA 260. 55

αἰκασία dicta Herophilo, cutis hu-

mana 231. 43

I N D E X.

glandulę quę 579.

Gracis, pollex 124. 54

139. 36. & 141. 11. & 168. 33

nuli a quodam deglutiti, tursusq;

excreti historia 390. 46

anum referens in cerebrō orificiū

638. 44

* *ἀσπὴρ* dicta arteria 294. 47

ἀσπὴρ intestinum 502. 14

ἀσπὴρ musculorum 220. 22

* apoplectica arteria 296. 45

ἀσπὴρ 8. 13

ἀσπὴρ cum *ἐμπύρε* subinde ab

alijs confundi 8. 43

Appendix 7. 13. inde

appēdices in ætate provecioribus

pertinacius adherere. 7. 26

appendices in natu grandioribus co-

alitate ossibus 12. 32

appendices in pueris ab ossibus sæ-

pius quā articulos luxari 27. 24

appendices interdum ossium capita

Galeno dici 9. 42

appendices nō solum grandioribus

ossibus cōtingere 7. 53. & quibus

possimū eodem

appendices sinuum medullam conti-

nentū non esse opercula 7. 40

appendicū connexus in iunioribus

solum speculatu facilis 8. 11

appendicū & processū differen-

tię 8. 22

appēdicū femoris, ilium ossis, &c.

dehneato 5. & 6. 14. inde

appendicū processus. 8. 29

applantatio 7. 18

Aqua in cordis inuolucro cuiusmo-

di, 584. 47. eiusq; causa 585. 4

Arabum, de Carne substantia ma-

nus, internę regiōni superstrata,

notata sententia 303. 56

Arabum sententia, de musculorum

intercostalium numero 290. 14

Arabum auctorū, de testium muscu-

lis notata sententia 286. 4

ἀσπὴρ dicta oculi tunica 646. 44

ἀσπὴρ intestinum 501. 14

arcualia ossa 166. 39. & 167. 10

arcualis futura 166. 27

Aristoteles unde cor neruorū prin-

cipium esse iudicari 591. 56

Aristotelis locus de articulorum mo-

tu 65. 10

Aristotelis de auditorij organi mea-

tibus lapsus 52. 57. inde

Aristotelis de costarum numero sen-

tentia 89. 54

Aristotelis de crurum in animalibus

flexione, &c. dogma 145. 18

Aristotelis sententia de dentium nu-

mero, notata 46. 46

Aristotelis de effectiūo hominis

principio sententia 520. 43

Aristotelis de humeri cum cubito ar-

ticulatiōe lapsus 107. 15

Aristotelis de lienis usu sententia ex-

pensa 513. 14

Aristotelis de mamillarum situ ra-

tio 545. 46

Aristotelis de mamillarum *σπυγδα*

sententia 544. 16

Aristotelis de ossium continuitate lo-

cus 12. 3

Aristotelis locus de ossium per clauū

connexu. 15. 43. et de tñu tali. ead. 50

Aristotelis de postbrachialis ossibus

sententia 120. 9

Aristotelis de quadrupedū genū ar-

ticulo lapsus 139. 14

Aristotelis de feminalib. arterijs fan-

guine destitutis opinio 526. 5

Aristotelis de septo transuersio sen-

tentia 291. 51

Aristotelis lapsus de futurarū in ui-

ris ac mulieribus differentia 26. 50.

item de canum caluarijs ead. 54

Aristotelis de tertio cordis uētriculo

lapsus. 590. 55. item de uētricu-

lorum numero pro animalū mole

uariare solito eod.

Aristotelis de thorace sententia 88. 39

Aristotelis libri de Animalium histo-

ria 90. 2

Aristotelis locus de futura inter uen-

triculum & omentum, &c. 357. 19

Aristotelis notata sententia, sefenū

cutis 232. 23

Aristotelis nullam generandi femi-

nis uim testibus tribuenus senten-

tia 527. 16

Aristoteli omenti pars colon dorso

colligans, pro omento non habita

496. 1

Aristoteli superior tantum omenti

membrana cognita 496. 12

Aristotelem falso cordis inuolucro

pinguedinem tribuere 584. 23

Aristotelem ubi de epiglottide agit,

perperam ab interpretibus intel-

lectum 155. 6

armalia ossa 166. 54

arquato laborantis lien cuiusmodi

512. 21

Arterialis uena. uide Venā arterial.

arterialis uenę appellatio 590. 19

arterialis uenę orificij membranarū

ratio 597. 39

arterialis uenę usus, ipsiusq; constru-

ctionis ratio 596. 44

* arteria quid sit 259. 13. compo-

sitiō eius. 37. & delineatio. ibidem.

Compositiōis ratio 260. 5

* arteria *ἀσπὴρ* Aristoteli quę 294. 49

* arteria apoplectica, lethargica, som-

ni, subeteni. quę 296. 44

* arteria Aristoteli, Platoni, Hippo-

crati, quę 259. 16

Arteria aspera præcipuum uocis or-

ganum 577. 2. 50

* arteria asperę appellatio quando

cepta 259. 34

arteria aspera, quibus cartilaginibus

constituatur 595. 56

arteria asperę cartilagine, 3. 35.

earundē usus & ratio 577. 41

arteria asperę cartilagine, quā inui-

cem colligentur 576. 27

arteria asperę examen. 602. 53

arteria asperę exterior superficies

qualis 575. 12. item interna. ead. 23

arteria asperę figura. 151. 32. eiusq;

cartilaginū descriptio. ead. & 152.

per totum. & 153. 8. inde

arteria asperę gratia datum homini

collum 63. 6

arteria asperę numerus, ac situs 574.

9. forma. ead. 37. cōnexus. 575. 17.

substantia. ead. 41. inde

arteria asperę pulmonī insertę deli-

neatio 568

arteria asperę ratio & situs. 62. 53.

inde

arteria asperę ratio acutus 153. 14

arteria asperę tunica exterior & in-

terior 576. 37. inde

arteria asperę tunicarum apta con-

struēdo 578. 30

arteria asperę usus, ipsiusq; constru-

ctionis ratio 577. 1

arteria asperę commissa corpora

574. 21

arteriam asperā membranea substan-

tiam oportuisse extrui 577. 10

* Arteria magnę appellationes ua-

rię 294. 47

arteria magna quartum cordis tras,

eiusq; orificiū cuiusmodi. 590. 42.

& origo. eod.

* arteria magnę ortus 298. 40. or-

tus sedes 299. 2

* Arterię caudicis bipartitio. 299. 19.

Partis ascēdētis distributio 299. 23.

quę ad sinistri lateris primā costā

oblique rēdit. ibid. quę sinistrā axil-

lam petit. 300. 1. quę dextrā. 301. 1.

Maior portio, suprema corporis

petens. 300. 53. sopolalis sinistra.

ibid. 56. dextra 301. 6. sopolalis

ad caluariam series. 301. 10.

* Arterię partis descendētis distri-

butio. 301. 39. quę ad inferiora co-

stārū interualla. ibid. 42. ad septū

transuersum. 56. quę ad iecur, bilis

uēsicā, uētriculū, lienē, duodenū,

colicę partē accēdit portunculę.

302. 1. quę mesenterij accēdit præci-

pua. 302. 47. ad renes. ibid. 50. ad

partē mesenterij humiliorē. 303. 7.

ad lumborū uertebras. ibid. 11.

Arterię magnę supra os sacrum fa-

cta diuisio, eiusq; supra cauā ascen-

sus. 303. 17. partium huiusce distri-

butionis distributio. 303. 32. quā pu-

bis ossis foramen transit. ibid. 47.

per crura distributō. 304. 6. quā

tibiā adit. ead. 22.

* Arterię magnę per uniuersū cor-

pus delineata distributio. 295. bi-

partitio. 296. 2. ascendētis partis

delineatio. ibid. quę axillā petit.

296. 26. sopolarię utriusq; deline-

atio. 296. 43. caluariā petēs. ead. 54.

* Arterię partis descendētis distribu-

tio delineata. 297. quę ad inferiora

costarū interualla, septum, secur, bi-

lis

- līs uescam, ventriculū, lienem,
 duodeni, colicq; partem. 297. 12. 6.
 quæ ad renes utriusq; ibid. 4. 6.
 * Arteriæ supra os sacri diuisio deli-
 neata. 297. 54. per crura distribu-
 tio. 298. 17. &c.
 arteria cur causæ solum iecoris sedi ex
 portecta 508. 45
 arteria dextræ & sinistræ lateris ab um-
 bilico in magnam exportecta. 356.
 & 357. 8
 arteriæ cauum iecoris & bilis uesci-
 lam petentis figura 358. & 359. 20
 arteriæ in uescam distributæ ratio
 518. 28
 arteriæ magnæ cum corde situs deli-
 neatio. 564. eiusdem orificium. 557
 arteriæ magnæ & causæ uenæ distri-
 butionum sub ossē sacro examen
 556. 23
 arteriæ magnæ in mesenterium ex-
 cursus 504. 34. 44
 arteriæ magnæ membranæ cuiusmo-
 di 592. 56
 arteriæ magnæ non idem cum sto-
 macho per septum foramen 388.
 36. inde
 arteriæ magnæ orificij delineatio u-
 bi querenda 589. 42
 * arteriæ magnæ ortus non contro-
 uersus 298. 44
 arteriæ magnæ per thoracem & in-
 gulum collumq; distributionis exa-
 men 601. 10
 arteriæ magnæ series in peritonæi am-
 plitudine qui obseruanda. 554. 30
 arteriæ magnæ seu arterialis uenæ ra-
 dicis figura 93. 39. 56
 arteriæ magnæ super cauum uenam
 ascensus, ambarūq; supra sacri os-
 sis initium diuisio 370. & 371. 30
 * arteriæ ramus, cuius pulsum ante
 brachiale exploramus. 300. 28. Eius
 delineatio 296. 34
 * arteriæ tunicæ peculiare binæ. 259.
 42. tunicæ alciuitiæ 260. 5
 arteriæ uenalis ad cordis basim et pul-
 monem connexæ delineatio. 564.
 16. inde
 * arteriæ uenalis descriptio 312. 17
 delineatio 311. 54
 arteriæ uenalis appellatio, & descri-
 ptio eiusdem 590. 25
 arteriæ uenalis, eiusdemq; orificij deli-
 neatio ubi querenda 589. 42
 arteria uenalis & magnæ membranæ
 cuiusmodi 598. 52
 arteriæ uenalis examen 601. 14
 arteriæ uenalis in corpore ratio. 598
 23. eiusdem usus 583. 10. 40
 arteriæ uenalis membranæ cuiusmo-
 di 592. 15
 arteriæ uenalis pulmonis insertæ deli-
 neatio 568
 arteriæ & uenæ coli & recti intestini
 501. 40
 arteriæ ac uenæ gracilium intestino-
 rum 499. 38
 arteriæ ac uenæ in musculorū fabri-

caufus. 220. 35
 arteriæ ac uenæ renibus oblata. 515. 15
 arteriæ ac uenæ uentriculū peten-
 tes 392. 22. inde
 * arteriæ Coronales. 299. 9. earumq;
 descriptio. ibid. delineatio 296. 1
 * arteriæ cur pluribus tunicis quā
 uena, conformata 260. 14
 * arteriæ neq; a cerebro neq; ab extre-
 mis corporis partibus nascuntur
 298. 52
 arteriæ omenti 497. 12
 * arteriæ feminales. 302. 53. earūdem
 delineatio 297. 46
 arteriæ feminales an sanguinis exper-
 tes 526. 4
 arteriæ uitalem spiritum foetui defe-
 rentes 518. 39
 arteriam soporale non ferri per idem
 foramen cum tertio ac quarto ner-
 uorum pari 52. 32
 * arteriarū ac uenæ umbilici descri-
 ptio. 284. ortus. ead. 7. ductus. ead.
 25. usus. ead. 28
 arteriarum & uenarum in intestinis
 ratio 503. 35
 * in Arteriarum ac uenarū serie Na-
 turæ artificium 260. 46
 arteriarū anatomes ratio. 552. 4. inde
 * arteriarum cerebri delineatio. 305
 arteriarum diductibus subditæ glan-
 dulæ. quære Glandulæ.
 * arteriarum in animali numerus.
 260. 20
 arteriarum in iecur excurrentium ra-
 tio 507. 36
 arteriarum per abdominis musculos
 repentium administratio 549. 35
 arteriarum per manum tendentium
 examen. 656. 26 per crura. 657. 49
 arteriarum testes petentium ratio. 523.
 17. inde
 * arteriarum trium caluariæ subeun-
 tium descriptio. 307. 2. quæ in pri-
 mum duæ membranæ sinum ex-
 hauriuntur. ibid. 49. tertiæ
 arteriæ series. 310. 18. omnium deli-
 neatio 305. 47
 arteriarum uentriculi munus. 493. 6
 * arterias recondens Natura. 300. 43
 arthrodia 12. 22. & 14. 9
 ἀρθροδια 103. 11
 arthrodiā quando constituerit Na-
 tura 14. 13
 ἀρθροδια 9. 22
 ἀρθροδια. ἀρθροδια 13. 2
 articulatio, articulus. 13. 3. & 9. 22.
 & ead. 48
 articulus totius corporis dignissimus
 quis 65. 16
 articuli 121. 48
 articuli capitis motibus parati. 64. 8
 articuli duplices quibus modis for-
 mentur 14. 55
 articulorum cartilagines. 42. ac ui-
 scidus humor. ead. 10.
 articulorum cōpositionis triplex for-
 ma 13. 40
 articulorū motus non eadē ratio. 13. 3

articulorū per ligamenta cōitus. 17. 31
 articulos omnes non isdem agi mo-
 tibus 13. 20
 artus 7. 14
 artuum capita, non recte τριφύτοι: &
 καρδιαὶ Galeno dici 9. 48
 arundo brachij minor 168. 9.
 maior. 12. 28. inde
 ἀρὺν τανυστὶν, ἀρὺν τανυστὶν cartilago. 15. 4. 12
 Aseth 168. 4
 alinae uterus acetabulorum ex-
 pers 540. 9
 aspera melius terere quā leuia. 46. 7
 asser os 167. 44
 asserum nexu 16. 4
 ἀσπὸν γὰρ 145. 38. & 168. 44
 ἀσπὸν ead.
 Atlas uertebra 167. 35
 Ἀὐχλὺς 10. 11. & 167. 35
 auditorius meatus 52. 46. 51
 auditus instrumentum 650. 8
 auditus instrumentum Anatomicis
 parum probe cognitum 323. 42
 auditus organi examen 656. 12
 auditus organi officula. 33. 50. & 34.
 4. Galeno ignorata ead. 37.
 auditus organi ossa quot 162. 37
 auditus organi ossiculorum usus. 350
 33. & harmonia. ead. 49.
 auditus organo parata cauitas, fora-
 mina q; in ipsam pertinentia. 34. 29
 auditus organorum constitutio 31.
 29. inde
 auditus ratio difficilior cognit. 35. 38
 * Auicenna, Persa 227. 30
 * Auicenna, unde Anatonem descri-
 pserit 227. 30
 auium iecoris situs 505. 46
 auriculæ cordis. uide Cordis auriculæ
 auri cartilago. 4. 53. eiusdem descri-
 ptio. 150. 40
 inde
 aures quibusdam cur mobiles 242.
 53. & 150. 43
 aurium ossa 166. 49
 aurium situs 19. 7
 axillaris uena. quære Vena axillaris.
 axillarum ualli, musculi 267. 41.
 ἀξίλων 67. 25
 * ἀξίλων dicta uena 279. 28
 B.
 Bafise os 168. 46
 basillare os 166. 46. &
 167. 2. siue basillare. 4
 Βασιλίδης 11. 7. & 106. 23
 Βαλαυστὶν processus.
 & 166. 56
 31. 40.
 beriteron, berbetinen 385. 57
 Biliosus naturis peculiare quid. 511. 5
 bilis in intestina defluxus utilitas.
 510. 45
 bili excipiente & emittente parati
 meatus 509. 33
 bilem expurgare ubi conduxerit
 510. 27
 bilis uesicula carentes quosdam repe-
 riri, ab Aristotele & Plinio prodi-
 tum 511. 7
 bilis uesiculæ, eiusdemq; meatuū de-
 lineatio 365. 7. inde. & 366. 26
 K k 4 bilis

bilis uesiculae delineatio 370. 18
 bilis uesicula in uentriculum meatus
 493. 9. in iecore. 507. 35. eorumq;
 situs ratio 508. 4. 4
 bilis uesiculae meatus cur duodeno
 insertus 503. 4. 4
 bilis uesiculae meatus duodeno infer
 tus, an propaginem uentriculo of
 ferat 509. 51
 bilis uesiculae situs. 509. 5. forma. ead.
 14. substantia, 20. uenae, arteriae
 & nerui 26
 ex Bilis uesicula meatum in uentricu
 lum non semper pertinere. 510. 21
 bolus dulcis 359. 56
 boum cerebra crebrius Galeno tra
 ctata 32. 49
 Brabantis omentum plumae nomi
 ne dici 497. 48
 brachiale quid 117. 1. & 168. 15
 brachiale ab ulna diuidens cartilago.
 113 55
 * brachiale in supinum & pronum
 non agitur, contra quam Galenus
 tradidit 215. 19
 * brachiale mouentium musculorum
 administratio. 223. primi & secun
 di. ead. 3. tertij. 224. 6. quarti. ead.
 32
 * brachiale mouentium musculorum
 descriptio. 214. 3. primus. ibid.
 secundus. tertius. quartus. ibid. 26.
 munus omnium 215. 4
 brachiale mouentium musculorum deli
 neatio. primi. 183. 18. secundi.
 180. 14. tertij. 195. 54. quarti.
 201
 brachiale octo ossibus. constitui, inter se
 forma differentibus 117. 2. inde
 brachialis ad tarsum proportio. 147.
 55.
 brachialis ad cubitum articulus. 117. 48
 brachialis cum radio articulatione. 113.
 41. inde
 * brachialis motus quot. 214. 1
 brachialis os rectum, & cartilagino
 sum, quod nam 118. 14. 16
 brachialis ossa quibus sedibus, aut
 cartilagine aut ligamentis obducun
 tur 117. 14
 * brachialis ossa necessitum ligamen
 torum descriptio 220. 55.
 brachialis ossa quot. 149. 20. & 162. 42
 brachialis ossa quot alijs ossibus. con
 termina 118. 29. inde
 brachialis ossium cur duo ordines. 117.
 26. eorumdem nomina, & articula
 tio cuiusmodi. ead. 37. inde
 brachialis ossium delineatio. 115. &
 116. 10.
 Brachium, brachium. 105. 2. & 168. 3.
 Brachium quid appellet Hippocrates.
 99 57
 brachium paruum 168. 3
 * brachium totum, manus Hippocra
 ti dictum 220. 1
 brachij adiutorium. 168. 4. cana. ead.
 brachij & femoris in quadrupedi
 bus & aubus Aristoteli ignoratum.

15.
 brachij motus 13. 23. & 264. 14
 brachij motus tam uarij unde 102. 56
 brachij motorum musculus quispiam
 Galeno descriptus, quo simiae ac
 canes abundant, homines carent.
 266. 41. eiusdem musculi descri
 ptio, in simia, cane, & bobus. 267. 1.
 administratio 268. 50
 brachij motorum musculus primus,
 quo pacto duorum loco haberi que
 at 263. 7
 brachij motorum secundus muscu
 lus, perperam a Galeno in plures
 diuisus 270. 16
 brachij motorum quintus, circue
 rentium primus, a Galeno non de
 scriptus 267. ult.
 brachij os. 168. 3. eiusdem figura. 5.
 & 6. 10 & 2. eiusdem descriptio
 & figura 104. 5. & 105. 1. inde
 * brachij totius ligamentorum descri
 ptio. 220. 4. administratio. 223. 55.
 & 224. 45
 brachium adducens musculus quo
 simia abundat 263. 14
 brachium attollens musculus quis.
 264. 48
 brachium attollentibus musculis de
 scribendis, Galenus uarijs. 265. 21
 brachium ac scapulam mouentes mu
 sculi, in quibus animalibus ab ho
 mine maxime uariant 270. 3
 brachium mouens musculus quispi
 am male a Galeno assignatus. 263.
 49. & 14
 brachij mouentes musculi, num re
 spirationi quoque seruiant. 292. 47.
 & 293. 13
 brachium mouentium tertius muscu
 lus, non recte a Galeno inter circue
 rentes brachium relatus. 265. 46.
 & 270. 53
 brachium mouentium quarti muscu
 li ortus ac functio non recte a Ga
 leno tradita 266. 23
 brachium mouentium musculorum
 administratio. 268. 27. primi. 269.
 16. secundi. 270. 7. tertij. ibid. 50.
 quarti. 24. quinti. ibid. ult. sexti.
 271. 3. septimi 270. 55
 brachium mouentium musculorum
 delineatio. 176. 34. secundi. 182. 40.
 tertij. 191. 20. quarti. 198. 27. quin
 ti. 204. 11. sexti. 191. 16. septimi.
 201. 12
 brachium mouentium musculorum
 descriptio. 462. 22. primi. ibid. se
 cundi. 264. 28. tertij. 265. 30. quarti. i
 bid. 53. quinti. 267. 46. sexti. se
 ptimi. 266. 5
 brachij pectori adducens musculus,
 quo simiae abundant 263. 14
 brachij petentes nerui. quere Nerui.
 * in Brachio musculi quot 222. 2
 Brachij ossa 166. 38
 brachij ossa 359. 55
 bucca saporita 359. 56
 buccae mouentium musculorum de

lineatio. primi & secundi. 179. 101
 tertij & quarti. 182. 20. & 185. 5. quin
 ti & sexti. 179. 18. septimi & octa
 ui 182. 20
 buccae & labra mouentium muscu
 lorum descriptio. 244. primi & se
 cundi. ead. 22. tertij & quarti. 243. 17.
 & reliquorum quatuor. 244. 5. eo
 rundem administratio. 244. 5. primi
 & secundi. ead. 11. tertij & quarti.
 246. 5. & reliquorum quatuor. 245.
 35.
 buccella 10. 26
 buxii cultri ad sectionem quomodo
 parandi 236. 29

C



Accum foramen. 53. 12
 caecum intestinum cuius
 modi. 362. 11. & 500.
 9. in cane. 33. in gliribus.
 & sciuris. ead.
 caecum intestinum unde dictum. 500. 33
 caeci intestini an duo officia. 500. 25
 caeci intestini ortum in cane & homi
 ne uariare 500. 42
 Caelij Rhodigini lapsus 66. 32
 calaminum os 166. 57
 calamo assimilatus ab Herophilo ce
 rebri sinus 635. 12
 Calx aduulgus 168. 45
 calcar capitis 166. 56
 calcar pedis 168. 48
 calceus latus internum quale. 147. 5. ex
 ternum ead. 16. pars anterior. ead. 21
 calceus ossis figura 5. & 6. 6
 calceus ossis figura 142. & descriptio.
 143. 10
 calceus ossis sedes terram spectans. 146.
 41. eiusdem superior sedes, extra
 tibiae rectitudinem retrorsum du
 ctia. 50
 calceus ossis sinus 146. 31
 * Calx aduulgus 261. 38
 Calx aduulgus quid 497. 29. & 505. 7.
 callosi corporis cerebri historia. 632.
 21. sedes ac nomenclatura 632. 24.
 initium, seu cum reliqua cerebri sub
 stantia continuas. ibid. 47. late
 ribus adiacentes sinus. 632. 50. usus
 633. 20
 callosi corporis delineatio. quibus in
 locis spectanda 632. 24
 callosi corporis administratio. 632. 21
 calor ingenuus corpori, Galeno ani
 ma 569. 27
 caloris ingenui substantia 569. 39
 caloris natui fomes cor 594. 56
 calua 166. 20
 caluaria cur non solido constet offe
 26. 8. 28.
 caluaria cur pluribus ossibus effor
 mata 11. 91.
 caluariarum anterioris figura. 36. & ra
 tio. ead. 31. & 47. 31.
 caluariarum appellatio. 25. 55. & 48. 4.
 caluariarum balis, seu sedes. 22. 6.
 & 38. 3.
 caluariarum basis interna sedes. 24. 1. in
 de. & 48. 2. & 49. 2.
 caluariae

I N D E X.

caluariae basis exterior facies 48.11.
 & 49
 caluariae figurae 18
 caluariae forma aptiff. quae 19.20
 caluariae nomina 166.19
 caluariae offa cuiusmodi esse oportu-
 erit 28.11
 caluariae offa quot 162.34
 caluariae pars mollissima & rarissima
 quae 30.32
 caluariae ratio 88.52
 caluariae sedes, lapidosa 167.6
 caluariae sinus durae membranae ua-
 sis cedentes 53.47
 caluariae squamae 20.13
 caluariae tabulae 20.17
 caluariae tam integrae, quam seiu-
 ctae figura 20
 caluariae quaedam absque futuris 27.
 6 inde
 caluariam succingentis membranae
 externae descriptio 62.5.12
 calx 163.47. calcis os. ead.
 cameratum dictum corpus cerebri.
 636 37
 canis animal minime pituitosum.
 51 6
 canis caluariae interna superficie abū-
 dans os 32.44
 canis caecum intestinum cuiusmodi.
 500 33
 canis caluariae foramina 51.7
 canis facii ossis descriptio. 81.37. item
 coccygis 82.8
 canes ab homine variantes in muscu-
 lis brachium mouentibus. 266.41
 canes colo & mesenterio ab homini-
 bus differre 496.45
 canes in non paucis partibus ab ho-
 mine uariantes. In musculis tho-
 racis. 287.20. & 52. item 288.55. i-
 tem 289.19. & 30. itē 293.41. & 45.
 item 294.4. & 33
 canū caluaria nō absq̃ futuris. 26.54
 canū & hominū colon differre. 501.16
 canum & hominum *πυλγας* colo-
 ris diuersi 497.30
 canum iecur quale. 506.43. & 507.7
 canum iecoris situs 505.46
 canum omēti ratio, & ad hominis di-
 uersitas 496.42. & 497.3
 canum penis offeus 527.50
 canum renes cur altius siti 514.33
 canibus macilentius obtigisse mēen-
 terium 504.54
 in Canibus nulla cum hominis offi-
 bus similitudo 85.28
 caninae caluariae figura. 36.32. & 37.51
 canini capitis figura 47.32
 canini renis ad humanum differen-
 tia 516.9
 canini uteri delineatio 382.1
 canini dentes 46.1. & 167.19. cur
 dicti 46.3
 canna 168.9.11.38
 canna brachij 168.4
 canulae secantibus aptae. 237.11. de-
 lineatio 235
 caput cur copiosiore euacuatione e-

geat 26.9
 caput cur super primam uertebra-
 non simul & circumducatur, & in
 latera inclinetur 67.41
 caput humanum oculorum gratia ef-
 formatum 18.1
 caput in ossibus quid 9.6.25.49.
 item capitulum ead.
 caput in istar tecū domus calidæ. 26.7
 capitis calcar 166.56
 capitis commissurae 27.43. inde
 capitis figura naturalis quae 19.13
 & 20.21
 capitis figurae naturalis cuiusmodi fu-
 turae 26.38
 capitis figurae aliquot non naturales
 19.23
 capitis figurarum non naturalium cu-
 iusmodi futurae 27.29
 capitis ligamentorum ad ceruicis pri-
 mam secundamq̃ uertebra-
 descriptio. 280.6. administratio. i-
 bidem. 35. delineatio 279.47
 capitis motus lateralis quibus uerte-
 bris committatur 68.9
 capitis motus propius quispiam, con-
 tra Galeni sententiam 276.18
 capitis motuum differentiae 276.1
 capitis motuum observatio difficilis.
 63.14 46. inde
 capitis motorum musculorum par
 primum, cur Galeno tertium sit.
 176 34
 capitis octauum os 32.33
 capitis olla, theca, testa, scutella, etc.
 166 24
 capitis offa cur à maxillae superioris
 ossibus distincta 48.6
 capitis offa futuris circūscripta quo-
 29 54
 capitis ossium foramina, eorumq̃ de-
 scriptio 47.17. & 49.9. inde
 capitis structurae ratio, quocq̃ eius fi-
 gurae 17.46. & pag. 13
 capitis tabulae 20.12
 caput circumuertentium musculorum
 descriptio. 278.10. & 24. admini-
 stratio 279.35
 caput flexi & reflecti super primam
 uertebra- 65.4. & 67.10
 caput mouentium musculorum deli-
 neatio. paris primi. 204.3. secun-
 di paris. 205.36. tertij. 209.19. quar-
 ti. ibid. 27. quinti. ibid. 28. sexti.
 ibid. 30. septimi paris 182.32
 caput mouentium musculorum de-
 scriptio. 276.1.
 caput mouentium musculorum par
 secundum, in homine, à Galeni de-
 scriptione diuersum 277.20
 caput mouentium, sed motu nō pro-
 prio, musculorum traditionem to-
 tā, quare sub Dorsi motoribus. 4.
 paria prima. ratio 297.12
 caput mouentium musculorum po-
 steriorum descriptio. 276.35. par
 eorum primum. ibid. par secun-
 dum. 277.2. & utriusque paris mu-
 nus. ead. 50. par tertium. 277.56.

quartum. 278.51. quintum ac sex-
 tum par. ibid. 10. & horum fun-
 ctio ead. 144
 caput mouentes musculi anteriores.
 eorum descriptio. 278.29. par om-
 nium capitis motorum, septimū.
 278.29. functio binis paribus po-
 steriorum opposita 278.46
 caput mouentium musculorum, iux-
 ta septem parium ordinem, admi-
 nistratio 279.15
 capita ossium non semel *πυλγας* quo
 que Galeno dici 5.42
 capitū in ossibus alia prominētia, alia
 depressa 9.7. & que. ead. 16. inde
 capitum in ossibus differentiae. 9.31.
 quantus earundem cognoscenda-
 rum usus 39
 capita futuris delinita. 27.6
 capita uirorum à mulierum capiti-
 bus non perpetuo futuris uariare.
 26.47 inde
λαγρία 387.48
 carina hominis 167.31
 carnosa membrana. quare Membr.
 carnosa membrana in abdomine ad
 ministratio 548.37. & 549.16
 caro, cur musculis addita 22.0.26
 caro musculorum, praecipuum morus
 organum 222.39.
 carne, quid uocet Aristoteles. 232.30
 * *λαγρία* arteria 301.9
λαγρία quid 117.1. & 168.15
 cartilago brachiale ab ulna diuidens
 113 55
 cartilago, *χόνδρος* 166.13
 cartilago clauiculae articulationis cū
 pectoris osse peculiaris 102.19
 cartilago epiglottalis 93.20
 cartilago glutinis uicem subiens. 4.31
 cartilago in nominata quae 154.5
 cartilago in articulis quibusdam ter-
 tia 4.13
 cartilago inter uertebras triplex. 301.4
 cartilago inter uertebras iuxta Gale-
 ni sententiam quid praestet. 300.33
 cartilago ligamentorum substantiam
 ingreditur 4.35
 cartilago mucronata, siue *figura* *αδης*.
 93.2. eius usus. ead. 17. & 167.46
 cartilago omnibus articulis commu-
 nis. 44.26
 cartilago quid, eiusq̃ natura, usus, ac
 differentiae 3.35. inde
 cartilago scapulae sinum frequenter
 augens 98.3
 cartilago spinarum apicibus obna-
 ta 59.4
 cartilago, tarsus uocitata 238.27
 cartilaginis in ossium connexu u-
 sus 16.46
 cartilaginis temperies 190.54
 cartilaginē osse promptius stringi ac
 dilatari 3.53
 cartilagine aliquid continuo erigen-
 tes 4.38
 cartilagine nasi 151.1. asperae arte-
 riae ead. 32. & 153.9
 cartilagine nudis & extantibus par-
 tuculis

ticulis adnatæ 4.44.51
 cartilagine quibus tibiæ ossis sinus
 augentur 138.44
 cartilaginum costarum cum pecto-
 ris osse, ab ipsarum ossibus libera-
 tio 599.52
 cartilaginum palpebrarum & aurium
 descriptio 150.29.40
 cartilaginum substantia 4.45
 cartilaginea cordis basis 93.35. inde 56
 cartilagineæ cordis substantiæ exa-
 men 602.50
 cartilagineum in vertebris ligamen-
 tum 57.46
 cartilagineæ uasorum radices quo pa-
 cto inquirendæ 94.31
 cartilaginosa os brachialis quod-
 nam dictum ueteribus 118.16
 callos os 167.44
καταλειψ quid 100.5
 Cava uena. uide Vena cava.
 causæ uenæ ad cordis basim conti-
 nuitas expressa 563
 causæ uenæ distributionis per thora-
 cem & iugulum examen 600.48.
 inde
 causæ uenæ & arteriæ magnæ distri-
 butionum sub osse sacro examen
 556.28
 causæ uenæ orificio præfectarum mem-
 branularum usus 597.23
 causæ uenæ ortus examen 602.16
 causæ uenæ series in peritonæi ampli-
 tudine, qui obseruanda 554.30
 caudæ os 167.41
 cauilla 167.5. & 168.46
 cauillæ 168.42
 cauitas auditus organo parata 34.39
 cellulæ coli 362.25
 Cor. Celsus in ijs quæ ad Anatomem
 pertinent, sæpè lapsus 154.56
 Cor. Celsi de arteriæ asperæ forma
 locus 576.9
 Cor. Celsi de incerto brachialis ossi
 numero sententia 117.13
 Cor. Celsi de inferiori maxilla locus
 44.14
 Cor. Celsi de pectoris osse lunatosen-
 tentia 93.7
 Cor. Celsi locus de primis colli verte-
 bris 67.29
λεγειν 281.23
 * cento apud Arabes uenarum quæ-
 dam copia 290.13
λεγαλιν, *λεγαλιν* 9.5.20. & 10.1
λεγαλιν tunica 649.9
λεγαλιν 168.8
 cerebelli delineatio unde sit petenda
 628.42
 cerebelli descriptio totius. 628.45.
 situs ac magnitudo. 629.14. for-
 ma. ibid. 45. implexuum ratio &
 species. 631.1. durities. ibid. 36
 color & substantia. 631.41. quo
 pacto continuu sit cerebro. 629.15.
 administratio 653.27
 cerebelli processum uermiformi de-
 scriptio 639.1 delineatio ubi spe-
 cianda 638.55

cerebelli sedes 31.2
 cerebelli situs 19.17
 Cerebrum cuius animæ facultatis se-
 des 594.37
 cerebrum homini grandius datum
 ex proportionem 507.11
 cerebrum, neruorum principium
 316.39
 cerebrum quo pacto mole in anima-
 libus uariet 624.9
 cerebrum rationis sedes, quale domi-
 cilium natura sortitum 26.1
 cerebrum sensus ac motus arbitrii
 principium, et rationis sedes. 599.13
 cerebri arteriæ. quare Arteriæ cere-
 bri.
 cerebri corpus callosum. quare Cal-
 losum corpus.
 cerebri corpus testudinum camera-
 tum uel eiusque descriptio 636.37.
 usus. 637.34. delineatio unde pe-
 tenda sit. 636.41. administratio.
 652.42
 cerebri delineatio unde sit petenda.
 628.41
 cerebri dura membrana. quare Mem-
 brana dura cerebri.
 cerebri descriptio totius. 628.45. nu-
 merus. ibid. 45. magnitudo & for-
 ma. 629.51. anfractus, & eorundem
 usus. 630.34. partes, dextra ac sini-
 stra. ibid. 15. cur sic sectum. ibidem
 54. & quibus sedibus continue-
 tur. 629.6. durities. 631.37. Col-
 lor. 631.42. substantia. ibid. 43.
 quo pacto ab ossium medulla disse-
 rat. 531.51. nutritioni quo pacto
 prospectum. 632.9
 cerebri, eiusque partium omnium admi-
 nistratio 650.47
 cerebri excrementorum in os descen-
 dentium receptaculum an garga-
 reon 580.37
 cerebri fabrica in brutis ab homine
 non differens 624.4
 cerebri figura 19.16.19
 cerebri galea 166.20
 cerebri glandis descriptio. 637.42
 cerebri infundibulum, glandula, &
 pituitam excipientes ductus reli-
 qui. descriptio omnium. 640.1. de-
 lineatio unde petenda. ibid. 4
 cerebri partium ac functionum bre-
 uis enumeratio 622.21
 cerebri os cuiusmodi à Galeno tradi-
 tum 32.41
 cerebri neruorum quinque surculi tem-
 porali musculo oblati 33.29
 cerebri neruorum parium aliquot e-
 xamen 604.3
 cerebri neruorum historiam quare
 in Neruis cerebri.
 * cerebri membrana uenarum modo
 causæ 307.13
 * cerebri membranae duræ sinus qua-
 les sint. 307.41. cavitates, sinuum
 quatuor quales. 308.28. usus sinu-
 um. 307.41. primi & secundi si-
 nus constructio. 307.55. tertius &

quartus sinus. 308.8. quæ à primo et
 secundo sinu enascantur propagi-
 nes. 308.48. quæ à tertio. ead. 54.
 à quarto. 309.8. processus à quarto
 sinu, cerebri petens uentriculos. ead.
 36. omnium delineatio 305.45
 cerebri membrana tenuis quare Mē-
 brana cerebri.
 cerebri pituita, ad palatum per quos
 meatus eat. 641.42. & in narium
 amplitudinem. ibid. 44
 cerebri pituitam per olfactus organa
 non expurgari 641.46
 cerebri plexus secundas referentis tra-
 ctio 643.3
 cerebri plexuum, reticularis & secun-
 darum plexibus similis, descriptio.
 642.13. delineatio ubi spectanda.
 ead. 16
 cerebri reuolutiones intestinorum an-
 fractus eleganter ab Erasistrato
 collatæ 630.25
 cerebri substantia ab ossium medul-
 la quo pacto differat 631.51
 cerebri testium ac narium descriptio.
 638.18. delineatio unde petenda.
 ibid. 21. administratio 653.37
 * cerebri torcular 309.45
 cerebri uenæ. quare Venæ cerebri.
 cerebri uentriculi. quare Ventriculi
 cerebri.
 cerebri uentriculorum anteriorum du-
 ctus. 323.7. delineatio ead. 11
 de Cerebri uentriculis cōfuta recen-
 titium opinio 623.19
 * in Cerebri uentriculis prioribus con-
 stituitur plexus fabrica. 310.39. deli-
 neatio 306.40
 cerebro dorsalem medullam respon-
 dere natura 58.17.56.
 cerebrum nullis musculis indiguisse
 88
 cerebrum oculorum gratia in capite
 locari, & dein cerebri nomine reli-
 quos sensus * 18.21. & 19.5
 Ceruix 10.12.16
 ceruicis flexioni præfecti musculi. 278.
 56. eorumque administratio. 295.47
 ceruicis motus, alius peculiaris, alius
 dorso communis 295.32
 ceruicis motorum musculorum de-
 scriptio. quare Dorsum mouentium
 musculorum. 4. prima pars, usus,
 sub Vsu eorundem. administratio.
 sub ipsidem. ratio. 297.11. & 277.
 49. & 278
 ceruicis motuum differentia quæ. 276.9
 ceruicis nomina 167.34
 ceruicis uertebra primam secundæ
 necentis ligamenti descriptio. 280.
 30. administratio. ead. 42. deli-
 neatio 279. ultimo
 ceruicis uertebra. uide Vertebra.
 ceruicis uertebrae cuiusmodi. 59.18.
 quot numero 63.12
 ceruicis uertebrae delineatio. 60
 ceruicis uertebrae primæ ac secun-
 dæ ad caput annexio, ligamento-
 rumque descriptio. 280.6. admini-
 stratio.

I N D E X.


stratio, ibid. 35. delineatio. 279. 47
 ceruicis uertebris adnatae ligamen-
 tum quoddam 301. 44. 49
 ceruicis in ossibus qui potius dican-
 tur 10. 20
 ceruini cordis os medicorum impo-
 stura excogitatum 94. 23
 χαλκοῖσιν ossa 148. 3. & 168. 52.
 chamel 385. 52
 χάλυξ 11. 1
 chirurgiae instrumentorum delineat-
 io 329. 20
 χονδρ Graci 640. 38
 χονδρος 90. 22. & 166. 18
 * χονδριον 294. 3. & 541. 56
 χονδριῶν dicta membrana 628. 6
 χονδριῶν oculi tunica 648. 17
 χονδριῶν plexus. 309. 32. & 310. 41. &
 643. 3
 CHRISTI lateris aperturam
 sterijs plena 585. 28
 CHRISTOPHORVS PFLVE-
 GEL SALISPVRGENSIS
 19. 45
 cibo ac potui in corpore, concoquen-
 dis famulantis organa. earumq; ra-
 tio 385. 5
 cibum potumq; uentriculo deferen-
 tis uiae nomina 388. 6
 ciceri assimilatum ossiculum, ac mira
 eius uis 126. 37. inde
 Ciceroni parum recte mesenterium,
 medium intestinum dictum 504. 6
 clisia 150. 26
 κλίσια cur pro gargareone
 circumuersionis motus 580. 17
 κλίσιας ὀφθαλμοῦ 524. 4. 37.
 & 525. 14
 clauales 166. 57
 clauiculæ ad summum humerum ne-
 xus 103. 8
 clauiculæ curuitas, eiusdemq; usus.
 102. 28. 43
 clauiculæ substantia, tubera, asperita-
 tes, leuitates, foramina 103. 12. inde
 clauiculæ tuberculi articulatione 99. 45
 clauiculæ 167. 51. & 168. 42
 clauicularum à pectoris osse libera-
 tio 599. 46
 clauicularū delineatio, 101. inde. ea-
 rundem numerus, & ad pectoris
 oss articulatione, 102. 2. inde. usus.
 ead. 53
 clauies 167. 51
 clauium ossa 167. 40
 κλαυῖον 102. 1. & 167. 51
 κλαυῖον 138. 241. & 168. 36
 clunium ossa 167. 39
 clypeus oris stomachi
 clypeus pectoris 167. 54
 clypeus, pro omento 494. 39
 coarticulatio, 12. 20. & 13. 18
 coccyx, aus, cucus 83. 24
 coccyx, siue coccygis os 1. 46. et
 56. 56
 uide Os coccygis.
 κοκκυγιος appellatio 83. 23. & 85. 27
 coccygis canini descriptio, 82. 9. eius-
 dem foramina 85. 17
 coccygis humani descriptio, 83. 28. in-

de & 84. 43
 coccygis ossis in parturientibus maxi-
 mum momentum 131. 52
 coccygis ossis nomina 167. 40. inde
 coccygis ossis quot ossa 162. 39
 κοκκυγία 166. 20
 cogitationis ossa 166. 40
 * κοιλία dicta uena 276. 54
 κοιλία cur dictus Gracis uentriculus.
 389 30
 coitus pruritus ac delectationis cause
 expense 516. 9. inde
 colatorij os 167. 5
 κολάριον 7. 13
 colon excrementorum uelut prom-
 ptuarium 503. 1
 coli cellulæ 362. 25
 coli in hominibus & canibus disci-
 men 501. 16
 coli intestini à recto differentia. 501. 15
 coli intestini circa tenuia situs. 361. 11.
 & 362. 16 & 501. 14
 coli intestini uentriculi fundo expor-
 recti, etc. figura 358. 19. & 357
 coli principium ubi 500. 51
 coli situs raris 502. 57
 coli tunice ac fibræ cuiusmodi. 501. 20.
 inde. uenæ & arteriæ. ead. 40.
 nerui 50
 κολωνία capita non recte ἐπιφύσεις &
 κολωνία Galeno dici 9. 48
 colo mesenterij uice esse inferiorem
 omenti membranam 496. 24
 collum 10. 11. & 167. 35
 collum asperæ arteriæ gratia datum
 homini 63. 6
 collum homini pulmonū gratia da-
 tum 62. 49
 colli uertebræ. 56. 48. et uide Ceruicis.
 collo carētia uocem non edere. 62. 57
 columella cur pro gargareone. 580. 17
 commissura instar unguium 16. 3
 commissuræ temporū quamose 27. 44
 commissurarum ossa iungentium ty-
 pus. 12. 16. ac differentia 13. 1. inde
 * communis dicta uena 287. 15
 κοινὴ, κοινὴ 163. 31
 κοινὴ, κοινὴ 29. 31. & 166. 19
 concupiscibilis animæ sedes iecur.
 38
 κόνδυλος, κόνδυλοι 9. 20. 48. & 10. 1. 36
 κόνδυλοι digitorum qui 121. 48
 κόνδυλος non recte Galeno dici artu-
 um capita 9. 47
 κωνοειδὴς processus 66. 33
 κωνοειδὴς glans, quæ & κωνοειδὴς* 309.
 38. & 637
 κωνοειδὴς processus. 98. 24. & 167.
 55. & 168. 1
 cor 387. 48
 cor an lienis beneficio refrigeretur.
 514 11
 * cor arteriarum fons, sine auctorum
 controuersia 293. 44
 cor cuius animæ sedes 594. 19. 38
 cor humanum uero osse carere. 95. 54
 cor insidi caloris fomes, & irascibilis
 animæ sedes 96. 36
 cor neruorum esse principium, cur

ab Aristotele proditum 591. 56
 cor neruorum principium non esse.
 316 48
 cor quatuor uasorum ad contermi-
 nas sedes connexu sustineri. 94. 21
 cordis, ipsiusq; partium functio, et u-
 sus, ipsarumq; constructionis ratio.
 594. 15 inde
 cordis, ipsiq; subministrantium partium
 functionis enumeratio. 569.
 36 inde
 cordis à pulmōe liberi. & dextri eius.
 dem uentriculi adaperiti delineatio.
 565. 566. item sinistri uentriculi. 567
 cordis ab ipsius inuolucris prorsus li-
 beri delineatio 563
 cordis adeps 585. 17. & 588. 24
 cordis auri dextra 563. sinistra. 564
 cordis auriculæ dextre usus, & ipsius
 constructionis ratio. 597. 3. item utri-
 usq; ead. 13. sinistra 598. 42
 cordis auricularū delineatio, ubi que-
 renda 593. 7
 cordis auricularum situs. 593. 12. dex-
 tre situs & forma. ead. 18. substantia.
 42. nexus. 47. item sinistra. ead. 53
 cordis basis ratio & usus 595. 25
 * cordis basim cingens uena 278. 56
 cordis caro cuiusmodi. 566. 43. & fi-
 bræ. ead. 49. inde item carnis usus.
 588. 34. & fibrarum. ead. 38
 cordis caro cur in mucrone quàm in
 basi spissior solidiorq; appareat.
 587 29
 cordis carnis usus 598. 20
 cordis cartilagineæ siue osseæ substan-
 tiæ usus. 596. 15. eiusdem examen.
 602 50
 cordis cum suo inuolucro & pulmo-
 ne delineatio 561. & 562
 cordis dextrum latus expressum. 563.
 item sinistrum 564
 cordis dilatio quid 587. 45
 cordis figura. 585. 41. superficies. ead.
 48. magnitudo 586. 32
 cordis formæ ratio 595. 29
 cordis inuolucrum cuiusmodi aquam
 contineat. 584. 47. & cur potissimum.
 585 11
 cordis inuolucrum quibus uasis uitam
 præbeat 583. 41
 cordis inuolucrum quibus uasis ac
 neruis implicetur 584. 39
 cordis inuolucri delineatio ubi quæ-
 renda 583. 28
 cordis inuolucrum examen 600. 32
 cordis inuolucrum forma. 583. 36. initium.
 ead. 49. situs. 584. 4. substantia. ead.
 17. superficies & nexus 22
 cordis inuolucrum usus & constructio
 nis ratio 584. 43. & 595. 1
 cordis membranæ quæ. 591. 30. & quot
 numero. ead. 33
 cordis mucronis ratio & usus. 595. 20
 cordis neruulus. 588. 17. eiusd. usus.
 596 13
 cordis orificiorum membranulæ. ea-
 rumq; delineatio ubi querenda.
 591 23
 de Cordis

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------------|--|--------------------------|-----|
| de Cordis orificijs, Anatomicorum
diuerſa placita | 590.34 | κορφοῦς ossa | 166.33 | 38 | inde | |
| cordis os, ſiue cartilaginea ſubſtan-
tia | 93.34. inde | coſtæ quot | 162.40 | cruris domeſtica canina | 168.39 | |
| cordis offis, ſiue cartilagineæ ſubſtā-
tiæ delineatio | 567.20 | coſtæ ſpurie ſiue nothæ, & legiti-
mæ | 167.50 | crurum in hominibus & quadrupe-
dibus ſimilitudo | 145.1. inde | |
| cordis partes nō aequè omnes digne-
ſunt | 17 | coſtarum ad uertebras articulo. | 91.20. | per Crura tendentium uenarum &
arteriarum examen | 657.49 | |
| cordis partes omnes cui functioni po-
tiſſimum famulentur | 594.56 | earundem delineatio | 87.1. inde | crystallinus humor, ſiue λεπιδωδὴς | 646.25 | |
| cordis per tranſuerſum diſſecti deli-
neatio | 567 | coſtarum aſperum tuberculum. | 91.4 | λεπιδωδὴς | 168.16 | |
| cordis pulſus in uiuo animali examē. | 588 | coſtarum cartilagineæ | 3.52. & 5.2 | λεπιδωδὴς dentes | 167.17 | |
| cordis ſcutum | 167.44 | coſtarū cartilaginū cū peſtoris offe,
ab ipſarū offibus liberatio. | 599.52 | λεπιδωδὴς | 168.16 | |
| cordis ſitus. 561.28. & 585.57. eiufdem
ratio | 595.3 | coſtarum ductus | 93.24 | cubi | 147.36 | |
| cordis ſitus ac formæ delineatio ubi
querenda | 585.34 | coſtarum in cōpingendo ſceletō qua-
lis obſeruanda ratio | 161.16 | cubum referēs os. 148.4. inde. & 168.16 | | |
| cordis ſubſtantiæ delineatio ubi qua-
renda | 566.40 | coſtarum longitudo, amplitudo, læ-
uitas & aſperitas non eadem om-
nium | 90.31. inde | cubiforme os | 168.53 | |
| cordis ſubſtantiæ peculiare uenę &
arterię. 588.13. eidemq; obnata tuni-
ca. ead. | 22 | coſtarū numerus. 89.45. uiris & mu-
lieribus idem | ead.50 | cubitus quid | 109.18. & 110.44 | |
| cordis ſubſtantię ſecundū, ipſius uen-
triculos delineatio | 567.24 | in Coſtarū octo inferiorū inflāmati-
one an mittēdus etiā ſanguis. 602.5 | | cubiti flexus ratio | 106.11 | |
| cordis ſubſtantiæ uſus | 595.37 | coſtarum offeæ ſubſtantiæ delinea-
tio | 87.17 | * cubiti motus duo | 226.50 | |
| cordis uafa quot, & quæ | 589.47 | coſtarum ſubſtantiā & appendix
cuiuſmodi. 7.50. & 90.15. inde. car-
tilagineæ. ead. ſinus. ead. | 47 | cubiti nomina | 168.5 | |
| cordis uaforum & orificiorū eorun-
dē delineatio ubi querenda. 589.40 | | coſtis lingulis peculiaris tūica. 771.39 | | cubiti offium figura | 108.3 | |
| cordis uentriculus dexter cur ſanguis
neus diſtus | 596.20 | coſtas ſuccingens tunica. uide, Tu-
nica coſtas ſuccingens. | | * cubiti ſedis internæ muſculorū nu-
merus. 221.45. externę ſedis. ead. 51 | | |
| cordis uentriculus ſiniſter cur ſpiritu
ſiue æreus appellatus | 598.5 | coſtas ſuccingens tunica altera, uete-
ribus dicta quæ | 295.2 | * in Cubiti ſede externa ligamētōrū
trāſuerſorum adminiſtratio. 223.56 | | |
| cordis uentriculi dextri, & ipſius ori-
ficiorum membranarumq; examē | 601.50. item ſiniſtri | coſtas ſuccingens tunica altera, uete-
ribus dicta quæ | 295.2 | * cubito adiacētibus muſculis obna-
ta membrana. 220.42. obſeruanda
quomodo | 222.31 | |
| cordis dextri uentriculi uſus. | 596.20. | λεπιδωδὴς & γλαυῖος diſcrimen | 10.2.44 | * cubitum brachiali neceſſaria liga-
menta | 221.1 | |
| item ſiniſtri, eiufdemq; cōſtructio-
nis ratio | 598.3 | λεπιδωδὴς | 10.2.44 | cubiti flexentium muſculorū delinea-
tio. primi. 188.49. ſecundi. 193.17. | | |
| cordis uentriculorum delineatio ubi
querenda | 598.36 | λεπιδωδὴς | 10.2.44 | extendentium iidem primi. 201. | | |
| cordis uentriculorum numerus & li-
tus. 588.45. dextri forma. ead. 48. &
ſiniſtri. 54. eorū. ſuperficiēs. 589.10 | | λεπιδωδὴς herba | 539.25 | 50. ſecundi | 175.45 | |
| cornix | 8.53 | λεπιδωδὴς cur uteri acetabula dicta. | 539 | * cubitum mouentes muſculi in ca-
nibus | 219.29 | |
| coronalis os | 166.42 | 539 | 28 | * cubitum mouentium muſculorum
deſcriptio. 216.50. flexentium pri-
mus. 217.8. ſecundus. ibid. 38. am-
borum functio. 218.12. extenden-
tium primus. 218.50. ſecundus. 219.6 | | |
| coronalis ſutura, & φωνιδία. 166.27. &
21.16. & 23.4. cur dicta | 26.41 | coxæ os | 128.55. & 168.21.28 | 5. tertius. ead. 12. adminiſtratio
omnium | 225.4 | |
| coronalis uenę uſus | 595.41 | coxendix | 128.56 | cultelli parui pro ſectiōne apti. 236.6 | | |
| coronalium arteriarum uſus. 596.6. | | coxendicis acetabuli ad uteri acetab-
ula collatio. | 539.2 | 20. earum delineatio | 235.47 | |
| earundem ortus | 11 | coxendicis os. 6.2. & 127.17. & 128.52. & 131.36 | | culturalis cartilago. | 167.48 | |
| κορώνη, καρυνίς | 8.53 | coxendicis offis acutus proceſſus. 131.18 | | cukri è buxo, pro ſectiōne parandi. | 236.29. eorum delineatio | 235 |
| κορώνης appellatiōe quid Galenus
uoluerit intelligi | 65.36 | coxendicis offis appēdix. 131.25. eiuf-
dem figura. 5. * item ligamenta ad
os femoris. quære, Femoris os. | | cultorū uulgarū ad ſectiōnē deſcri-
ptio. 236.27. delineatio | 235.48 | |
| κορώνη | 106.17 | coxendicis offis robori quomodo ſit
proſpectum | 130.35 | cuneiforme os. 21.35. & 22.14. & 23.15. | | |
| corpus cuiuſmodi ad ſectiōnē adhi-
beri conueniat | 548.10 | coxendicis offis ſuperiori ſede inſcul-
ptus ſinus. 130.22. eiufdem tubera.
ead. | 28 | 40. & 25. 20. 39. & 30.2. & 36.45. | | |
| corpus teſtudinatum cameratum ue
636.37. quere itē, Cerebri corpus teſ-
tudinatum. | | κορύνη | 166.19 | & 38.10 | | |
| corporis humani medium exactiſſi-
mum quod | 595.14 | crallū inteſtinū, uide Inteſtinū crallū | 167.23 | cuneiforme os πολυμορφον. 32.3. eiufd. | | |
| corporis humani offa quo artificio
parāda ad inſpectiōnē. 155.23. inde
corruptelę homini connata neceſſi-
tas. | 384.38 | λεπιδωδὴς dentes | 167.23 | antra. ead. 5. inde | | |
| κορσών ſiue κορσών offa | 166.48 | λεπιδωδὴς | 141.10 | cuneiforme os ſpongice modo non
eſſe peruium | 32.15 | |
| corticales ſuture | 166.36 | λεπιδωδὴς dicti muſculi | 285.57 | cuneiformis offis circumſcriptio. 28. | | |
| | | Cretenſiū renuēdi mos, retroſiū
flexo capite | 63.30 | 44 | | |
| | | cribri modo peruium os | 167.5 | cuneiformis offis foramē Anatomici-
cis ignoratum haſtenus. 49.31. pe-
culiare | 52.45 | |
| | | criſtę os | 28.24 | cuneiformis offis medium neutiquā
perforatum, cōtra Galeni traditiō-
nem | 51.33 | |
| | | crocodilis nō idem motus maxillarū
ut reliquis animanibus | 246.14 | cuneiformis offis ſinus | 54.56 | |
| | | λεπιδωδὴς futura | 166.35 | cuniiformis offis futura. 28.33.44 qui
bus ſedibus occurrat. 29.4. eiufd
interuallum | 29.18 | |
| | | λεπιδωδὴς offa | 166.43 | curſoribus lienem eximi, ſtultē per-
ſuaſum | | |
| | | crus | 168.34 | | | |
| | | cruris arundo maior, & minor. 168. | | | | |


INDEX

suafus vulgo 513.8
 cuticula quid 223.14
 cuticula, *αὐτοκόπη* 232.18
 cuticulæ administratio. 234.1. & 548.50. & 549.6. delineatio 231.30
 cutis in homine, *αὐτοκόπη* dicta Herophilo 231.43
 cutis manus. quare, Manus 231.35
 cutis quid sit 231.35
 cutis administratio. 234.1. & 548.30. & 549.6. delineatio 231.30
 cutis differentia à connexu. 231.43.
 à nervorū copia. ibid. 48. à mollicie. ibid. 50. à motu. ibid. 56. à pilis. 232.4. à foraminibus. ibid. 7
 cutis & membrana in frōte & pene, scortorū, nullo adipe subfrita cur. 521.42
 inde 161.54
 cutis humanæ crassities 237.25
 cutis quæ partes in homine moueantur 231.38
 cutis substantia 232.21
 cutis venis, arterijs, ac nervis prædita, ac sensus compos 232.21
 cuti per uniuersum subdita membrana carnosā 232.45
λευκός 111.6. & 168.13
λευκοδόνος os 1.41. & 148.4. & 168.33
κυμβάριος & *κυμβάριος*, herba 539.26
 cymbā referēs os. 168.49. eiusdē delineatio. 5. & 6.5. & 142. & 143.14.
 eiusdē sinus. 147.23. & sedes. ead.
 cymbam referēs ossis per medium dissecti figura 2
λευκοδόντος 167.19
λευγός 166.20
 D
 *Δακτύλος* 168.17
Δακτύλος Herophilo quid sit 234.38
 dearticulatio 121.16.
 & 13. 7
δελτοειδής dictus musculus 264.45
 dens processus 61.55. & 66.31
 dens secundæ uertebræ tuber, siue processus 66.31
 dentis dicti ossis ligamētū. 280.2. & 44
 dentis molaris facies utraq. 33. & 34.25
 dentis processus cum prima uertebræ contextus 66.39
 dētes, *δολύρις*, eorūq. nomina. 167.16
 dētes frigore possitūm uexatī. 45.35
 dentes omnium ossium durissimi. 2.54. & 46.11
 dentes qui maxillis infigantur. 46.17
 dentes quot 162.38
 dentes radicibus inter se variare. 46.20.
 inde 3.20. & 45.26
 dentes soli omnium ossium nudi 3.26
 dentium à ceteris ossib. differentia. 45.42
 dentium alueoli 44.41. & 45.10
 dentium appendices 46.56. inde 46.51
 dentium cavitates 46.51
 dentium dolori, remediū optimū. 45.39
 dentium excessus præsecādi, aut exurendi mos 45.33
 dentium frequentia argui uitæ longitūdinem 46.49

dentium numerus. 45.47. & nomina. ead.
 dentium numerū aliqui variare 46.31
 dentium præsepola 46.17
 dentium puerorum appendices 7.51
 dentium radicibus affixi neruuli. 45.30
 dentium usus 1.20
 dentium utriusq. maxillæ figura. 45
δελτοειδής, cutis dicta 232.14
δελτοειδής 290.47
δελτοειδής membrae, quæ. 572.13
 diarthrosis, *διδυχοειδής* 12.20. & 13.7. & 120. 24
δύσαστες, dentes 167.17
διδυχοειδής, cur testes dicti 521.20
διδυχοειδής dicti in cerebro 638.42
 digiti, *διδυχοειδής* 168.17
 digiti, cur inæquales 125.15
 digiti, cur unguibus donati 149.42
 digiti manus. quare, Manus digit. 124.21
 digitorū articulationis forma. 124.21
 digitorum dignitas. 124.54. usus ac situs. ead. & 125.2. inde
 digitorum flexus, extrorsum mirabilis 124.36
 digitorum forma in mulieribus pulcherrima, qualis 122.12
 digitorum manus ossa, quot 162.43.
 pedis. ead. 43
 digitorū manus cuti internæ nervosa uicinitate subnati musculi descriptio. 302.26. administratio. * 222.32
 digitorum ossa 9.49.55
 digitorum ossa non penitus medullæ expertia 121.50
 digitorum ossa perperam Galenofolia constituta 2.51
 digitorum ossa quot. 120.35. & cuiusmodi. 121.16. inde. & 149.20
 digitorum ossium appendices 89
 digitorum ossium articulationis ratio 123.30
 digitorum ossium magnitudo, & forma decentissima 122.8.14. inde
 digitorū pedis ossa, eorumq. descriptio 142. & 143.24
 digitorum pedis figura 5. & 6.7
 digitorum pedis ratio 149.13
 digitorū tertij ossis processu. 124.46
 digitos flexentium musculi secunditendinum per primi tendines transitus 306.5
 digitos mouentium musculus uigelmus tertius, ad brachiale referendus 312.11. & 313.3
 digitos manus mouentes musculi, quare, Manus digitos. &c.
 digitos pedis mouentes musculi. quare, Pedis digit. mouent.
 digitos quinque omnino fingi oportuisse. 124.50. non plures. 125.14
 digitos singulos tribus ossibus efformari, meritō 121.47
 diploa 20.15
διδυχοειδής *διδυχοειδής* inuestinum. 499.2
 dorsalis medulla, quot neruos edat 339.
 dorsalis medullæ delineatio 37
 dorsalis medulla, eius descriptio. 338.

23. ab ossium medulla quo pacto differat. ibid. quæ sint illi cū cerebro cōmunia, quæ peculiaria. 339.2.
 cur sit unica. 339.20. cur sit facta. 338.34.
 muniēda quo pacto? ossibus. 338.51. mēbrancis inuolucris. ead. 52
 dorsalis medullæ cum cerebro cōalitus 613.42
 dorsalis medullæ terminus ex osse prodies sacro, inter neruos nō censeatur 339.44. & 350.18
 dorsalem medullam in sexto ossis sacri osse terminari 85.2
 dorsum, eiusq. ossium descriptio. 56.41. & 99.22
 dorsum illū ossis 129.52. & 130.1
 dorsū ligamēta ualida quædā, & eorū usus. 301.17. ligamenta in spinarum interuallis posita 301.25
 dorsū medullæ initiū. 531.24. color. 611.41. substantia, ibid.
 dorsū motuū differentia 295.22
 dorsū musculi, à Galeno frigide descripti 295.45
 dorsū nomina 167.30
 dorsū ossium multitudinis causa. 58.10. & quot consistit ossibus ead.
 dorsū ossium non par magnitudo, nec dorsalis uitæ aqua amplitudo. 58.31
 dorsū pars thoraci respondens, proprios flexionis musculi cur non habet 298.4
 dorsū uertebræ. 167.37. earundem appendices 7.46
 dorsū uertebrarum ligamenta, iuxta Galeni placitum, eiusq. improbatio 300.33
 dorsū uertebrarum ligamēta, *υδροειδής* *διδυχοειδής* dicta 301.10
 dorsū uertebrarum ligamenti species canibus propria 301.40
 dorsū uertebras necentium ligamentorum descriptio. 300.28. administratio 302.5
 dorsum flexū antrorsum, fuisse cōmodius 300.40
 dorsum homini quāra induratum. 57.51. inde
 dorsum mouentū musculorū delineatio. paris primi. 191.11. secūdi. 191.15. tertij. 205.47. quarti. 209.35. quinti. 209.50. sexti. 205.50. septimi. 209.40
 dorsum mouentium musculorum descriptio 295.11
 dorsum mouentū musculorū iuxta singulorū parū ordinē administratio. 299. parium 4. priorum. ead. 28. quatuor postremorū, nempe quinti. 299.38. triū sequentiū. 300.1
 dorsum mouentū musculorū, iuxta 8 ipsorū paria sigillatim expōsitus usus. 296. paris primi. ead. 13. secūdi & tertij parium usus. 296.48. quarti. 297.8. quinti. 298.1. sexti. ibid. 40. septimi. 299.2. octauī. ibid. 20
 Dorsum mouentium musculorum par primum, Galeno parū apte in plures

I N D E X.

plures diuifum. 296. 4. ufus non
recte assignatus. ead. 18
dorsum mouentiu mufculorū par 5.
a Galeno nō recte defcriptū. 297. 16
dorsum mouentiu mufculorum pa-
ria duo. 7. & 8. Galeno incogni-
ta 298. 11
dorsum mouentiu mufculorū pa-
ria 8. ac primum. 295. 48. fecundū.
296. 20. tertiu. ead. 39. quartū. ead.
52. par quintum. 297. 13. sextum.
298. 10. feptimū. ead. 44. octauū.
299. 7
duales dentes 167. 18
dulcis morfus, feu bolus, quid 359. 55
duodenum inteflinum 362. 1
duodenum cur in nullo anfractus
ducatur 502. 52
duodenum inteflinum cur exortus
390. 36
duodenum non minus quā ieu-
num, inane 499. 19
duodeni appellatio 498. 57
duodeni inteflini ductus, & ratio
498. 52
duodeni tunica cuiusmodi 499. 30
duodeni inteflini uenæ & arteriæ.
499. 39. nerui. ead. 52
duodeno cur infertus bilis ueficulæ
meatus 503. 44
dura offa 166. 54
dura mater, dura Cerebri membra-
na. quare, Membrana dura cerebri.
E
 Kφουσι quid 498. 53
eflos 494. 39
elephantiafi laborantis
lien maior 512. 19
elephantiafi laboran-
tium superficies cutis & color, cu-
iusmodi 511. 54
emulgentes uenæ delineatæ. 370. 18
& 371.
enarthrosis 12. 22. & 13. 43
enarthrosis quando in simplici ar-
ticulo 13. 55
eniformis cartilago 167. 46
εντάρια 498. 5
ενδάρια 232. 18. & 549. 6
ενδάρια tunica. quæ 522. 43.
& 524.
epiglottalis cartilago 93. 20. & 167. 48
ἐπιγλωττῖς 154. 47. & 155. 1. & 258. 29
ἐπιγλωττῖς & γλωττῖς differunt, quo-
modo 261. 33
ἐπιγλωττῖδος delineatio 257. 44
ἐπιγονατῖς 168. 31
ἐπιμυλῖς 167. 53
ἐπιώτιον 7. 18. inde
ἐπίφυσιν cum ἀπαύσε, subinde ab
alijs confundi 8. 43
ἐπίφυσες quoque ossium capita Gale-
no non semel dicti 9. 42. 47
(495. 8)
epiplex. 494. 39
ἐπιπλοκῆλη, cur Græcis dictus ramex
495. 31
ἐπιπλοκῆλη 494. 44
ἐπίφρυξ 67. 24

ἐπιφρυξ, dictus mufculus 99. 43. &
102. 35. & 264. 46
Erasistrati opinio de arterijs sangui-
ne destitutis 526. 4
Erasmi Roterod. de talorū lusu dia-
logus parum anatomicus 107. 18
Erasmi de talo lapsus 140. 19
ἐνυδρόδης inuolucrum 522. 19
excessus 8. 13
exortus, cur duodenum inteflinum
appellatum 390. 36
exortus uenæ cauæ, qui
expiratio alia naturalis, alia uiolenta,
& quæ 292. 52
expiratio, quibus mufculus perficia-
tur 292. 55
expiratiois ufus 570. 8
expiratioem Naturæ, cur citra mu-
sculi opē fieri scribat Galenus. 293. 1
explantatio 8. 13

F



Aux 167. 15. & quid
579. 46. 13
faucium glandulæ triū
generum 579. 28
faucium organorū exa-
men 503. 48
femen 168. 28
femur mouentis, mufculi defcriptio
297. 26
* femur mouētēs mufculi, quot con-
stituenti 242. 24
femur mouentium mufculorum deli-
neatio. primi. 196. 10. fecūdi. 199. 3.
tertij. 202. 10. quartij. 202. 13. quin-
ti. 205. 1. sexti. 195. 28. feptimi. 195.
30. octauū. ult. noni. 193. 36. de-
cimi. 199. 14
* femur mouentiu mufculorum de-
fcriptio. 238. 20. primi. ead. 32.
fecundū. ead. 43. tertij, quartij,
quinti. 239. 2. munus omnium. 240.
31. sexti. 240. 49. feptimi, octauū.
241. 4. omniū. 241. 22. noni, deci-
mi. ibid. 40. decimo appendice car-
næ portiones 242. 12
* femur mouentiu mufculorū quin-
tus, totius corporis mole maximus
239. 44
femur mouētū mufculorū decē ad-
ministratio exposita ordine. 242. 36
femur petētes nerui. quare, Nerui.
femoris appendices. 7. 55. eorund.
delineatio 5. & 6. 14
femoris superius caput 9. 8
femoris capita 5. & 6. 31
femoris inferiora capita, cur retror-
sum producantur 134. 17
femoris ceruices 10. 14
femoris dextri figura 5
femoris & brachij os in quadrupe-
dibus & auibus Aristoteli ignora-
tum 15. 52
femoris figura laudatiffima, quæ 135.
40. inde
femoris luxatio qua parte creberri-
ma 131. 11
femoris motus 13. 25. & 238. 20
femoris os 168. 22. 25. 28

femoris ossi comparatum auditus of-
fani ossiculum 35. 28
* femoris os ossi coxendicis alligan-
tium ligamentorū defcriptio. 252. 31.
administratio 256. 22
femoris ossis defcriptio & figura 133. 1
inde. & 134. 1
femoris processus 8. 23
femoris processus, seu rotatores, duo
134. 52
femoris secundū ipsius longitudi-
nem forma 135. 24
femori ad tibiā articulatio sedes 138.
femori articulatio paratum 134
acetabulum 130. 53
fenestratum os 168. 25
fibrarum cordis & mufculorū ratio
quatenus eadē aut diuerfa. 587. 41
fibrarū in inteflinis ratio 503. 26
fibrarū in uefica, uentriculo, & bilis
uesicula ratio 518. 13
fibrarū motibus naturalibus feruien-
tū species, & cuiusq; functio. 258. 6
delineatio ibidem
* fibrarum, quæ motibus, tum natu-
rali, tum arbitrario sunt præfeciæ,
differētia 257. 32
fibrarum ufus 506. 3
fibras tunicarum in uefica optime co-
gnosci 518. 12
fibula 1. 45. & 138. 26. & 168. 39
fibula quid à fura differat 138. 30
fibula secundū ipsius longitudinem
triangula 140. 33
fibulæ ad tibiæ os nexus. 139. 17. ubi
à tibiæ offe dehiscat 24
fibulæ cum talo articulatio 140. 2
fibulæ exarnis pars 140. 28
fibulæ figura. 136. defcriptio 137. 6
* fibulam ad tibiæ os colligantium li-
gamentorum defcriptio 253. 36
filum, sectioni aptum 236. 56
focile brachij minus. 168. 9. maius. 12.
& 38. inde
fecunditatis præfagium ex umbilici
ua forum nodis 383. 42
foetus, ipsiusq; inuolucrorū examen
557. 50
foetus inuolucrorū primum ac extimū,
cuiusmodi. 541. 16. & quali sub-
stantia 33. inde
foetus inuolucrorū secundū, seu mediū
cuiusmodi. 542. 4. itē tertiu. ead. 44
foetū inuolucrorū extimi nomina. 541. 56
foetus inuolucra elegatius à matrib.
afferuari, quā abijci, &c. 543. 15.
eadem ab reliquis animantibus rur-
sum deuorari. ead. 19
foetus inuolucrorū delineatio 383. 16
foetus in utero situs. 382. & 383. 32. nō
qualis uulgo traditur 541. 28
foetus urinae meatus. 557. 11. & 556. &
518. 360. ipsius ratio. 542. 25. quo-
modo inquirendus 558. 18
fœtus urina & recremento uteri cer-
uicem irrigari ad faciliorem par-
tum 542. 53
foetui uitalem spiritum deferentes ar-
teriae 518. 39
foetum

foetum inuoluens membrana à quibſdam exiccata aſſeruari ſolita, eiꝿqꝫ diuerſa nomina 543. 4
foetum inuoluens membrana falſo nō omnibus pueris communis habita 543. 5. de qꝫ ſupplitiones. ead. 11
foramen cæcum. 34. 39. & 53. 12
foramina auditus organi cauitatem ingredientia 34. 39
foramina nerui emittendis parata 58. 47.
foramina neruus in ſacro oſſe tranſmittentia 84. 21
foraminula per caluariæ ampli tudinem ſparſim obuia 54. 23
foraminũ capitis ſiue caluariæ deſcriptio. 47. 17. & 49. inde
foraminũ in uertebriſ, neruus in latera tranſmittentium natura 70. 29
foraminum ſpeculatio ut iucundiffima, ita ab alijs hæcienus prætermiſſa 53. 19
forficulae, aptæ ſecantibus. 237. 7.
deſineatio 235
FRANCISCVS PINELLVS
Genuenſis 90. 5
frontis cutem mouentis muſculi deſineatio, ubi ſpectanda 179. 7
frõtiſ muſculi. quære, Muſculi frontis
frõtiſ oſſis. 21. 33. & 23. 12. & 30. 1. eiꝿ cir cſcriptio. ead. 13. & 36. 40. & 166. 42
Fued, fuhed 387. 49
fundibulum cur pro gargareone 580.
furcula peſtoris oſſis 92. 22
furculæ inferioris medium 167. 49
furculæ 102. 2. & 167. 51. inferiores. ead.
fuli oſſa 167. 32

G
Alea, foetum inuoluens membrana quibꝿdã dicta 543. 4
* Galenus de Vſu partium libros emendare aggregitus, non plene id præſtitit 219.
Galenus non pauca, in libris præcipue de Partũ uſu, imaginatus eſt tantũ, in animalib. non uiſa 635. 47
Galenus e quibus animalibus Anatomem ſcripſerit. 233. 21
Galenus hominem nunquam ſecuit 275.
Galenus in Ariſtotele iniquior. 591. 1
Galenus in Ariſtotelem calumnix nimis ſophiſticæ 540. 55
* Galenus ſtudio in Ariſtotelem ſui ipſius obliuſ 267. 14
Galenus in Euripide ridendo qꝫ ſpectandis oſſibus occupator 145. 27
Galenus medicinx parens 591. 15.
rarum Naturæ miraculum. 63. 17.
ſummus Naturæ admirator. 500. 39.
omniũ bonorũ autor. 569. 24.
Galenus non raro quæ maxime fuerant exponenda, tacitus præterit. 630.

Galenus quid fecerit, ne aliquã partem ab alijs deſcriptam præteriſſe uideretur 32. 52
Galenus ſimiarũ ſectiõis, quàm hominum ſtudioſior. 42. 55. Item in ſimiarũ ſectiõne quàm hominum peritiõr 81. 24. inde
Galenum ſimix & hominis Anatomem confundere 83. 17
Galenum ſimiarũ potius anatomem quàm hominis tradiſſe 85. 8
Galenus ſimiarum ſectiõne deluſus 307.
* Galenus ſimiarum ſectiõni nimis ſiſus, priorum Anatomicorum reſcitas ſententias ſæpe euerit. 234. 19.
& * 246. 16. & 274. 25. & 299. 50. & 631.
Galenus aliquot librorum interitus. 575.
* Galeni Anatomicarũ annotationes 219.
* Galeni autoritas quanta ſit 278. 41
Galenus boum pene deluſi falſũ de huiꝰ mani penis materia dogma 529. 8
Galenũ humani penis fabricã nunqꝫ ſpectaſſe 527. 54
Galenus crebri in Anatomicis tradendis lapſus 591. 9
Galenus de Adminiſtrandiſ ſectiõnib. libri poſtremo ab eo ſcripti 63. 42
Galenus demonſtrationes Anatomicæ magnã parte falſæ 526. 48
Galenus de Demõſtratione librorum interitus quatenus dolẽdus 526. 34
Galenus de Oſſibus librum græcum per inuidiã quorundam latere hæcienus 42. 48
Galenus diligentiæ plurimum debet 63. 15
Galenus in Anatomicis ſectatores notati 572. 52
Galenus interpretum lapſus 58. 25.
& 140.
Galenus interpretum menda Anatomice à Veſalio ſublata 55. 39
Galenus loca ab hominis deſcriptione diſcrepantia, nō pauca miſſa 42. 11
Galenus loca non pauca inter ſe diſſidentia, aut alioqꝫ falſa, omiſſa 282. 5
Galenus loci quatuor emendati in libro Adminiſtrationũ primo. 309. 24

GALENI LOCA
quædam uel expoſita, uel reprehẽſa, eadẽ iuxta rerum ſeriem digeſta: quorũ tamen catalogum diligens Lector abunde perſectis hiſce libris locupletabit. nobis enim ex multis uix pauca ſolum hæc annotare, propter Galeni autoritatem, libuit.

Galenus ſententiã, de Adipe inter cutẽ manus internæ, & tendinẽ illi ſub natum, notata 303. 26
Galenus de tribus Animæ ſpeciebus, aut partibus inter ſe natura diuerſis, ſententia 594. 36
Galenus notata ſententiã, de uſu Appendix in oſſibus. 7. 39. Item quod ſolis magnis oſſibus adſint

appendices. ibidem. 54. & 8. 9.
quodqꝫ ſolis adſint ſinus. 2. 51
Galenus de Arteriæ magnæ & uenæ oriſicijs lapſus 591. 10
* Galeni locus de Arteriæ ortu. 299. 6
Galenus ignoratum, Arteriã ſoporalem non ferri per idẽ foramen cum tertio ac quarto neruorũ pari. 52. 32
Galenus ſententiã, de Arterijs plexum reticulare conſtituentibus 622. 46
Galenus ſententiã de Aſtragali ſitu, notata 15. 50
* Galenus, duo Brachij ligamenta, ignorans 220. 25
* Galeni ſententiã de motu Brachialis in pronũ & ſupinũ, notata 215. 19
Galenus de Cæco inteſtino, ſententia 30
Galenus ignota, nō pauca Capitis foramina 52. 32
Galenus locus de Capitis motu ſuper uertebraſ ſecundã, notatus. 67. 9.
eiꝿdẽ alius de oſſibus in motu à ſe inuicem abſcedentibus. ibid. 54
Galenus ſententiã de Capitis motu proprio quopiam, notata 176. 12
Galenus de capitis motibus, notata ſententia 63. 26
Galenus locus de capitis motu in latuſ ſuper prima uertebra, improbatuſ 65. 7. & deinceps
Galenus ſuper Cartilagine inter uertebraſ dorſi reſpoſita, notata ſententia 300. 33
Galenus uana ratio, de Cerebelli ſimplicitate 339. 24
Galenus ſententiã de cerebelli duplicitate, improbata 631. 20.
Galenus ratio de cerebri diuiſione, notata 632. 13
Galenus ſententiã de cerebri reuolutionibus, notata 630. 37
Galenus dogmata nō pauca de Cerebri uentriculis, notata, alia omiſſa 614. 20
Galenus de præſtantia Cerebri uentriculorum, variuſ 636. 26
Galenus ſententiã de ſuperficie uentriculorum Cerebri tenui mēbrana cinctã, eiꝿqꝫ improbatio 635. 40
Galenus ſententiã, Colon ſeu artuũ capiti adqꝫ uocari & leuodũ uocari docentis, improbat 9. 47
Galenus de Cordis oſſe ſententiã 93. 51
Galenus de Coſtarũ articulatione, ſententia 91. 22
Galenus de Coſtarum cartilaginibus, ſententia 90. 27
Galenus de Crurũ in animalibus flexione, &c. dogma 145. 20
* Galeni ſententia de cubiti flexionibus planẽ imaginaria, notata. 218. 14.
in enumerandis muſculis harum autoris uarietas. ead. 19
Galenus de digitorum forma ſententiã. 123. 28. & articulatione. ead. 30.
Galenus placituſ, de Dorſi motibus, ſententia contraria 76. 25
Galenum ſubinde Dorſum, & ſpi.

- nam in tibiā & femur mouentū
musculorum descriptione confun-
derē 129.57
- Galenus Dorſi motores musculos
quatuor poſtremos ignorās. 298.11
- Galenus in deſcriptione Dorſi mu-
ſculorum, notatus 295.45
- Galenus de effectiuo & materiali ho-
minis principio, ſententia 510.42
- Galenus de Femoris ad coxendicis os
motu lapſus 134.116
- Galenus de Foetus inuolucris dogma-
ta quatenus uera 541.12
- Galenus de ſecundo foetus inuolucro
ſententia 542.31
- Galenus ſententia, de foraminis ſecu-
ndū neruorū cerebri par trāmitten-
tis magnitudine, improbara. 90.25
- Galenus ſententia, de foraminibus cri-
brum referentibus, ac pituitam ce-
rebri expurgantibus, fictiſſa 641.28
- * Galenus notata ſententia de Glande
in teſtino ieiuino adnata. 284.47
- Galenus de Glanduloſa carne ad infe-
rius uentriculi oriſcium ſententia
391.2
- Galenus anatomica demōſtratio, qua
Glandolum corpus ſemini paran-
do non præſſe conficitur 516.47
- Galenus de Humeri tuberculo interio-
re & exteriori ſententia 107.7.16
- Galenus de Humero poſt femur om-
nibus oſſibus grandiore, ſententia
105.9
- Galenus falſo Humerum exterius
gibbum, interius ſimū, &c. ſta-
tuiſſe 107.39
- Galenus canū inteſtina magis quā
hominum inſpecta 500.39. & 501.31
- Galenus de Mamillarum litu ratio
545.46
- Galenus locus de Maſſeteribus mu-
ſculis notatus 246.30. & 248.6
- Galenus locus de Maxillæ ſuperioris
ſuturis explicatus. 29.38. alius de
eorundē oſſium cōſtitutione. 39.11
- Galenus loca aliquot de Maxillæ ſupe-
rioris oſſiū numero, ſuturis, reſuta-
ta. 42.11. & deinceps
- Galenus locus de Membranis proceſ-
ſus uermiformes cōtinentibus, no-
tatus 216.14
- Galenus an rectē tria Meſenteria nu-
meret, & cuiuſmodi. 504.19
- Galenus locus, Muſculū inter liga-
mentum ac neruum ponentis eſſe
mediū 220.41
- Galenus opinio de Muſculorū ortu,
notata 213.24
- Galenus opinio de Muſculorū fibris,
notata 217.7
- Galenus notata ſententia, qui Muſcu-
li tendine careant 228.27
- Galenus locus notatus de Muſculorū
tendinibus 222.51
- Galenus in deſcribendis abdominis
muſculis, uariis 233.6
- Galenus locus, de muſculo Brachium
attollente, notatus 264.42
- Galenus in deſcribendis Brachium
attollentibus muſculis, uariis 265.21
- Galenus ſententia, de muſculo tanquā
Brachium circumuertente notata
265.46. & 270.53
- Galenus, de muſculo quopiam tanquā
Brachij motore, notata ſententia
263.49. & 14
- Galenus, ſuper muſculo quopiam Brachij
motore, in hominibus autem
nō reperto, notata ſententia 266.41
- Galenus, de quarto Brachij motorum
muſculo, notata ſententia 266.23
- Galenus præteritis muſculis inter
Brachij motores quintus 267.ult.
- Galenus, de muſculorum Caput mo-
uentium pari ſecundo, notata ſen-
tentia 277.20
- * Galenus ſententia ficta, de muſculis
cubiti mouentibus 217.1
- Galenus loca de muſculis Digito mo-
uentibus, notata. 305.33. & 306.4.
& 14. item 307.1
- Galenus, ſuper muſculorum qui Dor-
ſum mouent, pari primo, notata
ſententia 296.4. & 18
- Galenus, in deſcribendo quinto Dor-
ſum mouentium muſculorum pa-
ri, notata ſententia 297.16
- Galenus, in deſcribendo ſexto Dor-
ſum mouentium muſculorū pari,
notata ſententia 298.12
- * Galenus de muſculo femur mouētū
quarto, cuiuſq; ortu ſententia 239.26
- Galenus de muſculorum intercoſtalium
functione, notata ſententia 290.21
- Galenus locus, de muſculis Labra mo-
uentibus, notatus 242.29
- Galenus ſententia, de muſculo Manus
internæ regioni ſubnato notata.
302.44
- Galenus, de quarto muſculorum pa-
ri, Oſſi v propriorum, notata ſen-
tentia 251.39
- Galenus, de Palpebrā mouētibus mu-
ſculis opinio 239.14
- * Galenus in tradendis muſculis pe-
dem digitosq; mouentibus, admo-
dum uariis 243.44
- * Galenus ſententia, de muſculis primis
Pedem mouentibus, notata. 245.35
de quarto muſculo. 246.16. de o-
ctauo. 248.7. de muſculis Pedis di-
gitos mouētibus. 250.13. & 21. & 251.38
- Galenus ſententia, muſculis Pollicis &
parui digiti abductioni præſectis,
notata ſententia 308.35
- Galenus ignorans tres muſculos, ſe-
cundū Pollicis os ſelectes 309.15
- Galenus ſententia de muſculis Pollici
præſectis, notata 312.38
- * Galenus, de muſculi in Poplite lati-
tantis functione, notata ſententia
& 56
- * Galenus ſententia de primo Radiū
mouētū muſculorū, notata. 216.6
- Galenus in muſculorū Scapulam mo-
uentium traditione, notata ſenten-
tia 274.10. 42. ac deinceps
- Galenus, de muſculo quopiam tanquā
Scapulam mouente, notata ſenten-
tia 275.12
- Galenus ſententia, in tradēdo Scapulæ
motorum ſecundo muſculo, nota-
ta 275.48
- Galenus ſententia, de muſculosis tem-
porum lineamentis, notata. 250.40
- Galenus ſententia, de quarto Thoracis
muſculo, notata 289.10
- * Galenus ſententia, de muſculis Tibiæ
mouentibus, notata 230.8
- Galenus ſuper primo Tibiam mouen-
tū muſculo, notata ſententia. 231.22.
- ſuper ſecundo. ibid. 41. ſuper ter-
tio. 232.2. ſup quarto. ead. 21. & 39.
ſuper quinto. 232.47. & 233.24. &
236.57. ſuper ſexto, quem perſun-
ctoriē tantū attingit. 234.46. ſuper
nono. 235.43. ſuper tendinibus, ti-
biæ muſculorum 236.7
- * Galenus ſententia, de muſculi in ueſi-
cæ ceruicē uſu, notata 228.12
- * Galenus locus, de muſculo uolæ me-
diæ, &c. ſubnato notatus 222.50
- Galenus ſententia, de Neruo paris ter-
tij notata 325.45
- Galenus ſententia, de neruorum opū-
torum foraminibus 324.43
- Galenus neruorum recurrentium
inuentor & admirator 329.19
- Galenus in neruorum traditione no-
tata ſententia 350.3
- Galenus exploſa ſententia, quod ner-
uorū alij ſenſui, alij motui præſint
348.49
- Galenus locus de neruis ē primo de
Locis affectis notatus. 344.57. eiuf-
locus alterē lib. 3. de Adminiſtratio-
nibus Anatom. 345.37
- Galenus locus de Oculi tunica, ē de-
cimo de Vſu partium 647.28
- Galenus de omenti membrana colon
dorſo colligante ſententia 496.30. 41
- Galenus ſententia de acutis Oſſium
proceſſibus notata 9.1
- Galenus ſententia de numero oſſium,
oſ ſacrum conſtituentium 339.49
- Galenus loca de oſſiū inter ſe ſtructu-
rā ueritate aliena, ē multis aliqua
enumerata 16.57. & deinceps
- Galenus de octauo brachialis oſſe, ſen-
tentia 118.21
- Galenus locus de oſſe inter cerebrum
ac cerebellum in canibus poſito,
explicatus 32.44
- * Galenus, libro de Vſu partū, Coc-
cygis os ignorans 239.26
- Galenus ſententia de oſſis cuneiformis
conſtitutione ac uſu notata 32.13
- Galenus ſententia de oſſe cuneiformi
tanquā perforato inſtar ſpōgiæ,
improbata. 51.31. & quod pituita
illāc nō coletur. ibid.
- Galenus ſententia de oſſibus digitorū
tanquā ſolidis improbata 2.51
- Galenus de tertio quodā oſſe in ſum-
mi humeri cū clauicula nexu, ſen-
tentia 100.2. in de
Galenus

- Galenus de offe Maxille inferioris tari
quam gemino, notata sententia. 44. 8
Galenus de Pectoris ossium synarthro-
si sententia 51. 53
Galenus de Pedis & manus ossium pa-
ri numero lapsus 149. 22
Galenus de primo Pollicis offe lapsus
148. 44
Galenus de Sacro offe & coccyge, sen-
tentia notata 81. 14. inde. & 82. 18.
& 85. 16
Galenus de Tibiæ ossis sinibus sen-
tentia 138. 45
Galenus quædam Offa ipsi non uisa,
tanquam in humano essent corpo-
re, recensere 32. 51
Galenus de Patelæ cartilagine lapsus
142. 4
Galenus notata sententia, de Pituita ce-
rebrî per plactus canales educen-
da 323. 7. & 48
Galenus de Postbrachialis ossibus sen-
tentia 120. 8
Galenus de acuto ulnæ Processu senten-
tia 114. 6. inde
Galenus sententia, de anteriori Pro-
cessu primæ ceruicis uertebrae, no-
tata 64. 47
Galenus sententia, de Processum in
cerebro uermiformium usui, nota-
ta 639. 9
Galenus sententia, de Processibus du-
re membranæ tanquam duplica-
tis, notata 626. 1
* Galenus sententia, de quinto Pulmo-
nis lobo cauam uenam sustinente,
notata 280. 31
Galenus de quinto Pulmonis in ho-
mine lobo error 581. 55
Galenus de Quadrupedum genu ar-
ticulû lapsus 139. 14
Galenus de Renum situ ratio minime
approbanda 514. 53
Galenus de Reticulari in caluaria ple-
xu lapsus 524. 8
Galenus reticularis plexus nusquam
inuentus. 642. 19. superq. eo locus
in libro de Venarum sectione 29
Galenus de Seminalium uenarum or-
tu & ductu sententia 523. 20
Galenus de Seminis ex sinistro teste
pruritu, sententia expensa 526. 13
Galenus placitum, omnia præter car-
nem & pinguedinem, Semine con-
sistere, in humano corpore 541. 2
Galenus opinio, de Septi foraminibus,
notata. 225. 52. & 291. 26. & 43
* Galenus de Simiarû ad hominē dif-
ferentia, notata sententia 243. 47
* Galenus sententia notata, de Sinibus
in membrana cerebri dura consti-
tutis 307. 30
Galenus de Stomachi cum arteria in-
cessu sententia 388. 36. inde
* Galenus sententia, de Tendine lato,
qui plantæ cuti subnascitur, nota-
ta 244. 15
* Galenus de tendinû in digitos ma-
nus insertionē, notatus. 213. 10.
contraria de his docet. ead. 25
Galenus sententia de tendinibus x vii
musculi digitos mouentium, no-
tata 310. 8. & 13
Galenus opinio de tendinibus pro-
cessus uermiformes continenibus
notata 639. 48
* Galenus notata sententia, de Tibiæ
motuum differentiis 230. 46
Galenus quid Testis caput appella-
tum 522. 45
* Galenus ignota Venæ axillaris diui-
sio quædam 286. 41
Galenus de uena caua uentriculo sub-
strata opinio 392. 24
* Galenus argumenta de uenæ cauæ
ortu in Aristotelem, non nimis fir-
ma. 275. 13. & quæ, quoq. pacto
mox infra. 23
* Galenus irrefutabilis demonstratio,
de Cauæ uenæ ortu, confutata. 276. 2
Galenus de uenæ cauæ principio sen-
tentia explosa 589. 56
Galenus de cauæ uenæ in omentum
ductu error 496. 45
* Galenus sententia, qua cauam uenâ
ubi iecoris gibbo committitur esse
amplissimâ statuit, confutata 278. 1.
& 275. 23
* Galenus locus, à uena caua priusquâ
cor attingat ramos in thoracis mem-
branas distribuētis, notatus. 230. 45.
eiusdem alius de uenæ arterialis or-
tu, notatus. ead. 50
Galenus de Coronalium uenarum or-
tu sententia 596. 10
* Galenus de ortu uenæ sine pari sen-
tentia uaria 281. 4
Galenus cur de uena pari carere tam
uarii scripserit 281. 53
Galenus de uenis Mesenterij ac inte-
stinorum lapsus 504. 48
* Galenus de Portæ uena, ut sangui-
nem conficiente, sententia uaria
267. 13
Galenus de portæ cauæ ramis iecori
sanguinem præparantibus, opinio
508. 6
* Galenus in descriptione uenarû hu-
merariæ & axillaris, partim uerus,
partim falsus, & quo pacto 286. 6
* Galenus simiarû uenas docens, ho-
minû uenas non persequi 262. 28
Galenus de Ventriculi situ sententia
389. 35
Galenus sententia, de nexu corporum
thoracis Vertebraû, notata. 73. 12.
Item de foraminibus uertebra-
rum nervos transmittentibus. 73. 52.
Item de costarum ad uertebra-
articulationē. 74. 20. Item de trans-
uersis infimarû thoracis uertebra-
rum processibus ibidem
Galenus in assignatione aliquot in
lumbis uertebra-
rum, uariis. 79. 9.
Eiusdem sententia, lumborum uer-
tebris processum affingētis ad imi-
tationem simiarum accanum, im-
probata 78. 39
- Galenus uertebra-
ginglymo conne-
xas arbitratus, tria ossa, pro hac sen-
tentia ad articulationem concurrere,
non animaduertit 15. 22
Galenus hominis Viscera autoscitan-
ter, aut neutiquam spectasse 584. 33
Galenus umbilicus non recte corpo-
ris medium constitutus 595. 13
Galenus de umbilico corporis medio
sententia 389. 39
Galenus uaccinus caprinus uel Vte-
rus, non muliebris, descriptus 534. 33
Galenus de uteri cornibus notata sen-
tentia 286. 14
Galenus de uteri uenis in mamillas se-
se exonerantibus sententia 547. 11
Galenus humanum uterum nunq. spectasse
532. 43
Galenus studiosos esse omnes medici-
næ candidatos debere 531. 40
Galenus in humani corporis fabricæ
cognitionem nimium a plerisque tri-
bui 540. 5
Galenus peculiaris mos 292. 1
Galenus quædam non obseruata 4. 22
Galenus ex ueris aliorû Anatomio-
rum descriptionibus fecisse fal-
sas 85. 25
Gallicus morbus glandulis faucium
palatoq. & gargareoni præcipue
infectus 580. 7
gargareon cur idem Græcis 579. 39
gargareon uocis plectrum 580. 30
gargareonis nomina. 580. 13. eiusdē
situs, forma, substantia, usus, &c.
ead. 25. inde
gargareonis præfectio 580. 29. inde
gargareoni infectus Gallicus mor-
bus 580. 7
gargareonem soli inter animatâ ho-
mini, & quibusdam auiibus obti-
gisse. 580. 21.
gargareonem temere à quibusdam
excrementorum cerebri receptacu-
lum esse, confictum 580. 37
yαση unde dictus Græcis uentricu-
lus 389. 30
γαστρονμία 138. 30
γαστρονις dentes 167. 17
gemelli dicti, in cerebro 638. 43
gemini cur testes dicti 521. 20
GEMMAE FRISII laus 161. 46
generandi amor animatibus natura
ingenitus 520. 17
generationis nostræ principia. 384. 10
circa Generationis organa moueri
solite quæstiones 520. 38
generationis organorû uirilium deli-
neatio 374
generationis organis. utendi quoq.
appetitus natura adiectus 520. 15
generationi subseruentiu partium
brevis enumeratio 520. 4
genu articuli cartilagines 139. 11
* genu articuli ligamentorum descri-
ptio. 253. 3. administratio. 256. 26
genu rotula. 168. 31. oculus. ead. 33
genuini dentes. 46. 35. & 167. 22
LI 3 γγυς

gibber 167. 14
gibbert 9. 49
gibbertus, siue gibbus ulnæ proceſſus 111. 15. & 168. 14
gibboſorum uertebrae 71. 19
ginglymos 12. 22. & 14. 33
ginglymon, quando natura format 14. 51
γυγλυμοειδὲς humeri orbita 106. 24
GISBERTI CARBONIS Lorianenſis medicilauſ 162. 11
γόμερος 2. 2
γόμερος dentes 167. 21
gompholis 12. 22. & 15. 39
glans cerebri, pinæ nucis ſimilis, eiusq; deſcriptio. 637. 42. ſitus quib. ibid. 47. uſus. 638. 5. delineatio unde petenda 637. 45
glandis cerebri pituitam excipietis, & accumbentium ipli arteriarum examen, ſeu adminiſtratio 654. 40
glandulæ cerebri teſtula incumbenſis adminiſtratio. 653. 9. eiufdem hiſtoria. 640. 45. ſitus quib. ſpectanda. 640. 9. canales ab ea ducti 641. 2
glans penis cuiuſmodi 543. 32
glandes inteſtinorum 499. 54
glandes, ſiue glandoſum corpus meſenterio cur Natura addiderit 505. 7. inde
glandium in faucibus, triplex genus 579. 28
glandularum laryngis ratio 578. 50
glandularum in mamillis ratio diuerſa 543. 56
* glandularum quæ uſorum diductibus ſubduntur, deſcriptio. 261. 4. nomen, ead. 29. differentiæ à nomine, colore, imagine. ead. 32. uſus. ead. 7. & 43
glandularum ſtomacho crebro adnatarum uſus 389. 18
glandulis faucium infeſtus Gallicus morbus 580. 7
glanduloſa caro non procul ab inferiori uentriculi oriſicio 391. 2
glandoſum omenti corpus. 358. & 359. 55. & 497. 27
glandoſum corpus uſorum ſemen deferentium inſerionem excipietis 525. 18
glanduloſum corpus ueſicæ ceruicis initio adnatū. 373. 57. & 372. eiufdem uſus 526. 38
glanduloſi corporis in ipſa uſorum diſtributione poſiti delineatio 363
γλάνη 10. 3. 32
γλάνης & τετάνης diſcrimen 10. 44
γλάνηος ſinus 66. 6
glirium cæcum inteſtinum cuiuſmodi 500. 34
gloſſocomi inſtrumenti delineatio 329. 21
γλωττις, qualiter ſpectanda adminiſtranti 261. 20
γλωττις quid. 253. 29. ὑπὸ γλωττις, ibid. & 154. 48
γλωττις & ὑπὸ γλωττις nō eadē 261. 23

γλωττις dicta in cerebro 638. 47
γλωττις 135. 2. & 168. 29
granatum malum, cartilago. 93. 19. & 167. 48
granatum malum teſticulorū 168. 29
grandinoſum os 148. 13. & 168. 54
γαφροειδὲς proceſſus 31. 40. & 112. 5. & 166. 56
* Guades dictæ uenæ 270. 14
* guidetz dictæ uenæ 270. 14
gulæ appellatio quibuſdam pro ſto macho 388. 8
G V L I E L M V S M A R T I N V S S T E L L A iureconſul. 531. 16
guloliſ maius iecur datum 507. 10
gurgulio quid 580. 13
guſtatus ſedes 19. 10
guſtus inſtrumentum 650. 20
guttur 153. 18
gutturis os 167. 27

H



Hæmorrhoidum fluxus par ratio cūmenſtruo ſanguine 538. 38
* Hæmorrhoidum modus 267. 14
hæmorrhoidū ſanguis unde profluat 538. 46
hamuli pro ſectione paradi. 236. 32. delineatio 235. 49
* hanabub Arabibus uocata uena 276. 53
harmonia 12. 22. & 16. 9
harmoniarum coitus cuiuſmodi 16. 47
Haſoher 387. 50
hæſus os 168. 14
* Hector ab Achille circum Troiam tractus quo paſſio 246. 8
ἡπικτινὶς dicta uena 276. 53
hermaphroditorum ſpecies, cur non etiam recenſeantur 522. 26
ἱφίον os 167. 39
Hippocratis locus de ſecundo ceruicis uertebrae nomine 66. 31
* Hippocratis ſententia, de phlebotomia in pleuritide quæ 281. 54
Hippocratis ſententia de ſepto tranſuerſo, notata 291. 43
Hippocratis de ſtomachi inceſſu ſententia 388. 36
Hippocratis de ſummo humero locuſ 99. 54
Hippocratis de temporalibus plagis locus 31. 30
Hippocratis locus de uertebraſ luxatione explicatus 58. 23
Hippocrati quæ dicantur acetabula 540. 2
Hiſpani cuiuſdam, & unionum ab eo deuoratorum hiſtoria 390. 48
homo quibus locis à ſimia diſſerre Galeno perſpectus 528. 3
hominis primarium effectiuū principium uirile ſemen 520. 38
hominis principia ipſum diſpenſantia, tria 88. 50
hominis uiscera ad ipſorum fabricam

diſcendam non inuoluitur exquiliſ 512
homini breuiſſimam obtigiffe infeſtiorē maxillam 43. 47
hominem neceſſario corruptioni obnoxii, mortalem uel eſſe 384. 1. inde hominem pluribus oſſibus coſtare, motus gratia, etc. 11. 42. inde hominem producere immortalē materiæ occaſione non licuiſſe. 519. 54
hominum & canum παύλεως diuerſi coloris 497. 34
hominum fabricæ ratio 520. 5
humani alimentum ad plantarum nutritiam uim differentiā 493. 42
humerales muſculi ſex. 106. 39. inde humeraria uena, quare, Vena humeraria.
humerus quid. 13. 49. & 105. 1. & 167. 53. & 168. 3
humerus ſummus quid. 99. 23. 51. & 100. 44. eius uſus. ead. 45. & 102. 52. & 167. 55
humeri appendix. 5. & 6. 23. & 8. 2
humeri articulus. 97. 55. cur à coſtis remoueat 102. 52
humeri caput 9. 10
humeri figura & deſcriptio. 104. 5 & 105. 1. inde
humeri foramina 107. 52
humeri in anteriori ſede aſperitas ad quid parata 107. 46
humeri orbita γυγλυμοειδὲς 106. 24
humeri oſſis figura 2. & 5. & 6. 10
humeri partis ſuperioris & inferioris deſcriptio. 105. 15. 43. item mediarum partium 107. 29
humeri inferioribus proceſſibus nulli appendices 8. 23
humeri tuberculū externum. 106. 46. internum. ead. 55
humero excipiendo paratus ſinus 97. 42
humerū poſt ſemur nō eſſe omnium oſſiū grandiffimum, uti Galenus cenſuit 105. 9
humerum ſcapulæ neceſſarium ligamentorū deſcriptio. 271. 17. adminiſtratio 272. 3
humeri 167. 51
humerorū ſcapulis in ſceletō coniungendorum ratio 161. 28
* Hymen puellarum conſtituentes uenulæ 290. 13
hyoidis oſſis figura. 55. 5. 11. inde ſitus & nomina. ead. 33. inde hyoidis oſſis firmatio, & uſus 56. 23
hyoidis oſſis medium officulum. 55. 45. latera. 56. 6. inde
hyoidis oſſis quot offacula 162. 38



I
Iaculator quid 525. 2
ianitor, uentriculi oriſicium. 390. 27. & 391. 16
IACOBVS NIGER
Genuenſis 90. 5
* Iecoraria dicta uena quæ. 276. 55. & 277. 1
iecur an crapula abſumatur 507. 14. iecur

- lecur anteriori peritonæi sedi conne-
 xum 507.51
 lecur cuius animæ facultatis sedes.
 594
 lecur homini grādus, & quibus ma-
 ius obtigerit 507.11
 lecur humanum nullis fibris diui-
 sum 507.3
 lecur maxima ex parte costis succin-
 gi munitur 505.49
 lecur nulla peculiari eguisse figura.
 506
 lecur nutritionis organorum præci-
 pui, & sanguinis officina. 505.30.
 & 508
 lecur quare sanguine nutriatur cras-
 siori 508.39
 lecur septo connectentium præcipu-
 um ligamentum 356. & 357.5
 lecoris caui delineatio. 365.4. & 370.8
 lecoris constructionis ad testes colla-
 tio 525.41
 lecoris examen 603.13
 lecoris fibrarū ridicula quibusdam
 efficta nomina 506.51
 lecoris fibrarum uentriculum appre-
 hendentium figmentum unde na-
 tum 506.47
 lecoris forma uaria 505.55
 lecoris gibba posteriorisq; sedis de-
 lineatio. 369.1. caua. 370.8. &
 372.30
 lecoris gibbus 373.4. & 376
 lecoris humani formā à canū & por-
 corum lecoribus uariare 506.42
 lecoris ligamenta, ac ex illis prona-
 scens tunica 507.42
 lecoris munus siue officium. 385.13.
 ipsiusq; structuræ ratio 508.4
 lecoris sanguificatio qui conficiatur.
 508
 lecoris sedis figura 360
 lecoris situs, eiusdemq; ratio 505.
 31.44. qualis in auiibus & canibus.
 505
 lecoris situs examen. 551.14. & 552.1
 lecoris substantia. 507.16. uenarum
 series. ead. 13. arteriar. 35. substantia
 ualis circumfusa. 38. nerui. 55. eo-
 rumq; omnium ratio. 508.41. inde
 icium ab ileo nihil minus quam
 inanitione dirimendum 499.18
 icium intestinum cuiusmodi.
 499
 icium intestinum cur cremorem
 suum ocyus transmittat 503.47
 icium intestinum & ileum cur in
 uentris medio sita 502.54
 icium intestini finis ubi constituen-
 dus 499.9
 icium intestini uenæ & arteriæ. 499.
 39. item nerui ead. 49
 ileon intestinum cuiusmodi. 499.7
 ileum & icium intestinum cur in
 medio uentris sita 502.54
 ilei intestini initium ubi statuedum.
 499
 ilei intestini nerui 499.49
 ilium 118.57
 ilium os. 6.2. & 168.19. & 117.14. &
 118
 illū ossis appendix. 5. & 6.17. & 129.
 50. spina, dorsum. ead. & 130.1. &
 129
 ilium ossis appendix quibus muscu-
 lis occupetur. 130.4. quibus inter-
 na eius amplitudo ead. 14
 ilium ossis dorsū lineæ, ipsiusq; occu-
 pantes musculi 130.38
 illū ossis pars retrorsum magis quam
 sacri ossis transuersi processus ex-
 porrecta 129.42
 ilium ossis sedis figura 355. & 356.5
 * ilium ossa, cum osse sacro ne senti-
 um ligamentorum descriptio. 252.
 17. administratio 256.19
 ilium ossa cur in mulieribus amplio-
 ra 132.1
 ilium ossis figura 5
 ilium ossis sedes sacro ossi commissæ
 qualis 119.16
 incisorij dentes 45.49. & 167.17
 incudi comparatum ossiculum. 34.
 54. ipsius figura 33. & 34.26
 indusium quibusdam dicta scerū in
 uoluens membrana 543.4
 * iux
 iux, dicti musculi 257.37
 iux os 267.44
 166.45
 infundibulum cerebri. quære, Cere-
 bri infundibulum.
 innominata carilago quæ 154.5
 inspiratio naturalis uolenta 292.52
 inspiratio quibus musculis fiat. 292.
 55.
 inspirationis usus 570.7
 instrumentorum Anatomicorū de-
 scriptio. 236. delineatio 235
 instrumentorum chirurgicorum de-
 lineatio 329.20
 intercostalium musculorum descri-
 ptio. & administratio. 289.40. ex-
 terni. ead. 49. interni. 290.7
 intercostalium musculorum munus
 iuxta Galeni mentem. 290.21. iux-
 ta ueritatem ead. 28
 intercostalium musculorum nume-
 rus. 289.40. iuxta Arabes. 290.14
 internodia 116.27. & 121.47
 interpretum oscitantia 111.7
 interscapilij uertebrae 167.37
 intersepientes membranæ. uide,
 Membranæ.
 intestinum cæcum. uide, Cæcum.
 intestini crassum in colon et rectum
 diuidi 501.10
 intestinum duodenum 362.1
 & uide, Duodenum.
 intestinum icium. uide, Icium
 intestinum mediū an recte à Cicero-
 ne uersum pro mesenterio. 504.6
 intestinum ileon. uide, Ileon.
 intestinum princeps quod nam.
 501
 intestinum rectum, & colon, uide,
 Rectum, & Colon.
 intestini cæci, coli, rectiq; imago &
 ductus 351.15. & 362.41. & 363
 intestini crassi ductus ac situs. 506.51
 intestini gracilis ductus. 498.33. &
 iusdem in tria diuisio. 498.47. for-
 ma, & substantia 499.21. inde
 * intestini recti anularis musculi de-
 lineatio 226.34. & 225.23
 intestini recti musculorum examen.
 556
 intestina continuū quidem esse cor-
 pus, sed pluralitatis numero, ua-
 rijsq; nominibus diuersas ob cau-
 sas donari 498.11
 intestina qui à mesenterio rescen-
 da, & à corpore auferenda. 513.4
 intestinum à uentriculo exortus.
 498
 intestinorum crassorum historia. 29
 500
 3. inde
 intestinorum crassorum tunica. 20
 501
 intestinorū ductus longitudo quan-
 ta 498.9
 intestinorū formæ ratio. 503.13. item
 substantiæ, & tunicarum. ead. 17
 fibrarum. 26. uenarum & arteria-
 rum 35. neruorum 42
 intestinorum glandes 499.54
 intestinorum gracilium uenæ & ar-
 teriæ 499.38. item nerui. ead. 49
 intestinorum historie breuis enu-
 meratio 498.23
 intestinorum in scortum defensus.
 495.24
 intestinorum munus 385.10
 intestinorum munus, ac dein eorum
 constructionis ratio 501.57. inde
 intestinorum nomine quæ compræ-
 hendantur 498.6
 intestinorum pars caua quæ dicitur
 Anatomicis. 499.35. item quæ gib-
 ba ead.
 intestinorum sedis figura 360
 intestinorum situs examen. 550.45.
 eiusdem ratio 502.51. inde
 intestinorum situs, forma, substan-
 tia 498.23
 intestinorum tenuium ductus deli-
 neatio 362
 intestinorum tunicam anteriorem ali-
 quando in agris putrefcere, exte-
 riore salua 503.19
 intestinorum tunica 362.41. inde
 intestinorum tunica qui examinan-
 da 553.22
 intestinis nullas uenas propagari à
 caua, contra quam Galenus tradit.
 504.
 49
 intestinis obnatus adeps 501.51
 Introductorij autor alius à Galeno
 17
 inuerecundum os 166.43
 inuolucrum cordis. uide Cordis in-
 uolucrum.
 IOACHIMVS ROELANTS me-
 dicus 538.12
 LI 4 IOAN.

IOANNES CENTVRIO Genu
ensis 124. 39
IOANNES DRYANDER medi
cus 395. 3
irascibilis animæ sedes cor
1594. 19
iris, oculi circulus quis
240. 37
ιδρύς cur pro faucibus
579. 20
ιδρύς 128. 56. & 168. 21
Italia circumscriptionem referens
1. 43
os 11. 1
ιτυς 11. 1
iugale os. 22. 6. & 23. 20. & 33. 3. 13.
& 38 14
iugalis ossis usus 33. 21. 32
iugalia ossa 1. 37. & 167. 8
iugularis uenâ. quare, Vena iugul.
92. 22
iugulum pectoris ossis
102. 2. & 167. 51
iugula 167. 38
ισο- vertebrae

L
Abra 11. i
labra mouentes muscu
li. quare, Buccas mo
uentes musculi.
labra mouentium mu
sculorum historia. quare, Muscu
lorum labra mouentium.
labrorum fungosa substantia. 245. 40
laceriam uiris quibusdâ post pubem
exprimi 545. 23
lactis in mamillis generatio, eiusque
ratio 546. 48
lactes an recte pro mense terio uer
sum à Gaza 504. 6
lacticia quare 580. 1
λακτόν 281. 23
λακτόν OS 168. 19
lambdoeides futura. 21. 19. & 23. 5.
32. & 166. 28. unde dicta 26. 42
lambdoeides future additamēta. 28. 39
λαμβδοειδής OS 55. 36. & 167. 26
lapidea, siue lapidosa ossa. 1. 34. & 33.
7. 33 & 166. 48
lapidosa caluarie sedes 167. 6
larynx. uide Arteria aspera.
larynx, etiam φάρυγξ dicta 579. 17
larynx, asperæ arteriæ caput 153. 18
laryngis cartilagine 340. & 52
laryngis cartilaginum coordinatio
nis ratio 578. 21
laryngis cartilaginum figura & de
scriptio. 152. 3. inde. & 153. per totū.
laryngi appositæ glandulæ 261. 16
laryngis glandularum & pinguedi
nis ratio 578. 46
laryngis γλωττις, qualiter spectanda.
261 20
laryngis ligamenta 260. 31
laryngis lingula seu rima, præcipuū
uocis organum 144. 47
laryngis duo musculi Galeno igno
rati 260. 19
laryngis musculorū administratio.
260. 41. cōmuniū ordine. 48. pro
priorum. 12. ordine 261. 35
laryngis musculorū descriptio. 258. 32
laryngis musculorum examē. 604. 14
laryngis musculorum alij proprii, a
lij communes. 258. 37. priorum

numero 12. descriptio ordine. 258.
46. functio. 259. 45. communium,
qui sex sunt, descriptio. 259. 49.
functio 260. 9
laryngis musculorū delineatio. 256.
communium, primi & secundi. 257.
32. tertij, quarti. ead. 34. quinti &
sexti. ead. 38. priorum delinea
tio. 257. 48. & deinceps
laryngis operculum 154. 35. eiusdem
bini musculi. 260. 16. descriptio. i.
bid.
laryngis operculi, duorum musculo
rum administratio, qui ē commu
nibus non habentur 261. 5
laryngis operculi musculorum deli
neatio 257. 43
laryngis operculi usus 578. 13
laryngis radici adnatæ glâdes. 576. 54
laryngis rimæ usus 577. 52
laryngis substantia cuiusmodi. 575. 55
laryngis superficies exterior & inte
rior qualis 575. 11. inde
laryngem succingens tunica 260. 36
lateralis morbi uenæ sectio cuiusmo
di optima 514. 6
* in Laterali morbo quæ uena secan
da 267. 31
latum os 167. 39
laude os. 166. 45. & 167. 27 (166. 11)
L A Z A R V S Hebraus de Frigeis.
ἀλῆα, siue planæ testibus compara
tæ 520. 50
* λινός, seu torcular cerebri 309. 47
λινιδειδὴ ossa 166. 48
λινιδειδὴ προσωλλήματα 27. 54
λινιδειδὴς futura 166. 35
* lethargica arteria 296. 45
licur linguosum uiscus appelletur.
511 42
lien cur risus author uulgo dicatur.
514 8
lien qualis in aubus & canib. 505. 47
lien quid in uentriculum eructet, &
quo meatu 513. 36
lienis beneficio, an cor refrigeretur
514. 11
lienis eximendi ratio, in Anatome
553. 38
lienis nutritio, eiusdemque ratio 385. 18
lienis omēti membrana adhuc testī
figura 357. & 358. 21
lienis omni ex parte cōspicui figura,
369. 22. inde. & 370
lienis situs 494. 16. & 511. 25. forma.
ead. 32. superficies & color. 52.
substantia 512. 7. 14
lienis situs examen 551. 14
lienis tunica, & nexus eiusdem 512. 53
lienis tunica qui obseruanda, simul
cum ipsius ad uentriculū nexu &
substantia 554. 2. inde
lienis uasorum series 512. 6
lienis uenæ, arteriæ & nerui unde du
cantur 512. 37
lienis uenarum arteriarum & neruo
rum series 358. & 359. 52
lienis usus ac functio 513. 7
lienem cursoribus eximi, stulte per

suasum uulgo 513. 8
ligamentum, σπασμός, quid 215. 8
ligamentum ceruicis uertebra primam secundæ annexi. 280. 30.
descriptio, ibid. administratio.
ead. 42. delineatio 279. 57
ligamentum, linguam faucibus alli
gans, quale 255. 53
ligamentum secundū linguæ longi
tudine, ossis uicem præstans. 255. 17
* ligamentū inter ulnam & radium.
221. 13
ligamentum ossis dentis dicti 280.
& 44
ligamentum totam pedis amplitudi
nem subiens. quare Pedis ampl.
ligamenti descriptio, quo ostenditur
caput super uertebra secundā ad
anteriora posteriora ue non mo
ueri 280. 28
ligamenti & nerui, in musculis con
stituentis permixtio. 220. 14. eius
delineatio 218. 38
ligamenti in musculorum fabrica ne
cessitas 219. 50
ligamenti substantia 215. 16
ligamēta alia unum duntaxat usum
præstant, alia plures: & quæ qua
lem 217. 1
ligamēta, caput humeri scapulæ cer
uici annexientia. 268. 22. eorū de
scriptio. 271. 17. administratio 271. 3
ligamenta dorsi uertebra. quare
Dorsi uert.
ligamenta γυνώσκια, id est transuersa
seu anularia 215. 65
* ligamenta femoris ossis. quare Fe
moris ossa
ligamenta fibulæ ad ossa tibie. quæ
re Fibul.
ligamenta genu articuli. quare Ge
nu art.
ligamēta in externa cubiti sedē. quæ
re Cubit.
ligamenta laryngis 260. 31
ligamenta Manus. quare, Manus li
gament.
* ligamenta musculorū manus con
stitutionem subeuntia. 221. 21 (24)
ligamēta nerui nomine uocata. 315.
ligamenta νδύορχονδρῶδιν σπασίοντα
dicta, quæ 301. 10
ligamenta, ossa colligantia. 215. 12.
tendines in suis sinibus continen
tia. ibid. 31. ossiū sinus succingen
tia. 216. 17. ossium acetabula, au
gentia. ibid. 24. propugnaculū
uicem præstātia. ibid. 29. quæ in
terstitij instar sunt. ibid. 43. mu
sculi constitutionem ingredientia.
ibid. 52
ligamēta pedis transuersa. quare Pe
dis ligamenta.
ligamentorum, ab usu sumptæ diffe
rentiæ quinque. 215. 12. prima. ibid.
secunda. ibid. 31. tertia. 216. 29.
quarta. ibid. 43. quinta. ibid. 52
ligamentorū capitis ad ceruicis uer
tebra primam & secundā descri
ptio.

I N D E X

ptio. 280. 6. administratio. *ibid.* 35.
delineatio 279. 47
ligamentorum cuiq; parti corporis
peculiarium traditionem, sub ipſi-
us partis elemento reperies: uelut
Thoracis, Capitis, &c.
ligamentorum differentie alię, ut ab
ortu. 217. 29. à partibus necien-
dis. *ibid.* 32. à partibus quibus
committuntur. *ibid.* 38. à subſtan-
tia. 16. 41. à ſitu. *ibid.* 52. à for-
ma. *ibid.* 54
ligamentorum maxillam inferiorem
ſuperiori necientium adminiſtra-
tio 250. 33
* ligamentorum os ſacrum cæteris
anneſcentium adminiſtratio, 243
29
* ligamentorum, os ſacrum illium of-
bus colligantur, deſcriptio. 252. 17.
adminiſtratio 256. 19
ligamentorum ſubſtantiam ingredi-
ens cartilago 4. 35
ligamentorum thoracis deſcriptio
294 45
ligamentorum tranſuerſorum, ad di-
gitos fleſcentium muſculorum ten-
dines uſus 308. 1
ligamentorū uſcidus humor, & quid
praeflet 16
ligamentorum uſus. 16. 31. inde
ligamentis cōmune, obſcure ſentire
218 14
ligamentis tranſuerſis adſcribendæ
membranæ 216. 5
Ligures, *ἡπίοντες* ueteribus dicti.
90 6
limborum uaria ſuitio 16. 5
lingua cur muſculis indigeat. 253. 37
lingua, quid rarum in muſculis habe-
at 254. 1
lingua guſtatorium organum cuius
ſit beneficio 254. 15
linguæ fibrarum delineatio 253. 32
linguæ fibrarum officia 255. 11
linguæ iuſta magnitudo 253. 34
linguę ligamentum. 254. 10. offis ui-
cem præſtans 255. 17
linguę motus, in de Partū uſu quali-
ter tractetur à Galeno 253. ult.
linguæ muſculorū cognitio cur diffi-
cilis 253. 45
linguæ muſculorum examen. 604. 8
linguæ muſculorum nouem admini-
ſtratio, ordine 255. 26
linguę muſculorum nouem, euiden-
tium, deſcriptio ordine 254. 28
linguæ nouę muſculorū natura ac ſi-
tus delineatus 253
linguæ muſculorum ſectio apud Cla-
lenum interijt 253. 51
linguæ os 167. 27
linguæ portio ante ſectionem cōſpi-
cua quibus conſtet partibus. 254. 8.
& 255 3
linguæ reliqui corporis adminiſtra-
tio 255. 42
linguam faucibus alligans ligamen-
tum quale 255. 53

linguam mouentium muſculorum
delineatio 252. 40
lingula, uocis organum 154. 52
λίβανος offa 33. 33. & 166. 48
λίβανος iecoris 506. 40
lobi pulmonis quot 581. 46
loculi, extimum forus inuolucrum.
541 56
longaon in teſtinum 501. 15
Louanium obſidione à C H R L
STOPHORO P F L V B G E L li-
beratum 19. 47
luhach quid Arabes dicant 4. 26
lumbare os 167. 39. & 168. 20
lumborum uertebræ. 167. 38. eorūq;
motus 295. 33
lumborum uertebræ quomodo fora-
minibus à ceruicis uertebris uariet
70 40
lumborum uertebrarum delineatio.
77. uide, Vertebræ lumborum.
lumbos mouentium muſculorū tra-
ditio tota. quare, Doſi mouen-
tium paria quatuor poſtrema, ſiue
5. 6. & ſeptimum.
Lutetia itineris à porta D. Iacobi ad
eam quæ Martini dicitur, uaria
nomina 498. 18
luxationes appendicū in pueris fre-
quentiores quàm articuloꝝ. 27. 24



M
Alarum cutis muſculo
caret 243. 40
mallei forma, ſecanti a-
pta. 237. 9. eiufdem
delineatio 235
mallei in auditu organo delineatio.
33. & 34. 24
malleolus interior 8. 32
malleoli exterioris & interioris figu-
ra & deſcriptio. 136. & 137. 57. &
138. 6. inde. & 139. 50. & 140. 17.
malleolo non diſſimile oſſiculū. 35. 14
malleolū ab Anatomicis perperam
pro talo uſurpari. 140. 17. & 168. 44
malleoli 168. 41
malum granatum, pectoris offis car-
tilago. 93. 19. & 167. 48. item teſticu-
lorum 168. 29
mamillaris capitis proceſſus. 22. 25. &
23. 30. & 31. 27. & 36. 44. & 167. 1
mamillæ an ex deuorato à muliere pi-
lo uexari *ῥομφαία* poſſint. 544. 20
mamilla cur homini elatiꝝ, cæteris
animalibus demiliſſus poſita. 545.
46
mamillarum cum genitalibus affini-
tas 546. 25. cum utero. ead. 46
mamillarum examen 557. 10
mamillarum formæ ratio 546. 16
mamillarum glanduloſæ ſubſtantie
temperies 546. 29
mamillarum munus & officium, ip-
ſarūq; cōſtructionis ratio. 545. 10
mamillarum natura oculis ſubiecta
378. & 379 inde
mamillarum nerui unde ducantur.
545. 4
mamillarum ſitus, forma, ſubſtātia,
etc. 543. 33 inde. & 544. 6

etc. 543. 33 inde. & 544. 6
mamillarum ſitus ratio 545. 33
mamillas petentium uenarum ſeries
544. 31. inde & 546. 30
mandibula 167. 14
manſorium muſculum à iugali offe
initium ducere 33. 32
manus quid Hippocrati 116. 5. &
220. 4
manus ſumma extrema ue que. 116. 2
manus colliculorum ſiue montium
apud chiromantas, fabrica 303. 44
manus cutis interna, cur debilis. 303.
14
manus delineatio 115
* manus digitorū ac pedis ratio mo-
tus prope par 248. 57
manus digitorum motus 304. 41
manus digitos fleſcentiū tendinum
ligamenta tranſuerſa, eorūq; uſus.
308 1
* manus digitos fleſcentium muſcu-
lorum adminiſtratio 223. 13. primi,
ſecundi, tertij. *ibid.* octio ſequen-
tium. 224. 45. quinq; ſequentium.
ibid. decimiſepimi, octauū, noni.
224. 9. reliquorum ad uigeli-
mum tertium. *ibid.* 26. ſex ultimo
rum 224. 38
manus digtos mouentium muſcu-
lorum delineatio. primi. 187. 18. ſe-
cundi. 189. 4. tertij. *ibid.* 13. octio,
quatuor digitorum primos articu-
los fleſcentium. 193. 25. maioris
primum pollicis os fleſcentiū. 193.
24. minoris. 189. 17. decimiſepimi
omnium. 195. 47. decimiſeptimū,
ibid. 50. deciminonū. 198. 53. uigeli-
mi. 172. 51. primi. 198. 53. ſecun-
di & tertij. 198. 47. pollicem maxi-
me abducentis. 172. 49. adducentis
220. 6. quatuor muſculorū digitos
quatuor pollicis adducentiū. 199. 11
manus digitos mouentium muſcu-
lorum deſcriptio. 304. 33. numerus
305. primus 305. 4. functio. 36. ſe-
cundus. *ibid.* 40. tertius 305. 25. fun-
ctio amborū 307. 1. & 308. 10 octio
ſequētes, primis quatuor digitorū
offibus præfecti. 308. 15. duo ſe-
quentes, pollicis offi primo præfe-
cti. 308. 31. qui ſecundo, tres rursus
aliq. 4. *ibid.* 47. ſiſtētiōq;. 309. 11. de-
cimū ſeptimū. 309. 52. decimū ſe-
ctauus & decimū nonus. *ibid.* dem.
20. functio omnium. 311. 1. & 23.
uigelimus. *ibid.* 25. uigelimus pri-
mus, ſecundus. 311. 33. functio utri-
uſq;. 312. 19. uigelimus tertius. 311.
42. Sex reliqui, quorum duo pol-
lici. 312. 31. reliqui quatuor, digitis
præfecti. ead. 32
* manus digitos mouentium muſcu-
lorum inferiones ſimul collectæ.
321 25
manus digitorum lateribus addita
ſubſtantia carnea cur 304. 23
manus digitorum offa cuiuſmodi, et
quot ſingulorum. 121. 47. eorundem
tendines,

- tendines, etc. 123. 14. inde. uide, Di
gitorum ossa.
- manus digitorū regioni internæ sur-
perstrata substantia carnea. 303. 44.
- manus extremæ ossa quot 149. 19
- * manus ligamentorum administra-
tio 224. 45. & 223. 56
- * manus ligamentorum descriptio.
220. 1. quæ tendines continentia-
nulum modo. ead. 12. quæ ossa
connectunt. ead. 49. quæ muscu-
lorum constitutionem subeunt.
- 221 21
- manus ossicula sesamina cuiusmodi
126 1
- manus pecten, & pectus 168. 16
- manus summæ cutem internā qua-
lem parari decuit 302. 54
- manui summæ adnata caro, quid præ-
siet 304. 30
- manus uolæ mediæ nervosa tenuita-
te sua subnati musculi descriptio.
302. 26. administratio. * 222. 32
- manum petentes nervi. quare
Nervi.
- per Manum tendentium uenarum
ac arteriarum examen 246. 26.
- * in Manu extrema musculi quot.
221 39.
- MARCI ANTONII CONTRA
RENI laus 691. 1
- MARCUS ANTONIVS GE-
NVA philosophiæ professor Pa-
tauij 35 54
- Marini Anatomicorum librorum
iactura 580. 2
- Marini lapsus de patellæ cartilagine.
142. 5
- masseteris musculi examen 603. 42
- masseterem à iugali osse principium
ducere 33. 32
- masseteris dicti musculi 246. 26
- masseteris processus 31. 36. & 167. 1
- MATTHÆVS TERMINVS me-
dicus 159. 24
- de Matricis cellulis stulta quorundā
persuasio 531. 10
- * matricis dicta uena 293. 30
- maxilla inferior cur durior facta. 43.
52. cur unico fere osse in homine.
44. 1
- maxilla inferior homini breuissima.
43 48
- maxilla inferior sola mouetur in ho-
mine 246. 14
- maxilla inferior ualidior superiore,
& scabiei Gallicæ minus obnoxia.
39 15
- maxillæ inferioris ceruix 10. 15
- maxillæ inferioris duo utrinque pro-
cessus. 44. 20. cartilago peculiaris.
ead. 26 foramina 32.
- maxillæ inferioris figura 5. & 43
- maxillæ infer. in posteriori sede am-
plitudo, tenuitas, sinus, asperita-
tes. 44. 45. inde
- maxillæ inferioris motus tres. 246. 12
- maxillæ inferioris musculi 604. 10
- maxillam inferiorem mouentium mu-
sculorum delineatio. lateris alteri
us primi. 182. 8. secundi. 182. 6. ter-
tij. 188. 8. quarti, qui deorsum ma-
xillam trahit 185. 10
- maxillam inferiorem mouentium mu-
sculorum descriptio. 246. 14. admi-
nistratio 249. 48
- maxilla superior quid 39. 23
- maxilla superior cur pluribus ossib.
ijsq; cauis ac leuibus constet. 39. 1.
inde.
- maxillæ superioris ossa 22. 1. 5. &
23 18
- maxillæ superioris ossa priuatis no-
minibus carere 167. 12
- maxillæ superioris ossium expressio.
36. 31 & 38. 12
- maxillæ superioris ossium structura
ratio. 39. 15. & eorundem enumera-
tio. ead. 25. inde & 42. 7
- maxillæ superioris tractatio perpetua
à Galeno instituta 42. 14. inde
- maxillæ musculorum nomina. 246. 25
- maxillam deorsum trahentis musculi
administratio 250. 24
- maxillam deorsum trahentes muscu-
li quid peculiare obtineant. 249. 12
- maxillam mouentium musculorum
historia. quare, Muscul.
- maxillas connectentia ligamenta.
250 33
- maxillares dentes 167. 21
- meatus foetus urinam educens.
518 36
- meatum urinam erentibus in ueli-
cam deducendum historia. 518. 43.
- eorundem artificiosa insertio. 510. 10
- * mediana dicta uena 287. 15
- medianum pro mesenterio 504. 6
- mediastinum uulgo quid 572. 14
- medico de anime quocq; facultatibus
ac sede considerandum 594. 45
- medicorum de cordis ceruini osse im-
positura 94. 23
- medicorum in Anatome oscitantia
& ignorantia 81. 1. 36
- * medicorum in distinguenda secti-
one uenarum pedis, imperitia. 293.
24
- * medicorum in uenarum scientia
ignoratio 288. 2
- medulla cur in singulis uertebis im-
par 58. 47
- medulla dorsi. quare Dorsi medul-
la proprium ossium nutritum
3. 1
- medulla qua ossiū parte reponatur.
3 3
- medullæ dorsalis eadē cum cerebro
natura 58. 17. 56
- medullæ dorsalis initium quod 322. 22
- medullam continentium sinuum ap-
pendices non esse opercula 7. 40
- * medullæ dicta uena 276. 53
- membrana carnosa quæ. 232. 45. cur
sic dicta. ibid. 54. & 386. 4. & 521.
36.
- membranae carnosæ administratio.
234. 1. delineatio 231. 30
- membrana cerebri tenuis 200. 148
dicta 628. 6
- membranae cerebri tenuis delinea-
tio quibus locis petenda. 627. 42
- membranae tenuis in cerebro descri-
ptio. 627. 38. numerus. ibidem
45. situs. ead. 51. superficies ex-
terior. 628. 2. fabricæ totius ratio
& usus. ibidem 4
- membra dura cerebri cur sic dicta.
624. 34
- membranae duræ basii, et eorum quæ
adsunt illi examen 654. 40
- membranae duræ cerebri administra-
tio. 651. 30 tenuis. ibid. 46
- membranae duræ cerebri delineatio
quibus locis petenda 624. 16
- membranae duræ cerebri descriptio.
624. 14. situs, numerus, magnitu-
do, forma. ibid. 34. superficies in-
terior. 626. 10. usus & constructio
nis totius ratio. 626. 53. nexus ad cal-
uariam. 625. 12. ad tenuem membra-
nam. 626. 27. processus. 626. 40.
uasa. ibid. 37. foramina 626. 40
- membranae duræ cerebri sinuum ad-
ministratio 653. 21
- membranae caluariam foris succin-
gentis creatio & usus 627. 12
- * membrana, musculis in cubiti lon-
gitudine, obnata. 220. 42. obser-
uanda quomodo 222. 31
- * membrana, musculis cubitum oc-
cupantibus obducta. 210. 42. ob-
seruanda quomodo 222. 32
- membrana ossibus obducta. 3. 23. 30
- membrana uentriculorum dicta 294. 56
- membrana pubis ossium. quare,
Pubis ossa.
- * membrana pubis ossis Foramen oc-
cupans. 252. 28. administratio eius.
256 19
- * membranae pubis os comprehen-
dentes Anatome 243. 25
- membranae cerebri. quare, Cerebri
membranae.
- membranae interspersæ quo pacto
inuicem distent 572. 25
- membranae interspersæ quo pacto
médatura, numerus, situs, forma,
etc. 572. 13 inde
- membranae interspersæ substantiam
subeuntia quæ 573. 6
- membranae interspersæ superficies &
connexus. 573. 20. ortus
27. usus eod.
- membranae orificiorum cordis unde
cūm. 591. 33. uide, Cordis, etc.
- membranae, transuersæ ligamentis
adscriptæ 216. 5
- membranae thoracis amplitudi-
nem interspersæ examen. 599. 57
- membranularum cauae uenæ orifi-
cio praefectarum usus. 597. 23. item
arterialis uenæ. ead. 37
- membranularum uenalis arteriæ &
magnæ arteriæ usus 598. 52
- membrum 7. 14
- memoriae os 166. 45
- memoriosa mendosa

INDEX

inendosa ossa 166. 54
mendosa suturae 166. 36
menstrui sanguinis ad lactis genera-
tionem in gerentibus uteri ratio.
547. 1 inde
menstrui sanguinis temperamētum
acratio 384. 13. inde
menstruæ purgationes unde fluant
mulieribus 338. 8
de Menstruis purgationibus proble-
mata quorundam 546. 2
μεσούρι 168. 23
meri quid 388. 9
μεσεντερικόν, & μεσεντερικόν 504. 5
mesenterium quas uenas aut arteri-
as admittat. 504. 34. 46
mesenteria quomodo Galeno nume-
rentur tria 504. 19
mesenterij centri delineatio. 365. &
366 51
mesenterij delineatio 369. & 364
mesenterij & omenti eximendi ratio
in Anatome 553. 49
mesenterij grandior arteria. 358. &
359 44
mesenterij membranae & adeps. 505. 1
mesenterij muliebris delineatio. 377
mesenterij natura qui per sectionem
indaganda 552. 43
mesenterij nomenclatura 504. 5
mesenterij situs. 504. 11. substantia.
ead. 14. forma & ortus 18
mesenterij substantia ratio & usus.
504 33
μεταπνεύριον 120. 2. & 168. 16
metaphrenum 56. 50
μεταφρενικαε vertebrae 167. 37
μεταφρενικός 168. 54
μεσάνιος os 166. 42
Michaelis Scoti indocilis. de physio-
gnomia scriptum 551. 13
inola 168. 31
molaris dentis utraque facies. 33. &
34 25
molaris denti simile ossiculum 35. 13
molares dentes qui 46. 4. & 167. 21
molarum exasperandarum ratio. 46. 8
Mondini de uteri formatione error.
581 26
monilis à quodam Hispano deuora-
ti historia 390. 48
monoculum foramen 53. 12
IOAN. BAPTISTA MONTA-
NVS medicus 307. 31
mordentes dentes 167. 20
morsus Adami os 167. 27
morsus dulcis 359. 55
motus animalis maxime proprius.
11 40
motus circumuersionis 13. 27
motus seruato sensu perit, & contra.
348 34
motus arbitrarij sensusque principij
cerebrum 599. 13
motus articularum non eadem ratio
13 3
motus euidentes. 13. 4. obfcuri 9
* motus naturales alij fibris, alij sine
illis perficiuntur 557. 40

mucronata pectoris cartilago, eius-
que usus. 93. 3. 17. & 167. 46. & 357.
6 & 356
muliebris Anatomes ratio ac series
557 9
muliebris corporis trunci delineatio.
877 & 378
muliebris pudendi prominulae car-
tunculae. 536. 54. earumque præcisio
cuiusmodi eadem
muliebris pudendi carticula non in
omnibus aequales 532. 1
muliebris uterus acetabulorum ex-
pers 540. 9
mulieres etiam semen habere perin-
de ut uiros, idque cuiusmodi. 537. 52.
& 540 41
mulieres genibus innixas felicius
parere 131. 56
mulieres præpingues cur ad concipi-
endum minus aptae. 495. 5. 16. &
530 16
mulierum à Vesalio hæcenus secta-
rum catalogus. 538. 52. & 540. 15
mulierum pinguedine, feminalium
uasorum seriem latere. 376. 56
mulierum pubis ossa quid à uirorum
ossibus differant 131. 42
mulierum testes cuiusmodi. 535. 23.
eorundem inuolutura 38
mulierum uasa feminaria cuiusmo-
di 535. 47
mulierum uesica quatenus à uirorum
diuersa 519. 24
mulieribus parturientiibus non reclu-
di pubis ossa 131. 50
musculus quid sit, secundum alios
219. 44. quid reuera sit 212. 36
musculus δελταειδής dictus. 264. 45
musculus κρωπις 264. 46
* musculus in manu latescentem tendi-
nem educētis administratio. 222.
32. descriptio eius 302. 27
musculus natura inter ligamentum
& neruum medius 210. 8
musculus neuosa exilitate, uolæ me-
diae & digitorum cuti interne sub-
natus. 302. descriptio eius. ead. 27.
administratio * 222. 32
musculus, qui scapulam antrorsum
agit, controuersus 263. 49
* musculus totius corporis mole ma-
ximus 239. 44
musculus uesicae ceruicis, quare,
Vesicae ceruic.
musculi caput, quid. 210. 21. deline-
tio. 218. 39. finis, seu tendo. 220. 21.
delineatio. 218. 44. uenter. 220. 21.
delineatio 218. 41
musculi caput, tendine non semper
tenuius 221. 53
musculi uenter, designatus 218. 40
musculi uenter, ubi reponendus pro-
prie 217. ult.
musculi femoris motorum quarti or-
tus 84. 16
musculi frontis cutem mouentis de-
scriptio. 237. 19. administratio. ibi
dem 48

musculi in ore delitescētis admini-
stratio. 250. 15. eiusdem descriptio.
248 31
musculi masseteris administratio. 250. 5. descriptio eiusdem 246. 42
musculi maxillam deorsum trahen-
tis, ac tribus illis superadditi, quar-
tisque descriptio 249. 6
musculi membrana 210. 37
musculi neuosa exilitate sua medicæ
uolæ & internæ digitorum cuti sub-
nati delineatio 172. 27
musculi nomen unde. 214. 42. etc.
musculi structuræ depictæ ratio. 218.
musculi substantia præcipua, caro.
222 39
musculi temporalis descriptio. 247.
43. eiusdem administratio. 249. 48
musculi temporalis robur maximū,
ex historia 248. 22.
musculo temporalis quot neruorum
propagines offerantur 327. 15
musculum nullum os mouere nisi eidē
inferat, Anatomicorum axioma. 307. 6
musculi articularum motores pri-
mi, superficiei proximi 226. 34
musculi, carnis appellatione dicti An-
ristotelē 232. 23. 30
musculi λωπαστήρες dicti. 235. ultimo.
nullum fortisuntur musculum con-
trarium 288. 1
musculi etiam uinculorum loco. 16. 39
musculi duo laryngis operculi. 260.
16.
musculi humerales sex. 106. 39. inde
musculi in ore delitescētis, dicti qui.
246 40
musculi intercostales, quare, Inter-
costales musculi.
musculi intestini recti, quare, Inte-
stini recti.
musculi μακροτήρες qui. 245. 38. tem-
porales. ibidem. 37
musculi non æquas portiones nerui
ac ligamenti recipiunt, & quomo-
do 220. 39
musculi non omnes ab ossibus oriū-
tur, contra quā Galenus. 213. 24
musculi, oppositis musculis destitu-
ti 260. 28
musculi os aperientes, qui 246. 41
musculi penis, quare, Penis musc.
musculi recti intestini cuiusmodi.
501 54
musculi, tendinum nomine dicti ab
Hippocrate 267. 41
musculi tendinibus destituti. 222. 49
musculi uteribus carnis nomine ap-
pellati 16. 41
musculi qualiter munus obeant su-
um 222. 19
musculorum administrationis ordo
duplex 264. 1
musculorum brachij, scapulam, tho-
racem, caput, dorsumque mouentium
examen 603. 36. inde
musculorum capita, non minus quam
tendines sentiunt. 222. 5. & laesa
conuulsioni obnoxia sunt ibid.
muscu-

musculorū carni adipem intexi, con-
 quam alij affirmarunt 222. 42
 musculorum differentia quatuor de
 cim. 223. à substantia. ead. 5. ab
 ortu. ead. 24. ab insertione. 56. à
 parte quæ mouetur. 224. 19. à for-
 ma. ead. 28. à foraminibus. 225. 49.
 à magnitudine. 226. 4. à colore. i-
 bidem. 12. à situ. ibidem. 32. à fi-
 brarum genere. ibid. 42. earumq;
 compactione. 227. 17. à musculo-
 rum capitibus. ibid. 34. à ventri-
 bus. ibid. 54. à tendinibus. 228.
 23. à mutua musculorum in offi-
 cio oppositione. 229. 18. à munere.
 ibidem 26
 musculorum fabricæ expositio toti-
 us. 219. 47. eiusdem delineatio.
 213 28
 musculorum fabricæ quid præstet li-
 gamentum. 219. 50. quid neruus.
 ibid.
 musculorum impressiones. 4
 ὀφθαλμοὶ 218. 19
 musculorum laryngis historia. que-
 re. Laryngis musc.
 musculorum linguæ, historia tota,
 quere. Linguae musc.
 musculorum numerus cōtrouersus.
 219. 36. unde petendus. ut à fibris.
 219. 31. ab impressionibus. 230. 15.
 à capitibus. ibid. 20. à tendinibus.
 ibid. 44. à mutuo connexu. 231.
 6. à concursu. ibid. 11
 musculorum omnium usus commu-
 nis 283. 10
 musculorum ortus omnium iuxta
 Galenum. ab osse 213. 24
 musculorum ossis v referentis descri-
 ptio 250. 50
 musculorum ossis v par quartū, sca-
 pulæ motibus non subseruit. con-
 tra Galenum 251. 39
 musculorum ossis v referentis par
 quartum quid peculiare sibi ven-
 dicet 251. 30
 musculorum ossis v propriorum, pa-
 ria quatuor. 251. 3. & deinceps. nō
 propriorum assignatio. ibid. 56. ad
 ministratio unde petenda 252. 37
 musculorum ossis v propriorum iux-
 ta quatuor paria administratio.
 252. 12. eorundem functio. 250. 57
 musculorum ossa mouentium non
 pauci tendinibus carent, contra
 quam Galenus 218. 27
 musculorum pars neruea, carnea, li-
 uida, quæ 226. 29
 musculorum quamque corporis par-
 tem mouentium historiam, sub cu-
 iusq; partium earum elemento ini-
 tiali reperies, uelut eorum qui fron-
 tis cutem, qui palpebras, oculos,
 buccas, labra, nasi alas, maxillā in-
 feriores, linguā, larynga, brachiū,
 scapulā, caput, abdomen, testes ui-
 riles, tum muliebrem uterum, tho-
 racem, dorsum, manus, pedes, etc.
 musculorum quorundam & uaso-

rum administratio 599. 32
 musculorum tendines qualiter disse-
 rant 223. 44
 musculorum totius corporis maxi-
 mus 131. 35
 musculorum trium, masseteris, tem-
 poralis, ac in ore delitescents mu-
 nus 248. 50
 musculis cur addita caro 220. 26
 musculis cur additæ uenæ & arteriæ.
 220 35
 musculis nerui non omnibus in ca-
 pitis exortu inferuntur, & quomo-
 do 221. 30
 musculis non omnibus neruus mi-
 scetur, & quibus 221. 4. & 223. 11
 musculis omnibus unum tantum fi-
 brarum genus tribuens Galenus
 227 7
 musculis: quādo tendines annexan-
 tur 222. 47
 musculis quid nerui uere præsent.
 222 16
 musculis uenas ad extimam tantum
 superficiem adnasci 595. 47
 musculosa temporum lineamenta.
 250 39
 musicorum instrumentorum fabri-
 cæ ratio ex auditus organi compa-
 ge desumpta 35. 48
 musicorum artificum instrumenta
 ad naturæ imitationem fabrefacta.
 578. 11.
 mustacem uocare Latinos labri por-
 tionem quandam 244. 32
 muscularum penis osseus 517. 50
 musti feruentis ad iccoris sanguifica-
 tionem comparatio 508. 18
 μυλαγίς, & μύλα 168. 31
 μυλῖται dentes 167. 21



N
 arium foramina. 39. 7.
 & 54 7
 narium septū. 37. 10. 25
 narium situs 19. 8
 nasi alæ. 151. 27. earundē
 cartilagine. 3. 49
 nasi alas mouentium musculorū de-
 lineatio. primi, secundi. 179. 13. &
 182. 16. tertiij & quarti 182. 15
 nasi cartilaginum descriptio. 151. 11.
 inde.
 nasi cartilaginum structura uel soli-
 us Gallici morbi nomine non osci-
 tanter expendenda 151. 29
 nasi musculorum alas mouentū de-
 scriptio. 244. 27. administratio.
 245 47
 natis 163. 29
 natium cerebri descriptio 638. 19
 naturæ in neruis digerendis scopus.
 317 17
 nauiculare, siue nauiforme os. 168.
 49. uide. Cymbam referens os.
 nerualia ossa 166. 39
 nerualis sutura 166. 31
 neruus instrumentum sensus. 18. 24
 neruus non cēsetur, dorsalis medul-
 læ terminus, ex osse sacro prodici.

339. 44 & 350. 18
 neruus nullus cordi commissus pre-
 ter unum 315. 50
 neruus omnīs sensu tactus præditus
 317 44
 neruus omniū corporis crassissimus
 quo sinu feratur 131. 16
 * neruus pulsilis apud Arabes q̄s.
 259 50
 neruus quibus cōstet paribus. 316. 20
 neruus quinti neruorum cerebri pa-
 ris, etc. 34. 13. 47 inde
 neruulus iuxta quinti paris neruo-
 rum cerebri radicē, hæcenus igno-
 ratus. 50. 6
 nerui appellatio. 16. 34. quādo late pa-
 teat. 315. 24. quibus organis pro-
 priè competat ead. 29
 nerui cum ligamēto in musculorum
 fabrica permixtio. 220. 14. eius de-
 lineatio 218. 38
 nerui, in musculis constituendis ne-
 cessitas 219. 50
 nerui coli, & recti intestini 501. 50
 nerui coniugati enascuntur. 318. 11
 nerui cutem subeuntes non eandem
 semper proponunt seriem. 345. 10
 nerui idem cerebro præstāt quod ar-
 teria magna cordi, & uena epati.
 622 32
 nerui in papillis distributi 344. 1
 nerui intestinorum graciliū. 499. 49
 nerui nō omnibus musculis miscen-
 tur, & quibus 221. 4. & 223. 11
 nerui omenti 497. 18
 nerui quid musculis uere præsent.
 222 16
 nerui, uasorum nomine appellati.
 317 53.
 nerui uentriculi, eorūq; usus. 493. 12.
 nerui uisori perforati. 324. 34. & nō
 perforati ead. 36
 neruorum per abdominis musculos
 repentium administratio 549. 55
 neruorum alios sensui, alios motui
 falso præfici 348. 34
 neruorum Anatomæ ratio 552. 7
 neruorum brachium aduentium ori-
 go diligenter consideranda cur.
 344 46
 nerui in brachiū à quibus paribus
 ducantur. 344. 43. eorundem im-
 plexus descriptus. ead. 50. ac deli-
 neatus ead. 16
 neruorum in brachium ac manū ex-
 tremam distributorum expositio.
 344. 43. primi. 345. 1. delineatio.
 336. 5. secundi. 344. 15. delineatio.
 336. 8. tertiij. 346. 19. & 347. 17. deli-
 neatio. 336. 11. quarti. 346. 28. deli-
 neatio. 336. 33. quinti. 347. 17. deli-
 neatio. 336. 52. sexti. 348. 50. deli-
 neatio 337. 3
 neruorum cerebri initium unde lit.
 322 28
 neruorum cerebri iuxta septem pa-
 ria examen 654. 8
 neruorum cerebri paris primi descri-
 ptio tota. 324. ortus, ead. 1. coalitus.
 13. ingressus

I N D E X.

33. ingressus in oculos. eadem. 20.
in tunicam reti comparatam dilata-
tio. eadē. 24. ductus delineatus. 325. 16.
an sit perforatum, quæstio. 324.
neruorum cerebri paris secundi de-
scriptio. 325. 22. quod oculorū mu-
sculis distribuitur ead. 29
neruorum cerebri paris tertij descri-
ptio. 325. 36. radix duplex. ead. 37.
tenuioris ortus ac distributio. ead.
42. crassioris itidem 326. 5
neruorum paris quarti descriptio. 326
neruorum cerebri paris quinti descri-
ptio. 326. 45. eiusdem meatus. 52.
46. & 53. 10. item ad auctus orga-
num series 34. 47
neruorum cerebri paris sexti descri-
ptio. 327. 29. in thoracis amplitu-
dinem distributio. 329. 29. in nu-
tritionis organa series. eadem. 47.
recurrentium dexter. 318. 42. si-
nister. eadem. 53. cur sint facti.
329. 13. amborum delineatio. 318.
35 & 39
neruorum cerebri paris septimi de-
scriptio 330. 34
neruorum ē cerebro prodeuntium
par cæteris Anatomicis ignotum.
322. 34. & 337. 11
neruorum cerebri paria quot. 322. 27
neruorum ē cerebro prodeuntium
ortus delineatus. 318. eorum-
dem depicta uniuersa series. 319.
par primum. 320. 18. secundum.
eadem. 23. tertium. eadem.
24. quartum. 40. quin-
tum. 41. sextum. eadem. 49.
septimum 321. 42
neruorum decussatim facta distribu-
tio fictitia 325. 7
neruorum differentia. 316. 42.
a mollitie & duritie. ibidem. 45.
& eiusdem differentia ratio. 317.
5. ab originis forma. ibidem.
346. ab ipsorum cavitare. 317. 51
a serie. ibidem. 54
neruorum a dorsali medulla pro-
deuntium omnium delineatio. & 333
neruorum ē dorsali medulla prode-
untium numerus. 339. 37. non
idem in omnibus animalibus. ea-
dem 47
neruorum femur, tibiam & pedem
adeuntium distributio exposita.
350. primi. eadem. 34. se-
cundi. eadem. 46. tertij. 351. 6.
quarti. eadem. 15. Singulo-
rum delineatio. 337. primi. ea-
dem. 27. secundi. ead. 30. ter-
tij. eadem. 39. quarti. eadem. 44.
neruorum in intestinis ratio. 503.
41.
neruorū ē lumborum uertebriis pro-
deuntium descriptio. 349. 12. sunt
autem quinque paria. Delinea-
tio 337. 7

neruorum per manum distributio,
quo pacto citra sectionem depre-
hendatur 348. 21
neruorum qui in extremam manum
distribuantur expositio. 348. 13
neruorum ortus a cerebro. 315. 39.
non ē dura eius membrana. 316. 18.
nec a corde 315. 49
neruorum ortus uarie a priscis con-
stitutus 315. 39
neruorum sacri ossis foramina. 84.
21.
neruorum ex osse sacro prosilientiu
descriptio. 349. 37. deline-
atio 337. 17
neruorum paria recedendi mos qua-
lis ueteribus 84. 27
neruorum principium cor esse, un-
de iudicant Aristoteles 591. 56
neruorū propaggines temporali mus-
culo quot offerantur 327. 15
neruorum recurrentium examen.
601. 17
neruorum recurrentium sciētia, Ga-
leni inuentum 329. 19
de Neruorum sectione liber Gale-
ni, uix totius fragmentum est.
325. 46
neruorum septum transversum in-
gradientium descriptio. 341. 35. de-
lineatio 334. 57
neruorum sepi transversi examen.
600. 24
neruorum in uertebriis foraminum
ratio 70. 29. inde
neruorum ē uertebriis ceruicis prode-
untium paria septem. eorumq; de-
scriptio. 340. 1. par primum. ibi-
dem. secundum. eadem. 30.
tertium. quartum. quintum. 341. 2.
sextum. septimum. 342. 16
neruorum ē uertebriis ceruicis pro-
deuntium delineatio. 334. par
primum. eadem. 20. secundum.
eadem. 25. tertium. eadem. 30.
quartum. eadem. 40. quin-
tum. eadem. 54. sextum. 335
12. septimum ead. 29
neruorum ē thoracis uertebriis pro-
deuntium descriptio, iuxta paria
duodecim. 342. par primum.
omnium octauum. 45. eius deli-
neatio. 335. 35. secundum quod
omnium est nonum par. 343. 15.
eius delineatio. 335. 41. terti-
um. quartum. ac cætera paria us-
que ad thoracis duodecimū, uni-
uersorum autem uigesimalū par.
343. 21. delineatio eorundem. 335.
46.
neruorum tria paria in osse sacro &
coccyge 82. 25
neruorum uesicæ ratio 518. 30
de Neruorum uisiorum decussa-
tione historie authoris. 324. 46
in Neruis digerendis scopus natu-
ræ triplex. 317. 17. sensus. ibidem.
21. motus. 27. trisantium digno-
tio 25

neruis emittendis parata foramina.
58. 47
neruis unde spiritus animalis prebe-
atur 316. 32
neruos in musculorum initia potius
quàm fines inseri, Anatomicā a-
xioma 341. 44
vñs; quid 499. 3
νυρρονδρωσθης dicta ουδωσθης. 217.
46. &
νυρρονδρωσθης musculi. 301. 10
νυρρος unde 29. 14
νυρρος unde 315. 35
Nicolai & Gentilis de utri forma-
tione error 531. 20
nodus 9. 49
νδρω 56. 41. & 167. 31
νδρω uertebrae 167. 37
nouaculorum ad sectionem descri-
ptio. 236. 7. delineatio. 235. 46
nutrimenti uehiculū cuiusmodi Hip-
pocrati dictum 508. 30
nutritionis instrumenta, triplicia
384. 52
nutritionis necessitas 384. 40
nutritiōni ex cibo potuq; famulan-
tium partium enumeratio. 385.
5. inde
nutritionis subseruentiu instru-
torum necessitas 384. 47
nutritiua uis quatenus in plantis &
hominibus differat 493. 35
nutritionis organorum enumera-
tio 519. 39
νυμν quid 290. 51. & 532. 1. eiusq;
in mulieribus differentia. ead. &
536. 55



O
Βελιζα futura. 26. 43. &
166. 30
occipitis siue occipiti
os. 21. 33. & 22. 27. &
23. 13. & 30. 1. eiusdem
circumscriptio. ead. 40. &
166. 45
occipitis os ubi crassissimum. 30. 47.
& 53.
occipitis ossis capitula 31. 11
occipiti ossis, quā primæ uertebrae
articulatur, descriptio 64. 15
oculus genu 168. 33
oculus scapulæ 168. 2
oculi angulum interlorem occupan-
tis carunculae usus 40. 20
oculi humores. Cristallinus. 646.
25. delineatio. 646. 54. Vitreus.
646. 1. delineatio. 645. 3. Aqueus.
649. 21. delineatio. 644. 6
oculi musculorum descriptio. 240.
12. administratio. 241. 29. delinea-
tio 239. 30
oculi partium omnium breuis enu-
meratio. 649. 42. earundem usus.
ibid. 54
oculi partium omnium delineatio
644. 7
oculi sedes quot efformetur ossibus
39. 37
oculi tunicarum expositio. αβρω-
δωσ Mm 6105

- ὄλως*, 646. 44. delineatio. 643. 46.
quæ rei comparatur. 647. 15. deli-
neatio. 643. 50. ueræ dictæ. 647. 15.
delineatio. 643. 52. quæ cilijs seu pal-
pebrarum pilis respondet. 648. 41.
delineatio. 643. ult. duræ. 648. 52.
delineatio. 644. 1. adherentis, seu
albæ. 649. 34. delineatio. 644. 6.
cornea
649. 9
oculorum colorem ex humorum spi-
rituum ue copia non uariare
648. 31
oculorum fabrica tota exposita. 646.
12. eiusdem administratio. 655. 1.
delineatio 643. & 644
oculorum gratia formatum caput
18. 1
oculorum musculi, quare, Muscu-
li, &c.
oculorū sedes à cuneiformi osse maxi-
ma parte constitui 29. 31
oculorum situs 18. 5
oculis, cur additus motus voluntari-
us. 240. 12. eiusq; differentia. ibid.
oculos mouentes musculi, eorūq;
numerus, descriptio tota. 240. 12.
delineatio. 139. 29 administratio.
241. 26
oculos mouentium musculorum de-
lineatio 239. 31
oculos qui muniuerit natura 18. 15
ὁδὸν, & ὁδὸν ὁδὸν secundæ uertebræ
tuber 66. 31
ὁστέον 388. 6
ὁστέον 111. 5.
& 163. 13
ὁστέον, ὁστέον 163. 5
olfactus organum 51. 9
olfactus organum constituentes ce-
rebrī processus 323. 25
olfactus organi descriptio 643. 14
de Olfactus organo sententiæ uariæ
323. 51
olfactus organa. 30. 3. 14. eorun-
dem sedes. 32. 35. cribri modo per-
uium os 28. 24.
olfactus organorum sedes, non pa-
riter amplæ in singulis caluarijs.
51. 6
olfactus organorum sinus pituitam
cerebri non expurgant 641. 46
olfactus sedes 19. 8
omētum an deuolui ad scortum pos-
sit 495. 9. 20
omentum cur plumæ nomine Bra-
bantis appellatum 497. 48
omentum cur rete & reticulum ap-
pellatum 497. 10
omentum qui diuellendum, ipsiusq;
ortus inuestigandus, unā cum ua-
fis illo suffultis 551. 34
omentum sacculo, aut minoribus pi-
scatorum reibus simile. 359. 6.
& 358
omenti adeps. 497. 19. eiusdem usus
ead. 51
omenti ala superior, & humilior,
quid 358. 15. 18
omenti arteriæ ac nerui 497. 12. 13
omenti descriptio. 357. 15. &
356
omenti diuersa nomina 494. 39
omenti & mesenterij eximendi ratio
in Anatome 553. 49
omenti fabricam suis uisibus respon-
dere 497. 45
omenti figura & quantitas. 495. 31.
& 358. & descriptio. 359. 3. inde
omenti glandosum corpus 497. 27
omenti inferioris membrana scēctio
difficillima 510. 6
omēti intestinis obducti situs. 356. 17
omenti membrana inferior qua par-
te mesenterij uice 496. 26
omenti membranæ descriptio. 357.
& 358. 15 inde
omenti membranæ superiori expor-
rectæ uenarum & arteriarum pro-
pagines 357. 21. & 356. & 358
omenti ortus, ac dein nexus. 495. 45.
cum colo. 496. 20
omenti præcipuus usus quis. 497. 36
omenti situs. 494. 47. eiusdem ob-
seruatio 550. 33
omenti substantiæ enumeratio. 495.
36
omenti superior anterior ue, & infe-
rior seu posterior membrana. 495.
42
omentum implicantes uenæ. 496. 44
omentum uentriculi anteriori sedi
non obduci 494. 22
omēto quatenus comprimi uteri fun-
di os possit 495. 9
ὁμολογία 167. 53
ὁμολογία 99. 54. & 167. 53
ὁμολογία 261. 29
* *ὁμολογία* quid 11. 1
ὁμολογία 19
ὁμολογία dentes 167. 24
oris apertio, organorumq; in fauci-
bus positiorum examen 603. 48
ὁμολογία 167. 41
osanium & ofanum os 167. 40
os, *ὁστέον* 166. 17
os quid, eiusq; natura, & usus. 1. 1.
inde
os amplum, latum, sacrum, idem Ga-
leno 81. 48
os in cerebro à Galeno traditum,
quale 32. 41
os de corde cerui Medicorū & Phar-
macopolarum impostura excogi-
tatum 54. 23
os cordis. uide, Cordis os.
os coxæ, siue coxēdicis. uide, Coxæ,
& Coxēdicis os.
os coccyx. 56. 56. eiusdem delinea-
tio 79
ossis coccygis descriptio 84. 43
ossis cymbam referentis sinus 147.
28
ossis dentis dicti ligamentum. 280. 2.
& 44
os ilium. uide, Ilium os.
os iugale. 22. 6. & 23. 20. & 33. 13.
& 38. 14
os pectoris. uide, Pectoris os.
os pubis. uide, Pubis os.
- os sacrum, 56. 55. uide, Sacrum os.
os sacrum, amplum, latum, *ωλατὸν*,
idem 85. 30
os sacrum cæteris annexentium li-
gamentorum administratio. 243. 29
os sacrum quale in simijs & canibus.
81. 37. inde. & catulis ead. 43
* os sacrum ilium ossibus colligan-
tium ligamentorum descriptio.
252. 17. administratio 256. 19
ossis sacri appellatio, unde 85. 33
ossis sacri constitutio. 58. 34.
& 59. 15
ossis sacri delineatio 79
ossis sacri in homine descriptio. 83.
28. inde
ossis sacri neruorum foramina. 84.
21. spinæ. ead. 30. anterior, po-
steriorq; sedes. ead. 38. & 85. 16
ossis sacri, sex interdum ossa 84. 52
ossi sacro nexorum ossibus in uiris &
mulieribus differentia 131. 42
ossa sacri ossis lateribus commissa
in pueris tribus efformari ossibus
132. 34
ossium sacro ossi nexorum in uiris
& mulieribus differentia 131. 42
ossium sacri ossis lateribus commis-
sorum usus 129. 4
ossis u referentis figura. 55. 5. 11. situs
& nomina. ead. 33
ossis u referentis musculorum desc-
riptio. uide, Musculi.
ossa ad disciplinam utilissima, quæ.
159. inde
ossa an sensu prædita 3. 22
ossa cumulata in cimiterijs asserua-
ri solita, ad skeleton inutilia. 159.
19
ossa, cur circa connexum molliora
7. 32
ossa digitorum. uide, Digitorum os-
sa.
ossa dissoluta ad disciplinam aptio-
ra, quàm compacta 159. 6
ossa emundata, quomodo iungenda
159. 30
ossa inter se omnia contigua. 11. 55
ossa iungentium commissurarum ty-
pus 12. 10
ossa lapidea 1. 34. & 33. 7. 33
ossa non hominis solum, sed & bru-
torum omnis generis animantium,
philosophiæ ac medicinæ studiosis
obseruanda 162. 21
ossa omnia, præter dentes, testæ.
3. 26
ossa præruptæ rupt similia quæ, &
cur ita dicta 33. 34
ossa senum, iuuenum, & puerorum
inuicem uariare 27. 12
ossium capita pleraque sine appen-
dice 9. 45
ossium coctionis tempus ex ætatem
ratione obseruandum. 157.
35
ossium coctionis scopus 157. 39
ossium commissuræ, earumq; cartila-
gines 4. 3
ossium

I N D E X.

- dem 50
peritoneum in similiarium partium numero 386.1
peritonæum non undique pariter crassum 386.39
peritonæum quibus partibus peruium 386.46
peritonæum quibus uasis ac nervis implicetur 386.57
peritonæum tactus sensu etiam præditum 387.6
peritonæum, transuersis abdominis musculis pertinaciter adhærens. 283
peritonæi à partibus extrinsecus ipsi commissis liberatio 549.41
peritonæi ad uelicæ fundum nexus. 357
peritonæi apertio 549.54
peritonæi figura, 355. & descriptio. ead. 356
peritonæi laterum uenæ. 356.1. & 355
peritonæi magnitudo & situs. 386.5. forma. etc. ead. 19
peritonæi nomina 385.46
peritonæi ortus examen 557.5
peritonæi superficies cuiusmodi. 386.22. processus ab eodem enati. eadem 30
peritonæi usus 387.10
περιτονὴ quid 138.26. & 168.40
π.σ.α. 168.41
* pedis amplitudinem subeuntis ligamenti descriptio. 244.22. administratio 255.1
* pedis ac digitorum motibus famulantium musculorum alij in tibiæ sede anteriore consistunt. 254.30. alij in posteriore. eadem. 41. alij in pede. ead. 47. & quot sigillatim ibidem 168.48
* pedis calcar 168.48
* pedis cruris cavitates, per quam traiecit fune Hector ab Achille circum mœnia Troiæ actus 246.8
pedis dextri ossium delineatio 5
* pedis digitos mouentium musculorum administratio. primi. 255.32. secundi & tertij. eadem. 44. decimi quarti, quinti. 256.7. decimi sexti. eadem. 14. decimi septimi & octauæ. 255.33. reliquorum quatuor 255.52
pedis digitos mouentium musculorum delineatio primi. 210.27. secundi. ibidem. 35. tertij. ibidem. 29. eorum qui primos digitorum articulo flectunt, & sunt decem. 211.46. & 212.13. decimi quarti. 183.50. decimi quinti. 186.48. decimi sexti. ibidem. 52. decimi septimi. 179.50. decimi octauæ. 173.49. quatuor musculorum, digitos quatuor pollicis adducentium. 210.46 & 211 48
pedis digitos mouentium musculo-
- rum descriptio. 248.46
mus, secundus, tertius. 249.21
qualiter in simijs sese habeant. 250.31.
decem sequentes, primis digitorum articulis præfecti. eadem. 46
decimus quartus & quintus. 251.3.
decimus sextus, pollicem ac tres proximos digitos abducens. 251.22.
decimus septimus, octauus. eadem. 43.
reliqui ad 22. usque, digitos quatuor pollicis adducentes 252.1
* pedis digitos mouentium musculorum numerus 252.8
* pedis digitorum motus 248.46.
* pedis digitorum ac manus, ratio motus prope par 248.57
pedis digitorum ratio 149.13
pedis fabricæ ratio 148.46
* pedis ligamentorum transuersorum descriptio. 253.38. alia, ossa pedis committentia. eadem. 54. administratio. 256.41
* pedis motus 245.4
pedis ossa quot 149.21
pedis ossium delineatio. 142.23. descriptio 143. & 144
pedis ossium quibus in manu nullum respondeat 147.46
pedis ossicula sesamina cuiusmodi. 126 24
pedis pectus & pecten 168.55
* pedis plantæ cuti subnati tendinis lateri descriptio 244.3
pedis posterioris in quadrupedibus appellatio quæ. 145.11
pede ab extrema manu uno ossis superari 149.19
* pedem mouentium musculorum administratio. 255. primi et secundi. eadem. 14. tertij & quartij. ibidem. 17. & 23. quinti. 255.55. sexti. 256.4. septimi & octauæ. ibidem. 11
pedem mouentium musculorum delineatio. primi. 205.20. secundi. ibidem. 21. tertij 207.39. quartij. ibid. 42. quinti. 211.37. sexti. 180.47. septimi. 189.31. octauæ. 179.39. noni 103.52
* pedem mouentium musculorum descriptio. 245.10. primus. ibid. secundus, tertius, quartus. 245.21. quintus, sextus. 246.22. septimus, octauus. 247.11. nonus. 248.14. minus omnium. ibid. 24
pedem petentes nervi. quære, Nervi pedem petent.
* pedes ac digitos mouentium musculorum traditio apud Galenum supra modum uaria 243.44.
pedum in quadrupedibus & hominibus similitudo 145.1. inde petroforum ossium appellatio unde 33.34
- π.α.ο.σ. dictus humor 646.25.
36
φ.α.λ.α.γ.γ.ε. digitorum quæ. 121.48
pharmacopolarum impostura excogitatum os de corde cerui. 94.23
φ.α.ρ.ύ.γ.γ.ε.φ.ο.υ. 55.42. & 167.26
φ.α.ρ.ύ.γ.γ.ε. appellatio 579.17
φ.α.ρ.ύ.γ.γ.ε. 574.12
φ.α.ρ.ύ.γ.γ.ε. 46.17
φ.α.ρ.ύ.γ.γ.ε. 19.28
φ.α.ρ.ύ.γ.γ.ε. 290.47
φ.α.ρ.ύ.γ.γ.ε. in mamillis quid 544.24
π.α.ο.σ. 110.44. & 168.5
pia mater. quære, Tenuis cerebri membrana.
pinguedo. quære, Adeps
pinguedinis humanæ usus 157.33
piscis ut collo, ita etiam pulmonibus destituit 62.51
pituitæ cerebri purgandæ parati meatus. 32.20. inde. & 51.3. 28. inde pituitam cerebri excipientes ductus. 640 1
pixis os 168.22
planarum ad testes comparatio. 520.50
planta 168.54
planta pedis 148.36
plantæ appellatio 147.54
plantæ cuti subnatus latefescens tendos. quære, Pedis plantæ.
platarum nutritia uis quatenus ab humana differat 493.40
planum pedis. 143.40. & 168.54
π.λ.α.τ.α. 167.53
Platonis Anatomica dogmata. 145.36
Platonis de ingenito nobis generationis amore sententia 520.22
Platonis de septo transuerso sententia 291.50
π.λ.α.τ.ων. 167.39
π.λ.α.τ.ων. 31.41. & 166.56
pleura uulgo quid 570.29
π.λ.ε.υ.ρ.α. 167.50
Plinij lapsus 107.17
Plinij de menstrui sanguinis praui-tate & graueolentia error 538.18
Plinij in appellatione tali lapsus. 140 19
plumæ nomine omentum apud Brabantos appellari 497.48
pollicis os secundum, uix extra rectam lineam extendi 123.57
pollicis ossis primi ad brachiale nexus. 123.37. secundi, etc. eadem. 48. & 124.5. tertij, &c. eadem 8
pollicis ossis primi & postbrachialis ossium ad brachiale contextus. 118 47
pollicis pedis ad manus pollicem descri-men 149.14
pollicis usus ac dignitas. 124.54. fitus 125.24
pollicem furibus præcidendi mos. 124 57
IV L I I Pollucis lapsus, 65.30. & 38.
66
polus

INDEX.

- polus** 168.33
polux 387.50
πολύμορφον dictum cuneiforme os. 32.3. & 148.15. & 167.3. & 168.53.
 * **popletica** dicta quibusdam uena. 293
 * **in Poplite** latitantis musculi descriptio. 237.37. administratio. 255.40.
porcorum iecur quale 506.45
portæ uena. quare, Vena portæ. 508.4
portæ uenæ officium 508.4
portæ uenæ omenti membrana ful-tæ figura 358. & 359.18
portæ uenæ rami una cum arterijs & neruis illis attentis qui exami-nandi 552.20
portæ uenæ ramorum officium. 385.9.
ποροὶ διήκοντες 324.36
postbrachiale 168.16
postbrachialis appellatio 120.7
postbrachialis appendix 8.6
 * **postbrachialis** ossa neccentia liga-menta 220.51
postbrachialis ossa quot. 120.3. & cui-usmodi sint. ead. 34. eorundem in-terualla. ead. 47. & 149.20. & 161.43
postbrachialis ossa quæ cedat muscu-lis 120.56
postbrachialis ossium & primi polli-cis ossis ad brachiale connexus. 118
præcordium 387.48
præcordia dicta quæ 290.48
prægnantium uterus cuiusmodi. 534
præsepiola dentium 46.17
processus 8.13.37
processus alis similes 32.28
processus dens appellatus, etc. 61.55. & 66. 31
processus lumborum uertebri ex a-bundanti attributus à Galeno. 78.41.
processus mamillaris. 22.25. & 23.30. & 31.27. & 36.44
processus stylo scriptorio similis. 23.30. & 31.38. & 36.44
processus appendicibus donati alij, alij non 8.25
processus laterales siue transuersi in uertebri qui 57.5. item descen-dentes. eadem. 18.22. posteriores. eadem. 30. & 59.21
processus uespertilionum alis com-parati 21.38. & 23.15. & 25.51
processuum & appendicum differen-tiæ 8.22
processu in femoris ossibus alijsq; usus 135.2
processuum femoris maxillæ, etc. de-lineatio 5. & 6.26
processuum transuersorum ceruicis uertebRARUM natura. 68.55. fora-men. 69.4. ascendendum et descen-
- dentium natura. 69.25. numerus. 70
processuum transuersorum in thora-cis & colli uertebri ductus. 75.24
processuum usus 8.46
περικνημίου 168.37
περιεπιπιδίου 237.22
proræ os 166.45
proræ futura 166.29
παρασθενής dicta cerebri portio. 632.37. & 637.16. & * 309.40
ψάου musculi 297.14
ψάου uertebrae 167.38
πλεγμα 168.48
πλεγμασθενής processus. 32.28. & 167.7
pubis os. 6.2. & 127.17. & 128.51. & 168. 14
pubis os cur maximo foramine per-uium, ipsiusq; sinus & tubera. 132.7.23. crassities ead. 30
pubis ossis figura. 5. foramen. 128.39
 * **pubis** ossis foramen occupans membrana. 252.28. administra-tio 256.19
 * **pubis** ossium foramina occupans membrana 226.35. & 225.28
 * **pubis** ossis forame occupatis mem-branæ administratio 243.25
pubis ossis historia 131.37. inde
pubis ossa an usquam puellis nuper-natis disiungantur, facilioris par-tus genera 132.4
pubis ossa mulieribus in partu non recludi 131.50
pubis ossa quæ dirimenda 556.16
pubis ossium in uiris & mulieribus quæ differentia 131.41
puendi muliebris prominentes ca-runculae. 536.54. eademq; præci-dendi apud Aegyptios mos. 537
 2
puendi muliebris carunculas non esse in omnibus æquales. 532.1
pu dibundum 168.25
puellaris uteri fundus minor. 533.36.
ceruix mollior 535.14
pueri à uetribus in Anatomæ exer-ceri soliti 83.22
pueris quomodo erudiendi dentes. 47
puerorum ossa cuiusmodi 27.19
pulmo instar promptuarij cordi cir-cumpositus 596.24
pulmonis anterioris sedis delineatio. 568. item posterioris ead.
pulmonis cordi inuoluti delineatio. 561 & 563
pulmonis examen 600. 37. & 563
pulmonis fibrarum seu loborum de-lineatio 562. & 563.12. & 568. inde 601.48
pulmo in quot lobos fibras ue distri-buatur 581.46
pulmonis lobū in homine nullum cauæ caudicem suffulcire. 591.56
- pulmonis** situs, ac partes. 580.50. fot-ma 591.8. item. 560. & 561.30
pulmonis superficies qualis. 582.7. item connexus. ead. 11. substantia. 28. ualæ. 29. tunica. 46. nerui 50
pulmonis ualorum ratio. 533.9. item tunicae ead. 20
pulmonis usus & constructionis ra-tio 582.53
pulmonem thoracis formam sequi. 89
pulmone carentia animalia etiam de-xtro cordis uentriculo destitui. 596.35.
pulmonum colores diuersi. 582.12
pulmonum grana homini datū col-lum 62.49
pulsus & respirationis idem usus. 570 7
pulsuum autor cor 594.57
puppis capitis os 166.42
puppis futura 166.27
πύλας 640.42
 * *πύλας* 266.55
πύλας unde dictus 390.27. & 391 16
πύλας & *πνευμονόσθενής* processus. 66.34
pyxis 10.26
pyxis os 166.45
- Q**
Vadratum os cuiusmo-di 163.13
quadrupedum cum ho-minis cruribus, ac pe-dibus similitudo. 145. inde 167.17
quaterij dentes 167.17
quattro tali tuber cur dicatur. 145.50
- R**
Habdoies, siue *παβδοί* ossis futura inter uer-ticis ossa. 26.44. & 166 30
παβδοί. 56.41. & 167.30
radius quid. 1.40. & 110.50. & 168.8
radij ad humerum articulatio. 111.51.
radij cum ulna motus. 13.33. & hu-mero. ead. 53
radij delineatio 108. & 109.5
radij obliquitates. 113.1. eiusdem ad ul-nam articulatio. ead. 16. secundum ipsius longitudinem leuitas & aspe-ritas 25
radij partis inferioris historia. 113.40
radij sinus deducendis locandisq; musculus & ipsorum tendinibus a-
 pti 144.47
radij substantia cuiusmodi. 115.10
 * **radius** brachiali neccentia liga-menta 221.1
radius cum humero neccentia li-gamenta 221.18
radius pronum & supinum consti-tuentium musculorum delineatio. primi. 191.26. secundi. 189.11. ter-tii. 191.26.

tij. 191. 23 quart. 204. 28
 * radius in pronum ac supinū mo-
 uentium musculorum descriptio.
 215. 46. primus. ead. 57. secun-
 dus, tertius, quartus. 216. 12. admi-
 nistratio 124. 34
 γαροσδός tunica 648. 16
 ramex, ῥάμολος Græcis cur. 495.
 8.
 ramicum sectionis periculum. 495.
 24
 ῥάφα, ῥάφα, suturæ 15. 53. & 166.
 25.
 raseta, & ossa raseta 168. 15. 51
 rasga 168. 33
 rationis ossa 166. 40
 rationis sedes cerebrum 599. 13
 rationis sedes an in corde 594. 26
 rectum brachialis os appellatum cu-
 iusmodi 118. 14
 rectum intestinum. quare, Intesti-
 num rectum.
 recti intestini musculi 501. 54
 * recti intestini musculorum descrip-
 tio. 228. 39. sedem attollentium. ibi-
 dem. 42. orbicularis. 229. 1. ad-
 ministratio. 229. 28. delineatio.
 228
 27
 * rectum intestini attollentibus mu-
 sculis nullus opponitur. 228. 54
 rectum intestinum quod, & cuius-
 modi 501. 15
 recti intestini à colo differentia. 501.
 16 inde
 recti intestini situs ratio 503. 12
 recti intestini tunica ac fibræ 501.
 20. inde. uenæ & arteriæ. eadem.
 40. nerui 50
 recurrentes nerui. quare, Neruos
 sexti paris cerebri, etc.
 regum uterum coronæ cuiusmodi
 forma 592. 13
 in Religionis censores quosdam.
 594 41
 remigis cuiusdam Anatomiz. pecu-
 liare quid ab alijs corporibus habe-
 re obseruata, historia 510. 11
 RENALDVS COLUMBVS So-
 phistices apud Patavinos profes-
 sor 56. 23
 * renalis quibusdam dicta uena. 293.
 32
 renis canini ad humanum differen-
 tia 516. 9
 renis fascia quid 517. 10
 renum cum uenæ causæ portionibus
 delineatio 374
 renum cur alter altero elatior. 514.
 49
 renum forma. 515. 2. magnitudo. ead.
 8. substantia 10
 renum in internis sedibus cõforma-
 tio 515. 30
 renum fabrica negligentius hacten-
 us ab Anatomes professoribus
 expensa 515. 38
 renum minus 385. 27. &
 516 53

renum numerus, situs & usus, 514.
 29
 de Renum officio ridicula Anatomi-
 corum dogmata 555. 2
 renum sinus cuiusmodi 516. 13.
 inde.
 renum sinus delineati 371. 49
 de Renum sinibus falsa quorun-
 dam persuasio 515. 51
 renum situs delineatio. 370. & 371.
 12. & 372. 32 & 373. 5
 renum tunica ac nerui 517. 8. 21
 renum tunicarū, totiusq; eorundem
 naturæ examen 554. 36
 renum uerterbræ 167. 38
 renibus oblata uenæ & arteriæ. 515.
 15.
 renuendi mos diuersus 63. 30
 respiratio naturalis, & non natura-
 lis 569. 45
 respirationis & pulsus idem usus.
 570 7
 respirationis organum thorax et pul-
 mo 56. 36
 respirationis organorum artificiosa
 constructio 583. 24
 respirationis partes, & cuiusq; earum
 seruientes musculi 292. 51
 respirationis usus ac ratio 569.
 27
 de Respirationis usu libri autorem
 falsò Galenum haberi 513. 19
 respiratione perpetuò egere homi-
 nem 89. 24
 * rete mirabile, seu plexus reticularis
 Galeni quis 310. 44
 reticularis plexus falso à bobus ad
 homines quoque relatus à Gale-
 no 524. 8
 reticularis plexus Galeni, nusquam
 repertus 642. 19
 reticularem plexum soporali arte-
 ria fieri. 50. 34. falso confectum à
 Galeno 52. 38
 risorij dentes 167. 17. 20
 risus author cur lien uulgo dicatur.
 514 3
 ῥόγνα 648. 16
 Rodol 359. 56
 rostrum porcinum 167. 57
 rotator processus 168. 29
 rotatores femoris processus. 7. 57. &
 8. 23 & 134. 56
 rotula genu 168. 31
 rotunda omnia capacissima, & iniu-
 rijs minus expolita 390. 5



S
 Acrum os, ἰσγό, &c.
 167. 39. uide, Os fa-
 crum.
 sacri ossis appellatio,
 unde 85. 33
 sacri ossis constitutio 58. 34. &
 59 15
 sacri ossis dextro lateri commissum
 os, eiusq; figura 127. 3
 sacri ossis lateribus commissæ ossa

in pueris tribus ossibus efformā-
 ri 132. 34
 sacri ossis lateribus commissorū os-
 sium usus 129. 4
 sacri ossis quot ossa 162. 39
 sacri ossis transuersi processus quai-
 lium ossibus connectuntur. 129.
 17
 σκεῦμα 497. 9
 sagittale os 166. 57
 sagittalis sutura, & uariis ipsius du-
 ctus 25. 12. & 26. 44. & 166.
 30
 sanguificationis in iecore modus ac
 ratio 385. 14. inde
 sanguificationis organū primariū
 iecur 508. 33
 sanguineus cordis uentriculus dex-
 ter cur appellatus 596. 26
 sanguis an mittendus in octo infe-
 riorum costarum inflammatione.
 602 8
 sanguinis in iecore generatio cuius-
 modi 508. 14
 * saphena 293. 30
 sapientie dentes qui 167. 14
 σκαποδόντιος os 1. 42. uide, Cym-
 bam referens. & 168. 49
 σκαπῖον 166. 20
 scapulæ à clauicula liberandæ, admi-
 nistratio 275. 49
 scapulæ anguli ac laterum descriptio
 plenior 97. 19
 scapulæ anterior, seu costis proxima
 sedes. 98. 42. posterior 99. 8
 scapulæ basis 96. 51. eiusdem ap-
 pendices 97. 3. cartilago. eadem.
 7. ceruix eadem. 57
 scapulæ appendices 7. 44
 scapulæ cartilago sinu eius frequen-
 ter augens 98. 3
 scapulæ ceruix 101. 22
 scapulæ dorsi figura 5. & 6. 11
 scapulæ forma triangularis. 96.
 49
 scapulæ humerum colligantium li-
 gamentorum descriptio 271. 17.
 administratio 272. 3
 scapulæ inferioris superiorisq; lateris
 differentia 97. 18
 scapulæ motuum differentia. 272. 18
 scapulæ nomina 167. 53
 scapulæ nullū musculū tribuit Gale-
 nus, proprio motu ad pectus ad-
 ducentem 272. 34
 scapulæ oculus, & spina, quid. 168. 2
 scapulæ processus 8. 23. & 98. 17
 46
 inde
 scapulæ processuum nomina. 167.
 55 inde
 scapulæ superior processus qui sum-
 mus humerus dicitur, quibus ani-
 malibus obtigerit 100. 38
 scapulæ sinus humero excipiendo
 paratus 97. 42
 scapulæ spina 99. 22. 31. 50
 scapulam antrosum agens muscu-
 lus, à Galeno non recte pro moto-
 re brachij

rebrachij habitus 263. 49
 scapulam mouentium secundus, à Galeno bipartiri uisus. & falso. 275 48
 scapulam attolentes musculi tres, quibus homines carent, simiæ abundant. 274. secundus, ead. 10. tertius. ead. 26. quartus 32
 scapulam attollentibus non recte attributus à Galeno musculus. 274. 51.
 scapulam mouentes musculi, an respirationi quoq; seruiant. 292. 47. & 293 13
 scapulam mouentes & brachiū musculi, in quibus animalibus variēt ab homine 270. 3
 scapulam non mouere musculum eum quo brachium detrahitur. 275 13
 scapulam mouentium musculorum administratio. 275. 42. primi, ibidem. secundi. 269. 36. tertij & quarti. 275. 29. eorundem delineatio. primi. 185. 41. secundi. 195. 17. tertij 191. 15. quarti. 198. 15. item descriptio. 272. 18. primus, ibid. 20. secundus. ibid. 43. tertius. 274. 39. quartus 275. 4
 scapularum cum ossibus sacri ossis lateribus commissis affinitas. 129. 4
 scapularum figura. 94. descriptio. 95. inde, situs & nexus. 96. 12. usus. eadem 24
 σκαλητόν 12. 5
 sceleti constructionem quid maxime uisitat 159. 1
 sceleti parandi ratio 155. 23. inde σκαλῶ quid Galeno 168. 34
 * schiatica uena 293. 32
 scioli quidam Galeno nimis additi reprehenduntur 83. 1. inde sciutorum cæcum intestinum cuiusmodi 500. 34
 σκαλοῦρος 649. 1
 σκυλακισμός processus cerebri. 639. 8
 scopula, scopulum apertum. 167. 54
 scortorum apud Venetos truculentum facinus 126. 51
 scrotum, siue scortum quid 521. 39
 scutalis cartilago 159. 23
 scutum cartilago 167. 48
 scutum cordis 167. 44
 scutum pectoris 167. 54
 scutiforme os 168. 31
 scutiformis cartilago. 152. 4. 22. & 153. 21 inde
 σκυλακισμός digitorum quæ sectio. uide, Anatome. 510. 5
 sectio corporis difficillima quæ. 510. 5
 sectio utuorum, eiusq; histria, & quid ea peculiariter doceat. 658. 27
 secundæ, secundinæ, extimum foetus inuolucrum. 541. 56. uide, Foetus inuolucrum. 558. 6
 secundinarum examen 558. 6
 semen à teste ad uescicæ cervicem deferentis uasis histria. 524. 17. & 525 2

semen deferentis uasis structura ratio 526. 22
 semen deferenti uasi nulla cum testium uenis & arterijs communicio. 527 5
 semen deferentium uasorum ortus ratio 525. 54
 semen deferentium uasorum insertionem excipiens glandosum corpus 525. 13
 semen deferentium uasorum ad glandosum uescicæ corpus examen. 556 24
 semen uirile hominis primum effectuum principium 520. 38
 semen utero deducendum uasorum delineatio 378. & 379. 8
 seminis genitalis temperamentum ac ratio 384. 13. inde
 seminis procreatrix testium substantia 525. 38
 semini parando non præesse corpus glandosum, Galeni sententia impugnata 526. 47
 semini urinæq; communis meatus. 528. 22. eiusdem glande diuisi exemplum 529. 23
 seminales arteriæ an sanguinis expertes 526. 5
 seminales arteriæ qui obseruandæ. 554 22
 seminalium uasorum delineatio 373. 10. & 372 & 374
 seminalium uasorum examen. 555. 10.
 seminalium uasorum circa testem examen 555. 46
 seminalium uasorum in mulieribus ratio. 535. 47. & 537. 5. examen. 557 29
 seminalium uenæ & arteriæ series, ductus, ac ratio. 522. 55. & 523. 15. & 524 12
 seminalium uenarum & arteriarum in testes ductus. 370. & 371. 22. & 372 inde
 seminarij uasis in penem insertio. 525 6
 seminaria dextri & sinistri lateris uasa 355. 19
 senes cur dorsum inflectant. 71. 18
 senum caluarie suturis destitutæ. 27 9
 sensus ac motus arbitrij principium cerebrum 599. 13
 sensus communis os 166. 43
 sensus dentes qui 167. 24
 sensus seruato motu perit, & contra. 348 34
 septum, eiusq; foramen non obstare, ne cibuse uentriculo superiora repetat 389. 12
 septi foramina tria, non duo solum. primum 291. 26. secundum. ead. 37 tertium. ead. 40
 septi transuersi administratio. 294. 13. eiusdem delineatio 191. 42. item descriptio. 290. 45. foramina. 291. 24. functio iuxta ueritatem

tem 291. 49
 septi transuersi functionem uix quifquam antiquorum absolute tradidit. 291. 56. & super hoc ipso notatus Galenus 292. 1
 septi transuersi motus perperam à quibusdam assignatus. 283. 22. & 292 22
 de Septi transuersi munere antiquorum sententia, Platonis, Aristotelis 291. 59
 septi transuersi neruorum examen. 600 24
 serra, sectionibus apta quæ. 237. 3.
 delineatio 235
 serrata compago 16. 2
 serratina ossicula, σκεπημοσθία 115.
 & 116. 53. & 119. 27. & 168. 56
 sesamina pedis ossicula 144. 55
 sesamina ossicula quibus sedibus ponantur. 125. 54. inde, in manu. 126. 1. in pede. ead. 24
 sesamina ossicula quot 162. 44
 * sesamoidon manus ossium administratio 224. 46
 sesaminorum ossium usus 1. 13
 sibilus pro gargarione 580. 13
 σιγμοειδής processus. 98. 22. & 168. 1
 σιγμοειδής sinus 111. 21
 σιγμοειδής membrana quæ. 592. 56
 * simia ab homine in pluribus differens quam puguit Galenus. 243. 47. in musculus thoracis. 287. 52. item. 288. 55. item 289. 19. & 30. item 293. 41. & 45. item 294. 4. & 33. item in brachium mouentibus musculus. 263. 14. item 266. 41. item 263. 50
 simias colo & mesenterio differre ab hominibus 496. 25
 * simiæ, in cubitum agentibus musculis ab hominem differentia. 291. 29. item in musculus femur mouentibus. * 240. 30. & 49. item. 241. 20. item in manus interna fabrica 503. 24
 * simiarum in musculus, pedis digitorum motoribus 3. ad hominem differentia. 250. 31. item in pedum motoribus musculus. * 245. 39. & 246. 16. & 248. 24. in digitorum motoribus, & quo pacto. 250. 34. & 251. 38 & 56
 simiarum ad hominem differentia in pulmonis lobo quinto uenam cauiam sustinente 280. 3. & 41
 simiæ ad hominem differentia, in scapulam mouentibus musculus. 274. 11. & 26 & 32
 * simiæ ab homine in tendine pedis subnato differentia 244. 5
 simijs, musculorum thoracis numeros ab homine uariis 292. 46
 simiæ caudatæ ab hominibus differentes in neruorum serie. 349. 40 & 55.
 simiæ caudatæ lumborum uertebra. 77. 54. & processus eadem. 78. 53. & 79 3
 Nm 4 simiæ

- simia caudatæ tertio musculo digi-
 tos manus mouentium carentes.
 306.
 simiarum sectio Galeno familiarior
 quàm hominum. 42.56. & 81.24
 simiarum Anatomia quàm homi-
 num peritior Galenus. 55.7. & 93.
 6. & 500
 simiarum non caudatarum coccygis
 ossis descriptio 82.54
 simiarum omentum mediam inter
 homines & canes rationem forti-
 tum 496.41
 simia pulmone deceptū Galenum,
 etiam hominis pulmōni quintum
 lobum attribueret 581.56
 simiarum sacri ossis & coccygis deli-
 neatio. 80.38. descriptio 81.37
 simiarū sectione delusus Galenus,
 aliorum Anatomicorū placita ue-
 ra sepe euertere aggressus. 299.50.
 uide, Galenus simiarum secti, delu-
 sus, &c.
 similiaria corpora 286.1
 sinus, ad quem decimus femur mo-
 uentium musculus uoluitur. 131.22
 sinus, quo crassissimus corporis ner-
 uus fertur 131.16
 sinus in uertice diuersa serie 54.53
 sinus articulationis nomine non pa-
 rati 11.21
 sinus ossibus quibusdam peculiaris.
 2
 sinus primæ uertebræ, tubera secun-
 de excipientes 66.4
 sinus, seu acetabula in ossibus quæ.
 10
 sinuum capitis ratio 54.3. inde
 sinuum medullam continentium ap-
 pendices non esse opercula 7.40
 sinuum in ossibus & caput usus,
 10.46 ac differentia. eadem.
 50.
 solis calor in suspensis corporibus
 uis 585.21
 solum pedis 163.54
 * somni arteria 296.45
 σφαγις dentes 167.22
 spatula 167.54
 speciei propagandæ Naturam proui-
 disse 519.45
 σπειραειδής πούς 515.1
 σφαγίς pectoris ossis 92.22
 * σφαγιλλή uenæ 270.10
 sphaerica figura iniurijs ferendis om-
 nium pertinacissima 995.31
 σφισσαδής os 1.37. & 28.33. &
 167.2
 σφουζ, 163.41. neutro & foeminino
 genere 45
 σφουζ perperam à Galeni interpre-
 tubus talos uertit 140.21
 spina 167.31
 spina cur appellatum tibie os. 140.56
 spina scapulae. 163.2. eiusdem appen-
 dix 5. & 6.24
 spina fex humiliorum ceruicis uerte-
 brarum 68.22
 spina uertebrarum 59.1
 spinarum appellatio 57.23. & 99.50
 spinarum apicibus obnata carila-
 go 59.4
 spinarum in uertebis ductus 75.11
 spiritus animalis ubi elaboretur.
 622
 spiritus animalis per uasa distribu-
 tio quæ fiat 623.7
 spiritus in aquam conuersio in cor-
 dis inuolucro, quibusdam asserta.
 585
 spiritus uitalis fons cor 594.56
 spiritui uitali subseruientia membra,
 eorumque ratio 569.27. inde
 σπινδύλιος. 9.30. & σπινδύλοι 167.31
 squamæformis conglutinatio. 21.29.
 & 23.7. & 25 13
 squamose temporum commissuræ.
 27.44. cur ita dictæ ead. 54
 squamose conglutinationes curreli-
 quarum futurarū specie non com-
 pingantur 28.9
 squamose conglutinationes in exteri-
 ori capitis superficie clatius quàm
 interiori ascendere 29.17
 * squamose futuræ 166.34
 σφαλή cur pro gargareone 580.15
 * σελήια dicta uena. 267.2. & 276.52
 σελήια 166.22
 σελήια futura 166.27
 σίγγορ 83.43. & 167.43
 σῆδος 88.43. & 167.44 & 168.16. 54
 σῆδος etiam de palma & pedio dici.
 120
 σῆδος pedis 148.35. & 168.54
 σολήια 237.23
 stomachus, σμάχος. 387.49. & 388.70
 uide, Ventriculus.
 stomacho adnatæ crebro glandulæ.
 389
 stomachi anterior & posterior facies
 32
 stomachi appellatio 153.45
 stomachi examen 603.5
 stomachi fibræ cur duplices solum.
 388
 stomachi obliqui ductus usus. 389.
 16
 stomachi oris dypeus 167.48
 stomachi situs & incellus 388.28
 stomachum non eodem cum arteria
 magna uiti foramine sepi. 388.36
 stomachum non esse angustiores
 quàm uentriculo continuatur. 389.
 15.
 strumæ uulgo strophulæ 245.30
 styloides, siue stylo scriptorio limi-
 lis processus. 8.31. & 23.30. & 31.
 40. & 112.5. & 166.56. & 169.
 14
 stylorem pro sectione descriptio. 236.
 39 delineatio 235.49
 * subciteni arteria 296.45
 Suidæ in laryngis dictione senten-
 tia explosa 579.19
 summus humerus 167.55
 summi humeri appellatio, et usus, ui-
 de, Humerus.

- supercilia 11.1
 sura quid 138.26. & 168.40
 sura tibie uenter 138.30
 * suram constituentes musculorum
 uentres. 245.28. & 248.24
 suspensidij præfagium ex umbilici pro-
 gressu collo obducto 383.44
 suspensorum oculos solum ab aui-
 bus lacerari, non cutem, aliter quàm
 uulgus putat 161.54
 sutura 12.22. & 15.53
 sutura coronalis. 21.16. lambdæoides,
 &c. ead. 19. & 22. inde
 sutura frontis os à maxillæ ossibus di-
 rimens 29.43
 sutura octauum capitis os circūscri-
 bens 28.22
 sutura omentum anterioris uentricu-
 li fundo committens. 377.19. & 356.
 sutura sagittalis 25.12
 suturæ capitis figura 20.4
 suturæ cuneiforme os circumscriben-
 tis interualla, &c. 23.21. inde
 suturæ interuallū cuneiformi et fron-
 tis ossi commune 29.36
 suturæ naturalis figuræ capitis cuius-
 modi 26.38
 suturæ capitis ossibus, & alijs com-
 munes 28.32
 suturæ non naturalium capitis figura-
 rum cuiusmodi 27.29
 suturæ, σφαγίς. 166.25. earumque nomi-
 na. ead.
 suturarum appellatio 39.18
 suturarum capitis delineatio. 24.
 & 25.4. & 37.14. inde, & 38.17. in-
 de. earundem ratio 11.47
 suturarum coitus qualis 16.47
 suturarum maxillæ superioris ratio.
 40.1. inde, ad finem usque Cap.
 suturarum numerus. 28.20. & inter-
 ualla 29.11. inde
 suturarū uoce ueteres etiam harmo-
 nias complexi 16.14
 suturarum usus 26.27
 suturas capitis etiam in interna cal-
 uariæ sede conspici 27.55
 suturis destituta quædam capita.
 27
 symphyllis 12.22. & 16.15
 synarthrosis 12.20. 36. & 13.18
 synarthrosis motus qualis 17.3
 synarthroseos uoce quomodo usus
 Galenus 120.27
 synchondrosis 12.43. & 16.47
 syncypitis ossa 166.38.42
 συννεύρωσις 16.34
 synsarcosis 12.39. & 16.41. &
 17
 sypho pro sectione parandus. 236.
 42. delineatio 235
 σφρηγιστής 58.18
 T
 Adus instrumentum.
 670
 tacijs toto corpore fu-
 sus, cur 19.12
 talus, ασπράγος et ασπίος
 145.28 & 168.43
 tali

I N D E X.

tali ceruix 10. 17
 tali connexus. 15. 46. ad calcē. 146. 27.
 cum osse cymbam referente articu-
 lus. 146. 25
 tali cum calce commissurarum sinus
 146. 34
 tali delineatio. 5. & 6. 5. & 142. & 143. 6
 tali sinus, quibus à tibie osse & fibu-
 la ligamēta assumit. 146. 14. & quib-
 us tendines deducit ead. 20
 talis sinus, ipsiusq; cum tibie osse & fi-
 bula articulationis ratio 145. 40
 tali tuber cur τὸ πρῶτον, siue quatrio
 dictum, 145. 46. 50. quale in cani-
 bus 146. 1
 talum ante sectionem tactui non oc-
 currere 140. 12
 talum falsò appellari à quibusdā exte-
 riorum malleolum 140. 17
 tarsus 168. 50. & 238. 27
 tarsi descriptio 147. 49. inde
 tarsi ossa. 148. 1. eorundem forma &
 quantitas uaria ead. 17
 tarsi ossa quot 162. 47
 tarsi ossium delineatio 5. & 6. 4
 τὸ πρῶτον 4. 40
 τὰς ὀφθαλμοὺς appellatio 150. 29
 temporum lineamenta musculosa
 250. 39
 temporis os. 21. 33. eius processus. 22.
 7. 24. & 23. 14. & 36. 43
 temporis ossis linea 23. 49
 temporum ossis cavitates. 31. 30. pro-
 cessus iugalis ossis portionem con-
 stituens ead. 47
 temporis ossis processus 33. 17
 temporum ossa. 29. 57. eorumq; cir-
 cumscriptio 31. 22. & 165. 48. 54
 temporum ossa lapidea appellata,
 quæ 33. 41
 temporum ossa qualia esse oportue-
 rit 28. 12
 temporum ossium anse 167. 10
 temporalis musculi examen 603. 42
 temporali musculo, quot nervorum
 propaggines offerantur 327. 15
 temporalium musculorum latione
 quæ mala inducantur 33. 27
 temporales plagæ cur stuporiferæ
 Hippocrati dicte 33. 30
 temporales suturæ 166. 14
 temporalibus musculis quomodo
 Natura prospexit 33. 24
 tendo latefcens plattæ cuti subnatus,
 quare, Pedis plana.
 tendo ligamento, non nervo respon-
 det 221. 42
 tendinis sub uola manus latefcens
 descriptio. 302. 27. administratio.
 * 222. 32
 tendines nuncupati Musculi, qui
 267. 43
 tendines, Nerui appellatione dicti
 315. 27
 tendinū in musculis differētē. 228. 44
 tendinum, manus digitos, ac manū
 ipsam mouentium traditio, sub cu-
 iusq; musculorum traditione quæ-
 ratur

tendinum pedis traditio, ac digito-
 rū, sub Musculis pedis quaratur.
 tenon, uertebra 167. 35
 τὸ πρῶτον unde 315. 35
 tergum 167. 31
 testis caput quid Galeno 522. 45
 testis dextri uena à caue caudice. 526. 1
 testis inuolucrum inuoluminum cuiusmo-
 di 522. 27
 testis musculus exteriori ipsius inuo-
 lucrō innatus 522. 16
 testis tunicæ exterioris apertio. 515. 39
 testem interdum unum, interdū tres
 etiam reperiri 521. 21
 testem sinistram petentū uasorum
 ortus examen 555. 9
 testes cerebri, ac eorundem descri-
 ptio 638. 19
 testiculorū malum granatum. 168. 29
 testes mulierum cuiusmodi, 535. 23.
 eorundem inuolucra 38
 testium muliebrium musculorū de-
 scriptio. quare, Vteri musc.
 testium muliebrium ratio 537. 51
 testium muliebrium situs delineatio
 377. 12. & 378
 testium constructionis ad iecur col-
 latio 525. 41
 testium delinatio. 372. & 373. 50. & 374
 testium in uiris musculorum descri-
 ptio. 285. 35. eorum usus. ibid. 51.
 administratio 286. 31
 testium & penis à suis inuolucris de-
 scriptio in administranda Anatome
 555. 19
 testium & uasorum seminalium exa-
 men 555. 46
 testium cum suis musculis delinea-
 tio 372. & 373. 10
 testium inuolucra utriusque testibus
 communia. 522. 34. priuata utriusq;
 ead. 45
 testium musculi, non rectē ab Arabi-
 bus traditi 286. 4
 testium situs. ac numerus. 521. 19. for-
 ma. ead. 23. substantia 26
 testium situs examen 555. 28
 testium substantia feminis procrea-
 trix 525. 38
 testium substantiæ, insertæ uenulæ
 521. 29
 testium uenæ cuiusmodi, earumq;
 ortus. 522. 55. inde. & cum arteria
 connexus. 523. 43. & 524. 12.
 testium uirilium ratio 520. 5
 testium uasa duplicia cuiusmodi 520. 7
 testibus nullam generandi feminis
 uim tribui ab Aristotele 527. 16
 testibus sanguinem ac spiritum defe-
 rentium uasorum numerus & or-
 tus 522. 54
 testudinatum dictum corpus cere-
 bri 636. 37
 τὸ πρῶτον tali tuber, cur dictum 145. 50
 tharua 168. 30
 thalam. papilla 543. 44
 Theod. Gaza. an rectē mesenteria
 ctes uerterit 504. 5
 Theodori Gæza lapsus 155. 4

theologis scholasticis frequentior de
 genitalibus & semine, quàm medi-
 cis, sermo 531. 22
 theologos sibi solis uendicare de ani-
 marum immortalitate disputatio-
 nem 126. 48
 Theophrasti parum Anatomici, locus
 reprehensus 506. 50
 Theriacæ caput, φαρμακον 19. 28
 thorax quid. 88. 38. λεγάμενος. 43. & 167.
 44. & 586. 5
 thorax pro corporis trunco Aristoteli
 389. 41
 thoracis amplitudinem intersepien-
 tium membranarū examen. 559. 57
 thoracis cavitatē intersepiētes mem-
 branæ. 572. 9. inde
 thoracis creandi artificium admirabi-
 le. 88. 45. inde. & 89. 37
 thoracis ex sinistro latere expressio.
 559. 12. item anterioris 560
 thoracis fabricæ quatuor scopi. 89. 40
 thoracis ligamentorū traditio. 294. 45
 thoracis motus cuiusmodi 89. 1
 thoracis motus uoluntarius 286. 50
 thoracis motū, an musculi brachium
 aut scapulam mouentes, adiument
 292. 47. & 293. 13
 thoracis musculi intercostales. quæ-
 re, Intercost. musc.
 thoracem mouētes musculi, necessa-
 riò facti. & eorundem ratio 287. 16
 thoracem mouentium musculorum
 administratio. 293. 18. eorundem
 delineatio. primi. 135. 30. secūdi,
 172. 5. tertij. 201. 10. quarti. 204. 14.
 quinti. 201. 35. sexti. 195. ult. in-
 tercostalium musculorum delinea-
 tio 188. 28
 thoracis motorum musculorum de-
 scriptio. 286. 50. primus. 287. 24.
 secundus. ead. 31. tertius in homi-
 ne, similis quartus. 288. 14. quartus,
 similis sextus. ead. 56. quintus
 hominis, similis septimus. 289. 19.
 sextus hominis, similis octauus.
 ead. 30
 thoracem mouentium musculorum
 enumeratio. & quādo suo fungan-
 tur illi munere 292. 40
 thoracem mouentium musculorum
 numerus uniuersus. 287. 18. & 292.
 40. & quando singuli functionē
 obeant ibidem
 thoracem mouentium musculorum
 sex, non intercostalium functio. 287.
 primi. ead. 29. secūdi. ead. 43. ter-
 tij. 288. 29. quarti. 289. 18. quinti.
 ibid. 29. sexti. ibid. 37
 thoracis musculorum septimi, lateri
 utriusq; communis delineatio 191. 48
 thoracis musculis septem quocūq;
 numerat, & eius traditio tota. 290.
 45. quare item, Septimum
 thoracis situs ratio 388. 8
 thoracis ossium descriptio & figura.
 85. 54. inde. & 86. 7. & 88. 45. inde
 & 89. 45
 thoracis uertebra & costæ 56. 51
 Mm 5 thoracis

thoracis uerterbrarū foramina. 70.45
 thoracis uerterbrarum figura. 71.25.
 uide, Verterbræ thoracis.
θυρεω uerterbræ 167.37
 Thracum renuendi mos retrorum
 flexo capite 63.30. & 67.10
 * *θυρεω* 261.39. * & 282.18
θυρεω cartilago 153.22
θυρεω os 132.8
 tibia, *λευγ* 138.24. & 168.36
 tibiæ os ead.
 tibiæ, & tibiæ ossis discrimen 138.27
 tibiæ appendix 8.1
 tibiæ motus quot. 231.1. super his
 Galeni sententia uaria 230.45
 * tibiæ os ad fibulam neuentium li-
 gametorum descriptio 253.30.
 administratio. 256.34
 tibiæ os, spina appellatum 140.56
 tibiæ ossis ad femur articulat. 138.
 34. inde & 139.15
 tibiæ ossis appēdix & processus. &c.
 138. 31
 tibiæ ossis secundum ipsius longitu-
 dinem, figura 140.54
 tibiæ ossis sinus & tubera, quibus ta-
 lo articulatur 139.41
 tibiæ ossium figura. 136. descriptio.
 137.6. & 133.22. inde
 * tibiam mouentium musculorū ad-
 ministratio. 236.16. primi. ead. 34.
 secundi. ead. 37. tertij & quarti.
 ead. 48. quinti. 56. sexti. 236.24.
 reliquorum trium. 237.9. eorun-
 dem delineatio. primi. 180.26. se-
 cundi. 213.17. tertij. 199.48. quar-
 ti. 199.50. & 205.1. sexti. 180.29. se-
 primi. 186.35. octauī. ibid. 39. no-
 ni 183.32
 * tibiam mouentium musculorū de-
 scriptio. 230.3. primus. 231.11. se-
 cundus. ead. 29. tertius. ead. 50.
 quartus. 232.13. quintus iuxta Ga-
 lenū. ead. 51. iuxta ueritatē. ibid.
 sextus. 234.22. septimus, octauus,
 nonus 235.6
 * de Tibiā mouētibz musculis, Ga-
 leni sententia uaria 230.8
 tibiam petētes nerui. quære, Nerui.
 timidis secur maius datum 507.10
 tintinabulum pro gargareone. 580.13
 tibus quid 494.39
τομης dentes 167.17
 tonsillæ, earumq; usus 389.22
 tonsillæ faucium, quæ 579.46
 tonsillarum examen 604.12
 * torcular cerebri 309.45
 trachametra maior 168.30
τραχηλος 10.11. & 167.34
τραχηλος processus 594.5
τραχηλος mamillarū parum rectē Ari-
 stoteli asserta 544.16
τραχηλος 168.29
τραχηλος femoris processus. 134.56
 tunica costas succingens quid. 570.21.
 eiusdē nomen, ac litus. ead. 29. ma-
 gnitudo. 35. figura. 40. superfi-
 cies quales, quisq; earum ad alias
 partes nexus 50

tunica costas succingens, altera uete-
 ribus dicta, quæ 295.2. & 571.39
 tunica cost. succingentis foramina.
 571.14. substantia. ead. 22
 tunica costas succingentis secundæ
 examen 603.31
 tunica costas succingētis usus, eius-
 demq; constructionis ratio 571.48
 tunicarum costas succingentium ad-
 ministratio 294.43
 tunica oculi, uide, Oculi tunica
 Turcarum anulus, quo sagittantes
 utuntur 154.7
 Turcicæ sellæ cuiusmodi 593.30
 turcorum telorū triangulares cuspi-
 des cuiusmodi 592.8
 Turdulorum gentis quosdam septe-
 nis costis creati 89.55
τυρομαχης cerebri substantia 632.34
 tymparum ossa 166.54
τυφλόν foramen 53.12
τυφλόν intestinum cuiusmodi. 500.9



V
 Accini uteri cornua. 532
 50
 uaccini uteri delineatio
 382. 2
 uariciformis plexus
 524
 uaricosi corporis delineatio 374.
 & 375. 23
 ualis semen à teste ad uescicæ ceruicē
 deferentis historia 524.17
 uasorum appellatio, neruis attribui-
 ta 371.53
 uasorū per lienis corpus series. 512.6
 uasorum testis materiam deducentiū
 ortus ratio 525.54
 uasorum testibus sanguinem accipi-
 riūm deferentium numerus & or-
 tus. 522.54. & an maior dextri late-
 ris quā sinistra implexus 523.50
 ubera. uide, Mamillæ.
 uenalis arteria. uide, Arteria uenalis.
 uenalis arteriæ descriptio. 590.25.
 eiusdem appellatio. 602.
 * uena quid. 257.29. qualiter à mem-
 brana eius corpus differat. ead. 31
 * uena, corpus instrumentariū. 257.34
 * uenæ cōpositio, eiusq; ratio. 258.27
 * uenæ tunica ascititia, quæ 258.41
 uenæ usus 258.55
 * uenæ arterialis descriptio. 312.11.
 delineatio. 311.24. & 590.17. appel-
 latio ead. 19
 uenæ arterialis examen 601.13
 uenæ arterialis membranæ cuiusmo-
 di 592.36
 uenæ arterialis, eiusdemq; orificij de-
 lineatio, ubi querenda 598.42
 uenæ arterialis orificij, ac membra-
 narum examen 602.30
 uenæ arterialis pulmōni insertæ deli-
 neatio 598
 uenæ arterialis principiū. 564.19. inde
 uenæ arterialis usus 593.12
 uenæ axillaris distributio delineata
 271. 37
 * uenæ axillaris oris delineatio. 269.37

* uenæ axillaris per brachium series.
 285.35. & 280.27. distributio in trun-
 cos præcipuos duos, cæteris igno-
 ta. 280.46. portionisq; qua in imū
 mergitur series. ibid. portionis
 qua cutem subit series 287.6
 * uenæ axillarem constituentis ortus
 282. 23
 * a Vena quæ axillam petit ipsi rami,
 priusquam illa brachium sub-
 eat 283.7
 uena caua, uide, Caua uena.
 uena caua primum cordis uas. 590.16
 * uenæ caua per collum caputq; se-
 ries 283.37
 uenæ caua p crura distributio. 291.1.
 femur petentes radices duæ. ibid.
 radices minoris series. 290.16. ma-
 ioris radices series 291.15
 * uenæ caua per crura distributa de
 lineatio. 274.11. per pedes. ibid. 49
 * uenæ caua distributionis descri-
 ptio, ab epate ordiēda cur 276.28
 uenæ caua exortus, & ad iecoris gib-
 bum in duos truncos distributio-
 nis falsa hæcenus traditio 507.8
 * uenæ caua, quæ gibbo epatis adna-
 scitur, delineatio. 269.4. qua in
 dextrū cordis sinum tendit. ead. 17
 * uenæ caua partis eius quæ supra ie-
 cur consistit exposita distributio
 278. 1
 * uenæ caua in iecore series. 276.43
 * uenæ caua ad iugulum progressus
 expositus 281.15
 uenæ caua membranæ 591.36
 uenæ caua orificium 590.4. eiusq;
 delineatio, ubi querenda 589.41
 uenæ caua orificij in cor pertinentis
 usus 596.37
 uenæ caua ortus, an à corde 589.51
 * uenæ caua ortus, apud autores con-
 trouersus. 275.7. item apud Gabe-
 num uariis. * 231.4. & unde eam
 enasci oportuerit ead. 32
 * uenæ caua ortum ē iecore esse, im-
 becilliter à Galeno confirmatum.
 275.14. & quo pacto, deinceps
 * uena caua, quo pacto portæ uenæ
 committatur, & in iecur ramos dif-
 fundat descriptio 275
 * uenæ caua supra os sacrum biper-
 titæ, delineatio 273.28
 * uenæ caua iuxta sacri ossis summā
 regionem distributio. 289.33. quā
 per foramen ossis pubis femur pe-
 tit 290.13
 * uenæ caua pars septum transiens,
 ea quæ sub iecore consistit arctior
 non est. 278.11. contra quā Ga-
 lenus prodidit. ibid. & 271.23
 * uenæ caua per septum transien-
 tis descriptio. 278.46. in septum
 rami. ead. 49. in cordis sinum de-
 xtrum ad apertio. ead. 51
 * uenæ caua ad partes quæ infra se-
 ptum sunt, distributio. 288.21. ad
 renum inuolucra. ead. 28. ad renes
 ipsos. ead. 36. ad lumborum uer-
 tebras

tebras. 239.27
 * uenæ causæ nomina 276.52
 uenæ causæ situs delineat. 370. & 371.9
 * uenæ causæ totius per uniuersum corpus distributæ, delineatio 258
 * uenam causam constituuentem, eque fecore ductarū uenarū, congressus qua iecoris parte fiat 277.6
 * uenam causam sustinens pulmonis fibra, Galeni figmentum 280.31
 * uenæ communis cōstitutio. 287.14. series ead. 39
 * uenæ communis delineatio. 271.55. & 272.14. diuisio. ead. 18.
 * uena coniugis expers dicta. 279.23. & 358. & 359.50
 * uena coniugis expers, quo pacto à caua educenda fuerit 279.12
 * uenæ sine pari delineatio 269.28. eiusdem uariæ distributio exposita 279.35. & 45
 uenæ coniugæ carentis examen. 600. 56. & 602.3
 * uena Coronaria dicta 278.56
 * uenæ Coronariæ delineatio 269.23
 * uenæ superioræ costarum interval- la petentis, descriptio 282.26
 * uena Crassa dicta Hippocrati. 272.38
 * uena decolationis 296.4.44
 * uena ante paruum digitum & anu- larem, humerariæ soboles 286.23
 * uenæ Humerariæ per brachium fe- rientes. 285.35. iuxta cubiti articulum ead. 56
 * uenæ humerariæ ortus, & priusquā brachium subit series 234.7
 * uenæ humerariæ orientis delineatio. 271.7. & totius series. ead. 12
 * uena iugularis interior, eiusq; se- ries. 283.45. exterioris ortus. 284.7. eiusq; series ead. 22
 * uena iugularis interna, quibusdam falso dicta 284.48
 * uena minor Aristoteli dicta, quæ 299.34. & 294.51
 uenæ & arteriæ, in musculorum fa- brica, usus 220.35
 uenæ & arteriæ in testis substantiam implexus, &c. 524.12
 uena portæ. uide, Porta uenæ
 * uenæ portæ descriptio. 264. ramo- rū in iecoris substantia series. ead. 11. extra iecur distributio. 164.12. in- bilis uesciam. ibid. ad uentriculū. ead. 17. ad intestinū duodenum. ead. 37. in duos truncos principa- les scissio. 264.19. trunci sinistri se- ries. 164.50. dextri. 166.5. distri- butionis totius ratio ibid. 35
 * uenæ portæ nomina 266.53
 * uenæ portæ ortus, ac distributionis delineatio 62
 * uenæ portæ rami sanguinem the- lancolicum expurgantes 267.14
 * uena portæ, sanguinem non confi- ci 267.5
 * de uena umbilici locus, ob Galenū aduertendus 294.23
 * uenæ umbilici nudæ delineatio. 293.

* uenæ & arteriarum umbilici descri- ptio. 294. ortus. ead. 7. ductus. ead. 13. usus. ead. 28
 * uenia quæ uterus & mamillæ com- mūcant 290.41
 uenæ albæ Celsi, quæ 518.51
 * uenæ apoplectice, iuueniles, orga- nicæ, peniles, subeticæ, uertigino- sæ, quæ 270.15
 uenæ & arteriæ coli & recti intestini 501. 40
 uenæ & arteriæ renibus oblate. 515.15
 uenæ gracilium intestinorum. 499.38
 uenæ omentum implicantes cuius- modi 496.44
 * uenæ puellarum hymen constituen- tes 290.13
 uenæ, quæ inciduntur 234.14
 uenæ seminales, an à renum uenis oriuntur. 523.15. earumq; ductus. ead. inde 270.17
 * uenæ somni dictæ
 * uenæ substantiæ, cerebri non inna- scuntur, sed membranæ ipsius im- plicantur, & quo pacto 307.13
 uenæ, tempore Aristotelis, Platonis, Hippocratis, quæ 259.20
 uenæ uentriculum petentes. 392.22. inde
 uenarū Anatomes ratio. 552.4. inde
 * in Venarū arteriarumq; serie Na- turæ artificium 260.46
 * uenarum quæ per brachiū distribu- untur appellationes uariæ. 272.28. axillaris. 272.30. acellaris. ibid. 56. auris. 276.9. basilica. 272.57. & 273.8. capitis uena. 272.34. cephalica. ibid. 53. cōmunis. ibid. 42. corpo- ralis. 273.12. cubiti interior. 274. exterior. ead. 34. funis brachij. 272.56. & 273.8. humeraria. 272.34. ieco- raria. 172.32. lienaria. ibid. 33. Me- dia. 272.39. media, mediana. 273.12. nigra. 272.57. & 273.8. oblique dictæ uenæ. 272.41. omnia. ibid. 34. ocularis. 273.8. saluatella. 273.5. salubris. ibid. spatularis 272.51
 * uenarum sex, caluariam ingredien- tium descriptio. 306.43. earū quæ in primū duræ membranæ sinū unā cum arterijs exhauriuntur. 307.49. tertie uenæ series. 310.3. quintæ ac sextæ, ibid. 12. omnium delinea- tio. 305.47
 * uenarum cerebri delineatio 305
 * uenarum cutem pedis ac tibie im- plicantium series, quo pacto discēda. 293.16. earundē nomina. ead. 30.
 uenarū diductibus subditæ glandu- læ, quare, Glandule
 * uenarū ē quibus purgationes men- struæ uirginib. promanare credun- tur, expolitio 290.9
 uenarum ex iecore prodeuntium se- ries 507.19
 uenarum in intestinis ratio 503.35
 * uenarum in pede consistentium se- ctio imperitē à medicis distincta 293. 24

* uenarum iugularium appellationes uariæ 270.13
 * uenarum iugularium delineatio. interioris. 270.6. exterioris. ead. 9
 uenarum mamillis exportectarum series 544.31
 * uenarū manus extremæ cutem im- plicantium series uaria 287.53
 uenarum per abdominis musculos repentium administratio 549.35
 uenarum per abdominis regionem inter cutem & carneam membra- nam excurrentium administratio 549. 10
 uenarum per iecoris substantiam di- gestarū, cur tenuior tunica. 508.37
 uenarum per manum tendentū exa- men. 656.26. per crura 657.49
 * uenarum quæ inter pollicem & in- dicem, inter anularem & minimū habentur, ignorata series apud Me- dicos 288.2
 * uenarum renes petentium delinea- tio 273.15
 * uenarum seminalium delineatio, dextræ, sinistræ 273.21
 * uenarum seminalium series, in ui- ris. 288. sinistræ. ead. 48. dextræ. 289.4. in mulieribus. 289.21
 * uenarum series in cubito quocum- que in cute manus extremæ per sepe- uarians 288.8
 * uenarū sub pectoris osse deorūm repentium descriptio 282.30
 * uenarum totius animalis numerus quis sit 260.20
 uenarum uentriculi munus 493
 uenarum uellæ distributarum ra- tio 518.28
 uenis & arterijs ex iecore & magna arteria excurrentibus, quantum subseruiat mesenterium 504.34
 uenas musculis ad exitum tantum superficiem adnasci. 595.47
 uenas nullas intestinis à caua propa- gari, contrā quā Galenus tradit 504. 49
 ueneris hortus, herba 539.27
 uenter & uenterculus, cur yænoq; & uelut Græcis 389.31
 uenter inferior qui 502.39
 uentris fabricæ solertia 89.32
 uentris mappa 494.39
 uenterculus. uide Stomachus.
 uenterculus cerebri Galeno, nūc me- dius, nunc postremus, præstator dictus 636.36
 uenterculi cerebri anterioris nō sunt olfactus organa, ut putabat Gale- nus, & quædam alia 634.20
 de Venterculis cerebri confutata re- centium sententia 623.19
 uenterculorū cerebri administratio primorum. 652.33. tertij. 653.14. quartj. ibid. 51
 uenterculorū cerebri delineatio, ubi querenda 633.34
 uenterculorū cerebri descriptio. 637. 324. numerus, ibid. 42. dexter ac sinister

INDEX.

sinister. 633. 45. communis amborum
cauitas, qui tertius est uentriculus.
634. 39. quarti uentriculi historia.
635. 3. quid lingulis insit. 635. 30.
quis sit usus. 636. 7. tres priores te-
nui membrana non succingi. 635.
40. à tertio uentriculo educit me-
tus. 364. 47
uentriculorū cerebri septum. 363. 6.
eius descriptio. ibid. usus. ibid. 19
uentriculus cordis dexter, cur sangui-
neus appellatus 596. 20
uentriculus cordis sinister, cur spiri-
tuosus, aëreus ue appellatus 598. 5
uentriculus, cur sub thorace locatus
357. 51
uentriculus rex corporis quibusdam
dictus 494. 7
uentriculi superiori omenti membra
na tecti, descriptio 358. 17
uentriculi anterior pars 357. 12. & 356
uentriculi anterior & posterior faci-
es. 367. interior 368
uentriculi anteriori sedi nullā omen-
ti partem obduci 494. 22
uentriculi capacitatis & tunicarum
examen 554. 8
uentriculi eximendi ratio, in Anato-
mie 553. 38
uentriculi forma. 390. 3. inde. & 506. 8
uentriculi fundus, an carnosior 392. 10
uentriculi historia 389. 30
uentriculi munus 385. 5. & 493. 56
uentriculi munus qui subseruiat par-
tes ei accumbentes, atq; ita illius ad
alias partes contactus 494. 12
uentriculi nerui 493. 12. eorumq; u-
sus ead. 31
uentriculi nutrimentum cuiusmodi
494. 3
uentriculi octo facultates. 493. 56.
& 494. 6
uentriculi officia 365. 5. & 366. 19.
& 390. 6. 21. eorundem non par am-
plitudo. ead. 41
uentriculi superius orificium 370. 16
ad Ventriculi inferioris orificiū glan-
dulosa caro cuiusmodi 391. 2. inde
uentriculi protuberās in orificijs sub-
stantia. 391. 18. eius usus. ead. 25
uentriculi os inferius, cur superiori
arctius, & quanta eiusdem ampli-
tudo in quibusdam 390. 41. inde
uentriculi quantitas 391. 38
uentriculi sedis descriptio. 356. 17. &
figura. 360
uentriculi situs 389. 35. eiusdem exa-
men 551. 14
uentriculi substantia, forma, ac tuni-
cæ 388. 14
uentriculi substantia, quibus forme-
tur tunicis 391. 44. inde
uentriculi superficies 391. 28
uentriculi tunicarū series, numerus,
ac natura 367. 42
uentriculi uenarum munus. 493. 2.
inde. & arteriarum ead. 6
uentriculum nullis cellulis abundan-
te 391. 36

uentriculum petentes uenæ ac arte-
riæ 392. 22. inde
uentriculum quinq; iecoris fibris ap-
prehendi, unde ab Anatomicis tra-
ditum 506. 47
uentriculum sedi, non esse contigu-
um 501. 13
uermis imaginem referentium cere-
bri processuū traditio. 639. 11. deli-
neatio ubi spectanda 638. 55
uermiformes cerebri processus, nul-
lum habent motum 216. 15
uermiformes processus, continentes
tendines pro mente Galeni, qui
639. 48
uermiformium cerebri processuum
administratio 653. 54
uermiformium processuū usus à Gia-
leno mirabiliter traditus. 639. 9. à
recentioribus perperam ead. 23
uerterbra 9. 26. 29
uerterbra superior, inferiori maior
68. 52
uerterbram in dorso medio unā utrin-
que suscipi, cur oportuerit 76. 36
uerterbram secundā aliquot sibi sub-
ditis esse maiorem 68. 49
uerterbra, *anatomia* 167. 31
quot. 162. 39
uerterbrarum appendices. 7. 48. inde.
& 70. 57
uerterbrarum coarticulatio 559. 28
uerterbrarum corpus 57. 3
uerterbrarū corporibus exporrecio-
rum examen 603. 27
uerterbrarum in compingendo sce-
to applicatio cuiusmodi esse debe-
at 160. 32
uerterbrarum in senibus nexus 71. 13
uerterbrarum inter se differentia. 58.
46.
uerterbrarum nexus uariis 15. 11
uerterbrarum omnium articulationis
ratio 75. 44. inde
uerterbrarum processus 8. 18. trans-
uersi 59. 20
uerterbrarum spina 59. 1
uerterbrarū ceruicis corpora quomo-
do committantur. 69. 42. inde
uerterbrarum ceruicis delineatio. 60.
descriptio 64. 35. inde
uerterbrarū ceruicis processuū trans-
uersorum natura. 68. 55. foramen.
69. 4. 25. numerus. 70. 12. laterum
foramina ead. 29
uerterbræ ceruicis primæ descriptio.
64. 35. 40. qualis in canibus. ead.
51. secundæ tubera. 66. 8. & dens.
ead. 28. & 68. 13. inde. earundem &
reliquarum processus quales. ead.
29. inde per totum
uerterbrarum colli, lumborum, & tho-
racis foramina variare. 70. 29. inde
uerterbrarum colli processus 76. 15
uerterbræ costarum, & thoracis 56. 52
uerterbrarum lumborum delineatio.
77. descriptio 78. 6. inde
uerterbrarum lumborum numerus.
78. 8. corpora, ead. 11. foramina,

13. transuersi processus. 18. spina.
24. processus ascendentes & de-
scend. 34. inde & 79. 3
uerterbrarum lumborum processus,
eorumq; ductus. 75. 38. & articu-
lationis ratio 76. 23
uerterbræ thoracis quot numero ple-
runque 72. 45. & 75. 56
uerterbrarum thoracis delineatio. 71.
25. descriptio. 72. 44. inde. fora-
mina 73. 52
uerterbrarum thoracis differentia in
corporibus. 73. 3. ex sinibus, qui
costæ articulantur. ead. 25. ex cor-
porum substantia. ead. 44. à trans-
uersis processibus. 74. 2. à spina.
ead. 40. inde. à processibus ascen-
dentibus & descendentes 75. 43
uerterbrarum thoracis processus, co-
rumq; ductus 75. 24
uerterbrarū thoracis processus quot
76. 51
uerterbrarum thoracis quandam su-
pra, infraq; ab alijs suscipi 72. 51
uerterbras thoracis tredecim sæpius
occurrere, quam undecim 89. 47
uerterbras dorso necessitia ligamēta,
quare, Dorso uert.
uerterbras ginglymo articulari quo-
modo à ueteribus dictum 15. 18
uerterbras in pueris pluribus costare
ossibus 71. 3
uerterbrum 9. 26
uertercis os sinistrum 36. 43
uertercis ossa. 21. 32. & 23. 11. & 29. 56.
eorumq; circumscriptio. 30. 4.
& 166. 38
uertercis ossium situs 28. 15
uertercis sedem urendi, aut tenebran-
di temeritas. 54. 55
uertercis sinus 54. 53
uerterculum 9. 30
uerterculi 167. 32
uescet quid 388. 9
uesica urinæ receptaculum, eiusq; fi-
tus ac forma. 517. 41. substantia ac
fibræ. 518. 2. uenæ, arteriæ & nerui
ead. 28
uesicæ cauitatis delineatio 380. 14
uesicæ ceruicem ambiens musculus
372. & 374. 1. & 226. 34. & 225. 28.
eiusdem descriptio. * 227. 44. in
uiris. ibid. in mulieribus. ead. 51.
usus. ead. 55. administratio. 229. 28.
delineatio in uiris. 226. 34. & 225. 28.
in mulieribus 227. 41
uesicæ situs delineatio. 370. & 371. 36.
& 372
uesicæ fundus 356. & 357. 11
uesicæ tunica, cur durior 518. 16
uestigium 148. 36
uesicæ ceruicis musculi, ipsiusq; uesti-
cæ fundi, & ceruicis examē. 556. 44
uesicæ ceruicis pars uteri ceruici in-
serta 381. 31
uesicæ ceruicis per glandosum cor-
pus transitus 525. 26
uesicæ ceruicis semini urinæq; com-
munis delineatio 374. & 375. 7
uesicæ

I N D E X.

uesicæ cervicis seu colli nō eadem in
 uirīs & mulieribus ratio 519.24
 uesicæ collo adnati corporis glando-
 si usus 526.38
 uesicæ cum seminarijs organis exe-
 ctæ delineatio. 374
 uesicæ & uteri forma quatenus eadē
 530.35
 uesicæ & uteri situs delineatio. 377.
 uestigium 168.54
 uetula os 167.40
 uespertilionū alis similes processus.
 21.38. & 23.15. & 25.51. & 167.7
 uini multi seruētis ad iecoris sangui-
 ficationem comparatio 508.18
 uirginalis dicta uena 293.30
 uirile semen primariū hominis prin-
 cipium 520.38
 uirilīs mēbri structura, uide, Penis.
 uirorum capita à mulierū capitibus
 non perpetuō futuris variare. 26.
 47. inde
 vitreus humor dictus 646.51
 uitra quibusdā dicta foetū inuoluens
 membrana 543.4
V I T V S T R I T O N I V S Athe-
 litus 338.13
 uiuorum sectionis ratio, & quid ea
 præstet 658.27
 ulna quid 110.50. & 168.3.5.10
 ulnæ ad brachiale ductus, inferior-
 risq; ipsius sedis historia, 112.1. inde
 ulnæ ad humerū articulatio, ipsiusq;
 hic processū & sinus descriptio,
 110.53. inde
 ulnæ ad humerū orbitā flexus 106.10
 ulnæ appendix. 8.3. eiusdem proces-
 sus 8.30
 ulnæ cum radio connexus cuiusmo-
 di in animalib; aliquot. 113.9. inde
 ulnæ delineatio, 108. & descriptio.
 109.5. inde
 ulnæ processus anterior & posterior
 109. 22
 ulnæ processus, *longior*. 106.17
 ulnæ processibus nulli appendices
 8. 29
 ulnæ secundum ipsius longitudinē
 forma, & impressiones quedam.
 112.20. eiusdem cognoscendæ uti-
 litas. ead. 52
 ulnæ sinus humeri rotulam excipiens
 109. 23
 ulnæ substantia solida, &c. 115.11
 umbilicus Veneris herba 539.27
 umbilicus an corporis mediū. 595.13
 umbilici figura & descriptio. 355.17.
 & 356
 umbilici à peritonæo liberati figura
 356. & 357.2
 umbilici uasorū administratio. 549.
 57. eorundem præfectio. 550.31.
 eorundem progressus, ac nodi cu-
 iusmodi 383.42. ex eodem præfa-
 cia. ead.
 umbilici uasorū unā cum foetus in-
 uolucris, examen 558.21
 umbilici uenæ, arteria. quare, Vena,
 arteria.

umbilici uena in iecur porrecta. 356.
 & 357. 2
 umbilici uena iecur peritonæo con-
 necit 507.52
 umbilicum non esse corporis mediū
 389. 39
 in Vmbilicum pertinentium uenarū
 & arteriarum series 543.20
 ungues calente aqua auferendi ra-
 tio 158.13
 ungues ex quibus gignantur. 150.11
 ungues sensus omnis expertes. 150.9
 unguium eadem quæ cartilaginū
 substantia 4.46
 unguis figura & descriptio. 149.34.
 43. usus, ac natura. 51. nexus. 150.1
 unguium nerui. 150.7. & incremen-
 ta ead. 13
 unionum à quodam deglutitorum
 historia 390.49
 uocis generatio cuiusmodi 578.7
 uocis materia 62.56. optima quæ
 583. 2
 uocis organum præcipuum aspera
 arteria 577.2.50
 uocis organum præcipuum, laryn-
 gis lingua 154.47
 uocis organum præcipuum quod sit
 iuxta Galenum 261.33
 uocis plectrum gargareon 580.30
 uocem nō edere collo carentia. 62.57
 uolæ mediæ superstrata carnea sub-
 stantia descripta 303.44
 uolulus cuiusmodi intestinū. 499.7
 uolulus meatus, eiusq; ratio 542.25
 urina serosus humor 514.31
 de Vrinæ excolatione medicorum
 commentum 515.46
 urinae foetus meatus. 357.10. & 356. &
 378.17. & 518.36
 urinam foetus deducētis meatus ra-
 tio 542.25
 urinae feminicq; communis meatus.
 523.22. eiusdem separati exemplū.
 529. 23
 urinam ē renibus in uesicā deducen-
 tium meatuum historia. 518.43. eo-
 rundem artificiosa insertio 519.9
 urinam uesicæ deferentiū meatuum
 delineatio. 379.10.36. & 378
 de Vrinarij meatus operculo figmen-
 tum quorundam 516.46
 urinariorum meatuum ad uesicam
 examen 556.23
 urinariorum meatuum in muliere
 examen 557.38
 urinariorum meatuū principia decla-
 rantes figuræ 371.50
 de Vsu partium libri ex aliorum sen-
 tentia à Galeno conscripti 350.4
 uterus muliebris & alinae, acetabu-
 lorum experts 540.9
 uterus qualis in non pragnantibus.
 529.53. in impragnatis. 530.23. inde
 uterus quibus partibus adnascatur,
 & quas solum tangat 536.32
 uteri acetabula uerē quæ, & quæ pri-
 mo, secundo & tertio, ita nuncupa-
 ta 539.19.39. inde

uteri acetabulorum examen. 558.28
 uteri acetabulorum ratio cuiusmodi
 539. 28
 uteri canini & uaccini delineatio
 382. 1.2
 uteri ceruix an multis & orbiculari-
 bus musculis intertexta 535.10
 uteri ceruicis delineatio 378
 uteri ceruicis ratio 537.44
 uteri ceruicis substantia 535.1
 uteri cornua
 uteri cornua in homine, Galeni fig-
 mentum 286.14
 uteri muliebris cornua quid ab alio-
 rum animantium cornibus differ-
 rant 533.6
 uteri cum illū peritonæo alligantibus
 membranis delineatio 380.14
 uteri cum mamillis consortium. 544.
 43. & 546.46
 uteri & uesicæ situs delineatio. 377.
 & 378
 uteri ac uesicæ situs qui obseruādis.
 557.22. & forma ead. 43
 uteri foetu turgidi delineatio 382.40
 uteri forma delineata. 381. & 530.
 35. cur Arabibus quadrata dicta.
 ead. 47
 uteri in fundum & ceruicem diuisio
 529. 35
 uteri fundus puellīs minor. 533.36.
 ceruix mollior 535.14
 uteri fundi os omento cōprimi. 495.9
 uteri fundi oris ad ceruicis os prola-
 psum 530.7
 uteri fundi os, quibus in pudendum
 solet propendere 533.33
 uteri fundi orificium. 380.14. cuius-
 modi 532.11
 uteri fundi sinus. 530.56. cuiusmodi
 531. 30
 uteri fundi substantia 533.46
 uteri interna superficies cuiusmodi
 531. 53
 uteri muliebris ab aliorū animalium
 uteris differentia 530.32
 uteri muliebris magnitudo. 533.16.
 & 381
 uteri musculi 536.36
 uteri muliebris musculorum descri-
 ptio. 286.7. functio, ead. 17. ad-
 ministratio ead. 43
 uteri officium, ipsiusq; conformatio
 nis ratio 537.5
 uteri orificium in coitu non semper
 apertū. 532.20. neq; penem eo excl-
 pi ead. 30
 uteri os, & uteri ceruicis os, nō idem
 532. 14
 uteri sedem & ceruicem petentiū ue-
 narum examen 557.35
 uteri situs, partiumq; uicinarum con-
 tactus 529.41. inde
 uteri situs quatenus foetuū sexus ra-
 tione uariet 530.29
 uteri situs ratio. 557.6. item formæ.
 ead. 11. magnitudinis. 15. sub-
 stantiæ. 19. superficies & nexus.
 32. orificij fundi 59
 uteri

I N D E X.

uteri superficies cuiusmodi 530.50
uteri testes 520.12
uteri tunicae 533.57
uteri tunicae interioris fibrae cuiusmodi 534.48
uteri uenae & arteriae, seminaliumque organorum constructio, 535.21.
& 536. 10
uteri uenarum & arteriarum in foetus in uoluerum implexus 541.35
uteri uenarum & arteriarum ratio 538.
uterum humanum nunquam speculasse Galenum 532.43
utero leuius gerendo, quomodo prope exierit mulieribus Natura 132.1

uuea dicta tunica 647.44
uuea cur progargareone 580.15
VVOLPHANGI HERVVORT
patricij Augustani laus 35.55



X
ipsose in pectore locatum os 93.2
ipsose cartilago ab infima pectoris ossis fededucia 167.46



Y
Aloudus dictus humor 647.
solatodolus 649.22
os. 1.39. & 11.56.
& 55.34. & 167.26

u referentis ossis figura 55.5.27
& 244.32
& 200.200's tunica Gracis dicta, quae 570.
& 167.26
& 166.28



Z
Ac & Zachd 536.41
zeudeth 30.34.
& 166. 32
ziphac, zimpfac. 335.

zirbus, zirbus adipinus 494.39
& 33.134
& 167.

INDICIS FINIS.


SERIES CHARTARVM.


*a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z A B C D E F G H I K L M N O P Q R S
T V X Y Z Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm

Omnes terniones, praeter m & Mm quaterniones. Carterum in m propter infutam extra reliquas chartas figuram quaternione, obseruabis semifolium ideo iniectum, ut ex imaginibus ipsi impressis uariae portiunculae, infutae illic figurae committi queant. Sic & p, propter infutam figuram, ternio efficitur.

BASILEAE. EX OFFICI-
NA IOANNIS OPORINI,
Anno salutis reparaæ M D XLIII.
Mense Iunio.







Col. B. J. P.
 1/1/60

(12), 313 [i.e. 413], (4), [414] - [452], 1641, [452] - [454], 1641, [455] - 659 [i.e. 663], (37) pp.
 = (718) pp.

* $^6A - Z^6a - \ell^6m^{6+3}n - z^6Aa - L\ell^6Mm^8 = 359$ //

c.c. 2/84 PF





RARE 84-B
OVERSILE 27611

- 22371

THE J. PAUL GETTY CENTER
LIBRARY

